

主編單位 南京中醫學院

主編 彭懷仁

中醫方劑大辭典

第八冊



人民衛生出版社

中医方剂大辞典

第 八 册

主编单位 南京中医学院
主 编 彭怀仁

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中医方剂大辞典 第八册/彭怀仁主编. -北京:人民卫生出版社,1996
ISBN 7 117 01890-9

I. 中… II. 彭… III. 方剂学-词典 IV. R289-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 20964 号

中医方剂大辞典

第 八 册

主编单位 南京中医学院

主 编 彭怀仁

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京市崇文区天坛西里10号)

三河市宏达印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 69 $\frac{3}{4}$ 印张 1581千字

1996年12月第1版 1996年12月第1版第1次印刷

印数:00 001— 3 000

ISBN 7-117-01890-9/R·1891 定价:134.50 元

《中医方剂大辞典》顾问委员会

(以姓氏笔划为序)

万友生 王绵之 白永波 吴考槃
何 任 张瑞祥 欧阳琦 周仲瑛
施奠邦 钱伯文 徐国仟 董建华

编写单位

主编单位:南京中医学院

协编单位:山东中医学院

上海中医学院

江西中医学院

湖南中医学院

江西省中医药研究所

湖南省中医药研究院

《中医方剂大辞典》第八分册

编委会及编写人员

(以姓氏笔划为序)

主 编:	彭怀仁					
副 主 编:	万少菊	王旭东	田代华	史欣德	史慕山	朱华德
	孙世发	孙光荣	李 飞	沙凤桐	张民庆	陈子德
	赵国平	洪广祥	顾保群	傅瑞卿		
常委编委:	王旭东	石历闻	史欣德	史慕山	成德水	孙世发
	李 飞	吴承艳	张民庆	赵国平	彭怀仁	
编 委:	万少菊	马永华	王旭东	石历闻	田代华	史欣德
	史慕山	成德水	朱华德	孙世发	孙光荣	孙美珍
	李 飞	肖德发	吴永贵	吴承艳	吴跃进	沙凤桐
	张民庆	张炳填	张浩良	陈 伟	陈子德	陈涤平
	陈德兴	赵文业	赵国平	柳长华	洪广祥	顾保群
	郭君双	郭国华	巢因慈	彭怀仁	傅幼荣	傅瑞卿
	谢文光	虞胜清	路振平	蔡铁如	谭兴贵	樊巧玲
撰 稿 人:	万少菊	马永华	王龙章	王旭东	毛 平	文乐兮
	石历闻	田代华	史欣德	史慕山	包明蕙	匡奕璜
	朱华德	华中健	华浩明	刘更生	刘学华	汤希孟
	阳 立	孙世发	孙光荣	孙迎节	孙美珍	杨 虎
	杨俊杰	李 飞	李春英	吴永贵	吴承艳	吴跃进
	肖德发	何清湖	辛增平	宋经中	张 昱	张为群
	张民庆	张炳填	张浩良	陆 萍	陈 伟	陈卫星
	陈子德	陈家玉	陈涤平	陈德兴	赵文业	赵国平
	柳长华	姜静娴	洪广祥	顾保群	徐春波	郭兰忠
	郭君双	郭国华	郭建生	郭瑞华	龚志南	巢因慈
	彭怀仁	韩育明	蒋玉珍	程淑娟	傅幼荣	傅瑞卿
	谢凤英	谢文光	虞胜清	路振平	蔡铁如	廖云龙
	谭兴贵	樊巧玲	薛建国	戴 慎	魏飞跃	瞿 融

前 言

中医方剂，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病治病的主要手段。纵观周、秦以来，新方创制不断增加，载方文献汗牛充栋，组方理论渐趋完善，为炎黄子孙的健康和中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。在方书的编撰方面，唐以前的方书多出私人之手。如被尊为“方书之祖”的《伤寒论》与《金匱要略》；集简、便、验方面成书的《肘后方》；采集群经，删繁就简的《千金要方》、《千金翼方》；上自神农，下迄唐世，无不采摭的《外台秘要》等，均为私人所编著。由于医药学之发展，与民族之强弱、国家之兴衰有着密切的关系，故自宋代以后，方书之编撰受到了官方的关注，如宋·王怀隐主编的《太平圣惠方》、陈承等主编的《太平惠民和剂局方》、赵佶主编的《圣济总录》、明·朱橚主编的《普济方》、清·吴谦主编的《医宗金鉴》、陈梦雷主编的《古今图书集成·医部全录》等，均为国家级的载方名著，其中《太平惠民和剂局方》是我国官方颁布的第一部成药制剂规范，而《普济方》收载明初以前之方剂达 61739 首之多，《四库全书提要》称为“集方书之大全者”。由于历代王朝关心医药，重视方书，亦促进了民间医药之发展。据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著的各种方书多达 1400 余种。民国迄今，医药科学突飞猛进，中医方剂学亦随着时代的步伐而不断前进。尤其是在中华人民共和国成立以后，党和政府重视中医中药，中医的古籍与新著不断出版，方剂的实验研究相继开展，中医方剂学已成为全国各中医学院主要课程之一。《中华人民共和国药典》收录的名方验方和复方新制剂，对于中医方剂的推广运用，起到了积极的作用。

在制方理论方面，在宋以前多有方而无论，制方之义不明，后人难以掌握，用之稍有不当，不免影响疗效。金·成无己著《伤寒明理论》，对《伤寒论》中 20 首方剂分析主治之证情，阐述配伍之奥义，开创了方论之先河。自此以后，有自创新方，自释方义者，如金·李杲《脾胃论》、《兰室秘藏》，元·罗谦甫《卫生宝鉴》等；有为前人成方撰写方义者，如明·许宏《金镜内台方议》、洪九有《摄生秘剖》；清·罗美《古今名医方论》、汪昂《医方集解》、吴仪洛《成方切用》、王晋三《古方选注》、张秉成《成方便读》等。尤其值得一提的是，清·吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》，是我国第一部由官方修订刊行的方论专著。目前全国各中医院校教材《方剂学》、《中国医学百科全书·方剂学》等著作中的古今名方验方，均由当代名医撰写了方论，对研究方剂配伍原理及临床运用有一定参考价值。

在我国对外文化交往中，中医方书是其内容之一。在日本，成书于公元 984 年的《医心方》，收录了我国唐以前方书中的方剂。在朝鲜，成书于公元 1445 年的《医方类聚》、成书于公元 1610 年的《东医宝鉴》，均引载了我国明代以前方书中的方剂，足见中医方剂在我近邻各国中有着深远的影响。

据近 2000 种中医药文献的不完全统计，中医各科有名称和无名称的方剂已达 13 万首以

上,虽然历经王怀隐、赵佶、朱橚等整理,但存在的问题仍然很多。例如古籍所载之方,均据病证分类,方随病证而列,多无方名目录,欲检一方,殊非易事;同一方剂的出处,众说纷纭,令人莫衷一是,无所适从;同一方剂的名称,因载方文献或版本不同而命名各异,孰先孰后,仓卒难别;有相当一部分方剂的内容,由于辗转传抄刻印,脱、衍、倒、讹比比皆是,以讹传讹,影响疗效;有些常用的名方与验方的不同功效、主治、方论、临证验案、实验研究等资料,分散于各种文献中,汇集不易,难窥全貌;诸如此类,不胜枚举。综上所述,对中医方剂进行一次划时代的、全面的、系统的整理,是一项具有历史意义而又刻不容缓的工作。

《中医方剂大辞典》,对我国上自秦、汉,下迄现代(1986年)的所有有方名的方剂进行了一次系统的整理,力求使上述各种问题得到合理的解决。以方剂检索而言,本书汇集古今有方名的医方,按照辞书形式编纂,既有目录,又有索引,从而解决检方的难题。以方源而言,本书参考古今各种中医药文献,对每一首方剂的方源进行认真的考证,而注明其原始出处,这对研究方剂的历史,澄清方剂的源流,是十分必要的。以一方多名而言,凡属同方异名,经过反复考证,依据载方文献成书年代之先后,确定正名与异名,并将二者相互挂钩,查正名即可知道异名,查异名即可知道正名,这对了解一方多名和准确地统计方数,有着极大的裨益。以方剂的质量而言,本书尽可能地进行仔细的校勘,使脱者补之,衍者删之,倒、讹者正之,使方剂的内容经过这次整理而准确无误。以方剂容纳的资料而言,本书对所有方剂分散在各种文献中的不同主治、方论、验案以及现代实验研究资料分别设项进行整理筛选,汇集于各方之下,为读者全面了解方剂提供了极大的便利。

早在1958年,南京中医学院即开始组织人力,筹备编撰本书,并得到当时的中华人民共和国卫生部的大力支持。到1961年底,已从1700余种中医药文献中,收集了大量的方剂,并进行了初步的筛选整理,此后因故而停顿。1983年原中医古籍办公室又将编撰本书的任务下达给南京中医学院,1985年本书的筹备工作开始恢复,1986年成立课题协作组。1988年国家中医药管理局成立以后,又将本书列为局级课题。在编撰过程中,得到了有关各级主管部门的热情关怀,在此表示衷心的感谢!

我们的主观愿望,是将本书编撰成载方最多、资料最全、考证最精的划时代的方剂大典。但由于本书所收资料涉及文献甚多,考证难度极大,撰审任务非常艰巨,加之我们的水平不够和种种客观条件所限制,错误缺点在所难免,敬请读者指正,以便再版时修改。

编 者

凡 例

一、本辞典共收载上自秦、汉，下迄 1986 年底 1800 余种中医药及有关文献中有方名的方剂 9 万余首。其中以 1911 年以前的方剂为收集重点，1911 年以后的方剂则择优选录。

二、本辞典以方剂名称作为辞目。辞目又分为正辞目与副辞目。同一方剂而有不同名称者，以最早出现的方名为正辞目，其余为副辞目。但在有些文献中，先见的方名仅有主治，而无组成、用法，后见的方名有组成、用法、主治者，则以后见的方名作正辞目，先见的方名作副辞目。

三、正、副辞目按方名首字笔划、笔顺排列；方名首字相同的辞目，先按方名字数归类，字数少者排前，多者排后；方名首字、字数均同者，再按第二字之笔划、笔顺排列，依次类推；同名方则按各方方源的成书年代或创方者生卒年代先后排列。

四、凡经增补的文献，因其原著的方剂与增补的方剂年代不同，故均区别开来确定年代，并尽可能在出处中注明。

五、凡正辞目方名有误者，根据始载书的不同版本及有关转载书径予订正，并在备考中加以说明。副辞目方名有误者，径删不录。

六、正辞目内设方源、异名、组成、用法、功用、主治、宜忌、加減、方论选录、临证举例、现代研究、备考等十二项。

1. 方源：叙述正辞目的原始出处。如始载书存在者，注始载书的书名和卷次；始载书已佚者，注现存最早转载书引始载书。若系转引的人名，经追考创方者的著作中有此方者，改从原著收录；原著已佚或创方人无著作传世者，乃注转载书引某某人方。始载书无方名，后世文献补立方名者，注“方出始载书卷×，名见转载书卷×”。

2. 异名：收录各方异名的名称及其出处。如一方有多种异名者，则按所载异名的文献年代先后排列。若仅有始载书的异名者，不注出处。

3. 组成：收录始载书中各方的具体成分，包括药物名称、炮制、用量等内容。方中药物计量单位，1979 年前的方剂概用旧制，1979 年后新创方均用公制。方中诸药原无用量者，不予增补；后世转载文献已补用量者，则收录于“备考”中。如组成中个别药物无用量，则在备考项说明：“方中某药用量原缺。”如上述某药原无用量，转载书中有用量者，则根据转载文献补入，亦在备考项说明。

4. 用法：收录方剂的制剂、剂型、服用方法与用量等内容。如原书无用法，转载文献已补用法者，则收录于备考项。

5. 功用、主治、宜忌：分别设项收录，叙述各方的功效、主治病证、组方用方的注意事项。凡收录两种以内不同文献的引文资料，均直接摘收引文；凡收录三种以上不同文献的资料，先由编者根据引文内容归纳成主文，然后下列引文。

宜忌项归纳主文，须有三种以上关于疾病、体质、妊娠宜忌和毒副反应的文献资料。若关于药物配伍宜忌、炮制与煎煮药物器皿宜忌、服药时的饮食宜忌等，均只用引文，不写主文。

6. 加减：仅收录始载书的资料。如加减药物占原方用药比例过多者不录；现代方剂加减不严谨者不录；后世转载书的加减一概不录。

7. 方论选录：择用古今名医对各方组成结构、配伍原理、综合功效、辨证运用、方名释义、类方比较等论述，而有独到见解者。原文精简者，录其全文；文字冗长者，择要摘录。

8. 临证举例：选录古今医家运用各方治疗疾病的实际案例。文字简短者全文照录，文字较长者择要摘录。

9. 现代研究：收摘用现代方法与手段对方剂进行实验研究和剂型改革的资料，包括复方药理作用和主要成分的研究，将传统的成方剂型改造成现代剂型等内容，均以摘要或综述方式撰写。对实验资料，摘录其实验结果，不详述实验方法与操作步骤；对剂型改革，不详述制剂的工艺流程。

10. 备考：凡古今医方中的资料，有不宜收入前述各项而确具参考价值又必须收录者，均在本项叙述。有些方剂经编者研究考证，有必要加以说明者，均在本项说明之。

11. 自功用以下各项，其内容出处与方源项一致者，所录引文不注出处；如上述各项收录有方源以外其它文献引文者，均分别注明出处。凡两条以上引文均根据文献年代排列，并编有顺序号。

以上十二项，以方源、组成、功用或主治为必备项，其余各项有资料则设，无资料则从缺。

七、引文筛选与整理：所有引文资料，均经过编者去同存异，精心筛选。相同的引文，一般从最早的文献中收录；若后世文献论述精辟者，择用后世文献的资料。凡引文中的封建迷信内容一概不录。引文文义不顺或重复者，在不违背原意的前提下，由编者作适当的加工整理。

八、副辞目：凡属副辞目，仅写副辞目的名称与出处，及与相关正辞目的关系。并在相关正辞目的有关项目中与之挂钩呼应：如写作“为某某方之异名”的副辞目，在正辞目异名项挂钩；写作“即某某方加（减）某某药”的副辞目，在正辞目加减项挂钩；其余副辞目，均在正辞目的备考项挂钩。

九、出处标注：正辞目除方源、异名二项标明书名和卷次外，其余诸项均只注书名，不注卷次。副辞目的出处亦标明书名和卷次。

期刊注法统一采用：刊名·年；（卷）期；起页。

十、药名统一：凡首字不同的中药异名仍保持原貌，如“瓜蒌”不改“栝楼”，“薯蓣”不改“山药”，“玄胡索”、“元胡索”不改“延胡索”。首字相同的中药异名，第二字以下诸字与《中药大辞典》的正名系同音字者，一律改用《中药大辞典》的正名，如“黄芪”改“黄耆”，“芒硝”改“芒消”，“白鲜皮”改“白鲜皮”；若非同音字者，仍保留此异名。凡辞目中含有药名者，处理方法同此。

十一、书名统一：为了压缩篇幅，我们根据历代文献的引用情况，对某些常用方书的书名进行了简化。如《备急千金要方》简称《千金》，《太平圣惠方》简称《圣惠》。未经简化者仍用全称。一书多名者，选用一种常用名，如《入己良方》又名《寿世良方》，则统一用《人

己良方》。

十二、文字统一：本辞典所用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》（1964年第二版）为主要依据。根据中医药学名词术语的要求，少数繁体字如癥瘕之“癥”，橘皮之“橘”等，仍予保留。

十三、文献版本：凡一书有多种版本者，选用善本、足本；无善本者，选用最佳的通行本；其它不同的版本作为校勘、补充。若同一方剂在不同的版本中方名有差异者，以善本、最佳通行本或较早版本之方名作正辞目，其它版本的方名作副辞目。

十四、本辞典分11册出版。1~10册为正编，书前均设该册“方名目录”，按方名笔划顺序编排。第11册为附编，设有全书方名总目录、病证名称索引、参考书目索引、古今度量衡对照表等，以利读者检索。

目 录

十 画

【一】

艳

66424 艳容膏 1

珠

66425 珠云散 1

66426 珠母散 1

66427 珠龟丸 1

66428 珠泥膏 1

66429 珠宝丹 1

66430 珠宝散 1

66431 珠参散 1

66432 珠珀丸 1

66433 珠珀丹 2

66434 珠珀膏 2

66435 珠荳散 2

66436 珠香散 2

66437 珠粉丸 2

66438 珠粉丸 2

66439 珠粉散 2

66440 珠粉散 3

66441 珠粉散 3

66442 珠黄粉 3

66443 珠黄散 3

66444 珠黄散 3

66445 珠黄散 3

66446 珠黄散 3

66447 珠黄散 3

66448 珠黄散 3

66449 珠黄散 4

66450 珠黄散 4

66451 珠黄散 4

66452 珠黄散 4

66453 珠蛤散 4

66454 珠窝散 4

66455 珠子辰砂丹 4

66456 珠玉二宝粥 4

66457 珠母补益方 5

66458 珠珀如意散 5

66459 珠珀保婴丹 5

66460 珠珀益元散 5

66461 珠珀救苦散 5

66462 珠黄十宝丹 6

66463 珠黄八宝丹 6

66464 珠黄夺命散 6

66465 珠黄吹喉散 6

66466 珠黄宝生丹 6

66467 珠黄保生丹 6

66468 珠黄消疳散 7

66469 珠黄琥珀丸 7

66470 珠黄紫香丸 7

66471 珠珀滋阴淋浊丸 7

66472 珠黄琥珀抱龙丸 7

顽

66473 顽荆散 7

66474 顽癖丸 7

66475 顽癖方 7

66476 顽癖方 8

66477 顽癖必效方 8

66478 顽癖浮萍丸 8

耘

66479 耘苗丹 8

素

66480 素丹 8

66481 素雪丹 8

蚕

66482 蚕子酒 8

66483 蚕号散 8

66484 蚕矢汤 8

66485 蚕灰散 8

66486 蚕灰散 8

66487 蚕灰散 9

66488 蚕蚕散 9

66489 蚕沙汤 9

66490 蚕沙饮 9

66491 蚕沙饮 9

66492 蚕沙酒 9

66493 蚕沙散 9

66494 蚕沙散 9

66495 蚕沙膏 9

66496 蚕纸丸 9

66497 蚕矾散 9

66498 蚕茧汤 10

66499 蚕茧散 10

66500 蚕茧散 10

66501 蚕茧散 10

66502 蚕香散 10

66503 蚕消散 10

66504 蚕蛾散 10

66505 蚕蛾散 10

66506 蚕蛾散 10

66507 蚕蛻散 10

66508 蚕蛻散 10

66509 蚕蛻散 10

66510 蚕蛻散 10

66511 蚕蛻散 11

66512 蚕鳖散 11

66513 蚕豆花露 11

66514 蚕沙浸酒	11	66555 秦艽汤	15	66598 秦艽散	21
66515 蚕沙蒸方	11	66556 秦艽汤	16	66599 秦艽散	21
66516 蚕沙熨方	11	66557 秦艽汤	16	66600 秦艽散	21
66517 蚕茧眼药	11	66558 秦艽汤	16	66601 秦艽散	21
66518 蚕退纸散	11	66559 秦艽汤	16	66602 秦艽散	21
66519 蚕蛹汁方	11	66560 秦艽汤	16	66603 秦艽散	22
66520 蚕沙黄柏汤	12	66561 秦艽汤	16	66604 秦艽散	22
66521 蚕蝎归耆汤	12	66562 秦艽汤	16	66605 秦艽散	22
		66563 秦艽汤	16	66606 秦艽散	22
		66564 秦艽汤	17	66607 秦艽散	22
		66565 秦艽汤	17	66608 秦艽散	22
66522 秦二散	12	66566 秦艽汤	17	66609 秦艽散	22
66523 秦王散	12	66567 秦艽汤	17	66610 秦艽散	23
66524 秦艽丸	12	66568 秦艽汤	17	66611 秦艽散	23
66525 秦艽丸	12	66569 秦艽汤	17	66612 秦艽散	23
66526 秦艽丸	12	66570 秦艽汤	17	66613 秦艽散	23
66527 秦艽丸	12	66571 秦艽汤	17	66614 秦艽散	23
66528 秦艽丸	12	66572 秦艽汤	17	66615 秦艽散	23
66529 秦艽丸	13	66573 秦艽汤	18	66616 秦艽散	23
66530 秦艽丸	13	66574 秦艽汤	18	66617 秦艽散	23
66531 秦艽丸	13	66575 秦艽汤	18	66618 秦艽散	23
66532 秦艽丸	13	66576 秦艽汤	18	66619 秦艽散	24
66533 秦艽丸	13	66577 秦艽汤	18	66620 秦艽散	24
66534 秦艽汤	13	66578 秦艽汤	18	66621 秦艽散	24
66535 秦艽汤	13	66579 秦艽饮	18	66622 秦艽散	24
66536 秦艽汤	14	66580 秦艽饮	18	66623 秦艽散	24
66537 秦艽汤	14	66581 秦艽饮	18	66624 秦艽散	24
66538 秦艽汤	14	66582 秦艽酒	18	66625 秦艽散	24
66539 秦艽汤	14	66583 秦艽酒	19	66626 秦艽散	25
66540 秦艽汤	14	66584 秦艽酒	19	66627 秦艽散	25
66541 秦艽汤	14	66585 秦艽散	19	66628 秦艽散	25
66542 秦艽汤	14	66586 秦艽散	19	66629 秦艽散	25
66543 秦艽汤	14	66587 秦艽散	19	66630 秦艽散	25
66544 秦艽汤	15	66588 秦艽散	19	66631 秦艽煎	25
66545 秦艽汤	15	66589 秦艽散	20	66632 秦皮丸	25
66546 秦艽汤	15	66590 秦艽散	20	66633 秦皮丸	25
66547 秦艽汤	15	66591 秦艽散	20	66634 秦皮汤	25
66548 秦艽汤	15	66592 秦艽散	20	66635 秦皮汤	25
66549 秦艽汤	15	66593 秦艽散	20	66636 秦皮汤	26
66550 秦艽汤	15	66594 秦艽散	20	66637 秦皮汤	26
66551 秦艽汤	15	66595 秦艽散	20	66638 秦皮汤	26
66552 秦艽汤	15	66596 秦艽散	21	66639 秦皮汤	26
66553 秦艽汤	15	66597 秦艽散	21	66640 秦皮汤	26
66554 秦艽汤	15				

秦

66641 秦皮汤	26	66684 秦艽天麻汤	31	66723 泰山盘石散	36
66642 秦皮汤	26	66685 秦艽牛蒡汤	31		
66643 秦皮汤	26	66686 秦艽升麻汤	31	盞	
66644 秦皮汤	26	66687 秦艽白术丸	31	66724 盞蒸	36
66645 秦皮汤	26	66688 秦艽白术汤	31	66725 盞落汤	36
66646 秦皮汤	26	66689 秦艽白术汤	31	66726 盞落汤	36
66647 秦皮汤	27	66690 秦艽地黄丸	32	66727 盞落汤	37
66648 秦皮汤	27	66691 秦艽地黄汤	32	66728 盞落汤	37
66649 秦皮汤	27	66692 秦艽地黄汤	32	66729 盞落散	37
66650 秦皮散	27	66693 秦艽地黄汤	32		
66651 秦皮散	27	66694 秦艽当归汤	32	桂	
66652 秦皮散	27	66695 秦艽当归汤	32	66730 桂丸	37
66653 秦皮散	27	66696 秦艽竹沥汤	32	66731 桂汤	37
66654 秦皮散	27	66697 秦艽防风汤	32	66732 桂浆	37
66655 秦皮散	27	66698 秦艽苍术汤	32	66733 桂浆	37
66656 秦皮散	27	66699 秦艽苍术汤	33	66734 桂散	37
66657 秦皮散	27	66700 秦艽扶羸汤	33	66735 桂膏	37
66658 秦皮散	28	66701 秦艽羌活汤	33	66736 桂膏	38
66659 秦皮散	28	66702 秦艽补漏汤	33	66737 桂车汤	38
66660 秦皮散	28	66703 秦艽柴胡汤	33	66738 桂心丸	38
66661 秦皮散	28	66704 秦艽涂敷方	33	66739 桂心丸	38
66662 秦皮煎	28	66705 秦艽黄芩汤	34	66740 桂心丸	38
66663 秦龟饮	28	66706 秦艽寄生汤	34	66741 桂心丸	38
66664 秦矾散	28	66707 秦艽鳖甲饮	34	66742 桂心丸	38
66665 秦桂丸	28	66708 秦艽鳖甲散	34	66743 桂心丸	38
66666 秦桂丸	28	66709 秦艽鳖甲散	34	66744 桂心丸	39
66667 秦桂丸	28	66710 秦皮大黄汤	35	66745 桂心丸	39
66668 秦椒丸	29	66711 秦皮洗眼方	35	66746 桂心丸	39
66669 秦椒丸	29	66712 秦皮洗眼方	35	66747 桂心丸	39
66670 秦椒丸	29	66713 秦皮洗眼汤	35	66748 桂心丸	39
66671 秦椒散	29	66714 秦皮洗眼汤	35	66749 桂心丸	39
66672 秦椒散	29	66715 秦皮洗眼汤	35	66750 桂心丸	39
66673 秦椒散	29	66716 秦椒剪红丸	35	66751 桂心丸	39
66674 秦艽饮子	30	66717 秦皮汤洗眼方	35	66752 桂心丸	40
66675 秦艽饮子	30	66718 秦艽牛乳二味汤	35	66753 桂心丸	40
66676 秦艽饮子	30	66719 秦王续命大八风散	35	66754 桂心丸	40
66677 秦艽饮子	30			66755 桂心丸	40
66678 秦艽煮散	30	66720 秦家二十四味养胃		66756 桂心丸	40
66679 秦艽煮散	30	丸	36	66757 桂心丸	40
66680 秦川剪红丸	30	66721 秦绶锦家二十四味养脾		66758 桂心丸	41
66681 秦川剪红丸	30	丸	36	66759 桂心丸	41
66682 秦王背指散	30			66760 桂心丸	41
66683 秦艽人参汤	30	秦			
		66722 泰山茵芋散	36		

66761 桂心丸	41	66804 桂心汤	46	66847 桂心散	52
66762 桂心丸	41	66805 桂心汤	46	66848 桂心散	52
66763 桂心丸	41	66806 桂心汤	46	66849 桂心散	52
66764 桂心丸	41	66807 桂心汤	46	66850 桂心散	52
66765 桂心丸	41	66808 桂心饮	46	66851 桂心散	52
66766 桂心汤	42	66809 桂心酒	46	66852 桂心散	52
66767 桂心汤	42	66810 桂心酒	46	66853 桂心散	52
66768 桂心汤	42	66811 桂心散	47	66854 桂心散	52
66769 桂心汤	42	66812 桂心散	47	66855 桂心散	52
66770 桂心汤	42	66813 桂心散	47	66856 桂心散	53
66771 桂心汤	42	66814 桂心散	47	66857 桂心散	53
66772 桂心汤	42	66815 桂心散	47	66858 桂心散	53
66773 桂心汤	43	66816 桂心散	47	66859 桂心散	53
66774 桂心汤	43	66817 桂心散	47	66860 桂心散	53
66775 桂心汤	43	66818 桂心散	48	66861 桂心散	53
66776 桂心汤	43	66819 桂心散	48	66862 桂心散	53
66777 桂心汤	43	66820 桂心散	48	66863 桂心散	54
66778 桂心汤	43	66821 桂心散	48	66864 桂心散	54
66779 桂心汤	43	66822 桂心散	48	66865 桂心散	54
66780 桂心汤	43	66823 桂心散	48	66866 桂心散	54
66781 桂心汤	43	66824 桂心散	48	66867 桂心散	54
66782 桂心汤	43	66825 桂心散	49	66868 桂心散	54
66783 桂心汤	44	66826 桂心散	49	66869 桂心散	54
66784 桂心汤	44	66827 桂心散	49	66870 桂心散	54
66785 桂心汤	44	66828 桂心散	49	66871 桂心散	54
66786 桂心汤	44	66829 桂心散	49	66872 桂心散	54
66787 桂心汤	44	66830 桂心散	49	66873 桂心散	54
66788 桂心汤	44	66831 桂心散	49	66874 桂心散	55
66789 桂心汤	44	66832 桂心散	49	66875 桂心散	55
66790 桂心汤	44	66833 桂心散	50	66876 桂心散	55
66791 桂心汤	44	66834 桂心散	50	66877 桂心散	55
66792 桂心汤	44	66835 桂心散	50	66878 桂心散	55
66793 桂心汤	45	66836 桂心散	50	66879 桂心散	55
66794 桂心汤	45	66837 桂心散	50	66880 桂心散	55
66795 桂心汤	45	66838 桂心散	50	66881 桂心散	55
66796 桂心汤	45	66839 桂心散	50	66882 桂心散	55
66797 桂心汤	45	66840 桂心散	51	66883 桂心散	55
66798 桂心汤	45	66841 桂心散	51	66884 桂心粥	55
66799 桂心汤	45	66842 桂心散	51	66885 桂心粥	55
66800 桂心汤	45	66843 桂心散	51	66886 桂心煎	56
66801 桂心汤	46	66844 桂心散	51	66887 桂心膏	56
66802 桂心汤	46	66845 桂心散	51	66888 桂心膏	56
66803 桂心汤	46	66846 桂心散	51	66889 桂术汤	56

66890 桂术汤	56	66933 桂附汤	60	66976 桂枝汤	67
66891 桂术汤	56	66934 桂附汤	60	66977 桂枝汤	67
66892 桂术汤	56	66935 桂附汤	61	66978 桂枝汤	67
66893 桂术汤	56	66936 桂附汤	61	66979 桂枝汤	67
66894 桂术散	57	66937 桂附汤	61	66980 桂枝汤	67
66895 桂号散	57	66938 桂附汤	61	66981 桂枝汤	67
66896 桂皮散	57	66939 桂附汤	61	66982 桂枝汤	68
66897 桂皮散	57	66940 桂附汤	61	66983 桂枝汤	68
66898 桂朴汤	57	66941 桂附汤	61	66984 桂枝酒	68
66899 桂朴散	57	66942 桂附汤	62	66985 桂枝散	68
66900 桂朴散	57	66943 桂附散	62	66986 桂枝散	68
66901 桂芎汤	57	66944 桂附散	62	66987 桂枝散	68
66902 桂芎汤	57	66945 桂附散	62	66988 桂枝散	68
66903 桂曲丸	57	66946 桂附散	62	66989 桂枝散	68
66904 桂红丸	57	66947 桂附散	62	66990 桂枝散	69
66905 桂芸膏	58	66948 桂附散	62	66991 桂枝散	69
66906 桂花汤	58	66949 桂附膏	62	66992 桂枝散	69
66907 桂花饼	58	66950 桂枝丸	62	66993 桂苓丸	69
66908 桂花散	58	66951 桂枝汤	62	66994 桂苓丸	69
66909 桂花散	58	66952 桂枝汤	64	66995 桂苓汤	69
66910 桂杏丸	58	66953 桂枝汤	65	66996 桂苓汤	69
66911 桂杏丸	58	66954 桂枝汤	65	66997 桂苓汤	69
66912 桂杏丸	58	66955 桂枝汤	65	66998 桂苓汤	70
66913 桂连丸	58	66956 桂枝汤	65	66999 桂苓汤	70
66914 桂肝丸	58	66957 桂枝汤	65	67000 桂苓饮	70
66915 桂辛丸	58	66958 桂枝汤	65	67001 桂苓饮	70
66916 桂辛汤	58	66959 桂枝汤	65	67002 桂苓散	70
66917 桂辛散	59	66960 桂枝汤	65	67003 桂苓散	70
66918 桂辛散	59	66961 桂枝汤	65	67004 桂苓散	70
66919 桂沉浆	59	66962 桂枝汤	66	67005 桂参丸	70
66920 桂灵散	59	66963 桂枝汤	66	67006 桂参丸	70
66921 桂附丸	59	66964 桂枝汤	66	67007 桂参汤	70
66922 桂附丸	59	66965 桂枝汤	66	67008 桂参汤	71
66923 桂附丸	59	66966 桂枝汤	66	67009 桂珀散	71
66924 桂附丸	59	66967 桂枝汤	66	67010 桂荔汤	71
66925 桂附丸	59	66968 桂枝汤	66	67011 桂药散	71
66926 桂附丸	60	66969 桂枝汤	66	67012 桂星散	71
66927 桂附丸	60	66970 桂枝汤	67	67013 桂骨散	71
66928 桂附丸	60	66971 桂枝汤	67	67014 桂香丸	71
66929 桂附丸	60	66972 桂枝汤	67	67015 桂香丸	71
66930 桂附汤	60	66973 桂枝汤	67	67016 桂香丸	71
66931 桂附汤	60	66974 桂枝汤	67	67017 桂香丸	71
66932 桂附汤	60	66975 桂枝汤	67	67018 桂香汤	72

67019 桂香汤	72	67062 桂心牡蛎汤	76	67105 桂枝甘草汤	80
67020 桂香饮	72	67063 桂心牡蛎散	76	67106 桂枝石膏汤	81
67021 桂香散	72	67064 桂心羌活丸	76	67107 桂枝石膏汤	81
67022 桂香散	72	67065 桂心枳实汤	76	67108 桂枝石膏汤	81
67023 桂香散	72	67066 桂心茯苓丸	76	67109 桂枝归苓汤	81
67024 桂香散	72	67067 桂心釜墨散	76	67110 桂枝四七汤	81
67025 桂香散	72	67068 桂心胶饴汤	76	67111 桂枝四物汤	81
67026 桂香散	72	67069 桂心消积丸	76	67112 桂枝生化汤	81
67027 桂香散	72	67070 桂心蜂房散	76	67113 桂枝白术汤	82
67028 桂香散	72	67071 桂心橘皮汤	76	67114 桂枝白术汤	82
67029 桂香散	72	67072 桂末吹鼻方	77	67115 桂枝白术汤	82
67030 桂香膏	73	67073 桂术二陈汤	77	67116 桂枝白芍汤	82
67031 桂姜丸	73	67074 桂术加葱汤	77	67117 桂枝白虎汤	82
67032 桂姜丸	73	67075 桂朴当归散	77	67118 桂枝瓜蒌汤	82
67033 桂姜丸	73	67076 桂芍知母汤	77	67119 桂枝半夏汤	82
67034 桂姜汤	73	67077 桂芍当归散	77	67120 桂枝加味汤	82
67035 桂姜汤	73	67078 桂附二陈汤	77	67121 桂枝加参汤	82
67036 桂姜汤	73	67079 桂附二陈汤	77	67122 桂枝加桂汤	82
67037 桂姜饮	73	67080 桂附八味丸	77	67123 桂枝地黄汤	83
67038 桂姜散	73	67081 桂附八味汤	77	67124 桂枝芍药汤	83
67039 桂姜散	73	67082 桂附八珍汤	77	67125 桂枝芍药汤	83
67040 桂桃汤	73	67083 桂附止带汤	78	67126 桂枝芍药汤	83
67041 桂香汤	74	67084 桂附六合汤	78	67127 桂枝芍药汤	83
67042 桂铁散	74	67085 桂附地黄丸	78	67128 桂枝芍药汤	83
67043 桂浆粥	74	67086 桂附地黄汤	78	67129 桂枝芍药汤	83
67044 桂菖散	74	67087 桂附杜仲汤	78	67130 桂枝芍药汤	83
67045 桂黄汤	74	67088 桂附苓乌汤	78	67131 桂枝芍药汤	83
67046 桂黄丸	74	67089 桂附苓术饮	78	67132 桂枝芍药汤	84
67047 桂椒丸	74	67090 桂附贴脐膏	78	67133 桂枝防风汤	84
67048 桂椒錠	74	67091 桂附逍遥散	78	67134 桂枝防风汤	84
67049 桂粟饮	74	67092 桂附理中丸	78	67135 桂枝如圣饮	84
67050 桂蜡丸	74	67093 桂附理中汤	79	67136 桂枝红花汤	84
67051 桂蜜汤	75	67094 桂附理中汤	79	67137 桂枝茯苓汤	84
67052 桂麝散	75	67095 桂附续命汤	79	67138 桂枝牡蛎汤	84
67053 桂心酒粥	75	67096 桂附醒风汤	79	67139 桂枝皂角汤	84
67054 桂苓饮子	75	67097 桂枝人参汤	79	67140 桂枝皂荚汤	84
67055 桂矾敷方	75	67098 桂枝大黄汤	80	67141 桂枝羌活汤	84
67056 桂丁定痛散	75	67099 桂枝大黄汤	80	67142 桂枝补血汤	85
67057 桂心三物汤	75	67100 桂枝大黄汤	80	67143 桂枝附子汤	85
67058 桂心白术丸	75	67101 桂枝五物汤	80	67144 桂枝附子汤	85
67059 桂心白术汤	75	67102 桂枝乌头汤	80	67145 桂枝附子汤	85
67060 桂心白术散	75	67103 桂枝乌苓汤	80	67146 桂枝苓泽汤	85
67061 桂心半夏汤	76	67104 桂枝六合汤	80	67147 桂枝苓泽汤	85

67148 桂枝苓泽汤	86	67191 桂苓术甘汤	91	67234 桂枝加黄耆汤	96
67149 桂枝和营汤	86	67192 桂苓术附汤	91	67235 桂枝加葛根汤	97
67150 桂枝治伤汤	86	67193 桂苓甘术汤	91	67236 桂枝合白虎汤	98
67151 桂枝参苓汤	86	67194 桂苓甘枣汤	91	67237 桂枝合补血汤	98
67152 桂枝参耆煎	86	67195 桂苓甘草汤	91	67238 桂枝栝楼根汤	98
67153 桂枝枳实汤	86	67196 桂苓甘露汤	91	67239 桂心生姜枳实汤	98
67154 桂枝柏叶汤	86	67197 桂苓甘露饮	91	67240 桂甘龙骨牡蛎汤	98
67155 桂枝梔子汤	86	67198 桂苓甘露饮	91	67241 桂附八味地黄丸	98
67156 桂枝茯苓丸	86	67199 桂苓甘露饮	91	67242 桂附乌梅四物汤	98
67157 桂枝茯苓汤	87	67200 桂苓甘露饮	91	67243 桂枝一白虎二汤	99
67158 桂枝茯苓汤	87	67201 桂苓甘露饮	91	67244 桂枝二麻黄一汤	99
67159 桂枝独活汤	87	67202 桂苓甘露散	91	67245 桂枝二越婢一汤	99
67160 桂枝姜附汤	87	67203 桂苓甘露散	92	67246 桂枝二越婢一汤	100
67161 桂枝姜苓汤	88	67204 桂苓甘露散	92	67247 桂枝人参芍药汤	100
67162 桂枝姜苓汤	88	67205 桂苓白术丸	92	67248 桂枝人参黄耆汤	100
67163 桂枝姜砂汤	88	67206 桂苓白术汤	92	67249 桂枝丹皮地黄汤	100
67164 桂枝桃仁汤	88	67207 桂苓白术散	92	67250 桂枝丹皮首乌汤	100
67165 桂枝桃仁汤	88	67208 桂苓白术散	92	67251 桂枝丹皮桃仁汤	100
67166 桂枝柴胡汤	88	67209 桂苓神术汤	92	67252 桂枝丹皮紫苏汤	101
67167 桂枝柴胡汤	88	67210 桂苓理中汤	92	67253 桂枝甘草附子汤	101
67168 桂枝调血饮	88	67211 桂苓薤苳汤	92	67254 桂枝龙骨牡蛎汤	101
67169 桂枝薑朮汤	88	67212 桂珀调经散	93	67255 桂枝龙骨牡蛎汤	101
67170 桂枝黄土汤	89	67213 桂香匀气丸	93	67256 桂枝生姜枳实汤	101
67171 桂枝黄芩汤	89	67214 桂扁猪肚饮	93	67257 桂枝瓜蒌首乌汤	101
67172 桂枝黄芩汤	89	67215 桂麻各半汤	93	67258 桂枝加附红花汤	101
67173 桂枝黄耆汤	89	67216 桂耆贴足方	93	67259 桂枝地黄阿胶汤	101
67174 桂枝救逆汤	89	67217 桂麝椒雄耆	93	67260 桂枝芍药大黄汤	101
67175 桂枝麻黄汤	89	67218 桂心菴藿子丸	93	67261 桂枝芍药当归汤	101
67176 桂枝麻黄散	89	67219 桂枝去芍药汤	93		
67177 桂枝续命汤	89	67220 桂枝加人参汤	94		
67178 桂枝续命汤	90	67221 桂枝加干姜汤	94		
67179 桂枝葛根汤	90	67222 桂枝加干葛汤	94		
67180 桂枝葛根汤	90	67223 桂枝加大黄汤	94		
67181 桂枝葛根汤	90	67224 桂枝加归芍汤	95		
67182 桂枝越婢汤	90	67225 桂枝加瓜蒌汤	95		
67183 桂枝解肌汤	90	67226 桂枝加朴杏汤	95		
67184 桂枝解毒汤	90	67227 桂枝加芍药汤	95		
67185 桂枝解毒汤	90	67228 桂枝加当归汤	95		
67186 桂枝解毒汤	90	67229 桂枝加附子汤	95		
67187 桂枝新加汤	90	67230 桂枝加附子汤	96		
67188 桂枝橘皮汤	90	67231 桂枝加附桂汤	96		
67189 桂枝薑香汤	91	67232 桂枝加桂枝汤	96		
67190 桂苓术通散	91	67233 桂枝加耆术汤	96		

67262	桂枝芍药知母汤	101	67283	桂枝加芍药大黄汤	106	67305	桂枝去桂加茯苓白术汤	109
67263	桂枝芍药黄土汤	102	67284	桂枝加芍药当归汤	106	67306	桂枝加人参芍药新加汤	109
67264	桂枝当归桃仁汤	102	67285	桂枝加当归芍药汤	106	67307	桂枝加芍药人参新加汤	109
67265	桂枝汤加乌头汤	102	67286	桂枝加当归茯苓汤	106	67308	桂枝加芍药生姜人参汤	110
67266	桂枝汤加附子方	102	67287	桂枝加附子红花汤	106	67309	桂枝加芍药防风防己汤	110
67267	桂枝附子续命汤	102	67288	桂枝加厚朴杏子汤	106	67310	桂枝加知母石膏升麻汤	110
67268	桂枝茯苓人参汤	103	67289	桂枝加厚朴杏仁汤	107	67311	桂枝加黄耆知母石膏汤	110
67269	桂枝茯苓当归汤	103	67290	桂枝加黄耆五两汤	107	67312	桂枝附子去桂加白术汤	110
67270	桂枝姜附阿胶汤	103	67291	桂枝加葛根瓜蒌汤	107	67313	桂枝附子汤去桂加术汤	110
67271	桂枝姜苓牡蛎汤	103	67292	桂姜枣草黄辛附汤	107	67314	桂枝黄耆白薇款冬花散	110
67272	桂枝姜苓阿胶汤	103	67293	桂姜草枣黄辛附汤	107	67315	桂苓甘味合附子都气丸	110
67273	桂枝栝楼干葛汤	103	67294	桂甘姜枣麻辛附子汤	107	67316	桂枝去芍药加茯苓白术汤	110
67274	桂枝柴胡各半汤	103	67295	桂甘姜枣麻附细辛汤	107	67317	桂枝去芍药加黄辛附子汤	111
67275	桂枝黄耆鳖甲汤	103	67296	桂枝去芍药加皂荚汤	107	67318	桂枝去芍药加麻辛附子汤	111
67276	桂枝麻黄各半汤	103	67297	桂枝去芍药加附子汤	107	67319	桂枝附子去桂枝加白术汤	111
67277	桂苓五味甘草汤	104	67298	桂枝甘草龙骨牡蛎汤	108	67320	桂枝附子汤去桂加白术汤	111
67278	桂苓甘草五味汤	104	67299	桂枝加葛根瓜蒌根汤	109	67321	桂枝蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	111
67279	桂枝去桂加苓术汤	104	67300	桂枝芍药人参生姜汤	109	67322	桂枝五味甘草去桂加姜辛汤	111
67280	桂枝加人参附子汤	105	67301	桂枝芍药人参新加汤	109	67323	桂枝汤去芍药加茯苓白术汤	111
67281	桂枝加川芎防风汤	105	67302	桂枝附子去桂加术汤	109	67324	桂枝加芍药生姜人参新加汤	111
67282	桂枝加龙骨牡蛎汤	105	67303	桂枝去芍药加茯苓白术汤	109	67325	桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤	111
			67304	桂枝去芍药加麻辛附子汤	109			

67326	桂枝去芍药加麻黄附子 细辛汤 111	67353	桔梗丸 117	67396	桔梗汤 124
67327	桂枝去芍药加麻黄细辛 附子汤 111	67354	桔梗丸 118	67397	桔梗汤 124
67328	桂枝去芍药加蜀漆龙骨 牡蛎汤 112	67355	桔梗丸 118	67398	桔梗汤 124
67329	桂苓五味甘草去桂加姜 辛夏汤 112	67356	桔梗丸 118	67399	桔梗汤 124
67330	桂枝二白虎一加芍药黄 芩杜桂方 112	67357	桔梗汤 118	67400	桔梗汤 124
67331	桂苓五味甘草去桂加姜 辛半夏汤 113	67358	桔梗汤 119	67401	桔梗汤 124
67332	桂枝去芍药加蜀漆龙骨 牡蛎救逆汤 113	67359	桔梗汤 119	67402	桔梗汤 124
67333	桂枝去芍药加蜀漆牡蛎 龙骨救逆汤 113	67360	桔梗汤 119	67403	桔梗汤 124
67334	桂枝麻黄柴胡四物去杏 仁加桃仁汤 113	67361	桔梗汤 119	67404	桔梗汤 124
67335	桂苓五味甘草去桂加干 姜细辛半夏汤 113	67362	桔梗汤 119	67405	桔梗汤 124
67336	桂枝加芍药生姜各一两 人参三两新加汤 114	67363	桔梗汤 119	67406	桔梗汤 125
67337	桂枝柴胡各半汤加吴萸 楝子茴香木香汤 115	67364	桔梗汤 120	67407	桔梗汤 125
桔		67365	桔梗汤 120	67408	桔梗汤 125
67338	桔干汤 115	67366	桔梗汤 120	67409	桔梗汤 125
67339	桔连汤 115	67367	桔梗汤 120	67410	桔梗饮 125
67340	桔枳汤 115	67368	桔梗汤 120	67411	桔梗饮 125
67341	桔梗丸 115	67369	桔梗汤 120	67412	桔梗散 125
67342	桔梗丸 116	67370	桔梗汤 120	67413	桔梗散 125
67343	桔梗丸 116	67371	桔梗汤 121	67414	桔梗散 125
67344	桔梗丸 116	67372	桔梗汤 121	67415	桔梗散 125
67345	桔梗丸 116	67373	桔梗汤 121	67416	桔梗散 126
67346	桔梗丸 116	67374	桔梗汤 121	67417	桔梗散 126
67347	桔梗丸 116	67375	桔梗汤 121	67418	桔梗散 126
67348	桔梗丸 117	67376	桔梗汤 121	67419	桔梗散 126
67349	桔梗丸 117	67377	桔梗汤 121	67420	桔梗散 126
67350	桔梗丸 117	67378	桔梗汤 121	67421	桔梗散 126
67351	桔梗丸 117	67379	桔梗汤 122	67422	桔梗散 126
67352	桔梗丸 117	67380	桔梗汤 122	67423	桔梗散 126
		67381	桔梗汤 122	67424	桔梗散 127
		67382	桔梗汤 122	67425	桔梗散 127
		67383	桔梗汤 122	67426	桔梗散 127
		67384	桔梗汤 122	67427	桔梗散 127
		67385	桔梗汤 122	67428	桔梗散 127
		67386	桔梗汤 122	67429	桔梗散 127
		67387	桔梗汤 123	67430	桔梗散 127
		67388	桔梗汤 123	67431	桔梗散 128
		67389	桔梗汤 123	67432	桔梗散 128
		67390	桔梗汤 123	67433	桔梗散 128
		67391	桔梗汤 123	67434	桔梗散 128
		67392	桔梗汤 123	67435	桔梗散 128
		67393	桔梗汤 123	67436	桔梗散 128
		67394	桔梗汤 123	67437	桔梗散 128
		67395	桔梗汤 123	67438	桔梗散 129

67439 桔梗散	129	67481 桔梗甘草栀子汤	133	67513 栝楼汤	136
67440 桔梗散	129	67482 桔梗甘草鼠粘子汤	133	67514 栝楼汤	136
67441 桔梗散	129			67515 栝楼汤	136
67442 桔梗散	129			67516 栝楼汤	137
67443 桔梗散	129			67517 栝楼汤	137
67444 桔梗散	129			67518 栝楼汤	137
67445 桔梗散	129			67519 栝楼汤	137
67446 桔梗散	129			67520 栝楼汤	137
67447 桔梗散	130			67521 栝楼汤	137
67448 桔梗散	130			67522 栝楼汤	137
67449 桔梗散	130			67523 栝楼汤	137
67450 桔梗引子	130			67524 栝楼汤	137
67451 桔梗白散	130			67525 栝楼汤	138
67452 桔梗汁方	130			67526 栝楼汤	138
67453 桔梗芦散	130			67527 栝楼汤	138
67454 桔梗饮子	130			67528 栝楼汤	138
67455 桔梗煮散	130			67529 栝楼汤	138
67456 桔梗二陈汤	130			67530 栝楼饮	138
67457 桔梗甘草汤	130			67531 栝楼饮	138
67458 桔梗甘草汤	131			67532 栝楼酒	138
67459 桔梗白术汤	131			67533 栝楼酒	138
67460 桔梗玄参汤	131			67534 栝楼酒	139
67461 桔梗半夏汤	131			67535 栝楼粉	139
67462 桔梗半夏汤	131			67536 栝楼散	139
67463 桔梗半夏汤	131			67537 栝楼散	139
67464 桔梗半夏汤	131			67538 栝楼散	139
67465 桔梗防风汤	131			67539 栝楼散	139
67466 桔梗麦冬汤	131			67540 栝楼散	139
67467 桔梗杏仁丸	131			67541 栝楼散	139
67468 桔梗杏仁煎	131			67542 栝楼散	139
67469 桔梗连翘汤	131			67543 栝楼散	140
67470 桔梗枳壳汤	132			67544 栝楼散	140
67471 桔梗枳壳汤	132			67545 栝楼散	140
67472 桔梗枳壳汤	132			67546 栝楼散	140
67473 桔梗荆芥汤	132			67547 栝楼散	140
67474 桔梗香薷汤	132			67548 栝楼散	140
67475 桔梗独活汤	132			67549 栝楼散	140
67476 桔梗前胡汤	132			67550 栝楼散	140
67477 桔梗破气丸	132			67551 栝楼散	140
67478 桔梗消毒汤	132			67552 栝楼散	140
67479 桔梗黄耆汤	132			67553 栝楼散	141
67480 桔梗甘草防风汤	133			67554 栝楼散	141
				67555 栝楼散	141

67556	栝楼散	141
67557	栝楼散	141
67558	栝楼散	141
67559	栝楼散	141
67560	栝楼散	141
67561	栝楼散	141
67562	栝楼散	142
67563	栝楼散	142
67564	栝楼散	142
67565	栝楼散	142
67566	栝楼散	142
67567	栝楼散	142
67568	栝楼散	142
67569	栝楼散	142
67570	栝楼散	142
67571	栝楼煎	142
67572	栝楼煎	142
67573	栝楼子散	142
67574	栝楼子散	143
67575	栝楼子膏	143
67576	栝楼实丸	143
67577	栝楼实汤	143
67578	栝楼根丸	143
67579	栝楼根丸	143
67580	栝楼根丸	143
67581	栝楼根丸	143
67582	栝楼根丸	143
67583	栝楼根丸	144
67584	栝楼根丸	144
67585	栝楼根丸	144
67586	栝楼根丸	144
67587	栝楼根方	144
67588	栝楼根汁	144
67589	栝楼根汤	144
67590	栝楼根汤	144
67591	栝楼根汤	144
67592	栝楼根汤	144
67593	栝楼根汤	145
67594	栝楼根汤	145
67595	栝楼根汤	145
67596	栝楼根汤	145
67597	栝楼根汤	145
67598	栝楼根汤	145

67599	栝楼根汤	145
67600	栝楼根汤	145
67601	栝楼根汤	145
67602	栝楼根汤	145
67603	栝楼根饮	146
67604	栝楼根散	146
67605	栝楼根散	146
67606	栝楼根散	146
67607	栝楼根散	146
67608	栝楼根散	146
67609	栝楼根散	146
67610	栝楼根散	146
67611	栝楼根散	146
67612	栝楼根散	147
67613	栝楼根散	147
67614	栝楼根散	147
67615	栝楼根散	147
67616	栝楼根散	147
67617	栝楼根散	147
67618	栝楼根散	147
67619	栝楼根散	147
67620	栝楼根煎	147
67621	栝楼根羹	147
67622	栝楼涂方	148
67623	栝楼粉粥	148
67624	栝楼敷方	148
67625	栝楼牛蒡汤	148
67626	栝楼牡蛎散	148
67627	栝楼乳香散	148
67628	栝楼桂枝汤	148
67629	栝楼葛根汤	149
67630	栝楼瞿麦丸	149
67631	栝楼麝香散	150
67632	栝楼根桂枝汤	150
67633	栝楼薤白白酒汤	150
	150
67634	栝楼薤白半夏汤	150
	150
67635	栝楼薤白桂枝汤	150
	150
	梓	
67636	梓皮汤	150

67637	梓皮散	150
67638	梓皮散	151
67639	梓皮散	151
67640	梓皮散	151
67641	梓皮饮子	151

格

67642	格楞藤饮	151
-------	------	-----

桃

67643	桃汤	151
67644	桃仁丸	151
67645	桃仁丸	151
67646	桃仁丸	152
67647	桃仁丸	152
67648	桃仁丸	152
67649	桃仁丸	152
67650	桃仁丸	152
67651	桃仁丸	152
67652	桃仁丸	152
67653	桃仁丸	153
67654	桃仁丸	153
67655	桃仁丸	153
67656	桃仁丸	153
67657	桃仁丸	153
67658	桃仁丸	153
67659	桃仁丸	153
67660	桃仁丸	153
67661	桃仁丸	154
67662	桃仁丸	154
67663	桃仁丸	154
67664	桃仁丸	154
67665	桃仁丸	154
67666	桃仁丸	154
67667	桃仁丸	154
67668	桃仁丸	154
67669	桃仁丸	155
67670	桃仁丸	155
67671	桃仁丸	155
67672	桃仁丸	155
67673	桃仁丸	155
67674	桃仁丸	155

67675 桃仁丹	155	67718 桃仁散	161	67761 桃仁散	166
67676 桃仁方	155	67719 桃仁散	161	67762 桃仁散	166
67677 桃仁方	156	67720 桃仁散	161	67763 桃仁散	166
67678 桃仁汤	156	67721 桃仁散	161	67764 桃仁散	167
67679 桃仁汤	156	67722 桃仁散	161	67765 桃仁散	167
67680 桃仁汤	156	67723 桃仁散	161	67766 桃仁散	167
67681 桃仁汤	156	67724 桃仁散	161	67767 桃仁散	167
67682 桃仁汤	156	67725 桃仁散	162	67768 桃仁粥	167
67683 桃仁汤	157	67726 桃仁散	162	67769 桃仁粥	167
67684 桃仁汤	157	67727 桃仁散	162	67770 桃仁煎	167
67685 桃仁汤	157	67728 桃仁散	162	67771 桃仁煎	167
67686 桃仁汤	157	67729 桃仁散	162	67772 桃仁煎	168
67687 桃仁汤	157	67730 桃仁散	162	67773 桃仁煎	168
67688 桃仁汤	157	67731 桃仁散	162	67774 桃仁煎	168
67689 桃仁汤	157	67732 桃仁散	162	67775 桃仁煎	168
67690 桃仁汤	158	67733 桃仁散	163	67776 桃仁煎	168
67691 桃仁汤	158	67734 桃仁散	163	67777 桃仁煎	168
67692 桃仁汤	158	67735 桃仁散	163	67778 桃仁煎	168
67693 桃仁汤	158	67736 桃仁散	163	67779 桃仁煎	169
67694 桃仁汤	158	67737 桃仁散	163	67780 桃仁膏	169
67695 桃仁汤	158	67738 桃仁散	163	67781 桃仁膏	169
67696 桃仁汤	158	67739 桃仁散	164	67782 桃仁膏	169
67697 桃仁汤	158	67740 桃仁散	164	67783 桃仁膏	169
67698 桃仁汤	158	67741 桃仁散	164	67784 桃仁膏	169
67699 桃仁汤	159	67742 桃仁散	164	67785 桃仁膏	169
67700 桃仁汤	159	67743 桃仁散	164	67786 桃术汤	169
67701 桃仁汤	159	67744 桃仁散	164	67787 桃叶汤	169
67702 桃仁汤	159	67745 桃仁散	164	67788 桃叶汤	169
67703 桃仁汤	159	67746 桃仁散	164	67789 桃叶汤	169
67704 桃仁汤	159	67747 桃仁散	165	67790 桃叶汤	170
67705 桃仁汤	159	67748 桃仁散	165	67791 桃叶饮	170
67706 桃仁汤	159	67749 桃仁散	165	67792 桃白散	170
67707 桃仁汤	159	67750 桃仁散	165	67793 桃奴丸	170
67708 桃仁饮	159	67751 桃仁散	165	67794 桃奴丸	170
67709 桃仁酒	159	67752 桃仁散	165	67795 桃奴丸	170
67710 桃仁酒	159	67753 桃仁散	165	67796 桃奴丸	170
67711 桃仁酒	160	67754 桃仁散	165	67797 桃奴汤	170
67712 桃仁散	160	67755 桃仁散	166	67798 桃奴汤	171
67713 桃仁散	160	67756 桃仁散	166	67799 桃奴散	171
67714 桃仁散	160	67757 桃仁散	166	67800 桃奴散	171
67715 桃仁散	160	67758 桃仁散	166	67801 桃奴散	171
67716 桃仁散	160	67759 桃仁散	166	67802 桃皮汤	171
67717 桃仁散	160	67760 桃仁散	166	67803 桃皮汤	171

67804 桃皮汤	172	67847 桃红散	176	67890 桃花散	182
67805 桃皮汤	172	67848 桃红散	176	67891 桃花散	182
67806 桃皮汤	172	67849 桃红散	177	67892 桃花散	182
67807 桃皮汤	172	67850 桃红散	177	67893 桃花散	182
67808 桃皮酒	172	67851 桃红散	177	67894 桃花散	182
67809 桃皮散	172	67852 桃红散	177	67895 桃花散	182
67810 桃皮膏	172	67853 桃红散	177	67896 桃花散	182
67811 桃耳煎	172	67854 桃红散	177	67897 桃花散	182
67812 桃红丸	172	67855 桃红散	177	67898 桃花散	183
67813 桃红丸	173	67856 桃红膏	177	67899 桃花散	183
67814 桃红丸	173	67857 桃花丸	177	67900 桃花散	183
67815 桃红丸	173	67858 桃花丸	178	67901 桃花散	183
67816 桃红饮	173	67859 桃花丸	178	67902 桃花散	183
67817 桃红散	173	67860 桃花丸	178	67903 桃花散	183
67818 桃红散	173	67861 桃花丸	178	67904 桃花散	183
67819 桃红散	173	67862 桃花丸	178	67905 桃花散	183
67820 桃红散	173	67863 桃花丸	178	67906 桃花散	183
67821 桃红散	173	67864 桃花丸	178	67907 桃花散	183
67822 桃红散	174	67865 桃花丹	178	67908 桃花散	183
67823 桃红散	174	67866 桃花丹	178	67909 桃花散	183
67824 桃红散	174	67867 桃花丹	179	67910 桃花散	183
67825 桃红散	174	67868 桃花水	179	67911 桃花散	183
67826 桃红散	174	67869 桃花汁	179	67912 桃花散	184
67827 桃红散	174	67870 桃花汤	179	67913 桃花散	184
67828 桃红散	174	67871 桃花汤	180	67914 桃花散	184
67829 桃红散	174	67872 桃花汤	180	67915 桃花散	184
67830 桃红散	174	67873 桃花汤	180	67916 桃花散	184
67831 桃红散	175	67874 桃花面	180	67917 桃花散	184
67832 桃红散	175	67875 桃花散	180	67918 桃花散	184
67833 桃红散	175	67876 桃花散	180	67919 桃花散	184
67834 桃红散	175	67877 桃花散	180	67920 桃花散	184
67835 桃红散	175	67878 桃花散	181	67921 桃花散	184
67836 桃红散	175	67879 桃花散	181	67922 桃花散	185
67837 桃红散	175	67880 桃花散	181	67923 桃花粥	185
67838 桃红散	175	67881 桃花散	181	67924 桃花膏	185
67839 桃红散	176	67882 桃花散	181	67925 桃杏散	185
67840 桃红散	176	67883 桃花散	181	67926 桃杏膏	185
67841 桃红散	176	67884 桃花散	181	67927 桃灵丸	185
67842 桃红散	176	67885 桃花散	181	67928 桃灵丹	185
67843 桃红散	176	67886 桃花散	181	67929 桃灵丹	185
67844 桃红散	176	67887 桃花散	181	67930 桃灵散	185
67845 桃红散	176	67888 桃花散	182	67931 桃灵散	185
67846 桃红散	176	67889 桃花散	182	67932 桃枝丸	186

67933	桃枝汤	186
67934	桃枝汤	186
67935	桃枝汤	186
67936	桃枝汤	186
67937	桃枝汤	186
67938	桃枝饮	186
67939	桃枝散	187
67940	桃枝煎	187
67941	桃泉汤	187
67942	桃柳汤	187
67943	桃姜散	187
67944	桃姜煎	187
67945	桃核汤	187
67946	桃根汤	187
67947	桃根汤	187
67948	桃根煎	188
67949	桃胶汤	188
67950	桃胶散	188
67951	桃胶散	188
67952	桃胶散	188
67953	桃梅丹	188
67954	桃梅饮	188
67955	桃梅煎	188
67956	桃黄散	188
67957	桃黄煎	188
67958	桃符丸	188
67959	桃符丸	189
67960	桃符丸	189
67961	桃符丸	189
67962	桃符丸	189
67963	桃符丸	189
67964	桃蜜膏	189
67965	桃熊散	189
67966	桃蝎散	189
67967	桃仁涂方	189
67968	桃仁煎丸	189
67969	桃仁煎丸	189
67970	桃仁煎丸	190
67971	桃仁澡豆	190
67972	桃白皮汤	190
67973	桃白皮汤	190
67974	桃白皮散	190
67975	桃白皮散	190

67976	桃白皮散	190
67977	桃红饮子	190
67978	桃红洗剂	190
67979	桃枝饮子	190
67980	桃枝饮子	191
67981	桃柳心汤	191
67982	桃仁大黄汤	191
67983	桃仁大黄汤	191
67984	桃仁石膏汤	191
67985	桃仁四物汤	191
67986	桃仁地黄酒	191
67987	桃仁芍药汤	191
67988	桃仁当归汤	192
67989	桃仁当归汤	192
67990	桃仁延胡汤	192
67991	桃仁红花汤	192
67992	桃仁红花汤	192
67993	桃仁红花汤	192
67994	桃仁苏木汤	192
67995	桃仁苦酒汤	192
67996	桃仁承气汤	192
67997	桃仁承气汤	192
67998	桃仁承气汤	193
67999	桃仁承气汤	193
68000	桃仁承气汤	193
68001	桃仁承气汤	193
68002	桃仁承气汤	193
68003	桃仁承气汤	193
68004	桃仁承气汤	193
68005	桃仁承气汤	193
68006	桃仁承气汤	193
68007	桃仁承气汤	194
68008	桃仁承气汤	194
68009	桃仁承气汤	194
68010	桃仁承气汤	194
68011	桃仁恒山丸	194
68012	桃仁洗面方	194
68013	桃仁桂心汤	194
68014	桃仁常山丸	194
68015	桃仁雄黄膏	194
68016	桃仁滑石汤	194
68017	桃仁鳖甲汤	194
68018	桃心塞耳方	194

68019	桃叶汁涂方	195
68020	桃叶蒸痔方	195
68021	桃红四物汤	195
68022	桃红四物汤	195
68023	桃红四物汤	195
68024	桃红四物汤	195
68025	桃红消瘀汤	195
68026	桃花化浊汤	195
68027	桃花生肌散	195
68028	桃花行气丸	195
68029	桃花活血散	196
68030	桃花隔纸膏	196
68031	桃枝当归膏	196
68032	桃枝浸浴方	196
68033	桃桂当归丸	196
68034	桃核承气汤	196
68035	桃椒二仁丸	197
68036	桃溪气宝丸	197
68037	桃溪回阳丹	197
68038	桃仁青蒿煎丸	198
68039	桃仁承气饮子	198
68040	桃叶朱砂煎酒	198

核

68041	核桃丸	199
68042	核桃散	199

醕

68043 酌圣丹 199

都

68044	都气丸	199
68045	都气饮	199
68046	都昆丸	199
68047	都梁丸	199
68048	都梁丸	200
68049	都梁散	200
68050	都梁香散	200
68051	都气加桂汤	200

眞

68052 真丸 200

68053 真丹	200	68096 真珠丸	207	68139 真珠散	212
68054 真汤	200	68097 真珠丸	207	68140 真珠散	212
68055 真一汤	200	68098 真珠丸	208	68141 真珠散	213
68056 真元饮	200	68099 真珠丸	208	68142 真珠散	213
68057 真牙汤	201	68100 真珠丸	208	68143 真珠散	213
68058 真气汤	201	68101 真珠丸	208	68144 真珠散	213
68059 真丹散	201	68102 真珠丸	208	68145 真珠散	213
68060 真火汤	201	68103 真珠丸	208	68146 真珠散	213
68061 真功丹	201	68104 真珠丸	209	68147 真珠散	213
68062 真白汤	201	68105 真珠丸	209	68148 真珠散	213
68063 真圣丸	201	68106 真珠丸	209	68149 真珠煎	213
68064 真圣散	201	68107 真珠丸	209	68150 真珠煎	214
68065 真朱散	201	68108 真珠丸	209	68151 真珠膏	214
68066 真阴丹	201	68109 真珠丹	209	68152 真珠膏	214
68067 真阴散	202	68110 真珠丹	209	68153 真珠膏	214
68068 真应散	202	68111 真珠汤	209	68154 真珠膏	214
68069 真良汤	202	68112 真珠粉	209	68155 真黄散	214
68070 真武丸	202	68113 真珠散	209	68156 真酥粥	214
68071 真武丸	202	68114 真珠散	209	68157 真蛤散	214
68072 真武汤	202	68115 真珠散	209	68158 真犀丹	214
68073 真武汤	204	68116 真珠散	210	68159 真玉磨方	214
68074 真武汤	204	68117 真珠散	210	68160 真龙骨散	214
68075 真金散	204	68118 真珠散	210	68161 真阿胶丸	215
68076 真珍散	204	68119 真珠散	210	68162 真珠母丸	215
68077 真珠丸	204	68120 真珠散	210	68163 真珠涂方	215
68078 真珠丸	204	68121 真珠散	210	68164 真珠粉丸	215
68079 真珠丸	204	68122 真珠散	210	68165 真珠粉丸	215
68080 真珠丸	205	68123 真珠散	211	68166 真珠粉丸	215
68081 真珠丸	205	68124 真珠散	211	68167 真珠粉丸	215
68082 真珠丸	205	68125 真珠散	211	68168 真人化铁汤	215
68083 真珠丸	205	68126 真珠散	211	68169 真人夺命饮	215
68084 真珠丸	205	68127 真珠散	211	68170 真人安胎散	215
68085 真珠丸	205	68128 真珠散	211	68171 真人还少丹	215
68086 真珠丸	206	68129 真珠散	211	68172 真人还少丹	215
68087 真珠丸	206	68130 真珠散	211	68173 真人明目丸	216
68088 真珠丸	206	68131 真珠散	211	68174 真人活命饮	216
68089 真珠丸	206	68132 真珠散	212	68175 真人活命散	216
68090 真珠丸	206	68133 真珠散	212	68176 真人养脏汤	216
68091 真珠丸	207	68134 真珠散	212	68177 真人养脏汤	216
68092 真珠丸	207	68135 真珠散	212	68178 真人换白丸	216
68093 真珠丸	207	68136 真珠散	212	68179 真人积德丸	216
68094 真珠丸	207	68137 真珠散	212	68180 真人萃仙丸	216
68095 真珠丸	207	68138 真珠散	212	68181 真人解毒汤	216

68182	真人碧雪膏	217
68183	真方木香散	217
68184	真方五色丸	217
68185	真方白丸子	217
68186	真方圣散子	217
68187	真君妙贴散	217
68188	真君妙神散	217
68189	真法枳壳散	218
68190	真珠天麻丸	218
68191	真珠天麻丸	218
68192	真珠天麻丸	218
68193	真珠贝母散	218
68194	真珠牛黄丸	218
68195	真珠附著散	218
68196	真珠退翳散	218
68197	真料重明散	218
68198	真料济阴丹	219
68199	真碓儿眼药	219
68200	真精妙合丸	219
68201	真人去三尸方	219
68202	真方五色丸子	219
68203	真传温脐脐丸	219
68204	真金不换正气散	220
68205	真方不换金正气散	220

索

68206	索血散	220
68207	索豆散	220
68208	索氏三和汤	220
68209	索矩三和汤	220
68210	索氏三和汤三倍加白术方	220

袁

68211	袁二白散	221
-------	------	-----

壶

68212	壶公丹	221
68213	壶公妙剂散	221
68214	壶隐子双鹿丸	221

菩

68215	菩菜汤	221
-------	-----	-----

萆

68216	萆荠退翳散	221
68217	萆荠熟地汤	221

莽

68218	莽草丸	222
68219	莽草汤	222
68220	莽草汤	222
68221	莽草汤	222
68222	莽草汤	222
68223	莽草汤	222
68224	莽草汤	222
68225	莽草散	222
68226	莽草散	223
68227	莽草散	223
68228	莽草散	223
68229	莽草散	223
68230	莽草散	223
68231	莽草散	223
68232	莽草散	223
68233	莽草散	223
68234	莽草散	224
68235	莽草散	224
68236	莽草散	224
68237	莽草散	224
68238	莽草散	224
68239	莽草散	224
68240	莽草散	224
68241	莽草散	224
68242	莽草散	225
68243	莽草散	225
68244	莽草膏	225
68245	莽草膏	225
68246	莽草膏	225
68247	莽草膏	225
68248	莽草膏	225
68249	莽草膏	225
68250	莽草膏	226

68251	莽草膏	226
68252	莽草叶散	226
68253	莽草浴汤	226
68254	莽草浴汤	226

莱

68255	莱子丸	226
68256	莱菔丸	226
68257	莱菔丸	226
68258	莱菔汁	226
68259	莱菔饮	226
68260	莱菔酒	226
68261	莱菔散	227
68262	莱菔粥	227
68263	莱菔膏	227
68264	莱菔膏	227
68265	莱菔子丸	227
68266	莱菔子汤	227
68267	莱菔子粥	227
68268	莱菔子煎	227
68269	莱菔木香散	227

莲

68270	莲子丹	228
68271	莲子散	228
68272	莲子散	228
68273	莲子散	228
68274	莲子粥	228
68275	莲子粥	228
68276	莲子膏	228
68277	莲心饮	228
68278	莲心散	228
68279	莲心散	228
68280	莲心散	228
68281	莲心散	229
68282	莲心散	229
68283	莲心散	229
68284	莲叶饮	229
68285	莲叶散	229
68286	莲肉丸	229
68287	莲肉汤	229
68288	莲肉散	229

68289	莲肉粥	229
68290	莲肉粥	230
68291	莲肉膏	230
68292	莲汤散	230
68293	莲米散	230
68294	莲壳散	230
68295	莲花饮	230
68296	莲花饮	230
68297	莲花肚	230
68298	莲花散	230
68299	莲实丸	230
68300	莲实汤	230
68301	莲实粥	231
68302	莲房汤	231
68303	莲房饮	231
68304	莲房散	231
68305	莲砂散	231
68306	莲葱饮	231
68307	莲蓬散	231
68308	莲藕汁	231
68309	莲子房散	231
68310	莲子草散	231
68311	莲子草膏	231
68312	莲子草膏	232
68313	莲子草膏	232
68314	莲花蕊散	232
68315	莲子六一汤	232
68316	莲子六一散	232
68317	莲子生化汤	232
68318	莲子黄连丸	232
68319	莲子清心饮	233
68320	莲子清心饮	233
68321	莲子清心饮	233
68322	莲心清火汤	233
68323	莲枣麦豆汤	233
68324	莲房枳壳汤	233

莫

68325	莫愁汤	233
-------	-----	-----

蒔

68326	蒔萝丸	233
-------	-----	-----

68327	蒔萝散	233
-------	-----	-----

葛

68328	葛苳饮	233
68329	葛苳酒	234
68330	葛苳散	234
68331	葛苳散	234
68332	葛苳子粥	234
68333	葛苳熨方	234

莪

68334	莪术丸	234
68335	莪术汤	234
68336	莪术散	234
68337	莪术散	235
68338	莪术脾积丸	235
68339	莪术溃坚汤	235

荷

68340	荷叶丸	235
68341	荷叶汤	235
68342	荷叶汤	235
68343	荷叶汤	235
68344	荷叶散	236
68345	荷叶散	236
68346	荷叶散	236
68347	荷叶散	236
68348	荷叶散	236
68349	荷叶散	236
68350	荷叶粥	236
68351	荷叶蒂汤	237
68352	荷叶蒿本汤	237
68353	荷杏石甘汤	237

荃

68354	荃薤金银散	237
-------	-------	-----

萆

68355	萆苏汤	237
-------	-----	-----

莎

68356	莎芎散	237
-------	-----	-----

68357	莎芎散	237
68358	莎根酒	237
68359	莎草根丸	237
68360	莎草根散	238
68361	莎草根散	238
68362	莎草根散	238

莨

68363	莨菪丸	238
68364	莨菪丸	238
68365	莨菪丸	238
68366	莨菪丸	238
68367	莨菪丸	238
68368	莨菪酒	239
68369	莨菪散	239
68370	莨菪煎	239
68371	莨菪膏	239
68372	莨菪膏	239
68373	莨菪子丸	239
68374	莨菪子丸	239
68375	莨菪子散	240
68376	莨菪子散	240
68377	莨菪子散	240
68378	莨菪浸方	240

莼

68379	莼菜羹	240
68380	莼羹方	240

莹

68381	莹玉膏	240
68382	莹肌丸	240
68383	莹肌散	241
68384	莹肌膏	241
68385	莹泉散	241
68386	莹珠膏	241
68387	莹肌如玉散	241
68388	莹肌如玉散	241

盐

68389	盐曲	241
68390	盐汤	242

68391	盐水饮	242
68392	盐水锭	242
68393	盐术散	242
68394	盐花丸	242
68395	盐花散	242
68396	盐矾散	242
68397	盐拓方	242
68398	盐津丸	242
68399	盐姜汤	242
68400	盐脂汤	243
68401	盐烧酒	243
68402	盐梅丸	243
68403	盐梅汤	243
68404	盐梅散	243
68405	盐豉丸	243
68406	盐豉饮	243
68407	盐黄散	243
68408	盐黄散	243
68409	盐绿散	243
68410	盐滚丸	243
68411	盐煎散	244
68412	盐煎散	244
68413	盐煎散	244
68414	盐煎散	244
68415	盐煎散	244
68416	盐煎散	244
68417	盐煎散	244
68418	盐煎散	245
68419	盐煎散	245
68420	盐精丸	245
68421	盐蜜煎	245
68422	盐醋煎	245
68423	盐熨方	245
68424	盐白梅散	245
68425	盐韭敷方	245
68426	盐豉熨方	245

香

68427	香归汤	245
68428	香归汤	245
68429	香丝丸	246
68430	香老丹	246
68431	香老丹	246

68432	香豆汤	246
68433	香陈汤	246
68434	香附汤	246
68435	香附汤	246
68436	香附汤	246
68437	香味丸	246
68438	香桂酒	246
68439	香婆丸	246
68440	香婆丸	246
68441	香婆汤	246
68442	香婆汤	247
68443	香术防桂汤	247
68444	香术两活汤	247
68445	香术调经散	247
68446	香归敛血汤	247
68447	香芍桂酒汤	247
68448	香参五味汤	247
68449	香婆万病丸	247
68450	香芍桂苦酒汤	249

晋

68451	晋凡散	249
68452	晋福散	249

恶

68453	恶阻汤	249
68454	恶实丸	249
68455	恶实丸	249
68456	恶实丸	249
68457	恶实酒	249
68458	恶实散	249
68459	恶实散	249
68460	恶实散	250
68461	恶实散	250
68462	恶实膏	250
68463	恶疮方	250
68464	恶实叶菹	250
68465	恶实根酒	250
68466	恶实根粥	250
68467	恶疮锭子	250
68468	恶实根涂敷方	250
68469	恶疮死肉锭子	250

栗

68470	栗子粥	250
68471	栗皮丸	251
68472	栗灰散	251
68473	栗粉丸	251
68474	栗树叶洗剂	251

贾

68475	贾同知通圣散	251
-------	--------	-----

速

68476	速效饮	251
68477	速效散	251
68478	速效散	251
68479	速效散	251
68480	速效散	251
68481	速验饮	252
68482	速产兔脑丸	252

赶

68483	赶经汤	252
68484	赶经汤	252
68485	赶毒散	252
68486	赶痛汤	252

起

68487	起右汤	252
68488	起左汤	252
68489	起生丸	252
68490	起伛汤	253
68491	起阳汤	253
68492	起阴汤	253
68493	起枕汤	253
68494	起枕散	253
68495	起枕散	253
68496	起顶散	253
68497	起废丹	254
68498	起胃散	254
68499	起迷丹	254
68500	起痔汤	254
68501	起痔汤	254

68502	起脾汤	254
68503	起脾汤	254
68504	起痛汤	254
68505	起睫汤	254
68506	起睫膏	255
68507	起痿丹	255
68508	起痿丹	255
68509	起痿丹	255
68510	起痿汤	255
68511	起痿汤	255
68512	起废神丹	256
68513	起陷神丹	256
68514	起痿神汤	256
68515	起死回生丹	256
68516	起死回生丹	256
68517	起死回生散	256
68518	起死回生散	256
68519	起死轻骨丹	257
68520	起死轻骨膏	257
68521	起死神应丹	257
68522	起死救儿丹	257
68523	起异复光丸	257
68524	起阳至神丹	257
68525	起祖三棱丸	257
68526	起蒸中央汤	257
68527	起痿至神丹	258
68528	起痿至神汤	258
68529	起痿延生丹	258
68530	起痿降火汤	258
68531	起痿至神汤	258

殊

68532	殊圣散	258
68533	殊圣散	258
68534	殊圣散	259
68535	殊圣散	259
68536	殊胜汤	259
68537	殊胜散	259
68538	殊胜散	259
68539	殊效汤	259
68540	殊验清中汤	259

顾

68541	顾耳汤	259
68542	顾步汤	259
68543	顾步汤	260
68544	顾首汤	260
68545	顾母理脏汤	260
68546	顾步保脱汤	260

砥

68547	砥柱丸	260
-------	-----	-----

破

68548	破气丸	260
68549	破气汤	260
68550	破气汤	260
68551	破气散	261
68552	破邪汤	261
68553	破血丸	261
68554	破血丹	261
68555	破血汤	261
68556	破血汤	261
68557	破血药	261
68558	破血散	261
68559	破血散	261
68560	破血散	261
68561	破合汤	262
68562	破关丹	262
68563	破阴丹	262
68564	破阴丹	262
68565	破块丸	262
68566	破坚丹	262
68567	破坚散	262
68568	破饮丸	262
68569	破饮丸	263
68570	破灵丹	263
68571	破郁丹	263
68572	破郁汤	263
68573	破疔散	263
68574	破疔汤	263
68575	破经丸	263
68576	破经汤	264

68577	破毒丹	264
68578	破毒散	264
68579	破毒散	264
68580	破故丸	264
68581	破痈丹	264
68582	破结丸	264
68583	破结丹	264
68584	破结汤	264
68585	破结散	265
68586	破根散	265
68587	破积丸	265
68588	破积丸	265
68589	破积丸	265
68590	破积散	265
68591	破积散	265
68592	破假汤	265
68593	破棺丸	266
68594	破棺丹	266
68595	破棺丹	266
68596	破棺丹	266
68597	破棺丹	266
68598	破棺丹	266
68599	破棺丹	266
68600	破棺丹	266
68601	破棺汤	266
68602	破棺散	267
68603	破棺散	267
68604	破棺散	267
68605	破棺煎	267
68606	破隘汤	267
68607	破瘀丹	267
68608	破瘀汤	267
68609	破瘀汤	267
68610	破瘀丸	267
68611	破管散	267
68612	破颜丹	267
68613	破癖方	268
68614	破癖汤	268
68615	破癥丸	268
68616	破癥丸	268
68617	破癥散	268
68618	破伤风散	268
68619	破伤风膏	268

68620	破血金丹	268
68621	破块验丸	268
68622	破故纸丸	268
68623	破故纸丸	269
68624	破故纸散	269
68625	破故纸散	269
68626	破故纸散	269
68627	破滞气汤	269
68628	破癭点药	269
68629	破癭腹散	269
68630	破血红花散	269
68631	破血红花散	270
68632	破血明目汤	270
68633	破血消痛汤	270
68634	破血散疼汤	270
68635	破血散痛汤	270
68636	破血散聚汤	270
68637	破血紫金丹	270
68638	破证夺命丹	270
68639	破证夺命汤	271
68640	破证夺命散	271
68641	破毒无比散	271
68642	破毒雄黄丸	271
68643	破逆化斑汤	271
68644	破逆化斑汤	271
68645	破积导引丸	271
68646	破积导饮丸	271
68647	破脓如神散	271
68648	破黄七神丹	272
68649	破蛊全生汤	272
68650	破棺千金汤	272
68651	破棺夺命丹	272
68652	破棺急救丹	272
68653	破滞回源汤	272
68654	破痰消饮丸	272
68655	破壁擒王饮	272
68656	破棺千金煮汤	273
68657	破毒天下无比散	273
	夏	
68658	夏柱丹	273

夏

68659	夏冰	273
68660	夏枯膏	273
68661	夏枯草汤	273
68662	夏枯草汤	273
68663	夏枯草汤	273
68664	夏枯草汤	274
68665	夏枯草汤	274
68666	夏枯草汤	274
68667	夏枯草汤	274
68668	夏枯草散	274
68669	夏枯草散	274
68670	夏枯草散	274
68671	夏枯草散	274
68672	夏枯草散	274
68673	夏枯草散	274
68674	夏枯草散	275
68675	夏枯草散	275
68676	夏枯草散	275
68677	夏枯草膏	275
68678	夏枯草膏	275
68679	夏冰对配丹	275
68680	夏冰对配丹	275
68681	夏陈六君汤	275
68682	夏枯扶桑丸	275
68683	夏姬杏仁方	275
68684	夏姬杏仁煎	275
68685	夏姬杏金丹	276
68686	夏英公酒浸饮子	276
68687	夏季补肾肾沥汤	276

原

68688	原蚕茧汤	276
68689	原蚕蛾散	276

逐

68690	逐尸饮	276
68691	逐气丸	276
68692	逐气丸	276

68693	逐气散	277
68694	逐风汤	277
68695	逐风散	277
68696	逐火丹	277
68697	逐水散	277
68698	逐邪丸	277
68699	逐邪散	277
68700	逐虫丸	278
68701	逐虫丹	278
68702	逐虫煎	278
68703	逐血丹	278
68704	逐衣汤	278
68705	逐狐丹	278
68706	逐狐汤	278
68707	逐疝汤	278
68708	逐毒丸	278
68709	逐毒丹	279
68710	逐客汤	279
68711	逐黄散	279
68712	逐虚汤	279
68713	逐蛊汤	279
68714	逐秽丹	279
68715	逐痛丸	279
68716	逐痛丸	279
68717	逐湿汤	279
68718	逐湿汤	279
68719	逐寒丹	280
68720	逐寒散	280
68721	逐痹丹	280
68722	逐瘀汤	280
68723	逐瘀汤	280
68724	逐瘀汤	280
68725	逐瘀汤	280
68726	逐瘀饮	280
68727	逐瘀煎	281
68728	逐痰丸	281
68729	逐痰丸	281
68730	逐痰丸	281
68731	逐痰汤	281
68732	逐痰汤	281
68733	逐痰饮	281
68734	逐瘟丹	281
68735	逐瘟丹	281

68736	逐鳖汤	281
68737	逐呆仙丹	281
68738	逐风通痹汤	282
68739	逐邪四物汤	282
68740	逐邪至神丹	282
68741	逐邪杀蛇汤	283
68742	逐血四物汤	283
68743	逐血补心汤	283
68744	逐血破瘀汤	283
68745	逐汗化痰丸	283
68746	逐虎负隅煎	283
68747	逐疫七宝丹	283
68748	逐贼出壁饮	284
68749	逐秽消胀汤	284
68750	逐寒回阳汤	284
68751	逐寒返魂汤	284
68752	逐寒荡惊汤	284
68753	逐寒趁痛散	285
68754	逐瘀止血汤	285
68755	逐瘀止崩汤	285
68756	逐瘀化痰汤	285
68757	逐瘀夺命丹	285
68758	逐瘀全神丹	286
68759	逐瘀定痛散	286
68760	逐瘟神圣丹	286

振

68761	振中汤	286
68762	振阳丹	286
68763	振阳汤	287
68764	振颓丸	287
68765	振颓汤	287

捕

68766	捕更丸	287
-------	-----	-----

捍

68767	捍齿膏	287
68768	捍齿牢牙方	287

捏

68769	捏头散	288
-------	-----	-----

捉

68770	捉虎丸	288
68771	捉虎丹	288
68772	捉虎膏	288
68773	捉疳丸	288
68774	捉疳丸	288
68775	捉疳丸	288
68776	捉痛散	288

损

68777	损伤膏	288
68778	损余汤	289
68779	损伤药酒	289
68780	损益草散	289
68781	损伤风湿膏	289
68782	损伤回生散	289
68783	损伤接骨方	289

挫

68784	挫气丹	289
-------	-----	-----

换

68785	换肌丸	290
68786	换肌丸	290
68787	换肌丸	290
68788	换肌散	290
68789	换肌散	290
68790	换肌散	290
68791	换肌散	290
68792	换肌散	290
68793	换形散	291
68794	换肠丸	291
68795	换肠丸	291
68796	换金丹	291
68797	换金丹	291
68798	换金散	291
68799	换骨丸	291
68800	换骨丹	291
68801	换骨丹	292
68802	换骨丹	292
68803	换骨丹	292

68804	换骨丹	292
68805	换骨丹	292
68806	换骨丹	293
68807	换骨丹	293
68808	换骨丹	293
68809	换骨丹	293
68810	换骨丹	293
68811	换骨酒	293
68812	换骨散	294
68813	换骨散	294
68814	换骨膏	294
68815	换神丹	294
68816	换容散	294
68817	换脚丸	294
68818	换痘丹	294
68819	换睛散	294
68820	换腿丸	294
68821	换腿丸	295
68822	换皮麻药	295
68823	换金煮散	295
68824	换肌消毒散	295
68825	换肌消毒散	295
68826	换肌消毒散	295

挽

68827	挽流汤	295
-------	-----	-----

捣

68828	捣姜饼	295
68829	捣毒散	295
68830	捣雍膏	296
68831	捣关救肾汤	296

挨

68832	挨积丸	296
68833	挨痞丸	296
68834	挨癖丸	296

顿

68835	顿止丹	296
-------	-----	-----

致

68836	致和丸	296
-------	-----	-----

68837	致和汤	296
68838	致新汤	296

热

68839	热牙散	297
68840	热见愁	297
68841	热郁汤	297
68842	热郁汤	297
68843	热郁汤	297
68844	热逆汤	297
68845	热粘皮	297
68846	热疳丸	297
68847	热熨针	297
68848	热蘸汤	297
68849	热六合汤	298
68850	热疳神效膏	298
68851	热疳争攻散	298
68852	热战咬牙汤	298
68853	热疳寒膏药	298

【 | 】

鸱

68854	鸱鸢散	298
68855	鸱鸢散	298
68856	鸱鸢涎丸	298
68857	鸱鸢尿膏	298

柴

68858	柴平汤	298
68859	柴平汤	299
68860	柴平汤	299
68861	柴平饮	299
68862	柴平散	299
68863	柴平煎	299
68864	柴归饮	299
68865	柴半汤	299
68866	柴皮汤	299
68867	柴朴汤	299
68868	柴朴汤	300
68869	柴芍饮	300
68870	柴芎汤	300

68871	柴防煎	300
68872	柴芩汤	300
68873	柴芩汤	300
68874	柴芩汤	300
68875	柴芩煎	300
68876	柴芩煎	300
68877	柴陈汤	300
68878	柴陈汤	300
68879	柴陈煎	301
68880	柴陈煎	301
68881	柴附汤	301
68882	柴苓汤	301
68883	柴苓汤	301
68884	柴苓汤	301
68885	柴苓汤	301
68886	柴苓汤	302
68887	柴苓汤	302
68888	柴苓汤	302
68889	柴苓汤	302
68890	柴苓汤	302
68891	柴苓汤	302
68892	柴苓饮	302
68893	柴苓散	302
68894	柴苓散	302
68895	柴苓煎	302
68896	柴胡丸	302
68897	柴胡丸	302
68898	柴胡丸	303
68899	柴胡丸	303
68900	柴胡丸	303
68901	柴胡丸	303
68902	柴胡丸	303
68903	柴胡丸	303
68904	柴胡丸	304
68905	柴胡丸	304
68906	柴胡汤	304
68907	柴胡汤	304
68908	柴胡汤	304
68909	柴胡汤	304
68910	柴胡汤	304
68911	柴胡汤	304
68912	柴胡汤	305
68913	柴胡汤	305

68914	柴胡汤	305
68915	柴胡汤	305
68916	柴胡汤	305
68917	柴胡汤	305
68918	柴胡汤	305
68919	柴胡汤	306
68920	柴胡汤	306
68921	柴胡汤	306
68922	柴胡汤	306
68923	柴胡汤	306
68924	柴胡汤	306
68925	柴胡汤	306
68926	柴胡汤	307
68927	柴胡汤	307
68928	柴胡汤	307
68929	柴胡汤	307
68930	柴胡汤	307
68931	柴胡汤	307
68932	柴胡汤	307
68933	柴胡汤	307
68934	柴胡汤	308
68935	柴胡汤	308
68936	柴胡汤	308
68937	柴胡汤	308
68938	柴胡汤	308
68939	柴胡汤	308
68940	柴胡汤	308
68941	柴胡汤	308
68942	柴胡汤	309
68943	柴胡汤	309
68944	柴胡汤	309
68945	柴胡汤	309
68946	柴胡汤	309
68947	柴胡汤	309
68948	柴胡汤	309
68949	柴胡汤	309
68950	柴胡汤	310
68951	柴胡汤	310
68952	柴胡汤	310
68953	柴胡汤	310
68954	柴胡汤	310
68955	柴胡汤	310
68956	柴胡汤	310

68957	柴胡汤	310	69000	柴胡汤	315	69043	柴胡饮	320
68958	柴胡汤	310	69001	柴胡汤	316	69044	柴胡饮	320
68959	柴胡汤	310	69002	柴胡汤	316	69045	柴胡饮	320
68960	柴胡汤	311	69003	柴胡汤	316	69046	柴胡饮	320
68961	柴胡汤	311	69004	柴胡汤	316	69047	柴胡饮	320
68962	柴胡汤	311	69005	柴胡汤	316	69048	柴胡饮	320
68963	柴胡汤	311	69006	柴胡汤	316	69049	柴胡饮	320
68964	柴胡汤	311	69007	柴胡汤	316	69050	柴胡饮	321
68965	柴胡汤	311	69008	柴胡汤	316	69051	柴胡散	321
68966	柴胡汤	311	69009	柴胡汤	316	69052	柴胡散	321
68967	柴胡汤	311	69010	柴胡汤	317	69053	柴胡散	321
68968	柴胡汤	312	69011	柴胡汤	317	69054	柴胡散	321
68969	柴胡汤	312	69012	柴胡汤	317	69055	柴胡散	321
68970	柴胡汤	312	69013	柴胡汤	317	69056	柴胡散	321
68971	柴胡汤	312	69014	柴胡汤	317	69057	柴胡散	322
68972	柴胡汤	312	69015	柴胡汤	317	69058	柴胡散	322
68973	柴胡汤	312	69016	柴胡汤	317	69059	柴胡散	322
68974	柴胡汤	312	69017	柴胡汤	317	69060	柴胡散	322
68975	柴胡汤	313	69018	柴胡汤	317	69061	柴胡散	322
68976	柴胡汤	313	69019	柴胡汤	317	69062	柴胡散	322
68977	柴胡汤	313	69020	柴胡汤	318	69063	柴胡散	322
68978	柴胡汤	313	69021	柴胡汤	318	69064	柴胡散	323
68979	柴胡汤	313	69022	柴胡饮	318	69065	柴胡散	323
68980	柴胡汤	313	69023	柴胡饮	318	69066	柴胡散	323
68981	柴胡汤	313	69024	柴胡饮	318	69067	柴胡散	323
68982	柴胡汤	314	69025	柴胡饮	318	69068	柴胡散	323
68983	柴胡汤	314	69026	柴胡饮	318	69069	柴胡散	323
68984	柴胡汤	314	69027	柴胡饮	318	69070	柴胡散	323
68985	柴胡汤	314	69028	柴胡饮	318	69071	柴胡散	324
68986	柴胡汤	314	69029	柴胡饮	319	69072	柴胡散	324
68987	柴胡汤	314	69030	柴胡饮	319	69073	柴胡散	324
68988	柴胡汤	314	69031	柴胡饮	319	69074	柴胡散	324
68989	柴胡汤	314	69032	柴胡饮	319	69075	柴胡散	324
68990	柴胡汤	315	69033	柴胡饮	319	69076	柴胡散	324
68991	柴胡汤	315	69034	柴胡饮	319	69077	柴胡散	324
68992	柴胡汤	315	69035	柴胡饮	319	69078	柴胡散	325
68993	柴胡汤	315	69036	柴胡饮	319	69079	柴胡散	325
68994	柴胡汤	315	69037	柴胡饮	320	69080	柴胡散	325
68995	柴胡汤	315	69038	柴胡饮	320	69081	柴胡散	325
68996	柴胡汤	315	69039	柴胡饮	320	69082	柴胡散	325
68997	柴胡汤	315	69040	柴胡饮	320	69083	柴胡散	325
68998	柴胡汤	315	69041	柴胡饮	320	69084	柴胡散	325
68999	柴胡汤	315	69042	柴胡饮	320	69085	柴胡散	326

69086 柴胡散	326	69129 柴胡散	332	69172 柴胡散	337
69087 柴胡散	326	69130 柴胡散	332	69173 柴胡散	338
69088 柴胡散	326	69131 柴胡散	332	69174 柴胡散	338
69089 柴胡散	326	69132 柴胡散	332	69175 柴胡散	338
69090 柴胡散	326	69133 柴胡散	333	69176 柴胡散	338
69091 柴胡散	326	69134 柴胡散	333	69177 柴胡散	338
69092 柴胡散	326	69135 柴胡散	333	69178 柴胡散	338
69093 柴胡散	327	69136 柴胡散	333	69179 柴胡散	338
69094 柴胡散	327	69137 柴胡散	333	69180 柴胡煎	338
69095 柴胡散	327	69138 柴胡散	333	69181 柴胡煎	338
69096 柴胡散	327	69139 柴胡散	333	69182 柴胡煎	338
69097 柴胡散	327	69140 柴胡散	334	69183 柴胡膏	339
69098 柴胡散	327	69141 柴胡散	334	69184 柴荆饮	339
69099 柴胡散	328	69142 柴胡散	334	69185 柴香散	339
69100 柴胡散	328	69143 柴胡散	334	69186 柴桂汤	339
69101 柴胡散	328	69144 柴胡散	334	69187 柴桔汤	339
69102 柴胡散	328	69145 柴胡散	334	69188 柴陷汤	339
69103 柴胡散	328	69146 柴胡散	334	69189 柴梗汤	339
69104 柴胡散	328	69147 柴胡散	335	69190 柴常汤	339
69105 柴胡散	329	69148 柴胡散	335	69191 柴葛煎	340
69106 柴胡散	329	69149 柴胡散	335	69192 柴胡引子	340
69107 柴胡散	329	69150 柴胡散	335	69193 柴胡引子	340
69108 柴胡散	329	69151 柴胡散	335	69194 柴胡饮子	340
69109 柴胡散	329	69152 柴胡散	335	69195 柴胡饮子	340
69110 柴胡散	329	69153 柴胡散	335	69196 柴胡饮子	340
69111 柴胡散	329	69154 柴胡散	335	69197 柴胡饮子	340
69112 柴胡散	330	69155 柴胡散	336	69198 柴胡饮子	340
69113 柴胡散	330	69156 柴胡散	336	69199 柴胡饮子	341
69114 柴胡散	330	69157 柴胡散	336	69200 柴胡饮子	341
69115 柴胡散	330	69158 柴胡散	336	69201 柴胡饮子	341
69116 柴胡散	330	69159 柴胡散	336	69202 柴胡饮子	341
69117 柴胡散	330	69160 柴胡散	336	69203 柴胡饮子	341
69118 柴胡散	330	69161 柴胡散	336	69204 柴胡饮子	341
69119 柴胡散	330	69162 柴胡散	336	69205 柴胡饮子	341
69120 柴胡散	331	69163 柴胡散	337	69206 柴胡饮子	341
69121 柴胡散	331	69164 柴胡散	337	69207 柴胡散子	341
69122 柴胡散	331	69165 柴胡散	337	69208 柴胡煮散	341
69123 柴胡散	331	69166 柴胡散	337	69209 柴胡煎丸	341
69124 柴胡散	331	69167 柴胡散	337	69210 柴胡煎丸	342
69125 柴胡散	331	69168 柴胡散	337	69211 柴胡煎丸	342
69126 柴胡散	332	69169 柴胡散	337	69212 柴术六君汤	342
69127 柴胡散	332	69170 柴胡散	337	69213 柴术参苓汤	342
69128 柴胡散	332	69171 柴胡散	337	69214 柴芍六君丸	342

69215 柴芍六味丸	342	69258 柴胡天水散	347	69301 柴胡地骨散	351
69216 柴芍地黄丸	342	69259 柴胡木香汤	347	69302 柴胡地黄汤	351
69217 柴芍参苓饮	342	69260 柴胡五味汤	347	69303 柴胡地黄汤	351
69218 柴芍参苓散	342	69261 柴胡化滞汤	347	69304 柴胡地黄汤	352
69219 柴防二陈汤	342	69262 柴胡化滞汤	347	69305 柴胡芍药汤	352
69220 柴苓七物汤	342	69263 柴胡化滞汤	347	69306 柴胡芍药汤	352
69221 柴苓双解汤	343	69264 柴胡升阳汤	347	69307 柴胡芍药汤	352
69222 柴苓四物汤	343	69265 柴胡升麻汤	347	69308 柴胡芍药汤	352
69223 柴苓竹叶饮	343	69266 柴胡升麻汤	317	69309 柴胡芍药汤	352
69224 柴苓两解汤	343	69267 柴胡升麻汤	347	69310 柴胡芍药汤	352
69225 柴苓承气汤	343	69268 柴胡片姜散	347	69311 柴胡芍药散	352
69226 柴苓退热汤	343	69269 柴胡六合汤	348	69312 柴胡芒消汤	352
69227 柴苓清膈煎	343	69270 柴胡双解饮	348	69313 柴胡芎归汤	352
69228 柴苓解托汤	343	69271 柴胡双解散	348	69314 柴胡芎归汤	353
69229 柴连解毒汤	344	69272 柴胡平肝汤	348	69315 柴胡达原饮	353
69230 柴陈五苓散	344	69273 柴胡甘草汤	348	69316 柴胡百合汤	353
69231 柴陈化滞汤	344	69274 柴胡石膏汤	348	69317 柴胡百合汤	353
69232 柴陈四妙汤	344	69275 柴胡石膏汤	348	69318 柴胡当归汤	353
69233 柴陈拈痛汤	344	69276 柴胡石膏汤	348	69319 柴胡当归汤	353
69234 柴陈解托汤	344	69277 柴胡石膏汤	348	69320 柴胡当归汤	354
69235 柴青泻肝汤	344	69278 柴胡石膏汤	348	69321 柴胡当归汤	354
69236 柴苓二妙汤	344	69279 柴胡石膏散	348	69322 柴胡竹茹汤	354
69237 柴苓平胃汤	345	69280 柴胡归芍汤	349	69323 柴胡后生汤	354
69238 柴苓四物汤	345	69281 柴胡归芍汤	349	69324 柴胡导热汤	354
69239 柴苓扶元汤	345	69282 柴胡四物汤	349	69325 柴胡防风汤	354
69240 柴苓梔子汤	345	69283 柴胡四物汤	349	69326 柴胡防风汤	354
69241 柴苓清热汤	345	69284 柴胡四物汤	349	69327 柴胡防风汤	354
69242 柴胡二术汤	345	69285 柴胡四物汤	349	69328 柴胡防风汤	354
69243 柴胡二连丸	345	69286 柴胡四物汤	350	69329 柴胡防风汤	354
69244 柴胡二陈汤	345	69287 柴胡四物汤	350	69330 柴胡防风汤	355
69245 柴胡丁香汤	345	69288 柴胡生化汤	350	69331 柴胡防风汤	355
69246 柴胡人参汤	345	69289 柴胡白虎汤	350	69332 柴胡防风汤	355
69247 柴胡人参汤	346	69290 柴胡白虎汤	350	69333 柴胡防归汤	355
69248 柴胡人参汤	346	69291 柴胡白虎汤	350	69334 柴胡麦冬汤	355
69249 柴胡人参汤	346	69292 柴胡白虎汤	350	69335 柴胡麦冬散	355
69250 柴胡人参汤	346	69293 柴胡白虎煎	350	69336 柴胡麦冬散	355
69251 柴胡人参汤	346	69294 柴胡半夏汤	350	69337 柴胡苍术汤	355
69252 柴胡人参散	346	69295 柴胡半夏汤	351	69338 柴胡抑肝汤	355
69253 柴胡三白汤	346	69296 柴胡半夏汤	351	69339 柴胡抑肝散	355
69254 柴胡三棱饮	346	69297 柴胡加桂汤	351	69340 柴胡抑肝散	355
69255 柴胡下热汤	346	69298 柴胡加桂汤	351	69341 柴胡连翘汤	356
69256 柴胡大黄汤	346	69299 柴胡加鼓汤	351	69342 柴胡连翘汤	356
69257 柴胡山梔散	347	69300 柴胡发泄汤	351	69343 柴胡牡蛎汤	356

69341 柴胡羌活汤	356	69387 柴胡养荣汤	361	69430 柴胡清肝饮	367
69345 柴胡羌活汤	356	69388 柴胡养荣汤	361	69431 柴胡清肝饮	367
69346 柴胡羌活汤	356	69389 柴胡养荣汤	361	69432 柴胡清肝饮	367
69347 柴胡羌活汤	356	69390 柴胡姜桂汤	361	69433 柴胡清肝饮	367
69348 柴胡青黛汤	356	69391 柴胡姜桂汤	361	69434 柴胡清肝饮	367
69349 柴胡和胎饮	356	69392 柴胡姜桂汤	361	69435 柴胡清肝饮	367
69350 柴胡知母汤	357	69393 柴胡姜桂汤	361	69436 柴胡清肝饮	367
69351 柴胡知母汤	357	69394 柴胡退翳丸	361	69437 柴胡清肝饮	367
69352 柴胡知母汤	357	69395 柴胡秦艽汤	361	69438 柴胡清肝饮	367
69353 柴胡知母汤	357	69396 柴胡秦艽汤	361	69439 柴胡清肝散	367
69354 柴胡知母饮	357	69397 柴胡桂枝汤	362	69440 柴胡清肝散	368
69355 柴胡泻肝汤	357	69398 柴胡桂枝汤	363	69441 柴胡清肝散	368
69356 柴胡泻肝汤	357	69399 柴胡桂姜汤	363	69442 柴胡清肝散	368
69357 柴胡泻肝汤	357	69400 柴胡桂姜汤	363	69443 柴胡清肝散	368
69358 柴胡泽泻汤	357	69401 柴胡桔梗汤	363	69444 柴胡清肝散	368
69359 柴胡参术汤	358	69402 柴胡栝楼汤	363	69445 柴胡清骨散	369
69360 柴胡参归汤	358	69403 柴胡桃仁汤	364	69446 柴胡清骨散	369
69361 柴胡细辛汤	358	69404 柴胡破瘀汤	364	69447 柴胡清胆汤	369
69362 柴胡枳芍汤	358	69405 柴胡破瘀汤	364	69448 柴胡清热饮	369
69363 柴胡枳壳汤	358	69406 柴胡铁锈汤	364	69449 柴胡清燥汤	369
69364 柴胡枳壳汤	358	69407 柴胡清肿汤	364	69450 柴胡清燥汤	369
69365 柴胡枳壳汤	358	69408 柴胡消痈汤	364	69451 柴胡清燥汤	369
69366 柴胡枳壳汤	359	69409 柴胡益肝散	364	69452 柴胡羚羊汤	369
69367 柴胡枳桔汤	359	69410 柴胡调经汤	364	69453 柴胡葛根汤	369
69368 柴胡枳桔汤	359	69411 柴胡陷胸汤	365	69454 柴胡紫苏饮	370
69369 柴胡枳桔汤	359	69412 柴胡陷胸汤	365	69455 柴胡舒肝散	370
69370 柴胡枳桔汤	359	69413 柴胡陷胸汤	365	69456 柴胡温胆汤	370
69371 柴胡栀子饮	359	69414 柴胡通经汤	365	69457 柴胡疏肝汤	370
69372 柴胡栀子饮	359	69415 柴胡通塞汤	365	69458 柴胡疏肝散	370
69373 柴胡栀子散	359	69416 柴胡通塞汤	365	69459 柴胡疏肝散	370
69374 柴胡栀子散	359	69417 柴胡梅连汤	366	69460 柴胡疏肝散	371
69375 柴胡梅连汤	359	69418 柴胡梅连散	366	69461 柴胡疏肝散	371
69376 柴胡茯苓汤	359	69419 柴胡梅连散	366	69462 柴胡疏厥煎	371
69377 柴胡茯苓汤	359	69420 柴胡黄芩汤	366	69463 柴胡解肌汤	371
69378 柴胡厚朴汤	360	69421 柴胡黄连膏	366	69464 柴胡解毒汤	371
69379 柴胡厚朴汤	360	69422 柴胡猪苓汤	366	69465 柴胡解毒汤	371
69380 柴胡厚朴汤	360	69423 柴胡清中汤	366	69466 柴胡截疟饮	371
69381 柴胡复生汤	360	69424 柴胡清肌散	366	69467 柴胡聪耳汤	371
69382 柴胡复明汤	360	69425 柴胡清肝汤	366	69468 柴胡橘皮汤	372
69383 柴胡独活汤	360	69426 柴胡清肝汤	366	69469 柴胡鳖甲丸	372
69384 柴胡胜湿汤	360	69427 柴胡清肝汤	367	69470 柴胡鳖甲汤	372
69385 柴胡洗眼汤	360	69428 柴胡清肝汤	367	69471 柴胡鳖甲汤	372
69386 柴胡养阴汤	361	69429 柴胡清肝饮	367	69472 柴胡鳖甲汤	372

69473	柴胡鳖甲饮	372
69474	柴胡鳖甲散	373
69475	柴独苍术汤	373
69476	柴前梅连散	373
69477	柴桂干姜汤	373
69478	柴桂地黄汤	373
69479	柴梗半夏汤	373
69480	柴葛二陈汤	373
69481	柴葛二妙汤	373
69482	柴葛二妙汤	373
69483	柴葛二妙汤	373
69484	柴葛五苓散	373
69485	柴葛平胃散	373
69486	柴葛平胃散	374
69487	柴葛各半汤	374
69488	柴葛安胎饮	374
69489	柴葛芩连汤	374
69490	柴葛败毒散	374
69491	柴葛败毒散	374
69492	柴葛桂枝汤	374
69493	柴葛桂枝汤	374
69494	柴葛桂枝汤	374
69495	柴葛解肌汤	374
69496	柴葛解肌汤	375
69497	柴葛解肌汤	376
69498	柴葛解肌汤	376
69499	柴葛解肌汤	376
69500	柴葛鳖甲汤	376
69501	柴磁地黄丸	376
69502	柴芍六君子汤	376
69503	柴芍六君子汤	376
69504	柴胡五味子汤	376
69505	柴胡六君子汤	377
69506	柴胡加大黄汤	377
69507	柴胡加芒消汤	377
69508	柴胡加防风汤	377
69509	柴胡加细辛汤	377
69510	柴胡加桂枝汤	378
69511	柴胡地骨皮汤	378
69512	柴胡地骨皮汤	378
69513	柴胡地骨皮汤	378
69514	柴胡地骨皮散	378
69515	柴胡地骨皮散	378

69516	柴胡麦门冬汤	378
69517	柴胡麦门冬散	378
69518	柴胡栀子豉汤	378
69519	柴胡栝楼根汤	378
69520	柴胡桑白皮汤	378
69521	柴胡羚羊角散	378
69522	柴胡黍粘子汤	379
69523	柴芩栝楼芍药汤	379
69524	柴胡二桂枝汤	379
69525	柴胡六味地黄汤	379
69526	柴胡去芩加芍汤	379
69527	柴胡龙骨牡蛎汤	379
69528	柴胡瓜蒌干姜汤	379
69529	柴胡加山栀子汤	379
69530	柴胡芍药丹皮汤	379
69531	柴胡芍药茯苓汤	379
69532	柴胡茵陈五苓散	379
69533	柴胡桂枝干姜汤	379
69534	柴胡桂枝干姜汤	381
69535	柴胡桂枝干姜汤	381
69536	柴胡桂枝鳖甲汤	381
69537	柴胡桂姜半夏汤	381
69538	柴胡加龙骨牡蛎汤	382
69539	柴胡去半夏加栝楼汤	383
69540	柴胡加大黄芒消桑螵蛸汤	383

紧

69541	紧皮丸	383
69542	紧皮丸	383
69543	紧皮丸	383
69544	紧皮散	384
69545	紧皮膏	384

党

69546	党参片	384
69547	党参膏	384
69548	党参膏	384

逍

69549	逍生散	384
69550	逍遥丸	384
69551	逍遥丸	385
69552	逍遥丸	385
69553	逍遥丸	385
69554	逍遥汤	385
69555	逍遥汤	385
69556	逍遥饮	385
69557	逍遥饮	385
69558	逍遥饮	385
69559	逍遥散	385
69560	逍遥散	385
69561	逍遥散	387
69562	逍遥散	387
69563	逍遥散	387
69564	逍遥散	387
69565	逍遥散	387
69566	逍遥散	387
69567	逍遥散	388
69568	逍遥散	388
69569	逍遥散	388
69570	逍遥散	388
69571	逍遥散	388
69572	逍遥散	388
69573	逍遥散	388
69574	逍遥散	389
69575	逍遥散	389
69576	逍遥散	389

69577	逍遥散	389
69578	逍遥散	389
69579	逍遥八物汤	389
69580	逍遥五黄汤	389
69581	逍遥调经汤	390
69582	逍遥菱贝散	390

哮

69583	哮喘丸	390
69584	哮喘丹	390
69585	哮喘丸	390
69586	哮喘金丹	390
69587	哮喘灵秘方	390
69588	哮喘万灵膏	390
69589	哮喘滚痰丸	391

哽

69590	哽生散	391
-------	-----	-----

哈

69591	哈化丸	391
69592	哈化丹	391

唤

69593	唤肠散	391
69594	唤痔散	391
69595	唤痔散	391
69596	唤痔散	392

眩

69597	眩晕汤	392
69598	眩晕汤	392

眠

69599	眠膏	392
-------	----	-----

鸭

69600	鸭粥	392
69601	鸭子煎	392
69602	鸭头丸	392
69603	鸭血酒	392

69604	鸭肫散	392
69605	鸭脂膏	392
69606	鸭通汤	392
69607	鸭通汤	393
69608	鸭蛋汤	393
69609	鸭掌散	393

蛙

69610	蛙壳散	393
69611	蛙津散	393
69612	蛙霜散	393

蚬

69613	蚬子水	393
69614	蚬子汤	393
69615	蚬壳膏	393

蚣

69616	蚣蝎散	394
69617	蚣蝎散	394

蚊

69618	蚊蛤散	394
-------	-----	-----

蚓

69619	蚓泥散	394
-------	-----	-----

罢

69620	罢惊丸	394
69621	罢搐丸	394
69622	罢搐丸	394
69623	罢搐散	394
69624	罢搐煎	395

恩

69625	恩袍散	395
69626	恩袍散	395

哭

69627	哭风散	395
69628	哭来笑去散	395

69629	哭来笑去散	395
-------	-------	-----

圃

69630	圃参散	395
-------	-----	-----

圆

69631	圆红散	395
69632	圆灵丸	396
69633	圆灵丹	396
69634	圆明膏	396
69635	圆樵酒	396
69636	圆通大圣散	396
69637	圆翳防风散	396
69638	圆翳羚羊饮	396
69639	圆明拨云锭子	396
69640	圆明内障升麻汤	396

【ノ】

特

69641	特异万灵散	397
-------	-------	-----

钱

69642	钱汤丸	397
69643	钱脂膏	397
69644	钱氏白术散	397

钻

69645	钻胃丸	397
69646	钻胃丸	397

铁

69647	铁酒	397
69648	铁门臼	398
69649	铁门栓	398
69650	铁井栏	398
69651	铁井阑	398
69652	铁井阑	398
69653	铁井阑	398
69654	铁井槛	398

69655 铁臼散	398	69698 铁粉丸	404	69741 铁屑膏	409
69656 铁甲散	398	69699 铁粉丸	404	69742 铁埤丸	409
69657 铁头散	399	69700 铁粉丸	404	69743 铁桶膏	410
69658 铁扫帚	399	69701 铁粉丸	405	69744 铁桶膏	410
69659 铁朱散	399	69702 铁粉丸	405	69745 铁搥散	410
69660 铁杉散	399	69703 铁粉丸	405	69746 铁圈散	410
69661 铁围散	399	69704 铁粉丸	405	69747 铁笛丸	410
69662 铁柱杖	399	69705 铁粉丸	405	69748 铁笛丸	410
69663 铁刷丸	399	69706 铁粉丸	406	69749 铁笛丸	410
69664 铁刷丸	399	69707 铁粉丸	405	69750 铁脚丸	410
69665 铁刷汤	400	69708 铁粉丸	406	69751 铁脚丸	411
69666 铁刷汤	400	69709 铁粉丸	406	69752 铁脚丸	411
69667 铁刷汤	400	69710 铁粉丸	406	69753 铁液酒	411
69668 铁刷汤	400	69711 铁粉丹	406	69754 铁液散	411
69669 铁刷汤	400	69712 铁粉炼	406	69755 铁弹丸	411
69670 铁刷汤	400	69713 铁粉散	406	69756 铁弹丸	411
69671 铁刷汤	401	69714 铁粉散	406	69757 铁弹丸	412
69672 铁刷散	401	69715 铁粉散	406	69758 铁弹丸	412
69673 铁刷散	401	69716 铁粉散	406	69759 铁弹丸	412
69674 铁刷散	401	69717 铁粉散	407	69760 铁弹丸	412
69675 铁刷散	401	69718 铁粉散	407	69761 铁弹丸	412
69676 铁砂丸	401	69719 铁粉散	407	69762 铁落饮	412
69677 铁砂丸	401	69720 铁粉散	407	69763 铁锁匙	412
69678 铁砂散	401	69721 铁粉散	407	69764 铁槌丸	413
69679 铁砂散	401	69722 铁粉散	407	69765 铁罩散	413
69680 铁骨丹	402	69723 铁粉散	407	69766 铁罩散	413
69681 铁胆饮	402	69724 铁粉散	407	69767 铁拊散	413
69682 铁涎膏	402	69725 铁粉散	407	69768 铁箍丹	413
69683 铁勇丹	402	69726 铁粉散	408	69769 铁箍散	413
69684 铁勇丹	402	69727 铁粉散	408	69770 铁箍散	413
69685 铁笔圈	402	69728 铁粉散	408	69771 铁箍散	413
69686 铁笔圈	403	69729 铁粉散	408	69772 铁箍散	413
69687 铁烙饮	403	69730 铁粉散	408	69773 铁箍散	413
69688 铁粉丸	403	69731 铁粉煎	408	69774 铁箍散	413
69689 铁粉丸	403	69732 铁粉煎	408	69775 铁箍散	414
69690 铁粉丸	403	69733 铁浆酒	408	69776 铁箍散	414
69691 铁粉丸	403	69734 铁扇子	409	69777 铁箍散	414
69692 铁粉丸	403	69735 铁扇散	409	69778 铁箍散	414
69693 铁粉丸	403	69736 铁扇散	409	69779 铁箍散	414
69694 铁粉丸	404	69737 铁扇散	409	69780 铁箍散	414
69695 铁粉丸	404	69738 铁屑丸	409	69781 铁箍散	414
69696 铁粉丸	404	69739 铁屑散	409	69782 铁箍散	414
69697 铁粉丸	404	69740 铁屑散	409	69783 铁箍散	414

69784	铁箍散	415	420	69864	铅参散	425	
69785	铁箍散	415			69865	铅壶酒	425	
69786	铁箍散	415			69866	铅粉散	425	
69787	铁箍散	415	69827	铃石散	420	69867	铅粉散	425
69788	铁箍散	415			69868	铅粉膏	425	
69789	铁箍散	415			69869	铅梳子	425	
69790	铁箍散	415			69870	铅黄丸	425	
69791	铁箍散	415	69828	铅丹	420	69871	铅黄散	425
69792	铁箍散	415	69829	铅酒	421	69872	铅糖水	426
69793	铁箍散	416	69830	铅酒	421	69873	铅霜丸	426
69794	铁箍散	416	69831	铅丹丸	421	69874	铅霜丸	426
69795	铁箍散	416	69832	铅丹丸	421	69875	铅霜丸	426
69796	铁箍散	416	69833	铅丹丸	421	69876	铅霜丸	426
69797	铁箍散	416	69834	铅丹丸	421	69877	铅霜丸	426
69798	铁精丸	416	69835	铅丹丸	421	69878	铅霜丸	426
69799	铁精丸	416	69836	铅丹丸	421	69879	铅霜丸	427
69800	铁精丸	416	69837	铅丹丸	421	69880	铅霜丸	427
69801	铁精丸	416	69838	铅丹丸	422	69881	铅霜丸	427
69802	铁精丸	417	69839	铅丹丸	422	69882	铅霜丸	427
69803	铁精丸	417	69840	铅丹丸	422	69883	铅霜散	427
69804	铁精汤	417	69841	铅丹丸	422	69884	铅霜散	427
69805	铁精散	417	69842	铅丹丸	422	69885	铅霜散	427
69806	铁精散	417	69843	铅丹散	422	69886	铅霜散	427
69807	铁精散	417	69844	铅丹散	422	69887	铅霜散	428
69808	铁精散	417	69845	铅丹散	423	69888	铅霜散	428
69809	铁鞋散	418	69846	铅丹散	423	69889	铅霜散	428
69810	铁罐散	418	69847	铅丹散	423	69890	铅霜散	428
69811	铁魔丹	418	69848	铅丹散	423	69891	铅霜散	428
69812	铁罐膏	418	69849	铅丹散	423	69892	铅霜散	428
69813	铁布衫丸	418	69850	铅丹煎	423	69893	铅霜散	428
69814	铁布衫丸	418	69851	铅丹膏	423	69894	铅霜散	428
69815	铁柱杖丸	418	69852	铅丹膏	423	69895	铅霜散	428
69816	铁弹子丸	419	69853	铅丹膏	423	69896	铅霜散	428
69817	铁爪长匙散	419	69854	铅丹膏	423	69897	铅霜散	429
69818	铁砂三黄汤	419	69855	铅丹膏	424	69898	铅霜散	429
69819	铁砂牡蛎汤	419	69856	铅丹膏	424	69899	铅霜散	429
69820	铁粉牛黄丸	419	69857	铅丹膏	424	69900	铅白霜丸	429
69821	铁粉乌鸡散	419	69858	铅回散	424	69901	铅白霜丸	429
69822	铁锈鸡纳丸	419	69859	铅红散	424	69902	铅白霜丸	429
69823	铁筒拔毒膏	420	69860	铅汞丸	424	69903	铅白霜散	429
69824	铁筒拔毒膏	420	69861	铅汞丹	424	69904	铅白霜散	429
69825	铁罐点毒膏	420	69862	铅汞膏	424	69905	铅砂蒸剂	429
69826	铁瓮申先生交感丹		69863	铅金丸	425			

秫

- 69906 秫米汤 429
 69907 秫米散 429
 69908 秫米半夏汤 429
 69909 秫米常山甘草汤
 429

秤

- 69910 秤金丹 429
 69911 秤锤酒 430

积

- 69912 积串 430
 69913 积气丸 430
 69914 积气丸 430
 69915 积气丸 430
 69916 积气丸 430
 69917 积气丸 431
 69918 积气丹 431
 69919 积气散 431
 69920 积块丸 431
 69921 积肥丸 431
 69922 积疝丸 431
 69923 积疝方 431
 69924 积聚汤 432
 69925 积气养荣汤 432

称

- 69926 称金丹 432
 69927 称病散 432

秘

- 69928 秘丹 432
 69929 秘丹 432
 69930 秘丹 432
 69931 秘元丸 432
 69932 秘元丹 432
 69933 秘元丹 433
 69934 秘元丹 433
 69935 秘元汤 433
 69936 秘元煎 433

- 69937 秘叶散 433
 69938 秘红丹 433
 69939 秘灵丹 434
 69940 秘金丹 434
 69941 秘金散 434
 69942 秘药方 434
 69943 秘药饼 434
 69944 秘真丸 435
 69945 秘真丸 435
 69946 秘真丸 435
 69947 秘真丸 435
 69948 秘真丸 435
 69949 秘真丸 435
 69950 秘真丹 436
 69951 秘真丹 436
 69952 秘真丹 436
 69953 秘真丹 436
 69954 秘效丸 436
 69955 秘效丸 436
 69956 秘痰丸 436
 69957 秘篆丹 436
 69958 秘精丸 436
 69959 秘精丸 436
 69960 秘精丸 437
 69961 秘精丸 437
 69962 秘精丸 437
 69963 秘精丹 437
 69964 秘藏丸 437
 69965 秘传肉丹 437
 69966 秘传疟丹 437
 69967 秘传药酒 438
 69968 秘传药酒 438
 69969 秘传膏药 438
 69970 秘传膏药 438
 69971 秘制饭灰 438
 69972 秘方十补丸 439
 69973 秘方万应丸 439
 69974 秘方化滞丸 439
 69975 秘方乌金散 439
 69976 秘方匀气散 439
 69977 秘方水澄膏 440
 69978 秘方平肺汤 440
 69979 秘方石韦散 440

- 69980 秘方龙骨丸 440
 69981 秘方四神饮 440
 69982 秘方白梅散 440
 69983 秘方立效散 440
 69984 秘方半夏丸 440
 69985 秘方夺命散 441
 69986 秘方托里散 441
 69987 秘方防风散 441
 69988 秘方苍术汤 441
 69989 秘方芦荟丸 441
 69990 秘方连翘散 441
 69991 秘方拔毒散 441
 69992 秘方肥儿丸 441
 69993 秘方净肌散 441
 69994 秘方定心丸 441
 69995 秘方定振丸 441
 69996 秘方参附丸 441
 69997 秘方枳壳汤 442
 69998 秘方柏叶散 442
 69999 秘方茶调散 442
 70000 秘方种子丹 442
 70001 秘方香连丸 442
 70002 秘方重明丸 442
 70003 秘方顺肝散 442
 70004 秘方洗心散 442
 70005 秘方洗肝散 443
 70006 秘方养脏汤 443
 70007 秘方换腿肌 443
 70008 秘方柴胡汤 443
 70009 秘方润肠膏 443
 70010 秘方益母丸 443
 70011 秘方菊花散 443
 70012 秘方黄丸子 443
 70013 秘方硃砂膏 443
 70014 秘方猪苓汤 444
 70015 秘方清脾丸 444
 70016 秘方琥珀膏 444
 70017 秘方揩牙散 444
 70018 秘方紫金膏 444
 70019 秘方蝉花散 444
 70020 秘方噙化丸 444
 70021 秘方擦牙散 444
 70022 秘方蟹黄散 445

70023 秘本黄连汤	445	70066 秘传百解散	450	70109 秘传保和丸	458
70024 秘传一擦光	445	70067 秘传夹纸膏	450	70110 秘传保婴丹	458
70025 秘传二仙糕	445	70068 秘传当归膏	450	70111 秘传顺气散	458
70026 秘传二奇汤	445	70069 秘传团鱼羹	451	70112 秘传独圣散	458
70027 秘传十子丸	445	70070 秘传先天丸	451	70113 秘传洞关散	458
70028 秘传刀伤药	445	70071 秘传延寿丹	451	70114 秘传祛风散	459
70029 秘传三仙丹	445	70072 秘传安神汤	451	70115 秘传神应散	459
70030 秘传三仙糕	446	70073 秘传羊肝丸	452	70116 秘传神应膏	459
70031 秘传三圣散	446	70074 秘传杖疮膏	452	70117 秘传神效散	459
70032 秘传三意酒	446	70075 秘传豆黄丸	452	70118 秘传除疔散	459
70033 秘传千捶膏	446	70076 秘传芦荟丸	453	70119 秘传桃花散	459
70031 秘传千捶膏	446	70077 秘传赤龙丸	453	70120 秘传起痿丹	459
70035 秘传飞步丸	446	70078 秘传连翘汤	453	70121 秘传捉虎丹	459
70036 秘传木香散	446	70079 秘传返魂汤	453	70122 秘传铁箍散	460
70037 秘传木通汤	446	70080 秘传羌活散	453	70123 秘传息搐散	460
70038 秘传五疳散	446	70081 秘传补阴汤	453	70124 秘传消痞丸	460
70039 秘传牙痛方	447	70082 秘传补脾汤	453	70125 秘传涤风散	460
70040 秘传牛黄丸	447	70083 秘传妙济饮	453	70126 秘传涌泉散	460
70041 秘传反魂丹	447	70084 秘传枣矾丸	454	70127 秘传通气散	460
70042 秘传乌鸡丸	447	70085 秘传郁金散	454	70128 秘传通塞散	460
70043 秘传六和丸	447	70086 秘传拔毒丹	454	70129 秘传黄耆丸	460
70044 秘传六神丸	447	70087 秘传抱龙丸	454	70130 秘传梨汁饮	460
70045 秘传斗门方	448	70088 秘传抱龙丸	454	70131 秘传敛瘤膏	461
70046 秘传斗门散	448	70089 秘传败毒散	454	70132 秘传清咽散	461
70047 秘传水银膏	448	70090 秘传固本丸	454	70133 秘传清燥汤	461
70048 秘传平疟饮	448	70091 秘传和中饮	455	70134 秘传紫金丹	461
70049 秘传平毒散	448	70092 秘传刮金丹	455	70135 秘传黑虎丹	461
70050 秘传平秽散	448	70093 秘传肥儿丸	456	70136 秘传遗粮汤	461
70051 秘传正胃丸	448	70094 秘传泻肝汤	456	70137 秘传循经丸	462
70052 秘传正骨丹	448	70095 秘传治疳汤	456	70138 秘传隔纸膏	462
70053 秘传玉锁丹	448	70096 秘传降气汤	456	70139 秘传蒲黄散	462
70054 秘传归参汤	449	70097 秘传降气汤	456	70140 秘传愈刚散	462
70055 秘传生肌散	449	70098 秘传珍珠膏	457	70141 秘传愈疥散	462
70056 秘传白玉膏	449	70099 秘传茵陈散	457	70142 秘传愈疯丹	462
70057 秘传白犀丹	449	70100 秘传茴香汤	457	70143 秘传解毒丸	462
70058 秘传白膏药	449	70101 秘传枳壳丸	457	70144 秘传靖肤散	463
70059 秘传宁口散	449	70102 秘传秋石丹	457	70145 秘传碧云膏	463
70060 秘传宁口散	449	70103 秘传复生散	457	70146 秘传槟榔丸	463
70061 秘传宁痒散	450	70104 秘传香连丸	457	70147 秘传熏洗方	463
70062 秘传发灰丸	450	70105 秘传香连丸	458	70148 秘传熏洗方	463
70063 秘传地仙丹	450	70106 秘传香连丸	458	70149 秘传熏洗方	463
70064 秘传地黄膏	450	70107 秘传保安丸	458	70150 秘传膈噎膏	463
70065 秘传夺命丹	450	70108 秘传保和丸	458	70151 秘传赛宝丹	463

70152 秘传褪金丸	464	70195 秘旨乌骨鸡丸	470	70218 秘传加味二陈汤	474
70153 秘传蝌蚪散	464	70196 秘授乌鸡煎丸	470	70219 秘传加味二妙丸	474
70154 秘传镇惊丸	464	70197 秘授术宝真丹	470	70220 秘传加味四物汤	475
70155 秘传擦牙散	464	70198 秘方千金种子丹	471	70221 秘传加味四物汤	475
70156 秘传豁痰丸	464	70199 秘本加味清胃散	471	70222 秘传加味四物汤	475
70157 秘传豁痰汤	464	70200 秘传一味千金散	471	70223 秘传加味四物汤	475
70158 秘旨安神丸	464	70201 秘传一醉不老丹	471	70224 秘传加味枳术丸	475
70159 秘制太和丸	465	70202 秘传八味二花散	471	70225 秘传加味醉仙散	475
70160 秘制白龙丹	465	70203 秘传人参鳖甲饮	471	70226 秘传加味八味汤	475
70161 秘制白带丸	465	70204 秘传万金内托散	472	70227 秘传加味八珍汤	476
70162 秘制白浊丸	465	70205 秘传万病遇仙丹	472	70228 秘传加味平胃散	476
70163 秘制朱砂膏	465	70206 秘传千金种子方	472	70229 秘传加味省风汤	476
70164 秘制肠风散	465	70207 秘传开明银海丹	472	70230 秘传加味香薷饮	476
70165 秘制抱龙丸	465	70208 秘传木香化气汤	472	70231 秘传加味调中汤	476
70166 秘制兔血丸	466	70209 秘传太乙万灵膏	472	70232 秘传加味调中汤	477
70167 秘制珍珠丸	466	70210 秘传牛黄清心丸	473	70233 秘传加味理中汤	477
70168 秘制清宁丸	466	70211 秘传乌药顺气散	473	70234 秘传加味渗湿汤	477
70169 秘宝万灵丹	466	70212 秘传乌须万应散	473	70235 秘传当归地黄汤	477
70170 秘验血崩丸	466	70213 秘传去翳圣金膏	473	70236 秘传远志养心丹	477
70171 秘验带下丸	466	70214 秘传龙骨锁精丹	474	70237 秘传走马通圣散	477
70172 秘验桃花散	466	70215 秘传加味二陈汤	474	70238 秘传助脾渗湿汤	477
70173 秘验清胃饮	466	70216 秘传加味二陈汤	474	70239 秘传围药解和散	477
70174 秘授九灵丹	466	70217 秘传加味二陈汤	474		
70175 秘授甘露饮	467				
70176 秘授济阴丹	467				
70177 秘授神效散	467				
70178 秘授蜡矾丸	467				
70179 秘精菟丝丸	467				
70180 秘方三棱煎丸	467				
70181 秘方仙遗粮汤	468				
70182 秘方茶酒调散	468				
70183 秘方消痞膏药	468				
70184 秘传大补元丸	468				
70185 秘传大透肌散	468				
70186 秘传马蔺花丸	468				
70187 秘传玉液还丹	468				
70188 秘传仙遗粮散	469				
70189 秘传竹叶灰丸	469				
70190 秘传神应眼药	469				
70191 秘传雄鼠骨散	469				
70192 秘传掌中金丸	469				
70193 秘传酸枣仁汤	470				
70194 秘传膈噎仙方	470				

.....	478
70210 秘传羌活保生汤	478
.....	478
70211 秘传补中参术汤	478
.....	478
70212 秘传灵脂遏痛汤	478
.....	478
70213 秘传阿魏万灵膏	478
.....	478
70214 秘传明目补下丸	479
.....	479
70215 秘传固本牛胆丸	479
.....	479
70216 秘传金锁思仙丹	479
.....	479
70217 秘传金箔镇心丸	479
.....	479
70218 秘传疝气如神汤	479
.....	479
70219 秘传定痛生肌散	479
.....	479
70250 秘传枳术二陈汤	479
.....	479
70251 秘传茱萸内消丸	480
.....	480
70252 秘传点眼光明丹	480
.....	480
70253 秘传神仙延寿丹	480
.....	480
70254 秘传神仙拨云散	480
.....	480
70255 秘传神仙消痞丸	480
.....	480
70256 秘传神效红丸子	481
.....	481
70257 秘传神效活命饮	481
.....	481
70258 秘传真人活命汤	481
.....	481
70259 秘传海上香连丸	481
.....	481
70260 秘传诸蛊保命丹	481
.....	481

70261 秘传黄连地黄汤	481
.....	481
70262 秘传盘胀槟榔丸	482
.....	482
70263 秘传痔漏内消丸	482
.....	482
70264 秘传煮酒应效方	482
.....	482
70265 秘传紫府青津丸	482
.....	482
70266 秘传解肌理中汤	483
.....	483
70267 秘传解瘟散毒汤	483
.....	483
70268 秘传漆黄蟾酥丹	483
.....	483
70269 秘传增补香芷丸	483
.....	483
70270 秘治跌打损伤膏	483
.....	483
70271 秘方乌梅五味子汤	483
.....	483
70272 秘传十六味流气饮	483
.....	483
70273 秘传加味四君子汤	484
.....	484
70274 秘传治肠风下血丸	484
.....	484
70275 秘制金毛狮子疮药	484
.....	484
70276 秘授仙方万应膏药	484
.....	484
70277 秘传止血定痛生肌散	485
.....	485
70278 秘传加减川芎茶调散	485
.....	485
70279 秘传加减芩连四物汤	485
.....	485
70280 秘授儿科万病回春丹	485
.....	485
70281 秘授万灵一粒九转还丹	485
.....	485

敌

70282 敌金丸	486
70283 敌痰丸	186

舐

70284 舐掌散	486
-----------	-----

笔

70285 笔头灰散	486
------------	-----

笑

70286 笑逢散	486
-----------	-----

笋

70287 笋粉散	486
-----------	-----

氍

70288 氍氍汤	486
-----------	-----

造

70289 造草酥	487
70290 造化争雄膏	487
70291 造化调经散	488

透

70292 透天丸	488
70293 透天水	488
70294 透气丹	488
70295 透水丹	488
70296 透水散	488
70297 透耳筒	488
70298 透邪煎	488
70299 透肌丸	488
70300 透肌汤	488
70301 透肌散	488
70302 透肌散	489
70303 透肌散	489
70304 透肌散	489
70305 透肌散	489
70306 透肌散	489

70421 倍苓丸	504	70462 健捷散	508	70505 健脾膏	513
70422 倍矾散	504	70463 健猪肚	508	70506 健脾膏	514
70423 倍金散	504	70464 健猪肺	508	70507 健脾膏	514
70424 倍轻散	504	70465 健脚煎	508	70508 健腰丹	514
70425 倍香膏	504	70466 健脾丸	508	70509 健土开涎散	514
70426 倍姜丸	504	70467 健脾丸	508	70510 健土杀虫汤	514
70427 倍黄散	504	70468 健脾丸	509	70511 健土杀虫汤	514
70428 倍槐丸	504	70469 健脾丸	509	70512 健民薄荷油	514
70429 倍榆散	504	70470 健脾丸	509	70513 健母固脱丸	515
70430 倍术二陈汤	504	70471 健脾丸	509	70514 健步四物汤	515
70431 倍参生化汤	505	70472 健脾丸	509	70515 健步虎潜丸	515
70432 倍姜半夏丸	505	70473 健脾丸	509	70516 健步虎潜丸	515
健		70474 健脾丸	509	70517 健步虎潜丸	515
70433 健中丸	505	70475 健脾丸	509	70518 健步虎潜丸	516
70434 健中丸	505	70476 健脾丸	510	70519 健步虎潜丸	516
70435 健中汤	505	70477 健脾丸	510	70520 健步虎潜丸	516
70436 健中汤	505	70478 健脾丸	510	70521 健步虎潜丸	516
70437 健中散	505	70479 健脾丸	510	70522 健忘预知散	516
70438 健民丹	505	70480 健脾丸	510	70523 健胃丁香散	516
70439 健母丹	505	70481 健脾丸	510	70524 健胃开涎散	516
70440 健阳丹	506	70482 健脾丸	511	70525 健胃止呕散	516
70441 健阳丹	506	70483 健脾汤	511	70526 健胃驱风散	517
70442 健阳酒	506	70484 健脾汤	511	70527 健胃保和丸	517
70443 健运丸	506	70485 健脾汤	511	70528 健胃散湿丹	517
70444 健运汤	506	70486 健脾汤	511	70529 健胃温降汤	517
70445 健志丸	506	70487 健脾汤	511	70530 健效化毒散	517
70446 健步丸	506	70488 健脾汤	511	70531 健脾丁香散	517
70447 健步丸	506	70489 健脾汤	511	70532 健脾人参丸	517
70448 健步丸	506	70490 健脾汤	511	70533 健脾止汗汤	517
70449 健步丸	506	70491 健脾饮	512	70534 健脾止泻汤	517
70450 健步丸	507	70492 健脾饮	512	70535 健脾化气饮	517
70451 健步丸	507	70493 健脾饮	512	70536 健脾化痰丸	517
70452 健步膏	507	70494 健脾粉	512	70537 健脾化痰丸	518
70453 健忘丹	507	70495 健脾散	512	70538 健脾化痰汤	518
70454 健肾汤	507	70496 健脾散	512	70539 健脾分水汤	518
70455 健固汤	507	70497 健脾散	512	70540 健脾生化汤	518
70456 健肺丸	507	70498 健脾散	513	70541 健脾生化汤	518
70457 健胃丸	507	70499 健脾散	513	70542 健脾异功丸	518
70458 健胃丹	507	70500 健脾散	513	70543 健脾阳和膏	518
70459 健胃丹	508	70501 健脾散	513	70544 健脾豆蔻丸	519
70460 健胃散	508	70502 健脾散	513	70545 健脾利水汤	519
70461 健骨散	508	70503 健脾散	513	70546 健脾利水汤	519
		70504 健脾膏	513	70547 健脾补肾汤	519

70548 健脾补肾丸	519	70580 射干丸	523	70623 射干散	529
70549 健脾和胃汤	519	70581 射干丸	524	70624 射干散	529
70550 健脾肥儿丸	519	70582 射干丸	524	70625 射干散	529
70551 健脾肥儿丸	520	70583 射干丸	524	70626 射干散	529
70552 健脾肥儿丸	520	70584 射干丸	524	70627 射干散	529
70553 健脾肥儿丸	520	70585 射干丸	524	70628 射干散	529
70554 健脾胜湿汤	520	70586 射干丸	524	70629 射干散	529
70555 健脾养胃丸	520	70587 射干汤	524	70630 射干散	529
70556 健脾养胃汤	520	70588 射干汤	525	70631 射干散	530
70557 健脾祛风汤	520	70589 射干汤	525	70632 射干散	530
70558 健脾除湿汤	521	70590 射干汤	525	70633 射干散	530
70559 健脾除湿汤	521	70591 射干汤	525	70634 射干散	530
70560 健脾消食汤	521	70592 射干汤	525	70635 射干散	530
70561 健脾消食汤	521	70593 射干汤	525	70636 射干散	530
70562 健脾润肤汤	521	70594 射干汤	525	70637 射干散	530
70563 健脾资生丸	521	70595 射干汤	526	70638 射干散	530
70564 健脾理中汤	521	70596 射干汤	526	70639 射干散	531
70565 健脾渗湿汤	521	70597 射干汤	526	70640 射干散	531
70566 健脾渗湿饮	522	70598 射干汤	526	70641 射干散	531
70567 健脾温中丸	522	70599 射干汤	526	70642 射干散	531
70568 健脾解毒汤	522	70600 射干汤	526	70643 射干散	531
70569 健脾解毒汤	522	70601 射干汤	526	70644 射干散	531
70570 健脾增力丹	522	70602 射干汤	526	70645 射干散	531
70571 健脾固本药酒	522	70603 射干汤	526	70646 射干散	531
70572 健脾化食散气汤	523	70604 射干汤	527	70647 射干散	531
70573 健脾利水生化汤	523	70605 射干汤	527	70648 射干煎	532
70574 健脾利水生化汤	523	70606 射干汤	527	70649 射干煎	532
70575 健脾利水补中汤	523	70607 射干汤	527	70650 射干煎	532
70576 健脾消食生化汤	523	70608 射干汤	527	70651 射干煎	532
70577 健脾化痰开郁行气丸	523	70609 射干汤	527	70652 射干膏	532
70578 射干丸	523	70610 射干汤	527	70653 射干膏	532
70579 射干丸	523	70611 射干汤	527	70654 射老丸	532
		70612 射干汤	527	70655 射罔散	532
		70613 射干汤	527	70656 射脓丸	533
		70614 射干汤	528	70657 射脓散	533
		70615 射干汤	528	70658 射影丸	533
		70616 射干饮	528	70659 射干牛蒡汤	533
		70617 射干饮	528	70660 射干连翘汤	533
		70618 射干饮	528	70661 射干连翘散	533
		70619 射干散	528	70662 射干兜铃汤	533
		70620 射干散	528	70663 射干消毒饮	533
		70621 射干散	528	70664 射干麻黄丸	533
		70622 射干散	528	70665 射干麻黄汤	533

70666	射干鼠粘汤	534
70667	射疮坏脓丸	534
70668	射干鼠粘子汤	534
70669	射干鼠粘子汤	534
70670	射干鼠粘子汤	534
70671	射干鼠粘子汤	534
70672	射干鼠粘子散	534

臭

70673	臭灵丹	534
70674	臭灵丹	534
70675	臭灵丹	535
70676	臭科散	535
70677	臭黄膏	535
70678	臭黄膏	535
70679	臭橙饮	535
70680	臭橘散	535
70681	臭橘散	535
70682	臭椿皮散	535
70683	臭椿皮散	535
70684	臭梧桐洗剂	536

息

70685	息争汤	536
70686	息氛汤	536
70687	息乳丸	536
70688	息炎汤	536
70689	息沸饮	536
70690	息贲丸	536
70691	息贲丸	536
70692	息贲汤	536
70693	息怒汤	537
70694	息涕汤	537
70695	息怒养妊汤	537
70696	息焚安胎汤	537
70697	息焚救液汤	537

徒

70698	徒都子补气丸	537
-------	--------------	-----

徐

70699	徐鼓酒	537
-------	-----------	-----

70700	徐王煮散	538
70701	徐王煮散	538
70702	徐长卿汤	538
70703	徐长卿散	538
70704	徐长卿洗剂	538
70705	徐氏疏苓丸	538
70706	徐国公仙酒	538
70707	徐神翁神效地仙丹	538

70708	徐神翁神效地仙方	538
-------	----------------	-----

欲

70709	欲蛇龟酒	538
-------	------------	-----

豹

70710	豹骨木瓜丸	539
-------	-------------	-----

釜

70711	釜墨膏	539
70712	釜底抽薪散	539

脊

70713	脊肉粥	539
70714	脊背续骨汤	539

饿

70715	饿虎散	539
-------	-----------	-----

狸

70716	狸头散	539
70717	狸鸪丸	539
70718	狸骨丸	540
70719	狸骨散	540
70720	狸骨散	540
70721	狸豆根汤	540
70722	狸骨知母散	540

狼

70723	狼牙丸	540
70724	狼牙汤	540

70725	狼牙汤	541
70726	狼牙浆	541
70727	狼牙散	541
70728	狼牙散	541
70729	狼牙散	541
70730	狼牙散	541
70731	狼牙膏	541
70732	狼毒丸	541
70733	狼毒丸	541
70734	狼毒丸	541
70735	狼毒丸	542
70736	狼毒丸	542
70737	狼毒丸	542
70738	狼毒丸	542
70739	狼毒丸	542
70740	狼毒丸	542
70741	狼毒丸	542
70742	狼毒丸	543
70743	狼毒丸	543
70744	狼毒丸	543
70745	狼毒丸	543
70746	狼毒散	543
70747	狼毒散	543
70748	狼毒散	543
70749	狼毒膏	544
70750	狼毒膏	544
70751	狼脂膏	544
70752	狼牙草散	544
70753	狼毒洗剂	544
70754	狼毒浸剂	544

胰

70755	胰子汤	544
70756	胰楞丸	544
70757	胰腺消化汤	545

脛

70758	脛黄散	545
-------	-----------	-----

脛

70759	脛脂散	545
70760	脛脂散	545

70761	胭脂散	545
70762	胭脂散	545
70763	胭脂散	545
70764	胭脂散	545
70765	胭脂膏	546
70766	胭脂膏	546
70767	胭脂膏	546
70768	胭脂膏	546
70769	胭脂膏	546
70770	胭脂膏	546
70771	胭脂涂法	546

脍

70772	脍菹散	546
-------	-----	-----

脂

70773	脂膏	546
70774	脂连丸	547
70775	脂附丸	547
70776	脂草饮	547
70777	脂调散	547
70778	脂调散	547
70779	脂蜜酒	547
70780	脂蜜膏	547

胸

70781	胸膜炎汤 1 号	547
70782	胸膜炎汤 2 号	547

脏

70783	脏头丸	548
70784	脏连丸	548
70785	脏连丸	548
70786	脏连丸	548
70787	脏连丸	548
70788	脏连丸	548
70789	脏连丸	549
70790	脏连丸	549
70791	脏连丸	549
70792	脏连丸	549
70793	脏连丸	549
70794	脏连丸	549

70795	脏连固本丸	549
-------	-------	-----

脐

70796	脐风散	550
70797	脐风散	550
70798	脐风散	550
70799	脐风散	550
70800	脐风散	550
70801	脐风散	550
70802	脐压散	550

胶

70803	胶酒	551
70804	胶艾丸	551
70805	胶艾汤	551
70806	胶艾汤	551
70807	胶艾汤	551
70808	胶艾汤	551
70809	胶艾汤	551
70810	胶艾汤	551
70811	胶艾汤	552
70812	胶艾汤	552
70813	胶艾汤	552
70814	胶艾汤	552
70815	胶艾饮	552
70816	胶艾散	552
70817	胶地丸	552
70818	胶红饮	552
70819	胶连丸	553
70820	胶连饮	553
70821	胶饴丸	553
70822	胶饴汤	553
70823	胶饴煎	553
70824	胶胡散	553
70825	胶香散	553
70826	胶粉散	553
70827	胶豉汤	553
70828	胶豉汤	553
70829	胶黄散	554
70830	胶葵散	554
70831	胶蜡汤	554
70832	胶蜡汤	554

70833	胶蜜汤	554
70834	胶髓膏	554
70835	胶子蜜调药	554
70836	胶艾六合汤	554
70837	胶艾四物汤	554
70838	胶艾四物汤	554
70839	胶艾四物汤	555
70840	胶艾芎归汤	555
70841	胶艾芎归汤	555
70842	胶艾芎归汤	555
70843	胶艾当归散	555
70844	胶艾安胎饮	555
70845	胶艾安胎饮	555
70846	胶艾安胎散	555
70847	胶艾绛覆汤	555
70848	胶艾栝归汤	555
70849	胶艾榴皮汤	556
70850	胶艾漏胎方	556
70851	胶归四逆汤	556
70852	胶地寄生汤	556
70853	胶芩四君汤	556
70854	胶姜理中汤	556
70855	胶菟清金汤	556
70856	胶菟犀角汤	556

脑

70857	脑子散	556
70858	脑朱丹	556
70859	脑泻散	557
70860	脑香散	557
70861	脑疳丸	557
70862	脑漏散	557
70863	脑麝祛风丸	557

脓

70864	脓疱疥疮散	557
70865	脓溃生肌散	557
70866	脓窠疥疮药酒	557

鸱

70867	鸱头丸	557
70868	鸱头丸	558

70869	鸱头丸	558
70870	鸱头丸	558
70871	鸱头酒	558
70872	鸱头酒	558
70873	鸱头膏	558

鸱

70874	鸱头散	558
-------	-----------	-----

皱

70875	皱血丸	559
70876	皱肺丸	559
70877	皱肺丸	559
70878	皱肺丸	559

留

70879	留齿散	559
70880	留线汤	559

逢

70881	逢原饮	559
-------	-----------	-----

【、】

效

70882	效妙散	560
70883	效验汤	560

高

70884	高丽丸	560
70885	高堂丸	560
70886	高良姜丸	560
70887	高良姜丸	560
70888	高良姜丸	560
70889	高良姜丸	560
70890	高良姜丸	560
70891	高良姜汤	561
70892	高良姜汤	561
70893	高良姜汤	561
70894	高良姜汤	561
70895	高良姜汤	561

70896	高良姜汤	561
70897	高良姜汤	561
70898	高良姜汤	561
70899	高良姜汤	562
70900	高良姜汤	562
70901	高良姜汤	562

70902	高良姜汤	562
70903	高良姜汤	562

70904	高良姜汤	562
70905	高良姜汤	562

70906	高良姜汤	562
70907	高良姜汤	562

70908	高良姜饮	562
70909	高良姜酒	562

70910	高良姜散	563
70911	高良姜散	563

70912	高良姜散	563
70913	高良姜散	563

70914	高良姜散	563
70915	高良姜散	563

70916	高良姜散	563
70917	高良姜散	563

70918	高良姜散	563
70919	高良姜散	563

70920	高良姜散	564
70921	高良姜散	564

70922	高良姜散	564
70923	高良姜散	564

70924	高良姜散	564
70925	高良姜散	564

70926	高良姜散	564
70927	高良姜散	564

70928	高良姜散	565
70929	高良姜散	565

70930	高良姜散	565
70931	高良姜粥	565

70932	高良姜粥	565
70933	高良姜粥	565

70934	高良姜粥	565
70935	高丽清心丸	565

70936	高良姜煮散	565
70937	高枕无忧散	565

70938	高良姜十味散	566
-------	--------------	-----

70939	高良姜羊肉汤	566
70940	高良姜理中丸	566
70941	高良姜三味饮子	566

70942	高粘除秘授消散败毒 万应灵膏	566
-------	-------------------------	-----

离

70943	离中丹	566
70944	离骨丹	566

70945	离骨丹	567
70946	离骨丹	567

70947	离骨散	567
70948	离骨散	567

70949	离济膏	567
70950	离珠丹	567

70951	离照汤	568
70952	离宫锭子	568

袞

70953	袞金丸	568
-------	-----------	-----

唐

70954	唐侍中散	568
70955	唐栖平影丸	568

疳

70956	疳劳丸	568
70957	疳积丸	568

70958	疳积丸	568
70959	疳积丸	569

70960	疳积饼	569
70961	疳积散	569

70962	疳积散	569
70963	疳积散	569

70964	疳积散	569
70965	疳积散	570

70966	疳积膏	570
70967	疳疾丸	570

70968	疳疾散	570
70969	疳湿散	570

70970	疳湿散	570
-------	-----------	-----

70971 疳积膏药 570
 70972 疳症仙丹 570
 70973 疳眼兼药 570
 70974 疳药麝香丸 571
 70975 疳疮轻粉散 571
 70976 疳热凉膈散 571
 70977 疳积珍珠散 571

疳

70978 疳腿汤 571

痈

70979 痈肿膏 571

疔

70980 疔疳丸 571

痼

70981 痼完余毒汤 571

悖

70982 悖散汤 572

悦

70983 悦脾汤 572

閻

70984 閻閻霜 572

烧

70985 烧丹丸 572
 70986 烧丹丸 572
 70987 烧丹散 572
 70988 烧白散 572
 70989 烧灰散 573
 70990 烧伤散 573
 70991 烧针丸 573
 70992 烧针丸 573
 70993 烧皂散 573
 70994 烧肝散 573
 70995 烧肝散 573

70996 烧肝散 574
 70997 烧肝散 574
 70998 烧肝散 574
 70999 烧肝散 574
 71000 烧肝散 574
 71001 烧肝散 574
 71002 烧附散 575
 71003 烧青丸 575
 71004 烧青丸 575
 71005 烧青丸 575
 71006 烧茄散 575
 71007 烧枣丸 575
 71008 烧枣丸 575
 71009 烧枣散 575
 71010 烧枣散 575
 71011 烧枣散 576
 71012 烧肾散 576
 71013 烧胃丸 576
 71014 烧胃丸 576
 71015 烧胃丸 576
 71016 烧盐酒 576
 71017 烧盐散 576
 71018 烧盐散 576
 71019 烧盐散 576
 71020 烧盐散 576
 71021 烧梅饮 577
 71022 烧梅散 577
 71023 烧裨散 577
 71024 烧绵丸 577
 71025 烧脾散 577
 71026 烧脾散 578
 71027 烧锤饮 578
 71028 烧腰散 578
 71029 烧腰散 578
 71030 烧弓弦散 578
 71031 烧冬瓜方 578
 71032 烧羊肾散 578
 71033 烧黄瓜丸 578
 71034 烧猪肝方 578
 71035 烧石子茴香散 578

烟

71036 烟油膏 579

71037 烟脂散 579
 71038 烟胶散 579
 71039 烟筒方 579
 71040 烟熏散 579
 71041 烟精膏 579
 71042 烟胶轻粉液 579
 71043 烟筒喘嗽方 579

烙

71044 烙药 579
 71045 烙脐丸 579
 71046 烙脐饼子 580

凌

71047 凌花散 580
 71048 凌霄散 580
 71049 凌霄花丸 580
 71050 凌霄花丸 580
 71051 凌霄花丸 580
 71052 凌霄花汤 580
 71053 凌霄花散 581
 71054 凌霄花散 581
 71055 凌霄花散 581
 71056 凌霄花散 581
 71057 凌霄花散 581
 71058 凌霄花散 581
 71059 凌霄花散 581
 71060 凌霄花根丸 581
 71061 凌阳子木香丸 581

准

71062 准提膏 581

凉

71063 凉心丸 582
 71064 凉心丹 582
 71065 凉心散 582
 71066 凉水丹 582
 71067 凉血丸 582
 71068 凉血汤 582
 71069 凉血汤 582
 71070 凉血饮 582

71071 凉血饮	582	71114 凉惊丸	587	71157 凉血四物汤	593
71072 凉血饮	583	71115 凉解汤	587	71158 凉血四神煎	593
71073 凉血饮	583	71116 凉解汤	587	71159 凉血生地饮	593
71074 凉血饮	583	71117 凉膈丸	587	71160 凉血地黄丸	593
71075 凉血散	583	71118 凉膈丸	588	71161 凉血地黄汤	593
71076 凉血散	583	71119 凉膈散	588	71162 凉血地黄汤	593
71077 凉血散	583	71120 凉膈散	589	71163 凉血地黄汤	594
71078 凉血散	583	71121 凉膈散	589	71164 凉血地黄汤	594
71079 凉肌丸	583	71122 凉膈散	589	71165 凉血地黄汤	594
71080 凉肌粉	583	71123 凉膈散	589	71166 凉血地黄汤	594
71081 凉肌散	583	71124 凉膈散	589	71167 凉血地黄汤	594
71082 凉肝丸	584	71125 凉膈散	589	71168 凉血地黄汤	594
71083 凉肝丸	584	71126 凉膈散	589	71169 凉血地黄汤	594
71084 凉肝散	584	71127 凉膈散	589	71170 凉血地黄汤	595
71085 凉肝散	584	71128 凉膈散	590	71171 凉血地黄汤	595
71086 凉肝散	584	71129 凉膈散	590	71172 凉血地黄汤	595
71087 凉肝散	584	71130 凉膈散	590	71173 凉血地黄汤	595
71088 凉肝散	584	71131 凉膈散	590	71174 凉血地黄散	595
71089 凉肝散	584	71132 凉膈散	590	71175 凉血芍药汤	595
71090 凉肝散	584	71133 凉膈散	590	71176 凉血当归饮	595
71091 凉补风	584	71134 凉膈散	590	71177 凉血攻毒饮	595
71092 凉顶散	585	71135 凉髓丹	590	71178 凉血抑火汤	595
71093 凉肾汤	585	71136 凉七味汤	591	71179 凉血护肌膏	595
71094 凉明饮	585	71137 凉八味丸	591	71180 凉血快斑汤	595
71095 凉金丸	585	71138 凉心煮散	591	71181 凉血明目汤	596
71096 凉肺汤	585	71139 凉水金丹	591	71182 凉血固真汤	596
71097 凉肺汤	585	71140 凉水金丹	591	71183 凉血狗宝丹	596
71098 凉肺散	585	71141 凉水金丹	591	71184 凉血洗心汤	596
71099 凉肢散	585	71142 凉血饮子	591	71185 凉血活血汤	596
71100 凉荣汤	586	71143 凉药子丸	591	71186 凉血养营煎	596
71101 凉胃汤	586	71144 凉风化痰丸	591	71187 凉血消风散	596
71102 凉胃汤	586	71145 凉心利水汤	592	71188 凉血消风散	596
71103 凉胃散	586	71146 凉心清肝汤	592	71189 凉血润燥饮	597
71104 凉胆丸	586	71147 凉血二黄汤	592	71190 凉血益气汤	597
71105 凉胆丸	586	71148 凉血五花汤	592	71191 凉血宽肠汤	597
71106 凉胆丸	586	71149 凉血五根汤	592	71192 凉血调经丸	597
71107 凉胎饮	586	71150 凉血止衄汤	592	71193 凉血清肠散	597
71108 凉惊丸	586	71151 凉血化毒汤	592	71194 凉血清肺饮	597
71109 凉惊丸	587	71152 凉血化毒汤	592	71195 凉血清脾饮	597
71110 凉惊丸	587	71153 凉血化毒饮	593	71196 凉血清燥汤	598
71111 凉惊丸	587	71154 凉血四物汤	593	71197 凉血散火汤	598
71112 凉惊丸	587	71155 凉血四物汤	593	71198 凉血猬皮丸	598
71113 凉惊丸	587	71156 凉血四物汤	593	71199 凉血解仓散	598

71200	凉血解毒丸	598
71201	凉血解毒汤	598
71202	凉血解毒汤	598
71203	凉血解毒汤	598
71204	凉血解毒汤	598
71205	凉血解毒汤	598
71206	凉血解毒汤	599
71207	凉血解毒汤	599
71208	凉肝八宝丹	599
71209	凉肝导赤汤	599
71210	凉肝明目散	599
71211	凉肝明目散	599
71212	凉荣泻火汤	599
71213	凉结攻毒饮	599
71214	凉营清气汤	600
71215	凉膈甘露丸	600
71216	凉膈白虎汤	600
71217	凉膈攻毒饮	600
71218	凉膈攻毒散	600
71219	凉膈连翘散	600
71220	凉膈消毒饮	600
71221	凉膈清脾饮	600
71222	凉血省风药酒	600
71223	凉膈天门冬汤	601
71224	凉膈加羚羊汤	601
71225	凉血地黄加人参汤	601
71226	凉血去湿补阴益气丸	601

酒

71227	酒归饮	601
71228	酒连丸	601
71229	酒连汤	601
71230	酒肿丸	601
71231	酒泻丸	601
71232	酒积丸	601
71233	酒积丸	602
71234	酒病丸	602
71235	酒调散	602
71236	酒调散	602
71237	酒调散	602
71238	酒调散	602

71239	酒豉方	602
71240	酒煮矾	602
71241	酒渣粉	602
71242	酒煎汤	602
71243	酒煎汤	603
71244	酒煎饮	603
71245	酒煎饮	603
71246	酒煎散	603
71247	酒煎散	603
71248	酒煎散	603
71249	酒煎散	603
71250	酒蜡膏	603
71251	酒磨丸	603
71252	酒瘰丸	603
71253	酒瘰丸	604
71254	酒瘰丸	604
71255	酒瘰丸	604
71256	酒瘰丸	604
71257	酒瘰丸	604
71258	酒瘰丸	604
71259	酒瘰丸	604
71260	酒制大黄散	605
71261	酒制神芎丸	605
71262	酒制通圣散	605
71263	酒积乌梅丸	605
71264	酒积麦芽丸	605
71265	酒浸牛膝丸	605
71266	酒浸芍药散	605
71267	酒浸药仙方	605
71268	酒调洗肝散	606
71269	酒煮木瓜粥	606
71270	酒煮当归丸	606
71271	酒煮当归丸	606
71272	酒煮茵陈汤	606
71273	酒煮黄连丸	606
71274	酒煮黄连丸	606
71275	酒煮解毒汤	607
71276	酒煮鳊鱼	607
71277	酒蒸黄连丸	607
71278	酒蒸黄连丸	607
71279	酒蒸黄连丸	607
71280	酒蒸干蟾丸	607
71281	酒煎大黄汤	607

71282	酒煎附子煎	607
71283	酒渣鼻擦剂	608
71284	酒煎附子四神丹	608

消

71285	消化丸	608
71286	消化丸	608
71287	消化片	608
71288	消化汤	609
71289	消化汤	609
71290	消化膏	609
71291	消气丸	609
71292	消气丸	609
71293	消气丸	609
71294	消气汤	609
71295	消气散	609
71296	消气散	610
71297	消丹饮	610
71298	消丹饮	610
71299	消风丸	610
71300	消风丸	610
71301	消风丸	610
71302	消风丹	610
71303	消风汤	611
71304	消风汤	611
71305	消风饮	611
71306	消风饮	611
71307	消风散	611
71308	消风散	612
71309	消风散	612
71310	消风散	612
71311	消风散	612
71312	消风散	612
71313	消风散	612
71314	消风散	613
71315	消风散	613
71316	消风散	613
71317	消风散	613
71318	消风散	613
71319	消风散	613
71320	消风散	613
71321	消风散	613

71322 消风散	614	71365 消石散	619	71408 消饮丸	623
71323 消风散	614	71366 消石散	619	71409 消饮丸	623
71324 消风散	614	71367 消石散	619	71410 消饮丸	624
71325 消风散	614	71368 消石散	619	71411 消饮散	624
71326 消风散	614	71369 消石散	619	71412 消肚丸	624
71327 消风散	614	71370 消石散	620	71413 消疔丸	624
71328 消风散	614	71371 消石散	620	71414 消疔丸	624
71329 消风散	615	71372 消石散	620	71415 消疔丹	624
71330 消风散	615	71373 消石散	620	71416 消疔散	624
71331 消风散	615	71374 消石散	620	71417 消疔散	624
71332 消风散	615	71375 消石散	620	71418 消疔散	624
71333 消风散	615	71376 消石散	620	71419 消疔散	625
71334 消风散	615	71377 消石散	620	71420 消疔散	625
71335 消风散	616	71378 消石散	620	71421 消疔散	625
71336 消风散	616	71379 消石膏	620	71422 消疔散	625
71337 消风散	616	71380 消石膏	620	71423 消补丸	625
71338 消风散	616	71381 消石膏	620	71424 消矾丸	625
71339 消风散	616	71382 消血饮	620	71425 消矾丸	625
71340 消风散	616	71383 消血散	621	71426 消矾散	625
71341 消风散	616	71384 消污汤	621	71427 消矾散	625
71342 消风散	616	71385 消导汤	621	71428 消肾丸	625
71343 消风散	616	71386 消导饮	621	71429 消肾丸	626
71344 消风散	616	71387 消导饮	621	71430 消肾丸	626
71345 消风散	617	71388 消红汤	621	71431 消肾汤	626
71346 消风膏	617	71389 消块丸	621	71432 消乳丸	626
71347 消水汤	617	71390 消块丸	621	71433 消乳丸	626
71348 消水散	617	71391 消芦散	621	71434 消乳丸	626
71349 消水膏	617	71392 消赤散	622	71435 消乳丸	626
71350 消平散	617	71393 消坚丸	622	71436 消乳丹	626
71351 消石丸	617	71394 消坚丸	622	71437 消乳丹	626
71352 消石丸	617	71395 消坚汤	622	71438 消乳丹	626
71353 消石丸	618	71396 消坚汤	622	71439 消乳汤	626
71354 消石丸	618	71397 消坚散	622	71440 消乳汤	626
71355 消石丸	618	71398 消坚散	622	71441 消乳饮	627
71356 消石丸	618	71399 消串丹	622	71442 消肿丸	627
71357 消石丸	618	71400 消余丸	622	71443 消肿丸	627
71358 消石丸	618	71401 消谷丸	622	71444 消肿丸	627
71359 消石汤	618	71402 消谷丸	622	71445 消肿丹	627
71360 消石汤	618	71403 消谷丸	623	71446 消肿汤	627
71361 消石汤	619	71404 消谷丸	623	71447 消肿汤	627
71362 消石汤	619	71405 消谷丸	623	71448 消肿汤	627
71363 消石饮	619	71406 消谷丹	623	71449 消肿汤	627
71364 消石散	619	71407 消饮丸	623	71450 消肿汤	628

71451 消肿饮	628	71494 消毒丸	632	71537 消毒饮	636
71452 消肿散	628	71495 消毒丸	632	71538 消毒饮	636
71453 消肿散	628	71496 消毒丸	632	71539 消毒饮	636
71454 消肿散	628	71497 消毒丸	633	71540 消毒饮	636
71455 消肿散	628	71498 消毒丸	633	71541 消毒饮	637
71456 消肿散	628	71499 消毒丹	633	71542 消毒饮	637
71457 消肿散	628	71500 消毒丹	633	71543 消毒饮	637
71458 消肿散	628	71501 消毒汤	633	71544 消毒散	637
71459 消肿散	628	71502 消毒汤	633	71545 消毒散	637
71460 消肿散	629	71503 消毒汤	633	71546 消毒散	637
71461 消肿散	629	71504 消毒汤	633	71547 消毒散	637
71462 消肿散	629	71505 消毒汤	633	71548 消毒散	637
71463 消肿散	629	71506 消毒汤	634	71549 消毒散	638
71464 消肿散	629	71507 消毒饮	634	71550 消毒散	638
71465 消肿散	629	71508 消毒饮	634	71551 消毒散	638
71466 消肿散	629	71509 消毒饮	634	71552 消毒散	638
71467 消肿散	629	71510 消毒饮	634	71553 消毒散	638
71468 消肿膏	629	71511 消毒饮	634	71554 消毒散	638
71469 消肿膏	629	71512 消毒饮	634	71555 消毒散	638
71470 消肿膏	630	71513 消毒饮	634	71556 消毒散	638
71471 消胀丸	630	71514 消毒饮	634	71557 消毒散	638
71472 消胀丸	630	71515 消毒饮	634	71558 消毒散	639
71473 消胀丸	630	71516 消毒饮	634	71559 消毒散	639
71474 消胀丸	630	71517 消毒饮	634	71560 消毒散	639
71475 消胀丸	630	71518 消毒饮	635	71561 消毒散	639
71476 消胀丹	630	71519 消毒饮	635	71562 消毒散	639
71477 消胀散	631	71520 消毒饮	635	71563 消毒散	639
71478 消疳饮	631	71521 消毒饮	635	71564 消毒散	639
71479 消疳丸	631	71522 消毒饮	635	71565 消毒散	639
71480 消疳丸	631	71523 消毒饮	635	71566 消毒散	639
71481 消疳丸	631	71524 消毒饮	635	71567 消毒散	639
71482 消疳丸	631	71525 消毒饮	635	71568 消毒散	639
71483 消疳丹	631	71526 消毒饮	635	71569 消毒散	639
71484 消疳散	631	71527 消毒饮	635	71570 消毒散	640
71485 消炉散	631	71528 消毒饮	635	71571 消毒散	640
71486 消炉散	631	71529 消毒饮	635	71572 消毒散	640
71487 消炎丸	632	71530 消毒饮	636	71573 消毒散	640
71488 消炎散	632	71531 消毒饮	636	71574 消毒散	640
71489 消炎散	632	71532 消毒饮	636	71575 消毒散	640
71490 消炎膏	632	71533 消毒饮	636	71576 消毒散	640
71491 消河饼	632	71534 消毒饮	636	71577 消毒散	640
71492 消实汤	632	71535 消毒饮	636	71578 消毒散	640
71493 消毒丸	632	71536 消毒饮	636	71579 消毒散	641

71580 消毒散	641	71623 消核饮	645	71666 消疳汤	650
71581 消毒散	641	71624 消核散	646	71667 消疳饮	651
71582 消毒散	641	71625 消核錠	646	71668 消疳饼	651
71583 消毒散	641	71626 消核膏	646	71669 消疳散	651
71584 消毒膏	641	71627 消恶汤	646	71670 消疳散	651
71585 消毒膏	641	71628 消积丸	646	71671 消疳散	651
71586 消毒膏	641	71629 消积丸	646	71672 消疳散	651
71587 消毒膏	641	71630 消积丸	646	71673 消疳散	651
71588 消毒膏	642	71631 消积丸	646	71674 消疳散	651
71589 消标散	642	71632 消积丸	647	71675 消疳散	652
71590 消指散	642	71633 消积丸	647	71676 消疳煎	652
71591 消胃汤	642	71634 消积丸	647	71677 消疽散	652
71592 消胃饮	642	71635 消积丸	647	71678 消疽膏	652
71593 消食丸	642	71636 消积丸	647	71679 消疹汤	652
71594 消食丸	642	71637 消积丸	647	71680 消痈汤	652
71595 消食丸	642	71638 消积丸	647	71681 消痈汤	652
71596 消食丸	643	71639 消积丸	647	71682 消痈酒	652
71597 消食丸	643	71640 消积丸	648	71683 消酒药	652
71598 消食丸	643	71641 消积丸	648	71684 消浮散	652
71599 消食丸	643	71642 消积丸	648	71685 消浆饮	653
71600 消食丸	643	71643 消积丸	648	71686 消黄汤	653
71601 消食丸	643	71644 消积丸	648	71687 消黄汤	653
71602 消食丸	643	71645 消积丸	648	71688 消黄汤	653
71603 消食丸	643	71646 消积丹	648	71689 消黄散	653
71604 消食汤	643	71647 消积汤	648	71690 消黄膏	653
71605 消食饼	644	71648 消积汤	648	71691 消跌汤	653
71606 消食散	644	71649 消积汤	648	71692 消蛊汤	653
71607 消食散	644	71650 消积饮	649	71693 消梨饮	653
71608 消食散	644	71651 消积饮	649	71694 消痔丸	653
71609 消食散	644	71652 消积散	649	71695 消痔丸	654
71610 消蚀散	644	71653 消脓汤	649	71696 消痔散	654
71611 消肘饮	644	71654 消脓饮	649	71697 消痔散	654
71612 消痈丸	644	71655 消疳丸	649	71698 消痔散	654
71613 消痈丸	644	71656 消疳丸	649	71699 消痔散	654
71614 消痈丸	644	71657 消疳丸	649	71700 消痔散	654
71615 消痈汤	645	71658 消疳丸	649	71701 消痔散	654
71616 消痈散	645	71659 消疳丸	650	71702 消惊丸	654
71617 消痈膏	645	71660 消疳丸	650	71703 消惊膏	654
71618 消疣水	645	71661 消疳丸	650	71704 消清散	655
71619 消疥丸	645	71662 消疳丸	650	71705 消斑饮	655
71620 消鸡汤	645	71663 消疳丸	650	71706 消斑散	655
71621 消核丸	645	71664 消疳丹	650	71707 消散片	655
71622 消核汤	645	71665 消疳丹	650	71708 消辜汤	655

71709 消厥散	655	71752 消痰丸	660	71795 消癖散	664
71710 消蛔丸	655	71753 消痰汤	660	71796 消癖膏	665
71711 消耐散	655	71754 消痰散	660	71797 消癖膏	665
71712 消暑丸	655	71755 消痰煎	660	71798 消蠱汤	665
71713 消暑丸	655	71756 消醒丸	660	71799 消水肿膏	665
71714 消暑丸	656	71757 消管丸	660	71800 消水毒饮	665
71715 消暑丹	656	71758 消管丸	660	71801 消水神丹	665
71716 消暑散	656	71759 消管方	660	71802 消石大丸	665
71717 消痞丸	656	71760 消管錠	660	71803 消石大丸	665
71718 消痞丸	656	71761 消腐散	661	71804 消石神丹	666
71719 消痞丸	656	71762 消瘟丹	661	71805 消石粉散	666
71720 消痞丸	656	71763 消瘟散	661	71806 消块神丹	666
71721 消痞丸	656	71764 消痕汤	661	71807 消疔毒膏	666
71722 消痞丸	656	71765 消漏丸	661	71808 消乳岩丸	666
71723 消痞丸	657	71766 消瘤丹	661	71809 消乳食丸	667
71724 消痞丸	657	71767 消瘤丹	661	71810 消乳食丹	667
71725 消痞丸	657	71768 消瘤丹	661	71811 消乳痰丸	667
71726 消痞丸	657	71769 消瘤酒	661	71812 消乳痰丸	667
71727 消痞丹	657	71770 消磨散	661	71813 消胀饮子	667
71728 消痞汤	657	71771 消瘰丸	661	71814 消炎 3 号	667
71729 消痞汤	657	71772 消瘰丸	662	71815 消炎合剂	667
71730 消痞汤	657	71773 消瘰膏	662	71816 消毒灯照	667
71731 消痞膏	657	71774 消瘰汤	662	71817 消毒饮子	667
71732 消痞膏	657	71775 消瘰酒	662	71818 消毒饮子	667
71733 消痞膏	658	71776 消瘰散	662	71819 消毒饼子	668
71734 消痞膏	658	71777 消瘰散	662	71820 消食饭灰	668
71735 消痞膏	658	71778 消瘰散	662	71821 消食膏酒	668
71736 消痛丸	658	71779 消瘰膏	663	71822 消热饮子	668
71737 消滞丸	658	71780 消糖散	663	71823 消痞口丸	668
71738 消滞丸	658	71781 消翳丸	663	71824 消痞神丹	668
71739 消湿散	658	71782 消翳散	663	71825 消梨饮子	668
71740 消渴丹	658	71783 消翳散	663	71826 消暑神丹	668
71741 消溃散	658	71784 消翳散	663	71827 消痞块汤	668
71742 消寒饮	659	71785 消癌片	663	71828 消痞神丸	668
71743 消蛾散	659	71786 消癖丸	663	71829 消痞神膏	669
71744 消愁汤	659	71787 消癖丸	663	71830 消痞核桃	669
71745 消解散	659	71788 消癖丸	663	71831 消渴痞丸	669
71746 消解散	659	71789 消癖丸	664	71832 消痰神丹	669
71747 消痰饮	659	71790 消癖丸	664	71833 消痰饮丸	669
71748 消痰膏	659	71791 消癖丸	664	71834 消痰饼子	669
71749 消痰丸	659	71792 消癖丸	664	71835 消横痃膏	669
71750 消痰丸	660	71793 消癖丸	664	71836 消下破血汤	669
71751 消痰丸	660	71794 消癖酒	664	71837 消上瘀血汤	669

71838	消中分利汤	670	71881	消石半夏丸	674	71924	消肿定痛汤	679
71839	消内灵砂丹	670	71882	消石矾石散	674	71925	消肿定痛散	679
71840	消化无形汤	670	71883	消虫神奇丹	675	71926	消肿定痛散	680
71841	消风化毒汤	670	71884	消肉化毒丹	675	71927	消肿定痛散	680
71842	消风化毒汤	670	71885	消血理中膏	675	71928	消肿南星散	680
71843	消风化毒散	670	71886	消衣神应方	675	71929	消肿活瘀膏	680
71844	消风化痰汤	670	71887	消汗至神丹	675	71930	消肿健脾汤	680
71845	消风化痰汤	670	71888	消导二陈汤	676	71931	消肿通气汤	680
71846	消风玉容散	670	71889	消导二陈汤	676	71932	消肿遗粮汤	680
71847	消风宁嗽汤	670	71890	消导平胃散	676	71933	消肿漱口方	680
71848	消风宁嗽散	671	71891	消导宽中汤	676	71934	消胀万应汤	680
71849	消风百解散	671	71892	消阴止泻丹	676	71935	消胀化臌丸	680
71850	消风百解散	671	71893	消阴米复汤	676	71936	消胀四物汤	681
71851	消风百解散	671	71894	消阴助阳汤	676	71937	消炎止痛汤	681
71852	消风托里散	671	71895	消阴利导煎	676	71938	消炎止痛散	681
71853	消风导赤汤	671	71896	消块止痛丹	676	71939	消炎止痛膏	681
71854	消风导赤汤	672	71897	消块和胃汤	677	71940	消炎化毒汤	681
71855	消风导赤汤	672	71898	消坚化痰汤	677	71941	消炎退翳丸	681
71856	消风住痛散	672	71899	消坚溃脓膏	677	71942	消炎解毒丸	681
71857	消风返正汤	672	71900	消谷断下丸	677	71943	消炎解毒丸	681
71858	消风羌活汤	672	71901	消饮白术丸	677	71944	消毒一錠金	682
71859	消风败毒散	672	71902	消饮白术煎	677	71945	消毒五圣汤	682
71860	消风败毒散	672	71903	消饮茯苓汤	677	71946	消毒止血散	682
71861	消风败毒散	672	71904	消饮倍术丸	677	71947	消毒化坚汤	682
71862	消风败毒散	672	71905	消疔化毒汤	677	71948	消毒化斑汤	682
71863	消风败毒散	672	71906	消疔泻毒丸	677	71949	消毒化斑汤	682
71864	消风定痛散	673	71907	消疔酥信丹	678	71950	消毒化斑汤	682
71865	消风顺气丸	673	71908	消补兼施汤	678	71951	消毒化斑汤	682
71866	消风胜湿汤	673	71909	消尿蛋白饮	678	71952	消毒化斑散	682
71867	消风养血汤	673	71910	消肾脱钳丸	678	71953	消毒升麻汤	683
71868	消风除湿汤	673	71911	消乳进食丸	678	71954	消毒圣神汤	683
71869	消风透痧汤	673	71912	消肿木香散	678	71955	消毒达原丸	683
71870	消风凉血汤	673	71913	消肿止痛散	678	71956	消毒百应丸	683
71871	消风桑白散	673	71914	消肿止痛膏	678	71957	消毒托里散	683
71872	消风脱甲散	674	71915	消肿化毒丹	678	71958	消毒红玉膏	683
71873	消风清热汤	674	71916	消肿化痰散	679	71959	消毒连翘饮	683
71874	消风清热饮	674	71917	消肿四物汤	679	71960	消毒利黄汤	683
71875	消风清燥汤	674	71918	消肿代刀散	679	71961	消毒快斑汤	683
71876	消风清燥汤	674	71919	消肿宁痛膏	679	71962	消毒青黛饮	683
71877	消风散火汤	674	71920	消肿托里散	679	71963	消毒青黛饮	684
71878	消风犀角散	674	71921	消肿劫毒散	679	71964	消毒拔翳汤	684
71879	消风豁痰汤	674	71922	消肿利咽汤	679	71965	消毒定痛散	684
71880	消水毒饮子	674	71923	消肿泻毒汤	679	71966	消毒安金散	684

71967 消毒保婴丹	684	72010 消积万灵丹	689	72053 消痈护产汤	694
71968 消毒活血汤	684	72011 消积化痞丹	689	72054 消痈顺气散	694
71969 消毒活血汤	684	72012 消积化聚丸	689	72055 消痈益志丹	694
71970 消毒神圣丹	684	72013 消积化聚丸	689	72056 消痈散毒汤	694
71971 消毒神效丹	685	72014 消积化聚汤	689	72057 消痈散毒饮	694
71972 消毒神效散	685	72015 消积正元散	689	72058 消痈通结汤	694
71973 消毒凉膈散	685	72016 消积正元散	690	72059 消黄去疸汤	695
71974 消毒凉膈散	685	72017 消积皂矾丸	690	72060 消黄败毒散	695
71975 消毒流气饮	685	72018 消积阿魏丸	690	72061 消黄栀子汤	695
71976 消毒宽喉散	685	72019 消积肥儿糕	690	72062 消虚至凉汤	695
71977 消毒黄龙丸	685	72020 消积保中丸	690	72063 消痔千金散	695
71978 消毒救苦丹	685	72021 消积通经丸	690	72064 消斑化疹汤	695
71979 消毒救苦汤	685	72022 消积理中汤	691	72065 消斑快毒汤	695
71980 消毒救苦散	685	72023 消积集香丸	691	72066 消斑青黛饮	695
71981 消毒救苦散	686	72024 消息向导丸	691	72067 消斑青黛饮	696
71982 消毒麻仁丸	686	72025 消脓桔梗散	691	72068 消斑青黛饮	696
71983 消毒麻仁丸	686	72026 消疳无价散	691	72069 消斑青黛饮	696
71984 消毒清肺饮	686	72027 消疳化虫丸	691	72070 消斑承气汤	696
71985 消毒散血汤	686	72028 消疳生肌散	691	72071 消斑活命饮	696
71986 消毒溃坚汤	686	72029 消疳羊肝散	691	72072 消斑神效汤	696
71987 消毒溃坚汤	686	72030 消疳茺莢汤	692	72073 消斑解毒汤	696
71988 消毒犀角汤	686	72031 消疳扶脾散	692	72074 消暑十全饮	696
71989 消毒犀角饮	687	72032 消疳鸡肝散	692	72075 消暑十全饮	697
71990 消毒犀角饮	687	72033 消疳明目汤	692	72076 消暑十全散	697
71991 消毒犀角饮	687	72034 消疳金蟾丸	692	72077 消暑十全散	697
71992 消毒犀角饮	687	72035 消疳肥儿丸	692	72078 消暑至神汤	697
71993 消毒犀角饮	687	72036 消疳肥儿丸	692	72079 消暑活产丹	697
71994 消毒犀角散	687	72037 消疳肥儿丸	692	72080 消暑清心饮	697
71995 消毒僵黄丸	687	72038 消疳肥儿丸	692	72081 消暑清心饮	697
71996 消食化气丸	687	72039 消疳肥儿丸	692	72082 消暑清心饮	697
71997 消食平胃汤	687	72040 消疳定痛散	692	72083 消痞大成膏	698
71998 消食导气饮	687	72041 消疳保和丸	693	72084 消痞五疳丸	698
71999 消食健脾丸	688	72042 消疳退云饮	693	72085 消痞化积丸	698
72000 消食健脾丸	688	72043 消疳退云散	693	72086 消痞去积丸	698
72001 消食清郁汤	688	72044 消疳退热饮	693	72087 消痞阿魏丸	698
72002 消食断下丸	688	72045 消疳退翳汤	693	72088 消痞阿魏丸	698
72003 消结神应丸	688	72046 消疳理脾汤	693	72089 消痞狗皮膏	698
72004 消核防风薄	688	72047 消疳清热汤	693	72090 消痞狗皮膏	699
72005 消恶安胎汤	688	72048 消疳解毒散	693	72091 消痞肥儿丸	699
72006 清热大黄丸	688	72049 消痞麝香丸	693	72092 消滞千金丸	699
72007 清热定惊煎	688	72050 消痈万全汤	693	72093 消滞止痛丸	699
72008 消积二陈汤	689	72051 消痈苍耳汤	694	72094 消滞升阳汤	699
72009 消积三棱煎	689	72052 消痈还阳丹	694	72095 消滞调脾饮	699

72096 消湿化怪汤	700	72139 消毒犀角饮子	704	72167 海青膏	708
72097 消温散火汤	700	72140 消积滞集香丸	705	72168 海明散	708
72098 消寒止痛丹	700	72141 消脂膜导痰汤	705	72169 海金散	708
72099 消愁破结酿	700	72142 消痰止痛药膏	705	72170 海参丸	708
72100 消痰荡秽汤	700	72143 消风去火化毒汤	705	72171 海参粥	708
72101 消痰清胃汤	700	72144 消风活血解毒汤	705	72172 海带丸	708
72102 消痰塌血汤	700	72145 消水肿归气饮子	705	72173 海带散	708
72103 消痰止嗽膏	700	72146 消肿调脾顺气汤	705	72174 海带散	708
72104 消痰平胃汤	700	72147 消毒加味犀角饮	706	72175 海神散	708
72105 消痰利气汤	701	72148 消食化气香壳散	706	72176 海桐酒	708
72106 消痰降火汤	701	72149 消疳退翳羊肝散	706	72177 海桐散	709
72107 消痰降火汤	701	72150 消疳退翳鸡肝散	706	72178 海桐散	709
72108 消痰茯苓丸	701	72151 消疳退翳猪肝散	706	72179 海桐散	709
72109 消痰咳嗽丸	701	72152 消管祛瘀火升丹	706	72180 海桐煎	709
72110 消痰消核膏	701			72181 海浮汤	709
72111 消痰流气饮	701			72182 海浮散	709
72112 消痰噤化丸	701			72183 海粉丸	709
72113 消障复明散	701			72184 海菜丸	709
72114 消障救目汤	701			72185 海葱散	709
72115 消障救睛散	702			72186 海蛤丸	709
72116 消瘤二反膏	702			72187 海蛤丸	709
72117 消瘤神应散	702			72188 海蛤丸	709
72118 消瘤碧玉散	702			72189 海蛤丸	710
72119 消瘰化坚汤	702			72190 海蛤丸	710
72120 消瘰五海丸	702			72191 海蛤丸	710
72121 消瘰五海饮	702			72192 海蛤丸	710
72122 消瘰五海饮	702			72193 海蛤丸	710
72123 消瘰五海散	702			72194 海蛤丸	710
72124 消瘰顺气散	702			72195 海蛤丸	710
72125 消凝大丸子	703			72196 海蛤丸	711
72126 消翳复明膏	703			72197 海蛤丸	711
72127 消翳复明膏	703			72198 海蛤丸	711
72128 消膜万应丹	703			72199 海蛤丸	711
72129 消膜至神汤	703			72200 海蛤丸	711
72130 消癖神火针	704			72201 海蛤丸	711
72131 消癖逐水丸	704			72202 海蛤丸	711
72132 消癖清肌汤	704			72203 海蛤丹	711
72133 消瘕去积丸	704			72204 海蛤汤	712
72134 消瘕破积丸	704			72205 海蛤汤	712
72135 消风火解毒汤	704			72206 海蛤汤	712
72136 消肿止疼药膏	704			72207 海蛤汤	712
72137 消肿止痛药水	704			72208 海蛤汤	712
72138 消毒犀角饮子	704			72209 海蛤散	712

退

72153 退干散

海

72154 海马汤

72155 海马散

72156 海艾汤

72157 海石丸

72158 海石散

72159 海龙丸

72160 海龙粉

72161 海仙丸

72162 海仙膏

72163 海半散

72164 海附丸

72165 海青丸

72166 海青丸

72337 涂容金面方 727
72338 涂擦雄黄膏 727

浴

72339 浴汤 728
72340 浴汤 728
72341 浴风汤 728
72342 浴日方 728
72343 浴体法 728
72344 浴肠汤 728
72345 浴坊方 728
72346 浴毒汤 728
72347 浴毒汤 728
72348 浴毒汤 729
72349 浴体天麻散 729

浮

72350 浮水散 729
72351 浮水散 729
72352 浮水膏 729
72353 浮石丸 729
72354 浮石丸 729
72355 浮石丸 729
72356 浮石散 729
72357 浮石散 729
72358 浮麦汤 729
72359 浮麦散 730
72360 浮麦散 730
72361 浮萍丸 730
72362 浮萍丸 730
72363 浮萍丸 730
72364 浮萍丸 730
72365 浮萍丸 730
72366 浮萍丸 730
72367 浮萍丸 730
72368 浮萍汤 730
72369 浮萍酒 731
72370 浮萍散 731
72371 浮萍散 731
72372 浮萍散 731
72373 浮萍散 731
72374 浮萍散 731

72375 浮萍散 731
72376 浮椒丸 731
72377 浮珠丸子 731
72378 浮萍草丸 731
72379 浮萍草散 731
72380 浮萍煎膏 732
72381 浮萍一粒丹 732
72382 浮萍天冬汤 732
72383 浮萍石膏汤 732
72384 浮萍地肤汤 732
72385 浮萍地黄汤 732
72386 浮萍当归汤 732
72387 浮萍茯苓丸 732
72388 浮萍黄芩汤 732
72389 浮萍黄芩煎 732
72390 浮萍葛根汤 732
72391 浮萍葛根汤 732
72392 浮翳坠翳丸 733
72393 浮萍葛根半夏汤
..... 733
72394 浮萍葛根芍药汤
..... 733

涣

72395 涣邪汤 733

涤

72396 涤中丸 733
72397 涤风散 733
72398 涤风散 733
72399 涤邪汤 733
72400 涤光散 734
72401 涤饮丸 734
72402 涤肠丸 734
72403 涤肠汤 734
72404 涤肠汤 734
72405 涤昏膏 734
72406 涤空丹 734
72407 涤毒散 735
72408 涤垢汤 735
72409 涤垢饮 735
72410 涤胎散 735

72411 涤热汤 735
72412 涤烦丸 735
72413 涤烦汤 735
72414 涤痔散 735
72415 涤寒汤 735
72416 涤痰汤 735
72417 涤痰丸 736
72418 涤痰丸 736
72419 涤痰丸 736
72420 涤痰丸 736
72421 涤痰丸 736
72422 涤痰丸 736
72423 涤痰丸 736
72424 涤痰丸 736
72425 涤痰丸 736
72426 涤痰汤 737
72427 涤痰汤 737
72428 涤痰汤 737
72429 涤痰汤 737
72430 涤痰汤 737
72431 涤痰散 737
72432 涤痰散 737
72433 涤邪救苦汤 737
72434 涤秽免痘汤 737
72435 涤秽免痘汤 738
72436 涤秽消痧汤 738
72437 涤秽漱口散 738
72438 涤滞消痰汤 738

流

72439 流气丸 738
72440 流气丸 738
72441 流气饮 738
72442 流气饮 739
72443 流气饮 739
72444 流气饮 739
72445 流气饮 739
72446 流气饮 739
72447 流气饮 739
72448 流气饮 739
72449 流气散 739
72450 流气散 739
72451 流水汤 739

72452	流伤饮	739
72453	流金丸	740
72454	流金丸	740
72455	流金丸	740
72456	流金散	740
72457	流金膏	740
72458	流注汤	740
72459	流注饮	740
72460	流注散	740
72461	流经散	741
72462	流星串	741
72463	流星散	741
72464	流积丸	741
72465	流气饮子	741
72466	流气饮子	741
72467	流脑合剂	741
72468	流气导滞丸	741

润

72469	润下丸	742
72470	润下丸	742
72471	润下丸	742
72472	润下丸	742
72473	润下丸	742
72474	润下汤	742
72475	润土汤	742
72476	润木汤	742
72477	润气煎	742
72478	润生丸	743
72479	润光丸	743
72480	润华膏	743
72481	润血汤	743
72482	润肌汤	743
72483	润肌散	743
72484	润肌膏	743
72485	润肌膏	743
72486	润肌膏	744
72487	润肌膏	744
72488	润字丸	744
72489	润字丸	744
72490	润体丸	744
72491	润体丸	745
72492	润体丸	745

72493	润肝汤	745
72494	润肠丸	745
72495	润肠丸	745
72496	润肠丸	745
72497	润肠丸	745
72498	润肠丸	745
72499	润肠丸	746
72500	润肠丸	746
72501	润肠丸	746
72502	润肠丸	746
72503	润肠丸	746
72504	润肠丸	746
72505	润肠丸	746
72506	润肠丸	746
72507	润肠丸	747
72508	润肠丸	747
72509	润肠丸	747
72510	润肠丸	747
72511	润肠丸	747
72512	润肠丸	747
72513	润肠丸	747
72514	润肠丸	747
72515	润肠丸	747
72516	润肠丸	747
72517	润肠丸	748
72518	润肠汤	748
72519	润肠汤	748
72520	润肠汤	748
72521	润肠汤	748
72522	润肠汤	748
72523	润肠汤	748
72524	润肠汤	748
72525	润肠汤	749
72526	润肠汤	749
72527	润肠散	749
72528	润肠散	749
72529	润肠散	749
72530	润肠散	749
72531	润肠粥	749
72532	润肠煎	749
72533	润肠煎	749
72534	润肠膏	749
72535	润肾丸	749

72536	润金饮	750
72537	润肤丸	750
72538	润肤膏	750
72539	润肺丸	750
72540	润肺丸	750
72541	润肺丸	750
72542	润肺丸	750
72543	润肺丸	750
72544	润肺汤	751
72545	润肺汤	751
72546	润肺汤	751
72547	润肺汤	751
72548	润肺汤	751
72549	润肺汤	751
72550	润肺汤	751
72551	润肺汤	752
72552	润肺饮	752
72553	润肺饮	752
72554	润肺饮	752
72555	润肺散	752
72556	润肺散	752
72557	润肺散	752
72558	润肺散	752
72559	润肺散	752
72560	润肺散	753
72561	润肺散	753
72562	润肺膏	753
72563	润肺膏	753
72564	润河汤	753
72565	润泽丸	753
72566	润经汤	753
72567	润胃丹	753
72568	润胃汤	754
72569	润秋汤	754
72570	润便汤	754
72571	润胆汤	754
72572	润胞汤	754
72573	润胎饮	754
72574	润神散	754
72575	润麻丸	754
72576	润润汤	754
72577	润喉丸	755
72578	润喉汤	755

72579 润喉散 755
 72580 润焦汤 755
 72581 润脾膏 755
 72582 润滋汤 755
 72583 润输汤 755
 72584 润槁汤 755
 72585 润膈丸 755
 72586 润膈丸 756
 72587 润燥丸 756
 72588 润燥丹 756
 72589 润燥汤 756
 72590 润燥汤 756
 72591 润燥汤 756
 72592 润燥汤 756
 72593 润燥汤 756
 72594 润燥汤 756
 72595 润燥汤 756
 72596 润燥汤 756
 72597 润燥汤 756
 72598 润燥汤 757
 72599 润燥饮 757
 72600 润燥饮 757
 72601 润血饮子 757
 72602 润肺膏丸 757
 72603 润木安魂汤 757
 72604 润肌皮肤膏 757
 72605 润阴坚骨汤 758
 72606 润肝安胎汤 758
 72607 润肠五仁丸 758
 72608 润肠化痰汤 758
 72609 润肠降火汤 758
 72610 润肠理气汤 758
 72611 润肠橘香丸 758
 72612 润肤生血饮 758
 72613 润肺止咳丹 759
 72614 润肺止咳膏 759
 72615 润肺化痰汤 759
 72616 润肺化痰膏 759
 72617 润肺百花膏 759
 72618 润肺扶气汤 759
 72619 润肺和肝膏 759
 72620 润肺降气汤 759
 72621 润肺除嗽饮 760

72622 润肺通窍汤 760
 72623 润疮生肌膏 760
 72624 润燥五仁丸 760
 72625 润燥至神汤 760
 72626 润燥安胎汤 760
 72627 润燥肺经汤 760
 72628 润燥泻肺汤 760
 72629 润燥破痰汤 761
 72630 润燥涩精汤 761
 72631 润肺豁痰宁嗽汤
 761

浣

72632 浣肌散 761

浸

72633 浸汤 761
 72634 浸酒 761
 72635 浸酒 762
 72636 浸酒 762
 72637 浸酒 762
 72638 浸酒 762
 72639 浸酒 762
 72640 浸毒散 762
 72641 浸药酒 762
 72642 浸药酒 762
 72643 浸药酒 762
 72644 浸洗药 762
 72645 浸酒药 763
 72646 浸黄酒 763
 72647 浸髮汤 763
 72648 浸虎骨酒 763
 72649 浸脚矾石汤 763

涩

72650 涩化丹 763
 72651 涩肠丸 764
 72652 涩肠散 764
 72653 涩精金锁丹 764
 72654 涩翳七宝丸 764
 72655 涩翳还睛散 764

涌

72656 涌泉汤 764
 72657 涌泉汤 764
 72658 涌泉散 765
 72659 涌泉散 765
 72660 涌泉散 765
 72661 涌泉散 765
 72662 涌泉散 765
 72663 涌泉散 765
 72664 涌泉散 765
 72665 涌泉散 765
 72666 涌泉散 765
 72667 涌泉散 766
 72668 涌泉散 766
 72669 涌泉散 766
 72670 涌泉散 766
 72671 涌泉散 766
 72672 涌泉膏 766
 72673 涌泉膏 766
 72674 涌泉膏 766
 72675 涌涎汤 766
 72676 涌铁膏 766
 72677 涌痰汤 767
 72678 涌泉神应散 767

浚

72679 浚川丸 767
 72680 浚川丸 767
 72681 浚川丸 767
 72682 浚川散 767
 72683 浚牛膏 767
 72684 浚水汤 768
 72685 浚血丸 768
 72686 浚荣散 768

戮

72687 戮羊角汤 768
 72688 戮羊角饮 768
 72689 戮羊角散 768
 72690 戮羊角散 768

瓶

72691 瓶中关升神效散
..... 768

粉

72692 粉散 769
72693 粉散 769
72694 粉散 769
72695 粉散 769
72696 粉散 769
72697 粉霜 769
72698 粉丹散 769
72699 粉艾丹 769
72700 粉龙丸 769
72701 粉代散 769
72702 粉灰散 770
72703 粉肌散 770
72704 粉肌散 770
72705 粉汗方 770
72706 粉汗散 770
72707 粉汗散 770
72708 粉汗散 770
72709 粉米汤 770
72710 粉红丸 770
72711 粉红散 770
72712 粉连散 770
72713 粉身方 771
72714 粉身散 771
72715 粉身散 771
72716 粉灵砂 771
72717 粉金散 771
72718 粉草汤 771
72719 粉草饮 771
72720 粉草散 771
72721 粉草膏 771
72722 粉砂饼 771
72723 粉香散 771
72724 粉香散 771
72725 粉香散 772
72726 粉姜散 772
72727 粉胶散 772

72728 粉黄膏 772
72729 粉黄膏 772
72730 粉隔汤 772
72731 粉蜜膏 772
72732 粉糖丸 772
72733 粉糖水 772
72734 粉霜丸 772
72735 粉霜丸 772
72736 粉霜丸 773
72737 粉霜丸 773
72738 粉霜丸 773
72739 粉霜散 773
72740 粉霜散 773
72741 粉霜散 773
72742 粉霜散 773
72743 粉黛散 773
72744 粉麝散 774
72745 粉矾平胃丸 774
72746 粉乳托里散 774
72747 粉香生肌散 774
72748 粉霜半夏丸 774
72749 粉色干燥药粉 774

料

72750 料物丸 774

益

72751 益儿丸 774
72752 益儿丸 774
72753 益儿丸 775
72754 益儿丸 775
72755 益儿饼 775
72756 益卫散 775
72757 益元丸 775
72758 益元丸 775
72759 益元汤 775
72760 益元汤 775
72761 益元汤 775
72762 益元汤 775
72763 益元散 776
72764 益元散 776
72765 益元散 776

72766 益元煎 776
72767 益牙散 777
72768 益中丸 777
72769 益中丹 777
72770 益中丹 777
72771 益中汤 777
72772 益中汤 777
72773 益中散 777
72774 益中膏 777
72775 益气丸 778
72776 益气丸 778
72777 益气丸 778
72778 益气汤 778
72779 益气汤 778
72780 益气汤 778
72781 益气汤 778
72782 益气汤 778
72783 益气汤 778
72784 益气汤 779
72785 益气散 779
72786 益火丹 779
72787 益心丹 779
72788 益心丹 779
72789 益心汤 779
72790 益水汤 779
72791 益母丸 779
72792 益母丸 779
72793 益母丸 779
72794 益母丸 779
72795 益母丸 779
72796 益母丸 780
72797 益母丸 780
72798 益母丸 780
72799 益母丸 780
72800 益母丹 780
72801 益母汤 780
72802 益母汤 781
72803 益母汤 781
72804 益母汤 781
72805 益母饮 781
72806 益母散 781
72807 益母散 781
72808 益母散 781

72809 益母散	781	72852 益胃丹	786	72895 益智散	790
72810 益母散	781	72853 益胃汤	786	72896 益智散	791
72811 益母煎	781	72854 益胃汤	786	72897 益智散	791
72812 益光散	781	72855 益胃汤	786	72898 益智散	791
72813 益血丹	782	72856 益胃汤	786	72899 益脾丸	791
72814 益后汤	782	72857 益胃汤	786	72900 益脾汤	791
72815 益多散	782	72858 益胃汤	786	72901 益脾饼	791
72816 益阳丹	782	72859 益胃散	787	72902 益脾散	791
72817 益阳丹	782	72860 益胃散	787	72903 益脾散	791
72818 益阳散	782	72861 益胃散	787	72904 益脾散	791
72819 益阳散	782	72862 益胆丸	787	72905 益脾散	791
72820 益阴丹	782	72863 益胆汤	787	72906 益瞳丸	792
72821 益阴丹	782	72864 益胆汤	787	72907 益母草丸	792
72822 益阴汤	782	72865 益神丸	787	72908 益母草丸	792
72823 益阴散	782	72866 益神散	787	72909 益母草汁	792
72824 益阴煎	783	72867 益神散	787	72910 益母草汤	792
72825 益阴煎	783	72868 益真丸	788	72911 益母草汤	792
72826 益欢散	783	72869 益真丸	788	72912 益母草饮	792
72827 益寿丸	783	72870 益损汤	788	72913 益母草散	792
72828 益寿丹	783	72871 益脑散	788	72914 益母草散	792
72829 益寿膏	783	72872 益脑散	788	72915 益母草散	792
72830 益志汤	783	72873 益容丸	788	72916 益母草散	792
72831 益肝汤	783	72874 益黄汤	788	72917 益母草散	793
72832 益肝散	784	72875 益黄散	788	72918 益母草散	793
72833 益肝煎	784	72876 益黄散	789	72919 益母草散	793
72834 益君汤	784	72877 益黄散	789	72920 益母草膏	793
72835 益肾丸	784	72878 益黄散	789	72921 益母草膏	793
72836 益肾散	784	72879 益黄散	789	72922 益母草膏	793
72837 益肾散	784	72880 益黄散	789	72923 益容仙丹	793
72838 益肾膏	784	72881 益黄散	789	72924 益智子汤	793
72839 益肺丹	784	72882 益智丸	789	72925 益智子汤	793
72840 益肺汤	784	72883 益智丸	789	72926 益智子散	793
72841 益肺汤	785	72884 益智丸	789	72927 益智子散	794
72842 益肺汤	785	72885 益智丸	789	72928 益智子散	794
72843 益肺散	785	72886 益智汤	790	72929 益智子散	794
72844 益肺散	785	72887 益智汤	790	72930 益智仁汤	794
72845 益经汤	785	72888 益智汤	790	72931 益智仁汤	794
72846 益荣丹	785	72889 益智汤	790	72932 益智仁散	794
72847 益荣汤	785	72890 益智汤	790	72933 益智仁散	794
72848 益荣汤	785	72891 益智酒	790	72934 益智仁散	794
72849 益荣汤	786	72892 益智散	790	72935 益智煮散	795
72850 益荣煎	786	72893 益智散	790	72936 益卫运化汤	795
72851 益胃丸	786	72894 益智散	790	72937 益卫养荣汤	795

72938 益元七宝丹	795	72981 益气调荣汤	800	73024 益阴肾气丸	806
72939 益元固真汤	795	72982 益气培元饮	800	73025 益阴肾气丸	806
72940 益元透肌汤	795	72983 益气救脱汤	800	73026 益阴固本丸	806
72941 益元透肌散	795	72984 益气清金汤	801	73027 益阴固本丸	806
72942 益元透肌散	795	72985 益气清脏汤	801	73028 益阴治癆方	806
72943 益元凉肌散	796	72986 益气散风汤	801	73029 益阴养荣膏	806
72944 益元资始丸	796	72987 益气滑胎丸	801	73030 益阴通闭丸	807
72945 益元散邪汤	796	72988 益气疏风汤	801	73031 益阴清热汤	807
72946 益气开痰汤	796	72989 益气聪明汤	801	73032 益寿比天膏	807
72947 益气止血方	796	72990 益火生光汤	801	73033 益寿比天膏	807
72948 益气止淋汤	796	72991 益火散寒汤	802	73034 益寿永贞膏	808
72949 益气内消散	796	72992 益心止遗丸	802	73035 益寿永真膏	808
72950 益气分清饮	796	72993 益水平火汤	802	73036 益寿地仙丸	808
72951 益气左金汤	797	72994 益本滋肾丸	802	73037 益寿地仙丹	808
72952 益气安胎饮	797	72995 益母八珍汤	802	73038 益寿固元膏	808
72953 益气安神汤	797	72996 益母止啼汤	802	73039 益寿固真丹	808
72954 益气导源汤	797	72997 益母四物汤	802	73040 益寿黑豆方	808
72955 益气导溺汤	797	72998 益母地黄汤	802	73041 益肝双补丸	809
72956 益气收乳汤	797	72999 益母佛手散	803	73042 益肾固精丸	809
72957 益气收浆汤	797	73000 益母草子散	803	73043 益肾固精丸	809
72958 益气时症丸	797	73001 益母草子散	803	73044 益肾泻火汤	809
72959 益气快中丸	797	73002 益母草汁粥	803	73045 益肾调肝汤	809
72960 益气补元汤	798	73003 益母草饮子	803	73046 益肾调经汤	809
72961 益气补冲汤	798	73004 益母草饮子	803	73047 益明长智丸	810
72962 益气补肾汤	798	73005 益母草涂方	803	73048 益金散风汤	810
72963 益气补肺汤	798	73006 益母草煎丸	803	73049 益府紫金锭	810
72964 益气补漏汤	798	73007 益母草煎丸	804	73050 益荣安神汤	810
72965 益气固阴汤	798	73008 益母种子丸	804	73051 益荣荡滞饮	810
72966 益气固肠丸	798	73009 益母胜金丸	804	73052 益胃升阳汤	810
72967 益气固精丸	798	73010 益母胜金丹	804	73053 益神定志丸	810
72968 益气保生丸	798	73011 益母毓麟丸	804	73054 益真鹿茸丸	810
72969 益气养元丸	799	73012 益血和中散	804	73055 益脑地榆散	811
72970 益气养荣汤	799	73013 益血润肠丸	804	73056 益脑吹鼻散	811
72971 益气养荣汤	799	73014 益血润肠丸	805	73057 益营内托散	811
72972 益气养荣汤	799	73015 益血润肠汤	805	73058 益黄健脾汤	811
72973 益气养神汤	799	73016 益阴去邪汤	805	73059 益消雄黄丸	811
72974 益气养营煎	799	73017 益阴生血汤	805	73060 益智二伏汤	811
72975 益气养脾汤	799	73018 益阴地黄丸	805	73061 益智本律散	811
72976 益气除风汤	800	73019 益阴地黄丸	805	73062 益智五味丸	811
72977 益气健脾丸	800	73020 益阴地黄丸	805	73063 益智太乙丸	811
72978 益气健脾汤	800	73021 益阴利产方	805	73064 益智仁煮散	811
72979 益气健脾汤	800	73022 益阴补气丸	805	73065 益智火煮散	812
72980 益气润燥丸	800	73023 益阴肾气丸	805	73066 益智安神汤	812

73180 宽胸行气散	825	73220 家秘冲和汤	831	73262 家传三因冲和丸	835
73181 宽筋活血散	825	73221 家秘坎离丸	831	73263 家传升阳固脱汤	835
73182 宽中喜食无厌丸	825	73222 家秘肝肾丸	831	73264 家传加味枳术丸	835
家		73223 家秘羌活汤	831	73265 家传加味胃苓丸	835
73183 家宝丹	825	73224 家秘补阳丸	831	73266 家传安胎保肺膏	835
73184 家宝丹	826	73225 家秘补阴丸	831	73267 家传治痢保和丸	835
73185 家宝丹	826	73226 家秘补肝汤	831	73268 家传枳术越鞠丸	836
73186 家莲散	826	73227 家秘和中汤	831	73269 家传茱萸内消丸	836
73187 家秘丸	826	73228 家秘泻白散	831	73270 家传养脾消积丸	836
73188 家秘煎	826	73229 家秘泻白散	831	73271 家传秘结祛痛散	836
73189 家菊散	826	73230 家秘泻白散	831	73272 家传秘捶红膏药	836
73190 家方黄膏	826	73231 家秘泻白散	832	73273 家传清气化痰丸	836
73191 家韭子丸	827	73232 家秘泻黄散	832	73274 家秘川连枳壳汤	836
73192 家韭子丸	827	73233 家秘香薷饮	832	73275 家秘木通羌活汤	837
73193 家猪屎散	827	73234 家秘保和散	832	73276 家秘加味枳术丸	837
73194 家传大明膏	827	73235 家秘保和散	832	73277 家秘加减理中汤	837
73195 家传木通散	827	73236 家秘保和散	832	73278 家秘知柏天地煎	837
73196 家传正气散	828	73237 家秘独圣散	832	73279 家秘枳壳黄连汤	837
73197 家传芎归汤	828	73238 家秘胆星丸	832	73280 家秘荆防甘桔汤	837
73198 家传西圣膏	828	73239 家秘胆星汤	832	73281 家秘烂口神效散	837
73199 家传异功丸	828	73240 家秘祛痛散	832	73282 家秘神验松葱膏	837
73200 家传和中丸	829	73241 家秘神术汤	833	73283 家秘湿疟地黄汤	
73201 家传定志方	829	73242 家秘神术汤	833		
73202 家传保和丸	829	73243 家秘桂枝汤	833		
73203 家传保和丸	829	73244 家秘消坚散	833		
73204 家传养肝丸	829	73245 家秘消胀散	833		
73205 家传神异散	829	73246 家秘消积散	833		
73206 家传凉惊丸	829	73247 家秘消滞汤	833		
73207 家传消癆丸	830	73248 家秘润肺饮	833		
73208 家传剪红丸	830	73249 家秘理中汤	833		
73209 家传滑胎饮	830	73250 家秘黄芩汤	833		
73210 家姜黄连丸	830	73251 家秘清胃汤	833		
73211 家秘三黄丸	830	73252 家秘清胃汤	833		
73212 家秘天地煎	830	73253 家秘清胆汤	833		
73213 家秘天地煎	830	73254 家秘舒筋丸	834		
73214 家秘天地煎	830	73255 家秘温肺汤	834		
73215 家秘正气散	830	73256 家秘滋肾丸	834		
73216 家秘甘露饮	830	73257 家秘截疟饮	834		
73217 家秘戊己汤	830	73258 家常八仙酒	834		
73218 家秘归经汤	830	73259 家方紫金沙散	834		
73219 家秘芎归汤	831	73260 家传胎产金丹	834		
		73261 家传丁香脾积丸	834		

.....	838
73284 家藏神验血竭膏	
.....	838
73285 家传不换金正气散	
.....	838

浆

73286 浆水饮	838
73287 浆水饮	838
73288 浆水散	838
73289 浆水粥	838
73290 浆水渍方	838
73291 浆水葱白粥	838

瓷

73292 瓷药散	838
-----------	-----

资

73293 资生丸	839
73294 资生丸	839
73295 资生丸	839
73296 资生丹	839
73297 资生汤	839
73298 资生汤	839
73299 资生汤	839
73300 资成汤	840
73301 资血汤	840
73302 资政丸	840
73303 资本润燥汤	840
73304 资生大造丸	840
73305 资生肾气丸	840
73306 资生顺坤方	840
73307 资生健脾膏	841
73308 资生通脉汤	841
73309 资寿小金丹	841
73310 资寿黑龙丸	841
73311 资寿解语汤	841
73312 资生健乾丸	841
73313 资液救焚汤	841

烫

73314 烫火药	841
-----------	-----

73315 烫火散	842
73316 烫伤膏	842
73317 烫伤膏	842
73318 烫脚散	842
73319 烫火软膏	842
73320 烫火药膏	842
73321 烫伤软膏	842
73322 烫伤乳剂	842
73323 烫伤药膏	842
73324 烫洗囊湿止痒药方	
.....	843

羞

73325 羞明立胜散	843
-------------	-----

诸

73326 诸石丸	843
73327 诸咳丸	843
73328 诸疮膏	843
73329 诸葛散	843
73330 诸疮洗药	843
73331 诸疮掺药	843
73332 诸疽疮膏	843
73333 诸葛干粮	844
73334 诸风应效酒	844
73335 诸毒一笔消	844
73336 诸疮一扫光	844
73337 诸疮一扫光	844
73338 诸疮解毒丹	844
73339 诸积太仓丸	845
73340 诸般败毒散	845
73341 诸蛊保命丹	845
73342 诸痔脱管丸	845
73343 诸葛行军散	845
73344 诸葛行军散	845
73345 诸葛行军散	845
73346 诸葛行军散	845
73347 诸葛行军散	845
73348 诸葛行营散	845
73349 诸葛卧龙丹	846
73350 诸葛解甲风	846
73351 诸葛武侯平安散	

.....	846
73352 诸葛武侯行军散	
.....	846

读

73353 读书丸	846
73354 读书丸	846

调

73355 调卫汤	847
73356 调卫汤	847
73357 调卫饮	847
73358 调卫散	847
73359 调元丸	847
73360 调元汤	847
73361 调元汤	847
73362 调元汤	847
73363 调元汤	848
73364 调元汤	848
73365 调元汤	848
73366 调元汤	848
73367 调元粉	848
73368 调元散	848
73369 调元散	848
73370 调元散	848
73371 调元散	848
73372 调中丸	848
73373 调中丸	849
73374 调中丸	849
73375 调中丸	849
73376 调中丸	849
73377 调中丸	849
73378 调中丸	849
73379 调中丸	849
73380 调中丸	849
73381 调中丸	850
73382 调中丸	850
73383 调中丸	850
73384 调中丸	850
73385 调中丸	850
73386 调中丸	850
73387 调中丸	850

73388 调中丸	850	73431 调中散	855	73474 调气散	860
73389 调中丸	850	73432 调中散	855	73475 调气散	860
73390 调中方	850	73433 调中散	856	73476 调气散	861
73391 调中汤	851	73434 调中散	856	73477 调气散	861
73392 调中汤	851	73435 调中散	856	73478 调气散	861
73393 调中汤	851	73436 调中散	856	73479 调正汤	861
73394 调中汤	851	73437 调中散	856	73480 调饥散	861
73395 调中汤	851	73438 调中散	856	73481 调生丸	861
73396 调中汤	851	73439 调中散	856	73482 调圣膏	861
73397 调中汤	852	73440 调中散	856	73483 调血汤	861
73398 调中汤	852	73441 调中散	857	73484 调血饮	861
73399 调中汤	852	73442 调中散	857	73485 调导饮	861
73400 调中汤	852	73443 调中散	857	73486 调导散	862
73401 调中汤	852	73444 调中散	857	73487 调阴汤	862
73402 调中汤	852	73445 调中散	857	73488 调肝汤	862
73403 调中汤	852	73446 调中散	857	73489 调肝饮	862
73404 调中汤	853	73447 调中散	857	73490 调肝饮	862
73405 调中汤	853	73448 调中散	857	73491 调肝散	862
73406 调中汤	853	73449 调中散	857	73492 调肝散	862
73407 调中汤	853	73450 调中散	858	73493 调肝散	862
73408 调中汤	853	73451 调化丸	858	73494 调肝散	863
73409 调中汤	853	73452 调气丸	858	73495 调肝散	863
73410 调中汤	853	73453 调气丸	858	73496 调补丸	863
73411 调中汤	853	73454 调气丸	858	73497 调补煎	863
73412 调中汤	853	73455 调气丸	858	73498 调和饮	863
73413 调中汤	854	73456 调气丸	858	73499 调金汤	863
73414 调中汤	854	73457 调气丸	858	73500 调肺丸	863
73415 调中汤	854	73458 调气汤	858	73501 调肺汤	863
73416 调中汤	854	73459 调气汤	859	73502 调肺散	863
73417 调中汤	854	73460 调气汤	859	73503 调降汤	863
73418 调中汤	854	73461 调气汤	859	73504 调降汤	864
73419 调中汤	854	73462 调气汤	859	73505 调经丸	864
73420 调中汤	854	73463 调气汤	859	73506 调经丸	864
73421 调中汤	854	73464 调气汤	859	73507 调经丸	864
73422 调中汤	854	73465 调气饮	859	73508 调经丸	864
73423 调中汤	855	73466 调气饮	860	73509 调经丸	864
73424 调中汤	855	73467 调气饮	860	73510 调经丸	864
73425 调中汤	855	73468 调气饮	860	73511 调经丸	865
73426 调中汤	855	73469 调气散	860	73512 调经丸	865
73427 调中汤	855	73470 调气散	860	73513 调经丸	865
73428 调中饮	855	73471 调气散	860	73514 调经丸	865
73429 调中饮	855	73472 调气散	860	73515 调经汤	865
73430 调中饮	855	73473 调气散	860	73516 调经汤	865

73517 调经汤	865	73560 调胃汤	870	73603 调元地黄汤	875
73518 调经汤	866	73561 调胃散	870	73604 调元百补膏	875
73519 调经汤	866	73562 调胃散	870	73605 调元托里汤	875
73520 调经汤	866	73563 调胃散	870	73606 调元托里汤	876
73521 调经汤	866	73564 调胃散	871	73607 调元肾气丸	876
73522 调经汤	866	73565 调胃散	871	73608 调元固本汤	876
73523 调经汤	866	73566 调胃散	871	73609 调元固系丸	876
73524 调经汤	866	73567 调胃散	871	73610 调元固表汤	876
73525 调经汤	866	73568 调胃散	871	73611 调元养荣丸	876
73526 调经饮	866	73569 调胃散	871	73612 调元健步丸	877
73527 调经饮	867	73570 调脉汤	871	73613 调元益本汤	877
73528 调经饮	867	73571 调逆汤	871	73614 调元清神汤	877
73529 调经酒	867	73572 调息丸	872	73615 调元渗湿汤	877
73530 调经酒	867	73573 调脏丸	872	73616 调元散瘀汤	877
73531 调经散	867	73574 调理丸	872	73617 调元解毒汤	877
73532 调经散	867	73575 调营丸	872	73618 调元解毒汤	877
73533 调经散	867	73576 调营散	872	73619 调元解毒汤	877
73534 调经散	867	73577 调营散	872	73620 调元解毒汤	878
73535 调经散	867	73578 调鼎方	872	73621 调中二陈汤	878
73536 调经散	868	73579 调脾丸	872	73622 调中二黄丸	878
73537 调经散	868	73580 调脾汤	873	73623 调中人参丸	878
73538 调经散	868	73581 调脾汤	873	73624 调中人参饮	878
73539 调经散	868	73582 调脾汤	873	73625 调中大成汤	878
73540 调经散	868	73583 调脾饮	873	73626 调中五参丸	878
73541 调经散	868	73584 调脾散	873	73627 调中止嗽汤	878
73542 调经散	868	73585 调脾散	873	73628 调中化痢丸	879
73543 调经散	868	73586 调脾散	873	73629 调中化瘀汤	879
73544 调经膏	868	73587 调脾散	873	73630 调中六神散	879
73545 调荣丸	869	73588 调脾散	873	73631 调中平胃丸	879
73546 调荣汤	869	73589 调痛散	874	73632 调中正气散	879
73547 调荣汤	869	73590 调滞汤	874	73633 调中正胃散	879
73548 调荣汤	869	73591 调解散	874	73634 调中归耆汤	879
73549 调荣汤	869	73592 调敷散	874	73635 调中白术丸	879
73550 调荣饮	869	73593 调中饮子	874	73636 调中白术散	879
73551 调荣饮	869	73594 调经末子	874	73637 调中白术煎	880
73552 调荣散	869	73595 调卫止汗汤	874	73638 调中托里散	880
73553 调荣散	870	73596 调卫养荣汤	874	73639 调中快斑汤	880
73554 调荣散	870	73597 调元内托散	874	73640 调中沉香汤	880
73555 调荣散	870	73598 调元化毒汤	875	73641 调中畅脾膏	880
73556 调胃丸	870	73599 调元生脉汤	875	73642 调中和气饮	880
73557 调胃丸	870	73600 调元生脉散	875	73643 调中和气散	880
73558 调胃汤	870	73601 调元生脉散	875	73644 调中和气散	881
73559 调胃汤	870	73602 调元生脉散	875	73645 调中和胃丸	881

73646 调中和胃汤	881	73689 调肝和血丸	887	73732 调经益母丸	893
73647 调中思食丸	881	73690 调肝和胃膏	887	73733 调经益母丸	893
73648 调中顺气丸	881	73691 调肝细辛散	887	73734 调经清郁丸	894
73649 调中养荣汤	881	73692 调补中州散	887	73735 调经琥珀汤	894
73650 调中健胃汤	881	73693 调和大补羹	888	73736 调经滋血汤	894
73651 调中健脾丸	881	73694 调和肺胃汤	888	73737 调经滋补丸	894
73652 调中健脾丸	881	73695 调和营卫汤	888	73738 调经愈痛汤	894
73653 调中健脾丸	882	73696 调肺人参汤	888	73739 调经愈痛散	894
73654 调中消食汤	882	73697 调经八物丸	888	73740 调荣化滞汤	894
73655 调中益气丹	882	73698 调经止带丸	888	73741 调荣四物汤	894
73656 调中益气汤	882	73699 调经化瘀丸	889	73742 调荣顺气汤	895
73657 调中益气汤	882	73700 调经乌鸡丸	889	73743 调荣活络汤	895
73658 调中益气汤	883	73701 调经六合汤	889	73744 调荣活络汤	895
73659 调中益气汤	883	73702 调经四物汤	889	73745 调荣活络饮	895
73660 调中益气汤	883	73703 调经过期汤	889	73746 调荣活络饮	895
73661 调中益气汤	883	73704 调经至宝汤	889	73747 调荣活络散	895
73662 调中益气煎	884	73705 调经回春膏	889	73748 调荣养卫丸	895
73663 调中益胃汤	884	73706 调经补真汤	890	73749 调荣养卫汤	895
73664 调中理气汤	884	73707 调经固荣汤	890	73750 调荣通脉汤	896
73665 调中葛根汤	884	73708 调经固真汤	890	73751 调荣清热饮	896
73666 调中疏邪汤	884	73709 调经育子方	890	73752 调荣解毒汤	896
73667 调中愈痛汤	884	73710 调经种子丸	890	73753 调胃干姜散	896
73668 调中槟榔丸	884	73711 调经种子丸	890	73754 调胃升阳汤	896
73669 调气木香丸	884	73712 调经种子方	890	73755 调胃白术散	896
73670 调气止痛汤	884	73713 调经种子汤	891	73756 调胃和中汤	896
73671 调气化饮膏	885	73714 调经种玉丸	891	73757 调胃参茸汤	896
73672 调气化痰丸	885	73715 调经种玉汤	891	73758 调胃承气丸	896
73673 调气平胃散	885	73716 调经种玉汤	891	73759 调胃承气汤	896
73674 调气平胃散	885	73717 调经香附丸	891	73760 调胃承气汤	897
73675 调气四物汤	885	73718 调经活血汤	891	73761 调胃承气汤	897
73676 调气和胃散	885	73719 调经济阴丸	891	73762 调胃承气汤	897
73677 调气活血汤	885	73720 调经养血丸	891	73763 调胃承气汤	898
73678 调气养血汤	885	73721 调经养血汤	892	73764 调胃承气汤	898
73679 调气养血汤	886	73722 调经养荣丸	892	73765 调胃承气散	898
73680 调气养神汤	886	73723 调经养荣汤	892	73766 调胃养中汤	898
73681 调气益黄散	886	73724 调经养营丸	892	73767 调胃噎膈汤	898
73682 调气清肺汤	886	73725 调经除带汤	892	73768 调顺正气散	898
73683 调气温胃丸	886	73726 调经破瘀汤	892	73769 调顺阴阳汤	898
73684 调气暖宫丸	886	73727 调经柴胡汤	893	73770 调脉葛根汤	898
73685 调水愈通散	887	73728 调经逍遥散	893	73771 调理益气汤	898
73686 调血化核丸	887	73729 调经消肿汤	893	73772 调营定痛丸	898
73687 调阴养阳汤	887	73730 调经益气丸	893	73773 调营活络散	899
73688 调劳养血丸	887	73731 调经益母丸	893	73774 调营养卫汤	899

73775 调营养气汤	899	903	73824 陷胸汤	905
73776 调营通导散	899	73802 调胃承气加生地苡蓉汤	903	73825 陷胸汤	905
73777 调营敛肝饮	899	903	73826 陷胸散	905
73778 调脾内托散	899	73803 调胃承气加白芍青萍汤	903	73827 陷胸散	905
73779 调脾抑火汤	899	903	73828 陷胸青龙汤	905
73780 调脾养荣汤	900	73804 调胃承气加芍药地黄汤	903	73829 陷胸泻心汤	906
73781 调脾除湿汤	900	903	73830 陷胸承气汤	906
73782 调脾清毒饮	900	73805 调胃承气加麦冬元参汤	903		
73783 调元益胃饮了	900	903	娱	
73784 调经不及期汤	900	朗		73831 娱亲汤	906
73785 调元健脾保肺汤	900	73806 朗明汤	903	难	
73786 调中清热化湿膏	900	扇		73832 难产散	906
73787 调气养胃和中汤	900	73807 扇坠香	903	73833 难产散	906
73788 调气滋补温肠丸	901	【一】		73834 难产散	906
73789 调肝舒筋软坚丸	901	弱		73835 难产夺命丹	906
73790 调经升阳除湿汤	901	73808 弱痰汤	903	预	
73791 调经升麻除湿汤	901	展		73836 预防汤	906
73792 调经养荣种子丸	901	73809 展筋丹	903	73837 预固丸	907
73793 调胃白术泽泻散	901	73810 展阳神丹	903	73838 预知丸	907
73794 调胃黄连解毒汤	901	73811 展轮四维饮	904	73839 预服散	907
73795 调脉理中茯苓散	901	陵		73840 预知子丸	907
73796 调理众病醒脾散	902	73812 陵零香油	904	73841 预知子膏	907
73797 调脾清肝理湿饮	902	73813 陵鲤甲汤	904	73842 预制金枪药	907
73798 调经种子神验秘方	902	73814 陵鲤甲散	904	73843 预服万灵丹	907
73799 调经种子第一神方	902	陷		73844 预备夹棍方	907
73800 调胃承气加橘皮汤	902	73815 陷水散	904	73845 预备金疮散	907
73801 调胃承气加木香槟榔汤	902	73816 陷伏散	904	73846 预解胎毒饮	907
		73817 陷坚散	904	能	
		73818 陷肿散	904	73847 能消丸	908
		73819 陷脉散	905	73848 能消丸	908
		73820 陷胸丸	905	73849 能消丸	908
		73821 陷胸汤	905	桑	
		73822 陷胸汤	905	73850 桑酒	908
		73823 陷胸汤	905	73851 桑煎	908
				73852 桑木灸	908
				73853 桑仁粥	908
				73854 桑乌丸	909
				73855 桑心汤	909

73856 桑艾煎	909	73899 桑虫丸	913	73942 桑椹方	918
73857 桑叶方	909	73900 桑虫浆	913	73943 桑椹汤	918
73858 桑叶汤	909	73901 桑花饮	913	73944 桑椹酒	918
73859 桑叶汤	909	73902 桑杏汤	913	73945 桑椹酒	918
73860 桑叶饮	909	73903 桑杏汤	914	73946 桑椹散	918
73861 桑叶散	909	73904 桑连散	914	73947 桑椹膏	918
73862 桑叶散	909	73905 桑条煎	914	73948 桑椹膏	918
73863 桑叶煎	909	73906 桑枝方	914	73949 桑榆散	918
73864 桑叶煎	910	73907 桑枝汤	914	73950 桑螺散	918
73865 桑叶膏	910	73908 桑枝汤	914	73951 桑螺膏	918
73866 桑白汁	910	73909 桑枝汤	914	73952 桑木耳散	918
73867 桑白散	910	73910 桑枝汤	914	73953 桑白皮丸	919
73868 桑白散	910	73911 桑枝汤	914	73954 桑白皮丸	919
73869 桑白散	910	73912 桑枝散	914	73955 桑白皮汤	919
73870 桑皮汤	910	73913 桑枝煎	915	73956 桑白皮汤	919
73871 桑皮汤	910	73914 桑枝煎	915	73957 桑白皮汤	919
73872 桑皮豆	910	73915 桑枝煎	915	73958 桑白皮汤	919
73873 桑皮饮	910	73916 桑枝煎	915	73959 桑白皮汤	919
73874 桑皮饮	910	73917 桑枝煎	915	73960 桑白皮汤	919
73875 桑皮饮	911	73918 桑枝煎	915	73961 桑白皮汤	920
73876 桑皮散	911	73919 桑枝膏	915	73962 桑白皮汤	920
73877 桑皮散	911	73920 桑枣酒	915	73963 桑白皮汤	920
73878 桑皮散	911	73921 桑根汤	915	73964 桑白皮汤	920
73879 桑皮散	911	73922 桑根汤	915	73965 桑白皮汤	920
73880 桑皮煎	911	73923 桑根散	916	73966 桑白皮汤	920
73881 桑朴汤	911	73924 桑根煎	916	73967 桑白皮汤	920
73882 桑耳丸	911	73925 桑柴饮	916	73968 桑白皮汤	920
73883 桑耳丸	911	73926 桑脂散	916	73969 桑白皮汤	921
73884 桑耳汤	911	73927 桑消煎	916	73970 桑白皮汤	921
73885 桑耳汤	912	73928 桑粉丹	916	73971 桑白皮汤	921
73886 桑耳饮	912	73929 桑菊饮	916	73972 桑白皮汤	921
73887 桑耳散	912	73930 桑菊散	917	73973 桑白皮汤	921
73888 桑耳散	912	73931 桑黄丸	917	73974 桑白皮汤	921
73889 桑耳散	912	73932 桑黄汤	917	73975 桑白皮汤	922
73890 桑耳散	912	73933 桑黄散	917	73976 桑白皮汤	922
73891 桑耳散	912	73934 桑黄散	917	73977 桑白皮汤	922
73892 桑耳散	912	73935 桑麻丸	917	73978 桑白皮汤	922
73893 桑耳散	913	73936 桑麻丸	917	73979 桑白皮汤	922
73894 桑耳散	913	73937 桑麻丸	917	73980 桑白皮汤	922
73895 桑耳散	913	73938 桑麻汤	917	73981 桑白皮汤	922
73896 桑耳散	913	73939 桑楮汤	917	73982 桑白皮汤	922
73897 桑耳粥	913	73940 桑葛汤	917	73983 桑白皮汤	922
73898 桑尖汤	913	73941 桑落酒	917	73984 桑白皮汤	922

73985 桑白皮汤	923	74028 桑皮汁方	928	74071 桑螵蛸汤	933
73986 桑白皮汤	923	74029 桑灰洗方	928	74072 桑螵蛸汤	933
73987 桑白皮汤	923	74030 桑枝饮子	928	74073 桑螵蛸汤	933
73988 桑白皮汤	923	74031 桑枝浸酒	928	74074 桑螵蛸散	933
73989 桑白皮汤	923	74032 桑枝煎丸	928	74075 桑螵蛸散	934
73990 桑白皮汤	923	74033 桑枝膏丸	929	74076 桑螵蛸散	934
73991 桑白皮汤	923	74034 桑根皮汤	929	74077 桑螵蛸散	934
73992 桑白皮饮	923	74035 桑根皮散	929	74078 桑螵蛸散	934
73993 桑白皮饮	924	74036 桑根煎丸	929	74079 桑螵蛸散	934
73994 桑白皮饮	924	74037 桑寄生丸	929	74080 桑螵蛸散	934
73995 桑白皮饮	924	74038 桑寄生丸	929	74081 桑螵蛸散	934
73996 桑白皮散	924	74039 桑寄生丸	929	74082 桑螵蛸散	934
73997 桑白皮散	924	74040 桑寄生汤	929	74083 桑螵蛸散	934
73998 桑白皮散	924	74041 桑寄生汤	930	74084 桑螵蛸散	935
73999 桑白皮散	924	74042 桑寄生汤	930	74085 桑螵蛸散	935
74000 桑白皮散	925	74043 桑寄生汤	930	74086 桑螵蛸散	935
74001 桑白皮散	925	74044 桑寄生汤	930	74087 桑螵蛸散	935
74002 桑白皮散	925	74045 桑寄生汤	930	74088 桑螵蛸散	935
74003 桑白皮散	925	74046 桑寄生汤	930	74089 桑螵蛸散	935
74004 桑白皮散	925	74047 桑寄生汤	930	74090 桑螵蛸散	935
74005 桑白皮散	925	74048 桑寄生饮	930	74091 桑螵蛸散	935
74006 桑白皮散	925	74049 桑寄生散	930	74092 桑螵蛸散	935
74007 桑白皮散	925	74050 桑寄生散	930	74093 桑木根洗方	935
74008 桑白皮散	926	74051 桑寄生散	931	74094 桑丹杞菊汤	935
74009 桑白皮散	926	74052 桑寄生散	931	74095 桑丹泻白汤	936
74010 桑白皮散	926	74053 桑寄生散	931	74096 桑丹泻白散	936
74011 桑白皮散	926	74054 桑寄生散	931	74097 桑丹清毒饮	936
74012 桑白皮散	926	74055 桑寄生散	931	74098 桑叶掩耳方	936
74013 桑白皮散	926	74056 桑寄生散	931	74099 桑白分解散	936
74014 桑白皮散	926	74057 桑寄生散	932	74100 桑白皮根煎	936
74015 桑白皮散	926	74058 桑寄生散	932	74101 桑白皮涂方	936
74016 桑白皮散	927	74059 桑寄生散	932	74102 桑皮十味煎	936
74017 桑白皮散	927	74060 桑寄生散	932	74103 桑皮杏仁饮	936
74018 桑白皮散	927	74061 桑寄生散	932	74104 桑皮接骨丹	936
74019 桑白皮散	927	74062 桑寄生散	932	74105 桑耳续断散	937
74020 桑白皮散	927	74063 桑椹子散	932	74106 桑耳塞鼻丹	937
74021 桑白皮散	927	74064 桑椹子膏	932	74107 桑耳囊腫方	937
74022 桑白皮散	927	74065 桑椹膏丸	932	74108 桑防白膏汤	937
74023 桑白皮散	927	74066 桑螵蛸丸	932	74109 桑苏桂苓汤	937
74024 桑白皮粥	927	74067 桑螵蛸丸	933	74110 桑杏清肺汤	937
74025 桑白皮煎	928	74068 桑螵蛸丸	933	74111 桑枝虎杖汤	937
74026 桑白皮煎	928	74069 桑螵蛸丸	933	74112 桑枝秦艽汤	937
74027 桑汁涂方	928	74070 桑螵蛸汤	933	74113 桑桔杏仁煎	937

74114	桑根白皮丸	937
74115	桑根白皮汤	937
74116	桑根白皮汤	938
74117	桑根白皮汤	938
74118	桑根白皮汤	938
74119	桑根白皮汤	938
74120	桑根白皮汤	938
74121	桑根白皮汤	938
74122	桑根白皮汤	938
74123	桑根白皮汤	938
74124	桑根白皮汤	938
74125	桑根白皮汤	939
74126	桑根白皮汤	939
74127	桑根白皮汤	939
74128	桑根白皮汤	939
74129	桑根白皮汤	939
74130	桑根白皮汤	939
74131	桑根白皮汤	939
74132	桑根白皮饮	939
74133	桑根白皮饮	939
74134	桑根白皮酒	939
74135	桑根白皮散	939
74136	桑根白皮散	939
74137	桑根白皮散	940
74138	桑根白皮散	940
74139	桑根白皮散	940
74140	桑根白皮散	940
74141	桑根白皮散	940
74142	桑根白皮散	940
74143	桑根白皮散	940
74144	桑根白皮散	941
74145	桑根白皮散	941
74146	桑根白皮散	941
74147	桑根白皮散	941
74148	桑根白皮散	941
74149	桑根白皮散	941
74150	桑根白皮散	941
74151	桑根白皮散	941
74152	桑菊葱豉饮	942
74153	桑菊感冒片	942
74154	桑菊愈风汤	942
74155	桑寄生饮子	942
74156	桑椹河车丸	942

74157	桑白皮八味散	942
74158	桑白皮沐头方	942
74159	桑枝酸枣仁煎	942
74160	桑螵蛸龙骨散	943
74161	桑螵蛸酒调散	943
74162	桑贝芎归清肺汤	943
74163	桑白皮汁十味煎	943
74164	桑根白皮六味丸	943

通

74165	通云散	943
74166	通天散	943
74167	通天散	944
74168	通天散	944
74169	通天散	944
74170	通天膏	944
74171	通中丸	944
74172	通中散	944
74173	通中散	944
74174	通中散	944
74175	通中散	944
74176	通化汤	944
74177	通气丸	945
74178	通气丸	945
74179	通气丸	945
74180	通气丸	945
74181	通气丸	945
74182	通气丸	946
74183	通气丸	946
74184	通气丸	946
74185	通气丸	946
74186	通气丸	946
74187	通气丹	946
74188	通气汤	946
74189	通气汤	946
74190	通气汤	947
74191	通气汤	947
74192	通气汤	947
74193	通气汤	947
74194	通气汤	947

74195	通气汤	947
74196	通气汤	947
74197	通气汤	947
74198	通气饮	947
74199	通气饮	948
74200	通气饮	948
74201	通气散	948
74202	通气散	948
74203	通气散	948
74204	通气散	948
74205	通气散	948
74206	通气散	948
74207	通气散	948
74208	通气散	948
74209	通气散	949
74210	通气散	949
74211	通气散	949
74212	通气散	949
74213	通气散	949
74214	通气散	949
74215	通气散	949
74216	通气散	949
74217	通气散	949
74218	通气散	949
74219	通气散	949
74220	通气散	950
74221	通气膏	950
74222	通火汤	950
74223	通心丸	950
74224	通心汤	950
74225	通心汤	950
74226	通心饮	950
74227	通心饮	951
74228	通心饮	951
74229	通心散	951
74230	通水丹	951
74231	通水散	951
74232	通正散	951
74233	通仙散	951
74234	通玄丹	951
74235	通圣丸	951
74236	通圣丸	951
74237	通圣丸	952

74238 通圣丸	952	74281 通关汤	957	74324 通关散	961
74239 通圣汤	952	74282 通关饮	957	74325 通关散	961
74240 通圣饼	952	74283 通关饮	957	74326 通关散	961
74241 通圣饼	952	74284 通关散	957	74327 通关散	962
74242 通圣饼	952	74285 通关散	957	74328 通关散	962
74243 通圣散	952	74286 通关散	957	74329 通关散	962
74244 通圣散	952	74287 通关散	957	74330 通关散	962
74245 通圣散	952	74288 通关散	957	74331 通关散	962
74246 通圣散	953	74289 通关散	958	74332 通关散	962
74247 通圣散	953	74290 通关散	958	74333 通关散	962
74248 通圣散	953	74291 通关散	958	74334 通关散	962
74249 通圣散	953	74292 通关散	958	74335 通关膏	962
74250 通圣散	953	74293 通关散	958	74336 通导散	962
74251 通圣散	953	74294 通关散	958	74337 通导散	962
74252 通圣散	953	74295 通关散	958	74338 通阳汤	963
74253 通圣散	953	74296 通关散	958	74339 通阳散	963
74254 通圣散	953	74297 通关散	958	74340 通壳丹	963
74255 通圣膏	953	74298 通关散	959	74341 通声丸	963
74256 通圣膏	953	74299 通关散	959	74342 通声丸	963
74257 通皮饮	954	74300 通关散	959	74343 通声煎	963
74258 通耳丸	954	74301 通关散	959	74344 通声膏	963
74259 通耳丹	954	74302 通关散	959	74345 通声膏	963
74260 通耳方	954	74303 通关散	959	74346 通里汤	963
74261 通耳汤	954	74304 通关散	959	74347 通利方	963
74262 通耳法	954	74305 通关散	959	74348 通利散	964
74263 通耳散	954	74306 通关散	959	74349 通利膏	964
74264 通达饮	954	74307 通关散	960	74350 通彻丸	964
74265 通邪煎	954	74308 通关散	960	74351 通肝散	964
74266 通光丸	954	74309 通关散	960	74352 通肝散	964
74267 通光散	954	74310 通关散	960	74353 通肝散	964
74268 通血丸	955	74311 通关散	960	74354 通肝散	964
74269 通血散	955	74312 通关散	960	74355 通肠丸	965
74270 通血散	955	74313 通关散	960	74356 通肠丸	965
74271 通血散	955	74314 通关散	960	74357 通肠丸	965
74272 通血散	955	74315 通关散	960	74358 通肠汤	965
74273 通产散	955	74316 通关散	960	74359 通肠饮	965
74274 通闭方	955	74317 通关散	961	74360 通肠饮	965
74275 通闭汤	955	74318 通关散	961	74361 通肠散	965
74276 通闭散	956	74319 通关散	961	74362 通应散	965
74277 通汗煎	956	74320 通关散	961	74363 通快饮	965
74278 通关丸	956	74321 通关散	961	74364 通快饮	965
74279 通关丸	956	74322 通关散	961	74365 通灵丸	966
74280 通关丸	956	74323 通关散	961	74366 通灵丸	966

74367 通灵丸	966	74410 通齿汤	970	74453 通经丸	976
74368 通灵丸	966	74411 通肾汤	970	74454 通经丸	976
74369 通灵丸	966	74412 通肾散	970	74455 通经丸	976
74370 通灵丹	966	74413 通鸣散	971	74456 通经丸	976
74371 通灵散	966	74414 通明丸	971	74457 通经丸	976
74372 通灵散	966	74415 通明丸	971	74458 通经丸	976
74373 通灵散	966	74416 通明丸	971	74459 通经丸	976
74374 通灵散	967	74417 通明汤	971	74460 通经丸	976
74375 通灵散	967	74418 通明汤	971	74461 通经丸	977
74376 通灵散	967	74419 通明饮	971	74462 通经丸	977
74377 通表散	967	74420 通明散	971	74463 通经汤	977
74378 通苓汤	967	74421 通明散	971	74464 通经汤	977
74379 通苓散	967	74422 通明散	972	74465 通经汤	977
74380 通苓散	967	74423 通明散	972	74466 通经汤	977
74381 通苓散	967	74424 通明散	972	74467 通经饮	977
74382 通苓散	967	74425 通畅饮	972	74468 通经饮	977
74383 通苓散	968	74426 通畅饮	972	74469 通经散	977
74384 通郁汤	968	74427 通和汤	972	74470 通经散	978
74385 通顶烟	968	74428 通乳丹	972	74471 通经散	978
74386 通顶散	968	74429 通乳汤	972	74472 通经散	978
74387 通顶散	968	74430 通乳汤	972	74473 通经散	978
74388 通顶散	968	74431 通乳汤	973	74474 通经散	979
74389 通顶散	968	74432 通乳汤	973	74475 通经散	979
74390 通顶散	968	74433 通乳饮	973	74476 通经散	979
74391 通顶散	968	74434 通乳饮	973	74477 通经散	979
74392 通顶散	968	74435 通乳散	973	74478 通经散	979
74393 通顶散	968	74436 通乳散	973	74479 通经散	979
74394 通顶散	969	74437 通乳散	973	74480 通经膏	979
74395 通顶散	969	74438 通乳煎	973	74481 通草丸	980
74396 通顶散	969	74439 通乳煎	973	74482 通草丸	980
74397 通顶散	969	74440 通命丸	974	74483 通草丸	980
74398 通顶散	969	74441 通命丸	974	74484 通草汤	980
74399 通顶散	969	74442 通命丸	974	74485 通草汤	980
74400 通顶散	969	74443 通命散	974	74486 通草汤	980
74401 通顶散	969	74444 通肺汤	974	74487 通草汤	981
74402 通顶散	969	74445 通泄散	974	74488 通草汤	981
74403 通顶散	969	74446 通经丸	974	74489 通草汤	981
74404 通顶散	969	74447 通经丸	975	74490 通草汤	981
74405 通顶散	970	74448 通经丸	975	74491 通草饮	981
74406 通顶散	970	74449 通经丸	975	74492 通草酒	981
74407 通顶散	970	74450 通经丸	975	74493 通草散	981
74408 通顶散	970	74451 通经丸	975	74494 通草散	981
74409 通顶散	970	74452 通经丸	976	74495 通草散	981

74496 通草散	982	74539 通神丸	987	74582 通神散	993
74497 通草散	982	74540 通神丸	988	74583 通神膏	993
74498 通草散	982	74541 通神丸	988	74584 通神膏	993
74499 通草散	982	74542 通神丸	988	74585 通络丸	993
74500 通草散	982	74543 通神丸	988	74586 通络片	993
74501 通草散	982	74544 通神丸	988	74587 通泰丸	993
74502 通草散	983	74545 通神丹	988	74588 通真丸	993
74503 通草膏	983	74546 通神丹	989	74589 通真丸	994
74504 通草膏	983	74547 通神汤	989	74590 通真丸	994
74505 通草膏	983	74548 通神汤	989	74591 通真丸	994
74506 通胃散	983	74549 通神汤	989	74592 通真散	994
74507 通幽汤	983	74550 通神饼	989	74593 通真散	994
74508 通幽汤	983	74551 通神烟	989	74594 通热汤	994
74509 通幽汤	984	74552 通神散	989	74595 通秘散	994
74510 通幽汤	984	74553 通神散	989	74596 通秘散	994
74511 通幽汤	984	74554 通神散	990	74597 通秘煎	994
74512 通幽汤	984	74555 通神散	990	74598 通脑散	995
74513 通幽汤	984	74556 通神散	990	74599 通脑散	995
74514 通幽汤	984	74557 通神散	990	74600 通脑散	995
74515 通幽汤	984	74558 通神散	990	74601 通流饮	995
74516 通幽散	984	74559 通神散	990	74602 通窍丸	995
74517 通幽散	985	74560 通神散	990	74603 通窍汤	995
74518 通香丸	985	74561 通神散	990	74604 通窍烟	995
74519 通便饮	985	74562 通神散	991	74605 通窍散	995
74520 通便条	985	74563 通神散	991	74606 通窍散	995
74521 通便散	985	74564 通神散	991	74607 通窍散	995
74522 通顺散	985	74565 通神散	991	74608 通理汤	996
74523 通泉饮	985	74566 通神散	991	74609 通淋散	996
74524 通脉汤	985	74567 通神散	991	74610 通淋散	996
74525 通脉汤	986	74568 通神散	991	74611 通淋散	996
74526 通脉散	986	74569 通神散	991	74612 通淋膏	996
74527 通脉散	986	74570 通神散	991	74613 通喉散	996
74528 通音丸	986	74571 通神散	992	74614 通喉散	996
74529 通音散	986	74572 通神散	992	74615 通痢散	996
74530 通音煎	986	74573 通神散	992	74616 通滞汤	996
74531 通涎散	986	74574 通神散	992	74617 通滞散	997
74532 通津丸	986	74575 通神散	992	74618 通滞散	997
74533 通宣丸	987	74576 通神散	992	74619 通滑散	997
74534 通神丸	987	74577 通神散	992	74620 通隘散	997
74535 通神丸	987	74578 通神散	992	74621 通噬散	997
74536 通神丸	987	74579 通神散	992	74622 通微丸	997
74537 通神丸	987	74580 通神散	992	74623 通解散	997
74538 通神丸	987	74581 通神散	992	74624 通解散	997

74625 通解散 997	74668 通天再造散 1002	74711 通阳圣化汤 1008
74626 通解散 997	74669 通天再造散 1003	74712 通阳抑阴煎 1008
74627 通痹丸 997	74670 通天再造散 1003	74713 通阳消毒汤 1008
74628 通痹散 998	74671 通天达地散 1003	74714 通声辛甘煎 1008
74629 通痹散 998	74672 通天达地散 1003	74715 通利运转汤 1008
74630 通瘀饮 998	74673 通天愈风汤 1003	74716 通利定胀汤 1008
74631 通瘀饮 998	74674 通气生姜丸 1003	74717 通利湿气丸 1008
74632 通瘀錠 998	74675 通气防风汤 1003	74718 通肝生乳汤 1009
74633 通瘀煎 998	74676 通气防风汤 1004	74719 通肝收乳汤 1009
74634 通瘀煎 998	74677 通气防风汤 1004	74720 通肠活血汤 1009
74635 通瘀煎 999	74678 通气防风汤 1004	74721 通肠痔漏丸 1009
74636 通溺饮 999	74679 通气防风散 1004	74722 通肠痔漏方 1009
74637 通鼻散 999	74680 通气防风散 1004	74723 通肠解毒汤 1009
74638 通鼻散 999	74681 通气利中丸 1004	74724 通补血络汤 1009
74639 通鼻膏 999	74682 通气辛夷散 1004	74725 通补奇经丸 1010
74640 通膈丸 999	74683 通气阿魏丸 1004	74726 通补肺肾丸 1010
74641 通膈丸 999	74684 通气驱风汤 1004	74727 通补温络汤 1010
74642 通膈丸 999	74685 通气驱风汤 1005	74728 通灵万应丹 1010
74643 通膈丸 999	74686 通气祛风汤 1005	74729 通灵玉粉散 1011
74644 通膈汤 1000	74687 通气散坚丸 1005	74730 通灵黄金膏 1011
74645 通膈汤 1000	74688 通心辰砂丸 1005	74731 通顶石南散 1011
74646 通膈散 1000	74689 通水至奇汤 1005	74732 通顶吹鼻散 1011
74647 通膈散 1000	74690 通仙五宝汤 1005	74733 通顶抽风散 1011
74648 通膈散 1000	74691 通仙五宝散 1005	74734 通顶定命散 1012
74649 通精散 1000	74692 通白四逆汤 1006	74735 通肾祛邪散 1012
74650 通隧丹 1000	74693 通用乌须方 1006	74736 通肾消水汤 1012
74651 通遵散 1000	74694 通用痛风丸 1006	74737 通明利气丸 1012
74652 通壅汤 1000	74695 通玄二八丹 1006	74738 通明利气汤 1012
74653 通天饮子 1001	74696 通玄千金丹 1006	74739 通明补肾丸 1012
74654 通气饮子 1001	74697 通玄消肾散 1007	74740 通明补肾丸 1012
74655 通气啞汤 1001	74698 通圣五宝丹 1007	74741 通乳四物汤 1012
74656 通圣饼子 1001	74699 通圣双行汤 1007	74742 通乳四物汤 1013
74657 通耳神丹 1001	74700 通圣双解散 1007	74743 通乳活血汤 1013
74658 通闭饮子 1001	74701 通圣消毒散 1007	74744 通乳消肿汤 1013
74659 通灵玉粉 1001	74702 通耳红棉散 1007	74745 通乳涌泉散 1013
74660 通明赤丸 1002	74703 通邪表毒汤 1007	74746 通乳散结汤 1013
74661 通经奇方 1002	74704 通关止血丸 1007	74747 通乳瓢蓄饮 1013
74662 通经秘方 1002	74705 通关导滞散 1007	74748 通变黑锡丹 1013
74663 通草饮子 1002	74706 通关利窍散 1007	74749 通府保精丸 1014
74664 通草饮子 1002	74707 通关育金散 1007	74750 通治三消丸 1014
74665 通塞脉片 1002	74708 通关神应散 1008	74751 通治还少丹 1014
74666 通元二八丹 1002	74709 通关滋肾丸 1008	74752 通治实火膏 1014
74667 通天再造丹 1002	74710 通关瞿麦汤 1008	74753 通治荆芥散 1014

74754 通治瘰癧方	1014	74791 通宣理肺膏	1021	74823 通脉泻热泽泻散	1026
74755 通治蟾酥丸	1014	74792 通神三灵丸	1021	74824 通津救命至灵丹	1026
74756 通经下取方	1014	74793 通神补血丸	1021	74825 通真延龄种子丹	1027
74757 通经止痛汤	1015	74794 通神乳香膏	1021	74826 通变白虎加人参汤	1027
74758 通经六合汤	1015	74795 通神保明丹	1021	74827 通脉四逆加芍药汤	1027
74759 通经六合汤	1015	74796 通络利湿汤	1021	74828 通脉四逆加猪胆汁汤	1027
74760 通经甘露丸	1015	74797 通络活血方	1021	透	
74761 通经甘露丸	1015	74798 通络益气丹	1022	74829 透巡酒	1028
74762 通经甘露丸	1015	74799 通络排石汤	1022	74830 透巡散	1028
74763 通经四物汤	1015	74800 通真延龄丹	1022	驱	
74764 通经四物汤	1016	74801 通真煨姜丸	1022	74831 驱龙珠	1028
74765 通经导滞汤	1016	74802 通脑丁香散	1023	74832 驱龙散	1028
74766 通经利窍汤	1016	74803 通润四物汤	1023	74833 驱珠散	1028
74767 通经妙灵丸	1016	74804 通窍明目汤	1023	验	
74768 通经活络丹	1017	74805 通窍活血汤	1023	74834 验胎法	1028
74769 通经活络汤	1017	74806 通窍排脓汤	1024	74835 验胎散	1028
74770 通经逐瘀汤	1017	74807 通淋琥珀丸	1024	74836 验方千捶膏	1029
74771 通经逐瘀汤	1017	74808 通脾泻胃汤	1024	骏	
74772 通经透关散	1017	74809 通脾泻胃汤	1025	74837 骏马散	1029
74773 通经益母丸	1018	74810 通脾泻胃汤	1025	绿	
74774 通经调气汤	1018	74811 通隔莽苈汤	1025	74838 绿云散	1029
74775 通草猪蹄羹	1018	74812 通隔莽苈散	1025	绣	
74776 通草橘皮汤	1018	74813 通隘不二散	1025	74839 绣球丸	1029
74777 通幽化浊汤	1018	74814 通用青金锭子	1025	74840 绣球丸	1029
74778 通幽润燥丸	1018	74815 通变大柴胡汤	1025		
74779 通幽润燥汤	1018	74816 通变白头翁汤	1026		
74780 通脉化痰饮	1018	74817 通噎消食膏酒	1026		
74781 通脉四逆汤	1018	74818 通关匀气托里散	1026		
74782 通脉四逆汤	1019	74819 通经活血止痛散	1026		
74783 通脉四逆汤	1020	74820 通脉四逆加减汤	1026		
74784 通脉四逆汤	1020	74821 通脉加减四逆汤	1026		
74785 通脉四逆汤	1020	74822 通脉泻热泽泻汤	1026		
74786 通脉四逆汤	1020				
74787 通脉回厥煎	1020				
74788 通宣理肺丸	1020				
74789 通宣理肺丸	1020				
74790 通宣理肺丸	1021				

检 字

十 画

【一】

艳	1
珠	1
顽	7
耘	8
素	8
蚕	8
桑	12
泰	36
盞	36
桂	37
桔	115
彬	133
桓	133
桐	133
栝	133
桦	150
格	151
桃	151
核	199
酌	199
都	199
真	200
索	220
袁	221
壶	221
荅	221
拳	221
莽	222
菜	226
莲	228
莫	233

蒔	233
莨	233
莪	234
荷	235
荃	237
菱	237
莎	237
茺	238
莼	240
莹	240
盐	241
霄	245
晋	249
恶	249
栗	250
贾	251
速	251
赶	252
起	252
殊	258
顾	259
砥	260
破	260
贾	273
夏	273
原	276
逐	276
振	286
捕	287
捍	287
捏	288
捉	288
损	288
挫	289

换	290
挽	295
捣	295
挨	296
顿	296
致	296
热	297

【二】

鸬	298
柴	298
紧	383
党	384
道	384
啐	390
哽	391
哈	391
唤	391
眩	392
眠	392
鸭	392
蚌	393
蜆	393
蚣	394
蚊	394
蛎	394
罢	394
恩	395
哭	395
圃	395
圆	395

【三】

特	397
---	-----

钱 397
 钻 397
 铁 397
 铃 420
 铅 420
 牀 429
 秤 429
 积 430
 称 432
 秘 432
 故 486
 舐 486
 笔 486
 笑 486
 笋 486
 飢 486
 造 487
 透 488
 乘 501
 借 501
 倚 501
 倒 502
 倍 503
 健 505
 蛆 523
 射 523
 臭 534
 息 536
 徒 537
 徐 537
 飲 538
 豹 539
 釜 539
 脊 539
 饿 539
 狸 539
 狼 540
 胰 544
 脛 545
 胭 545
 脰 546
 脂 546
 胸 547

脏 548
 脐 550
 胶 551
 脑 556
 腋 557
 鸱 557
 鸬 558
 皱 559
 留 559
 逢 559

【、】

效 560
 高 560
 离 566
 袞 568
 唐 568
 疖 568
 疔 571
 痈 571
 疰 571
 痲 571
 悻 572
 悦 572
 阍 572
 烧 572
 烟 579
 烙 579
 凌 580
 淮 581
 凉 582
 酒 601
 消 608
 泡 706
 海 706
 涂 726
 浴 728
 浮 729
 涣 733
 涤 733
 流 738
 润 742

浣 761
 浸 761
 涩 763
 涌 764
 浚 767
 穀 768
 瓶 768
 粉 769
 料 774
 益 774
 兼 815
 宽 816
 家 825
 浆 838
 瓷 838
 资 839
 烫 841
 羞 843
 诸 843
 读 846
 调 847
 朗 903
 扇 903

【一】

弱 903
 展 903
 陵 904
 陷 904
 娛 906
 难 906
 预 906
 能 908
 桑 908
 通 943
 遄 1028
 驢 1028
 驗 1028
 駿 1029
 綵 1029
 綉 1029

十 画

艳

66424 艳容膏

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】白芷 甘菊花(去梗)各三钱 白果二十个 红枣十五个 珠儿粉五钱 猪胰一个

【用法】上将珠粉研细,余俱捣烂,拌匀,外以酒酿炖化,入前药蒸过。每晚搽面,清晨洗去。

【主治】雀斑。

珠

66425 珠云散

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】云母粉 真珠粉 败龟版(煅白) 乳香 寒水石 象牙末 坏子粉

【用法】上为细末,外用。

【功用】生肉。

【主治】诸风破烂,及面、手足污疮。

66426 珠母散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】陈蚌壳(煅) 儿茶 轻粉 飞滑石 人中白(煅)各二钱 煅龙骨 枯矾各一钱 冰片三分

【用法】上为末。先以鸡肝或猪肝切作长条,煮熟,插入阴户,过一夜,次早取出,如此二三次,痒减虫净,然后用麻油调搽。

【主治】妇人阴痒,甚者令人发热如劳。

66427 珠龟丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】龟甲(酒炙)四两 石决明(童便煅)二两 朱砂 甘草各四钱

【用法】上为细末。用土茯苓四两,煎汤泛丸,如梧桐子大。每服二钱,空心土茯苓汤送下。

【主治】梅疮结毒,疮形腐烂,筋骨疼痛,遍体发疮。

66428 珠泥膏

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】真麻油四两 定粉 黄蜡各二两 琥珀五分 珍珠一钱 冰片三分 乳香(去油) 没药(去油)各五分

【用法】上将香油入锅内沸之,再下蜡化开,冲入定粉,搅匀,拿下火,待温再入众药,搅匀入水中,拔去火毒。

【主治】顽疮、诸疮不收口。

66429 珠宝丹

《青囊秘传》。为《金鉴》卷七十二“九一丹”之异名。见该条。

66430 珠宝散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】珍珠三分 西黄一分 铅粉五分 密陀僧一钱 熟石膏一钱 冰片一分 大黄三钱 寒水石三钱 人中黄三分

【用法】上为极细末。用鸡子清调敷,如湿烂无皮者,干掺。

【主治】火烫灼伤,腐烂不堪者。

66431 珠参散

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】真珠 人参各等分

【用法】上为末。人参汤送下,或莲肉汤亦可。

【主治】真阴不足,阴涸内热,内障青盲。

66432 琥珀丸

【方源】《明医指掌》卷十。

【组成】牛黄一钱 天竺黄 琥珀各五钱 雄黄四钱 冰片二分半 胆星二两 青礞石(消煅如金色者)一两 细珠子一钱五分(一方有枳壳,微炒,一两,生黄芩二两)

【用法】上药各为极细末,炼蜜为丸,重一钱二分,朱砂、金箔为衣。薄荷、灯心汤送

下。

【主治】惊风痰涎，热嗽不出声，上下不能升降。

66433 琥珀丹

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】琥珀末 朱砂各五分 雄黄一钱半 轻粉一钱

【用法】上为细末，炼蜜为二十七丸，每服三丸，好酒送下，每早、中、晚各一次，三日服完。如毒深，再服一料，永远除根。

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛，腐烂臭败。

66434 琥珀膏

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】真西珀（研）一两 上桂心五钱（研） 辰砂（水飞，净）五钱 香白芷一两（生，研） 防风（生，晒脆，研，取净末）一两 当归（生，晒脆，研净末）一两 广木香（生，晒）五钱 丁香五钱（二味同研，丁香之油掺入木香则易研易细，俱生用） 木通一两（生，晒脆，研净末。此味质最坚，须加重份量，研细，筛取极细者，如数用，防风亦如此）

上九味，各为极细末，调和一处，贮瓶听用。

木鳖子一两（去毛，切厚片，熬黑，去滓，用油） 嫩松香（清水煮四五次，晒干，筛细）五钱 纬丹十一两（水飞四五次，晒干或焙干用，如至冬令，只可用十两，多则太老）

【用法】上用芝麻油三十二斤，入铜锅内，先下番木鳖子一味，用炭火熬黑，用绵滤滓净尽，再熬，不必过老，俟其滴水将欲成珠之际，即下纬丹、松香二味，徐徐挑下，随下随搅，不得停手，下完后略熬片刻，即离火，待锅内火气少杀，将前九味细末，一人徐徐面下，一人随下随搅，必须搅和，旁用扇扇，看其膏将凝厚之象，即倾入冷水内，捞起捏成饼子。摊膏，用小瓦钵一个，以药饼入内，隔水炖烊，切不可经火。纸用油泾县

桑皮纸，封糊摊贴。

【主治】颈项瘰癧，及腋下初结小核，渐如连珠不消，不溃或溃而经久不愈，或成漏症，寒痰冷症。

【宜忌】用其冷水，宜贮瓦器，勿用木器。

66435 珠荃散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】真芦荟五分 龙脑薄荷叶五分 珍珠四分（研至无声） 真青黛三分 官硼砂二分 大冰片五厘 儿茶五分

【用法】上为极细末，瓷瓶贮好，以蜡塞口，勿令泄气。临用吹患处。

【主治】小儿五疳积，发热，牙疳并花后牙疳。

66436 珠香散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】煅研珍珠一钱五分 当门子五分 琥珀粉五钱 滴乳香一两

【用法】薄撒患处。

【功用】养血润肤，生肌固皮。

【主治】一切清洁疮面，及烧、烫伤，上皮生长迟缓。

【宜忌】撒布疮面后，往往很快结痂，切勿清除其痂皮，以防影响上皮生长。

66437 珠粉丸

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】珠粉一两（研） 犀角屑一两 朱砂半两（细研） 甘草二两（锉，生用） 苦参一两（锉） 川朴消一两（细研）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以人参汤送下，不拘时候。

【主治】时气热毒，心神烦躁，狂乱欲走。

66438 珠粉丸

【方源】《医家四要》卷三引《金鉴》。

【组成】椿根皮 黑姜 蛤粉 黄柏 滑石 神曲 青黛

【主治】湿热所致的赤白浊带下。

66439 珠粉散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】枯白矾一两 干胭脂一钱半 轻粉半钱 麝香少许

【用法】上为末。油调，搽口疮，或干贴。

【主治】口舌恶疮，及牙疳蚀。

66440 珠粉散

【方源】《古今医鉴》卷十五引翟散官方。

【组成】轻粉一钱 珍珠二分 天竺黄六分

【用法】上为细末。将疮用槐条煎汤洗净后搽药。即愈。

【主治】杨梅疮。

66441 珠粉散

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】真珠母（即大石蚌） 炉甘石三两 石膏三两 陈年蚕丝茧一两 赤石脂三两 血竭三钱 粉口儿茶一两

【用法】搽疮上。

【功用】生肌长肉。

【主治】疮毒脓腐已尽者。

【备考】方中真珠母用量原缺。

66442 珠黄粉

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】珍珠粉一两 牛黄一两 琥珀一两五钱 石决明（煨）一两五钱 龙齿（煨）一两五钱 朱砂八钱 滑石一两五钱

【用法】上为细末，瓶装，重四分。成人每服四分，小儿每服二分或一分，温开水冲下。

【功用】清热镇惊。

【主治】痢，里热痰盛神昏，谵语狂言；小儿急热惊风。

66443 珠黄散

【方源】《中国医学大辞典》引《局方》。

【组成】珍珠（豆腐制）三钱 西黄一钱

【用法】上为极细末，无声为度，密贮勿泄气。每用少许吹入患处。

【功用】①《中国医学大辞典》引《局方》：化毒去腐，清热生肌。②《饲鹤亭集方》：平疳化痰，清咽利膈，止痛。

【主治】①《中国医学大辞典》引《局方》：

咽喉肿痛腐烂，牙疳口疳，梅毒上攻，蒂丁腐去，小儿痘瘡后余毒未消，口舌破碎。②《医级》：风痰火毒，喉痹，及小儿痰搐惊风。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（天津方）：忌烟、酒及辛辣食物。

【备考】《医级》本方用法：小儿痰搐，以灯心调服二三分。

66444 珠黄散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】西牛黄五分 冰片五钱 真珠六钱 煨石膏五两

【用法】上为极细末，盛瓷瓶内，勿令泄气。用时吹入。

【主治】口疳，喉痛。

66445 珠黄散

【方源】《温证指归》卷三。

【组成】珍珠二分 牛黄二分 川贝六分 辰砂二分

【主治】小儿突然惊搐不醒，少定又惊，或一连数十次者，舌干、舌赤，舌黑，头重不立者。

66446 珠黄散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】西黄一分 大朱砂一钱 珍珠三分 上滴乳石一钱 月石一分五厘 寸香三分 雄精一钱 儿茶一钱 大梅片二分 人中白（煨）一钱五分

【用法】先将珠研极细，后入余药，俱研极细，瓷瓶收贮，勿令泄气。

【主治】烂喉疳，肿腐，汤水难入者；并近年烂喉结毒，腐去蒂丁；及幼孩口疳、口糜。

66447 珠黄散

【方源】《疡科捷径》卷下。

【组成】濂珠三分 犀角二分 人中黄一钱

【用法】上为末。每服三分，灯心汤调下。

【主治】胎中积热所致的小儿脐突。

66448 珠黄散

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】珍珠 犀牛黄各一分 青鱼胆一

钱(真者,阴干) 大冰片 麝香各一分

【用法】上为细末,不可泄气。吹之。

【主治】咽喉十八症。

66449 珠黄散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】西黄 灯心灰各五厘 象牙屑(焙) 真珠(豆腐煮过)各二分 人指甲(男用女,女用男)一分 大梅片三厘 薄荷叶 人中白 人中黄 硼砂各一分 青黛(飞净)三分 壁钱三十个(竹叶夹,炙存性)

【用法】上为细末,吹患处。

【主治】烂喉痧及喉痹、喉肿。

66450 珠黄散

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】西黄五分 濂珠四分 黄连 硼砂各七分 朱砂三分 冰片 麝香各一分 西洋参一钱 儿茶 腰黄各八分

【用法】上为细末。每服一二分,银花汤下。

【主治】天痘出后,尚有余毒者。

66451 珠黄散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄三两 牵牛(炒)二两(共研为细粉,过罗,每五两细粉兑) 牛黄一钱六分 朱砂三两 麝香四分 珍珠(粉)五分

【用法】上为细散,混和均匀,瓶装,重四分。每服二分,温开水送下。三岁以下小儿酌减。

【功用】清热安神,导滞。

【主治】小儿热盛,停食停乳,大便干燥,惊风抽搐。

66452 珠黄散

【方源】《中医眼科学》。

【组成】珍珠粉 2.1 克 犀黄 3 克 朱砂 2.1 克 麝香 2.1 克

【用法】上为细末,瓷瓶收贮。应用时点于内眦。

【主治】火疳,白膜侵睛。

66453 珠蛤散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】熟石膏 62 克 煅蛤粉 31 克 黄柏 15 克 冰片

【用法】上为细末,麻油调敷。

【主治】湿疹、皮炎、烧伤、溃疡。

【备考】方中冰片用量原缺。

66454 珠窝散

【方源】《医级》卷八。

【组成】大蚌一二个(用文武火一盆,上架铁楞,置蚌煨之) 冰片(每散一两,加片三分)

【用法】上为末,研匀。湿烂者,用筛筛上,自然收燥。如湿再加,不可剥去,燥则用麻油调涂,痂落自愈。如治恶疮,亦用麻油调搽。

【主治】汤泡火烧溃烂,并下部恶疮。

66455 珠子辰砂丹

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】山药 人参 远志 防风 紫石英 茯神 虎骨 虎睛 龙齿 五味子 石菖蒲 丹参 细辛各二钱半 真珠末四分 辰砂二钱(研,为衣)

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服三五十丸,煎金银汤送下,一日三次。

【主治】风痫久不愈。

【宜忌】忌鱼、肉、湿面,动风之物。

66456 珠玉二宝粥

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药二两 生薏米二两 柿霜饼八钱

【用法】上先将山药、薏米捣成粗渣,煮至烂熟,再将柿霜饼切碎,调入融化,随意服之。

【功用】补肺健脾养胃。

【主治】脾肺阴分亏损,饮食懒进,虚热劳嗽,并一切阴虚之证。

【方论选录】山药、薏米皆清补脾肺之药,

然单用山药，久则失于粘腻；单用薏米，久则失于淡渗；唯等分并用，乃可久服无弊。又用柿霜之凉可润肺，甘能归脾者，以为之佐使。病人服之不但痼病，并可充饥，不但充饥，更可适口，用之对证，病自渐愈。即不对证，亦无他患，诚为至稳善之方也。

【临证举例】劳嗽 一少年因感冒懒于饮食，犹勤稼穡，枵腹力作，遂成劳嗽，过午发热，彻夜咳吐痰涎。医者因其年少，多用滋阴补肾之药，间有少加参、耆者，调治二月不效，饮食减少，痰涎转增，渐至不起，脉虚数兼有弦象，知其肺脾皆有伤损也，授以此方，俾一日两次服之，半月痊愈。

66457 珠母补益方

【方源】《临症见解》。

【组成】珍珠母二两 龙骨一两 酸枣仁三钱 五味子二钱 女贞子五钱 熟地五钱 白芍四钱

【功用】育阴潜阳，养血宁神，益肾固精。

【主治】心肝肾虚损诸证。失眠证，阴虚阳亢的高血压，阴虚火旺头痛证，癫痫病，诸痛证，癭瘤病，瘰癧病，肝虚血少的肝炎病，盗汗证，肾虚证。

66458 珠珀如意散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】甘石二钱五分 赤石脂 大黄 甘草 扫盆 白蜡各二钱 粉龙骨 石膏 没药 乳香 白芷 青黛各一钱五分 鳖甲 地丁 草炭 僵蚕 琥珀各三钱 赤小豆四钱

【用法】上为细末，每药一两，加西黄六厘，梅片一分，麝香五厘，贮瓷瓶内，勿泄气。外用掺之。

【主治】下疳肿痛。

66459 珠珀保婴丹

【方源】《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。

【异名】保婴丹

【组成】东牛黄五分 天竺黄二钱五分

山参一钱 礞石二钱 东珍珠 明雄黄 油桂各一钱 半夏二钱 台麝五分 犀牛角 粉草各二钱 南星一钱 梅片五分 川贝母二钱五分(去心) 前胡二钱 川羌二钱五分 血琥珀三钱 僵蚕一钱 防风二钱 蜈蚣二条 辰砂三钱 全蝎四个 天麻二钱五分 纹军三钱

【用法】牛黄、珍珠、麝香、辰砂、琥珀均各另研，余药碾为细面，一处调匀。周岁小儿每服一分，二岁至五岁每服二分，六岁至八岁每服三分，灯心、竹叶、薄荷、鲜姜为引。

【功用】清火定风。

【主治】小儿急惊风症，痰火内蕴，外感风邪，卒然暴惊，壮热抖战，角弓反张，痰壅气塞，四肢搐搦，口眼喎斜，面青口噤。

【宜忌】忌食辛辣、生冷、油腻等物，乳母亦忌。

66460 珠珀益元散

【方源】《摄生秘剖》卷二。

【组成】白滑石(水飞)六两 甘草(大者，研极细)一两 朱砂(透明者，研，水飞)二钱 琥珀(真正者，研极细)三钱

【用法】上各制净，称准分两，配合和匀，收贮。每服三钱，凉水调下，或蜜水，或灯心汤俱佳。

【主治】男、妇、小儿六腑实热，上焦烦渴，心胸闷乱，精神恍惚，口舌干燥，便秘，赤色，及中暑。

【方论选录】滑石性寒而淡，寒则能清六腑，淡则能利膀胱；甘草性平而甘，平则能缓火势，甘则能调中气；朱砂之重，可以镇心，亦可以坠火；琥珀之明，可以安神，亦可以利水，故并用之。经曰：治温以清凉而行之。故用凉水、蜜水、灯心汤，是散易简而敏捷，火证、暑证，用之神良。但于老弱、阴虚之人，宜少与也，此虚实之辨，明者详之，否则踏虚虚之戒，恶乎不慎。

66461 珠珀救苦散

【方源】《天花精言》卷六。

【组成】石首鱼枕骨一钱（未经盐渍，鲜黄花鱼脑内白石二块，置水内煮一炷香，研为极细末）京剥牛黄五分 大珍珠五分（将珠下于豆腐内，将豆腐悬于净砂锅内，水煮一炷香，研为极细末）孩儿茶五分 黄柏末三分 大梅花冰片三分 真青黛五分 象皮五分（烧煨存性）好硼砂三分 琥珀末五分

【用法】上为极细末。先用小米泔水将疮漱洗干净，然后敷药，内则服清火散毒之剂，以解其毒，或服泻黄纳谷散，或服赛金化毒散。

【主治】走马牙疳。

66462 珠黄十宝丹

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】滴乳石（人乳煨）真琥珀 乳香（去油）没药（去油）辰砂（水飞）山茨菇各三钱 败龟版（炙）雄黄各四钱 犀角 珍珠各一钱 真正人中黄五钱 当门子五分（各取净末，称准）

【用法】上为极细末，山药打糊为丸，如梧桐子，辰砂为衣。分一月服完即愈，甚者再服一料必愈。

【主治】一切广疮，杨梅结毒，下疳溃烂，小儿胎毒。

66463 珠黄八宝丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】珠粉五分 西牛黄一分五厘 琥珀一钱五分 冰片三分 龙骨三钱 制甘石二钱 黄连五分 煅赤石脂二钱

【用法】各取净末，和匀，再研至极细为度，约成粉九钱五分。将药粉掺患处，用白玉膏盖贴。

【功用】生肌收口。

【主治】溃瘍瘰癧，久不收口。

66464 珠黄夺命散

【方源】《卫生鸿宝》卷四引徐澹安方。

【组成】廉珠四分 西黄三分 川连（炒）冰片各五分 陈胆星七分 硼砂 人中白

橄欖核（煨灰） 蝉退各一钱 人中黄 山豆根 滑石 玄明粉 儿茶各一钱半 青黛二钱 大力子 土贝 僵蚕（制）各三钱 青鱼胆（干者）二个 天名精（即土牛膝，俗名臭花娘，用叶、根、梗洗净，风干研末）

【用法】上为细末。锡盒收贮。

【主治】烂喉丹痧。

66465 珠黄吹喉散

【方源】《中国药典》一部。

【组成】珍珠 50 克 牛黄 30 克 硼砂（炒）250 克 西瓜霜 80 克 雄黄 40 克 儿茶 100 克 黄连 100 克 黄柏 150 克 冰片 50 克

【用法】以上九味，除牛黄、冰片、西瓜霜外，珍珠、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉，其余硼砂等四味粉碎成细粉，将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀即得。外用适量，吹于患处，一日三至五次。

【功用】解毒化腐。

【主治】咽喉、口舌肿痛糜烂。

66466 珠黄宝生丹

《全国中药成药处方集》（北京方）。即《北京市中药成方选集》“珠黄保生丹”见该条。

66467 珠黄保生丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】僵蚕（炒）四两 防风四两 花粉四两 钩藤四两 天麻四两 竺黄四两 玄参（去芦）四两 黄芩四两 栀子（炒）四两 桔梗四两 胆星一两五钱 生石膏一两五钱 羌活一两五钱 薄荷一两五钱 牙皂一两 全蝎五钱 甘草四两（前诸药共为细末，每五十一两五钱细末兑）朱砂一两 冰片一两 羚羊粉一两 犀角粉五钱 牛黄五钱 珍珠（豆腐炙）三钱 麝香三钱（共研细末）

【用法】上药混合均匀，炼蜜为丸，重五分，金衣三十六片，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次，周岁小儿酌减。

【功用】清热退烧，祛风化痰。

【主治】小儿内热火盛，头痛身烧，咳嗽痰喘，惊风抽搐。

【备考】本方方名，《全国中药成药处方集》（北京方）引作“珠黄宝生丹”。

66468 珠黄消疳散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】花粉 青黛 黄连 生硼砂 青叶 薄荷叶 甘草各一两 儿茶二两 牛黄二钱 珍珠一钱 冰片五钱

【用法】上为细末，二分重装瓶。将此散涂擦患处，一日数次。

【功用】清热解毒。

【主治】咽喉肿痛，口臭牙疳，齿龈溃烂，牙缝出血。

【宜忌】忌烟、酒、辛辣食物。

66469 珠黄琥珀丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】珍珠粉一钱五分 天竺黄五钱 腰黄三钱 犀黄八分 西琥珀七钱 生甘草 枳壳 朱砂（飞） 胆星 硼砂 白茯苓各一两 山药二两 全虫六钱 麝香五分 沉香五钱

【用法】生晒，研末，炼蜜为丸，每重五分，朱砂、金箔为衣，蜡壳封固。每服一丸，薄荷汤化下；小儿，金银花汤送下。

【主治】风痰癫痫，小儿牙关紧闭，痰嗽上壅，气喘甚急，及急惊胎痫、脐风。

66470 珠黄紫香丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】真珠 牛黄 乳香（炙） 没药（炙） 飞辰砂 蓬砂 葶苈（炒） 雄黄各一钱 血竭 沉香 冰片各五分 熊胆 麝香各三分

【用法】上为极细末，人乳为丸，每重一分，银箔为衣服。

【功用】护心止痛，消毒化脓。

【主治】内外一切痈疽疔毒。

66471 琥珀滋阴淋浊丸

【方源】《药奁启秘》。

【组成】珍珠粉一分 琥珀四钱 茯神五钱 龟版胶五钱 黄柏一两 淮山药五钱 猪脊髓六条

【用法】上为细末，打为丸。每服三钱。

【主治】小便淋浊，溺时刺痛，及肾虚淋浊者。

66472 珠黄琥珀抱龙丸

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】牛黄 珍珠 甘草各五钱 琥珀一两 天竺黄 防风各一两二钱 天麻 茯神 川羌 川贝 白附子 蝉退 胆星 桔梗各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三分，朱砂为衣。周岁小儿，每服一丸，白开水送下，一日二次。

【功用】镇惊安神。

【主治】急热惊风，痰涎抽搐。

顽

66473 顽荆散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】顽荆叶 全蝎（去毒，炒） 踯躅花 川芎各一分 香白芷 细辛（去叶土） 鹅不食草各半钱 薄荷叶四钱 郁金二钱（以上九味，同为细末） 雄黄（别研） 没药（别研） 乳香（别研） 各半钱 盆消四钱（别研） 脑子一字（别研）

【用法】上为细末，入研者药令匀。每用少许，含水搐鼻中。

【主治】一切眼疾。

66474 顽癣丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】浮萍 苍术 苍耳各一两 苦参一两半 黄芩五钱 香附二钱半

【用法】上为末，酒糊为丸。白汤送下。

【主治】顽癣。

66475 顽癣方

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川槿皮二钱 轻粉五分 斑蝥七

个 大枫子七个

【用法】河、井水共一钟，煎一半，露一宿。笔蘸涂之。

【主治】顽癣。

66476 顽癣方

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】羊蹄根 枯白矾

【用法】捣汁，入米醋少许调。搽之。一二次效。

【主治】白壳疮，即顽癣。

66477 顽癣必效方

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川槿皮四两 轻粉 雄黄各四钱 百药煎四饼 斑蝥（全用）一钱 巴豆（去油）一钱五分 大黄二两 海桐皮二两

【用法】上为极细末，用阴阳水调。抓损敷药。必待自落。

【主治】多年顽癣，诸药熏、擦、搽洗不效者。

66478 顽癣浮萍丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】紫背浮萍 苍术 苍耳草各二两 苦参四两 黄芩 僵蚕各一两 钩藤一两五钱 稀苳草二两（酒蒸）

【用法】上为末，酒糊为丸。每服二钱，白滚汤送下。随病上下服。

【主治】顽癣。

耘

66479 耘苗丹

《元和纪用经》引元珠先生方。本方中有上丹、中丹、小丹。各详专条。

素

66480 素丹

《魏氏家藏方》卷二。为原书同卷“三白丸”之异名。见该条。

66481 素雪丹

【方源】《治疫全书》卷五。

【组成】浮萍三钱 石膏三钱（研） 麦冬

二钱（去心） 元参二钱 葛根二钱 丹皮二钱（酒洗） 白芍一钱 生姜三钱 甘草一钱

【用法】流水三杯，加粳米一撮，煎大半杯，去滓热服。覆衣取少汗。

【主治】阳明身热，目痛鼻干，不卧，胸烦口渴。

【加减】呕者，加制半夏二钱。

蚕

66482 蚕子酒

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】蚕子不拘多少

【用法】将刀子子纸上量事，刮取约一钱匕，细研，酒三合至五合调服。如人行里许，更一服。

【主治】被打伤损，因疮中风。

66483 蚕号散

【方源】《婴童百问》卷一。

【组成】僵蚕四个（去嘴，略炒） 茯苓少许

【用法】上为末。蜜调，抹儿口内。

【主治】撮口，初生小儿七日不食乳。

66484 蚕矢汤

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】晚蚕沙三钱 木瓜三钱 生薏仁四钱 大豆黄卷四钱 川连二钱 醋炒半夏一钱 酒炒黄芩一钱 通草一钱 吴茱萸（炒）六分 炒山栀二钱

【用法】上以阴阳水煎，稍凉，徐徐服之。

【主治】霍乱吐利，转筋，肢痛，口渴烦躁，危急之症。

66485 蚕灰散

《圣济总录》卷九十五。为《博济》卷三“犀灰散”之异名。见该条。

66486 蚕灰散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】蚕纸灰 茶笼内箬叶（烧灰）各二两

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒下。

【主治】妇人崩中漏下。

66487 蚕灰散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】蚕子灰二钱 人中白一钱 麝香少许

【用法】上为细末。贴牙龈上，日三遍为妙，涎出吐了。

【主治】温疳齿。

66488 蚕蚕散

【方源】方出《千金》卷十一，名见《马培之医集》。

【组成】故败篦子一枚 故败梳一枚

【用法】上二物各破为二份，各取一份烧为末，又取一份以水五升，煮取一升，以服前烧末，顿服，斯须出矣。

【主治】山野人有啮虱，在腹生长为虱癥。

【方论选录】《千金方衍义》：败梳、篦烧，治虱癥。虽曰取义，亦取宿秽垢，以逐宿蕴之积。

66489 蚕沙汤

【方源】《秘传眼科龙木论》。

【组成】蚕沙四两（炒） 巴戟（去皮） 川楝肉 马蔺花各二两（去梗）

【用法】上为细末，每服二钱，无灰酒调下，不拘时候。

【主治】迎风有泪。

66490 蚕沙饮

《验方新编》卷九。为《内经拾遗》卷一“蚕沙酒”之异名。见该条。

66491 蚕沙饮

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蚕沙（布包）31克 重楼 15克 丹参 31克 白鲜皮 9克 地肤子 6克 蝉蜕 6克

【用法】水煎服，早、晚各服一次。

【主治】虚热型荨麻疹。疹色淡红，稀疏分布，日晒潮热，多在夜间发生，舌质红，苔薄，脉弦。

66492 蚕沙酒

【方源】《内经拾遗》卷一。

【异名】蚕沙饮（《验方新编》卷九）。

【组成】蚕沙四两（炒半黄色） 无灰酒一壶

【用法】上重汤煮熟，去沙。温饮一盞。即通。

【主治】①《内经拾遗》：月经久闭。②《本草纲目》：风缓顽痹，诸节不随，腹内宿痛。

66493 蚕沙散

【方源】《医方类聚》卷九十三引《瑞竹堂方》。

【组成】晚蚕沙不拘多少

【用法】上为细末，用滚沸汤泡过，滤净，取清水服之。立止。

【主治】男子、妇人心气痛不可忍者。

66494 蚕沙散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】蚕沙一钱 防己一钱 独活 杜仲 枸杞 防风 槟榔 半夏 羌活 秦艽 当归 川芎各一钱半 甘草一钱

【用法】生姜为引。

【主治】酒伤经络，筋软，周身不仁。

66495 蚕沙膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】原蚕沙二升（炒，研） 麦麸三升

【用法】上和匀，米醋四升煮稠，瓷器盛。量损处多少涂敷，以绢帛裹之，一日二次。

【主治】伤折，恶血不散。

66496 蚕纸丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】晚蚕蛾 蝉蜕 菊花 羌活 谷精草 甘草各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三十丸，茶送下。

【主治】左右目互相赤红。

66497 蚕矾散

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】出蛾儿蚕茧 细矾

【用法】上用出蛾儿蚕茧装细矾，炭火上烧沸，候过，将茧并矾研细。香油调敷。

【主治】脚裂。

66498 蚕茧汤

《朱氏集验方》卷二。为《直指》卷十七“茧丝汤”之异名。见该条。

66499 蚕茧散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】蚕茧三个 白术 信石各一钱

【用法】俱火煨，为末。掺烂肉上，三日。其核即下。

【主治】瘰癧已破。

66500 蚕茧散

《医钞类编》卷十九。为《小儿痘疹方论》“绵茧散”之异名。见该条。

66501 蚕茧散

【方源】《续刻经验集痘疹选要》。

【组成】出蛾蚕茧 枯矾 滑石 黄柏 胡粉 龙骨（煨）各等分

【用法】上为末。用麻油调搽。

【主治】痘、瘡及遍身生疮。

66502 蚕香散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】蚕纸（已出者，烧灰） 乌贼鱼骨（去甲） 染胭脂各一钱 麝香（研）半钱

【用法】上为散。满塞耳中不动，候自落。未愈，再用。

【主治】耳脓久不愈。

66503 蚕消散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】焰消一两 官硼五钱 冰片五分 僵蚕一钱

【用法】上为末。掺患处。

【主治】牙疼兼喉痹。

66504 蚕蛾散

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】原蚕蛾（炒） 陈曲各一两 桂（去粗皮）一分 麝香（别研）一钱 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 防风（去叉） 巴戟天（去心） 白芍药各二两 丹砂（别研） 生干地黄（焙） 白芷 白芷各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，生姜、薄荷

酒调下，不拘时候。

【主治】产后中风、偏风，声音不利，或只发热昏冒，筋脉挛急。

66505 蚕蛾散

《本草纲目》卷三十九。即《证类本草》卷二十一引《胜金方》“天蛾散”。见该条。

66506 蚕蛾散

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】晚蚕蛾 白芷 当归头 陈石灰 各等分

【用法】上为细末。敷。

【功用】止血，定痛，生肌。

【主治】《疡科选粹》：刀斧伤。

66507 蚕蜕散

【方源】方出《千金》卷三，名见《医级》卷九。

【组成】蚕子故纸（方）一尺

【用法】烧为末，酒服之。

【功用】妇人断产。

66508 蚕蜕散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】蚕蜕纸一大张（烧作灰，研）

【用法】上以酸浆草烂捣，绞取自然汁三分许，酒三分许，同微暖，调下。

【功用】催产。

【主治】产难。

66509 蚕蜕散

【方源】《普济方》卷三五七引《海上方》。

【组成】蚕蜕纸 棕榈皮（各烧灰存性）

【用法】上为细末。每服各抄二钱，温酒调下。

【主治】崩漏下血不止。

66510 蚕蜕散

【方源】方出《岭南卫生方》卷中，名见《普济方》卷二五一引《经验良方》。

【组成】蚕蜕纸（是出蚕子了纸也）不拘多少

【用法】用清油纸烛烧为灰，研极细。稍觉中毒，速以新汲水调一钱，频服即活。若被蒙汗昏昧如醉，此药下咽即醒。

【主治】①《岭南卫生方》：面青脉绝，腹胀吐血，口噤，昏昧如醉。②《普济方》引《经验良方》：牛马误吃花蜘蛛，腹胀欲死者。

66511 蚕蜕散

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】枯矾二钱 人中白（刮，以火煅令白）二钱 五倍子二钱 蚕退纸（烧灰）二钱

【用法】上为末。先以米泔水洗，后用蛭螭虫翻转，蘸水洗净败血，后以此药敷之。

【主治】痘疹后牙宣，牙龈生疮，时时出血，走马疳。

【备考】《种痘新书》有蛇床子。

66512 蚕鳖散

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】川芎一钱 当归一钱五分 红花四分 羌活六分 防风八分 白僵蚕一钱二分 土鳖虫七个（捣碎） 穿山甲三大片（酒炙） 柴胡七分 生甘草四分

【用法】水、酒各半，煎八分服。

【主治】破伤风疮。

【加减】疮在下部，加牛膝一钱。

66513 蚕豆花露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】蚕豆花一斤

【用法】用蒸气蒸馏法，鲜者每斤吊成露二斤，干者每斤吊成露四斤。每用四两，隔水温服。

【功用】清热止血。

【主治】鼻血，吐血。

66514 蚕沙浸酒

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】蚕沙（微炒，捣碎）五升

【用法】上用生绢囊贮，以酒一斗五升，浸经七日。取饮之，三合至五合。令常有酒气，以愈为度。

【主治】中风，口面喎僻，口角涎流。

66515 蚕沙蒸方

【方源】方出《本草衍义》卷十七，名见《串雅外编》卷二。

【组成】醇酒三升 蚕屎五斗

【用法】以三升醇酒，拌蚕屎五斗，用甑蒸热。于暖室中，铺于油单上，令患风冷气闭及近感瘫风人，就所患一边卧，看温热厚盖覆，汗出为度。若虚，人须常在左右，防大热昏冒。仍令头面在外，不得壅覆。未痊愈，间再作。

【主治】风冷气闭，及近感瘫风人。

66516 蚕沙熨方

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】晚蚕沙 食盐各等分

【用法】上相和，炒熟，布裹熨之。冷即再炒；或入少许醋尤佳。

【主治】风肿。

66517 蚕茧眼药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连二十两 菊花五十两 花椒二十两 防风十两 青盐十两 杏仁十两 当归十两 杏仁（去皮）十两 铜绿十两 蕤仁十两 白矾十两 芒消十两

【用法】上为粗末，每粗末十六两，兑冰片一钱，混合均匀。每二钱用湖绵裹衣，线绳捆好即成。将眼药一个，用针周围戳眼，放入碗内，开水泡热，熏洗。

【功用】散风明目，消肿退蒙。

【主治】风火眼疾，暴发红肿，眼眦痛痒，热泪气蒙。

66518 蚕退纸散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】蚕退纸（烧灰）五分 人中白（烧过）五分 红褐片（烧灰）五分 白矾（枣肉包烧，烟尽取用）一分

【用法】上为末。搽之。

【主治】牙疳。

66519 蚕蛹汁方

【方源】《普济方》卷二三九。

【组成】缫丝蚕蛹二合

【用法】烂研，生布绞取汁，空心顿饮之。非缫丝时，即须依时收取蚕蛹，晒干，捣罗

为末。用时以意斟酌多少，和粥饮服之。

【主治】蛔虫。

66520 蚕沙黄柏汤

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】生蚕沙（研末）一两 生黄柏（末）一钱

【用法】每服三钱，空心开水调下。六七服即愈。

【主治】遗精白浊，有湿热者。

66521 蚕蝎归耆汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】当归 黄耆各五钱 茯苓三钱 僵蚕 半夏各一钱 全蝎一个 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】形体素虚，忽感风邪，遍身淫淫，循行如虫，或从左脚腿起，渐次而上至头，复下行于右脚，自觉身痒有声。

秦

66522 秦二散

《伤寒图歌活人指掌》卷五。为《圣惠》卷七十四“秦艽散”之异名。见该条。

66523 秦王散

《外台》卷四引《古今录验》。为原书同卷“九疸秦王散”之异名。见该条。

66524 秦艽丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】秦艽一两（去苗） 乌蛇三两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 牛蒡子三分（微炒） 防风半两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 梔子仁三分 犀角屑三分 赤茯苓一两 苦参一两（锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎竹叶汤送下。

【主治】渴利后，肺脏风毒外攻皮肤，生疮瘙痒，心烦。

66525 秦艽丸

【方源】方出《圣惠》卷五十五，名见《普济方》卷一九五。

【组成】秦艽一两（去苗） 梔子仁一两 茵陈一两 槟榔二两 商陆一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温水送下，一日三四次。

【主治】阴黄。

66526 秦艽丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】秦艽二两（去苗） 黄耆二两（锉） 漏芦一两半 乌蛇四两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 防风一两半（去芦头） 黄连一两半（去须） 苦参二两（锉） 川大黄二两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温酒送下。

【功用】①《金鉴》：清热除痒。②《赵炳南临床经验集》：清血解毒。

【主治】疥疮、湿疹、顽癣。

①《圣惠》：遍身生疥，干痒，搔之皮起。②《金鉴》：脓窠疥。③《赵炳南临床经验集》：慢性湿疹（顽湿疡）、神经性皮炎（顽癣）、皮肤瘙痒症（隐疹）、寻常性狼疮（流皮漏）、盘状红斑性狼疮。

【宜忌】《赵炳南临床经验集》：体弱者慎用，孕妇忌服。

66527 秦艽丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】秦艽半两（去苗） 龙胆一分（去芦头） 桑根白皮半两（锉） 地骨皮半两 黄耆半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 人参半两（去芦头） 柴胡三分（去苗） 赤茯苓半两 犀角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，用粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿羸瘦体热，心神烦闷，小便赤黄。

66528 秦艽丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】秦艽 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）
苦参 升麻 枳壳（去瓢，麸炒） 黄芩
（去黑心） 防风（去叉）各一两半 恶实二
合 大黄（锉，炒）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服三十丸，食后以温浆水送下。

【主治】肺风热，皮肤疮癣，瘙痒。

66529 秦艽丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】秦艽（去苗土） 防己 松脂（炼
成者）各一两半 枳壳（去瓢，麸炒） 蒺
藜子（炒，去角）各二两半 苦参 白术 芎
藭 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐） 蒴
藿 干姜（炮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服二十丸，渐加至三十丸，早、晚食前温
酒送下。

【主治】风瘙瘾疹，搔之愈甚。

66530 秦艽丸

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】秦艽（去土） 苦参 升麻 黄芩
（去黑心） 枳壳（去瓢，麸炒） 防风（去
叉） 恶实（炒）各四分 乌蛇（酒浸，去
皮骨，炙） 蒺藜子（炒）各五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服二十丸，早晚、食后以蒺藜子煎汤送下。

【主治】风毒气客经络，成风疽。

66531 秦艽丸

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】秦艽半两 黄耆（锉） 枳壳（去
瓢，麸炒） 漏芦（去芦头） 防风（去
叉）各一两半 黄连（去须）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【主治】妊娠疮疥，烦热瘙痒。

66532 秦艽丸

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】川芎二两 白芍四两 归身四两

香附四两（醋炒） 秦艽四两 槐花四两
（炒）

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】肠风，久风入中。

66533 秦艽丸

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】川芎二两 当归二两（酒洗） 秦
艽一两（酒洗） 荆芥一两（取穗）

【用法】上为末，酒糊为丸，如绿豆大。每
服三钱，食后白汤送下。

【主治】产后气血大虚，风邪入于头脑作痛
者。

66534 秦艽汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【异名】桂心汤（《圣济总录》卷十七）。

【组成】桂心 防风 黄芩 干姜 茱萸
秦艽 甘草各一两

【用法】上切。以水五升，煮取一升半，分
再服，汤令热。不愈，更作。

【主治】贼风入腹抢心，拘急，四肢不随，
腹满欲死者。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱。

66535 秦艽汤

【方源】《外台》卷三十七引《古今录验》。

【异名】秦艽牛乳二味汤（《外台》卷四引
许仁则方）、秦艽煮散（《圣济总录》卷六
十）、秦艽煎（《卫生总微》卷七）。

【组成】秦艽三两（细切）

【用法】以牛乳一大升，煮取一小升。去滓，
顿服之，得利即愈。若老弱可量气力进之。热
气散后，黄色纵彻皮肤，是愈候，勿怪；热
散后，慄慄寒颤，若困颤，黄复出外者，是
谓余热欲散也，勿厚覆，但使饥肤中少寒颤
即止。

【主治】①《外台》引《古今录验》：服石
药后饮酒，热盛充满经络，心腹少胀，欲心
下痞痛不消，或时聚如坚，随复消者；或发
黄，小便赤，心坚痛者。②《卫生总微》：伤
寒心神烦躁，口干烦渴。

【宜忌】饮食宜清冷，不得浊热。

66536 秦艽汤

【方源】《外台》卷三引《近效方》。

【组成】秦艽一两 紫草一两 白鲜皮一两 黄芩一两 梔子一两

【用法】上切。以水一大升半，牛乳一大升，煮取七合，分为二服。老小以意量之，一剂不愈，更吃一剂。

【主治】天行三日外，忽觉心上妨满坚硬，脚手心热，变为黄。

【备考】《圣济总录》有大黄。

66537 秦艽汤

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《圣济总录》卷五十九。

【组成】秦艽二两（去苗） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散，每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分。去滓温服，不拘时候。

【功用】除烦躁。

【主治】消渴。

66538 秦艽汤

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《本草纲目》卷十三。

【异名】秦艽散（《治痘全书》卷十三）。

【组成】秦艽一两（去苗）

【用法】以水一大盏，煎取七分，去滓，食前分为二服。

【主治】小便难，蜘蛛螫伤，天蛇疮，痘疹。

①《圣惠》：小便难，胀满闷。②《外科大成》：由草中花蜘蛛螫伤，仍被露水所搭而致的天蛇疮，肌肤似癩非癩。③《治痘全书》：痘六七日，热不退。

66539 秦艽汤

【方源】《普济方》卷二九二引《圣惠》。

【组成】秦艽（去苗土） 连翘 青橘皮（去白，焙） 槟榔（煨）各半两 犀角（镑）三分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，加

木通少许，同煎至七分。去滓温服。

【主治】风毒久不愈，搏于筋脉，因成瘰癧结核生项腋。

66540 秦艽汤

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷五“麻黄散”之异名。见该条。

66541 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】秦艽（去苗土） 防风（去叉）各二两 黄耆（锉）三两 附子（炮裂，去皮脐）一两 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）四两 当归（切，焙）一两

【用法】上锉散。每服五钱匕，水一盏半，生姜三片，同煎至一盏，去滓温服，空心并二服，临卧并二服。厚覆，微出汗，慎外风。

【主治】历节风，骨节疼痛，日夜不可忍。

66542 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【异名】升麻汤（《普济方》卷九十五）。

【组成】秦艽（去土） 连翘 升麻 芍药 防风（去叉） 羚羊角（镑屑） 木香 枳壳（去瓢，麸炒） 薏苡仁各半两

【用法】上为细散，分为六服，每服以水二盏，加生姜五片，煎取一盏，去滓，缓缓温服。

【主治】荣气虚为不仁，皮肤搔之如隔衣状。

66543 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】秦艽（去苗土） 菖蒲 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 蔓荆实 人参 附子（炮裂，去皮脐） 黄芩（去黑心） 甘草（炙） 远志（去心） 防风（去叉）各半两 龙骨 赤石脂 白茯苓（去黑皮） 白芍药 芎藭 防己各三分

【用法】上锉散。每服三钱匕，水一盏，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心痹。邪气乘虚，恍惚不乐，身体强直，面目变色。

66544 秦艽汤

《圣济总录》卷二十三。为《圣惠》卷十一“秦艽散”之异名。见该条。

66545 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】秦艽(去苗土) 黄芩(去黑心) 甘草(炙, 锉) 木通 枳壳(去瓢, 麸炒) 玄参各半两 芍药 桔梗(炒) 吴蓝 山梔子仁各一两 枇杷叶三分(拭去毛, 姜汁炙)

【用法】上为粗末, 每服五钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】阳毒伤寒, 心躁闷乱, 烦热狂语, 口干不止。

66546 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 大青各一两 升麻 黄芩(去黑心) 甘草(炙, 锉) 各三分 虎杖半两

【用法】上为粗末, 每服五钱匕, 水一盞半, 加葱白五寸(切), 豉一百粒, 煎至八分, 去滓, 食后温服。

【主治】伤寒后, 口内生疮, 小便赤色, 手足烦热。

66547 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 各半分 常山一分 乌梅肉三枚 糯米一撮

【用法】上锉散。用水二盞, 煎至一盞半, 去滓, 分温二服, 未发前服之。取吐利。

【主治】山岚瘴气如疟。

66548 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】秦艽(去苗土) 一两半 防风(去叉) 一两一分 枳壳(去瓢, 麸炒) 一两 独活(去芦头) 一两 桂(去粗皮) 三分 槟榔(炮, 锉) 一两一分 牵牛子(生, 捣末) 一分 朴消(细研, 汤成旋下) 一两半

【用法】上除朴消外, 为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 下朴消末半钱匕,

更煎二沸, 食前温服, 一日二次。

【主治】大肠虚瘦, 秘涩躁闷。

66549 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】秦艽(去苗土) 半两 甘草(炙, 锉) 前胡(去芦头) 柴胡(去苗) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食前温服。

【主治】骨实烦热。

66550 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】秦艽不拘多少(去苗土)

【用法】上为粗末, 每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓温服。并服以愈为度。

【主治】胞转、肠风脱肛、痘热不退。

①《圣济总录》: 胞转不得小便。②《赤水玄珠》: 肠胃湿热及有风而脱肛不止。③《仁端录》: 痘六七日热不退。

66551 秦艽汤

《圣济总录》卷六十。为《圣惠》卷五十五“秦艽散”之异名。见该条。

66552 秦艽汤

《圣济总录》卷八十一。为《圣惠》卷四十五“秦艽散”之异名。见该条。

66553 秦艽汤

《圣济总录》卷八十五。为《外台》卷十七引《集验方》“秦艽散”之异名。见该条。

66554 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽(去苗土) 甘草(炙, 锉) 各一两 桂(去粗皮) 柴胡(去苗) 当归(切, 焙) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜二片, 乌梅并枣各一枚(擘破), 同煎至七分, 去滓温服。

【主治】虚劳喘嗽, 寒热盗汗。

66555 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽(去苗土) 前胡(去芦头) 桔梗(炒) 各二两 龙胆 人参各一两 甘

草(炙, 锉)一两 柴胡(去苗)四两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加乌梅一枚(拍碎), 生姜二片, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】寒热虚劳, 四肢无力, 面色枯悴。

66556 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 知母 甘草(锉, 炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】虚劳潮热, 咳嗽, 盗汗不止。

66557 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】秦艽(去苗土)四两 青蒿子(用童便浸一宿, 洗, 滤干, 焙) 知母(焙) 贝母(去心) 常山(洗, 焙) 甘草(盐水浸, 炙黄)各二两 鳖甲(去裙襕, 醋浸, 炙) 枳壳(去瓢, 麸炒) 柴胡(去苗) 半夏(汤洗后, 用姜汁浸一宿, 晒干) 陈橘皮(去白, 焙) 肉桂(去粗皮)各四两

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 加乌梅一个(拍破), 生姜三片, 煎七分, 去滓热服。如浑身壮热, 并吃二服。

【主治】骨蒸热劳。

66558 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】秦艽(去苗土) 枳实(去瓢, 麸炒) 升麻 柴胡(去苗) 知母(焙) 当归(切, 焙) 芍药各一两 芎藭半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至七分。去滓, 食后、临卧温服。

【主治】心膈气痰, 烦躁寒热, 头痛, 眼赤痛昏暗。

66559 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】秦艽(去苗土) 石膏(碎) 甘草(炙) 升麻 桑根白皮(锉) 大黄(锉, 炒)各一两 枳壳(去瓢, 麸炒) 葛

根各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加淡竹沥半合, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】因高声呼吸冷风, 或因哀哭伤气, 或饮食热气所冲, 皆致伤肺, 使气喘促, 皮肤风痒, 四肢痠疼, 鼻塞干痛。

66560 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】秦艽(去苗土) 马鞭草 甘草(炙, 锉) 柴胡(去苗)各一两 芎藭 芍药 桂(去粗皮)各二两 荆芥穗三两 半夏(汤洗去滑, 生姜汁制, 炒干)半两 白芷三分

【用法】上为粗末, 每服三钱匕, 水一盞, 加乌梅一枚(拍破), 生姜三片, 同煎至七分, 去滓温服。

【主治】妇人虚劳, 月水不利, 百节痠痛, 壮热少力, 心躁烦闷。

66561 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】秦艽(去苗土) 鹿角胶(炙燥) 地榆(锉) 甘草(炙, 锉) 白芷 人参 芎藭各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加糯米五十粒, 煎至一盞, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠胎动下血, 身体烦热倦怠。

66562 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】秦艽(去苗土) 玄参 芍药各一两 艾叶(炙) 白芷 续断 当归(切, 焙)各一两半

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 煎七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后恶露不断。

66563 秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】秦艽(去苗土) 麻黄(去根节, 煎, 掠去沫, 焙) 乌梅(去核, 炒) 甘

草(炙) 麦门冬(去心,炒) 青蒿子 常山 柴胡(去苗) 鳖甲(醋炙,去裙襕) 大黄(炮,锉) 当归(切,焙) 赤茯苓(去黑皮) 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,煎至八分,去滓,当未发前服,欲发时再服。

【主治】产后疟,先寒后热,头疼发渴,骨节痛。

66564 秦艽汤

【方源】《幼幼新书》卷十七引张涣方。

【组成】秦艽(去苗) 鳖甲(醋炙微黄,去裙襕) 各一两 川大黄(锉碎,微炒) 麻黄(去根节) 各半两 竹茹 甘草(炙) 各一分

【用法】上为粗散,每服一钱,水一盞,加葱白二寸,同煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿寒热往来。

【备考】《奇效良方》有柴胡、槟榔。

66565 秦艽汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】秦艽 杜仲 川断 艾叶 地榆 香附 陈皮 前胡 阿胶 防风 黄耆 白朮 黄芩 川芎 白芍 葱白

【功用】止血安胎。

【主治】妊娠每下血似月信至者,或孕妇血盛气衰,或营分受风则经血妄动。

【加减】血盛者,加生地、麦冬,倍黄芩、白芍。

【宜忌】血盛者,不宜服此汤;芩、防、芎、前不可过用。

【方论选录】卫主气,营主血,营行脉中,卫行脉外。血属阴,风属阳,风伤营血则肝火动而魂不藏,风热相搏,阴血消烁则血下行而胎不安。是方秦艽、防风、川芎皆风药也。秦艽益肝胆二经血而能祛风;川芎能引诸血药入厥阴血分,上至髓海,下入丹田;防风通行十二经。加以地榆(炒黑)、黄芩(酒炒凉血)、杜、断、艾、芍安胎养血,香、朮

益气,附、陈行气,清以前胡,引以葱白,立方之旨尽矣。

66566 秦艽汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】秦艽八钱 人参三钱 防风四钱半 芍药半两 柴胡八钱 黄芩四钱半 半夏三钱 甘草四钱(炙)

【用法】上为粗末。每服五七钱,水一盞,煎至七分,温服,不拘时候。

【功用】祛风。

66567 秦艽汤

《妇人良方》卷十二。即方出《本草纲目》卷十三引《圣惠》,名见《全生指迷方》卷四“秦艽散”。见该条。

66568 秦艽汤

【方源】《普济方》卷三四五。

【组成】熟地黄三分 当归 白芍药 秦艽 柴胡 甘草 地骨皮各一分半

【用法】上计一两二钱,挑五钱,水一盞半,煎至八分服,一日三次。热退住服。

【主治】偶伤风恶寒,浑身疼痛。

66569 秦艽汤

《校注妇人良方》卷三。为《保命集》卷中“大秦艽汤”之异名。见该条。

66570 秦艽汤

《医学入门》卷八。为《兰室秘藏》卷下“秦艽羌活汤”之异名。见该条。

66571 秦艽汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【异名】秦艽牛蒡汤(《金鉴》卷七十四)。

【组成】秦艽(去芦)一两 防风(去芦) 黄芩 麻黄(去节) 甘草(炙) 玄参(去芦) 犀角屑 牛蒡子(炒) 枳壳(去瓢,麸炒) 川升麻各七钱半

【用法】上咬咀。每服五钱,水一中盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风热毒气客于皮肤,遍身生痞瘤如麻豆。

【宜忌】《金鉴》:宜避风凉。

66572 秦艽汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】秦艽 防风 柴胡 黄芩 广皮 白芍药 甘草

【主治】外感筋挛，湿热伤于少阳者。

66573 秦艽汤

【方源】《郑氏女科万金方》卷五。

【组成】人参 白芷 羌活 独活 防风 白术 生地 当归 白芍 川芎 茯苓 细辛 黄芩 甘草

【主治】妇人中风，汗出不止，大便秘结。

【加减】遇天阴，加生姜七片；痞，加枳实。

【备考】本方名秦艽汤，但方中无秦艽，疑脱。

66574 秦艽汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】秦艽二钱 人参一钱半 防风一钱半 当归三钱（酒炒） 川芎一钱 黄耆三钱（酒炙） 炙草一钱半

【用法】水煎，去滓，入竹沥一杯，姜汁一匙，温服。

【主治】产后痙痲，脉浮虚数者。

【方论选录】产后血气两虚，风邪留恋于经络，故筋脉失养，痙痲不休焉。熟地补阴滋血，人参补气扶元，黄耆补中益卫气，当归养血荣筋脉，川芎入血海以行血气，白芍敛营阴以和血脉，防风疏风于表，炙草益胃于里，秦艽活血祛风以舒筋脉也。水煎，入竹沥、姜汁，使血气内充，则输精于元府，而风邪自散，四肢得禀血气于胃，无不屈伸如度，何痙痲之有哉。

66575 秦艽汤

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】秦艽六钱 石菖蒲 当归各三钱 葱白五个

【用法】水二钟，煎一钟，食远服。

【主治】妇人阴疮。

66576 秦艽汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】秦艽 知母 黄芩 防风 僵蚕

尖生 当归 元红 苏荷 甘草

【主治】手足不能运掉，舌大不语，口开手撒，头摇目合，鼻干吐沫。

66577 秦艽汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】羌活一钱五分 当归二钱 川芎一钱 熟地三钱 秦艽 白芍（酒炒） 独活各一钱五分

【主治】风中经络而痛。

【加减】如有热，加防己一钱，黄芩一钱五分；有寒，加制附子一钱，肉桂四分。

66578 秦艽汤

【方源】《性病》。

【组成】秦艽一钱五分 甘草（炙） 川芎 当归 芍药 生地 熟地（自制） 茯苓 羌活 独活 白术 黄芩各八分

【用法】水煎服。

【主治】阴肿，又名蚌疽，阴户忽然肿而作痛者。

66579 秦艽饮

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 贝母（去心，焙） 桔梗（炒）各一两 甘草（炙，锉）三分 诃黎勒（煨，去核）一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 麻黄（去根节）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用童便一盞，加乌梅一个，同煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】虚劳咳嗽不止，时发寒热，涕唾稠浊。

66580 秦艽饮

《得效》卷三。为《医方类聚》卷一三二引《济生》“秦艽饮子”之异名。见该条。

66581 秦艽饮

《婴童百问》卷六。即《小儿药证直诀》卷下“地骨皮散”加秦艽。见该条。

66582 秦艽酒

【方源】《千金》卷七。

【异名】牛膝酒（《圣济总录》卷五）。

【组成】秦艽 牛膝 附子 桂心 五加皮 天门冬各三两 巴戟天 杜仲 石南细辛各二两 独活五两 薏苡仁一两

【用法】上咬咀。以酒二斗，渍之得气味。可服三合，渐加至五六合，每日三次，夜一次。

【主治】四肢风，手臂不收，脚脚痿弱，或有拘急，挛缩屈指，偏枯痿躄，痼小不仁，顽痹者。

66583 秦艽酒

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 甘草(炙) 鳖甲(去裙襕，醋炙)各半两 常山 葱白各二两 豉一分

【用法】上锉散，用无灰酒三升，浸一宿。子近火处顿，常令微温，每服一盏，未发时，不拘时服。既服，又添酒一盏于药中，再添至三升，即止。

【主治】劳疟。

66584 秦艽酒

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【异名】牛膝汤(《普济方》卷一八六)。

【组成】秦艽 牛膝 芎藭 防风 桂独活 茯苓各一两 杜仲 丹参各八两 侧子(炮裂，去皮脐) 石斛(去梢，黑者) 干姜(炮) 麦门冬(去心) 地骨皮各一两半 五加皮五两 薏苡仁一两 大麻仁一合(炒)

【用法】上锉细。以生绢袋盛，酒一斗浸，春秋七日，夏三日，冬十日成。每日空腹温服半盏，一日二次。

【主治】①《圣济总录》：忧恚内伤，久坐湿地所致肾劳虚冷，干枯。②《普济方》：胞痹，小便不利。

66585 秦艽散

【方源】《外台》卷十七引《集验方》。

【异名】秦艽汤(《圣济总录》卷八十五)。

【组成】秦艽四分 白术十四分 桔梗四分 干姜五分 附子三分(炮) 杜蛎(熬) 防风六分 人参四分 茯苓四分 椒

子二分(汗) 黄芩三分 桂心五分 细辛三分 甘草三分(炙) 杜仲三分(一方加钟乳粉一两)

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日二次。

【主治】风冷虚劳，腰脚疼痛诸病。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、生葱、生菜、猪肉、冷水。

66586 秦艽散

【方源】《千金》卷七。

【组成】秦艽 干姜 桔梗 附子各一两 天雄 当归 天门冬 人参 白术 蜀椒各三十铢 乌头 细辛各十八铢 甘草 白芷 山茱萸 麻黄 前胡 防风 五味子各半两

【用法】上治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。若老人，少服之。

【主治】①《千金》：风无久新，卒得不知人，四肢不仁，一身尽痛，偏枯不随，不能屈伸，洒洒寒热，头目眩倒，或口面喎斜。②《圣济总录》：肝气逆，面青多怒，身体不能屈伸，甚则头目眩晕。

66587 秦艽散

【方源】《千金》卷八。

【组成】秦艽 独活 黄耆 人参 甘菊花各三两 茵芋十八铢 防风 石斛 桂心 山茱萸各二两半 附子 芎藭 细辛 当归 五味子 甘草 白术 干姜 白鲜皮各三十铢 麻黄 天雄 远志各一两

【用法】上治下筛。每服方寸匕，渐渐加至二匕，酒送下，一日二次。

【主治】半身不遂，言语错乱，乍喜乍悲，角弓反张，皮肤风痒。

66588 秦艽散

【方源】《医心方》卷十二引《令李方》。

【组成】秦艽一分 陈芥子二分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】小便利多。

66589 秦艽散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】秦艽三分(去苗) 茯神三分 桑根白皮三分(锉) 犀角屑三分 木通三分(锉) 麦门冬三分(去心) 防风三分(去芦头) 羌活三分 汉防己三分 酸枣仁三分(微炒) 甘草三分(炙微赤, 锉)

【用法】上为末。每服三钱, 以水一中盏, 入生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】肝中风, 语涩, 筋脉舒缓, 面上浮肿, 行履不稳。

66590 秦艽散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】秦艽一两(去苗) 柴胡一两(去苗) 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓢) 桑根白皮三分(锉) 麦门冬一两(去心) 葛根三分(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 入生姜半分, 芦根五寸, 煎至六分, 去滓, 温服, 不拘时候。

【主治】伤寒汗后, 余热不除, 四肢拘急, 胸膈不利, 呕逆, 不思饮食。

66591 秦艽散

【方源】《圣惠》卷十一。

【异名】秦艽汤(《圣济总录》卷二十三)。

【组成】秦艽一两(去苗) 鳖甲一两(去裙襴, 涂酥炙令黄) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 豉半合, 葱白二茎, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】伤寒潮热不退, 发歇无时。

66592 秦艽散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】秦艽一两(去苗) 人参三分(去芦头) 鳖甲一两(涂醋炙令黄, 去裙襴) 白术一两 半夏半两(汤洗七遍, 去滑) 五味子半两 甘草半两(炙微赤, 锉) 柴胡一两(去苗) 黄芩半两 桔梗半两(去芦

头) 麦门冬半两(去心) 黄耆一两(锉)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳, 黄瘦体热, 四肢烦疼, 不欲饮食。

66593 秦艽散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】秦艽(去苗) 黄芩 木通 犀角屑 麦门冬(去心) 玄参 蓝叶 梔子仁 甘草(炙微赤, 锉)各三分 赤芍药一分 桔梗一分(去芦头)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】时气热毒, 躁闷谵言, 口舌干, 渴不止。

66594 秦艽散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】秦艽(去苗) 柴胡(去苗) 芎藭 桔梗(去芦头) 葛根 黄芩 甘草(炙微赤, 锉) 川大黄(锉碎, 微炒) 桑根白皮各一两

【用法】上锉细和匀。每服半两, 以水一大盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】时气壮热, 腹满心下硬, 不能食, 发黄。

66595 秦艽散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】秦艽一两(去苗) 赤箭一两 独活一两 桂心一两 五加皮一两 磁石三两(捣碎, 水淘, 去赤汁) 甘菊花一两 汉防己一两 羚羊角屑一两 葛根一两(锉) 赤芍药一两 麻黄二两(去根节) 薏苡仁二两 防风一两(去芦头) 芎藭一两 侧子一两(炮裂, 去皮脐) 杏仁二两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 甘草一两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏,

加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】瘫风，手足不遂，肌肉顽痹，筋脉拘急，心神不安，言语謇涩，胸膈痰涎不利。

66596 秦艽散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】秦艽一两（去苗） 羚羊角屑三分 防风三分（去芦头） 葛根三分（锉） 当归半两（锉，微炒） 人参半两（去芦头） 赤芍药三分 汉防己三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 细辛三分 木通半两（锉） 赤茯苓三分 桂心半两 白术半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，取竹沥一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】贼风入腹，短气，心下烦热，手足疼痛，四肢不举，口噤不能语。

66597 秦艽散

《圣惠》卷二十。为《外台》卷十五引《广济方》“秦艽饮子”之异名。见该条。

66598 秦艽散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】秦艽三分（去苗） 附子一两（炮裂，去皮脐） 石膏一两 菖蒲一两 麻黄根二两 苍术二两（锉碎，炒微黄） 桂心一两 防风二两（去芦头）

【用法】上为细散。每服二钱，以温水调下，不拘时候。

【主治】风虚汗出不止，恶风头痛。

66599 秦艽散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】秦艽三分（去苗） 防风一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 大麻仁一两 槟榔一两 川朴消一两半 羚羊角屑一两 木香三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】大肠风热，秘涩躁闷。

66600 秦艽散

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】秦艽（去苗） 人参（去芦头） 白术 当归 天雄（炮裂，去皮脐） 附子（炮裂，去皮脐） 川乌头（炮裂，去皮脐） 干姜（炮裂，锉） 川椒（去目及闭口者，微炒，去汗） 防风（去芦头） 桂心 汉防己 萆薢（锉） 白薇 黄耆（锉） 桔梗（去芦头） 麻黄（去根节）各一两 山茱萸 细辛 莽草（微炙） 五味子 甘草（炙微赤，锉）各三分

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下。

【主治】一切风，无问新久。

【宜忌】忌生冷、鸡、猪肉。

66601 秦艽散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【异名】秦艽汤（《圣济总录》卷八十一）。

【组成】秦艽一两（去苗） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 白术一两 丹参一两 羌活一两 人参一两（去芦头） 柴胡一两（去苗） 茯神一两 紫苏茎叶一两 薏苡仁一两半 桑根白皮一两（锉） 防风一两（去芦头） 石斛一两（去根，锉） 大麻仁一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气痹挛，不能行步，时发疼痛，烦躁恍惚。

【备考】《圣济总录》有陈橘皮，无茯神。

66602 秦艽散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】秦艽一两（去苗） 玄参一两 地骨皮一两 独活一两 黄耆一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脚气风毒，生疮肿痛。

肩背急强。

66610 秦艽散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】秦艽一两(去苗) 甘草一两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿五岁至十岁以来, 骨热及手足心烦闷, 不欲饮食。

66611 秦艽散

【方源】方出《本草纲目》卷十三引《圣惠》, 名见《全生指迷方》卷四。

【组成】秦艽 阿胶(炒) 艾叶各等分

【用法】上为末。每服三钱, 水一大盏, 糯米五十粒, 煎服。

【主治】①《本草纲目》引《圣惠》: 胎动不安。②《鸡峰》: 妇人脏腑不调。

【备考】本方方名, 《妇人良方》引作“秦艽汤”。

66612 秦艽散

【方源】《博济》卷二。

【组成】秦艽(炙) 柴胡(去芦) 贝母(炮) 桔梗 麻黄各一两 陈皮一两(去白) 甘草三分(炙) 诃子一两半(煨, 去核, 用肉, 秤)

【用法】上为末。每服二钱, 用小便一盞, 乌梅一个, 同煎三五沸, 空心、晚食前温服。

【主治】肺痿劳, 咳嗽不止, 时觉寒热, 涕唾稠浊。

66613 秦艽散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】秦艽(净, 焙) 川当归 藿香(净, 去尘土) 各等分

【用法】上为细末。每服三钱, 水一盞, 童便一盞, 入乌梅三个, 桃、杏仁各二十四个(去尖), 桃、柳枝各七茎, 长一握, 葱白三茎, 与药同入砂瓶子, 文火煎至八分, 去滓, 临卧温服。

【主治】劳气虚弱, 汗出, 烦躁气逆。

66614 秦艽散

【方源】《普济方》卷十四引《护命方》。

【组成】秦艽(去土) 当归(切, 焙) 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 荆芥穗 连翘 虎杖 芎藭 牡丹皮 麻黄(去根节) 各一两

【用法】上为细散。每服三钱, 薄荷汤调服。

【主治】肝气实壅, 上攻头目, 筋脉拘急疼痛, 大小便赤热, 及臂上脚内疼痛。

66615 秦艽散

【方源】《圣济总录》卷五。

【异名】桂心散(《圣济总录》卷十三)、桂心汤(《普济方》卷一〇七)。

【组成】秦艽(去苗土) 附子(炮裂, 去皮脐) 白术 桂(去粗皮) 石斛(去根) 各一两

【用法】上为散。每服三钱匕, 空腹温酒调下, 一日二次。

【主治】中风汗出不止。

66616 秦艽散

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 甘草(炙, 锉) 乌梅(取肉, 焙) 各二两

【用法】上为散。每服一钱匕, 食后、临卧以沸汤调下。

【主治】骨蒸潮热, 烦渴引饮, 不思饮食。

66617 秦艽散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 各一两

【用法】上为散。每服三钱匕, 割猪肝三两片, 用酒煮之, 去肝, 取酒调药, 温服十服, 当愈。

【主治】虚劳口疮久不愈。

66618 秦艽散

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】秦艽(去苗土)

【用法】上为散。涂敷疮上, 以帛缚定口二三次。

【主治】附骨疽久不愈, 或愈年岁再发。

66619 秦艽散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】秦艽（去芦头，切，焙） 甘草（炙）各一两 干薄荷半两（勿焙）

【用法】上为粗末。每服一二钱，水一中盏，煎至八分，食后温服。

【主治】潮热减食，蒸瘦。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：秦艽退蒸，薄荷清热，炙甘草和中，故能治潮热减食，蒸瘦。

66620 秦艽散

【方源】《幼幼新书》卷二十引张涣方。

【组成】秦艽一两 川大黄（锉碎，微炒）黄耆 赤小豆 糯米各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】小儿肌热病。

【备考】《普济方》本方用法：入竹叶、薄荷各少许，煎五分，去滓，食后温服。

66621 秦艽散

【方源】《幼幼新书》卷十九引郑愈方。

【组成】秦艽 柴胡 大黄各一分

【用法】上为末。每服半钱，水五分，入韭白三寸，同煎至三分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿潮热。

66622 秦艽散

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】秦艽 金钗石斛 茯神 山药 人参 五味子 当归 远志 白芍药 牡丹皮 黄耆各一两 苁蓉 熟干地黄各二两 薏苡三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】虚劳羸瘦，身体发黄，食少忪悸，头昏眩晕，上焦虚热，口干烦郁。

【备考】本方方名，据剂型，当作“秦艽丸”。

66623 秦艽散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】秦艽 柴胡 前胡 葛根 紫苏

甘草 黄芩 白术 升麻 石膏 陈皮 桔梗 枳壳 云苓 葱白 焦栀

【主治】妊娠时气者，日久不治伤胎。

【方论选录】时气传染，远近老小病形相类。大约头疼身热，肢节痠痛，感于外邪也；恶心呕吐，周身寒慄，感于寒也；昏冒眩晕，头重目暗，上吐下泻，感于湿也；多汗肌热，心烦脉虚，感于暑也。加以内伤饮食，心胸痞满，与伤寒病情相似，妊娠遇此先治其标，后培其本。是方柴、芩入少阳，秦、芎、升、膏、葱白入阳明，芩、栀入太阳膀胱利湿清热，枳、桔、陈、苏清肺快膈，前胡兼除六腑痰热，白术配黄芩安胎圣药，所云先治标也。服一二剂后，感冒既清，仍以安胎为主。

66624 秦艽散

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】秦艽（去土） 当归（去芦） 桔梗 黄连（去须） 乌梅（去核） 甘草（炙） 青皮（去瓢） 柴胡（去芦） 干姜（炮） 芍药各等分

【用法】上为细末。分为二服，解暑，浓煎灯心汤下；心痛，煎菖蒲汤下；泻痢，米饮下，常服熟米下；骨热，地骨皮汤下。

【功用】解暑。

【主治】中暑，心痛，泻痢，骨热。

66625 秦艽散

【方源】《妇人良方》卷六引《妇人经验方》。

【组成】麦门冬 秦艽各一两 生地黄 当归各半两 地骨皮 郁金 苏木各一分

【用法】上为细末。每服一钱半，水一盞，加红花少许，同煎至七分，温服。此方可服一年。

【主治】血经有热，月脉凝滞，五心烦倦。

【宜忌】忌酒与热物。

【加减】若经脉调，减红花。

【方论选录】《济阴纲目》：此方以生地、麦冬凉血热，秦艽、地骨除骨热，其三味皆治血脉凝滞之物也。少加红花，以见生血之功。专忌酒热，以免助热之累，然非真郁金，不能服

一年也。

66626 秦艽散

【方源】《普济方》卷二〇〇引《如宜方》。

【组成】北柴胡 常山各一两 秦艽 甘草（炙）各半两。

【用法】上咬咀。酒、水、童便各半盏煎，当发日五更服。

【主治】久疟似成癆瘵，热寒往来。

66627 秦艽散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】秦艽 大黄 防风 梔子 薄荷 连翘各等分

【用法】水煎，漱。

【主治】牙肿痛。

66628 秦艽散

《医统》卷十八。为《医方类聚》卷一三二引《济生》“秦艽饮子”之异名。见该条。

66629 秦艽散

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】秦艽 川椒 人参 茯苓 牡蛎 细辛 麻黄 瓜蒌 干姜 白附子 白术 桔梗 桂心 独活 当归 黄芩 柴胡 牛膝 天雄 石南 杜仲 莽草 乌头 甘草 川芎 防风

【用法】酒浸服之。

【主治】手足痠痛，皮肤一身尽痛，眉毛脱落，耳聾湿痒。

66630 秦艽散

《治痘全书》卷十三。为方出《圣惠》卷五十八，名见《本草纲目》卷十三“秦艽汤”之异名。见该条。

66631 秦艽煎

《卫生总微》卷七。为《外台》卷三十七引《古今录验》“秦艽汤”之异名。见该条。

66632 秦皮丸

【方源】方出《千金》卷十五，名见《普济方》卷二一二。

【组成】鼠尾草 蔷薇根 秦皮（如无，用槲皮代之）各等分

【用法】上咬咀。以水淹煎，去滓，铜器重

釜煎，为丸如梧桐子大。每服五六丸，一日三次，稍增。愈止，亦可浓汁服半升。

【主治】血痢，下赤连年。

66633 秦皮丸

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】秦皮（去粗皮） 黄柏（去粗皮，炙） 黄芩（去黑心） 防风（去叉） 柴胡（去苗） 黄连（去须）各一两 甘草（炙） 葳蕤 木通（锉）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧温水送下。

【主治】粘睛翳。

66634 秦皮汤

【方源】《外台》卷二引《范汪方》。

【异名】秦皮散（《圣惠》卷十三）。

【组成】秦皮三两 黄连四两 白头翁二两 阿胶三两

【用法】上咬咀三味，以水八升，煮得二升，绞去滓，纳胶令烊，适寒温先食饮七合，一日二次。

【主治】伤寒腹中微痛不止，下利。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

66635 秦皮汤

【方源】《外台》卷二引《小品方》。

【异名】秦皮大黄汤（《伤寒总病论》卷三）。

【组成】秦皮二两 前胡二两 常山二两 黄芩二两 升麻二两 芍药二两 白薇二两 枳实二两（炙） 大黄三两 甘草二两（炙）（一方加蕤仁一两，梔子仁半两）

【用法】上以水八升，煮取三升，分三服，相去二食顷，更服。

【主治】毒病冲眼，忽生赤翳，或白，或肿肤起；或赤痛不得视光，痛入心肝；或眼外浮肿如吹汁出，生膜覆珠子。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱、生菜。

【加减】若盛热者，可加芒消二两。

【备考】方中前胡、白薇，《伤寒总病论》作“柴胡、白薇”。

66636 秦皮汤

【方源】《外台》卷二十一引《小品方》。

【组成】秦皮(洗) 黄连各二分 黄柏三分 大枣五枚 蕤仁二分

【用法】上切,以水二升,煮取一升,以洗眼。

【主治】眼风结肿合,或眼生翳,人口吹之,睛中牵引疼痛,白睛赤起,或黑变黄,从下上覆半睛者。

【宜忌】忌猪肉。

66637 秦皮汤

【方源】《外台》卷二引张文仲方。

【异名】点眼秦皮煎(《圣济总录》卷一〇二)。

【组成】秦皮 升麻 黄连各一两

【用法】上切,以水洗去尘。用水四升,煮取二升半,冷之,分用三合,仰眼,以绵绕箸头,取汤以滴眼中,如屋漏状,尽三合止,须臾复用,日五六遍乃佳。

【主治】伤寒病热毒气入眼,生赤脉赤膜,白肤白翳者,及赤痛不得见光,痛毒烦恼者。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

66638 秦皮汤

【方源】方出《外台》卷二十一引谢道安方,名见《圣济总录》卷一〇三。

【异名】秦皮洗眼方(《圣济总录》卷一〇六)。

【组成】秦皮 黄连各一两 苦竹叶一升

【用法】上切。以水五升,煮取八合,洗眼。

【主治】眼忽肿痛,盲。

【宜忌】忌猪肉。

66639 秦皮汤

【方源】《外台》卷二十一引《近效方》。

【组成】秦皮一两 梔子仁二枚 淡竹叶一握

【用法】上切,绵裹,以水一升半着铜器中,煎三五沸,以绵滤取,洗眼。

【主治】黑睛及瞳仁莹薄有疮翳。

【宜忌】滤液宜净器物盛之;不可用辛辣及

温药洗之。

66640 秦皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】秦皮(去粗皮) 羚羊角(镑)各一两半 桔梗(炒) 细辛(去苗叶)各半两 薏苡仁 伏翼(炙干)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加大枣二枚(劈破),煎至七分,入荆沥半合,再煎三两沸,食后、临卧服。

【主治】肝气实,胁下妨痛,筋脉痠疼,眼常昏浊,视物不明。

66641 秦皮汤

《圣济总录》卷一〇三。为《圣惠》卷三十二“洗眼秦皮汤”之异名。见该条。

66642 秦皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】秦皮 黄连(去须) 黄柏(去粗皮) 甘草各一两(炙)

【用法】上锉散。每用三钱匕,水一盞,入沙糖一弹子大,同煎一二十沸,滤去滓,稍热洗眼;如冷,再暖一服,可洗五度。

【主治】暴赤眼,肿痛。

66643 秦皮汤

《圣济总录》卷一一〇。为《圣惠》卷三十二“秦皮散”之异名。见该条。

66644 秦皮汤

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】秦皮(锉)一两半 防风(去叉)三两 车前子(微炒)二两 黄连(去须)三分

【用法】上为粗散。每服五钱匕,水一盞半,煎至七分,去滓,食后、临卧温服。

【主治】热肿,俱向暖处,周身毒热蒸人者。

66645 秦皮汤

《幼幼新书》卷十八引《龙木论》。为《圣惠》卷三十二“秦皮洗眼汤”之异名。见该条。

66646 秦皮汤

【方源】《普济方》卷七十七引《医方大成》。

【组成】秦皮 荆芥穗 赤芍药 当归各

一两半 黄连一两

【用法】上为粗末。每用三钱，水二盏，煎至三沸，滤去滓，热洗。

【主治】肝寒滞，热毒不可宣通，目急痒痛。

66647 秦皮汤

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】秦皮 蕤仁（去皮） 黄连（去须） 山梔子各半两 黄柏一两 大枣五枚（去核）

【用法】上为粗末。以水四升，煎取二升，去滓，微暖数洗之，冷则重暖，余滓再煎洗。

【主治】眼暴赤，积年睑烂不愈，涩痛，睛上有白膜。

66648 秦皮汤

《普济方》卷七十五。即《圣惠》卷三十二“洗眼秦皮汤”。见该条。

66649 秦皮汤

《普济方》卷八十五。即《圣济总录》卷一一三“淋洗秦皮汤”。见该条。

66650 秦皮散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】秦皮 前胡（去芦头） 蕤仁 黄芩 川升麻 赤芍药 白薇 枳壳（麸炒微黄，去瓢） 甘草（炙微赤，锉）各一两 梔子仁半两 川大黄二两（锉碎，微炒） 川芒消二两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒热毒气攻眼，忽生赤翳，疼痛不可视明，或眼外浮肿。

66651 秦皮散

《圣惠》卷十三。为《外台》卷二引《范汪方》“秦皮汤”之异名。见该条。

66652 秦皮散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】秦皮三两 防风（去芦头） 黄连（去须） 甘草（炙微赤，锉）各一两半

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼赤肿痛有翳，胬肉，多泪难开。

66653 秦皮散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】秦皮三两 辛夷二两 黄柏五两（锉） 黄连二两（去须） 玄参一两 莽草一两（微炙） 甘草二两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】一切风赤眼，生疮。

66654 秦皮散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】秦皮汤（《圣济总录》卷一一〇）。

【组成】秦皮一两 黄连一两（去须） 梔子仁三分 川大黄半两（锉碎，微炒） 细辛半两 蛇衔草三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】热毒攻眼，睑垂肿痛。

66655 秦皮散

【方源】《局方》卷七。

【组成】秦皮 滑石（桂府者，捣碎） 黄连（去须）各十两

【用法】上为细末。每用半钱，沸汤泡，去滓，温热频洗。

【主治】①《局方》：大人小儿风毒赤眼肿痛，痒涩眵泪，昏暗羞明。②《医统》：痘毒入眼。

66656 秦皮散

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】秦皮（去粗皮） 黄连（去须） 露蜂房 柴胡（去苗） 蛇衔 钩藤 紫苏 胡黄连 丹砂（别研）各等分

【用法】上除丹砂外，为散，与丹砂末拌匀。每服二钱匕，食后煎竹叶汤调下，一日三次。

【主治】目风，赤热痛，泪出。

66657 秦皮散

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】秦皮（去粗皮）二两 瞿麦穗 升

麻 枳壳(去瓢,麸炒) 黄连(去须) 前胡(去芦头) 梔子仁各一两半 薤白子 车前子 大蓝实 防风(去叉) 决明子(炒) 苋实 羚羊角(镑) 黄柏(去粗皮,炙)各一两

【用法】上为散。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后米饮送下,临卧再服。加至三十丸。

【主治】眼昏晕,不以年月深浅,恐变为内障。

【备考】本方方名,据剂型,当作“秦皮丸”。《普济方》本方用法:上为散,每服三钱,食后、临卧温浆水汤调下。

66658 秦皮散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】秦皮三两 莽草二两 细辛 苦参各一两半 黄芩 当归各一两

【用法】上为粗末。每洗时用猪蹄汤和药一两,同煎二十沸,去滓,通手以绵惹洗,以五枝煎贴之。

【功用】消逐恶肉脓水。

66659 秦皮散

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】当归 黄芩 川芎 荆穗 宣连 山枝仁 羌活 赤芍 秦皮 黄柏 蔓荆子各等分

【用法】上细锉。用新汲水滤去沙灰,用二大钱煎,温热泡洗。

【主治】暴赤肿痛,疼痛洒泪。

66660 秦皮散

【方源】《普济方》卷二九三引《鲍氏肘后方》。

【组成】秦皮三两 莽草二两 细辛 苦参半两 黄连 黄芩一两 大黄三分 当归

【用法】上为粗末。每用一两,水煎,去滓洗之,一日一次。

【主治】瘰癧。

【备考】方中细辛、黄连、当归用量原缺。

66661 秦皮散

《普济方》卷七十七。即《圣惠》卷三十二“洗眼秦皮汤”。见该条。

66662 秦皮煎

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】秦皮 黄耆 木香 黄连 黑参各一两

【用法】上为末,以水一盞,浸药三宿,去滓,入蜜四两,煎成膏用之。

【主治】神祟疼痛外障。

66663 秦龟饮

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】秦龟血

【用法】饮之。

【主治】入被毒箭伤。

66664 秦矾散

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】秦艽 蓝漆各一钱五分 羌活 黄丹各一钱 胆矾 水银各五分

【用法】上为末,香油调涂。

【主治】疥疮。

66665 秦桂丸

《三因》卷十七。为《产乳备要》“螽斯丸”之异名。见该条。

66666 秦桂丸

【方源】《普济方》卷三三六引《仁存方》。

【组成】秦艽 桂心 杜仲(炒) 防风 牡丹皮 厚朴(姜炒)各三分 附子 阳起石(煨) 白茯苓各一两半 白薇 当归 干姜 牛膝 沙参 半夏子各半两 人参 卷柏 鹿茸各一两 细辛二两一分

【用法】上药各为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,食前温酒送下。

【主治】妇人无子。

66667 秦桂丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】肉桂一两(去皮) 秦艽一两 附子一两(炮) 当归二两 厚朴一两(制) 人参一两 干姜一两(炒) 白薇一两 半夏一两(制)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服二三钱。

温酒送下。

【主治】血海久冷不孕，脉细涩者。

【方论选录】血海久冷，冲任少熏育之权，故腹痛经迟，时发寒热，而不能孕子焉。桂、附暖血海以逐冷，姜、朴温中气以散寒；当归养血脉，人参扶元气，秦艽活血通经，半夏化痰燥湿，白薇降泄以除寒湿热也。炼蜜以丸之，温酒以下之，俾血海温暖，则久冷顿消，而腹痛无不退，寒热无不除，何患天癸不调，不能孕子乎。

66668 秦椒丸

【方源】《千金》卷二。

【组成】秦椒 天雄各十八铢 玄参 人参 白薇 鼠妇 白芷 黄耆 桔梗 露蜂房 白僵蚕 桃仁 蛭螬 白薇 细辛 芫荽各一两 牡蛎 沙参 防风 甘草 牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子 芍药 桂心 大黄 石斛 白术各二十铢 柏子仁 茯苓 当归 干姜各一两半 泽兰 干地黄 芎藭各一两十八铢 干漆 白石英 紫石英 附子各二两 钟乳二两半 水蛭七十枚 虻虫一百枚 麻布叩复头七寸（烧）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，稍加至二十丸，酒送下，一日二次。若有所去如豆汁、鼻涕，此是病出，觉有异，即停。

【功用】荡涤腑脏，使玉门受子精。

【主治】妇人绝产，生来未产。

【方论选录】《千金方衍义》：此即第一方白薇丸之立法，方中附子不逮，益以天雄、白术、虻虫、鼠妇；不逮，益以蜂房。以蜂房能治崩中漏下五色，又解钟乳、白术相反之毒，苏颂所谓下乳石毒也。

66669 秦椒丸

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】秦椒（去目及闭口，炒出汗） 生干地黄（焙） 旋覆花 白芷各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米泔水送下。

【主治】髭发黄悴。

66670 秦椒丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】秦椒（去目及闭口，炒出汗）六两 茴香子（炒）一两 黄蜡四两（熬化，入地黄汁少许搅匀）

【用法】上为末，熔蜡为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】妊娠小便利。

66671 秦椒散

【方源】《外台》卷四引《深师方》。

【组成】秦椒一分（汗） 瓜蒂二分

【用法】上为末。每服方寸匕，水送下，一日三次。

【主治】①《外台》引《深师方》：膏痒。②《千金》：黄疸。

【方论选录】《千金方衍义》：黄疸饮少而溺反多，虽有湿热固结于中，因胸中之阳本虚，所以不能消水，故用秦椒之辛烈温中破结；瓜蒂之苦寒逐湿除寒。不得泛用利水药伤伐下焦阳气也。

66672 秦椒散

【方源】方出《圣惠》卷四十一，名见《圣济总录》卷一八七。

【组成】白芷一两 旋覆花一两 秦椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 桂心二两

【用法】上为细散。每服以井花水调下二钱，一日三次，三十日黑。

【功用】《圣济总录》：补虚益髭发，延年驻颜。

【主治】人年未至四十，头须尽白。

66673 秦椒散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】秦椒（去目及闭口，炒出汗）一分 干漆（炒烟尽） 生干地黄（焙） 马齿苋（重午日收，阴干）半两 石榴皮 柳枝 桑根白皮 胡桃皮 白刺皮各一分

【用法】上锉细。入瓷瓶内，以盐泥固济，用炭火十斤烧，以炭销为度，待冷细研。每

日早、晚揩齿，髭发白即变黑。

【主治】髭发白。

66674 秦艽饮子

【方源】《外台》卷十五引《广济方》。

【异名】秦艽散（《圣惠》卷二十）。

【组成】秦艽 常山 人参 羚羊角（屑）各二两 甘草三两

【用法】上切。以水六升，煮取二升，绞去滓，分温二服，一日二次，如人行四五里久，进一服。取快吐不利。

【功用】催吐。

【主治】①《外台》引《广济方》：心虚感风，头旋心忪，痰饮筑心闷，悠悠惚惚不能言语。②《圣惠》：风痰心昏，痰涎流溢。

【宜忌】宜微吐痰；忌生菜、生葱、热面、荞麦、猪肉、鱼、海藻、菰菜。

66675 秦艽饮子

《婴童百问》卷六引《全婴方》。即《小儿药证直诀》卷下“地骨皮散”加秦艽。见该条。

66676 秦艽饮子

【方源】《医方类聚》卷一三二引《济生》。

【异名】秦艽饮（《得效》卷三）、秦艽散（《医统》卷十八）。

【组成】秦艽（去芦） 当归（去芦，酒浸） 芍药 白术 官桂（去皮，不见火） 茯苓（去皮） 熟地黄（酒蒸） 橘红 小草 川芎各一两 半夏（汤泡） 甘草（炙）各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】五疸，口淡耳鸣，脚弱，微寒发热，小便白浊。

66677 秦艽饮子

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术 茯苓 秦艽各二钱 薄桂 橘红各一钱

【用法】水煎服。

【主治】黄疸。口淡咽干，恶寒发热。

66678 秦艽煮散

【方源】《普济方》卷一九五引《圣惠》。

【组成】秦艽（去苗土）三两半 芒消一两

【用法】上为末。用牛乳二盏半，煎至一盏半，食前温分二服。

【主治】黄疸。身体面黄，及爪甲、小便俱黄，心神烦闷。

66679 秦艽煮散

《圣济总录》卷六十。为《外台》卷三十七引《古今录验》“秦艽汤”之异名。见该条。

66680 秦川剪红丸

【方源】《永类铃方》卷四。

【组成】芫花一两（醋煮） 巴豆九粒（去油） 甘遂一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，候干，用红罗包之，绢线扎系，剪断。服前药（剪红丸）内加用一丸，万病转，汤使五更初服。瘵疾，醋炙肉咽；妇人，醋汤送下。

【主治】气膈。

66681 秦川剪红丸

《奇效良方》卷十六。为《永类铃方》卷四“剪红丸”之异名。见该条。

66682 秦王背指散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】宣连 槟榔各等分

【用法】上为末。伤扑，干贴；消肿，冷水调，鸡翎扫妙。

【功用】消肿毒。

【主治】一切伤损，血出。

66683 秦艽人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽（去苗土） 人参 柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襕，醋炙） 玄参 葛根（锉） 附子（炮裂，去皮脐） 干漆（炒令烟出） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉）各半两 干姜（炮）一分

【用法】上锉散。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓，空心、临卧温服。

【主治】虚劳发热，三焦不顺，饮食减少，肢节疼痛。

66684 秦艽天麻汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】秦艽一钱五分 天麻 羌活 陈皮 当归 川芎各一钱 炙甘草五分 生姜三片 桑枝(酒炒)三钱

【用法】水煎服。

【主治】肩背臂膊痛。

【加减】挟寒，加附子、桂枝。

66685 秦艽牛蒡汤

《金鉴》卷七十四。为《准绳·疡医》卷五“秦艽汤”之异名。见该条。

66686 秦艽升麻汤

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】升麻 干葛 甘草(炙) 芍药 人参各半两 秦艽 白芷 防风 桂枝各三钱

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏，连须葱白三茎，长二寸，约至一盏，去滓，稍热服，食后。服药毕，避风寒处卧，得微汗出则止。

【主治】中风，手足阳明经，口眼喎斜，恶风恶寒，四肢拘急。

【方论选录】①《医略六书》：血脉受风，营气不能灌注经络，故四肢拘急，口眼歪斜，而恶见风寒焉。秦艽祛风活血，桂枝温经散风，升麻、葛根升阳明之津气，防风、白芷燥太阴之湿邪，人参扶元气，白芍敛营阴，甘草缓三焦之急，葱白通一身之阳。燥润合宜，补散有法，则邪自外解而筋得所养，四肢无不和柔，口眼无不端正也，何恶见风寒之有。②《古今名医方论》：李士材曰：至哉坤元，为五脏之主，木胜风淫，则仓廩之官承制，脾主四肢，故痿痹也。口为土之外候，眼为木之外候，故俱病也。升麻、白芷皆阳明本药，故用为直入之兵，人参、桂枝固其卫气，芍药、秦艽和其营血，防风卑贱之卒，随令而行，葱根发汗之需，无微不至，又借甘草以和之，而邪有不散者乎？

66687 秦艽白术丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽(去芦) 桃仁(汤浸，去皮尖) 皂角仁(烧存性)各一两 当归梢(酒浸) 泽泻 枳实(麸炒黄) 白术各五钱 地榆三钱

【用法】上为细末，和桃仁泥研匀，煎熟汤打面糊为丸，如鸡头子大，令药光滑，焙干。每服五七十丸，空心白汤送下，待少时以美膳压之。

【主治】痔疾并痔漏有脓血，大便燥硬而作疼痛不可忍。

【宜忌】忌生冷、硬物、冷水、冷菜之类；并湿面、酒，及辣辛热、大料物之类。

【方论选录】①《兰室秘藏》：其疾甚者，当以苦寒泻火，以辛温和血润燥，疏风止痛，是其治也。以秦艽、当归梢和血润燥；以桃仁润血；以皂角仁除风燥；以地榆破血；以枳实之苦寒补肾，以下泄胃实；以泽泻之淡渗使气归于前阴，以补清燥受胃之湿邪也；白术之苦甘，以苦补燥气之不足，其甘味以泻火而益元气也。故曰甘寒泻火，乃借枳实之寒也。②《成方便读》：此方以秦艽入阳明，润燥宣风，能行能散；白术健脾胜湿，不特能利腰脐之血结，且可使离经之血仍统于脾，而协之以归尾、桃仁之破血润燥；枳实、皂角之导滞宽肠；泽泻以渗湿；地榆以凉瘀。丸以缓之，亦不欲其速化之意，立方之法，不愧为四大家之一耳。

【备考】本方改为汤剂，名秦艽白术汤(见《外科经验方》)。

66688 秦艽白术汤

《外科经验方》。即《兰室秘藏》卷下“秦艽白术丸”改为汤剂。见该条。

66689 秦艽白术汤

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】秦艽 白术 甘草 防风 升麻 黄柏 陈皮 泽泻 煨大黄 当归 枳壳 红花 柴胡 芍药

【主治】痔疮或肛门痛。

66690 秦艽地黄丸

《中国医学大辞典》。即《校注妇人良方》卷三“秦艽地黄汤”改为丸剂。见该条。

66691 秦艽地黄汤

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】秦艽 熟地黄(自制) 当归各一钱 川芎 芍药 牡丹 白术 茯苓各一钱半 钩藤钩一钱 柴胡 甘草(炙)各三分

【用法】水煎服。

【主治】肝胆经风热血燥，肩臂疼痛，或筋脉引急，或时牵痛，其内症发热，或寒热晡热，月经不调，或肢体痠痛。

【备考】本方改为丸剂，名“秦艽地黄丸”(见《中国医学大辞典》)。

66692 秦艽地黄汤

【方源】《痲痹机要》卷下。

【组成】秦艽 生地黄 当归 川芎 羌活 防风 荆芥 甘草 白芷 升麻 白芍药 大力子(蒸) 蔓荆子各一钱

【用法】水煎服。

【主治】风热血燥，筋骨作痛。

66693 秦艽地黄汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】秦艽 丹皮 茯苓 白术 钩藤 甘草 生地 柴胡

【主治】臂热。

66694 秦艽当归汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】秦艽(去苗土) 当归(二味醇酒浸经宿，焙) 人参 干漆(炒烟出) 白茯苓(去黑皮) 白术各半两 柴胡(去苗) 鳖甲(去裙襴，醋炙)各一两 木香 乌头(炮裂，去皮脐) 甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盞半，加小麦五十粒，同煎取一盞，去滓，稍热服。

【主治】虚劳寒热，四肢羸困，不思饮食。

66695 秦艽当归汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】大黄(煨)四钱 秦艽 枳实各一

钱 泽泻 当归梢 皂角仁 白术各五分 红花少许 桃仁二十个

【用法】上都作一服，水三盞，煎至一盞，去滓，食前热服。

【主治】痔漏，大便结燥疼痛。

【宜忌】宜避风寒；忌房事、酒、湿面、大辛热物。

66696 秦艽竹沥汤

【方源】《奇效良方》卷三。

【组成】秦艽二两(去苗) 竹沥一升 石膏三两 白茯苓 龙脑各一两半 玄参一两 防风一两 生铁二十斤(用水二斗，煮取一斗，去铁)

【用法】上为散。入铁汁中煮取五升，去滓，纳竹沥和匀，温服二合，不拘时候。

【主治】风狂乱走。

66697 秦艽防风汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽 防风 当归身 白术各一钱五分 炙甘草 泽泻各六分 黄柏五分 大黄(煨) 橘皮各三分 柴胡 升麻各二分 桃仁三十个 红花少许

【用法】上锉散，都作一服。水三盞，煎至一盞，去滓，空心稍热服之。

【主治】痔漏，每日大便时发疼痛。

【宜忌】宜避风寒；忌房事、酒、湿面、大辛热物。

【临证举例】痔漏《外科发挥》：一男子患痔成漏，每登厕则痛，以秦艽防风汤加条芩、枳壳，四剂而愈。

【备考】《医统》有白茯苓。

66698 秦艽苍术汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽(去苗) 桃仁(汤浸，去皮，另研) 皂角仁(烧存性，另研)各一钱 苍术(制) 防风各七分 黄柏(去皮，酒洗)五分 当归梢(酒洗) 泽泻各三分 梭身槟榔一分(另研) 大黄少许

【用法】上除槟榔、桃仁、皂角仁三味外，

余药咬咀，如麻豆大，都作一服。水三盏，煎至一盏二分，去滓，入槟榔等三味末，再上火煎至一盏，空心热服。待少时以美膳压之，不犯胃气也。

【主治】风热乘食饱不通，气逼大肠，致患痔漏，大便秘涩，必作大痛。

【宜忌】①《兰室秘藏》：服药日忌生冷硬物，及酒、湿面、大料物、干姜之类。②《疮疡经验全书》：忌桃、李、梅、杏果品、油、胡椒之类。

【加减】如有白脓，加白葵花头五朵（去萼心），青皮半钱（不去白），入正药中同煎，木香三分（为细末）。

66699 秦艽苍术汤

【方源】《疡科选粹》卷五引《良方》。

【组成】桃仁 皂角 秦艽 苍术各一钱 泽泻五分 黄柏三分 槟榔五分 木香三分 地榆五分 白术五分 当归一钱 白蜀葵三钱 芍药三分 大黄少许 枳壳五分 槐角子五分

【用法】上为末。将木香、桃仁、皂子别研，用水二钟，煎至七分，再添水一钟，煎至六分，空心温服经年。

【主治】内外痔漏，脓血不止。

【宜忌】忌腥、房事。

66700 秦艽扶羸汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】软柴胡二钱 人参（去芦头） 鳖甲（米醋炙） 秦艽 地骨皮各一两半 半夏（汤洗七遍）各一钱 紫菀茸 甘草各一两五分 当归（洗，焙）一两一分

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞，加生姜五片，乌梅、大枣各一枚，煎至八分，去滓，食后通口服。

【主治】肺痿。骨蒸劳嗽，或寒或热，声嘎羸瘦，自汗，四肢怠惰，不美饮食。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足少阳药也。柴胡、秦艽散表邪兼清里热，柴胡解肌热，秦艽退骨蒸；鳖甲、地骨滋阴血而退骨

蒸，地骨皮凉血，退有汗骨蒸；参、草补气；当归和血；紫菀理痰嗽，润肺除痰；半夏发音声。肺属金，声之所从出也，有物实之，则金不鸣，燥湿除痰，则金清而声自开矣。有声嘶而哑者，是肺已损也，难治。表里交治，气血兼调，为扶羸良剂。

66701 秦艽羌活汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】秦艽汤（《医学入门》卷八）。

【组成】羌活一钱二分 秦艽 黄耆各一钱 防风七分 升麻 炙甘草 麻黄 柴胡各五分 藁本三分 细辛少许 红花少许

【用法】上锉一剂。水二盏，煎至一盏，去滓，空心服之。

【主治】痔漏成块下垂，不任其痒。

66702 秦艽补漏汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 黄连 黄芩 山楂 连翘 秦艽 地榆 雷丸 枳壳 槐角 白芷 棕根 升麻各等分

【用法】水三碗，煎二碗。空心服之。

【主治】痔漏。

【加减】如肥入，加条黄芩三分。

66703 秦艽柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】秦艽（去土） 柴胡（去苗） 知母（焙） 青蒿各一两 大黄（锉，炒） 鳖甲（醋炙，去裙襴） 鬼白 常山各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至半盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒余毒，潮热不解。

66704 秦艽涂敷方

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】秦艽半两

【用法】上为末。涂敷疮上，以帛裹缚之，每日二次。

【主治】久痢瘡。

66705 秦艽黄芩汤

【方源】《儒京直指》卷二。

【组成】秦艽二钱 黄芩一钱半 连翘三

钱 银花三钱 通草一钱半 赤苓三钱 大豆卷二钱 广郁金二钱 飞滑石六钱(包煎) 泽泻三钱

【主治】湿热内蒸，午后身热，脘闷溲赤。

66706 秦艽寄生汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】秦艽 寄生 白芍 当归 熟地 蒲黄(半生半熟) 川断 独活 广皮 红花 山楂 香附 乌药

【功用】调和营卫，祛关节间之风、经隧间瘀血。

【主治】因产时损动，血气升降失常，留滞关节，筋脉引急所致产后遍身疼痛，甚则腰背强硬，不能俯仰，手足拘挛，不能屈伸；或身热头痛；或咳唾多痰；久则为痿痹，为瘰疬，为半身不遂。

【方论选录】产后气血俱虚，气虚则气之行于脉外也，多壅而不能周通一身；血虚则血之行于脉中也，常滞而不能滋荣于一体。外风乘虚而入，余血因虚而阻，遍身筋脉时作疼痛；甚则腰背强硬，不能俯仰，手足拘挛，不能屈伸，或身热头痛，或咳唾多痰，久则为痿痹，为瘰疬，为半身不遂诸症。是方秦艽、独活、寄生以祛风，香附、陈皮、乌药以利气，四物、川断以养血，红花、蒲黄、山楂以行血。壅者散之，滞者行之，周身流通，毫无阻碍，外风不入，内风不留，有何疼痛哉。

66707 秦艽鳖甲饮

《医略六书》卷十九。为《卫生宝鉴》卷五“秦艽鳖甲散”之异名。见该条。

66708 秦艽鳖甲散

【方源】《局方》卷五(吴直阁增诸家名方)。

【组成】荆芥(去梗) 贝母(去心) 天仙藤 前胡(去芦) 青皮(去白) 柴胡(去芦) 甘草(炙) 陈皮(去白) 秦艽(去芦，洗) 鳖甲(去裙，醋炙) 各一两 干葛二两(焙) 白芷 肉桂(去粗皮) 羌活各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，同煎至八分，稍热服，酒调亦得，不拘时候。

【功用】养气血，调荣卫，解倦怠。

【主治】男子妇人气血劳伤，四肢倦怠，肌体消弱，骨节烦痛，头昏颊赤，肢体枯槁，面色痿黄，唇焦口干，五心烦热，痰涎咳嗽，腰背引痛，乍起乍卧，梦寐不宁，神情恍惚，时有盗汗，口苦无味，不美饮食，及山岚瘴气，寒热往来。

66709 秦艽鳖甲散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【异名】秦艽鳖甲饮(《医略六书》卷十九)。

【组成】柴胡 鳖甲(去裙，酥炙，用九肋者) 地骨皮各一两 秦艽 当归 知母各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞，加青蒿五叶，乌梅一个，煎至七分，去滓，空心、临卧温服。

【功用】《中医大辞典》：滋阴养血，清热除蒸。

【主治】阴亏血虚，外感风邪传里化热，致患风劳，骨蒸潮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，呼吸气粗，神疲乏力，盗汗。

①《卫生宝鉴》：骨蒸壮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，气粗，四肢困倦，夜有盗汗。②《女科指掌》：经闭。③《金匱翼》：风劳之证，肌骨蒸热，寒热往来，痰嗽，盗汗，黄瘦，毛焦口臭，或成疳利，由风邪淹滞经络，瘀郁而然。

【方论选录】①《医方考》：风，阳气也，故在表则表热，在里则里热，附骨则骨蒸壮热，久蒸则肌肉消瘦。无风不作骨蒸，此昆之立言也。罗谦甫氏之主此方，盖有神契者矣。柴胡、秦艽，风药也，能驱肌骨之风；骨皮、知母，寒品也，能疗肌骨之热；鳖，阴类也，甲，骨属也，骨以及骨，则能为诸药之向导，阴以养阴，则能退阴分之骨蒸；乌梅味酸，能

引诸药入骨而收其热；青蒿苦辛，能从诸药入肌而解其蒸；复有当归，一以养血，一以导诸药入血而除热于阴尔。②《医略六书》：营气受风，遏热伤乎阴血，故肌肉消瘦，骨蒸潮热不已，名曰风痹。生鳖甲专入厥阴，力能滋阴而散结；秦艽肉兼走阳明，性善活血以祛风，青蒿解少阳之热；柴胡疏肝胆之邪；当归益荣养血；知母润燥益阴；地骨皮退肌表之热；乌梅肉敛肝肾之阴。使热退阴充，则风自外解，而骨蒸无不退，肌肉无不生矣。此滋阴解热之剂，为风痹骨蒸，消瘦之专方。

66710 秦皮大黄酒

《伤寒总病论》卷三。为《外台》卷二引《小品方》“秦皮汤”之异名。见该条。

66711 秦皮洗眼方

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】秦皮（去粗皮，锉）二两

【用法】上以浆水一碗，煎三五沸，浸一宿。去滓洗眼，日三二度。

【主治】风毒冲目，虚热赤痛。

66712 秦皮洗眼方

《圣济总录》卷一〇六。为方出《外台》卷二十一引谢道人方，名见《圣济总录》卷一〇三“秦皮汤”之异名。见该条。

66713 秦皮洗眼汤

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】秦皮汤（《幼幼新书》卷十八引《龙木论》）。

【组成】秦皮二两 秦艽（去苗） 细辛 防风（去芦头）各一两 甘草半两（炙）

【用法】上为细散。每用一两，以水一大盏半，煎至一盞，绵滤去滓，每暖三合洗。

【主治】①《圣惠》：热毒风上攻，眼睛疼痛。②《幼幼新书》引《龙木论》：疮疹入眼。

66714 秦皮洗眼汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】秦皮一两 秦艽一两 甘草半两 玄参一两 柴胡（去苗）三分

【用法】上为粗末。每用一两，以水三盏，煎取一盞半，绵滤去滓，微热淋洗，冷即再

暖用。

【主治】热毒风上攻，目睛疼痛。

66715 秦皮洗眼汤

《普济方》卷七十七。即《圣惠》卷三十二“洗眼秦皮汤”。见该条。

66716 秦椒剪红丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】秦椒 大黄 三棱 莪术 干漆 木香 槟榔 贯众 雄黄

【用法】上为末，神曲糊为丸。五更时用鸡汤送下。

【主治】虫膈、血膈。虫膈与血膈两端，皆饮食不下，皆有痛处，但虫则作止无常，攻动不一，或饥则盛，而稍得食则缓，血则口中自觉有血腥气，时作呃逆；或因大怒而血逆于上；或因受伤而血郁于中。

【方论选录】然虫膈最易裹血，血膈每易生虫，故出一方而两治之。方中行气破血之药，居其大半，而以杀虫之药辅之，用神曲糊丸者，助脾而复其健运之职。送服用鸡汤者，以甘美之味而易入出口也。

66717 秦皮汤洗眼方

《圣惠》卷三十二。为原书同卷“洗眼秦皮汤”之异名。见该条。

66718 秦艽牛乳二味汤

《外台》卷四引许仁则方。为《外台》卷三十七引《古今录验》“秦艽汤”之异名。见该条。

66719 秦王续命大八风散

【方源】《千金翼》卷十六。

【组成】秦艽二两 防风二两 附子二两（炮，去皮） 菖蒲二两 茯苓二两 牛膝二两 桔梗二两 细辛一两 乌头二两（炮，去皮） 薯蓣一两 芎藭一两 远志二两半（去心） 天雄一两（炮） 石龙芮一两 蜀椒一两（去目及闭口者，汗） 石斛二两 白芷一两 龙胆一两 白术一两 山茱萸一两 桂心一两 菊花一两 女萎一两 厚朴一两（炙） 巴戟天一两 萆薢一两 牡荆子一两（无，用柏子仁） 干漆一两（熬） 肉苁蓉一两 五味子一两半 芍药一两 黄芩一两

白矾一两(烧汁尽) 续断一两 白藜一两
黄耆一两半

【用法】上为散。每服方寸匕，温清酒调下，一日三次，不知，稍增之，可至二三匕，以知为度。若苦心闷者，饮少冷水。

【功用】调和五脏，便利六腑。

【主治】诸风，五缓六急，或浮肿嘘喘，微痹，风虚不足，并风消胀满。

【宜忌】宜断房室百日；禁生鱼、猪肉、菘菜；热人禁用。

【加减】心气不足，短气，加人参、甘草各一两；腹痛，加杜仲、羊肾各二两

66720 秦家二十四味养胃丸

《医统》卷二十三。为《传信适用方》卷一引黄子耕方“秦绶锦家二十四味养脾丸”之异名。见该条。

66721 秦绶锦家二十四味养脾丸

【方源】《传信适用方》卷一引黄子耕方。

【异名】秦家二十四味养胃丸(《医统》卷二十三)。

【组成】丁香 沉香 木香各一钱半 附子六钱半(炮，去皮脐，秤) 陈皮(去白) 大腹皮 神曲(炒)各半两 白术 大麦芽(炒) 肉桂(去皮，不见火)各一两半 厚朴(去皮，姜制)三两 诃子(炮，去核)一两三钱 人参(去芦) 茯苓各四钱 缩砂仁八钱 革澄茄 白附子(炮) 高良姜(油炒) 红豆(去红皮) 胡椒(炒) 革菱 甘草(炙) 川姜(炮)各二钱 生姜十四两(切作片，焙干)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。食前细嚼，沸汤送下。

【主治】风冷寒湿邪气，腹胀痞满刺痛，肠鸣泄泻，吐逆吞酸，羸弱困怠无力，不思饮食，一切脾胃之疾。

泰

66722 泰山茵芋散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】泰山茵芋(炙) 防风各七分 川

乌头(炮，去皮脐) 干姜 白藜各三分 桂心一分

【用法】上为末。每服方寸匕，酒调下，稍增至二匕，以知为度。

【主治】一切冷风，筋骨羸颤，关节拘挛，湿痹脚弱，四肢痛痒，皮肉隐疹，或发成疮，或热如疟，或加短气胸满，或欲吐。

66723 泰山盘石散

《景岳全书》卷六十一。为《医统》卷八十五“太山磐石散”之异名。见该条。

盞

66724 盞蒸

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】持羊背皮或羊肉三脚子(卸成事件) 草果五个 良姜二钱 陈皮二钱(去白) 小椒二钱

【用法】上件用杏泥一斤、松黄二合、生姜汁二合同炒，葱、盐五味调匀，入盞内蒸令软熟，对经捲儿食之。

【功用】补中益气。

66725 盞落汤

【方源】《内经拾遗》。

【异名】落盞汤(《丹溪心法附余》卷十五)。

【组成】石菖蒲 吴茱萸 高良姜 香附子 陈皮

【用法】水一碗，煎七分，去滓，滴香油三五点，温服。

【主治】心疝心痛。

66726 盞落汤

【方源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂方》。

【异名】落盞汤(《济阳纲目》卷七十)。

【组成】麻黄(去根节)七钱半 人参(去芦)五钱 陈皮(去白)七钱 甘草(去皮)八钱 御米壳(去隔瓤顶蒂，蜜炒黄)三钱

【用法】上咬咀。每服五钱，加生姜七片，

煎至七分，去滓，食远温服。

【主治】偏正头疼、头风。

66727 盖落汤

【方源】《本草纲目》卷三十引《赵氏经验》。

【组成】核桃一个 枣子一枚（去核夹桃，纸裹煨熟）

【用法】以生姜汤一钟，细嚼送下。永久不发。

【主治】急心气痛。

66728 盖落汤

《证治宝鉴》卷十一。为《普济方》卷四十五“盖落散”之异名。见该条。

66729 盖落散

【方源】《普济方》卷四十五。

【异名】盖落汤（《证治宝鉴》卷十一）。

【组成】米壳（去顶膈净）二两 柴胡五钱 桔梗五钱 甘草五钱

【用法】上为末。每服五钱，水一盞，煎至七分，入灯草一茎，去滓，食后服。若不住疼痛，加生姜五片，依前煎服。药先闻，药汁后服。

【主治】偏正头痛不可忍。

【备考】《证治宝鉴》有陈皮。

桂

66730 桂丸

【方源】《苏沈良方》卷四。

【组成】硃砂（研） 肉桂 甘遂 巴豆（去心皮，匀去油） 丁香 木香 芫花（醋炒焦）各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如小绿豆大。每服二三丸，温水送下。

【功用】养血，去积滞。

【主治】产后痢疾，寒积，崩中漏下。

①《苏沈良方》：产后痢。②《鸡峰》：年久冷积，诸药不效者。③《普济方》：产后崩中漏下。

66731 桂汤

《千金》卷八。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《集验方》“桂心汤”之异名。见

该条。

66732 桂浆

【方源】《本草图经》引《续传信方》（见《证类本草》卷十二）。

【组成】桂末二大两 白蜜一升

【用法】以水二斗，先煎取一斗，待冷，入新瓷瓶中，后下二物，搅二三百转令匀，先以油单一重覆上，加纸七重，以绳封之，每日去纸一重，七日开之，药成，气香味美，格韵绝高。夏月饮之。

【功用】①《本草图经》引《续传信方》：解烦渴，益气，消痰。②《遵生八笺》：祛暑，去热生凉，百病不作。

【宜忌】《医学入门》：上燥下寒者乃宜。

66733 桂浆

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】生蜜三斤 熟水一斗 赤茯苓（去皮，为末）三两 大麦芽（末）半两 细曲（末）半斤 桂（去粗皮，为细末）三两 杏仁（汤浸，去皮，生研如泥）一百个

【用法】上用前项药，蜜、杏仁并水一处搅匀，和水共量三大红盃，入于瓷罐子内，或瓷瓶内，以油纸封口，上用数重纸盖，泥固济，入冰窖内三日方熟，绵滤去滓，水浸饮之。

【功用】《饮膳正要》：生津止渴，益气和中，去湿逐饮。

【主治】伤寒。

66734 桂散

《元和纪用经》。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七“桂心散”之异名。见该条。

66735 桂膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】桂心 细辛 干姜（炮裂，锉） 川椒（去目及闭口者，微炒去汗）各半两 皂荚一分

【用法】上为末，以青羊脂和成膏。每用如枣核大，绵裹塞鼻中。

【主治】鼻塞，恒有清涕。

【备考】本方方名，《普济方》引作“塞鼻桂膏”。

66736 桂膏

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】桂（去粗皮）半两

【用法】上为末，以鱼膏和。拈如枣核大，塞耳中。

【主治】聤耳，耳中痛，脓血出。

【备考】本方方名，《普济方》引作“塞耳桂膏”。

66737 桂车汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】车前子一两 肉桂三分 知母一钱 王不留行二钱

【用法】水煎服。一剂即通。

【功用】泻膀胱之火以利水。

【主治】膀胱之火壅塞，以致小便流白浊，如米泔之汁，如屋漏之水，或痛如刀割，或涩似针刺，溺溲短少，大便后急。

66738 桂心丸

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七。

【组成】桂心二两 乌头一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，渐加之。

【主治】卒心痛。

【宜忌】《外台》：忌生葱、猪肉。

66739 桂心丸

【方源】方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷一八三。

【组成】桂心半两 白石英 麦门冬 枳实 白鲜皮 贝母 茯神 槟榔仁 天门冬 各二两半 车前子一两 人参 前胡 橘皮 白薇 杏仁各一两半 郁李仁三两 桃仁五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至三十丸，一日二次，以竹叶饮送下。

【主治】积气热发，气上冲不得息，欲死不

得卧。

【方论选录】《千金方衍义》：本虚邪实，故用桂心、石英、人参、茯神、天麦二冬固本滋阴；前、杏、橘、贝、白薇、白鲜皮疏肺泄气；槟榔、车前、郁李、桃仁分调血气而顺下之。更以竹叶饮子清润诸味，但加生姜之辛散而下前丸，上下开泄其气也。

66740 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】桂心一两 川椒三两（去目及闭口者，微炒去汗） 甘草三分（炙微赤，銼） 当归三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】上气咳逆，腹中坚痞，往来寒热，令人羸瘦，不能饮食，或时下痢，腹中疼痛。

66741 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桂心二两 干姜二两（炮裂，銼） 丹参三两 杜仲三两（去粗皮，炙微黄，銼） 牛膝三两（去苗） 续断三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】五种腰痛并冷痹。

66742 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桂心三分 干姜半两（炮裂，銼） 丹参一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，銼） 牛膝一两（去苗） 附子三分（炮裂，去皮脐） 续断二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚损，腰脚冷痹不仁。

66743 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】桂心一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研如膏） 甘草一分（炙微赤，銼） 干姜一分（炮裂，銼） 百

合一分 麦门冬半两 (去心, 焙)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如羊枣大。以绵裹一丸, 徐咽津, 不拘时候。

【主治】咳嗽, 咽喉干燥, 语无声音。

66744 桂心丸

【方源】方出《圣惠》卷四十六, 名见《普济方》卷一六〇。

【组成】桂心一两 不蛀皂荚五挺 (去黑皮, 涂酥炙黄焦, 去子) 栝楼一枚 (全者, 炙令干) 甜葶苈一两 (隔纸炒令紫色)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 以粥饮送下, 不拘时候。

【主治】咳嗽, 喉中呀呷。

66745 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桂心三分 川乌头一两 (炮裂, 去皮脐) 柴胡一两 (去苗) 赤芍药三分 槟榔三分 木香半两 桃仁一两 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 当归三分 (锉, 微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以粥饮送下, 不拘时候。

【主治】疝气急痛, 不思饮食, 肌体瘦弱。

66746 桂心丸

《圣惠》卷四十九。为《外台》卷十二引《必效方》“练中丸”之异名。见该条。

66747 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桂心一两 诃黎勒皮一两 白术一两 厚朴一两半 (去粗皮, 涂生姜汁, 炙令香熟) 橘皮二分 (汤浸, 去白瓤, 焙) 附子三分 (炮裂, 去皮脐) 干姜三分 (炮裂, 锉) 防葵三分 吴茱萸三分 (汤浸七遍, 焙干, 微炒) 鳖甲一两 (涂醋, 炙令黄, 去裙襕) 木香三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以生姜、枣汤送下, 不拘时候。

【主治】疝癖气, 不能食, 腹中痛, 时嗽, 四肢少力。

66748 桂心丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】桂心 桃仁 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 诃黎勒皮 木香 昆布 (洗去咸味) 琥珀 (细研) 陈橘皮 (汤浸, 去白瓤, 焙) 白术 干木瓜 (去瓤) 沉香 鸡舌香各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以生姜汤送下。或丸如弹子大, 绵裹一丸, 不问早晚, 含化咽津亦得。

【主治】五膈气, 咽喉不利, 难下饮食, 胸背俱闷, 或时呕啰。

66749 桂心丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】桂心半两 石膏一两 (细研, 水飞过) 人参半两 (去芦头) 川大黄半两 (锉碎, 微炒) 半夏一两 (汤浸七遍去滑) 干姜一两 (炮裂, 锉) 巴豆二十枚 (水煮一日, 去皮心, 炒令黄) 附子一两 (炮裂, 去皮脐)

【用法】上为末, 研巴豆令匀, 炼蜜为丸, 如小豆大。每服五丸, 食前以温水送下。

【主治】心腹留饮, 宿食不化, 腹胀气闷, 痰逆头痛。

66750 桂心丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】桂心一分 黄耆半两 (锉) 礞石 (炼了者) 一分 独活半两 芎藭一分 川大黄半两 (锉碎, 微炒) 乌喙半两 (炮, 去皮脐) 川椒一百粒 (去目及闭口者, 微炒去汗) 虎胥骨半两 (涂醋, 炙黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服二十丸, 空心及晚食前以温浆水送下。

【主治】痿痹痿, 疼痛出脓血。

66751 桂心丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桂心三分 夜明砂三分 (微炒) 砒霜一分 斑蝥一分 (糯米拌, 炒黄, 去翅足) 硃砂三分 (细研) 甘草三分 (炙微

赤，锉） 皂荚一分（去黑皮，涂酥，炙令黄，去子）

【用法】上为末，用软饭为丸，如梧桐子大。每服三丸，于食前以温酒送下。

【主治】妇人月水久不通，四肢状如枯木，上气咳嗽，背膊烦闷，涕唾稠粘，少食多睡。

66752 桂心丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桂心半两 赤芍药半两 土瓜根半两 黄芩半两 汉椒一分（去目及闭口者，微炒去汗） 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 当归半两（锉，微炒） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人月水不利，忧郁，心下支满，血气上攻，心腹疼痛，不得睡卧。

66753 桂心丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桂心半两 没药半两 槟榔半两 干漆三分（捣碎，炒令黄燥烟出） 当归半两（锉，微炒） 赤芍药半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 延胡索一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 京三棱一两（微煨，锉） 牡丹半两 青橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，一日三四次。

【主治】产后血气不散，积聚成块，上攻心腹，或时寒热，四肢羸瘦烦痛，不思饮食。

66754 桂心丸

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桂心一两（为末） 芫花一两（为末） 香墨二挺（为末） 木香一两（为末）

【用法】上药以酢醋二升，先煎芫花为膏，次入木香并墨、桂为丸，如梧桐子大。每服

十丸，以热酒送下。

【主治】产后血气冲心疼痛。

66755 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】桂（去粗皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以紫苏酒送下。

【主治】①《圣济总录》：心痛不可忍。②《卫生总微》：小儿饮杂果，腹胀气急。

【备考】《卫生总微》本方用法：饭为丸，如绿豆大。每服五丸，熟水送下，未愈再服，不拘时候。

66756 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】桂（去粗皮）一两 赤石脂半两 干姜（炮）半两 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）三分 乌头（炮裂，去皮脐）三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服五丸，空心、日午、夜卧用醋汤送下。

【主治】久心痛。

66757 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】桂（去粗皮） 诃黎勒（煨，去核） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 上锉细，掘地作坑子，用炭火烧赤，吹去灰，以酢醋一茶盏，并药投于坑子中，急以瓷碗热盖，土培，匀令漏气，待冷即取出，焙干，入后药。

干姜（炮） 草豆蔻（去皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 木香各一两 阿魏（研）一分 槟榔（煨，锉）半两 郁李仁（汤浸，去皮尖，炒）半两 朴消二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，以温酒送下。初服急行二三百步，又服二十丸，掣两脚各二三十下，贴膝便坐，气即散也。

【主治】胁肋痛，腹冷，或食冷物不消，或块聚不转，心肋胀闷刺痛，霍乱。

66758 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】桂(去粗皮) 当归(锉, 焙) 赤白芍(炒) 延胡索(炒) 芎藭 生干地黄(炒) 各一两 硃砂半两 芫花根一斤(冬日采, 洗, 锉碎) 米醋五斤

【用法】上先以醋煮芫花根三分减二, 去根, 入硃砂慢火煎, 又减半, 下诸药末为丸, 如鸡头子大。产后血运烦闷, 童便煎赤马通, 磨下一丸; 产后血败, 腰脚肿痛, 生姜、童便磨下; 血气冲心痛, 薄荷汁、热酒磨下; 血气腹胀及痛, 生地黄汁同热酒磨下; 平常血气, 葱、酒磨下。

【主治】诸气及产后气病。

66759 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】桂(去粗皮) 赤茯苓(去黑皮) 赤石脂各三分 黄连(去须, 炒) 一两 麦芽(炒) 陈曲(炒) 石斛(去根) 干姜(炮) 当归(切, 焙) 人参 附子(炮裂, 去皮脐) 蜀椒(去目并闭口, 炒出汗) 龙骨各半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心暖酒送下, 米饮亦得, 日晡再服。

【主治】脾胃气虚, 飧泄不止, 饮食不消, 腹内雷鸣疔痛。

66760 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】桂(去粗皮) 五分 吴茱萸(汤洗, 焙干, 炒) 三两 白薇一分 干姜(炮) 一两 乌头(炮裂, 去皮脐) 半两 蜀椒(去目及闭口者, 炒) 三分 芎藭一两 防葵半两 白芷三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 食前温酒送下。

【主治】①《圣济总录》: 寒疝, 胸胁支满, 食饮不化, 脐腹疔痛。②《普济方》: 呕逆, 风痉, 脐强急, 不得俯仰。

【宜忌】《普济方》: 忌生葱、猪肉、冷水。

66761 桂心丸

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】桂(去粗皮) 旱莲子草 香白芷 菊花 旋覆花 巨胜子 草澄茄 牛膝(酒浸, 去皮) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 盐汤送下, 不拘时候。

【主治】髭发枯槁。

66762 桂心丸

【方源】《上清紫庭追劳仙方》。

【组成】熟地黄三两 干漆五钱(炒) 桂心一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 米饮送下。

【主治】三尸九虫。

66763 桂心丸

【方源】《普济方》卷二十八。

【组成】桂(去粗皮) 细辛(去苗芦) 白芷 防风(去叉) 干姜(炮) 甘草(炙) 芎藭各一两

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后温水送下。

【主治】肺寒, 内外合邪, 清涕多, 语声不出。

66764 桂心丸

《普济方》卷二十九。为《千金》卷十九“肾气丸”之异名。见该条。

66765 桂心丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桂心一两半 人参一两半 熟地五两 茯神一两半(去木) 柏仁三两(炒) 远志一两半 辰砂一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸。每服三钱, 酒煎, 去滓温服。

【主治】产后惊悸, 脉虚弦细者。

【方论选录】产后血气虚寒, 心阳亏损, 而心气不振, 心神失养, 故惊悸不安焉。桂心补火以振心阳, 人参扶元以补心气, 熟地补血滋心阴, 茯神渗湿安神志, 远志通肾交心, 柏仁养心宁神, 朱砂镇坠心气以安神也。蜜

丸酒下，使血气内充，则虚寒自散，而心阳振发，心气自雄，安有惊悸不已之患乎。

66766 桂心汤

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《集验方》。

【异名】桂汤（《千金》卷八）、紫桂汤、桂心散（《圣济总录》卷七）。

【组成】桂心八两

【用法】水四升，服取一升，分三服。

【主治】卒心痛、失音、小儿客忤。

①《肘后方》：卒心痛。②《千金》：卒失音。③《圣济总录》：小儿客忤。

【宜忌】①《外台》：忌生葱。②《普济方》：阳证伤寒失音者不可用。

【方论选录】《千金方衍义》：桂汤辛甘利窍，入口便达廉泉，津自溢出，通声之效于此可见。

【备考】《圣济总录》本方用桂二两（削去皮），浓煎，去滓，涂儿五心，常令湿。

66767 桂心汤

【方源】《外台》卷十六引《范汪方》。

【异名】喜汤。

【组成】桂心 牡蛎（熬） 芍药 龙骨 甘草（炙）各二两 大枣三七枚（一方十枚） 生姜五两

【用法】上咬咀，以水八升，煎取三升，去滓，温分三服。

【主治】虚喜梦与女邪交接，精为自出。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱。

66768 桂心汤

【方源】《外台》卷七引《集验方》。

【组成】桂心四两 生姜三两 吴茱萸二两

【用法】上切，以酒一大升，煎至三合，去滓，分温三服，如人行六七里一服。

【主治】寒疝，气来往冲心腹痛。

【宜忌】忌生葱。

66769 桂心汤

【方源】《外台》卷七引《古今录验》。

【组成】桂心半两 茱萸二两 芍药三两 当归二两 生姜半斤（无生姜以干姜五两代之）

【用法】上切，以水一斗二升，煮取四升，每服一升，昼三夜一。

【主治】心痛懊侬悁闷，筑筑引两乳，又或如刺，困极。

【宜忌】忌生葱。

66770 桂心汤

【方源】方出《千金》卷十二，名见《医方类聚》卷八十四引《王氏集验方》。

【组成】桂心（末）

【用法】每服方寸匕，日夜可二十服。

【主治】吐血。

66771 桂心汤

【方源】方出《千金》卷十四，名见《圣济总录》卷四十三。

【组成】甘草 桂心各二两 龙骨 麦门冬 防风 牡蛎 远志各一两 茯神五两 大枣二十枚

【用法】上咬咀，以水八升，煮取二升，分二服，相去如行五里许。

【主治】①《千金》：惊劳失志。②《圣济总录》：健忘。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菰菜、生葱、酢物。

【方论选录】《千金方衍义》：惊劳失志，总由心肾不交，虚风内动所致。故以茯神、远志交通心肾，龙骨、牡蛎镇摄虚风，桂心、防风通达肝气，麦冬、甘草、大枣滋益心脾，则虚风无隙可入矣。

66772 桂心汤

【方源】《千金》卷二十四。

【异名】甘草汤（《圣惠》卷三十八）。

【组成】桂心 麦门冬各三两 人参 甘草各二两 葱白半斤 豉二升

【用法】上咬咀。先以水一斗五升，煮葱白作汤，澄取八升，纳药煮取三升，分三服。才服便使人按摩摇动，口中嚼物，然后仰卧，覆以暖衣，汗出去衣。

【功用】解五石毒。

【主治】乳石毒发，大势已解，肺家犹有客热余气。

66773 桂心汤

《千金翼》卷七。为《千金》卷三“桂蜜汤”之异名。见该条。

66774 桂心汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇三。

【组成】桂心二两 木瓜二两（干者） 乌梅肉二两

【用法】上为散。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】霍乱，脚转筋。

66775 桂心汤

《圣济总录》卷十七。为《外台》卷十四引《深师方》“秦艽汤”之异名。见该条。

66776 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】桂（去粗皮） 芍药 甘草（炙，锉） 葛根（锉）各等分

【用法】上为散。每服四钱匕。水一盏半。加生姜三片，枣一枚（擘），同煎至八分，去滓温服。

【主治】四时伤寒初觉。

66777 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】桂（去粗皮） 麻黄（去根节） 甘草（炙） 人参各半两 白术 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄） 附子（炮裂，去皮脐）各三分

【用法】上咬咀，如麻豆大，每服五钱匕，用水一盏半，加生姜半分（拍碎），同煎取七分，去滓温服。

【主治】伤寒，阴盛身寒，脉候沉细，头痛体疼。

66778 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】桂（去粗皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各三分 芍药一两 干姜（炮） 槟

榔（锉）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓，入童便一合搅匀，空腹分温二服。

【主治】伤寒服冷药过多，心腹胀满，脚膝厥冷，昏闷不知人。

66779 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】桂（去粗皮）一两 芍药 附子（炮裂，去皮脐） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）各三分 甘草（炙，锉） 杏仁（去皮尖双仁） 半夏（汤洗七遍，生姜等分同捣，焙） 干姜（炮）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加葱白三寸、生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】中风伤寒，头痛发热，胸中气逆，恶寒呕哕，小便难，足冷。

66780 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】桂（去粗皮）三分 芍药一两 麻黄（去根节） 杏仁（去皮尖双仁，炒，研） 黄芩（去黑心） 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘），煎至七分，去滓温服。

【主治】时行疫病，未经汗下，体热烦闷。

66781 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】桂（去粗皮）一两 槟榔（锉） 半夏（汤洗七遍 炒）各半两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，加生姜五片，同煎至七分，去滓，食前温服，如人行三五里再服。

【主治】伤寒心下有饮，悸动不定。

66782 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】桂（去粗皮） 人参 黄耆（锉） 牛膝（酒浸，切，焙）各一分 甘草（炙，

铍)二分 白茯苓(去黑皮)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片、大枣二枚(擘破),同煎至六分,去滓,空心温服。

【主治】伤寒后虚劳,羸瘦乏力。

66783 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】桂(去粗皮)二两 菖蒲一两(去须)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,用水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。衣覆取汗。未退再服。

【主治】伤寒邪气伤肺,失音不语。

66784 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】桂(去粗皮)三两 厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙)四两 枳实(去瓢,麸炒)五两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加生姜三片,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】霍乱心腹痛,烦呕不止。

66785 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】桂(去粗皮)二两半 麻黄(去节,煮,掠去沫,焙)半两 甘草(炙) 款冬花(焙) 杏仁(汤退去皮尖双仁,麸炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】肺中寒,咳唾喘息。

66786 桂心汤

《圣济总录》卷五十五。为《伤寒论》“桂枝甘草汤”之异名。见该条。

66787 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】桂(去粗皮) 干姜(炮) 半夏(汤洗去滑,炒)各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,煎至六分,去滓,空心温服。

【主治】脾胃虚寒,呕吐不止。

66788 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】桂(去粗皮)三分 麻黄(去根节) 当归(切,焙)各一两 防风(去叉) 槟榔各二两 黄芩(去黑心) 升麻生犀角(镑) 赤茯苓(去黑皮)各一两半

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服三钱匕,加大枣二枚(擘破),水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风毒脚气,痲痹不仁,语言謇涩。

66789 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】桂(去粗皮) 牛膝(去苗,酒浸一宿,铍,焙) 芍药 当归(铍,焙) 威灵仙(去土) 杜仲(去粗皮,酒浸,铍,炒) 芎藭 大黄(铍,炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,空心、日午、临卧各一次。

【主治】卒腰痛,转动艰难。

66790 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】桂(去粗皮) 黄耆(去芦头,铍,炒)各三分 芍药 甘草(炙,铍) 人参各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜三片、大枣二枚(擘),煎至七分,去滓温服,空心、日午、夜卧各一次。

【主治】虚劳体痛,手足疼,心热腹满,胸中少气,客热,头痛欲吐,恍惚多忘,小便赤涩,或多余沥,卧不安席。

66791 桂心汤

《圣济总录》卷九十一。为《伤寒论》“小建中汤”之异名。见该条。

66792 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】桂(去粗皮) 大黄(略炮) 桔梗(铍,炒) 附子(炮裂,去皮脐) 木香 白术 当归(切,焙) 槟榔 赤芍药

各一两 高良姜 (锉, 炒) 芎藭 枳实 (去瓢, 麸炒) 各半两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】寒疝积聚, 心腹疼痛, 结块不消。

66793 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】磁石散 (《济生》卷五)。

【组成】桂 (去粗皮) 羌活 (去芦头) 黄耆 (锉) 各一分 防风 (去叉) 半两 芍药 人参 木通 (锉) 各一分半 磁石 (煅, 醋淬七遍) 二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水三盞, 先煮羊肾一只, 去肾取汁一盞, 然后下药, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】肾气不足, 耳聋, 耳中虚鸣。

66794 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】桂 (去粗皮) 当归 (切, 焙) 蒲黄各二两 大黄 (蒸, 焙) 一两半

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。得血利为度。

【主治】伤损滞血在腹中, 坠堕内损, 吐唾出血。

66795 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】五行散 (《普济方》卷三五六)。

【组成】桂 (去粗皮) 一两半 瞿麦 (取穗) 木通 (锉碎) 牛膝 (酒浸半日, 切, 焙) 榆白皮 (刮净, 锉碎) 各二两

【用法】上为粗末。每服四钱匕, 以水一盞半, 煎至八分, 去滓温服。如未生, 更服。

【主治】①《圣济总录》: 难产数日不出, 或子死腹中, 母气欲绝。②《普济方》: 胞衣不下。

【加减】子死腹中, 加附子半两。

66796 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】桂 (去粗皮, 不得见火) 乌头 (大者, 炮, 去皮脐) 各一两

【用法】上锉, 如麻豆大, 每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 须臾连三服。

【功用】破寒堕胎。

【主治】产宫气寒, 胎血凝涩, 子死腹中。

66797 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】桂 (去粗皮) 三分 牛膝 (去苗, 酒浸, 切, 焙) 一两 滑石 当归 (切, 焙) 各三分 瞿麦穗一两 葵子 (炒) 二合 甘草 (炙) 半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生地黄酒半合, 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。以下为度。

【主治】胞衣不出, 胞烂。

66798 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】桂 (去粗皮) 三分 升麻 防风 (去叉) 麻黄 (去根节, 煎, 掠去沫, 焙) 各一两 芎藭 羚羊角 (镑) 各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 加竹沥半合, 再煎三两沸, 温服, 不拘时候。

【主治】产后中风口喎, 言语不利, 筋脉拘急。

66799 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】桂 (去粗皮) 一两 黄耆 (锉) 一两半 芎藭一两 当归 (切, 焙) 二两 赤芍药 (锉) 一两半 甘草 (炙) 人参各一两 附子 (炮裂, 去皮脐) 半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 加生姜三片、大枣一枚 (擘破), 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后虚热, 状似劳气, 瘦瘁无力。

66800 桂心汤

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】桂 (去粗皮) 一分 五味子半两

当归(切,焙)一分 枳壳(去瓢,麸炒)半两 甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。一月及百日儿,每服一钱匕,用水半盏,煎至三分,去滓,分温二服,半年至一岁儿,准前煎作一服,不拘时候。

【主治】小儿夜啼腹痛,状如鬼祟。

66801 桂心汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】紫苏叶二两 桂一两 黄橘皮 桔梗各三钱 甘草 细辛 附子各半两 半夏 人参

【用法】上为粗末,每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】肺气逆行,乘于心之肺心痛。心痛不得卧,动则痛甚,面色不变,其脉涩。

【备考】方中半夏、人参用量原缺。

66802 桂心汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参二两 桂 白茯苓各一两 麻黄 贝母各半两 甘草 远志各一分

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】心咳,脉浮恶风者。

66803 桂心汤

《普济方》卷三十八。即《圣惠》卷三十七“桂心散”。见该条。

66804 桂心汤

《普济方》卷一〇七。即《圣济总录》卷五“秦艽散”。见该条。

66805 桂心汤

《普济方》卷一六四。为《百一》卷五引邓左丞方“桂辛汤”之异名。见该条。

66806 桂心汤

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】甘草(炙) 牡蛎(煨赤) 芍药 桂心各三两

【用法】上为粗末。一岁儿,水一升,纳四方寸匕,煮二合,顿服,一日二次。

【功用】除热止痢。

【主治】小儿利下吐逆,壮热,数日不止,不得乳哺,或形羸困疲者。

66807 桂心汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】桂心 小草 吴茱萸 干姜 独活 熟地 当归 白芍各一钱 甘草 细辛各三分

【用法】水煎服。

【主治】素有宿寒,因产大虚,寒搏于血,血凝不散,上冲心之脉络所致之心痛。

66808 桂心饮

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】桂(去粗皮) 芍药各一两 虻虫(去翅足,炒) 水蛭(微炒) 消石 土瓜根 面尘(微炒) 大豆 续断 牡丹(去心) 当归(炙)各半两 野狐肝(焙干)一分 桃仁(去皮尖双仁,炒)一百粒

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食前温服,一日三次。

【主治】月经不调,变为带下。

66809 桂心酒

【方源】《千金》卷三。

【异名】单行桂酒(《千金翼》卷六)。

【组成】桂心三两

【用法】以酒三升,煮取二升,去滓,分三服,每日三次。

【主治】①《千金》:产后疼痛。②《养老奉亲》:老人冷气心痛,缴结气闷。

【方论选录】《千金方衍义》:桂心散寒结,用酒煮以行其势。

【备考】《养老奉亲》本方用法:温酒令热,即下桂心末调之,频服。一二服效。

66810 桂心酒

【方源】《千金》卷四。

【组成】桂心 牡丹 芍药 牛膝 干漆 土瓜根 牡蛎各四两 吴茱萸一升 大黄 三两 黄芩 干姜各二两 虻虫二百枚 廌虫 蛭 水蛭各七十枚 乱发灰 细辛各一两 僵蚕五十枚 大麻仁 灶突墨三升

干地黄六两 虎杖根 鳖甲各五两 菴苣子二升

【用法】上咬咀。以酒四斗，分两瓮浸之，七日并一瓮盛，搅令调，还分作两瓮。初服二合，每日二次，加至三四合。

【主治】月经不通，结成癥瘕。

66811 桂心散

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七。

【异名】桂散（《元和纪用经》）。

【组成】桂心 当归各一两 梔子十四枚

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三五次。

【主治】①《肘后方》：猝心痛，及久心病发作有时节者。②《圣惠》：小儿心痛不止。

【宜忌】《外台》：忌生葱。

【备考】《圣惠》本方用法：上为细散。每服半钱，以橘皮汤调下，不拘时候。

66812 桂心散

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】吴茱萸五合 桂一两

【用法】酒二升半，煎取一升，分二次服。

【主治】①《肘后方》：猝心痛。②《医方类聚》引《简要济众方》：膀胱冷气，往来冲心腹痛。

66813 桂心散

【方源】《外台》卷七引《肘后方》。

【组成】枳实（炙） 桂心各等分

【用法】上药治下筛。每服一匕，米汁送下。

【主治】猝心腹胀满，又胸胁痛欲死。

66814 桂心散

【方源】《医部全录》卷二二八引《集验方》。

【组成】桂心 漏芦 威灵仙 芎藭 白芷 木香 当归（去芦） 白僵蚕（炒） 地龙（炒，去土）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】风走注疼痛。

66815 桂心散

【方源】方出《千金》卷三，名见《普济方》卷三五二。

【组成】桂心 蛭螬各二两 栝楼根 牡丹各三两 豉一升

【用法】上咬咀。以水八升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】产后漏血不止。

【方论选录】《千金方衍义》：此仿佛《金匱》土瓜根散之制。彼用土瓜根，此用栝楼根；彼用廔虫，此用蛭螬；彼用芍药，此用牡丹；彼用桂枝，此用桂心，香豉者，专散秽恶之气也。

66816 桂心散

【方源】方出《千金》卷五，名见《外台》卷九引《广济》。

【异名】桂杏丸（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】桂心 杏仁各半两

【用法】上为末。以绵裹如枣大，含咽汁。

【功用】《普济方》：温润肺气。

【主治】喉痹失音，咳嗽上气，咽燥嗽血。

①《千金》：小儿喉痹。②《外台》引《广济方》：咽喉干燥，咳嗽，语无声音。③《圣济总录》：上气，心中烦闷。④《普济方》引《全婴方》：嗽血。⑤《普济方》：伤风冷气不通。

【宜忌】①《外台》引《广济方》：忌生葱、油腻。②《普济方》引《全婴方》：疮痘声哑不可用。

【方论选录】《千金方衍义》：桂心导龙火，杏仁下结气，从治之法也。

66817 桂心散

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣惠》卷九十二。

【组成】桂心十八铢 地肤子二两半 白术一两十八铢

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服七丸，白酒送下，一日三次。

【主治】狐疝伤损生癰。

【方论选录】《千金方衍义》：狐疝虽寒热不

同一，皆属于肝经，故首推桂心通肝散经，白术安脾逐湿，地肤专利小便以泄湿热也。

66818 桂心散

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一七。

【组成】茯苓 黄芩 甘草 大黄 蔷薇根各三十铢 枳实 杏仁 黄连各二两 桂心半两 栝楼根十八铢

【用法】上为末。每服方寸匕，食前浆水送下，一日二次。

【主治】胃中客热，唇口干燥生疮。

【方论选录】《千金方衍义》：唇口干燥生疮，脾家湿热显著于外，又须伊尹三黄兼苓、枳、栝楼以清胃热，桂心热因热用，为三黄等药开导湿热，甘草以和寒热诸性，杏仁、薇根口疮之本药也。

66819 桂心散

【方源】《医心方》卷十五引《令李方》。

【组成】黄耆六分 芍药四分 桂心一分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】痈肿。

66820 桂心散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】桂心一两 草豆蔻一两（去皮）附子一两（炮裂，去皮脐） 丁香半两 槟榔半两 木瓜一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】肝脏风冷，转筋不止。

【宜忌】忌猪肉、毒鱼。

66821 桂心散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】桂心三分 白术三分 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参三分（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 附子三分（炮裂，去皮脐） 赤茯苓三分 五味子

三分 麻黄三分（去根节） 干姜半两（炮裂，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 细辛半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】肺脏外伤寒，头目不利，多涕。

【宜忌】忌生冷、猪鱼、油腻。

66822 桂心散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】桂心三分 赤芍药三分 独活三分 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄芩三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣二枚，煎至六分，去滓，温温频服。

【主治】伤寒、中风，脉浮，发热往来，汗出恶风，项强，鼻鸣，干呕。

66823 桂心散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】桂心 柴胡（去苗） 赤茯苓 五味子 麦门冬（去心） 槟榔 甘草 细辛各三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒阳瘕，经二三日不愈，毒气攻五脏，心神烦躁，四肢疼痛。

66824 桂心散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】桂心二两 麻黄二两（去根节） 附子二两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药半两 干姜半两（炮裂） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 柴胡一两（去苗） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热频服，不

拘时候。汗出为度。

【主治】阴毒伤寒，项直脚冷，百节疼痛。

66825 桂心散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】桂心 当归（锉，微炒） 大腹皮（锉） 诃黎勒（煨，用皮） 川大黄（锉碎，微炒） 木香各一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒食毒，腹胀气短，壅闷，不下食，四肢少力。

66826 桂心散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】桂心 甘草（炙微赤，锉） 人参（去芦头） 白术 赤茯苓各一两 枳实半两（麸炒，令微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒发汗过多，其人以手扪心，心下悸，欲得按者。

66827 桂心散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桂心 前胡（去芦头） 甘草（炙微赤，锉） 皂荚灰 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 各一两

【用法】上为细散。每服二钱，以生姜汤调下，频服，不拘时候。以汗出为度。

【功用】发表。

【主治】两感伤寒，头痛身热，心胸闷乱。

66828 桂心散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】桂心一两 人参一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 白茯苓三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分、大枣二枚，煎至五分，去滓，食前稍热服。

【主治】伤寒后，虚羸黄瘦，五脏气乏。

66829 桂心散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】桂心 陈橘皮（汤浸，去白瓢，焙） 白术 附子（炮裂，去皮脐） 当归（锉，微炒） 木香 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 各半两 槟榔一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】伤寒后，腹胀气急，连腰脚疼痛。

66830 桂心散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】桂心 甘草（炙微赤，锉） 人参（去芦头） 赤茯苓 赤芍药 麻黄（去根节） 芎藭 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒愈后劳复，头痛壮热，肢节烦疼。

66831 桂心散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】桂心一两 甘遂半两（煨令微黄） 人参一两（去芦头） 栝楼一枚（取子用）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气结胸，心下坚实满痛。

66832 桂心散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】桂心半两 柴胡一两（去苗） 甘草一分（炙微赤，锉） 葛根一两（锉） 赤茯苓半两 泽泻半两 赤芍药半两 麻黄一两（去根节）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加薄荷二七叶，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。衣盖取汗，未汗再服。

【主治】热病三日，表犹未解，壮热，头目、

四肢不利。

66833 桂心散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】解语散（《传家秘宝》卷中）、桂附汤（《圣济总录》卷五）、解语汤（《简易方》引《资寿方》，见《医方类聚》卷二十）、资寿解语汤（《医方大成》卷一引《简易》）。

【组成】桂心一两 羌活二两 防风二两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 赤箭一两 羚羊角屑一两 酸枣仁一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】中风舌强，失音不语，精神昏闷，半身不遂，口眼喎斜。

①《圣惠》：中风失音不语。②《圣济总录》：中风精神冒闷。③《普济方》：中风，半身不遂，口眼喎斜，神气不清，一切风气并皆治之。

66834 桂心散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】桂心三分 防风三分（去芦头） 前胡一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 羚羊角屑三分 射干一两 甘草半两（炙微赤，锉） 独活三分 细辛半两

【用法】上为粗散。每服半两，以水一大盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风癰。咽喉作声，言语蹇涩，心胸不利。

66835 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】桂心一两 独活三分 葛根一两（锉） 防风三分（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 赤芍药三分 附子半两（炮裂，去皮脐） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 甘草三分（炙微赤）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】猝中风，半身不遂，舌强难言。

66836 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】桂心三分 防风三分（去芦头） 芎藭三分 干姜半两（炮裂，锉） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 秦艽一两（去苗） 甘草三分（炙微赤，锉） 槟榔三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】贼风。心腹拘急，四肢疼痛，腹满欲死。

66837 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】桂心一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 防风一两（去芦头） 生干地黄一两 赤芍药一两 当归一两（锉，微炒） 细辛半两 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】风入腹疔痛拘急。

66838 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】桂心一两 赤芍药半两 防风半两（去芦头） 细辛半两 人参半两（去芦头） 芎藭半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 附子三分（炮裂，去皮脐） 木香半两 桔梗三分（去芦头） 麻黄一两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】风邪入心，心痛连背，或上或下，腹满闷乱，神思不定，面色青黄。

66839 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】桂心一两 续断半两 虎掌半两（汤洗七遍，锉，生姜汁拌炒令黄） 枳壳一

两(麸炒微黄,去瓢) 牛膝一两(去苗) 海桐皮三分 萆薢三分(锉) 犀角屑三分 木香三分 槟榔一两 当归三分 羌活三分

【用法】上为散。每服四钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】中风偏枯,手足不遂,筋脉拘急疼痛,腹胁不利。

66840 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】桂心 丹桂 牛膝(去心) 附子(炮裂,去皮脐) 当归 赤芍药 木香一两 萆薢一两(锉) 麻黄一两(去根节)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】历节风,疼痛不可忍,肢节无力。

【宜忌】忌猪、鸡、犬肉,生冷,油腻。

【备考】方中自桂心以下六味药用量原缺。

66841 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桂心一两 甘草半两(炙微赤,锉) 皂荚三寸(去皮,涂酥炙微黄焦,去子) 白术三分 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 前胡三分(去芦头)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】虚劳痰饮,呕吐涎沫。

66842 桂心散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】桂心一两 白芍药一两 龙骨一两半 牡蛎粉一两半 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳梦泄,甚者心下悸,腹里急,阴头寒,目眶痛,发落。

66843 桂心散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】桂芎汤(《圣济总录》卷九十七)。

【组成】桂心 赤芍药 芎藭 当归 黄芩各一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入青竹茹半鸡子大,煎至六分,去滓,空腹及晚食前温服。

【主治】①《圣惠》:脏气虚伤,大便下血,腹中疼痛。②《圣济总录》:结阴便血。

【备考】本方方名,《普济方》引作“桂心汤”。

66844 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桂心一两 当归半两(锉,微炒) 食茱萸半两 赤芍药半两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 槟榔二两 郁李仁一两(汤浸,去皮,微炒)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】九种心痛,多吐腹胀。

66845 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桂心一两 高良姜一两(锉) 当归一两(锉,微炒) 草豆蔻一两半(去皮) 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】冷气攻心,腹痛多呕,不欲饮食。

66846 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桂心半两 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 赤芍药半两 当归半两(锉,微炒) 木香半两 槟榔半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】心悬急,懊恼痛,气闷,筑筑引两乳间或如锥刺。

66847 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桂心一两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 附子（炮裂，去皮脐） 白术 枳壳（麸炒微黄，去瓢） 桔梗（去芦头） 木香 赤芍药 槟榔 当归（锉，微炒）各三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】寒气伤于胸膈，引腹胁疼痛拘急。

66848 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桂心一两 牛膝一两（去苗） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 五加皮三分 独活三分 防风三分（去芦头） 赤芍药三分 五味子半两 附子三分（炮裂，去皮脐）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】猝腰痛，行立不得。

66849 桂心散

《圣惠》卷四十四。为《外台》卷十七引《经心录》“肾着散”之异名。见该条。

66850 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】桂心三分 诃黎勒皮三分 干姜三分（炮裂，锉） 人参半两（去芦头） 赤茯苓半两 甘草一分（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散，每服三钱，以水一中盏，加大枣二枚，煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】咳嗽声不出。

66851 桂心散

【方源】方出《圣惠》卷四十六，名见《普济方》卷一六二。

【组成】桂心三分 人参二分（去芦头） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 紫菀三分（去苗土） 熟干地黄一两半 桑根白皮二两（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，加黑饴半两更煎，候饴消，温服，不拘时候。

【主治】咳嗽唾脓血，气短，不得眠卧。

66852 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】桂心半两 人参三分（去芦头） 香薷二两 木瓜二两（干者） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 干姜半两（炮裂，锉） 槟榔一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱吐利，心烦转筋，腹胀满。

66853 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】桂心一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桔梗一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 木香一两 白术一两 高良姜半两（锉） 芎藭半两 当归一两（锉，微炒） 槟榔一两 赤芍药一两 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。生姜汤调下亦可。

【主治】积聚，心腹疼痛，面无润泽，渐黄瘦。

66854 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】桂心一两 前胡一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 牛李根一两（锉） 诃黎勒皮一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】膈气，心胸中伏滞冷气，疼痛，饮食不下。

66855 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】桂心一两 吴茱萸半两（汤浸七

遍,焙干,微炒) 射干一两 赤茯苓一两 木香半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】气噎极甚,咽喉胸膈壅塞不通。

66856 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】桂心三分 白术一两 细辛一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 槟榔三分

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】饮癖。气分,心下坚硬如杯,水饮所作。

66857 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】桂心一两 旋覆花半两 白术半两 细辛半两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 桔梗半两(去芦头) 赤芍药半两 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 泽泻半两 附子半两(炮裂,去皮脐) 前胡半两(去芦头) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】悬饮。心腹痞满,水走肠间,两胁引痛。

66858 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】桂心半两 人参半两(去芦头) 白茯苓半两 诃黎勒皮半两 大腹皮半两(锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 白术半两 前胡半两(去芦头)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】消渴。饮水伤冷太过,致脾气虚,腹胁胀满,不思饮食

66859 桂心散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】桂心二两 防风一两(去芦头) 汉防己一两 麻黄一两(去根节) 白术一两 人参一两(去芦头) 黄芩一两 细辛一两 茵芋一两 秦艽一两(去苗) 附子一两(炮裂,去皮脐) 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,入淡竹沥一合,更煎一两沸,拗开口温灌之,不拘时候。

【主治】妇人中风,咽中气塞壅闷,口噤不语,肝厥不识人。

66860 桂心散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】桂心一两 栝楼二两 牛膝二两(去苗) 瞿麦一两 当归一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妊娠,母因疾病,胎不能安。

66861 桂心散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】桂心一两 麻黄三分(去根节) 荆芥三分 石膏二两 赤芍药三分 柴胡一分(去苗) 葛根二分 芎藭半两 人参半两(去芦头) 细辛半两(去苗土) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,如人行五七里再服,以得汗出为效。

【主治】产后伤寒,头目四肢俱疼,心胸烦热。

66862 桂心散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】桂心 陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙) 人参(去芦头) 当归(锉,微炒) 各一两 紫苏子半两(微炒) 五味子半两

【用法】上为细散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】产后血气上攻于肺，虚喘。

66863 桂心散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桂心三分 赤芍药一两 琥珀半两(细研) 白芷半两 当归三分(锉，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣二枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后儿枕攻刺，腹肚疼痛不止。

66864 桂心散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桂心一两 水蛭半两(微炒) 牡丹半两 延胡索半两 硫黄半两(细研)

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】产后恶血未尽，心腹疼痛。

66865 桂心散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】桂心半两 甘草一两(炙微赤，锉) 紫菀三分(洗去苗土) 麦门冬一两(去心，焙)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，咳嗽吐逆，昼夜不息。

66866 桂心散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】桂心一分 乱发灰一分 干姜半分(炮裂，锉)

【用法】上为散。每服半钱，以冷水调下，不拘时候。

【主治】小儿鼻衄，心闷。

66867 桂心散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】桂心一两 甘草一两 白术三分 人参三分 干姜三分(炮)

【用法】上为末。每服四钱，以水一盏，煎

六分，去滓温服。

【主治】伤寒表热未除，数下之，遂夹热而利，利不止，腹痞满，表里不解者。

66868 桂心散

《圣济总录》卷七。为方出《肘后方》卷一，名见《外台》卷七引《集验方》“桂心汤”之异名。见该条。

66869 桂心散

《圣济总录》卷十三。为原书卷五“秦艽散”之异名。见该条。

66870 桂心散

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】桂(去粗皮)五两 柴胡(去苗)六两 青橘皮(去白，焙)一两 桃仁(汤浸，去皮尖双仁，炒)五两 紫葛(去心，微炙) 山茱萸 益智(去皮) 知母(锉，焙) 芎藭 当归(炙，锉) 五味子各三两 獾猪肚一具(切，焙)

【用法】上为散。每服三钱匕，空心陈米饮调下。

【主治】冷劳，脏腑虚弱，心腹胀满，四肢羸瘦，困乏无力，不思饮食。

66871 桂心散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】桂(去粗皮) 昆布(洗去咸，焙) 海藻(洗去咸，焙) 甘草(炙，锉) 白面(微炒)各一两 龙胆 海蛤 土瓜根 半夏(为末，生姜汁和作饼，晒干) 吴茱萸(汤浸，去涎，焙，炒) 牡蛎(烧)各一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧酸浆水调下。

【主治】瘕气，咽喉肿塞。

66872 桂心散

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】桂(去粗皮) 姜黄各一两

【用法】上为散。每服二钱，以炒生姜酒调下，不拘时候。

【主治】产后血块攻筑，头目昏晕。

66873 桂心散

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮, 涂生姜汁, 炙) 柴胡(去苗) 桔梗(锉, 炒) 紫菀(去土, 焙干) 芍药(锉) 高良姜 干姜(炮裂) 白芫荑(炒) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 鳖甲(去裙襕, 醋浸, 炙) 各半两 草豆蔻三枚(去皮)

【用法】上为散。每服二钱匕, 用獭猪肝十片炙熟, 乘热拌和药末, 旋嚼, 温酒下, 一日三次。

【主治】产后蓐劳, 日渐枯瘁, 寒热往来, 头疼体痛, 口苦舌燥。

66874 桂心散

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《全婴方》。

【组成】桂心(去皮)

【用法】上药不见火, 为细末。三岁半钱, 藕汁同蜜半匙调下。

【主治】小儿吐血或便血。

66875 桂心散

《医方类聚》卷二二九引《王氏集验方》。为《医方类聚》卷二二九引《济生》“香桂散”之异名。见该条。

66876 桂心散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】桂(去粗皮) 萆薢 细辛(去苗叶) 各等分

【用法】上为散。每用一字, 先含温水一口, 即搐药于鼻中; 偏头痛, 随痛左右用之。

【主治】脑风头痛。

66877 桂心散

《普济方》卷九十四。为《外台》卷十四引《古今录验》“独活汤”之异名。见该条。

66878 桂心散

《普济方》卷一一二。即《圣惠》卷二十三“肉桂散”。见该条。

66879 桂心散

【方源】《普济方》卷三五。

【组成】桂心 当归(锉, 微炒) 各一两 干姜(炮裂, 锉) 芫花(醋拌, 炒令干) 木

香各半两

【用法】上为细散。每服一钱, 食前以热酒调下。

【主治】产后两胁胀满。

66880 桂心散

《普济方》卷三六三。为《千金》卷五“三物细辛散方”之异名。见该条。

66881 桂心散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】桂心 伏龙肝各等分

【用法】上为末。每服三钱, 空心酒调下。

【主治】妇人交接辄痛出血。

66882 桂心散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桂心一两半 蒲黄三两 延胡一两半(酒炒)

【用法】上为散。每服三钱, 砂糖灰汤煎, 去滓温服。

【主治】产后恶血冲心痛, 脉紧涩滞者。

【方论选录】产后恶血不下, 上冲心膈, 故心气窒塞, 心痛不休焉。桂心温经通闭, 开心气之窒塞; 蒲黄破瘀下行, 降恶血之冲逆; 延胡活血以通经脉也。为散, 砂糖汤煎, 使瘀血消化, 则新血自生, 而恶血无不下, 安有上冲心膈, 心痛不已之患乎。

66883 桂心散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】桂心(烧存性)

【用法】上为末。每服三钱, 空心米饮调下。

【主治】血崩不止。

66884 桂心粥

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《食医心鉴》。

【组成】桂心四分 茯苓六分 桑白皮十二分

【用法】上锉细。以水二升, 煎取一升半, 去滓, 量事著米煮粥食之。

【主治】胸膈气壅结, 饮食不下。

66885 桂心粥

【方源】《养老奉亲》。

【组成】桂心(末)一两 粳米四合(淘研)

【用法】上以米煮作粥半熟，次下桂末调和，空心服，每日一次。

【功用】破冷气。

【主治】老人噎病，心痛闷，膈气结，饮食不下。

66886 桂心煎

【方源】《圣惠》卷二十七。

【异名】桂心膏(《永乐大典》卷一〇三三引《王氏手集》)。

【组成】桂心(末)二两 生姜汁二合 白蜜十两 生地黄汁一升

【用法】上药先以水一大盏，煎桂心取五分，去滓，入生地黄及蜜等，以慢火熬成煎，含一茶匙，咽津，不拘时候。

【主治】虚劳吐血，胸膈不利。

66887 桂心膏

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一四。

【组成】鸡脂五两(炼成下) 桂心半两 野葛半两

【用法】上为粗散，以鸡脂熬三二十沸，去滓成膏。每用笔管纳入少许膏，炙令管热，侧卧滴入耳中。

【主治】①《圣惠》：久耳聋。②《圣济总录》：聤聤。

66888 桂心膏

《永乐大典》卷一〇三三引《王氏手集》。为《圣惠》卷二十七“桂心煎”之异名。见该条。

66889 桂术汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】桂(去粗皮)一两 白术 人参 附子(炮裂，去脐皮)各三分 防风(去叉) 干姜(炮) 甘草(炙)各半两

【用法】上锉，如麻豆大，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒柔痉，手足厥冷，筋急，汗不止。

66890 桂术汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】肉桂 人参 茯苓 甘草 陈皮 五味 白术(土炒) 香附(酒炒) 苍术(泔水浸) 罂粟壳 杜仲 补骨脂(盐水炒)

【功用】温补固涩。

【主治】妇人产后脾胃气虚，或大肠虚寒遗粪，或白色兼沫水下者。

【方论选录】大肠虚则寒，粪白色，且水与沫兼下，其为虚寒无疑，法当温补加固涩之药。四君子加陈皮、香附则运气，加粟壳、五味则固脱；苍术、肉桂辛热以祛寒；杜仲、补骨脂辛温以补两尺。寒者温之，虚者补之，脱者固之，土旺而遗粪之症愈矣。桂术汤补气而不补血，以气旺而血自充也。

66891 桂术汤

【方源】《三因》卷十。

【组成】桂心 白术各一两 枳实(麸炒，去瓤) 京豉 干葛 杏仁 甘草各半两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏，煎七分，去滓，食前服。

【主治】酒疸因下后，久久为黑疸，目青面黑，心中如啖韭菹状，大便正黑，皮肤不仁，其脉微而数。

【备考】本方方名，《丹溪心法》引作“白术汤”。

66892 桂术汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】辣桂三两 白术 麻黄(去节) 细辛(去苗) 甘草(炒)各二两 枳壳(制) 干姜(炮)各一两半

【用法】上为散。每服三钱，水煎服。

【主治】水饮气分证。气为饮隔，痞满腹鸣，骨痛冷痹。

66893 桂术汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术五钱 肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，一二日即自汗出，咽痛，

吐利交作，肾经有寒者。

66894 桂术散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】桂枝一两 甘草半两 大附子(炮，去皮脐)一两 白术二两 芎藭 防风各一两半

【用法】上咬咀。每服四匕，以水二升，加生姜、大枣煎一升，去滓温服。

【主治】伤寒、中风、中湿，自利，汗不止，手足逆冷，及阴痉、筋脉拘急。

66895 桂号散

《婴童百问》卷四。为《千金》卷五“三物细辛散方”之异名。见该条。

66896 桂皮散

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】桂(去粗皮) 陈橘皮(汤浸，去白，焙)各一两 白槟榔(锉)一两半 牵牛子(半生半熟)二两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心、食前温酒调下，一日二次。

【主治】肺脏喘急，胸膈壅滞，大肠不利。

66897 桂皮散

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】桂皮(炙)一两 栝楼根(锉) 白茯苓(去黑皮)各三分 人参半两

【用法】上为散。每服半钱，粟米饮调下，徐徐服。

【主治】小儿下痢，兼渴不止。

66898 桂朴汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】肉桂四分 厚朴一钱 当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 丁香五分 砂仁一钱 白芍一钱(酒炒) 广皮一钱 郁金二钱 大枣二枚 生姜三片

【主治】胃气虚寒，不能纳谷，呕吐作痛。

66899 桂朴散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙令熟)各三分 吴茱萸(汤浸一宿，晒干，炒)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】心痛多唾，猝心腹痛。

66900 桂朴散

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】肉桂 当归各一两(焙) 厚朴(制) 白术 干姜各半两 甘草一分(炙)

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【功用】温脾胃。

【主治】脾胃不和。

66901 桂芎汤

《圣济总录》卷九十七。为《圣惠》卷三十七“桂心散”之异名。见该条。

66902 桂芎汤

《圣济总录》卷一四四。为原书同卷“芎藭汤”之异名。见该条。

66903 桂曲丸

【方源】《百一》卷二。

【组成】人参 茺茺 白术 干姜(炮) 高良姜(微炒) 缩砂仁 肉豆蔻(面裹，煨) 陈皮(汤洗，去白) 桂枝(去粗皮)各一两 甘草(锉，炒) 丁香各半两 神曲三块(锉，炒熟)

【用法】上为细末，熟汤泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，食前一时，米饮送下。

【功用】①《百一》：健脾胃，进饮食，助克化。②《普济方》：克化生冷，温中下气。

【主治】食少易伤，胸满恶心，或心腹疼痛，病后衰弱，气不复常。

66904 桂红丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】官桂 红花 桃仁 当归梢 阿魏各一两 广木香一两五钱 白豆蔻 蓬术 血见愁 穿山甲一两二钱

【用法】上为末，醋打米糊为丸。每服三钱，酒送下，早、晚各服一次。

【主治】血瘀，血痞。

【备考】方中白豆蔻、蓬术、血见愁用量原缺。

66905 桂芸膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】桂(去粗皮) 芸薹子(研) 白芥子(研) 木鳖子(去壳, 研) 大黄(锉) 败龟甲(酥炙) 虎脑骨(酥炙) 赤狗脑骨(烧灰) 各一两

【用法】上为末, 每用小黄米粥于生布上摊匀, 掺药末一匙头在上。于损折处裹之, 以竹片夹定, 用绳子缚, 一复时解去, 换药。

【功用】接骨。

【主治】打扑筋骨伤折, 疼痛不可忍。

66906 桂花汤

【方源】《局方》卷十(续添诸局经验秘方)。

【组成】干姜(炮)九两 桂心 甘草(炒)各九斤 缩砂仁三斤十四两 炒盐十四斤

【用法】上为末。每服一钱, 食前沸汤点下。

【主治】一切冷气, 心腹刺痛, 胸膈痞闷, 肋肋胀满, 呕逆恶心, 饮食无味。

66907 桂花饼

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】桂花一两 儿茶五钱 诃子七个 甘草五分

【用法】上为末, 桂花水调为丸饼。每嚼一丸, 滚水送下。

【功用】清痰降火, 止嗽生津。

66908 桂花散

【方源】《直指》卷六。

【组成】香附五两(炒赤, 去毛) 蓬术(醋煮, 焙干) 良姜 甘草(炙)各三两 桂花一两

【用法】上为末。每服二钱, 盐一点, 食前沸汤热调服。

【主治】脾积气痛。

66909 桂花散

《杂病源流犀烛》(崇文书局刻本)卷二十三。为《直指》卷二十一“桂星散”之异名。见该条。

66910 桂杏丸

《圣济总录》卷六十六。为方出《千金》卷五, 名见《外台》卷九引《广济方》“桂心

散”之异名。见该条。

66911 桂杏丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】桂(去粗皮)半两 杏仁一两半(去皮尖双仁, 麸炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如樱桃大。每服一丸, 含化咽津。

【主治】咳嗽, 语声不出。

66912 桂杏丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】款冬花半两 马兜铃一分 杏仁一两 苦葶苈半两 桂心一钱

【用法】上为细末, 蒸枣肉为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 临卧温水送下。

【主治】肺胃气不调, 上膈痰滞, 喘满气促, 语声不出。

66913 桂连丸

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】桂心 黄连各等分

【用法】上为末, 白糊为丸, 如小豆大。每服三十丸, 米汤送下。

【主治】小儿下利赤白, 腹痛不可食。

66914 桂肝丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】官桂(为末) 雄鸡肝各等分

【用法】捣烂为丸, 如绿豆大。温水送下, 每日服三次。

【主治】小儿梦中遗尿。

66915 桂辛丸

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】桂(去粗皮) 细辛(去苗叶) 白芷 防风(去叉) 干姜(炮) 甘草(炙) 芎藭各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后温米饮送下。

【主治】肺寒, 内外合邪, 清涕多, 语声不出。

66916 桂辛汤

【方源】《百一》卷五引邓左丞方。

【异名】桂心汤(《普济方》卷一六四)。

【组成】桂(去粗皮) 细辛(去苗土) 干姜(炮) 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 甘草(炙) 各二两 五味子 陈皮(去白) 白术 半夏(汤浸洗七遍, 细切如豆, 不捣) 各三分

【用法】除半夏外, 上为粗末, 再同拌匀。每服二钱, 水二盏, 同煎至一盏, 去滓, 食前温服。

【功用】下痰饮, 散风邪, 止涎嗽, 聪耳鼻, 宣关窍, 利咽喉, 清头目, 解胃眩, 进饮食。

66917 桂辛散

《奇效良方》卷六十四。为《千金》卷五“三物细辛散方”之异名。见该条。

66918 桂辛散

《张氏医通》卷十五。为《直指》卷二十一“桂星散”之异名。见该条。

66919 桂沉浆

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】紫苏叶一两(锉) 沉香三钱(锉) 乌梅一两(取肉) 砂糖六两

【用法】用水五六碗, 熬至三碗, 滤去滓, 入桂浆一升, 合和作浆。饮之。

【功用】去湿逐饮, 生津止渴, 顺气。

66920 桂灵散

【方源】《丹溪心法附余》卷十五。

【组成】桂心 良姜(麸炒) 厚朴 五灵脂(明净者) 各等分

【用法】上为末。每服一钱, 熟醋汤调下。

【主治】心腹大痛危急者。

【备考】方中桂心原脱, 据《东医宝鉴·杂病篇》补。

66921 桂附丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】桂(去粗皮) 附子(炮裂, 去皮脐) 干姜(炮) 赤石脂各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心、食前米饮送下, 一日三次。

【主治】濡泻、水痢久不止。

66922 桂附丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】桂(去粗皮) 附子(炮裂, 去皮脐) 黄连(去须) 黄柏(去粗皮) 陈曲(炒黄) 干姜(炮) 麦芽(炒) 各一两 吴茱萸(汤洗, 焙, 炒干) 蜀椒(去目及闭口者, 炒出汗) 乌梅肉(炒) 各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 米饮送下。

【主治】下痢数年不止。

66923 桂附丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】桂(去粗皮) 一两 干姜(炮) 半两 茴香子(炒) 二两 附子(炮裂, 去皮脐) 一两 硫黄(研) 半两

【用法】上为末, 用白面糊为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心盐汤送下。

【主治】虚劳下元久冷, 心腹疼痛, 不思饮食。

66924 桂附丸

【方源】《普济方》卷二十二引《卫生家宝方》。

【组成】香附子 厚朴 陈皮 甘草 苍术 桂心 三棱 阿魏(别研) 各五钱 肉豆蔻一个(煨)

【用法】上为末, 酒糊为丸, 如龙眼大。每服一丸, 生姜一块, 切开作孔, 安药在内, 合定湿纸裹煨, 候熟, 盐汤嚼下。

【功用】健脾胃, 进饮食, 除上焦寒。

66925 桂附丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】肉桂一两 香附四两(泔、酒、醋、便四制) 延胡二两(醋炒) 熟艾一两(醋煮和饼, 焙, 捣) 当归(姜汁拌炒) 三两 熟地四两(砂仁酒煮) 红花一两

【主治】外邪风冷所致妇人经水不通。

【方论选录】经水不行, 因热结者少, 由寒结者多。肉桂祛积冷, 香附行滞气, 故以为君; 红花、延胡行瘀破积, 熟艾行经络为臣; 当归、熟地补阴, 引诸药入血分为使。服久

寒邪退，瘀血行，大小腹必无疼痛矣。

66926 桂附丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】桂心 附子（炮裂，米醋中浸，再炮淬三五次，去皮尖） 厚朴（姜制） 甘草（炙） 白术各一两 木香一分 乳香二钱（别研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空腹米饮送下。

【主治】气漏、冷漏诸疮。

66927 桂附丸

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】川乌头三两（炮，去皮脐） 附子三两 干姜二两（炮） 赤石脂二两 桂二两 蜀椒（去目，微炒）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下。觉至痛处即止。若不止，加至五十丸，以知为度。若早服无所觉，至午后再服二十丸。若久心痛，每服三十丸至五十丸，尽一剂，终身不发。

【主治】风邪冷气，入乘心络，或脏腑暴感风寒，上乘于心，令人卒然心痛，或引背脊，甚则经久不愈。

【备考】方中蜀椒用量原缺，据《卫生宝鉴》补。

66928 桂附丸

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】破故纸二两（炒） 附子（炮） 肉桂各一两

【用法】酒糊为丸。每服五十丸，空心酒送下。

【主治】五种腰痛。

66929 桂附丸

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】桂心 附子（炮制，米醋中浸，再炮三五次，去皮脐） 人参 黄耆 陈皮 粉草（炙） 白术各一两 木香一钱 乳香二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服二三十丸，空心米饮送下。

【主治】冷漏诸疮。

【方论选录】原方有厚朴，无参、耆、陈皮。丹溪云，治冷漏与桂附丸，只有疮久不合，风冷乘之，血气不潮而成也。厚朴虽温，泻卫尤速，恐不若佐以参、耆、陈皮，庶与病情相得，故易之。

66930 桂附汤

《活人书》卷十二。为《伤寒论》“桂枝附子汤”之异名。见该条。

66931 桂附汤

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷十九“桂心散”之异名。见该条。

66932 桂附汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】桂（去粗皮） 芍药各一两半 麻黄（去根节，先煎掠去沫，焙） 甘草（炙）各一两 附子（炮裂，去皮脐）三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盂半，加生姜一枣大（拍碎），大枣二枚（去核），同煎至八分，去滓，食前温服。以热粥投之，取汗。

【主治】①《圣济总录》：中风伤寒，头目四肢疼痛，恶寒，干呕。②《普济方》：伤寒八九日，风湿相搏，身体疼痛，不能自转侧，不呕不吐，脉浮虚而涩。

【宜忌】避风。

66933 桂附汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】桂（去粗皮）一分 附子（去皮脐，生用）半两 丁香 吴茱萸（汤淘三遍，焙干，炒）各半分

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，水一盂，加生姜半分（拍碎），同煎至七分，去滓温服。

【主治】阴毒伤寒。

66934 桂附汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【异名】柏子仁饮（原书卷四十二）、柏子仁散（《宣明论》卷二）、补白茯苓散（《普

济方》卷十四)。

【组成】桂(去粗皮) 附子(炮裂,去皮脐) 各半两 当归(切,炒) 槟榔各半两 赤茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 柏子仁(研) 细辛(去苗叶) 白术 芎藭 枳壳(去瓢,麸炒) 各三分

【用法】除柏子仁,锉如麻豆大,拌匀,每服三钱匕,水一盞,加生姜三片、大枣二枚,同煎至七分,去滓,空心食前温服。

【主治】①《圣济总录》:肝着,肝气虚寒,邪着胸中,实塞不快,气血留滞,胸上欲蹈之者。疹筋,肝虚生寒,脉数筋急,腹肋妨闷,筋见于外。②《普济方》:两肋下满,不得太息,四肢厥逆,心腹痛。

【宜忌】《普济方》:忌生冷、油腻。

66935 桂附汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】桂(去粗皮) 附子(炮裂,去皮脐) 当归(切,焙) 人参 茯神(去木) 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 草薢 牛膝(酒浸,切,焙) 赤芍药 麻黄(去根节,煎,掠去沫,焙) 羌活(去芦头) 各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片、大枣二枚(擘破),同煎七分,去滓温服,空腹、食前各一次。

【主治】妇人中风偏枯,手足不随,或冷或痹。

66936 桂附汤

【方源】《三因》卷四。

【组成】附子(生,去皮脐) 桂心 干姜(炮) 芍药 甘草(炙) 茯苓 桃仁(去皮尖,面炒) 各一两

【用法】上咬咀。每服四钱,水三盞,煎七分,去滓,食前服。

【主治】少阴伤风,胸满,心烦,咽喉痛,自汗,腰疼连胛骨痠痛,呕吐涎沫,头痛,其脉沉弦者。

【加减】咽喉痛,加桔梗半两。

66937 桂附汤

《三因》卷十四。为《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

66938 桂附汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】黄柏(为引用) 知母各五分 肉桂一钱 附子三钱

【用法】上咬咀,都作一服。水二盞,煎至一盞,去滓,食远热服。

【主治】①《兰室秘藏》:白带腥臭,多悲不乐。②《竹林女科》:阳气虚极,大寒之证,带久不止,下流白滑如涕,腥气难闻,多悲不乐。

【加减】如少食多饱,有时似腹胀奔闷,加白芍药五分;如不思饮食,加五味子二十个;如烦恼,面上如虫行,乃胃中元气极虚,加黄耆一钱五分,人参七分,炙甘草、升麻各五分。

【方论选录】《玉机微义》:此补阳气极虚,用黄柏等为引用,又升降阴阳药也。

【备考】方中黄柏,《卫生家宝》作“黄芩”。

66939 桂附汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】交趾桂一两(去粗皮) 绵附子一枚(炮,去皮脐)

【用法】上为散。每服三钱,水二盞,加生姜三片、大枣二枚,水煎,食前温服。

【主治】①《得效》:虚汗不止,及体虚失血。②《东医宝鉴·杂病篇》引《医学入门》:阳虚血弱,虚汗不止。

66940 桂附汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】桂枝一两 附子三钱 青皮 甘草 柴胡各四钱

【用法】每服加生姜三片,作三次服。

【主治】厥阴症,口吐涎沫,小腹痛,不渴者。

66941 桂附汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】官桂 大附子 防风 黄芩 川芎 防己 甘草 玄参各一钱

【用法】加生姜三片，水煎熟，热服。

【主治】柔痉。

66942 桂附汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】大附子 肉桂各二钱 川芎五钱 白芍 生地 当归 木瓜各一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】血受寒而脊痛筋挛急。

66943 桂附散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服。衣覆出汗。

【主治】伤寒中风，身体疼，不烦躁，能自转侧，脉浮虚者。

66944 桂附散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白僵蚕一两（微炒） 蒲黄一两 茅根一两（锉） 古铜末一两 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】腕折，筋骨伤损疼痛。

66945 桂附散

《普济方》卷一三五。为《圣惠》卷十一“附子散”之异名。见该条。

66946 桂附散

《普济方》卷三一一。为《圣惠》卷六十七“淋熨桂附散”之异名。见该条。

66947 桂附散

【方源】《会约》卷八。

【组成】上肉桂（去粗）三钱 制附子（或用生者，焙干）三钱 干姜（炒黄）一钱 白豆蔻肉（炒）一钱

【用法】上为极细末。时常挑于口中，以火

酒运下。

【主治】饮食一下，痰水同吐，多而且冷，药下亦吐，火将息矣。

66948 桂附散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】川草乌各一钱五分 丁香一钱 肉桂二钱 生南星一钱五分 干姜二钱 牙皂一钱五分 白芥子一钱五分 唐阿魏二钱 吴萸一钱 细辛一钱 火消一钱五分 附子二钱 银朱一钱五分 毛菇一钱五分 原寸三分

【用法】上为细末，乳至无声。

【主治】阴疽，流注痰块，及一切风寒湿痹，周身串痛。

66949 桂附膏

【方源】《全国中药成药处方集》（武汉方）。

【组成】鲜侧柏叶十斤 鲜松毛三斤 生天雄一斤 麻油六斤 炒黄丹三十六两 肉桂一斤

【用法】用麻油六斤，将前药浸七日，入锅内熬至药枯黑，去滓滤净；加炒黄丹三十六两，搅微冷；加肉桂一斤搅匀，成膏一百一十八两八钱，稍冷，装入瓦钵中，用红布摊贴，每张大重五钱，小重三钱。视患处大小，熔开贴患处。

【主治】臀脊腰腹掣引疼痛。

66950 桂枝丸

【方源】《博济》卷二。

【组成】槟榔三个（大者） 牵牛三两（一半麸炒，一半生用） 官桂三两（去皮） 青皮二两（去白） 陈皮二两（去白） 干姜二两（炮）

【用法】上为细末，煮醋面糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，茶、酒任下。如妇人心腹痛，即醋汤送下，男子用茴香汤送下。若宿酒后服妙。

【功用】利胸膈，进饮食，充肌肤。

【主治】诸气，心疼腹痛；宿酒。

66951 桂枝汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】阳旦汤（《金匱》卷下）。

【组成】桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）

【用法】上咬咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身絪絪微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病愈，停后服，不必尽剂；若不汗，更服依前法，又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服，若不汗出，乃服至二三剂。

【功用】解肌发表，调和营卫。

①《伤寒论》：解肌发汗，和营卫。②《古今医鉴》：实表散邪。③《伤寒来苏集》：滋阴和阳，调和营卫。

【主治】外感风寒，汗出恶风，头痛发热，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱；杂病、病后、妊娠、产后等见时发热，自汗出，微恶风，属营卫不和者。现用于感冒、流行性感冒见上述症状者。

①《伤寒论》：太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕，头痛者。太阳病，下之后，其气上冲者。太阳病，外证未解，脉浮弱者。太阴病，脉浮者。霍乱吐利止而身痛不休者。②《金匱》：妇人妊娠得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热。产后风续之数十日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下闷，干呕，汗出。③《医灯续焰》：腹中痛在脐旁，名曰盘疝。脚气发于太阳经，发热头痛恶寒，目眩项强，腰脊、身体及外踝后至小趾外侧皆痛。④《伤寒附翼》：凡头痛发热恶风恶寒，其脉浮而弱，汗自出者，不拘何经，不论中风、伤寒、杂病，咸得用此发汗。愚常以此汤治自汗、盗汗、虚症、虚痢随手而愈。⑤《杂症会心录》：胎症。

【宜忌】①《伤寒论》：禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、恶臭等物。若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之。若酒客病，不可与桂枝汤。②《注解伤寒论》：桂枝下咽，阳盛则毙。

【方论选录】①《注解伤寒论》：《内经》曰：“辛甘发散为阳”，桂枝汤，辛甘之剂也，所以发散风邪。风淫所胜，平以辛，佐以苦甘，以甘缓之，以酸收之。是以桂枝为主，芍药、甘草为佐也；风淫于内，以甘缓之，以辛散之。是以生姜、大枣为使者也。②《医方考》：桂枝味辛甘，辛则能解肌，甘则能实表，经曰：辛甘发散为阳，故用之以治风；然恐其走泄阴气，故用芍药之酸以收之；佐以甘草、生姜、大枣，此发表而兼和里之意。③《伤寒附翼》：此为仲景群方之魁，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方也。用桂枝发汗，即用芍药止汗，生姜之辛，佐桂以解肌，大枣之甘，佐芍以和里。桂、芍之相须，姜、枣之相得，阴阳表里，并行而不悖，是刚柔相济以为和也。甘草甘平，有安内攘外之功，用以调和气血者，即以调和表里，且以调和诸药矣。而精义尤在啜稀热粥以助药力。盖谷气内充，外邪勿复入，热粥以继药之后，则余邪勿复留，复方之妙用又如此。故用之发汗，自不至于亡阴，用之止汗，自不至于貽患。④《伤寒贯珠集》：此方用桂枝发散邪气，即以芍药摄养津气，炙甘草合桂枝之辛足以攘外，合芍药之酸足以安内，生姜、大枣、甘草相合补益营卫，亦助正气去邪气之用也。盖以其汗出面邪不出，故不用麻黄之发表，而以桂枝助阳以为表，以其表病而里无热，故不用石膏之清里，而用芍药敛阴以为里，此桂枝汤之所以异于麻黄、大青龙也。

【临证举例】①伤风 《全国名医验案类编·续编》：赵云龙，年五十二岁，业商，住南通，患伤风。下乡收帐，感受风寒，头痛有汗，谵语狂笑，大便不通，已经六日，小

便自利，身热恶风，脉浮而大，宜桂枝汤。桂枝二钱，赤芍药二钱，甘草一钱，生姜二片，红枣二枚，服后笑语皆止，第二日大便自通，三日而愈。②发热 《伤寒论通俗讲话》：病者某某，女，成人。近一年来，每天都出现2~3次发热、汗出。查其饮食、大小二便、睡眠皆佳。曾按阴虚治疗，服药20余剂无效。诊其脉缓软，舌淡苔白，辨为营卫不和，用桂枝汤原方服二剂即热止汗不出。③多汗症 《福建中医药》(1964; 5: 35)：治一青年渔民，某年夏天因汗后入海捕鱼，遂致自汗不止，无论冬夏昼夜常自汗出，曾用玉屏风散及龙、牡、麻黄根，桂枝汤加黄耆，均稍愈而复发。经过年余，体益疲乏，皮肤被汗浸呈灰白色，汗孔增大，肢末麻痹，头晕、口不渴，尿量减少，饮食如常，脉浮缓，重按无力。用桂枝汤原方如法服之，三日后全身温暖，四肢舒畅，汗已止。继用原方加黄耆15克，连服二剂，竟获全功。④妊娠恶阻 《新中医》(1984; 4: 12)：病者王某某，24岁。妊娠月余，呕吐频频，曾服中药10余剂乏效，继又住院三天，中西医针药并举仍呕恶冲心难忍。近几天又增腹痛，望其面色不华，语声无力，无食欲，强食之则食之即吐，小便黄，大便干，舌苔舌质无明显变化，脉弦数。诊为冲气上逆，非降逆平冲不能止呕。遂用桂枝、白芍各10克，竹茹、生姜各9克，大枣3枚，炙甘草3克。服一剂，自觉心中安定，呕吐有所减轻。连服三剂，呕吐已止，腹痛除，胎气安。作者指出，本方所治之妊娠恶阻，以既无明显寒象，又无明显热象为宜。⑤急惊 《全国名医验案类编·续编》：柯某之长子，年岁半，住云南昆明市铁道分局。病冒风急惊。民国十一年阴历九月初六日晨，寐醒抱出，冒风面惊，发热自汗沉迷，角弓反张，手足抽搐，目上视，纹赤而浮，唇赤舌淡白，脉来浮缓。由风寒阻塞太阳运行之机，加之小儿营卫未充，脏腑柔嫩，不耐风寒，以致猝然抽搐而成急惊，此为风中太阳

肌表之症，以仲景桂枝汤主之。使太阳肌腠之风寒得微汗而解，一剂即熟寐汗出热退，次日霍然。⑥皮肤病 《浙江中医杂志》(1965; 5: 30)：以桂枝汤为主，治疗多形红斑、湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬季皮炎、冻疮、蛇皮癣等多种皮肤病之属风寒外袭，营卫不和，血脉阻滞而舌苔薄白，脉象浮缓或浮滑，以及有每逢冬季发作，春暖时症状减轻的规律者，获得满意效果。具体运用时，挟湿者，可加化湿利湿之品，如茅术、羌活、独活、防己、赤小豆、茯苓皮、薏苡仁、车前之类；营血不足者，加当归、首乌、鸡血藤、丹参之类

【现代研究】桂枝汤药理作用的初步研究(《中成药研究》1983; 3: 25)：药理实验结果证明，桂枝汤具有较强的解热、镇痛、抗炎、镇静作用。其解热实验表明，75%桂枝汤能使发热兔肛温降低0.71℃，皮温试验也可使小鼠正常皮肤温度降低8.13%，同时，实验还提示，其解热作用除因促进汗腺分泌引起外，还与桂枝汤的镇静作用及中枢性降温作用有关；镇痛实验表明，在120分钟时，37.5%、75%桂枝汤使小鼠基础痛阈分别增高64.82%和105.35%，而且37.5%桂枝汤对小鼠扭体反应抑制率为80%，75%桂枝汤的抑制率为90%；抗炎实验表明，小鼠致炎后一小时，37.5%和75%桂枝汤对肿胀抑制率分别为85.72%和84.77%；实验还表明，桂枝汤能抑制小鼠自由活动，增强巴比妥类催眠作用。

66952 桂枝汤

【方源】《外台》卷三引《范汪方》。

【组成】桂心二两 小蓝二两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取二升半，纳猪肝十两，去上膜，细研，著汤中，和令相得，临时小温，若毒悉在腹内，尽服之；在下部者，三分药中用一分，竹筒纳下部中。服药一时间，当下如发大细虫五六升。小儿半作之。

【主治】天行瘟疫病。

【宜忌】忌生葱。

66953 桂枝汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】桂心 甘草(炙)各三两 大枣十二枚 (一方用生姜五两)

【用法】上切。以水五升，煮取二升半，分三次服。

【主治】中风汗出，干呕。

【宜忌】忌生葱、海藻、菰菜。

66954 桂枝汤

《外台》卷十四引《深师方》。为《伤寒论》“桂枝加葛根汤”之异名。见该条。

66955 桂枝汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】桂枝半两 甘草二两半 紫菀十八铢 麦门冬一两十八铢

【用法】上咬咀。以水二升，煮取半升，以绵著汤中，捉绵滴儿口中，昼夜四五次与之。

【主治】婴儿猝得瞽咳，吐乳呕逆，暴嗽昼夜不得息。

【宜忌】宜节乳哺。

【方论选录】《千金方衍义》：桂枝汤风伤卫药也，以本方无治瞽咳药，故去芍药、姜、枣，而易紫菀、门冬引领桂枝、甘草以开发肺胃逆气，皆长沙方中变法，岂特婴儿主治哉。

66956 桂枝汤

【方源】《医方类聚》卷四十六引《千金月令》。

【组成】桂心 芍药 生姜(切)各三两 大枣十二枚(破之)

【用法】上切。以水七升，煮取枣烂，去枣，纳药，又煮令微沸，可三升，分为三次服。取汗；无汗更进一服，得汗即止。

【主治】阴伤寒。

66957 桂枝汤

《外台》卷三十四。即《千金》卷三“桂蜜汤”。见该条。

66958 桂枝汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】桂枝半两 附子半两(炮裂，去皮脐) 干姜半两(炮裂，锉) 甘草半两(炙微赤，锉) 麻黄二两(去根节)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加葱白二茎，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。如人行五里，以稀葱粥投之，衣盖取汗；如未汗，一依前法再服。

【主治】伤寒一日，太阳受病，头痛项强，壮热恶寒。

66959 桂枝汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】桂枝一两 赤芍药一两 甘草一两(炙微赤，锉) 麻黄一两(去根节) 芎藭一两 柴胡一两(去苗) 厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗，如人行十里未汗，再服。

【主治】伤寒七日不解，头痛，小便清者。

66960 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】桂(去粗皮) 干姜(炮) 黄芩(去黑心) 芎藭 远志(去心) 独活(去芦头) 防风(去叉) 紫石英 甘草(炙)各一两 麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙)三两 杏仁二十五枚(去皮尖双仁，炒) 石膏二两

【用法】上为粗末。每服七钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，日服三次，夜服一次。

【主治】中贼风，急强大呼，不自知觉，身体强直。

66961 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】桂(去粗皮)三分 芎藭 半夏(汤洗七遍，生姜等分同捣，焙) 附子(炮裂，去皮脐) 菖蒲 麻黄(去根节，先煎，掠去沫，焙) 羌活(去芦头) 细辛(去苗叶)各半两 白芷一分

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大（拍碎），煎至七分，去滓，食前温服。盖覆取汗。

【主治】中风伤寒初得，其外证头项疼，腰背强，壮热语涩，恍惚，涕唾稠粘，遍身拘急。

66962 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】桂（去粗皮） 甘草（炙，锉） 芍药 干姜（炮）各半两 杏仁（去皮尖双仁，炒黄）四七枚 麻黄（去根节）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，并两服。以衣被盖，令汗透。

【主治】初得伤寒时气。

66963 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】桂（去粗皮）二两 赤茯苓（去黑皮）一两半 白术一两 甘草（炙，锉）三分 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒水在心下，心悸动，欲得人按。

66964 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】桂（去粗皮） 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 前胡（去芦头） 芍药 柴胡（去苗） 人参 当归 甘草（炙） 芎藭 石膏各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣二枚（擘），煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒，头目昏痛，体热烦闷。

66965 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。一二百日儿，每服半钱匕，以水半盞，煎至三分，去滓，空心、午后，分二次温服。

【主治】小儿中客忤，吐青白沫，及食饮皆出，腹中痛，气欲绝。

66966 桂枝汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】桂枝 白术 芍药各半两 甘草二钱（炙）

【用法】上锉。每服半两，水一盞，煎至七分，去滓取清，宜温服之。

【主治】①《保命集》：大肠经动，下痢为鹭溏，大肠不能禁固，卒然而下，成水泄，青色，其中或有硬物，欲起而又下，欲了而不了，小便多清。②《济阳纲目》：内寒泄泻。

66967 桂枝汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】桂苓汤。

【组成】桂枝一两 茯苓半两 芍药一两 甘草七钱

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜、大枣同煎，温服。

【功用】发汗。

【主治】风寒暑湿之气，入于皮肤而未深，飧泄不止，日夜无度，完谷不化，身表微热，两手脉息俱浮。

66968 桂枝汤

【方源】《普济方》卷一四七引《鲍氏方》。

【组成】桂枝一两 白芍药一两半 甘草一两

【用法】上为散。每服五钱，煎八分，食前服。盖被取微汗。

【主治】①《普济方》引《鲍氏方》：伤风头痛，鼻鸣干呕，发热自汗恶风，或寒热汗出则少解，如疟状，脉浮洪虚大。②《杂病源流犀烛》：感冒过汗。

【加减】盛夏时及淋家、酒家、衄家，于桂枝汤加黄芩，名阳旦汤；或夏日只用本方增芍药，名建中汤。

66969 桂枝汤

【方源】《普济方》卷一〇六。

【组成】大续命汤去白术加桂

【主治】中风，急强大呼不自知觉，身体强直。

66970 桂枝汤

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】官桂 麻黄（去节，用枝）各等分

【用法】水一钟半，加生姜三片、葱一根，煎至八分，温服。取汗。

【主治】伤寒感冒。

66971 桂枝汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】桂枝 芍药 防风 羌活 川芎 白术 甘草

【用法】上锉。加生姜三片、大枣一枚，水煎，温服。

【功用】实表散邪。

【主治】冬月正伤寒，足太阳膀胱经受邪，头痛，发热恶风，脊强，自汗，脉浮缓。

【宜忌】无汗者不可服。

66972 桂枝汤

《东医宝鉴·外形篇》卷三。即《本事》卷七“桂枝散”。见该条。

66973 桂枝汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桂枝 白芍药 麻黄 甘草

【主治】西北方冬令伤寒，太阳经风伤卫，有汗，恶风，脉浮缓。

66974 桂枝汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】桂枝三钱 白芍（生用）三钱 甘草二钱 大枣三枚 浮麦一撮

【主治】伤风，脉来洪大无力，身热汗出者。

【加减】气虚脉细，加黄耆。

66975 桂枝汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】桂枝 当归 白芍（炒） 白术（炒） 白茯苓 柴胡 熟半夏 陈皮 甘草

【用法】生姜二片，红枣二枚为引。

【主治】疟来数次后，热少寒多者。

66976 桂枝汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】桂枝 厚朴（炒） 陈皮 甘草 桔梗 红花 柴胡 麦芽 神曲 木香

【用法】生姜一片，红枣二枚为引。

【主治】厥阴伤寒，腹痛作泻，或成结胸者。

66977 桂枝汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】桂枝 防风 神曲 使君子肉 厚朴 木香 白芍 陈皮

【用法】生姜一片为引，水煎服。

【主治】寒气入胃，吐虫，面青，手足作冷者。

66978 桂枝汤

【方源】《伤风约言》。

【组成】桂枝 芍药各二大园匕 生姜七分

【用法】以水三合，煎取一合，去滓顿服。中病即止。

【主治】外感风寒，脉浮数者。

66979 桂枝汤

【方源】《活人方》卷三。

【组成】防风三钱 羌活二钱 茯苓一钱五分 陈皮一钱五分 苏叶一钱 桂枝五分 甘草二分 生姜三片

【用法】水煎，午前后服。

【主治】三阴自利。

66980 桂枝汤

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】桂枝 枳壳 陈皮 红花 香附 生地 归尾 胡索 防风 赤芍 独活各等分

【用法】加童便、陈酒煎服。

【主治】伤手或伤臂。

【备考】本方方名，《中医伤科学讲义》引作“桂枝治伤汤”。

66981 桂枝汤

【方源】《治痢提要新书》。

【组成】酒芍四钱 桂枝二钱 炙草二钱

【用法】加生姜水煎，去滓，入饴糖三五钱，微火解服。

【主治】发热，恶寒，自汗，腹痛下痢。

66982 桂枝汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】桂枝 芍药 独活 牛膝 薯蓣 甘草各三两 附子二两 防风 茯苓 天雄 茵芋 杜仲 白术 蒟藳根各四两 干姜五两 大枣四十枚 踰躅一升 猪椒叶根皮各一升

【用法】上咬咀。以酒四斗，渍七日。每服四合，一日二次，加至五六合。

【主治】肝虚寒，卒然瘖哑不声，踞坐不得，面目青黑，四肢缓弱，遗失便利，疠风所损。

【方论选录】《千金方衍义》：肝虚卒犯疠风，面青肢缓乃肝之本病；至于瘖哑、便失，又为肾脏气衰不能统摄上下之兆。方用桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤三方萃聚于一，方谓峻矣；犹恐肾中真阳式微，不能焕发脾气，乃以干姜易生姜，佐术、附以温水、土二脏，且合成甘、姜、苓、术以祛肾着之邪；犹恐附子之力不逮，更需天雄统摄茵芋、踰躅、蒟藳、猪椒戮力并攻；犹恐茵芋等药过烈，因以大枣和之；其独活、防风、芍药、薯蓣、杜仲、牛膝虽药中卑伍，然无老成无以约制强悍，克济刚柔之用；用酒渍者，酒能活络行经，彻内外而搜逐风毒之气也。

66983 桂枝汤

【方源】《直指》卷二十六。

【异名】桂枝散（《普济方》卷三一）。

【组成】辣桂

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】打扑伤坠，瘀血混闷，身体疼痛。

66984 桂枝酒

【方源】方出《得效》卷八，名见《普济方》卷二一九。

【组成】桂枝二两 好酒二升

【用法】煎至一升，候温，分作二服灌之。

【主治】因大吐大泻之后，四肢逆冷，元气不接，不醒人事；或伤寒新愈误行房，小腹紧痛，外肾搐缩，面黑气喘，冷汗自出之脱阳证。

66985 桂枝散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】桂枝三分 黄芩三分 麻黄三分（去根节） 石膏一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗。

【主治】时气一日，头痛壮热，骨节疼痛。

66986 桂枝散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】桂枝半两 葛根半两 麻黄三分（去根节） 石膏一两 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白五寸，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗，未汗再服。

【主治】热病二日，头痛壮热。

66987 桂枝散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】桂枝 独活 麻黄（去根节） 赤芍药 川大黄（锉，微炒） 防风（去芦头） 细辛各一分

【用法】上为细散。每服半钱，以薄荷温酒调下，不拘时候。

【主治】小儿中风，口噤，四肢拘急。

66988 桂枝散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】桂枝一两 赤芍药一两 甘草半两（炙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。此方自霜降至春分宜用。

【功用】发汗。

【主治】四时伤寒并时气。

66989 桂枝散

【方源】《幼幼新书》卷二十一引郑愈方。

【组成】赤芍药 桂心 藿香 白术各二钱

【用法】上为末。每服半钱，饭饮调下。

【功用】调气。

【主治】小儿气逆取转后。

66990 桂枝散

【方源】《本事》卷七。

【组成】枳壳一两（小者，去瓢，麸炒黄）
桂枝（去皮）半两（不见火）

【用法】上为细末。每服二钱，姜、枣汤调下。

【主治】因惊伤肝，胁骨里疼痛不已。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒入足太阴，桂枝气味辛温入足太阳，因惊伤肝致胁骨疼痛不已，必延及太阴、太阳，故以苦寒、辛温二味护持经络，再以姜、枣之辛甘和其营卫，则受伤之肝得安而疼痛自然缓矣。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作“桂枝汤”。

66991 桂枝散

【方源】《普济方》卷二〇〇引《广南四时传方》。

【组成】官桂 甘草 青橘皮（去瓢） 干姜（炮） 牵牛子（生用）各等分

【用法】上为散。每服一钱，水一盞，煎至七分，热服。逐日早夜五服，取安为度，莫忌频频服。早晨常一服，诸疾不生。

【主治】时疾疟痢。

66992 桂枝散

《普济方》卷三一。为《直指》卷二十六“桂枝酒”之异名。见该条。

66993 桂苓丸

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】肉桂（去粗皮，不见火） 茯苓（去粗皮）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，用新汲水或热水嚼下；化下亦得。

【功用】大解暑毒。

【主治】水饮停留胸腹，短气眩晕，面足浮肿，小便不利；肾气上逆，水冷为痰，逆冲膈上。

①《鸡峰》：水饮不消，停留胸腹，短气上喘，头眩心忪，面目壅庞，心胸注闷，不思粥食，两胁胀满，小便不利，腰腿沉重，足胫浮肿，遍身黄色，时复自汗。②《御药院方》：冒暑大渴，饮水过多伏冷，心腹胀满，见食欲呕，头眩，小便赤少，大便滑泻。③《张氏医通》：肾气上逆，水泛为痰，逆冲膈上。

【备考】本方改为汤剂，名“桂苓饮”（见《张氏医通》）。

66994 桂苓丸

【方源】《三因》卷五。

【组成】桂心 白术各二两 赤茯苓三两 乌梅肉一两半 干生姜一两 甘草（炙）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸至二丸，嚼细，熟水送下。

【功用】消痰饮，宽胸膈。

【主治】伤暑烦渴。

66995 桂苓汤

【方源】方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八四。

【组成】桂心半两 赤茯苓一两 半夏一两（汤洗七次去滑） 细辛半两 麻黄二两（去根节） 五味子一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盞，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上气不得喘息，喉中作水鸡声。

66996 桂苓汤

《圣济总录》卷四十一。为《圣惠》卷三“补肝柏子仁散”之异名。见该条。

66997 桂苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】桂（去粗皮）三两 泽泻（锉） 赤茯苓（去黑皮，锉） 干姜（炮）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空腹、日午、日晚各服一次。

【主治】脚气上喘，心下妨闷。

66998 桂苓汤

《儒门事亲》卷十二。为原书同卷“桂枝汤”之异名。见该条。

66999 桂苓汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】辣桂 赤茯苓 当归 川芎 赤芍药 蓬莪术 京三棱 槟榔 苍术（炒）桑白皮（炒）大腹皮 瞿麦穗 青皮 陈皮 甘草（炒）各半两 葶苈 大黄（湿纸煨）各一分

【用法】上为散。每服三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】血分水饮，经脉不行，血化为水，四肢红肿。

67000 桂苓饮

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】猪苓 泽泻 桂枝 甘草 白术 知母 黄柏 山梔 蕨叶

【用法】水二钟，加生姜三片，煎至一钟，再加滑石末一钱，煎三沸，温服。取微汗为效。

【主治】伤寒初病，无热谵语，烦躁不安，精彩不与人相当，此因热结膀胱，名曰如狂。

【宜忌】忌下。

67001 桂苓饮

《张氏医通》卷十六。即《局方》卷二（绍兴续添方）“桂苓丸”改为汤剂。见该条。

67002 桂苓散

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

【组成】茯苓二两（锉） 桂一分

【用法】上为细末。每服二钱，粥饮调下，一日二三次，不拘时候。每服药后，饮沸汤，或粥饮一盞或半盞为佳。

【主治】伤寒。

67003 桂苓散

【方源】《得效》卷五。

【组成】半夏四钱 桂心 甘草各三钱 赤茯苓四两 泽泻四两

【用法】上为散。每服四钱，加生姜，水煎服。

【主治】翻胃发渴。

67004 桂苓散

【方源】《名家方选》。

【组成】芍药 茯苓各三十钱 当归十五钱 干姜 桂心各十钱 甘草五钱

【用法】上为散。每服一钱，白汤送下，日二夜一。

【主治】心腹动悸，诸药不效者。

67005 桂参丸

【方源】方出《外台》卷十二引《崔氏方》，名见《鸡峰》卷九。

【组成】乌头八分（炮） 人参八分 桂心八分 附子八分（炮） 干姜八分 赤石脂八分 朱砂三分（研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，以暖酒送下。稍稍加之至十九。

【主治】痼癖积冷，发如锥刀所刺，鬼疟往来者。

67006 桂参丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】桂（去粗皮）一两 肉苁蓉（酒浸，切，焙）半两 豉（微炒）一合 麝香（研）一钱 桃仁（汤浸，去皮尖，别研） 乌梅肉（炒） 常山（锉） 人参各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空腹米饮送下，未发时再服。渐加至二十丸。

【主治】劳疟。

67007 桂参汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】桂（去粗皮） 人参各半两 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 缩砂仁各一两 白术半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）三分 干姜（炮）半两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加粟米并大枣，同煎至七分，去滓温服。

【主治】干呕烦闷，不入饮食。

67008 桂参汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】桂(去粗皮)一两 人参一分

【用法】上为粗末。一二百日儿每服半钱匕,水半盏,煎至三分,去滓,分三次温服。

【主治】小儿中客忤,吐青白沫,及饮食皆出,腹中痛,气欲绝。

67009 桂珀散

《医级》卷九。即原书同卷“桂香散”加灵脂、沉香。见该条。

67010 桂荔汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】白术二两 肉桂二钱 山药一两 小茴香二钱 荔枝核三个(敲碎)

【用法】水煎服。

【功用】温肾中之寒,消睾丸之湿。

【主治】寒湿疝气。

67011 桂药散

【方源】《普济方》卷三五三引《卫生家宝方》。

【组成】没药一分(研) 官桂半两 当归三分(生用)

【用法】上为末。每服一大钱,炒葱白酒送下,一日三次。

【主治】产后如伤寒候,寒热不调,心惊头昏,体虚,四肢无力,饮食全不思。

67012 桂星散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】桂香散(《医学入门》卷七)、桂辛散(《张氏医通》卷十五)、桂花散(《杂病源流犀烛》崇文书局刻本卷二十三)。

【组成】辣桂 川芎 当归 细辛 净石菖蒲 白蒺藜(炒,杵去刺) 木通 木香 麻黄(去节) 甘草 大南星(煨裂) 白芷梢各四钱

【用法】上为碎。每服三钱,水一盞半,加葱白二片,紫苏五叶,生姜五片,水煎,食后服。晚少食,临卧加些全蝎服。

【主治】耳聋、耳鸣、头痛。

①《直指》:风虚耳聋。②《嵩崖尊生》:风

入聋鸣,必有时头痛。③《医钞类编》:寒虚耳聋。

67013 桂骨散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】桂(去粗皮) 鱼骨各一两

【用法】上为散。掺入耳中。

【主治】耳聋有脓。

67014 桂香丸

《三因》卷十一。为《局方》卷六(吴直阁增诸家名方)“豆附丸”之异名。见该条。

67015 桂香丸

【方源】《普济方》卷二〇四引《卫生家宝方》。

【组成】桂心 干姜 茯苓 槟榔 甘草(炮) 人参 细辛 诃子(炮,去核) 枳壳(麸炒,去瓢) 白芍 白术各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,嚼破,空心温酒送下。

【主治】气膈、食膈、忧膈、冷膈、热膈,痞塞不通,宿食不消,或霍乱,或心痛,或呕物,或泄泻,腹胁气胀,吞酸少食。

67016 桂香丸

【方源】《医方类聚》卷一三〇引《济生》。

【组成】肉桂(不见火)一两 麝香(别研)一钱

【用法】上为细末,饭为丸,如绿豆大。大人每服十五丸,小儿每服七丸,熟水送下,不拘时候。

【主治】①《医方类聚》引《济生》:过食杂果,腹胀气急。②《杂病源流犀烛》:多食果菜成积,不时泻利,腹中若有傀儡也。积聚、癥瘕、痞癖。

67017 桂香丸

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】当归须 川芎 赤芍药 牡丹皮 南木香 细辛 辣桂(并晒干) 玄胡索(略炒) 乳香 没药各等分

【用法】上煮米醋,将乳香、没药为膏,余药末之,揉和为丸,如梧桐子大。每服七十丸,续断煎汤送下;有热,多加生槐花煎汤

送下。

【主治】月事不调，心腹刺痛，寒热间作。

67018 桂香汤

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】桂（去粗皮） 芍药 木香 柴胡（去苗）各一两 芎藭 鳖甲（去裙襴，醋炙） 干姜（炮） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒） 常山各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】尸注发歇无时，心腹切痛。

67019 桂香汤

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】当归 川芎 桂心

【用法】上为末。每服四五钱，水、酒同煎服。

【主治】产后腹痛不可忍。

67020 桂香饮

《易简方》。为《博济》卷四“香桂散”之异名。见该条。

67021 桂香散

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】高良姜（锉，炒香熟） 草豆蔻 甘草 白术 缩砂肉 厚朴（去粗皮，锉）各一两 青橘皮（去瓤，炒黄） 诃子肉各半两 肉桂一分 生姜 枣肉各一两（二味同厚朴一处，用水一碗，煮令干，同杵为团，焙干用）

【用法】上同为末。每服二钱，入盐少许，空心沸汤点下。

【功用】温脾止痛。

【主治】脾胃虚弱，腹痛冷泻，及妇人脾血久冷。

67022 桂香散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】桂（去粗皮）半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一分

【用法】上为散。每服一钱匕，绵裹含咽。十次，其骨软渐消。

【主治】鵝、鸭及鸡骨，鲛在喉中。

67023 桂香散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】桂（去粗皮） 栝楼根各二两

【用法】上为细末。以小竹筒盛，密塞。带行，卒为毒蛇所中即敷之。

【主治】诸蛇咬，毒气攻心。

67024 桂香散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】水银 黑锡各三钱 硫黄五钱

【用法】铤内用柳木捶研，熬微火上，细研为灰，取出后入丁香末二钱、桂末二钱、生姜末三钱，一处研匀。每服三钱，黄米粥饮调下。一服取效，病甚者再服。

【主治】膈气反胃，诸药难效，朝食暮吐，暮食朝吐，甚者食已辄出。

67025 桂香散

《医方类聚》卷二二九引《胎产救急方》。为方出《卫生家宝产科备要》卷六，名见《医方类聚》卷二二九引《济生》“香桂散”之异名。见该条。

67026 桂香散

《普济方》卷三二八。为《博济》卷四“香桂散”之异名。见该条。

67027 桂香散

《医学入门》卷七。为《直指》卷二十一“桂星散”之异名。见该条。

67028 桂香散

【方源】《胎产秘书》卷中。

【组成】桂心一两 乳香（去油）一两

【用法】共为末。作三次服，芎归汤下。

【功用】催生。

67029 桂香散

【方源】《医级》卷九。

【组成】桂心 琥珀 当归 川芎各五钱 没药 香附 茴香 川楝子 木香 吴萸

【用法】上为末。每服一钱，开水调下。

【主治】妇人经脉虚滞，瘕气攻疼。

【加减】加灵脂、沉香，又名桂珀散。

【备考】方中没药、香附、茴香、川楝子、木香、吴萸以及灵脂、沉香用量原缺。

67030 桂香膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】桂(去粗皮) 牡蛎(烧) 蛇床子(炒) 各半两 细辛(去土) 零陵香各一钱半 胡椒四十九粒 麝香(另研) 一钱

【用法】上为细末。临时每用一钱，津唾调涂上。

【主治】阳痿。

67031 桂姜丸

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《圣济总录》卷六十一。

【组成】桂 乌喙 干姜各一分 人参 细辛 茱萸各二分 贝母二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，一日三次。

【主治】①《肘后方》：卒患胸痹痛，胸痹之病，令人心中坚痞忽痛，胸中苦痹，绞急如刺，不得俯仰，其胸前皮皆痛，不得手犯，胸满短气，咳嗽引痛，烦闷自汗或彻引背脊。②《外台》引《古今录验》：胸中隐然而痛，脊脊肩痛。

【宜忌】《外台》引《古今录验》：忌生葱、生菜、猪肉、冷水。

67032 桂姜丸

【方源】《普济方》卷一八七引《肘后方》。

【组成】桂(去粗皮) 干姜(炮) 乌头(炮，去皮脐) 各一分 人参三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，温酒送下；粥饮亦得。稍加之。

【主治】胸中隐然而痛，亦治胸痹，心膈痞满，肩背缓急痛。

67033 桂姜丸

《圣济总录》卷八十五。为《千金》卷十九“丹参丸”之异名。见该条。

67034 桂姜汤

《三因》卷六。为《伤寒论》“柴胡桂枝干姜汤”之异名。见该条。

67035 桂姜汤

【方源】《直指》卷十八。

【组成】吴茱萸十两(半酒半醋浸一宿，焙

干) 川白姜(生) 辣桂各半两 良姜 半澄茄 茴香(炒) 缩砂仁 益智仁 木香 茯苓 甘草(炙) 各三钱

【用法】上锉。每服三钱，水煎，调苏合香丸，食前服。

【主治】无阳脐冷疝气，兼治湿证。

67036 桂姜汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】肉桂 炮姜 甘草各五分

【用法】上药各为极细末，滚水冲掉，将碗顿于滚水内，再掉，慢以咽下。但先以鹅毛蘸桐油，入喉捲痰，痰出服药更效。

【主治】喉痛顷刻而起，前无毫恙者，此虚寒阴火之症；并治喉痹一切危急之症。

【备考】本方方名，《仙拈集》引作“姜桂汤”。

67037 桂姜饮

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】乌梅肉十枚 生姜三片

【用法】煎汤灌下。用童便灌下亦佳。

【主治】临月胎上逼下，呕哕欲死。

【备考】本方名桂姜饮，但方中无桂，疑为“梅姜饮”之讹。

67038 桂姜散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】桂(去粗皮)一两 生姜(片切，焙干)二两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】心疼，冷气疔刺，痛不可忍。

67039 桂姜散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】桂(去粗皮，以姜汁半合涂炙，令姜汁尽) 阿胶(炙令燥) 当归(切，焙) 各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，空心以陈米饮调下，一日二次。

【主治】产后冷痢疾。

67040 桂桃汤

【方源】《医级》卷九。

【组成】桂枝 芍药 甘草 桃仁 生地

生姜 大枣

【主治】经行偶感风寒，身热腹痛，无拘急者。

【加减】此方去生地为稳当，或加芎、苏更妙。

67041 桂香汤

【方源】《观聚方要补》卷一引《本草切要》。

【组成】桂枝汤 黄耆 人参 柴胡

【主治】伤寒里虚表实，行发散药邪汗不出，身热烦躁，六脉空数。

67042 桂铁散

【方源】《经验良方》。

【组成】铁粉 桂三分一

【用法】上为末。每日服四五钱。

【主治】水肿愈后，因纤维弛缓易再发者。

67043 桂浆粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】肉桂 2~3 克 粳米 50~100 克 红糖适量

【用法】将肉桂煎取浓汁去滓，再用粳米煮粥，待粥煮成后，调入桂汁及红糖，同煮为粥。或用肉桂末 1~2 克，调入粥内同煮服食。

【功用】补阳气，暖脾胃，散寒止痛。

【主治】肾阳不足，畏寒怕冷，四肢发凉，阳萎，小便频数清长，脉搏微弱无力；脾阳不振，脘腹冷痛，饮食减少，大便稀薄，呕吐，肠鸣腹胀，消化不良，以及寒湿腰痛，风寒湿痹，妇人虚寒性痛经。

67044 桂菖散

【方源】《玉机微义》卷五十。

【组成】桂心一两 石菖蒲一分

【用法】上为末。三岁一钱，水煎服。若大病后不语者，用猪胆汁调下，未语再服。

【主治】小儿急中风，失音不语。

67045 桂黄汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】半夏二两 生姜六两 陈皮（去白）四两 桂一两 吴茱萸（汤泡）五十粒

【用法】上咬咀。用水十升，煮取四升，空心食前，分五次服。

【主治】胸满气噎，下部冷，脐腹疼痛。

67046 桂黄丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】硫黄四两 桂 白术 赤茯苓 泽泻 猪苓 黄橘皮各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心橘皮汤送下。

【主治】水气肿满，小便不利。

67047 桂椒丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】桂（去粗皮）一分 胡椒（炒）四十九粒 巴豆七粒（去皮膜，研出油尽） 斑蝥七枚（去头足翅，炒）

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如麻子大，阴干。每服三丸，早、晚食后、临卧温酒送下；妇人，醋汤送下。

【主治】久心痛。

【宜忌】孕妇忌服。

67048 桂椒锭

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】橘皮一两五钱 天门冬一两 桂皮五钱 干姜 胡椒各二钱 丁香一钱

【用法】上为细末，干柿百个（去核），同和捣为泥，作锭用之。

【功用】补脾开胃，消滞温中，解酒毒。

【主治】痰喘嗽，胸腹冷痛。

67049 桂粟饮

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】粟米一升（水沉净洗，炒极热） 桂皮（去粗皮）五钱

【用法】上为细末。每服一合，温蜜水调下。

【功用】解烦热，止渴，止泻，实大肠，止霍乱。

67050 桂蜡丸

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】桂（去粗皮）

【用法】上为末，熔黄蜡为丸。看疮大小，置疮内，湿纸三五重搭盖，以火焙候药丸熔入肉，其刺自出。如无刺，即所伤者亦平也。

【主治】恶刺入肉。

67051 桂蜜汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】桂心汤（《千金翼》卷七）。

【组成】桂心二两 蜜一升 附子一两 干姜 甘草各二两 当归二两 赤石脂十两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取三升，纳蜜煎一二沸，分三服，一日三次。

【主治】产后余寒下痢，便脓血赤白，日数十行，腹痛时时下血。

【方论选录】《千金方衍义》：夫蜜润肠，下痢所禁，反取用之，以产后泄脱无度，非四逆、桃花无以疗之，虽证属虚滑，而痢久津液逮匱，急需滋干导滞以协济之。考之本草，蜜性虽滑，熟则温中，姜虽辛热，炮则苦平，可知蜜有和解辛热之功，姜具散火安中之力，而桃花汤中粳米煎，胶蜡汤中已借用之。此方既有桂心、当归、甘草、熟蜜温中和血，可无藉于粳米也。

【备考】本方方名，《外台》引作“桂枝汤”。

67052 桂麝散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】麻黄五钱 细辛五钱 肉桂一两 牙皂三钱 生半夏八钱 丁香一两 南星八钱 麝香六分 冰片四分

【用法】上为极细末。掺膏药内贴。

【主治】一切阴疽流注。

67053 桂心酒粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】桂心半两（末） 好酒一升

【用法】上暖酒和桂心末，空腹分二次服，搅粥食之。

【主治】肾脏虚冷，腰脚疼痛不可忍。

67054 桂苓饮子

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】桂枝 猪苓 知母 泽泻 黄柏 甘草梢 滑石

【用法】加生姜三片、灯心二十四茎，水煎，温服。

【主治】伤寒初得，邪热结于膀胱之如狂症，无大热，狂言、烦躁不安，精采不与人相当。

【备考】《寿世保元》本方用猪苓二钱，泽泻二钱，桂枝八分，甘草八分，黄柏一钱五分，知母一钱五分，滑石三钱；并有白术一钱五分，山梔三钱。

67055 桂矾敷方

【方源】方出《圣惠》卷八十九，名见《圣济总录》卷一八〇。

【组成】桂心一分 白矾半两

【用法】上为末。每用少许，干敷舌下，一日三次。

【主治】小儿重舌，及口中生疮、涎出。

67056 桂丁定痛散

【方源】《医醇剩义》卷四引徐相任方。

【组成】肉桂五分 丁香一钱 澄茄一钱五分 磁石三钱

【用法】上为极细末。分作十二次服。

【主治】夏、秋劳动口渴，多饮冷水，心腹作痛，诸药不效。

【方论选录】此方温之以桂、丁、澄茄，恋之以磁石，使药力不至一过就了，不论男妇老幼皆可服。

67057 桂心三物汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】桂心二两 胶饴半斤 生姜二两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取三升，去滓纳饴，分三次服。

【主治】心中痞，诸逆悬痛。

【方议选录】《千金方衍义》：桂心通心气，散血结；生姜去秽气、通神明；胶饴和脾气，缓急痛。凡心痛之属虚冷者宜之。

67058 桂心白术丸

《鸡峰》卷十五。为《圣惠》卷七十“白术丸”之异名。见该条。

67059 桂心白术汤

《活人书》卷十七。为《圣惠》卷十“白术散”之异名。见该条。

67060 桂心白术散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】桂心 白术 附子 川芎 甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】阴痿有汗，脉沉细，手足搐搦。

67061 桂心半夏汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇三。

【组成】桂心一两 半夏一两（汤浸七遍，去滑）

【用法】上为末。每服一钱，煎生姜酒调下。如人行十里再服。

【主治】霍乱转筋。

67062 桂心牡蛎汤

《活人书》卷十九。即《千金》卷三“芍药汤”加黄芩。见该条。

67063 桂心牡蛎散

《普济方》卷三五三。即《千金》卷三“芍药汤”加黄芩。见该条。

67064 桂心羌活丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮） 麻黄（去根节） 白僵蚕（炒） 防风（去叉） 枳壳（去瓢，麸炒） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙） 苦参 酸枣仁（炒） 乌头（炮裂，去皮脐） 犀角（镑） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 龙骨 郁李仁（去皮，研） 人参各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，热酒送下。

【主治】脑风头痛久不愈。

67065 桂心枳实汤

《圣济总录》卷五十六。为《金匱》卷上“桂枝生姜枳实汤”之异名。见该条。

67066 桂心茯苓丸

《张氏医通》卷十五。为《金匱》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

67067 桂心釜墨散

【方源】《金鉴》卷四十九引《千金》。

【组成】桂心 釜底墨各等分

【用法】上为末。每服方寸匕，酒送下。

【主治】妇人伤损心脾，每交接辄出血。

67068 桂心胶饴汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜一枣大（拍碎），煎至六分，去滓，下胶饴二枣大，更煎一二沸，温服，空心、早晚各一次。

【主治】心中痞急懊恼痛。

67069 桂心消积丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桂心一两半 当归三两 赤芍一两半（酒炒） 桃仁三两 厚朴一两半（制） 三棱一两半（醋炒） 槟榔一两半 蓬术一两半（醋炒） 大黄三两（醋煮） 鳖甲三两（醋炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，酒煎，去滓温服。

【主治】产后积聚，脉数弦洪紧涩者。

【方论选录】产后血瘀气壅凝结，经久而遏热伤阴，遂成积聚，故腹大胀满疼痛不止焉。槟榔破气导滞以消其聚，当归养血活血以荣其经，桃仁破瘀清积，厚朴散聚宽胀，三棱破气中之血以消坚，蓬术破血中之气以消积，赤芍破血通经，鳖甲滋阴散结，大黄涤热通幽，醋煮引入血分，肉桂温经暖血，中心通闭力优。蜜丸酒煎，使瘀化气行，则积聚并散，而遏热顿清，营阴暗复，安有胀满疼痛之患乎？

67070 桂心蜂房散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】桂（去粗皮）一分 蜂房（炙）半两

【用法】上为散。三四岁儿每服半钱匕，空心、午时煎小麦汤或酒调服。

【主治】小儿石淋、气淋。

67071 桂心橘皮汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】桂心半两 橘皮三两 成掇蕪五

两 黍米五合 人参半两

【用法】上咬咀。以水七升先煮药，煎取二升，次下薤、米，米熟药成，稍稍服之。

【主治】小儿五六日不食，气逆。

【方论选录】《千金方衍义》：桂心、人参、黍米俱温理胃气虚寒之药，兼橘皮以发越参、米补益之性，更加成掇之薤专泄胸中逆上之滞气也。

67072 桂末吹鼻方

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】桂（紫色者，去粗皮）半两

【用法】上为细末。每用少许，吹入鼻中，及置舌下。

【主治】风癰。精神不明，舌强语涩。

67073 桂术二陈汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝八分 白术一钱五分 广皮一钱 半夏一钱五分 茯苓三钱 枳实一钱 泽泻一钱五分 牛膝一钱五分 车前二钱 生姜三片

【主治】痰饮。水从胃出，下走肠间，辘辘有声，胸中微痞，头目作眩。

67074 桂术加葱汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术五钱 肉桂一钱 葱一条

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，五六日腹痛利不止，厥逆无脉，干呕而烦。

67075 桂朴当归散

【方源】《医方类聚》卷八十九引《施圆端效方》。

【组成】桂 川芎 当归（焙） 芍药 桔梗 茴香 五灵脂（炒） 良姜（炒）各二两 厚朴二两半 干姜三两（二味同捣，炒） 橘皮四两 甘草（炒） 黄耆 白茯苓

【用法】上为细末。每服二钱，食前浓煎生姜、大枣汤调下。

【主治】一切脾肾虚寒之证，腹痛泄泻，脾

胃停寒，妇人血海虚冷，脐腹疼痛，月候不匀，赤白崩漏。

【备考】方中甘草、黄耆、白茯苓用量原缺。

67076 桂芍知母汤

《沈注金匱要略》卷五。为《金匱》卷上“桂枝芍药知母汤”之异名。见该条。

67077 桂芎当归散

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄 桂枝各二钱 牛膝五分

【用法】加生姜，水煎，温服。

【主治】妇人产后胞衣不下。

67078 桂附二陈汤

【方源】《慎斋遗书》卷八。

【组成】肉桂 丁香 陈皮 半夏 柴胡 黄芩

【主治】疟疾初发，寒多热少，或但寒不热者。

【加减】渴，加炮姜；寒，加附子。

67079 桂附二陈汤

【方源】《保命歌括》卷二十三。

【组成】二陈汤加附子（炮） 肉桂各等分 甘草（炙）减半

【用法】上咬咀。水一盞半，加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】①《保命歌括》：寒疟，但寒少热，腰疼足冷。②《医灯续焰》：厥疝，厥逆心痛，足寒，诸饮食吐不下。

67080 桂附八味丸

《简明医彙》卷四。为《金匱》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

67081 桂附八味汤

《喉科种福》卷四。即《金匱》卷下“肾气丸”改为汤剂。见该条。

67082 桂附八珍汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】肉桂五分 大附子 人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍（炒） 熟地各一钱 木香 甘草各三分

【用法】加生姜三片，红枣二枚，水二钟，

煎八分，食远服。

【主治】房欲后阴虚受寒，致令肿块，或遍身腿脚疼痛。

67083 桂附止带汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】附片三钱 肉桂五分 续断 焦艾 茯苓 芡实各三钱 盐小茴一钱 乌鲗骨五钱 金樱子三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】温肾固摄。

【主治】肾虚证。带下黑色，稀薄量多，绵绵不止，月经紊乱，甚或停闭，色多晦黯，小腹不痛，但有冷感，腰痠软，面色苍白，喜暖恶寒，大便时溏，小便清长，舌淡苔白，脉沉缓无力。

【加减】腰痛甚，加鹿角霜二钱；下腹坠胀，阴中如有物坠出者，加升麻一钱半。

67084 桂附六合汤

《伤寒广要》卷七。为《元戎》“附子六合汤”之异名。见该条。

67085 桂附地黄丸

《简明医轍》卷八。为《金匱》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

67086 桂附地黄汤

《金鉴》卷四十八。即《金匱》卷下“肾气丸”改为汤剂。见该条。

67087 桂附杜仲汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】肉桂三钱 附子三四钱（急则用生附子） 杜仲二钱

【用法】热服。如上焦假热拒格，冷服。

【主治】真寒腰痛，六脉弦紧，口舌青，阴囊缩，身战栗。

【加减】如膝冷而痛，加川牛膝二三钱；如兼湿者，加苍术二钱。

67088 桂附苓乌汤

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】茯苓三钱 泽泻三钱 桂枝三钱 干姜三钱 附子三钱 龙骨三钱（煨，研） 牡蛎三钱（煨，研） 首乌三钱（蒸）

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】消渴，饮一溲二。

【方论选录】《素问》“饮一溲二，水寒土湿，木郁疏泄，宜苓、泽泄湿燥土，姜、附暖水温中，桂枝、首乌达木荣肝，龙骨、牡蛎敛精摄溺。病之初起，可以药救，久则不治。”

67089 桂附苓术饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】厚附片三钱 肉桂一钱 茯苓四钱 茅术 炒远志 生姜皮各二钱 制台乌一钱半

【用法】水煎服。

【功用】温肾行水。

【主治】肾虚证。妊娠数月，面浮肢肿，面色灰黯，心悸气短，下肢畏寒，腰胀腹满，舌淡苔薄白而润，脉迟。

67090 桂附贴墙膏

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】桂心一两 附子一两（去皮脐，生用） 乳香一两 川椒一两（去目） 白矾一两 吴茱萸一两 生姜汁五合 酒五合

【用法】上为细散，先将姜汁并酒，煎取七合，入药末，调令匀，于油单子上摊。贴于患处，急裹缚之。

【功用】接骨。

67091 桂附逍遥散

【方源】《医学探骊》卷五。

【组成】炙附子三钱 炮姜三钱 吴茱萸四钱 升麻二钱 泽泻三钱 桂心三钱 地榆炭三钱 罂粟壳四钱 沉香三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】寒痢。

【方论选录】此方以附子为君，暖其中宫；以姜、桂、沉香、吴萸、甘草为臣，清散其中、下焦之陈寒；以泽泻、升麻为佐，升降其凝滞之湿热；以地榆、粟壳为使，收敛其纯白之下痢，其郁结散而痢自止矣。

67092 桂附理中丸

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《饲鹤亭集方》“附桂理中丸”之异名。见该条。

67093 桂附理中汤

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】理中汤加桂 附

【主治】①《证治宝鉴》：肾虚呃逆。②《产科发蒙》：妊娠痢疾。

【备考】《产科发蒙》本方用法：每服七钱以水四合，煮取二合，去滓温服。

67094 桂附理中汤

【方源】《喉科种福》卷五

【组成】苏党参八钱 白术五钱 附片六钱 干姜三钱 油桂一钱半（去粗皮，研，炮）

【主治】中寒白喉，无恶寒发热，喉内起白皮，随落随长。

67095 桂附续命汤

《医学发明》。为《保命集》卷中“桂枝续命汤”之异名。见该条。

67096 桂附醒风汤

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】附子一个七钱 天雄一个 南星一个各一两（并生用，去皮脐） 蝎梢半两（去毒）

【用法】上咬咀。每服半两，水一盞半，加生姜七片，煎七分，不拘时候服。

【主治】中风涎潮，牙关紧急，不省人事。

67097 桂枝人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝加人参汤（《云岐子保命集》卷上）。

【组成】桂枝四两（别切） 甘草四两（炙） 白术三两 人参三两 干姜三两

【用法】以水九升，先煮四味，取五升，纳桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再服，夜服一次。

【功用】①《内台方议》：和解表里。②《金鉴》：温补中两解表里。

【主治】太阳病，外证未除，而数下之，遂协热下利，利下不止，心下痞硬，表里不解

者。

【方论选录】①《内台方议》：桂枝以解表，人参、白术以安中止泻，加干姜以攻痞而温经，甘草以和缓其中，此未应下而下之以虚其中者主之也。②《尚论篇》：以表未除，故用桂枝以解之；以里适虚，故用理中以和之。此方即理中加桂枝而易其名，亦治虚痞下利之圣法也。③《伤寒来苏集》：此之谓有表里症，然病根在心下，非辛热何能化痞而软硬，非甘温无以止利而解表。故用桂枝、甘草为君，佐以干姜、参、术，先煎四物，后纳桂枝，使和中之力饶，而解肌之气锐，于以奏双解表里之功，又一新加法也。④《古方选注》：理中加人参，桂枝去芍药，不曰理中，而曰桂枝人参者，言桂枝与理中表里分头建功也。故桂枝加一两，甘草加二两。其治外协热而里虚寒，则所重仍在理中，故先煮四味，而后纳桂枝，非但人参不佐桂枝实表，并不与桂枝相忤，宜乎直书人参而不讳也。

【临证举例】①胃痛《老中医经验选》：谭某某，男，36岁。患者素患胃痛，反复发作，经胃肠钡餐检查，诊为十二指肠球部溃疡，近月来胃脘隐隐作痛，有时发作，而以饭后二~三小时及夜间尤痛。右上腹部有明显压痛及痞闷感，口淡无味，时泛清水，胃纳欠佳，神疲乏力，大便正常，小便较多，脉迟弱，舌质淡白，苔薄白。此为胃虚气寒，治按温中散寒，用桂枝人参汤：党参五钱，白术五钱，干姜三钱，炙甘草三钱，桂枝四钱（后下），三剂，每天一剂。二诊：服上药后，胃痛减轻，纳食稍增，时觉脘闷欲吐，脉舌如前，照上方加法半夏三钱以温胃止吐，三剂，每天一剂。三诊：服上药后，胃痛已止，饮食如常；但停药后胃痛又复发，痞闷喜按，小便较多，脉迟细，舌淡、苔薄白。仍照上法治之，拟第一方减桂枝一钱，服药3剂后止痛。以后按上方继续治疗，服至胃痛消失，不再复发。②麻疹后期腹泻《广东中医》（1963；3：40）：一女孩，三岁许，疹子已收，身热

不退,体温 39℃,下利日十余次,俱为黄色粪水,脉数无歇止,舌质尚正常。诊断为麻后热毒不净作痢,与葛根芩连汤加石榴皮。服后体温反升至 39.5℃,仍下利不止,嗅其粪味并无恶臭气。沉思再三,观病孩颇倦容,乃毅然改用桂枝人参汤,仍加石榴皮。一服热利俱减,再服热退利止。

67098 桂枝加大黄汤

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为《伤寒论》“桂枝加大黄汤”之异名。见该条。

67099 桂枝大黄汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】桂枝 赤芍药 甘草 大黄 枳实 柴胡

【用法】上锉一剂。水二钟,加生姜一片、大枣二枚,煎之;临服入槟榔磨水二匙,热服。

【主治】邪热从阳经传入足太阴脾经,腹满而痛,咽干而渴,手足温,脉来沉而有力。

【加减】腹满不恶寒而喘者,加大腹皮,去甘草。

【备考】《寿世保元》本方用桂枝一钱、大黄二钱、芍药二钱、甘草八分、枳实二钱、柴胡八分。

67100 桂枝大黄汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】生军 桂枝 槟榔 厚朴 白芍 炙甘草 老姜 大枣

【主治】太阴腹满,便闭足温,脉沉数有力。

67101 桂枝五物汤

《赤水玄珠》卷十二。即《金匱》卷上“黄耆桂枝五物汤”。见该条。

67102 桂枝乌头汤

《全生指迷方》卷三。为《金匱》卷上“乌头桂枝汤”之异名。见该条。

67103 桂枝乌芍汤

【方源】《四圣心源》卷七。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 甘草二钱 首乌三钱 茯苓三钱 砂仁一钱

【用法】水煎大半杯,温服。

【主治】中风,左半偏枯者。

【加减】中下寒,加干姜、附子。

67104 桂枝六合汤

《伤寒全生集》卷三。为《元戎》“附子六合汤”之异名。见该条。

67105 桂枝甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂心汤(《圣济总录》卷五十五)。

【组成】桂枝四两(去皮) 甘草二两(炙)

【用法】以水三升,煮取一升,去滓顿服。

【功用】①《伤寒贯珠集》:补助心阳,生阳化气。②《伤寒论类方》:扶阳补中。

【主治】①《伤寒论》:发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者。②《伤寒论今释》引《证治大还》:妇人生产不快,或死腹中。

【方论选录】①《注解伤寒论》:桂枝之辛,走肺而益气;甘草之甘,入脾而缓中。②《伤寒附翼》:此补心之峻剂也。桂枝本营分药,得甘草则内补营气而养血,从甘也。此方用桂枝为君,独任甘草为佐,以补心之阳,则汗出多者,不至于亡阳矣;姜之辛散,枣之泥滞,固非所宜;并不用芍药者,不欲其苦泄也。甘温相得,气和而悸自平。③《古今选注》:桂枝复甘草,是辛从甘化,为阳中有阴,故治胸中阳气欲失。且桂枝轻扬走表,佐以甘草留恋中宫,载还阳气,仍寓一表一里之义,故得以外止汗而内除烦。

【临证举例】①心悸《印机草》:病经一月,两脉浮虚,自汗恶风,此卫虚而阳弱,用黄耆建中汤以建立中气,而温卫实表也。越一日,病者叉手自冒心间,脉之虚濡特甚,此汗出过多而心阳受伤也。仲景云:发汗过多,病人叉手自冒心,心下悸者,桂枝甘草汤主之;桂枝,甘草,大枣。②心痛《福建中医药》(1964;5:封三):林某,男,39岁。胸悸而痛喜按,十天来服许多止痛药均罔效,大小便正常,时有自汗出。诊其六脉微缓,舌

白滑。断为虚痛，用桂枝甘草汤：桂枝六钱，甘草三钱，顿服，服后痛即消失。③体质性低血压《黑龙江医药》(1979；2：59)：秦某某，男，46岁。四年来，血压一直偏低，伴有头晕眼花，失眠多梦，健忘，周身乏力，心悸，心前区压迫感。曾用西药治疗无效，近20余日加重，血压85/58mmHg。诊断：体质性低血压。处方：甘草15克，肉桂15克，桂枝15克，五味子25克，水煎，早晚服两次。4日后血压有所上升，症状减轻；一周后血压升为110/85mmHg，症状消失，睡眠明显好转，自觉周身有气力，精神愉快，后未复发。

67106 桂枝石膏汤

【方源】方出《千金》卷九，名见《活人书》卷十七。

【组成】桂枝 黄芩 甘草各二两 升麻 葛根 生姜各三两 芍药六两 石膏八两 梔子二七枚

【用法】上咬咀。以水九升，煮取二升七合，分二次服，相去十里久。若前两服讫，即得汗后，服即停；不得汗，更进一服，得汗即止。不得汗者，明日去梔子，加麻黄二两，足水二升，再依方服。

【主治】伤寒忽发肿，或著四肢，或在胸背，虚肿浮如吹状，亦著头面唇口颈项，剧者偏著脚胫外如轴大而不痛不赤，著四肢者乃硬不遂，与五香麻黄汤不愈，阳气犹在经络，未入脏腑，脉势仍数者。

【方论选录】《千金方衍义》：伤寒身发浮肿，服五香麻黄，脉数不除，阳邪犹在经络，故于桂枝汤中除去大枣之滞隔，加升麻、葛根以透表，石膏、梔子以化热，黄芩专散在表之标热也。倘服之不应，更进一服，仍不得汗，恐升、葛、桂枝力绵，不能胜芩、梔、石膏之过凉，于中裁去梔子，易入麻黄，便合大料桂枝二越婢一汤之法，以眼前药，身肿尚未全愈，故大枣终非所宜，升、葛尚不可缺也。

67107 桂枝石膏汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】桂枝五钱 石膏 知母各一两半 黄芩一两

【用法】上为粗末，分作三次服。每次以水一盞煎，迎发而服之。

【主治】疟无它证，邪气所舍深，隔日发，先寒后热，寒少热多。

67108 桂枝石膏汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】桂枝汤加石膏一两三钱一字半

【主治】热病。

67109 桂枝归苓汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 甘草二钱 当归三钱 茯苓三钱 川芎二钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】中风，血分虚而左半偏枯者。

【加减】中下寒，加干姜、附子。

67110 桂枝四七汤

【方源】《直指》卷六。

【组成】桂枝 白芍药 半夏(制)各一两 白茯苓 厚朴(制) 枳壳(制) 甘草(炙)各半两 人参 紫苏各一分

【用法】上锉。每服四钱，加生姜七片，大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】风冷寒邪客搏，心腹作痛。

67111 桂枝四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】四物汤加桂枝倍当归

【主治】《金鉴》：妇人经产一切血病，风感太阳卫分，发热有汗。

【备考】《金鉴》本方用当归、熟地、川芎各二钱，白芍(炒)三钱，桂枝三钱，甘草(炙)一钱，加生姜、大枣，水煎服。

67112 桂枝生化汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】桂枝六分 白芍(酒炒)一钱 川芎三钱 当归五钱 桃仁泥二钱 炮姜五分 炙甘草五分 煨天麻一钱 琥珀一钱 泽兰一钱五分 益母草三钱

【用法】加酒三匙冲服。

【主治】产后汗多，血虚生风，口噤咬牙，角弓反张，名曰痉病。

67113 桂枝白术汤

《嵩崖尊生》卷九。为《医学启源》卷中“桂苓白术散”之异名。见该条。

67114 桂枝白术汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】桂枝 白芍 甘草 白术 木瓜 续断 陈皮

【主治】风湿一身尽痛，汗出短气，恶风不欲去衣，脉沉细缓无力者。

67115 桂枝白术汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】嫩桂枝 杭青皮 真广皮 白云苓各一钱 正川芎 香白芷 芽桔梗 尖槟榔各五分 法半夏一钱二分 漂白术六分 家苏叶七分

【用法】加生姜三片，大枣三枚，水煎，于未发前二时服。

【主治】感风而发热症。

67116 桂枝白芍汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】桂枝 白芍 甘草 人参 黄耆

【用法】服药后，身温、汗止者，可治；身冷、脉微，汗不止者，不治。

【主治】出疹因麻黄药太多，或暑月服表药，汗出过多亡阳，表气空虚，邪往凑之，变成中风，冷汗大出，遍身凉，手足冷，身项强掣，角弓反张，不省人事。

67117 桂枝白虎汤

《医方集解》。即《金匱》卷上“白虎加桂枝汤”。见该条。

67118 桂枝瓜蒌汤

《普济方》卷一三四。为《三因》卷九“桂枝栝楼根汤”之异名。见该条。

67119 桂枝半夏汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝八分 半夏一钱五分 茯苓三钱 广皮一钱 白术二钱 芥子一钱 厚朴一钱 紫苏一钱 贝母二钱 甘草四分

生姜三片

【主治】伏饮。三阳之气为阴邪遏抑，郁而不舒，痰满喘咳吐，发则寒热，背腰痛，其人振振身瞤剧。

67120 桂枝加味汤

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】桂枝汤加泽泻 川乌（炮） 青盐 茴香各等分

【用法】水煎服。再用炮附子、葫芦巴（酒炒）、川楝肉（炒）、茴香（炒），四味等分为末，酒煮豕腰子，去筋膜，研细，入酒少许为丸，如梧桐子大，每服四五十丸，食前送下。

【主治】外肾吊痛，自左乳根起，如蜘蛛丝许，吊缩外肾，拘挛不得屈伸，其脉沉弦紧涩。

67121 桂枝加参汤

【方源】《医学入门》卷四

【组成】桂枝 芍药各三钱 人参二钱 甘草一钱 姜三片 枣二枚

【用法】水煎，温服。

【主治】汗后及霍乱后，身痛脉沉。

67122 桂枝加桂汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝加桂枝汤（《方剂辞典》）。

【组成】桂枝五两（去皮） 芍药三两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。炙其核上各一壮。

【功用】①《伤寒贯珠集》：泄上逆之气。②《伤寒论方医案选编》：温通心阳，兼祛寒以平冲逆。

【主治】烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者。

【方论选录】①《伤寒论》：桂枝汤今加桂满五两，所以加桂者，以泄奔豚气也。②《伤寒论条辨》：与桂枝汤者，解其欲自解之肌也；加桂者，桂走阴而能伐肾邪，故用之

以泄奔豚之气也。然则所加者桂也，非枝也，方出增补，故有成五两云耳。③《伤寒论类方》：重加桂枝，不特御寒，且制肾气。又药味重则能下达，凡奔豚症，此方可增减用之。④《伤寒论本旨》：相传方中或加桂枝，或加肉桂。若平肾邪，宜加肉桂；如解太阳之邪，宜加桂枝也。

【临证举例】奔豚 《经方实验录》：周右，住浦东。初诊：气从少腹上冲心，一日四五度发，发则白津出，此作奔豚论。肉桂心一钱，川桂枝三钱，大白芍三钱，炙甘草二钱，生姜三片，大枣八枚。二诊：投桂枝加桂汤后，气上冲减为日二三度发，白津之出亦渐稀，下得矢气，此为邪之去路，佳。肉桂心一钱半，川桂枝三钱，大白芍三钱，炙甘草三钱，生姜三片，红枣十枚，厚朴一钱半，半夏三钱。三诊：气上冲、白津出，悉渐除，益矢气得畅行故也。

67123 桂枝地黄汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 生地三钱 阿胶三钱 当归三钱 甘草二钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】肝燥舌卷。

【宜忌】若中风强舌语拙，或杂证舌萎言迟，皆脾肾湿寒，不宜清凉滋润，勿服此方。

67124 桂枝芍药汤

【方源】《圣惠》卷八。

【组成】桂枝一两 赤芍药一两 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】太阴病下之后，腹满时痛。

67125 桂枝芍药汤

【方源】《三因》卷四。

【组成】桂心半两 白芍药三两

【用法】上㕮咀。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，去滓温服。

【主治】太阴伤风，自汗，咽干，胸腹满，自利，不渴，四肢倦怠，手足自温，其脉弦大而缓者。

【加减】腹痛甚者，加大黄一两。

67126 桂枝芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】桂枝三钱 黄耆 知母 石膏 芍药各一两

【用法】上为粗末。每服五七钱至半两，水一盏半至一盏煎，温服清，迎发而服之。

【主治】疟疾。太阳、阳明合病，阳盛阴虚，内实外虚，寒热大作，不论先后。

67127 桂枝芍药汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】桂一两 芍药 炙甘草各半两

【用法】上㕮咀。每服一两，加生姜、大枣煎服。

【主治】太阴伤寒，主脉沉，客脉紧，沉紧相合，绕脐痛者。

67128 桂枝芍药汤

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为《伤寒论》“小建中汤”之异名。见该条。

67129 桂枝芍药汤

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】桂枝 白芍药 防风 黄耆（炙）甘草各等分

【用法】上锉细。加大枣二枚，水一盏半，煎七分，去滓温服。

【功用】补脾胃。

【主治】脾胃虚弱，痘子初出，他处俱起而手足起迟，他处俱收而手足不收者。

67130 桂枝芍药汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】桂枝 陈皮 甘草 生姜 白芍药

【功用】散寒。

【主治】寒气腹痛，左关弦紧者。

67131 桂枝芍药汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】桂枝 芍药各一钱半 当归三钱

生姜二片 葱头三枚

【主治】妊娠营血不足，寒袭经中，身疼无汗，发热恶寒，脉浮弱者。

67132 桂枝芍药汤

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】桂枝 赤芍 柴胡 防风 独活 羌活 川芎 当归 钩藤 牛蒡 白芷

【主治】小儿痘疮，恐毒气留滞筋骨，不得尽宣于肌肉，而气血又不能活，故手足痛。

67133 桂枝防风汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】桂枝 防风 桔梗 厚朴 苍术 甘草

【主治】风寒湿热三气下利。

【加减】若风热、湿热，当以羌活易桂枝。

【方论选录】用桂枝、防风去太阳风寒；用苍术去阳明风湿。

67134 桂枝防风汤

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】嫩桂枝一钱五分 杭白芍二钱 北防风一钱五分 炙甘草一钱

【用法】上作一剂。加老生姜一钱，大红枣五枚，水煎，热服。有汗能止，无汗能发，不致过汗亡阳。

【功用】解散肌肉之邪。

【主治】半周、一岁以至三五岁幼儿，伤寒初起，恶寒发热，体重面黄，或面白喘急，口中气热，呵欠顿闷。

【加减】有痰，加芥子一钱；有呕吐，加陈皮、半夏各一钱；热多，加柴胡一钱；胸紧气急，加枳壳、桔梗各一钱。

67135 桂枝如圣饮

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】白术 桂枝 防风 川芎 白芷 柴胡 白芍 人参 当归 甘草 半夏 黄芩 乌药

【主治】柔痉有汗，发热恶寒，项背反张，脉沉迟弦细。

67136 桂枝红花汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】桂心 芍药 甘草（炙）各三两 红花一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜四片，大枣二枚，煎至七分，去滓服，良久再服。汗出而解。

【主治】①《活人书》：妇人伤寒，发热恶寒，四肢拘急，口燥舌干，经脉凝滞，不得往来。②《东医宝鉴·杂病篇》：热入血室及结胸。

67137 桂枝苡蓉汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】甘草一钱 桂枝三钱 芍药三钱 丹皮三钱 茯苓三钱 泽泻三钱 橘皮三钱 肉苡蓉三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】肝脾湿陷，脂血郁腐之痢疾。

【加减】湿寒，加干姜；湿热，加黄芩；后重，加升麻。

【方论选录】肝脾湿陷，脂血郁腐，法当燥湿疏木，而以苡蓉滋肝滑肠，尽行腐瘀为善；若结涩难下，须用重剂苡蓉，荡涤陈宿，使滞开痢止，然后调其肝脾。

67138 桂枝牡蛎汤

《圣济总录》卷九十一。为《金匱》卷上“桂枝加龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

67139 桂枝皂角汤

【方源】《医统》卷四十五。

【组成】桂枝一两 甘草半两 大枣十二枚（去核） 皂角四条（炙，去皮弦）

【用法】水煎，分三次服。

【主治】肺痿。

67140 桂枝皂荚汤

《赤水玄珠》卷七。为《千金》卷十七“桂枝去芍药加皂荚汤”之异名。见该条。

67141 桂枝羌活汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】桂枝 羌活 防风 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服半两，水一盏半，煎至一盏，温服清，迎发而服之。

【主治】①《保命集》：处暑前疟病，头痛项强，脉浮，恶风有汗。②《顾氏医径》：风疟，先伤于风，后伤于寒，先热后寒，热多寒少，身自汗出。

【加减】如吐者，加半夏曲等分。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳药也。疟分六经，故仿仲景伤寒例，以防风、羌活散太阳之邪，而以桂枝主有汗也。

【备考】《顾氏医径》有生姜。

67142 桂枝补血汤

《医家四要》卷三。为《医钞类编》卷十七引《金鉴》“桂枝合补血汤”之异名。见该条。

67143 桂枝附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂附汤（《活人书》卷十二）。

【组成】桂枝四两（去皮） 附子三枚（炮，去皮） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 甘草二两（炙）

【用法】以水六升，煮取二升，去滓温服，一日三次。

【功用】①《医门法律》：祛风湿，助阳化湿。②《金鉴》：温散其风湿，从表而解。

【主治】①《伤寒论》：伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者。②《伤寒论方解》：恶寒发热，四肢掣痛，难以屈伸，厥，或心下悸，或脐下悸。

【方论选录】①《注解伤寒论》：不呕不渴，里无邪也；脉得浮虚而涩，身有疼烦，知风湿但在经也。与桂枝附子汤，以散表中风湿。风在表者，散以桂枝、甘草之辛甘；湿在经者，逐以附子之辛热；姜、枣辛甘，行营卫、通津液，以和表也。②《伤寒论类方》：此即桂枝去芍药加附子汤，但彼桂枝用三两，附子用一枚，以治下后脉促、胸满之症；此桂枝加一两，附子加二枚，以治风湿身疼、脉浮涩之症。一方而治病迥殊，方名亦异，分两之不可忽如此，义亦精矣。③《伤寒论方解》：加桂、附，是因冲逆、恶寒、身体烦疼、

四肢掣痛诸症较重的关系。桂枝、甘草与大枣同用，可以平冲逆，能治心下悸或脐下悸；桂枝、甘草与生姜同用，辛甘发散，能解表而散水气，以防水渍入胃。附子如只用一枚的小剂量，那只是为回阳设；如用到二枚或三枚之多，那便是取其温经止痛了。

【临证举例】伤寒变痹 《全国名医验案类编》：张幼文，三十二岁，贵胄之子，素因多湿，偶感风寒，发热恶寒，一身手足尽痛，不能自转侧，脉浮大而紧。风为阳邪，故脉浮大主病进，紧主寒凝，脉症合参，风寒湿三气合而成痹，桂枝附子汤主之：桂枝四钱，附子一钱半，甘草二钱，大枣六枚，生姜三钱。一日二服，三日举动如常；继服平调之剂全愈。

67144 桂枝附子汤

《三因》卷五。为《伤寒论》“甘草附子汤”之异名。见该条。

67145 桂枝附子汤

《普济方》卷三五三。为《伤寒论》“桂枝加附子汤”之异名。见该条。

67146 桂枝苓泽汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】茯苓三钱 泽泻三钱 甘草三钱 桂枝三钱 芍药三钱

【用法】水煎大半杯，热服。

【主治】淋家土湿脾陷，抑遏乙木，发生之气疏泄不畅，故病淋涩；木郁风动，精液耗损，必生消渴。

【加减】肝燥发渴，加阿胶。

【方论选录】苓、泽、甘草培土而泄湿，桂枝、芍药疏木而清风。

67147 桂枝苓泽汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】桂枝三钱 茯苓六钱 泽泻三钱 杏仁三钱 法夏三钱 甘草二钱 防己三钱 桑叶三钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】鼓胀。

67148 桂枝苓泽汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】茯苓三钱 泽泻三钱 猪苓三钱 桂枝三钱 阿胶三钱（炒）

【用法】水煎大半杯，热服。

【主治】五淋癃闭。

67149 桂枝和营汤

【方源】《疡科心得集·方汇》卷中。

【组成】桂枝 当归 秦艽 茯苓 川断 广皮 牛膝

【主治】寒凝湿滞，气血虚者。

67150 桂枝治伤汤

《中医伤科学讲义》。即《伤科补要》卷四“桂枝汤”。见该条。

67151 桂枝参苓汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】桂枝 芍药各三钱 人参 茯苓 各二钱 甘草一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】汗、吐、下后，胃虚而嘔，怫郁面赤。

67152 桂枝参耆煎

【方源】《重订通俗伤寒论》引卢氏方。

【组成】桂枝 太子参 生耆 白芍 白术各二钱 新会皮八分 炙甘草五分 浮小麦五钱 麻黄根三钱（醋炒）

【功用】止汗固脱。

【主治】伤寒过汗、误汗，自汗不止、气脱者。

67153 桂枝枳实汤

《方剂辞典》。为《金匱》卷上“桂枝生姜枳实汤”之异名。见该条。

67154 桂枝柏叶汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】首乌三钱 桂枝三钱 丹皮三钱 生地三钱 柏叶三钱 生姜三钱 人参三钱 阿胶三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】须落发焦，枯燥不荣。

【加减】黄涩早白，加桑椹、黑豆；阳衰土

湿者，加干姜、茯苓；肺气不充，重用黄耆。

67155 桂枝梔子汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】梔子十二个 豉半升 桂枝 麻黄各一两

【用法】上咬咀。水三升，煎至二升，下豉，取一升半，去滓，温饮一盞。温覆取小汗愈。

【主治】伤寒已愈，劳复如初，脉浮无汗者。

【加减】自汗者，去麻黄。

67156 桂枝茯苓丸

【方源】《金匱》卷下。

【异名】夺命丸（《妇人良方》卷十二）、牡丹丸、夺命丹（《普济方》卷三五七）、仙传保命丹、安襁丸（《胎产心法》卷中）。

【组成】桂枝 茯苓 牡丹（去心） 桃仁（去皮尖，熬） 芍药各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如兔屎大。每日一丸，食前服。不知，加至三丸。

【功用】①《金鉴》：下其癥。②《金匱要略方义》：化瘀生新，调和气血。

【主治】①《金匱》：妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。②《妇人良方》：妇人小产，下血至多，子死腹中，其人惜寒，手指、唇口、爪甲青白、面色黄黑，或胎上抢心，则闷绝欲死，冷汗自出，喘满不食，或食毒物，或误服草药，伤胎动气，下血不止。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：桂枝、桃仁、丹皮、芍药能去恶血；茯苓亦利腰脐间血，即是破血。然有散有缓、有收有渗、结者散以桂枝之辛；肝藏血，血蓄者肝急，缓以桃仁、丹皮之甘；阴气之发动者，收以芍药之酸；恶血既破，佐以茯苓之淡渗，利而行之。②《金匱要略方义》：本方为化瘀消癥之缓剂。方中以桃仁、丹皮活血化瘀；配伍等量之白芍，以养血和血，庶可去瘀养血，使瘀血去，新血生；加入桂枝，既可温通血脉以助桃仁之力，又可得白芍以调和气血；佐

以茯苓之淡渗利湿，寓有湿祛血止之用。综合全方，乃为化瘀生新、调和气血之剂。制作蜜丸，用法从小量开始，不知渐加，亦有下瘀而不伤胎之意，更示人对妊娠病证应持慎重之法。如此运用，使瘀消血止，胎元得安，故本方为妊娠宿瘀瘀血伤胎之良方益法。

【临证举例】①瘀瘕（宫外孕）《山东医刊》（1966；3：15）：宓某某，女，25岁。结婚八年未生育，四年前流产一次。这次月经两个月未来，前两天小腹突然疼痛剧烈，下坠，阴道点滴下血，血色紫黑。而黄瘦，语音低微，精神不振，急性病容，少腹疼痛拒按，舌苔白，脉沉滑。西医妇科检查：宫体增大如鸡卵，后穹窿饱满、触痛，似囊样感，宫体后与右侧附件有拳头大包块，压痛明显。西医诊断：宫外孕。中医诊断：瘀积瘀血。患者拒绝手术，故以中药与桂枝茯苓丸，服三次后，第二天腹痛减轻，阴道下血成淡红色血水，其量增多，饮食增加，精神好转；又继续服至三天时，流出一块扁圆形血块，淡红色，似烂肉状，并继续下黑紫色血，其量减少，腹痛消失，（但仍有压痛），脉搏沉缓；又续服三天，下血停止，腹部压痛消失。后穹窿稍有饱满，无压疼，中位子宫，附件双（一）。又继续服药两天后，所下血色变为鲜红，量多；改服加减胶艾汤两剂，下血停止，一切症状消除。继续观察一月，患者身体健康，月经来潮一次，持续四天。②产后恶露不净《蒲辅周医案》：陈某某，女，成年，已婚。1963年5月7日初诊：自本年3月底足月初产后，至今四旬，恶露未净，量不多，色淡红，有时有紫色小血块，并从产后起腰痠痛，周身按之痛，下半身尤甚，有时左少腹痛，左腰至大腿上三分之一处有静脉曲张，食欲欠佳，大便溏，小便黄，睡眠尚可，面色不泽，脉上盛下不足，右关弦迟，左关弦大，寸尺俱沉涩，舌质淡红无苔。由产后调理失宜，以致营卫不和，气血紊乱，恶露不化。治宜调营卫，和血消瘀。处方：桂枝一钱五分，

白芍二钱，茯苓三钱，炒丹皮一钱，桃仁一钱（去皮），炮姜八分，大枣四枚，服五剂。16日复诊：服药后恶露已尽，少腹及腰腿痛均消失，食欲好转，二便正常，脉沉弦微数，舌淡无苔。瘀滞已消，宜气血双补，十全大补丸四十丸，每日早晚各服一九，服后已恢复正常。③盆腔炎《新中医》（1975；6：40）：以桂枝茯苓汤治疗盆腔炎50例，其中慢性盆腔炎35例，治愈27例，疗效达77.1%，疼痛症状消失平均为16.4天，附件压痛减轻平均为18天，附件压痛消失平均18.9天。亚急性盆腔炎10例，治愈8例，疼痛症状消失平均为6.8天，附件压痛减轻平均为11.1天。急性盆腔炎5例，治愈4例，急性期合用各种抗菌素治疗。其余例数均为无效。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作“桂心茯苓丸”。

67157 桂枝茯苓汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【异名】桂枝独活汤。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 甘草 香附 桂枝 细辛 独活

【功用】温经散血。

【主治】肾积奔豚，乃寒气从腰眼而入，肠中汁沫凝聚，小腹作痛。

【方论选录】用二陈以行汁沫，桂、辛、独活以散外邪。

67158 桂枝茯苓汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】桂枝三钱 茯苓三钱 甘草二钱 丹皮三钱 芍药三钱 桃仁三钱

【用法】煎大半杯，温服。

【功用】疏木达郁而润其风燥。

【主治】妊娠下血瘀块连胎者。

67159 桂枝独活汤

《医学传灯》卷下。为原书同卷“桂枝茯苓汤”之异名。见该条。

67160 桂枝姜附汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】桂枝六钱 干姜三钱 白术（生）三钱 熟附子三钱

【用法】水五杯，煮取二杯，滓再煮一杯服。

【主治】寒湿伤阳，经络拘束，形寒不渴，脉缓，舌淡或白滑。

【方论选录】形寒脉缓，舌白不渴，而经络拘束，全系寒证，故以姜、附温中，白术燥湿，桂枝通行表阳也。

67161 桂枝姜苓汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】芍药四钱 桂枝一钱 干姜三钱 甘草二钱 玄参三钱 茯苓三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】脾胃湿寒，胆火上炎，而生口疮者。

67162 桂枝姜苓汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】甘草二钱 茯苓三钱 桂枝三钱 芍药三钱 干姜三钱 丹皮三钱 首乌三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】经漏及经水先期。

67163 桂枝姜砂汤

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】茯苓三钱 泽泻三钱 桂枝三钱 芍药三钱 甘草三钱（炙） 砂仁一钱（炒，研） 干姜三钱

【用法】水煎大半杯，入砂仁略煎，去滓，入西瓜浆一汤匙，温服。

【主治】气臌。

【加减】膀胱湿热，小便红涩者，加梔子清之。

67164 桂枝桃仁汤

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】桂枝 赤芍药各三两 熟干地黄二两 桃仁 甘草各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】妇人月经不行，腹痛较甚，或脐下

有积块者。

①《妇人良方》：寒气客于血室，血凝不行，结积血为气所冲，新血与故血相搏，故经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧。②《奇效良方》：妇人月事不通，小腹胀胀疼痛。③《灵验良方汇编》：气血郁滞，经水不行，肠中作痛，渐积成块，脐下如覆钵。④《医钞类编》：妇人经前先腹痛不可忍。

67165 桂枝桃仁汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】桂枝 槟榔各一钱五分 白芍生地 枳壳各一钱 桃仁二十五粒 炙草五分

【用法】加生姜、大枣为引。更宜常服四制香附丸。

【主治】肠覃。因经行之时，寒气自肚门而入客大肠，以致经血凝涩，月信虽行而血却少，其腹渐大，如孕子状。

67166 桂枝柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】桂枝 柴胡

【主治】寒伤少阳，寒多热少之症。

67167 桂枝柴胡汤

《医学摘粹》。为《四圣心源》卷八“桂枝菖蒲汤”之异名。见该条。

67168 桂枝调血饮

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】桂枝 当归 川芎 芍药 白术 茯苓 陈皮 香附 丹皮 干姜（炒） 益母草各等分 甘草减半

【用法】每服四钱，水煎，温服。

【主治】妇人产后气血虚损，脾胃怯弱，恶露不行，致心腹疼痛，发热恶寒，自汗口干，头晕眼花。

67169 桂枝菖蒲汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【异名】桂枝柴胡汤（《医学摘粹》）。

【组成】柴胡三钱 桂枝三钱 丹皮三钱 生姜三钱 甘草二钱 菖蒲二钱

【用法】水煎半杯，热服。

【主治】瞳子缩小。

67170 桂枝黄土汤

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】甘草二钱 白术三钱 附子三钱 阿胶三钱 地黄三钱 黄芩二钱 桂枝二钱 灶中黄土三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】便血。

【方论选录】便血之证，亦因水土寒湿，木郁风动之故。仲景黄土汤，术、甘、附子培土温寒，胶、地、黄芩清风泄火，黄土燥湿扶脾，法莫善矣。此加桂枝以达木郁，亦甚精密。

67171 桂枝黄芩汤

【方源】《三因》卷六。

【组成】桂枝（去皮） 芍药 黄芩各半两 甘草（炙）一两

【用法】上为散。每服五钱，水一盞半，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】风疫，证如太阳伤风，相传染为异，脉浮数而不弱，头项疼，腰脊痛，发热恶风。

67172 桂枝黄芩汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】柴胡一两二钱 黄芩四钱半 人参 甘草各四钱半 半夏四钱 石膏 知母各五钱 桂枝二钱

【用法】上为粗末。每服五七钱至半两，水煎，迎发而服之。

【主治】疟疾。太阳、阳明、少阳三阳合病，服桂枝芍药汤后，寒热转大者。

【方论选录】《杏苑》：用人参、甘草以补正气为本，石膏、知母、柴胡、黄芩等以清热为标，半夏豁痰，桂和营卫。

67173 桂枝黄芩汤

【方源】《直指》卷十六。

【组成】白芍药一两半 辣桂 甘草（炙）各一两 黄芩（炙）二两 黄芩半两

【用法】上为散。每服四钱，水一盞半，加

生姜五片，大枣三枚煎服。覆取微汗；未汗再服。

【主治】黄汗自出，发热身肿，小便不利。

67174 桂枝救逆汤

《金匱》卷中。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

67175 桂枝麻黄汤

【方源】《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。

【组成】桂枝一两 麻黄一两（去根节） 赤芍药一两 杏仁一两（去皮尖，麸炒黄）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞，加生姜五片，大枣二枚，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】阳明中风，头痛口苦，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，下之即小便难者；阳明病，五六日至七八日，如疟，热多寒少，一日再发，其脉微缓，为欲愈者；厥阴脉微而恶寒者，为阴阳俱虚，不可吐下者；厥阴发汗，面色赤，有热者，此欲解者。

67176 桂枝麻黄散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】桂枝 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 赤芍药 葛根（锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒微黄）各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗，如人行十里未有汗，再良久以葱豉粥投之。

【主治】阳毒伤寒，项背汗出，急强恶风者。

67177 桂枝续命汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】小续命汤 桂枝 芍药 杏仁依本方加一倍

【用法】上除附子、杏仁外，捣为粗末，后入二味令匀。每服五七钱，水一盞半，加生姜五片，煎至一盞，去滓，食前稍热服。宜针风府。

【主治】太阳经中风，有汗恶风。

67178 桂枝续命汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】桂附续命汤（《医学发明》）、桂枝附子续命汤（《卫生宝鉴》卷七）。

【组成】小续命汤 桂枝 附子 甘草依本方加一倍

【用法】上除附子、杏仁外，捣为粗末，后入二味令匀，每服五七钱，水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前稍热服。宜针太溪。

【主治】少阴经中风，有汗无热。

67179 桂枝葛根汤

【方源】《直指》卷十九。

【组成】桂枝 芍药 甘草各七钱 葛根一两三钱

【用法】上为散。每服四钱，加生姜五片，大枣一枚，煎服。

【主治】太阳表虚，颈项强，汗出恶风。

67180 桂枝葛根汤

【方源】《片玉痘疹》卷五。

【组成】桂枝 芍药 干葛 甘草 防风

【用法】水一盏，加生姜一小片、大枣一枚，煎七分，热服。

【主治】痘疹，如暴风连日而有伤风之症者。

67181 桂枝葛根汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】桂枝 葛根 赤芍药 升麻 防风 甘草各一钱

【用法】上锉细。加生姜三片、淡豆豉一钱，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿麻疹初发，如时大寒，则腠理闭塞，气血凝涩，防其发泄得迟，有毒气壅遏之变。

67182 桂枝越婢汤

《内台方议》卷一。为《伤寒论》“桂枝二越婢一汤”之异名。见该条。

67183 桂枝解肌汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】桂枝 赤芍 黄芩 甘草 人参

干葛 柴胡

【用法】淡竹叶为引，水煎服。

【主治】痘靨之后，因外感风寒，头目昏痛，恶寒，其脉浮者。

67184 桂枝解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷十。

【组成】官桂 赤芍 大力子 防风 蝉蜕

【用法】水煎服。

【主治】冬寒之时，盖覆少薄，被寒风郁遏，痘疮当靨不靨。

67185 桂枝解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】桂枝 麻黄（酒炒） 赤芍 防风 荆芥 羌活 甘草 桔梗 人参 川芎 牛蒡 生姜

【用法】水煎服。

【主治】时值严寒大冻，麻疹初热而出不快；斑疹湿邪内热，头痛咽干。

①《麻疹全书》：麻疹，如值大寒之时。②《种痘新书》：麻疹初热，严寒大冻，冷气逼入而出不快。③《麻疹集成》：时令大寒，斑疹湿邪内热，头痛咽干。

67186 桂枝解毒汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】猪苓 泽泻 麦冬 地骨皮 木通 黄芩 甘草 连翘 薄荷各等分

【用法】水煎服。

【主治】大寒寒气郁遏而痘难收靨者。

67187 桂枝新加汤

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67188 桂枝橘皮汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】桂枝尖一钱（蜜炙） 生白芍一钱半 鲜生姜一钱 广陈皮一钱半（炒） 清炙草六分 大红枣二枚（去核）

【功用】温调营卫。

【主治】行痹，肩背麻木，手腕硬痛，头重

鼻塞，恶风微汗，一身痛无定处。

【方论选录】桂枝汤本为太阳经中风而设，臣以广皮和中，以疏草、枣之甘滞；而白芍分量，又重于桂枝，故为脾受寒湿，调和营卫之良方。

67189 桂枝藿香汤

【方源】《中国内科医鉴》。

【组成】桂枝 藿香 槟榔 木香 缩砂 茺萸 莪术 甘草

【主治】伤食。

67190 桂苓木通散

【方源】《医级》卷七。

【组成】赤茯苓 猪苓 桂枝 半夏（制） 桔梗 枳壳 山栀 甘草梢 木通

【主治】肝胆火逆，饮停胸胁，治节不行，小便不利。

67191 桂苓术甘汤

《准绳·类方》卷二。即《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”。见该条。

67192 桂苓术附汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白术（净，炒） 茯苓各三钱 肉桂（去皮，另炖）四分 附子（制）一钱

【用法】加生姜汁半酒杯，冲药服。

【主治】饮症属虚寒者。

67193 桂苓甘术汤

《医方集解》。即《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”。见该条。

67194 桂苓甘枣汤

《医级》卷七。为《伤寒论》“茯苓桂枝甘草大枣汤”之异名。见该条。

67195 桂苓甘草汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】桂枝 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】水停心下而悸者。

67196 桂苓甘露汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十九。

【组成】生地 熟地 天冬 麦冬 石斛 茵陈 黄芩 枳壳 甘草 肉桂 茯苓 枇

杷叶

【主治】湿温。

67197 桂苓甘露饮

【方源】《医学正传》卷二引河间方。

【组成】桂心 人参 黄耆 茯苓 白术 甘草 葛根 泽泻 石膏 寒水石各一两 滑石二两（火煨，另研） 木香一钱

【用法】上为细末，每服三钱，白汤调下。

【主治】①《医学正传》引河间方：伏暑发渴、脉虚。②《保命歌括》：湿热下痢，小便涩少，口渴脉洪大者。

67198 桂苓甘露饮

《伤寒直格》卷下。为《宣明论》卷六“桂苓甘露散”之异名。见该条。

67199 桂苓甘露饮

【方源】《医学启源》卷中。

【异名】桂苓甘露散（《御药院方》卷二）。

【组成】白茯苓（去皮） 白术 猪苓 甘草（炙） 泽泻各一两 寒水石一两（别研） 桂（去粗皮）半两 滑石二两（别研）

【用法】上为末，或煎，或水调，二三钱任意，或入蜜少许亦得。

【功用】流湿润燥，宣通气液，解暑毒，兼利小水。

【主治】饮水不消，呕吐泻利，水肿腹胀，泄泻不能止者；兼治霍乱吐泻，下利赤白，烦渴。

67200 桂苓甘露饮

《卫生宝鉴》卷十六。为《医学启源》卷中“桂苓白术散”之异名。见该条。

67201 桂苓甘露饮

【方源】《玉案》卷二。

【组成】泽泻 猪苓各一钱二分 寒水石二钱 桂枝八分 苍术 滑石 甘草各一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伏暑，饮水过多，肚腹膨胀，霍乱吐泻。

67202 桂苓甘露散

【方源】《宣明论》卷六。

【异名】桂苓白术散（原书同卷）、桂苓甘露饮（《伤寒直格》卷下）。

【组成】茯苓一两（去皮） 甘草二两（炙） 白术半两 泽泻一两 桂半两（去皮） 石膏二两 寒水石二两 滑石四两 猪苓半两（一方不用猪苓）

【用法】上为末。每服三钱，温汤调下，新水亦得，生姜汤尤良。小儿每服一钱。

【主治】①《宣明论》：伤寒中暑，湿热内甚，头痛，口干烦渴，小便赤涩，大便急痛，霍乱吐下，腹满痛闷，及小儿吐泻、惊风。②《证治宝鉴》：伤暑吐血；痢疾。

67203 桂苓甘露散

《儒门事亲》卷十二。为《医学启源》卷中“桂苓白术散”之异名。见该条。

67204 桂苓甘露散

《御药院方》卷二。为《医学启源》卷中“桂苓甘露饮”之异名。见该条。

67205 桂苓白术丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】拣桂 干生姜各一分 茯苓（去皮） 半夏各一两 白术 红皮（去白） 泽泻各半两（一法更加黄连半两 黄柏二两）

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。每服二三十丸，生姜汤送下，一日三次。病在膈上，食后服；在下，食前服；在中，不拘时候。

【功用】消痰逆，止咳嗽，散痞满壅塞，开坚结痛闷，推进饮食，调和脏腑，流湿润燥，宣平气液，解酒毒。

【主治】寒湿，湿热呕吐泻利，肺痿劳嗽，水肿腹满。

67206 桂苓白术汤

《风劳腋膈四大证治》。为《医学启源》卷中“桂苓白术散”之异名。见该条。

67207 桂苓白术散

《宣明论》卷六。为原书同卷“桂苓甘露散”之异名。见该条。

67208 桂苓白术散

【方源】《医学启源》卷中。

【异名】桂苓甘露散（《儒门事亲》卷十二）、桂苓甘露饮（《卫生宝鉴》卷十六）、桂枝白术汤（《嵩崖尊生》卷九）、桂苓白术汤（《风劳腋膈四大证治》）。

【组成】木香 桂枝 藿香 人参 茯苓（去皮）各半两 甘草（炙） 白术 葛根 泽泻 寒水石各一两 滑石二两 石膏一两

【用法】上为末。每服三钱，白汤调下，新水或生姜汤亦得。

【主治】冒暑、饮食所伤转甚，湿热内甚，霍乱吐泻，转筋急痛，腹满痛闷；小儿吐泻、惊风。

【备考】方中滑石、石膏用量原缺，据《儒门事亲》补。

67209 桂苓神术汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝八分 茯苓三钱 白术一钱 茅术一钱 苡仁八钱 广皮一钱 半夏一钱 五分 厚朴一钱 砂仁一钱 生姜三片

【主治】溢饮。脾受水邪，水气旁流于四肢，肢节作肿，身重无力。

67210 桂苓理中汤

【方源】《四圣心源》卷七。

【组成】人参一钱 茯苓二钱 甘草二钱 干姜三钱 桂枝三钱 白术三钱 砂仁一钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】霍乱。

【加减】吐不止，加半夏；泄不止，加肉蔻；外有寒热表证，加麻黄；转筋痛剧，加附子、泽泻。

67211 桂苓薏苡汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】茯苓一两 羌活二钱 薏仁一两 桂枝三分

【用法】水煎服。

【主治】太阳痉病。感湿热之气，忽又伤风，口噤不能言，项背几几，脚手挛急，角弓反张。

67212 桂珀调经散

《顾氏医径》卷四。为《校注妇人良方》卷二十二“小调经散”之异名。见该条。

67213 桂香匀气丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】桂（去粗皮） 丁香皮 缩砂仁 益智（去皮，炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 槟榔（锉） 木香 蓬莪术（煨）各一两 乌梅（和核）一两半 巴豆（去皮心膜，研出油）六十四粒

【用法】上除巴豆外，为末，和匀，煮面糊为丸，如麻子大。每服七丸至十丸，食后茶、酒任下。

【功用】消积滞，化宿食、痰饮。

【主治】胸膈痞闷。

67214 桂扁猪脏饮

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】雄猪大脏一条（洗净） 桂圆肉二两 新鲜扁豆花四两

【用法】将后二味同打烂，用白糯米拌和，装入脏内，两头扎住，砂锅内烧烂，忌见铁器。然后将人中白炙脆，研末蘸吃，或酱油蘸吃亦可，不论吃粥、吃饭、空口皆可吃。吃四五条即愈。

【主治】大便下脓血，日夜数次，数年久病。

67215 桂麻各半汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》“桂枝麻黄各半汤”之异名。见该条。

67216 桂膏贴足方

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】桂（去粗皮，为末） 雄黄末一钱匕

【用法】以蓖麻子三七枚，去皮烂研，入上二味同研如膏。纸上摊，于两足心贴之。才产讫，急去药。

【功用】催产。

67217 桂麝椒雄膏

【方源】方出《种福堂方》卷二。名见《医

学从众录》卷五。

【组成】桂心一分 麝香三厘 雄黄七厘 川椒七枚

【用法】上为极细末。纳脐中，外以膏药贴之。

【主治】虚寒症。

【宜忌】孕妇忌贴。

67218 桂心菴藟子丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【异名】菴藟子丸。

【组成】桂（去粗皮） 芎藭 土瓜根 桑耳（微炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 大黄（锉，炒） 菴藟子各一两 赤茯苓（去黑皮）一两一分 熟干地黄（切，炒）二两 甘草（炙，锉）三分 赤芍药一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹酒送下。渐加至三十丸。

【主治】妇人经候不调，月水不通，脐下疝痛，身体黄瘦，不思饮食。

67219 桂枝去芍药汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】《伤寒论方医案选编》：解肌祛风，去阴通阳。

【主治】①《伤寒论》：太阳病，下之后，脉促胸满者。②《伤寒论方解》：太阳经，经医误投泻下剂后，头痛、发热、汗出、恶风等证未解，既未成痞，亦未结胸，心下不痞硬，按之亦不痛，但觉气上冲胸，胸满而微闷，脉紧躁面并居寸口，关尺部在相形之下反觉不鼓指。

【方论选录】①《尚论篇》：用桂枝之辛甘，以亟散太阳之邪；其去芍药之意，酸收二字不足尽之，以误下故不敢用，恐其复领阳邪下入腹中也。②《伤寒贯珠集》：邪气仍在阳分，故以桂、甘、姜、枣甘辛温药，从阳引

而去之；去芍药者，恐酸寒气味，足以留胸中之邪，且夺桂枝之性也。

【临证举例】外感咳嗽 《临证指南医案》：某，44岁，寒热咳嗽，当以辛温治之，桂枝汤去芍药加杏仁。

67220 桂枝加人参汤

《云岐子保命集》卷上。为《伤寒论》“桂枝人参汤”之异名。见该条。

67221 桂枝加干姜汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】桂枝一两 白芍药（一云白术）干姜各半两 炙甘草四钱

【用法】上咬咀。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】寒癥冷结。

67222 桂枝加干葛汤

《保婴撮要》卷四。为《伤寒论》“桂枝加葛根汤”之异名。见该条。

67223 桂枝加大黄汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝大黄汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）、桂枝芍药大黄汤（《伤寒大白》卷三）、桂枝加芍药大黄汤（《皇汉医学》）。

【组成】桂枝三两（去皮） 大黄二两 芍药六两 生姜三两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】以水七升，煮取三升，每服一升，去滓温服，一日三次。

【功用】①《痘疹世医心法》：发表疏里。②《金鉴》：外解太阳之表，内攻太阴之里实。

【主治】太阳表证未解，内有实热积滞，腹满实痛，大便不通。

①《伤寒论》：太阳病，医反下之，腹大实痛者。②《伤寒图歌活人指掌》：关脉沉实，按之痛，大便秘。③《痘疹世医心法》：痘疹，毒气内攻，发热，腹痛，大便不通。④《医学入门》：太阴传经热症，腹满而痛，咽干而渴，手足温，脉沉有力。

【方论选录】①《内台方议》：与桂枝汤以和表，加芍药、大黄以攻其里。且赤芍药性

凉，而能泻血中热，大黄能除其实、泻其脾也。②《古方选注》：大黄入于桂枝汤中，欲其破脾实而不伤阴也。大黄非治太阴之药，脾实腹痛，是肠中燥屎不去，显然太阴转属阳明而阳道实，故以姜、桂入太阴升阳分，杀太阴结滞，则大黄入脾反有理阴之功，即调胃承气之义。燥矢去，而阳明之内道通，则太阴之经气出注运行而腹痛减，是双解法也。③《中国医学大辞典》：此方以桂、姜升邪外行，倍芍药以疏太阴之经，加大黄以通阳明之腑，又虑其苦泄太过，更加枣、草以扶之，此双解表里法也。

【临证举例】①太阳阳明同病 《经方实验录》：庆孙，起病由于暴感风寒，大便不行，头顶痛，此为太阳、阳明同病。自服救命丹，大便行，而头痛稍愈。今表证未尽，里证亦未尽，脉浮缓，身常自汗，宜桂枝加大黄汤：川桂枝三钱，生白芍三钱，生草一钱，生川军一钱，生姜三片，红枣三枚。②痢疾腹痛 《皇汉医学》：曾有一人病痢，其人于左横骨上约二寸处疼痛不堪，始终以手按之，用此方痢止，痛亦治，是痢毒也。③疹出不顺腹痛 《皇汉医学》：一人年二十有五，发热如然而无汗，经四五日，疹子不出，腹满拘痛，二便不利，时或腰甚痛。因作桂枝加芍药大黄汤使饮之，微利二三行，拘痛渐安；兼用紫丸下之，下水五六行，其夜熟眠，发汗如洗，疹子随汗出。疹子收，全复旧。④荨麻疹 《江苏中医》（1958；2：24）：苏某某，女，32岁。患荨麻疹已达五年之久，开始时每年发五六次，后来逐年加剧。今年起愈发愈频，竟至没有间歇，曾用西药与中药多剂，均归无效。遍身有大小不等的疙瘩块，抓痒无度，此伏彼起，日夜无宁静之时，在发作剧烈时，特别怕冷，身必重裘，大便一直二天一次，且燥结难下，腹微痛。处方：桂枝三钱，芍药三钱，甘草一钱，生姜三钱，大枣三枚，大黄三钱，全瓜蒌四钱，麻仁四钱。服上药后约3小时，身痒渐止，疙瘩亦渐隐没，周身

微汗，大便畅通，症状全部消失，迄今已半月余，未再发过。

67224 桂枝加归芍汤

《杂病源流犀烛》卷十五。为《此事难知》“桂枝加当归芍药汤”之异名。见该条。

67225 桂枝加瓜蒌汤

《中国医学大辞典》。为《金匱》卷上“栝楼桂枝汤”之异名。见该条。

67226 桂枝加朴杏汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》“桂枝加厚朴杏子汤”之异名。见该条。

67227 桂枝加芍药汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝三两（去皮） 芍药六两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 生姜三两（切）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【功用】①《金鉴》：外解太阳之表，内调太阴之里虚。②《伤寒论方医案选编》：调和营卫，兼缓急止痛。

【主治】①《伤寒论》：本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也。②《方机》：烦，脉浮数，无硬满状者；腹满寒下，脉浮，或恶寒，或腹时痛者。

【方论选录】①《伤寒贯珠集》：桂枝所以越外入之邪，芍药所以安伤下之阴也。按《金匱》云：伤寒阳脉涩、阴脉弦，法当腹中急痛者，与小建中汤；不瘥者，与小柴胡汤。此亦邪陷阴中之故。而桂枝加芍药，亦小建中之意，不用胶饴者，以其腹满，不欲更以甘味增满耳。②《古方选注》：桂枝加芍药汤，此用阴和阳法也，其妙即以太阳之方，求治太阴之病。腹满时痛，阴道虚也，将芍药一味倍加三两，佐以甘草，酸甘相辅，恰合太阴之主药；且倍加芍药，又能监桂枝深入阴分，升举其阳，辟太阳陷入太阴之邪。复有姜、枣为之调和，则太阳之阳邪，不留滞于太阴矣。

【临证举例】下痢 《山东中医学院学报》(1977; 1: 27): 王某某, 男, 46岁。患菌痢, 当时经治已减, 后又复发, 缠绵不愈, 变成慢性菌痢, 每日少则三四次, 多则五六次, 排便甚急, 不及入厕, 则污衣裤, 然登厕后又排便不爽, 下重难通, 大便状不成形, 有红白粘液; 急不可耐, 伴有腹痛, 肠鸣等症。脉沉弦而滑, 舌红苔白, 观其所服之方, 寒必芩、连, 热必姜、附, 补以参、术, 涩如梅、诃, 尝之殆遍, 迄无所效。此仍脾胃阴阳不和, 肝气郁而乘之之证。治法: 调和脾胃阴阳, 并于土中平木。方药: 桂枝三钱、白芍六钱, 炙甘草三钱、生姜三钱、大枣十二枚。服二剂, 下痢减至一二次, 照方又服二剂而痊愈。

67228 桂枝加当归汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桂枝9克 赤芍9克 当归12克 甘草4克 生姜4克 红枣6克

【用法】水煎服。

【功用】《中医外科学》: 和营祛寒, 温经通络。

【主治】冻疮。

67229 桂枝加附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝附子汤（《普济方》卷三五三）、桂枝汤加附子方（《医门法律》卷二）。

【组成】桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草三两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】①《注解伤寒论》：温经复阳。②《尚论篇》：固表驱风，复阳敛液。

【主治】①《伤寒论》：太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者。②《千金》：产后风虚，汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸。

【方论选录】①《医方考》：用桂枝汤，所

以和在表之营卫；加附子，所以壮在表之元阳。与桂枝汤解在表之寒湿，加附子以温寒湿。②《伤寒来苏集》：用桂枝以补心阳，阳密则漏汗自止矣。坎中阳虚，不能行水，必加附子以回肾阳，阳归则小便自利矣。内外调和，则恶风自罢，而手足便利矣。③《古方选注》：桂枝加附子，治外亡阳而内脱液。熟附虽能补阳，终属燥液，四肢难以屈伸，其为液燥，骨属不利矣。仲景以桂枝汤轻扬力薄，必籍附子刚烈之性直走内外，急急温经复阳，使汗不外泄，正以救液也。

【临证举例】①太阳证过汗 《本事》：有一士人，得太阳证，因发汗，汗不止，恶风，小便涩，足挛曲而不伸。诊其脉浮而大，浮为风，大为虚。予用桂枝加附子汤，三啜而汗止；复佐以甘草芍药汤，足便得伸。②风寒表证兼阳虚 《江西中医药》(1958; 6: 39)：黄某某，女，23岁。头痛，恶寒发热，身痛，呕逆，手足拘急，厥冷，舌质嫩，色淡，微罩白苔，脉沉而弱，汗出肢厥。汗出恶风、头痛发热、呕逆等，为桂枝汤证；手足拘急、肢厥，属阳虚征象。遂予桂枝加附子汤：桂枝(后下)、杭芍、生姜、熟附片各三钱，甘草二钱，大枣四枚，水二碗，煎至一碗，嘱温服后静卧。当晚一剂服完，次晨步行前来就诊，自云证已减半，唯头痛身倦，原方再服二剂而愈。③鼻衄 《浙江中医杂志》(1958; 10: 34)：孙某某，男，35岁。病鼻衄，出血盈斗，两昼夜不止，曾服寒凉止血剂无效。脉微，口淡，身无热，二便自调，给服桂枝加附子汤，二剂痊愈。④十指疼痛 《伤寒解惑论》：范某，女。素体弱，感冒后发热，微汗出，并十指疼痛，已十余日，诊其脉象沉细。此是平素阳虚体质，感冒后邪未尽去，而阳愈见绌，不能达于四末之故。与桂枝加附子汤，附子初用八分，后增至一钱半，共服三剂痊愈。

67230 桂枝加附子汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】桂 附子(炮)各一两 甘草三钱半

【用法】上咬咀，水煎服。

【主治】腹中痛，脉迟缓。

67231 桂枝加附桂汤

【方源】《伤寒瘟疫条辨》卷五。

【组成】桂枝三钱 白芍三钱 甘草(炙)二钱 附子(生) 肉桂(去粗)各一钱 生姜三钱 大枣二枚

【用法】水煎，温服。覆取微汗。

【主治】太阳伤寒，寸口脉浮而大，浮则为风，大为阴虚，风则生微热，虚则两胫挛，其证自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急。

67232 桂枝加桂枝汤

《方剂辞典》。为《伤寒论》“桂枝加桂汤”之异名。见该条。

67233 桂枝加术汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】黄耆三钱(蜜炙) 桂枝三分 白术一钱半(炒) 白芍一钱半(酒炒) 甘草五分(炙) 生姜二片 大枣三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】多汗，脉弦软者。

【方论选录】脾肺两亏，清阳不能敷布，而卫气不密，故腠理空疏，汗出不止焉。黄耆补中固卫，白术燥湿健脾，白芍敛阴和营血，桂枝行阳温卫气，炙草缓中益胃，姜、枣调营和卫也。水煎温服，使脾肺气强，则营卫调和，而腠理致密，安有汗不止之患。此补中实表之剂，为表虚多汗之专方。

67234 桂枝加黄耆汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】桂枝加黄耆五两汤(《三因》卷十)。

【组成】桂枝 芍药各二两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚 黄耆二两

【用法】以水八升，煮取三升，温服一升。须臾饮热稀粥一升余，以助药力，温覆取微汗；若不汗更服。

【功用】《金匱教学参考资料》：助阳散邪，以发郁阻之湿。

【主治】①《金匱》：黄汗之病，两胫自冷。若身重，汗出已辄轻者，久久必身瞤，瞤即胸中痛，又从腰以上必汗出，下无汗，腰髀弛痛，如有物在皮中状，剧者不能食，身疼重，烦躁，小便不利。②《准绳·类方》：黄疸，脉浮，而腹中和者。

【方论选录】①《医方考》：客者除之，故用桂枝之辛甘，以解肌表之邪；泄者收之，故用芍药之酸寒，以敛营中之液；虚以受邪，故用黄耆之甘温，以实在表之气；辛甘发散为阳，故生姜、甘草可为桂枝之佐；乃大枣者，和脾益胃之物也。②《医门法律》：用桂枝全方，啖热粥助其得汗，加黄耆固卫。以其发热，且兼自汗、盗汗，发热故用桂枝，多汗故加黄耆也。其发汗已仍发热，邪去不尽，势必从表解之。汗出辄轻，身不重也；久久身瞤胸中痛，又以过汗而伤其卫外之阳，并胸中之阳也；腰以上有汗，腰以下无汗，阳通而阴不通也，上下痞隔，更宜黄耆固阳，桂枝通阴矣。③《金匱要略方义》：以桂枝汤微解其表，和其营卫，使在表之湿随汗而解。表虚之人，虽取微汗，犹恐重伤其表，故少佐黄耆以实表，使之汗不伤正，补不留邪，此正为寓补于散，扶正祛邪之妙用。同时，黄耆与桂枝、生姜配伍，尤有化气行水之功。然黄耆固表，有碍桂枝之发散，故服后需饮热粥以助药力。其治黄疸者，因黄疸亦属湿郁之证，故其表虚者，亦一并主之。

【临证举例】虚黄 《静香楼医案》：面目身体悉黄，而中无痞闷，小便自利，此仲景所谓虚黄也，即以仲景法治之。桂枝、黄耆、白芍、茯苓、生姜、炙草、大枣。

【备考】《三因》本方用：桂枝（去皮）、芍药各三两，甘草二两（炙），黄耆五两。为散，每服四钱，水一盞半，加生姜五片，大枣三枚，煎七分，去滓温服。

67235 桂枝加葛根汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝汤（《外台》卷十四引《深师方》）、桂枝加干葛汤（《保婴撮要》卷四）。

【组成】葛根四两 麻黄三两（去节） 芍药二两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 桂枝三两（去皮）

【用法】以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗，不须啖粥。余如桂枝法将息及禁忌。

【功用】①《医方集解》：发汗解肌。②《伤寒论讲义》：解肌祛风，升津舒经。

【主治】外感风寒，项背强，汗出恶风；麻疹、痢疾及胃肠病起见上述症状者。

①《伤寒论》：太阳病，项背强几几，反汗出恶风。②《症因脉治》：寒疟，寒伤阳明，寒多热少，有汗。③《伤寒论方解》：麻疹初期，疹初见未齐，见桂枝汤证者；痢疾初期，或胃肠病兼见桂枝汤证者。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌生葱、海藻、菘菜。

【方论选录】①《内台方议》：葛根性平，能祛风邪，解肌表，以此用之为使；而佐桂枝汤之用，以救邪风之盛行于肌表也。②《伤寒论集注》：用桂枝汤，以解太阳肌中之邪；加葛根，宣通经脉之气，而治太阳经脉之邪。③《古方选注》：桂枝加葛根汤，治邪从太阳来，才及阳明，即于方中加葛根，先于其所往，以伐阳明之邪。因太阳未罢，故仍用桂枝汤以截其后，但于桂枝、芍药各减一两，既不使葛根留滞太阳，又可使桂枝、芍药并入阳明，以监其发汗太过。其宣阳益阴之功，可谓周到者矣。④《伤寒论方解》：本方是桂枝汤减少桂枝、芍药的剂量，再加葛根一味所组成。原书中有麻黄，于理不合，当从林亿、朱肱诸氏之说，并参考《玉函》删去麻黄为是。仲景治项背强都要用到葛根，殆以葛根为治项背强的专药。葛根有解表、解热、解毒诸作用，仲景用以治项背强，后世用以透

疹、解热，其道理即在此。

【临证举例】①伤寒背强 《伤寒九十论》：庚戌，建康徐南强，得伤寒，背强，汗出，恶风。予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂而病如归，汗出愈加。予曰：得非仲景三方乎？曰：然。予曰：误矣！是方有麻黄，服则愈见汗多，林亿谓止于桂枝加葛根汤也。予令生而服之，微汗而解。②偏颈 《成都中医学院学报》(1979; 4: 94)：吴某，女，5岁。1979年11月9日初诊，母代诉：8天前患儿在田间玩耍，不慎失足落水，当时仅将裤子打湿，头身未见外伤，患儿未诉任何不适。傍晚，其父发现患儿颈项向左偏斜，不能转动，入夜不能平睡，呼叫颈项疼痛。因疑为“失枕”，治疗8日，病无起色，又以为“骨伤”，骨科检查排除骨折，转到我处诊治。患儿头颈明显向左偏斜，颈项肌肉强硬，皮色不变，亦不发热，但压之疼痛；头汗甚多，口干喜饮，饮食减少，大便一日一次，小便不黄。舌质正常，苔白、脉浮。诊断：偏颈。辨证：太阳中风，经输不利。治则：解肌祛风，舒利经脉。处方：桂枝10克，白芍15克，生姜10克，大枣12克，甘草3克，葛根24克，花粉18克。11月12日二诊：上方连服3剂，1剂汗止，3剂项即不偏，唯转动尚欠灵活，此太阳经输元气尚未疏通之故。乃宗上方加秦艽15克，丝瓜络12克，以祛风通络。服上方2剂后，颈项即活动自如。③荨麻疹 《江苏医学·中医分册》(1979; 4: 44)：李某某，女，37岁。患荨麻疹数年，每日必发，疹出如粟，逢汗出遇风时加重，病发则全身肌腠不舒。经多种方法治疗，效果始终未能满意，虽为小疾，但病情发作时，搔痒难忍，心中作烦，颇影响工作与休息。该患为肌腠疏泄，玄府不固，风邪侵入肌肤，又善行而数变，故窜之毛窍痒痒难忍；阳气外泄，故又汗出恶风，经气不舒。方拟桂枝加葛根汤，再加防风15克，共服20余剂，基本告愈。

67236 桂枝合白虎汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】桂枝 芍药 石膏(煨) 知母(生) 甘草(生) 粳米

【用法】引用生姜、大枣，水煎服。

【主治】风湿，壮热多汗，身重睡鼾。

67237 桂枝合补血汤

【方源】《医钞类编》卷十七引《金鉴》。

【异名】桂枝补血汤(《医家四要》卷三)、当归补血汤合桂枝汤(《医学摘粹》)。

【组成】桂枝 芍药 甘草(炙) 当归黄耆

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《医钞类编》引《金鉴》：产后伤血病痊。②《医学摘粹》：妇人产后，或男子患金疮，伤血过多而成痿证者。

67238 桂枝栝楼根汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】桂枝瓜蒌汤(《普济方》卷一三四)。

【组成】桂心 白芍药 栝楼根 甘草(炙) 川芎各等分

【用法】上为散。每服四大钱，水一盞半，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分，去滓服。

【主治】伤风汗下不解，郁于经络，随气涌泄，衄出清血，或清气道闭，流入胃管，吐出清血，遇寒泣之，色必瘀黑者。

【加减】头痛，加石膏。

67239 桂心生姜枳实汤

《外台》卷七。即《金匱》卷上“桂枝生姜枳实汤”。见该条。

67240 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》“桂枝甘草龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

67241 桂附八味地黄丸

《胎产心法》卷上。为《金匱》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

67242 桂附乌梅四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】白芍三钱(醋炒) 熟地五钱 乌

梅五个 桂心一钱(研) 附片一钱 当归身五钱(炒)

【主治】血虚经乱之证兼寒者。

【方论选录】于四物汤中，除去川芎之散，加以乌梅之敛，名曰乌梅四物汤，施之血虚经乱之证；其兼寒者，暂加桂心、附片，名曰桂附乌梅四物汤。

67243 桂枝一白虎二汤

【方源】《痰症论疏》。

【组成】桂枝(去皮)三钱五分 芍药(去黄赤皮一层，用蜜水拌蒸三次、晒三次，焙干，锉碎)六钱 生姜(切)七钱 大枣四枚(擘) 粳米一合(淘洗) 甘草(去头尾尖处各三寸，切作五寸长，好酒浸一宿，柳火上缓缓炙，表里皆燥为度，锉碎)七钱五分 石膏(取洁白如束针者，研极细，用甘草水飞三遍，澄清去水，晒干再研)二两五钱 知母(槐砧上锉细，干木臼杵捣数千下，勿犯铁器)七钱五分

【用法】以水三升五合，先煮粳米，减半升，去粳米，纳诸药，煮取一升二合，分二次温服，未发、临发各服一次。

【主治】阳明疟疾。

67244 桂枝二麻黄一汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝一两十七铢(去皮) 芍药一两六铢 麻黄十六铢(去节) 生姜一两六铢(切) 杏仁十六个(去皮尖) 甘草一两二铢(炙) 大枣五枚(擘)

【用法】以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升，一日二次。本云：桂枝汤二分，麻黄汤一分，合为二升，分再服，今合为一方。将息如前法。

【功用】①《注解伤寒论》：解散营卫之邪。②《金鉴》：小发营卫之汗。

【主治】太阳病，服桂枝汤，大汗出，脉洪大，形似疟，一日再发者。

【方论选录】①《伤寒附翼》：邪气稽留于皮毛肌肉之间，固非桂枝汤之可解；已经汗

过，又不宜麻黄汤之峻攻。故取桂枝汤三分之二，麻黄汤三分之一，合而服之，再解其肌，微开其表，审发汗于不发之中，此又用桂枝后更用麻黄法也。后人合为一方者，是大背仲景比较二分之轻重偶中出奇之妙理矣。②《古方选注》：桂枝铢两多，麻黄铢数少，即啜粥助汗之变化。桂枝汤减用四分之二，麻黄汤减用四分之一，则固表护阴为主，而以发汗为复，假麻黄开发血脉精气，助桂枝汤于卫分作微汗耳。第十六铢麻黄，不能胜一两十七铢桂枝、一两六铢白芍，则发汗之力太微，故又先煮麻黄为之向导，而以桂、芍袭其后也。

【临证举例】①太阳中风 《吴鞠通医案》：唐，五十九岁。头痛恶寒，脉紧，言謇，肢冷，舌色淡。太阳中风，虽系季春天气，不得看作春温，早间阴晦雨气甚寒，以桂枝二麻黄一法：桂枝六钱，杏仁五钱，生姜六片，麻黄(去节)三钱，炙甘草三钱，大枣(去核)二枚。煮三杯，先服一杯，得微汗，止后服；不汗再服；再不汗，促投其间。②寒热往来 《经方实验录》：王右，寒热往来，一日两度发，仲景所谓宜桂枝二麻黄一汤之证也。前医用小柴胡，原自不谬，但差一间耳。川桂枝五钱，白芍四钱，生草三钱，生麻黄二钱，光杏仁五钱，生姜三片，红枣五枚。病者服此，盖被自卧，须臾发热，遍身皦皦汗出。其病愈。

67245 桂枝二越婢一汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝越婢汤(《内台方议》卷一)、桂枝二越婢一汤(《古方选注》卷上)。

【组成】桂枝(去皮) 芍药 麻黄 甘草(炙)各十八铢 大枣四枚(擘) 生姜一两二铢(切) 石膏二十四铢(碎，绵裹)

【用法】以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本云：当裁为越婢汤、桂枝汤合之，饮一升。今合为一方，桂枝二分，越婢一分。

【功用】《伤寒论讲义》：微发其汗，兼清里热。

【主治】太阳病，发热恶寒，脉微弱者。

【方论选录】①《内台方议》：此汤亦即桂枝麻黄各半汤中减杏仁加石膏也，杏仁能发汗，去之；石膏能去虚热，故加之。②《古方选注》：桂枝二越婢一汤，治脉微无阳。无阳者，阳分亡津之剂，故于桂枝汤照原方用四分之二以和阳，越婢汤照原方用四分之一以行阴。行阴者，发越脾气而行胃中之津，俾阳和津生而脉复，因其病在阳，故有阳用二、阴用一之殊。③《伤寒贯珠集》：本无热证而加石膏者，以其人无阳，津液不足，不胜桂枝之任，故加甘寒于内，少变辛温之性，且滋津液之用。而其方制之小，示微发于不发之中。④《金鉴》：桂枝二越婢一汤，即大青龙以杏仁易芍药也。名系越婢辅桂枝，实则大青龙之变制也。去杏仁恶其从阳而辛散，用芍药以其走阴而酸收。以此易彼，裁而用之，则主治不同也。以桂枝二主之，则不发汗，可知越婢一者，乃麻黄、石膏二物，不过取其辛凉之性，佐桂枝二中和表而清热，则是寓发汗于不发之中，亦可识也。用石膏者，以其表邪寒少，肌里热多，故用石膏之凉，佐麻、桂以和其营卫，非发营卫也。

【临证举例】伤寒夹燥 《伤寒论汇要分析》：王某，女，20岁。三日前因接触冷水，当时即感有寒意。昨日上午开始头痛，恶寒发热，寒多热少，伴发咳嗽，咯痰白粘。今晨仍头痛发热（体温38.2℃），虽得微汗出，但尚恶风，喜着厚衣，咳嗽，痰色转赭色，咽痛而干，口渴而不多饮，胃纳欠佳，腰背痠痛（据云今年二月分娩后，因不慎闪挫，以致腰痛至今），二便自调，形体较瘦，神色尚无异常，舌质无变，苔薄黄而滑，手足欠温，但未至厥冷，六脉滑数。应作伤寒太阳证治例，但燥气内伏，又当精变其制，诊断为伤寒夹燥。拟桂枝二越婢一、麻杏石甘汤两方并用，以散寒疏卫，和营消热。处方：桂枝

三钱，白芍三钱，麻黄二钱，杏仁二钱，甘草二钱，生姜二钱，生石膏一两六钱，红枣三枚。仅服一剂，除因闪伤腰痛宿疾外，诸症悉除。继以自创“忍冬路通汤”专治其腰痛。

67246 桂枝二越婢一汤

《古方选注》卷上。为《伤寒论》“桂枝二越婢一汤”之异名。见该条。

67247 桂枝人参芍药汤

《伤寒大白》卷一。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67248 桂枝人参黄耆汤

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】人参三钱 黄耆三钱（炙） 桂枝三钱 甘草二钱（炙） 当归三钱 茯苓三钱 丹皮三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】痈疽脓泄热退，营卫双虚者。

67249 桂枝丹皮地黄汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 甘草二钱 丹皮三钱 地黄三钱 当归三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】脾虚肝燥，木郁克土，腹痛食减，渴欲饮水者。

【加减】气虚，加人参；水寒土湿，加干姜、茯苓。

67250 桂枝丹皮首乌汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】桂枝三钱 丹皮三钱 首乌三钱 甘草二钱 茯苓三钱 半夏三钱 干姜三钱 龙眼十个（肉）

【用法】水煎大半杯，热服。

【主治】两眼昏花不明，而无赤痛者。

67251 桂枝丹皮桃仁汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 丹皮三钱 桃仁二钱 茯苓三钱 丹参三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】经血凝滞闭结。

【加减】上热，加黄芩；中寒，加干姜；中气不足，加人参；血块坚硬，加鳖甲、虻虫；脾郁，加砂仁。

67252 桂枝丹皮紫苏汤

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 甘草二钱 丹皮三钱 苏叶三钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯，热服。覆取微汗。

【主治】痢疽初起。

67253 桂枝甘草附子汤

《类聚方》。为《伤寒论》“甘草附子汤”之异名。见该条。

67254 桂枝龙骨牡蛎汤

《金匱》卷上。为原书同卷“桂枝加龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

67255 桂枝龙骨牡蛎汤

《内台方议》卷一。为《伤寒论》“桂枝甘草龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

67256 桂枝生姜枳实汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】桂心枳实汤（《圣济总录》卷五十六）、生姜枳实汤（《鸡峰》卷十一）、桂枝枳实汤（《方剂辞典》）。

【组成】桂枝 生姜各三两 枳实五枚

【用法】以水六升，煮取三升，分三次温服。

【功用】①《金鉴》：通阳气，破逆气。②《金匱要略方义》：行气消痞，温中化饮。

【主治】①《金匱》：心中痞，诸逆心悬痛。②《金匱要略方义》：胃脘痞闷，气逆上攻作痛，呕恶暖气，畏寒喜热者。

【宜忌】《外台》：忌生葱。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：枳实、生姜，原以治气塞，况于痞乎？故较前条稍减轻分两，使痞者下其气以开之。悬痛属饮者，得生姜以散之，既足建功矣。乃去橘皮而用桂枝者，以所逆非一，或肾气上冲，正未可知，桂伐肾邪，正其能事，不但调和营卫，为去痞臣也。②《金匱要略心典》：桂枝、枳实、生姜辛以散逆，苦以泄痞，温以祛寒

也。③《金匱要略方义》：方中重用枳实快气消痞，以桂枝通阳降逆，以生姜散寒化饮，三药相合，使气行则痞消，阳盛则饮化，气畅饮消则诸逆痞痛自愈。

【临证举例】吐水 《金匱要略今释》引《成蹊录》：一妇人患吐水，水升胸间，漫漫有声，遂致吐水，每日晡而发，至初更乃已。诸医与大小柴胡汤及小半夏汤之类，无效。先生诊之，用桂枝枳实生姜汤，乃全愈。

【备考】本方方名，《外台》引作“桂心生姜枳实汤”。

67257 桂枝瓜蒌首乌汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 甘草二钱 瓜蒌根三钱 首乌三钱 生姜三钱 大枣三枚

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】风伤卫气而病柔痉，发热汗出者。

67258 桂枝加附红花汤

《医学纲目》卷三十三。即《云岐子保命集》卷下“桂枝加附子红花汤”。见该条。

67259 桂枝地黄阿胶汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】甘草二钱 地黄三钱 阿胶三钱 当归三钱 桂枝三钱 芍药三钱 茯苓三钱 丹皮三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】妊娠血下腹痛者。

67260 桂枝芍药大黄汤

《伤寒大白》卷三。为《伤寒论》“桂枝加大黄汤”之异名。见该条。

67261 桂枝芍药当归汤

《准绳·伤寒》卷七。为《圣济总录》卷一五九“当归汤”之异名。见该条。

67262 桂枝芍药知母汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】桂芍知母汤（《沈注金匱要略》卷五）。

【组成】桂枝四两 芍药三两 甘草二两 麻黄二两 生姜五两 白术五两 知母四两

防风四两 附子二枚(炮)

【用法】以水七升，煮取二升，每服七合，温服，一日三次。

【功用】①《金匱教学参考资料》：通阳行痹，祛风逐湿，和营止痛。②《经方发挥》：祛湿，驱风，清热，散寒，通络，活血，补虚。

【主治】①《金匱》：诸肢节疼痛，身体羸羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐。②《皇汉医学》引《类聚方广义》：风毒肿痛，憎寒壮热，渴而脉数；痘疮将欲成脓而不能十分贯脓，或过期不结痂，憎寒身热，一身疼痛，脉数者。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：桂枝治风，麻黄治寒，白术治湿，防风佐桂，附子佐麻黄、白术。其芍药、生姜、甘草亦和发其营卫，如桂枝汤例也。知母治脚肿，引诸药祛邪益气力；附子行药势，为开痹大剂。然分两多而水少，恐分其服而非一剂也。②《沈注金匱要略》：此久痹而出方也，乃脾胃肝肾俱虚，足三阴表里皆痹，难拘一经主治，故用桂枝、芍药、甘、术调和营卫，充益五脏之元；麻黄、防风、生姜开腠行痹而驱风外出；知母保肺清金以使治节；经谓风、寒、湿三气合而为痹，以附子行阳燥湿除寒为佐也。③《金匱要略心典》：桂枝、麻黄、防风，散湿于表；芍药、知母、甘草，除热于中；白术、附子，驱湿于下；而用生姜最多，以止呕降逆。为湿热外伤肢节，而复上冲心胃之治法也。

【临证举例】①历节 《经方实验录》：耿右，初诊：一身肢节疼痛，脚痛，足胫冷，日晡所发热，脉沉而滑，此为历节。宜桂枝芍药知母汤：川桂枝五钱，赤白芍各三钱，生甘草三钱，生麻黄三钱，熟附块五钱，生白术五钱，肥知母五钱，青防风五钱，生姜一块(打)。二诊：腰痛略减，日晡所热度较低，惟手足痠痛如故。仍宜前法：川桂枝五钱，赤白芍各五钱，生甘草三钱，净麻黄四钱，苍

白术各五钱，肥知母五钱，青防风四钱，生姜一块(打)，咸附子三钱(生用勿泡)。②类风湿性关节炎 《中医杂志》(1981; 1: 38):运用桂枝芍药知母汤治疗类风湿性关节炎32例，结果治愈14例(1例加用强的松和四环素)，显效6例，有效10例(3例加用强的松和四环素)，无效2例，总有效率为93.7%，有效病例平均服药21.6剂。治疗后化验指标的变化：类风湿因子转为阴性的27例(84.4%)；抗“O”滴度下降；全血粘度(比)、血浆粘度(比)、红细胞电泳时间(秒)均有明显下降，和治疗前相比均有非常显著性差异；血沉未见明显下降，未恢复正常范围。

67263 桂枝芍药黄土汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】甘草一钱 白术二钱 附子二钱 阿胶一钱 桂枝一钱 芍药二钱 灶中黄土三钱

【用法】流水煎半杯，温服。

【主治】痘症由于土湿木郁而便血者。

【备考】《医学金针》有生地。

67264 桂枝当归桃仁汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】桂枝三钱 芍药三钱 当归三钱 桃仁三钱 甘草二钱 茯苓三钱 川芎三钱 红花三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】妇人经脉闭结，经血凝滞而不行。

【加减】上热，加黄芩；中寒，加干姜；中气不足，加人参；血块坚硬，加鳖甲、廬虫；脾郁，加砂仁。

67265 桂枝汤加乌头汤

《医心方》卷六引《小品方》。为《金匱》卷上“乌头桂枝汤”之异名。见该条。

67266 桂枝汤加附子方

《医门法律》卷二。为《伤寒论》“桂枝加附子汤”之异名。见该条。

67267 桂枝附子续命汤

《卫生宝鉴》卷七。为《保命集》卷中“桂枝续

命汤”之异名。见该条。

67268 桂枝茯苓人参汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】人参三钱 甘草二钱 茯苓三钱 桂枝三钱 生姜三钱 大枣三枚

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】产后阳虚郁冒。

67269 桂枝茯苓当归汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】桂枝 茯苓 牡丹 桃仁 芍药 当归各等分

【用法】以水一盞半，煎一盞，温服。

【主治】半产后恶寒战栗如灌水，虽蒙重被尚鼓颌不止，须臾反烦热如灼，虽寒天欲得凉风，或腰腹疼痛，乍来乍止，其来如刺如割、如绞如啮，而流汗如雨、呻吟不已，或又渴好热汤，而阴门下瘀液臭汁。

67270 桂枝姜附阿胶汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】茯苓二钱 桂枝三钱 甘草三钱 干姜三钱 附子三钱 阿胶三钱（炒，研）

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】腰痛。

67271 桂枝姜苓牡蛎汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】甘草二钱 茯苓三钱 桂枝三钱 芍药三钱 干姜三钱 丹皮三钱 牡蛎三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】血崩。

【加减】气虚，加人参。

67272 桂枝姜苓阿胶汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】茯苓三钱 桂枝三钱 甘草二钱 生姜三钱 阿胶三钱（炒，研） 白芍三钱 当归三钱 川芎三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】虚寒腰痛。

67273 桂枝栝楼干葛汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四

【组成】桂枝 芍药各三钱 栝楼根 甘

草各二钱 干葛二钱半

【用法】水二盞，加生姜七片，大枣一枚，煎至八分，去滓服。

【主治】柔痉。

67274 桂枝柴胡各半汤

《痰疟论疏》。为《伤寒论》“柴胡桂枝汤”之异名。见该条。

67275 桂枝黄耆鳖甲汤

【方源】《退思集类方歌注》。

【组成】桂枝 白芍各一钱 黄耆（生）防风 秦艽 当归各一钱 鳖甲（酥炙）浮小麦各三钱 炙草五分 生姜一片 大枣一枚

【用法】水煎服。

【主治】久疟，营虚卫弱，汗多，洒淅恶风。

67276 桂枝麻黄各半汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄芍药汤（《内台方议》卷一）、桂麻各半汤（《医学入门》卷四）、麻黄桂枝合半汤（《伤寒来苏集》卷一）。

【组成】桂枝一两十六铢（去皮） 芍药 生姜（切） 甘草（炙） 麻黄（去节）各一两 大枣四枚（擘） 杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及二仁者）

【用法】以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。本云：桂枝汤三合，麻黄汤三合，顿服。将息如上法。

【功用】①《注解伤寒论》：小发其汗，以解表邪。②《金鉴》：小小汗之以和营卫。

【主治】①《伤寒论》：太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，面色反有热色，身痒者。②《皇汉医学》引《类聚方广义》：痘疮热气如灼，表郁难以见点，或见点稠密，风疹交出，或痘不起胀，喘咳咽痛者。

【方论选录】①《内台方议》：桂枝汤治表虚，麻黄汤治表实，二者均曰解表，霄壤之

异也。今此二方合而用之者，乃解其表不虚不实者也。桂枝汤中加麻黄、杏仁，以取小汗也。②《伤寒贯珠集》：既不得汗出，则非桂枝所能解，而邪气又微，亦非麻黄所可发，故合两方为一方，变大制为小制。桂枝所以为汗液之地，麻黄所以为发散之用，且不使药过病，以伤其正也。③《伤寒论类方》：此方分两甚轻，计共约六两，合今之秤仅一两三四钱，分三次服，只服四钱零，乃治邪退后至轻之剂，犹勿药也。④《古方选注》：其法先煎麻黄，后纳诸药，显然麻黄为主，而以桂枝、芍药为监制也。盖太阳邪未解，又因阴阳俱虚，汗吐下皆禁，不能胜麻黄之说，故监以桂枝、芍药以白芍，而又铢两各减其半，以为小制，服后得小汗即已，庶无大汗亡阳之过尔。

【临证举例】①太阳病 《经方实验录》，顾左，寒热交作，一日十数度发，此非疟疾，乃太阳病，宜桂枝麻黄各半汤：桂枝三钱，甘草一钱半，杏仁五钱，麻黄一钱半，白芍一钱半，生姜二片，大枣四枚。②风寒表证 《贵阳中医学院学报》(1979: 2: 5)：某，女，47岁。恶寒发热已9日，每日午后三时许，微恶寒，并发热，入夜体温达38.5℃左右，随后汗出烧退。体检、血象、胸透均无异常，服用一剂解表剂、ABC及抗菌素无效。苔白，脉弦细。证属太阳伤寒，给予桂枝麻黄各半汤一剂。服后恶寒加重，并作寒噤，继而发热，遍体微汗，次日即未再发。

67277 桂苓五味甘草汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】茯苓桂枝五味甘草汤(原书同卷)、茯苓桂心甘草五味子汤(《千金》卷十八)、茯苓五味子汤(《三因》卷十三)、苓桂味甘汤(《普济方》卷一四〇)、苓桂五味甘草汤(《类聚方》)、桂苓甘草五味汤(《血证论》卷八)。

【组成】茯苓四两 桂枝四两(去皮) 甘草三两(炙) 五味子半升

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者。

【宜忌】《外台》忌海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】《金匱要略心典》服青龙已，冲气不归，而仍上逆也。茯苓、桂枝，能抑冲气，使之下行；然逆气非敛不降，故以五味之酸敛其气；土厚则阴火自伏，故以甘草之甘补其中也。

【临证举例】①冲气上逆 (《上海中医药杂志》1984; 6: 31)：陈某，女，40岁，1979年10月26日来诊，因情志因素致阵发性脐下悸已8个月，每日发作3~5次，发作时自觉从少腹有气上冲、胸闷喉痒，唇麻齿抖，语言不利，面色潮红，并有冷气下行，足冷腿软，步履困难，近一月来症状加重，头痛畏光，视力减退，发作完毕，一切如常，苔薄白，脉滑数有力。冲气上逆，治拟平冲降气，桂苓五甘汤主之。茯苓、桂枝各12克，甘草9克，五味子24克，共服21剂，诸证消失，随访2年，未复发。②气厥(瘧病) (《上海中医药杂志》1984; 6: 31)：范某，女，60岁，每因生气出现脐下悸，惊恐气短，四肢发冷，遂即昏倒，小便失禁，甚时每日发作5~6次，历时半年余，西医诊断为瘧病，苔薄白，脉滑数有力，辨证为气机逆乱，蒙蔽清窍，发为气厥。方用茯苓、桂枝各12克，甘草9克，五味子24克，服6剂后，除略有心悸外，余证悉平，继服24剂病告痊愈，随访无恙。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“茯苓桂枝五味子甘草汤”。

67278 桂苓甘草五味汤

《血证论》卷八。为《金匱》卷中“桂苓五味甘草汤”之异名。见该条。

67279 桂枝去桂加苓术汤

《内台方议》卷一。为《伤寒论》“桂枝去桂加

茯苓白术汤”之异名。见该条。

67280 桂枝加人参附子汤

【方源】《金匱翼》卷三。

【组成】桂枝 白芍各一两半 甘草(炙)一两 附子(炮)半个 人参一两半

【用法】每服五钱,加生姜三片,大枣一枚,水煎服。

【主治】阳虚,腠理不固,恶寒自汗,脉浮虚。

67281 桂枝加川芎防风汤

【方源】《此事难知》。

【组成】桂枝 芍药 生姜各一两半 甘草 防风 川芎各一两 大枣六枚

【用法】上锉细。每服一两,水三盏,煎至一盏半,去滓温服。

【主治】柔痉,发热、自汗,而不恶寒者。

67282 桂枝加龙骨牡蛎汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】桂枝龙骨牡蛎汤(原书同卷)、龙骨汤(《外台》卷十六引《小品方》)、桂枝牡蛎汤(《圣济总录》卷九十一)、龙骨牡蛎汤(《广嗣纪要》卷二)。

【组成】桂枝 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣十二枚 龙骨 牡蛎各三两

【用法】以水七升,煮取三升,分三次温服。

【功用】①《金鉴》:调阴阳,和营卫,兼固涩精液。②《金匱要略方义》:整理阴阳,调和营卫,交通心肾,固精止遗。

【主治】男子失精,女子梦交,自汗盗汗,遗尿。

①《金匱》:失精家,少腹弦急,阴头寒,目眩(一作目眶痛),发落,脉极虚芤迟,为清谷亡血,失精,脉得诸芤动微紧,男子失精,女子梦交。②《金匱要略今释》引《橘窗书影》:遗尿。③《金匱要略方义》:自汗盗汗,心悸多梦,不耐寒热,舌淡苔薄,脉来无力者。

【宜忌】《外台》引《小品方》:忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水。

【方论选录】①《医门法律》:用桂枝汤调其营卫羸迟;脉道虚衰,加龙骨、牡蛎涩止其清谷、亡血、失精。一方而两扼其要,诚足宝也。②《金匱要略论注》:桂枝、芍药,通阳固阴;甘草、姜、枣,和中、上焦之营卫,使阳能生阴,而以安肾宁心之龙骨、牡蛎为辅阴之主。③《医方集解》:桂枝、生姜之辛以润之,甘草、大枣之甘以补之,芍药之酸以收之,龙骨、牡蛎之涩以固之。

【临证举例】①遗尿 《金匱要略今释》引《橘窗书影》:幕府集会酒井六三郎,年十八。遗尿数年,百治罔效。余诊之,下元虚寒,小便清冷,且脐下有动,易惊,两足微冷。乃投以桂枝加龙骨牡蛎汤,兼服八味丸,数日而渐减,服经半年而痊愈。桂枝加龙骨牡蛎,本为治失精之方,一老医用此治愈老宫女之屡小遗者;和田东郭用此治愈高槻老臣之溺闭;服诸药不效者,余用此治遗尿,屡屡得效。②遗精 《经方实验录》:邹萍君,年少时染有青年恶习,久养而愈。本冬遗精又作,服西药先二星期甚适,后一星期无效,更一星期服之反剧。精出甚浓,早起脊痛头晕,不胜痛苦,自以为中、西之药乏效。余予桂枝、白芍各三钱,炙草二钱,生姜三大片,加花龙骨六钱、左牡蛎八钱,以上二味打碎,先煎二小时。一剂后,当夜即止遗,虽邹君自惧万分,无损焉。第三日睡前,忘排尿,致又见一次。以后即不复发,原方加减,连进十剂,恙除,精神大振。计服桂枝、芍药各三两,龙骨六两,牡蛎八两矣。③盗汗 《经方实验录》:吴兄凝轩,昔尝患盗汗之恙,医用浮小麦、麻黄根、糯稻根以止其汗。顾汗之止仅止于皮毛之里,而不止于肌肉之间,因是皮肤作痒异常,颇觉不舒。后自检方书,得本汤服之,汗止于不知不觉之间云。④自汗 《岳美中医案》:李某某,40岁,男性。患项部自汗,竟日淋漓不止,频频作拭,颇感苦恼,要求治疗。诊其脉浮缓无力,汗自出。分析病情,项部是太阳经所过,长期汗

出,系经气向上冲逆,持久不愈,必致虚弱。因投以张仲景之桂枝龙骨牡蛎汤,和阳降逆,协调营卫,收敛浮越之气。先服4剂,自汗止;再服4剂,以巩固疗效。⑤女子梦交《浙江中医杂志》(1984;1:46):高某某,女,34岁,农民。入夜每与人交,天明始去,已四五年,误为“狐仙”,羞愧难言。初则不以为然,久则心悸胆怯,延期失治,病情日重,避卧于邻家,仍纠缠不散。形体消瘦,困倦乏力,少气懒言,头晕眼花,腰膝痠软,带多清稀,舌质淡红,苔薄白,脉细弱。系阴阳两亏,心肾不交,属梦交症。拟用桂枝加龙骨牡蛎汤:桂枝18克,白芍、龙骨各20克,甘草、生姜各9克,生牡蛎30克,红枣7枚。5剂后,诸症消除,予归脾丸巩固疗效。随访一年未复发。

67283 桂枝加芍药大黄汤

《皇汉医学》。为《伤寒论》“桂枝加大黄汤”之异名。见该条。

67284 桂枝加芍药当归汤

《云岐子保命集》卷下。为《圣济总录》卷一五九“当归汤”之异名。见该条。

67285 桂枝加当归芍药汤

【方源】《此事难知》。

【异名】桂枝加归芍汤(《杂病源流犀烛》卷十五)。

【组成】桂枝汤加当归 芍药

【主治】肾疝,令人洒洒,腰脊痛,宛转大便难,目眴眴然,手足寒。

67286 桂枝加当归茯苓汤

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】桂枝 白芍 甘草(炙) 当归 茯苓 生姜 大枣

【用法】水煎,温服。

【功用】泻肾补心。

【主治】奔豚。

67287 桂枝加附子红花汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】桂枝二两半 芍药 生姜各一两半 甘草一两(炙) 附子(炮) 红花各

五钱

【用法】上锉细。每服一两,以水三盏煎服。

【主治】妇人伤寒,太阳标与少阴本病,表虚自汗身凉,四肢拘急,脉沉而迟,经水适断。

【备考】本方方名,《医学纲目》引作“桂枝加附红花汤”。

67288 桂枝加厚朴杏仁汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝加厚朴杏仁汤(《医学纲目》卷三十二)、桂枝加朴杏汤(《医学入门》卷四)。

【组成】桂枝三两(去皮) 甘草二两(炙) 生姜三两(切) 芍药三两 大枣十二枚(擘) 厚朴二两(炙,去皮) 杏仁(去皮尖)五十枚

【用法】以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升。覆取微似汗。

【功用】《伤寒论讲义》:解肌祛风,降气定喘。

【主治】太阳病表未解,下之微喘。

【方论选录】①《内台方议》:下后微喘者,则为里气上逆,邪气在表,故属此汤主之。与桂枝汤以解表邪,加厚朴、杏仁为佐,以下逆气也。②《伤寒论翼》:夫喘为麻黄症,方中治喘者,功在杏仁。桂枝本不治喘,此因妄下后,表虽不解,腠理已疏,则不当用麻黄而宜桂枝矣。所以宜桂枝者,以其中有芍药也,既有芍药之敛,若但加杏仁,则喘虽微,恐不能胜任,必加厚朴之辛温,佐桂以解肌,佐杏仁以降气。故凡喘家不当用麻黄汤,而作桂枝汤者,加厚朴、杏仁为佳法矣。③《伤寒论方解》:本方是桂枝汤加厚朴、杏仁两味所组成。厚朴除有驱除痰涎作用外,还能疏利气壅;杏仁有定喘镇咳作用。桂枝汤中加上这两味,是为痰多而喘嗽者设。

【临证举例】①误治致喘 《伤寒九十论》:戊申正月,有一武弁在仪真,为张遇所虏,日夕置于舟艑板下,不胜踉伏,后数日得脱,因

饱食，解衣扞虱以自快，次日遂作伤寒。医者以因饱食伤而下之，一医以解衣中邪而汗之，杂治数日，渐觉昏困，上喘息高。医者惶惶，罔知所指。予诊之曰：太阳病下之，表未解，微喘者，桂枝加厚朴杏子汤，此仲景法也。一投而喘定，再投而濈濈汗出。至晚，身凉而脉已和矣。②外感引动宿喘 《伤寒医案选》：刘某某，男，42岁。素有痰喘之疾，发作较频。春日伤风，时发热，自汗出，微恶风，头痛；且引动咳喘，发作甚于前，胸闷而胀，气喘倚息，痰白稠量多，咳喘之时则汗出更甚，不思食，舌苔白腻，脉浮缓，关滑有力。此风邪伤表，引动痰喘复发，外风挟痰浊壅滞胸脘，肺胃气逆不降所致。方用桂枝加厚朴杏子汤加味。处方：桂枝6克，白芍6克，生姜2片，炙甘草4.5克，厚朴9克，杏仁9克，麻黄1.5克，贝母9克，苏子9克，炒枳壳9克。连用3剂后，表证去，自汗止，痰喘亦平。

67289 桂枝加厚朴杏仁汤

《医学纲目》卷三十二。为《伤寒论》“桂枝加厚朴杏子汤”之异名。见该条。

67290 桂枝加黄耆五两汤

《三因》卷十。为《金匱》卷中“桂枝加黄耆汤”之异名。见该条。

67291 桂枝加葛根瓜蒌汤

【方源】《此事难知》。

【异名】桂枝加葛根瓜蒌汤（《普济方》卷一三二）。

【组成】桂枝 芍药 葛根 栝楼根各二钱半

【用法】上为末，水煎服。

【主治】柔痉有汗。

【备考】《普济方》有生姜七片、大枣二枚。《伤寒广要》有甘草。

67292 桂姜枣草黄辛附汤

《类聚方》。为《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

67293 桂姜草枣黄辛附汤

《金匱》（涵芬楼本）卷中。即原书（商务

印书馆本）“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”。见该条。

67294 桂甘姜枣麻辛附子汤

《金匱要略心典》卷中。为《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

67295 桂甘姜枣麻附细辛汤

《金匱悬解》卷十。为《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

67296 桂枝去芍药加皂荚汤

【方源】《千金》卷十七。

【异名】桂枝皂荚汤（《赤水玄珠》卷七）。

【组成】桂枝 生姜各三两 甘草二两 皂荚一挺 大枣十二枚

【用法】上咬咀。以水七升，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】肺痿吐涎沫不止。

【方论选录】《千金方衍义》：桂枝汤和营卫药，《千金》去芍药之酸收，参入皂荚一味，即《金匱》皂荚丸，不用蜜丸，而入汤液，然不若用汤送丸，不使皂荚之味棘喉，尤为得宜。此唯肥盛多湿浊垢支塞肺胃者，方为合剂；若瘦人津液素槁，虽有痰血，亦难胜皂荚之荡涤也。

67297 桂枝去芍药加附子汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云：桂枝汤，今去芍药加附子。将息如前法。

【功用】《伤寒论讲义》：解肌祛风，兼温经复阳。

【主治】太阳病，下之后，脉促胸满、微恶寒者。

【方论选录】①《注解伤寒论》：与桂枝汤以散客邪，通行阳气；芍药益阴，阴虚者非所宜，故去之。阳气已虚，若更加之微寒，则

必当温剂以散之，故加附子。②《内台方议》：阳虚阴盛，邪在胸中，不可发汗，只得与附子以复阳温经，与桂枝以散其邪也。③《伤寒来苏集》：桂枝汤阳中有阴，去芍药之酸寒，则阴气流行，而邪自不结，即扶阳之剂矣。若微恶寒，则阴气凝聚，恐姜、桂之力不能散，必加附子之辛热。④《古方选注》：桂枝汤去芍药加附子者，下后微恶寒，显然阳气涣散于中下矣。当急救其阳，毋暇顾恋阳气，以附子直从下焦温经助阳，臣以桂枝、甘草，载还中焦阴气，以杜亡阳之机，为御后之策。

【临证举例】伤寒阴结 《全国名医验案类编》：刘荣年治刘某某，30余岁。冬月伤寒，误服寒泻药而成。身体恶寒，腹胀满痛，不大便者二日，脉浮大而缓。显系伤寒中证，医家不察，误为阳明腑证，误用大黄、芒消等药下之……以致寒气凝结、上下不通，故不能大便，腹胀大而痛更甚也，用桂枝汤去芍药加附子以湿行之，则所服消、黄得阳药运行，而反为我用也。处方：桂枝尖一钱，黑附子一钱，炙甘草五分，生姜一钱，大枣二枚（去核）。服药后，未及10分钟，即大泻二次，恶寒、腹胀痛均除而痊。

67298 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝龙骨牡蛎汤（《内台方议》卷一）、桂甘龙骨牡蛎汤（《医学入门》卷四）。

【组成】桂枝一两（去皮） 甘草二两（炙） 牡蛎二两（熬） 龙骨二两

【用法】以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，一日三次。

【功用】①《伤寒来苏集》：安神救逆。②《经方发挥》：潜阳，镇惊，补心，摄精。

【主治】①《伤寒论》：火逆下之，因烧针烦躁者。②《经方发挥》：心悸，虚烦，脏躁，失眠，遗精，阳萎。

【方论选录】①《注解伤寒论》：辛甘发散，桂枝、甘草之辛甘也，以发散经中火邪；淫

可去脱，龙骨、牡蛎之涩，以收敛浮越之正气。②《伤寒贯珠集》：桂枝、甘草，以复心阳之气；牡蛎、龙骨，以安烦乱之神。③《古方选注》：桂枝、甘草、龙骨、牡蛎，其义取重于龙、牡之固涩。仍标之曰桂、甘者，盖阴钝之药，不佐阳药不灵。故龙骨、牡蛎之纯阴，必须藉桂枝、甘草之清阳，然后能飞引入经，收敛浮越之火、镇固亡阳之机。

【临证举例】①惊悸 《经方发挥》：殷某某，女，28岁。患者心悸善惊，稍劳则惕惕而动，并喜手按其胸，时有虚烦，已二年之久。近一年来上证增重，日轻夜重，睡眠后惊悸而醒。神志迟呆，记忆力锐减，失眠，自汗，胃纳不佳，手足易次。曾多次用西药调治及服用中药安神养血之品不效。就诊时病情日渐加重，且常恐惧不安，天黑后一入不敢外出，在室中常幻听到有人呼唤她的名字，如无人伴随时，呼唤之声越来越大，惊惕更甚，以致每晚不敢独自在家，诊脉细而弱。考虑为心阳虚衰所致，给予桂枝甘草龙骨牡蛎汤二剂。服后自觉心悸善惊大有好转。又连服五剂，诸证悉愈。后宗此方配制丸药服一月之久，以后概未复发。②遗精 《经方发挥》：曹某某，男，20岁，未婚学生。由手淫引起梦遗一年多，起初三至五日遗精一次，以后发展到每日遗精，虽服过不少的滋补固涩药品，效果不佳。伴有头晕眼花，心悸失眠，精神不振，潮热，自汗盗汗，面色晄白，肌肉削瘦，腰腿疼困，乏力等证，脉细缓无力，舌光无苔。予以桂枝甘草龙骨牡蛎汤为主，加减出入，日服一剂，共治疗不到两月，诸证悉愈。观察二年，并未复发。③失眠 《经方发挥》：石某某，男，45岁，干部。患失眠十余年，逐渐加重。近一年来，有时几乎通宵不寐，时觉虚烦不安。虽累用安眠、镇惊之中、西药，疗效不显，时好时坏，伴有头晕、心悸、耳鸣、易汗、手足不温等证；胃纳尚可，不欲饮水，小便清长，大便稀薄；脉沉迟无力，舌淡，舌胖有齿痕。以桂枝甘草龙

骨牡蛎汤加茯苓等,服十三四剂后,睡眠基本正常,以后虽有反复,但证状轻微不足为害。又以此方剂制成丸药,常服以巩固疗效。

67299 桂枝加葛根瓜蒌根汤

《普济方》卷一三二。为《此事难知》“桂枝加葛根瓜蒌汤”之异名。见该条。

67300 桂枝芍药人参生姜汤

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67301 桂枝芍药人参新加汤

《医统》卷十四。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67302 桂枝附子去桂加术汤

《类聚方》。为《伤寒论》“桂枝附子汤去桂加白术汤”之异名。见该条。

67303 桂枝去芍加茯苓白术汤

《伤寒论方解》。为《金鉴》卷三十一“桂枝去芍药加茯苓白术汤”之异名。见该条。

67304 桂枝去芍加麻辛附子汤

《金匱》卷中。为原书同卷“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

67305 桂枝去桂加茯苓白术汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白术茯苓汤(《鸡峰》卷十八)、茯苓白术汤(《普济方》卷一四七引《十便良方》)、桂枝去桂加苓术汤(《内台方议》卷一)。

【组成】芍药三两 甘草二两(炙) 生姜(切) 白术 茯苓各三两 大枣十二枚(擘)

【用法】以水八升,煮取三升,去滓,温服一升。小便利则愈。本云:桂枝汤,今去桂加茯苓、白术。

【功用】《伤寒论讲义》:利水通阳。

【主治】太阳病服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者。

【方论选录】①《尚论篇》:在表之风寒未除,而在里之水饮上逆,故变五苓两解表里

之法,而用茯苓、白术为主治。去桂者,以已误不可复用也。然桂枝虽不可用,其部下诸属,皆所必需。倘并不用芍药以收阴,甘草、姜、枣以益虚而和脾胃,其何以定误汗、误下之变耶?故更一主将,而一军用命甚矣,仲景立方之神也。②《伤寒贯珠集》:表邪挟饮者,不可攻表,必治其饮而后表可解。桂枝汤去桂加茯苓、白术,则不欲散邪于表,而但逐饮于里,饮去则不特满痛除,而表邪无附,亦自解矣。③《古方选注》:苓、术、芍、甘,治太阳里水法也。解肌或下,水邪不去,而反变症,是非解肌者矣,当去桂枝,而以苓、术、生姜代桂枝行阳,存芍药以收阴;不取辛甘发散于表,取苓、芍药阴利水,甘、枣培土制水,即太阳入里用五苓表里两解之义也。④《伤寒论类方》:凡方中有加减法,皆佐使之药,若去其君药,则另立方名。今去桂枝为名,所不可解。殆以此方虽去桂枝,而意仍不离乎桂枝也。

【临证举例】①流行性感冒 《新医学》(1975;3:159):患者年岁颇高,偶感风寒,初起鼻塞头胀,喉痒咳嗽,咯痰清稀不多,服西药发汗后症状仍不解。笔者以桂枝汤为底,重用桂枝、生姜、甘草,加苏叶、细辛,一剂而愈。其后不久,正值流感流行,患者又染上流感,症状与前类似,但痰多而伴有胸闷、胃胀欲呕。病者自以上方治之,但无效。邀笔者再诊,投以下方:桂枝二钱,赤芍三钱,甘草二钱,大枣四钱,生姜四钱,川朴花三钱,法夏三钱,茯苓四钱,白术四钱。服药2剂,病愈。②低热 《伤寒论诠解》:陈慎吾先生曾治一数年低热患者,而有翕翕发热,小便不利等证。陈用本方原方,仅两三剂,便热退病愈。

67306 桂枝加人参芍药新加汤

《普济方》卷四十三。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67307 桂枝加芍药人参新加汤

《中国医学大辞典》。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67308 桂枝加芍药生姜人参汤

《金匱玉函经》卷五。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67309 桂枝加芍药防风防己汤

【方源】《此事难知》。

【组成】桂枝一两半 防风 防己各一两 芍药三两 生姜一两半 大枣六枚

【用法】上锉细。每服一两，以水三盏，煎至一盏半，去滓温服。

【主治】痉病，发热、脉沉细而腹痛者。

67310 桂枝加知母石膏升麻汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】桂枝汤内加知母 石膏各四钱半 升麻二钱

【用法】夏至后用。

【主治】热病。

67311 桂枝加黄耆知母石膏汤

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】桂枝汤加黄耆 知母 石膏各四钱半

【主治】疟疾。

67312 桂枝附子去桂加白术汤

《医效秘传》卷三。为《伤寒论》“桂枝附子汤去桂加白术汤”之异名。见该条。

67313 桂枝附子汤去桂加白术汤

《伤寒瘟疫条辨》卷五。为《伤寒论》“桂枝附子汤去桂加白术汤”之异名。见该条。

67314 桂枝黄耆白薇款冬花散

【方源】《痰症论疏》。

【组成】桂枝（去皮）三钱 黄耆（去头上皱皮，蜜水润透，蒸半炷香，取出炙燥，槐砧上锉碎）五钱 白薇（取山东所产者，柔黄而香，用糯米泔浸一宿，取出晒干，槐砧上锉碎，蒸之，从己至申）五钱 款冬花（取微见花者良，如已芬芳则无气力，拣去向里裹花蕊、壳并向里实如栗零壳及枝叶，用

甘草水浸一宿，却取款冬叶拌，蒸一夜，去叶晒干）三钱 芍药（削去皮一层，蜜水润，蒸三次，晒三次，锉碎）六钱 石膏（研细，甘草水飞，澄，晒）五钱 知母（槐砧上锉碎，干木臼中捣烂）五钱

【用法】上为粗末。每服五七钱，水煎服。

【主治】肺症。

67315 桂苓甘味合附子都气丸

【方源】《丁甘仁医案》卷四。

【组成】桂枝八分 云苓三钱 炙甘草五分 五味子五分 生白术五钱 制半夏二钱 炙远志一钱 炒补骨脂五钱 熟附块五钱 怀山药三钱 大熟地（炒松）三钱 合桃肉二枚

【功用】温化痰饮，摄纳肾气。

【主治】咳嗽气喘。

67316 桂枝去芍药加茯苓白术汤

【方源】《金鉴》卷三十一。

【异名】桂枝汤去芍药加茯苓白术汤（原书同卷）、桂枝去芍加茯苓白术汤（《伤寒论方解》）。

【组成】桂枝汤去芍药加茯苓 白术各三两

【用法】依桂枝汤法煎服。小便利则愈。

【主治】太阳病服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者。

【方论选录】①《金鉴》：此条为汗下后表不解、而心下有水气者立治法也。桂枝去桂加茯苓白术汤，去桂当是去芍药，此方去桂，将何以治仍头项强痛、发热无汗之表乎？若去桂则是芍药、甘草、茯苓、白术，并无辛甘走营卫之品，而曰余依桂枝汤法，无所谓也。且论中有脉促胸满、汗出恶寒之证，用桂枝去芍药加附子汤主之，去芍药者，为胸满也；此条证虽稍异，而其满则同，为去芍药可知矣。用桂枝汤以解表，去芍药之酸收，避无汗、心下之满；加茯苓之燥渗，因水停小便不利也。余依桂枝汤法煎服，谓依桂枝

汤法取汗也。小便利则愈,谓饮病输水道则愈也。此方即桂苓甘术汤而有生姜、大枣,其意专在解肌,利水次之,故用生姜、大枣佐桂枝,以通津液取汗也。②《伤寒论方解》:本方如去桂,便与证候不合。日医如吉益猷、丹波元简、山田正珍诸氏亦认为不当去桂。因此,理应从《金鉴》及吉益猷氏的说法,将“去桂”改为“去芍”,庶几药与证合。

67317 桂枝去芍药加黄辛附子汤

《方剂辞典》。即《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”。见该条。

67318 桂枝去芍药加麻辛附子汤

《医门法律》卷二。即《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”。见该条。

67319 桂枝附子去桂枝加白术汤

《金鉴》卷十三。为《伤寒论》“桂枝附子汤去桂加白术汤”之异名。见该条。

67320 桂枝附子汤去桂加白术汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白术附子汤(《金匱》)、桂枝附子去桂枝加白术汤(《金鉴》卷十三)、桂枝附子汤去桂加术汤(《伤寒瘟疫条辨》卷五)、桂枝附子去桂加白术汤(《医效秘传》卷三)、桂枝附子去桂加术汤(《类聚方》)。

【组成】附子三枚(炮,去皮,破) 白术四两 生姜三两(切) 甘草二两(炙) 大枣十二枚(擘)

【用法】以水六升,煮取三升,去滓,分三次温服。初一服,其人身如痹,半日许复服之;三服都尽,其人如冒状,勿怪,此以附子、术并走皮内,逐水气未得除,故使之耳。虚弱家及产妇,宜减服之。

【功用】①《金匱教学参考资料》:助里阳以逐表湿。②《金匱要略讲义》:祛湿温经。

【主治】伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,大便硬,小便自利者。

【宜忌】《外台》:忌葱、猪肉、菰菜、海藻、桃、李、雀肉。

【方论选录】①《注解伤寒论》:桂发汗走津液;此小便利、大便硬,为津液不足,去桂加术。②《伤寒来苏集》:病本在脾,法当君以白术,代桂枝以治脾,培土以胜湿,土旺则风自平矣,桂枝理上焦,大便硬、小便利,是中焦不治,故去桂。③《伤寒贯珠集》:去桂枝之辛散,加白术之苦燥,合附子之大力健行者,予以并走皮中,而逐水气,以避虚就实之法也。④《古方选注》:湿胜于风者,用术附汤。以湿之中人也,太阴受之,白术健脾去湿,熟附温经去湿,佐以姜、枣和表里,不必治风,但使湿去,则风无所恋而自解矣。

【备考】本方方名,《外台》引作“附子白术汤”、“附子汤”。

67321 桂枝蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

《医学纲目》卷三十二。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

67322 桂枝五味甘草去桂加姜辛汤

《张氏医通》卷十三。即《金匱》卷中“苓甘五味姜辛汤”。见该条。

67323 桂枝汤去芍药加茯苓白术汤

《金鉴》卷三十一。为原书同卷“桂枝去芍药加茯苓白术汤”之异名。见该条。

67324 桂枝加芍药生姜人参新加汤

《金匱玉函经》。为《伤寒论》“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”之异名。见该条。

67325 桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤

《医灯续焰》卷十八。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

67326 桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤

《赤水玄珠》卷五。为《金匱》卷中“桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤”之异名。见该条。

67327 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】桂枝去芍药加麻辛附子汤(原书同卷)、附子汤(《外台》卷八引《深师方》)、桂附汤(《三因》卷十四)、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤(《赤水玄珠》卷五)、桂甘姜

枣麻辛附子汤（《金匱要略心典》卷中）、桂甘姜枣麻附细辛汤（《金匱悬解》卷十）、桂姜枣草黄辛附汤（《类聚方》）。

【组成】桂枝三两 生姜三两 甘草二两大枣十二枚 麻黄二两 细辛二两 附子一枚（炮）

【用法】以水七升，煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取二升，分三次温服。当汗出，如虫行皮中，即愈。

【功用】①《金匱要略方义》：振奋阳气，调和营卫，外解风寒，内化水饮。②《金匱要略讲义》：温阳散寒，通利气机。

【主治】①《金匱》：气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作。②《金匱要略方义》：心肾阳虚，外感风寒，水饮内停，头痛身痛，恶寒无汗，手足逆冷，心下痞坚，腹满肠鸣，相逐有声，或矢气，或遗尿，脉沉迟而细涩无力。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水、生菜。

【方论选录】①《金匱要略论注》：药既用桂、甘、姜、枣以和其上，而复用麻黄、附子、细辛少阴的剂以治其下，庶上下交通而病愈，所谓大气一转，其气乃散也。②《古今名医方论》引柯琴：用附子、姜、桂以生阳之气，麻黄、细辛以发阳之汗，甘草、大枣以培胃脘之阳，使心下之水饮外达于皮毛，必如虫行皮中，而坚大如盘者始散。③《金匱要略方论》：本方是桂枝去芍药汤合麻黄细辛附子汤两方相合而成，桂枝去芍药汤主治表证而兼心阳不足者；麻黄细辛附子汤主治素体阳虚（主要为肾阳虚）而外感风寒者。今两方合用，殆为心肾阳虚、外感风寒之证而设。方中桂枝配伍麻黄，辛温发汗，宣散水气；附子温经助阳，与细辛相合可祛寒化饮。盖阳虚之体，邪客较深，取细辛可通彻表里，搜邪外出。佐以生姜、大枣，伍麻黄发越水气，合桂枝温通营卫；佐以甘草，调和诸药。

【临证举例】阴水 《福建中医医案医话选编》：陆某，女，24岁。全身浮肿，面色苍白，恶寒，四肢冰冷，脉象沉迟，舌苔白腻，渴不多饮。此证系阴盛阳微，水气泛滥，病名阴水。盖患者脾肾阳气素虚，水湿内蕴，脾主健运，肾主排泄，脾虚不能制水，肾虚不能化水，故水聚而成胀也。治宜消阴救阳、祛寒逐水，主以桂枝去芍药加麻辛附子汤：桂枝三钱，麻黄二钱，甘草二钱，细辛一钱，附子二钱，生姜二钱，大枣十枚。连服二剂，药后得微汗，四肢转温，恶寒已减，药已中肯，当乘胜再追，用前方再服一剂。恶寒已罢，小便通利，腹胀减小，脉象转缓，阳气亦有渐升之象，前方再服一剂。上部浮肿已消，腹胀再有减小，两足仍浮。后以鸡鸣散、实脾饮出入治愈。

【备考】本方方名，原书（涵芬楼本）作“桂姜枣草黄辛附汤”；《医门法律》引作“桂枝去芍药加麻辛附子汤”；《方剂辞典》引作“桂枝去芍药加黄辛附子汤”。

67328 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤

《古方选注》。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤”之异名。见该条。

67329 桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤

《金匱要略今释》卷四。为《金匱》卷中“桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤”之异名。见该条。

67330 桂枝二白虎一加芍药黄芩牡桂方

【方源】《痰疟论疏》。

【组成】桂枝（去皮）三钱 芍药（去皮，蜜水蒸、晒三次，锉碎）六钱 生姜（切）三片 甘草（去头尾，酒浸，蒸，炙令黄色）四钱 大枣三枚（擘） 粳米半合（淘净） 石膏（研细，甘草水飞过，澄，晒）一两五钱 知母（槐砧上锉碎，干木臼中杵捣）五钱 黄芩（取腐肠者，东流水润透，蒸之，晒干）六钱 牡桂（取厚寸许、色紫赤、味辛甜者，去内外粗皮一层，锉碎，勿令见火）三钱

【用法】以水四升，煮取一升半，去滓，分

三次温服，未发、将发、发后各服一次。

【主治】胃疟。

67331 桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤

《千金方衍义》卷十八。为《金匱》卷中“桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤”之异名。见该条。

67332 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤

《准绳·伤寒》卷五。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

67333 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝救逆汤（《金匱》卷中）、桂枝蜀漆牡蛎龙骨救逆汤（《医学纲目》卷三十二）、救逆汤（《圣济总录》卷二十八）、桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤（《准绳·伤寒》卷五）、桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤（《医灯续焰》卷十八）、桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤（《古方选注》）。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 牡蛎五两（熬） 蜀漆（去腥） 龙骨四两

【用法】以水一斗二升，先煮蜀漆减二升，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】《中医方剂学》：镇惊安神。

【主治】①《伤寒论》：伤寒脉浮，医者以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者。②《方机》：火逆烦躁，胸腹动剧者；及疟疾而有上冲者。

【方论选录】①《注解伤寒论》：与桂枝汤，解未尽表邪；去芍药，以芍药益阴，非亡阳所宜也；火邪错逆，加蜀漆之辛以散之；阳气亡脱，加龙骨、牡蛎之涩以固之。本草云：涩可去脱，龙骨、牡蛎之属是也。②《尚论篇》：桂枝汤，阳药也。然必去芍药之阴重，始得疾趋以达以阳位；既达阳位矣，其神之惊狂者，漫难安定，更加蜀漆为之主统，则神可赖以攸宁矣。缘蜀漆之性最急，丹溪谓其能飞补是也，更加龙骨、牡蛎有形之骨属，为之舟楫，以载神而反其宅，亦于重以

镇祛、涩以固脱之外，行其妙用。③《伤寒贯珠集》：被火者，动其神则惊狂，起卧不安，故当用龙、牡；其去芍药者，盖欲以甘草急复心阳，而不须酸味更益营气也，与发汗后，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，用桂枝甘草汤同义。蜀漆，即常山苗，味辛，能去胸中邪结气。此证火气内迫心包，故须之以逐邪而安正耳。④《医学摘粹》：用桂枝、甘草疏木而培中，生姜、大枣补脾而降逆，蜀漆吐腐瘀而疗狂，龙骨、牡蛎敛神魂而止惊也。

【临证举例】心悸《中医杂志》（1980；11：

58）：常山、蜀漆，如用量稍多，常致恶心、呕吐，出现此反应，也常是产生效果的标志。临床上尝遇有些卒发重症心悸不宁、气短、四肢不温、脉来疾数，往往不易计数（如心率>160次/分，心电图检查为室性或室上性阵发性心动过速），往往用中西医一般治疗措施而未能控制。曾用本方通阳镇惊安神，因无蜀漆，遂用常山，急煎服之，药液入胃，移时恶心呕吐，吐出痰涎及部分药汁，心动旋即恢复正常，心悸顿失，诸症均减。继以加减出入为方巩固，以防再发。体会到桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤能满意地控制心动过速，确有“救逆”之功。

67334 桂枝麻黄柴胡四物去杏仁加桃仁汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】桂枝汤、麻黄汤、小柴胡汤、四物汤去杏仁加桃仁。

【主治】三阴疟疾，疟在夜发。

67335 桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】茯苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤（《金匱》卷中、苓甘味姜辛夏汤（《普济方》卷一四〇）、茯苓五味甘草去桂加姜辛夏汤（《医门法律》卷五）、桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤（《千金方衍义》卷十八）、苓甘五味姜辛半夏汤（《金匱要略心典》卷中）姜苓五味细辛汤（《四圣心源》卷

五)、苓甘姜味辛夏汤(《类聚方》)、桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤(《金匱要略今释》卷四)。

【组成】茯苓四两 甘草 细辛 干姜各二两 五味子 半夏各半斤

【用法】以水八升,煮取三升,去滓,温服半斤,一日三次。

【功用】①《金匱要略释义》:去胃中之饮。②《金匱教学参考资料》:逐饮止呕。

【主治】①《金匱》:支饮者法当冒,冒者必呕。②《金匱要略方义》:肺寒留饮,咳嗽痰多,清稀色白,头昏目眩,胸满呕逆,舌苔白腻,脉沉弦滑。

【临证举例】①咳嗽 《金匱要略今释》引《续建殊录》:一男子,郁郁不乐,咳嗽短气,动摇则胸悸甚,上气微呕,不欲饮食,小便不利,盗汗出,时时抢于心下,或胸中痛,与苓甘姜味辛夏汤加人参,服药而诸证渐退,逾月全愈。②痰饮 《江西医药》(1964; 6: 266):胡某某,男,47岁,工人。咳嗽气短,倚息不得卧,吐白痰夹水,每于早晚咳甚,咳时须俟痰出而后安,伴有胸闷不适,胃脘胀满,舌白而润,脉象弦滑。病属痰饮为患,肺有宿寒,无见外感,故拟从除痰涤饮、温肺除寒入手,方用苓甘五味姜辛半夏汤:茯苓四钱,炙甘草一钱,五味子一钱,生姜三钱,细辛五分,制半夏二钱,饮片二剂。服后诸症悉减,咳平安卧,精神倍增,早晚咳痰减少,脉仍弦而滑,胃脘略不适,病仍属肺气虚寒、痰饮未尽,守原方加广皮二钱,生姜易干姜二钱。五剂后咳止痰平,其病如失,饮食大增,精神舒畅,睡眠安宁,脉息和缓而虚,舌净口和,唯食后稍有胀闷,继从香砂六君子汤加味调理中州,以善其后。

67336 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝加芍药生姜人参汤、桂枝加芍药生姜人参新加汤(《金匱玉函经》)、桂枝

新加汤、桂枝芍药人参生姜汤(《伤寒图歌活人指掌》卷四)、桂枝加人参芍药新加汤(《普济方》卷四十三)、桂枝芍药人参新加汤(《医统》卷十四)、桂枝人参芍药汤(《伤寒大白》卷一)、桂枝加芍药人参新加汤(《中国医学大辞典》)、新加汤(《伤寒论方解》)。

【组成】桂枝三两(去皮) 芍药四两 甘草二两(炙) 人参三两 大枣十二枚(擘) 生姜四两

【用法】以水一斗二升,煮取三升,去滓,温服一升。

【功用】①《伤寒贯珠集》:益不足之血,散未尽之邪。②《金鉴》:温补其营卫。

【主治】①《伤寒论》:发汗后,身疼痛,脉沉迟者。②《方机》:发汗后,疼痛甚,脉沉迟,或痹,或四肢拘挛、心下痞塞者。

【方论选录】①《尚论篇》:桂枝方中倍加芍药、生姜各一两以去邪,用人参三两以辅正。名曰新加汤者,明非桂枝汤中之归法也。②《金鉴》:汗后身疼痛,是营卫虚而不和也,故以桂枝汤调和其营卫。倍生姜者,以脉沉迟、营中寒也;倍芍药者,以营不足血少故也;加人参者,补诸虚也。桂枝得人参,大气周流,气血足而百骸理;人参得桂枝,通行内外,补营阴而益卫阳,表虚身疼未有不愈者也。③《古方选注》:桂枝汤调和营卫,一丝不乱,桂枝、生姜和卫,芍药、大枣和营。今祖桂枝人参汤法,则偏于卫矣。妙在生姜加一两,佐桂枝以大通卫气,不使人参有实邪之患;尤妙芍药亦加一两,仍是和营卫法。名曰新加者,申明新得其分两之理而加之也。④《医学摘粹》:汗泄血中温气,阳虚肝陷,经脉凝涩,风木郁遏,故用甘草补其脾精,桂枝达其肝气,芍药清风木之燥,生姜行经络之瘀,人参补中气以充经脉也。

【临证举例】①误治伤正身冷痛 《皇汉医学》引《续建殊录》:一老人,大便不通数日,上逆头眩。医与备急丸而自若,因倍加分量

而投之，得利，于是身体麻痹，上逆益甚，而大便复结。更医诊之，与以大剂承气汤，一服不得下利，服三帖，下利如倾盆，身体冷痛，不得卧，大便复结。又转医作地黄剂使服之，上逆尤剧，面色如醉，大便益不通。于是请治于先生，心下痞硬，少腹无力，即与桂枝加芍药生姜人参汤，服之三帖，冲气即降，大便通快；经过二三日，冷痛止，得卧，大便续通快。二旬之后，诸证去而复常。②妊娠恶阻 《浙江中医杂志》(1965; 8; 26): 刘某某，24岁。月经三月未行，四肢痿软无力，恶心呕吐，渴不欲饮，口淡无味，不思纳食，眩晕，嗜眠，形寒发热，脉滑而细，舌苔薄白，即予桂枝汤一剂。复诊：诸证较前有所减轻，脉滑面弱，舌质淡红，续予桂枝新加汤二剂，症状消失。于次年分娩，产后健康。③剖腹产后高热 《江苏医药·中医分册》(1979; 1: 43): 蔡某某，女，29岁。因妊娠毒血症治疗无效，行剖腹产手术，术后高热持续四天，虽用退热药，静滴葡萄糖、氯霉素等，热势不减，体温39.4℃。苔薄白，脉浮数，发热，汗出，微恶寒，口不渴。病属手术后气血两伤，卫阳不固，营阴不守，风邪乘袭。治宜调和营卫，处方：红参10克、桂枝3克、白芍10克、炙甘草3克、生姜1片、大枣3枚、白薇10克、青蒿5克。服头汁后，体温由39.4℃陡降至37.8℃，续服2剂告愈。

67337 桂枝柴胡各半汤加吴黄楝子茴香木香汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】桂枝 吴茱萸 黄芩 柴胡 人参 广木香 生姜 白芍 大枣(去核) 川楝子 小茴香 半夏 炙甘草

【主治】燥金司令，头痛，身寒热，胸胁痛，甚则疝瘕痛者。

【方论选录】此金胜克木也，木病与金病并见，表里齐病。故以柴胡达少阳之气，即所以达肝木之气，合桂枝而外出太阳，加芳香

定痛，苦温通降也。湿燥寒同为阴邪，故仍从足经例。

桔

67338 桔干汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】荆芥 防风 连翘 桔梗 牛蒡射干 玄参 山豆根 竹叶 甘草

【主治】痰热客肺，喘急上气，致失音者。

67339 桔连汤

【方源】《回生集》卷上。

【组成】苦桔梗 川黄连(倍加) 枳实(炒) 前胡 连翘(去心) 陈皮 防风 制半夏 柴胡 南星 白附子 牛蒡子(炒，研) 玄参 赤芍 莪术(煨) 甘草各等分

【用法】水煎服。用绵裹箸头，蘸食盐点肉上，一日五六次，自消，再服本方。

【主治】喉中忽生肉如桃如云，层层面起。

67340 桔枳汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】桔梗 枳壳 陈皮 厚朴 木香

【主治】暴吐。

【加减】或加大黄利之。

67341 桔梗丸

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】桔梗四分 枳实四分(炙) 鳖甲四分(炙) 人参四分 当归四分 桂心三分 白术四分 吴茱萸三分 大麦蘖六分 干姜四分 甘草五分(炙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，酒送下，一日二次。稍加至二十丸。

【主治】①《外台》引《延年秘录》：冷痰癖气，发即痰气急引膀胱痛，气满不消食。②《圣济总录》：息积。胁下气逆妨闷，岁久不已。

【宜忌】①《外台》引《延年秘录》：禁生葱、猪肉、苋菜。②《普济方》：忌蒜、海藻、

菰菜、桃、李、雀肉。

67342 桔梗丸

【方源】《千金》卷十七。

【异名】藜芦丸（《普济方》卷二三八）。

【组成】桔梗 藜芦 皂荚 巴豆 附子 各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。宿不食，旦起饮服二丸，仰卧服。勿眠，至食时膈上吐，膈下下，下去恶物如蝌蚪、虾蟆子，或长一二尺，下后当大虚口干，可作鸡羹饮五合，大极饮一升，食粥三四日，病未尽更服。忌如药法。

【主治】诸症病。毒症、鬼症、食症、冷症；痰饮宿食不消，酒癖。

【方论选录】《千金方衍义》：桔梗、皂荚、藜芦涌吐，巴豆攻下，附子以奋诸药之力也。

67343 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】桔梗一两（去芦头） 白术一两 槟榔一两 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心二分 干姜半两（炮裂，锉） 人参一两（去芦头） 前胡二分（去芦头） 麦蘖三分（炒微黄） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、大枣汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和，胸膈腹胁胀满，不能饮食。

67344 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桔梗一两（去芦头） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 白术三分 桂心三分 人参一两（去芦头） 槟榔半两 甘草半两（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤洗，去白瓤，焙） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 干姜半两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜、大枣汤送下。

【主治】①《圣惠》：伤寒后脾胃气不和，心腹满闷，四肢乏力，吃食减少。②《圣济总录》：虚冷气满腹胀，不能饮食，虽食不消，呕逆虚满，腹内雷鸣，下气。

67345 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桔梗一两（去芦头） 白术一两半 桂心一两 吴茱萸一两半（汤浸七遍，焙干微炒） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 人参一两半（去芦头） 干姜一两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦蘖一两半（炒微黄） 神曲一两半（炒微黄） 肉豆蔻三分（去壳）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以暖酒送下。以愈为度。

【主治】虚劳，脾胃虚冷，气满不思食。

67346 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】桔梗一两（去芦头） 胡椒三分 荜茇三分 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 人参三分（去芦头） 干姜半两（炮裂，制） 桂心三分 细辛三分 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 附子三分（炮裂，去皮脐） 前胡三分（去芦头） 甜葶苈三分（隔纸炒令紫色） 白术三分 防葵三分 槟榔一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，一日三次。

【主治】逆气胸中痞满，不能喘息，脏腑虚寒，心腹坚痞，痰饮留滞，宿食不消。

67347 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】桔梗一两(去芦头) 藜芦一两(去芦头, 微炙) 桂心一两 甜葶苈一两(微炙令香) 附子一两(炮裂, 去皮脐) 当归一两(锉, 微炒) 鳖甲一两(涂醋炙微黄, 去裙襴) 川大黄一两(锉碎, 微炒) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 杏仁五十枚(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 食前以温酒送下。

【主治】心腹牢强寒疝, 邪气往来, 坚固积聚, 苦寒烦闷, 不得眠卧, 夜苦汗出, 大便坚, 小便不利, 食不生肌。

67348 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桔梗一两(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓢) 人参一两(去芦头) 鳖甲一两(涂醋炙令黄, 去裙襴) 吴茱萸三分(汤浸七遍, 焙干微炒) 当归一两(锉, 微炒) 桂心三分 白术一两 大麦蘖一两半(炒微黄) 干姜一两(炮裂, 锉) 青橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 川大黄二两(锉碎, 微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以温酒送下, 一日三四次。

【主治】寒癖气。发即胁下痛引膀胱, 里急, 气满不下食。

67349 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】桔梗三分(去芦头) 京三棱一两(微煨, 锉) 紫菀三分(去苗土) 干姜半两(炮裂, 锉) 芫花三分(醋拌, 炒令干) 桂心半两 川大黄半两(锉碎, 微炒) 当归半两(锉碎, 微炒) 巴豆十枚(去皮心, 研, 纸裹压去油) 桃仁半两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为末, 研入巴豆令匀, 酒煮面糊为丸, 如绿豆大。每服三丸, 空心以生姜汤送下。

【主治】痰冷结聚成癖, 两胁胀满。

67350 桔梗丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】桔梗一两(去芦头) 神曲一分(微炒) 麦蘖半两(微炒) 乌梅肉半两(微炒) 黄连一两(去须, 微炒) 厚朴半两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 白术半两 人参半两(去芦头) 赤石脂半两 黄芩半两 甘草半两(炙微赤, 锉) 龙骨半两 桂心半两 黄雌鸡骨一具(净洗, 去肉, 酒浸一宿, 炙令黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服五丸, 以粥饮送下, 一日三四次。

【主治】小儿久痢不断, 肌体羸瘦, 食不消化。

67351 桔梗丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】桔梗 细辛 菖蒲 紫菀各三分 肉桂 陈橘皮(去瓢) 各一两 百合 杏仁(去皮, 炒令黄) 人参各半两 甘草一分(炙)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。每服一丸, 绵裹, 咽津含化。

【主治】肺脏伤风冷, 喘促咳嗽, 言语声嘶, 咽喉不利。

67352 桔梗丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】桔梗(炒)二两 防风(去叉) 禹余粮(醋淬, 研) 远志(去心) 葶藶 鹿茸(去毛, 酥炙) 橘皮(汤浸, 去白, 焙) 芫花 紫石英(研) 桂(去粗皮) 干姜(炮) 各一两 吴茱萸(汤洗, 焙干, 炒) 甘草(炙, 锉) 各三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每日二十丸, 空心米饮送下。

【主治】脾胃冷气, 腹内雷鸣, 冷气入腹中, 脘痞闷, 胁肋胀满, 饮食不下。

67353 桔梗丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】桔梗(锉,炒)半两 葶苈子(纸上熬)一两一分 藜芦(去芦头,炙)半两 杏仁(去皮尖双仁,炒)五十枚 厚朴(去粗皮,生姜汁涂炙,锉)一两一分 附子(炮裂,去皮脐)一两一分 桂(去粗皮) 人参 沙参各三分 特生礞石一两(烧半日许)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸或七丸,米饮或温酒送下,一日三次。

【主治】寒疝。邪气往来,坚固积聚不散,多寒不得卧,苦汗出,大小便不利。

67354 桔梗丸

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】桔梗一两 诃黎勒(煨,去核) 木香各半两 白术 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各二两 细辛(去苗叶)半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温米饮送下。

【主治】妊娠心腹疼痛,不思进饮食。

67355 桔梗丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】桔梗一斤 牵牛(头末)三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四五十丸加至百丸,食前温水送下,一日二次。

【主治】太阳经卫虚,血贯瞳仁,脸肿,头中湿淫肤脉,睛痛,肝风盛,眼黑肾虚。

67356 桔梗丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】桔梗(微炒) 半夏(汤泡七次) 枳实(去瓢,麸炒)各一两 陈皮二两(去白)

【用法】上为细末,水为丸,如梧桐子大。每服五十丸,姜汤送下。

【功用】除痰下气。

【主治】胸胁胀满,寒热呕哕,心下坚痞,短气烦闷,饮食不下。

67357 桔梗汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】甘草桔梗汤(《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》)、如圣汤(《幼幼新书》卷三十四引《养生必用》)、散毒汤(《圣济总录》卷一二二)、国老汤(《普济方》卷二十七引《十便良方》)、甘草汤(《医级》卷八)、桔梗甘草汤(《经方实验录》卷下)。

【组成】桔梗一两 甘草二两

【用法】以水三升,煮取一升,去滓,温分再服。

【功用】宣肺祛痰,利咽宽胸,解毒排脓。

①《兰室秘藏》:快咽喉,宽利胸膈。②《医方类聚》引《吴氏集验方》:解野葛毒。③《金鉴》:解肺毒,排脓肿。④《中医方剂临床手册》:宣肺祛痰,利咽。

【主治】风热客于少阴,咽喉肿痛;风热郁于肺经,致患肺痈,咳唾脓血。

①《伤寒论》:少阴病二三日,咽痛不瘥者。②《幼幼新书》引《养生必用》:喉痹舌颊肿,咽喉有疮。③《局方》:风热毒气上攻咽喉,肿塞妨闷。④《证类本草》引《杜壬方》:口舌生疮,嗽有脓血。⑤《圣济总录》:肺气上喘。⑥《兰室秘藏》:小儿斑已出。⑦《医方类聚》引《吴氏集验方》:野葛毒。⑧《内台方议》:肺痿。⑨《外科发挥》:肺气壅热,胸膈不利,痰涎壅盛。⑩《内科摘要》:心脏发咳,咳而喉中如梗状。⑪《医统》:痘疹咽喉疼痛生疮。⑫《金鉴》:咳而胸满,振寒脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥之肺痈;及血痹。

【方论选录】①《内台方议》:用桔梗为君,桔梗能浮而治上焦,利肺痿,为众药之舟楫也;以甘草为臣佐,合而治之,其气自下也。②《伤寒大白》:以桔梗开发肺气,同甘草泻出肺中伏火。因此,悟得欲清肺中邪结,必要开肺清肺,二味同用,则肺中之邪始出。③《金鉴》:肺痈今已溃后,虚邪也,故以桔梗之苦,甘草之甘,解肺毒排痈脓也,此治已

成肺痈，轻而不死者之法也。

【临证举例】肺痈 《内科摘要》：武选汪用之，饮食起居失宜，咳嗽吐痰，用化痰发散之药。时仲夏，脉洪数而无力，胸满面赤，吐痰腥臭，汗出不止，余曰：水泛为痰之证，而用前剂，是谓重亡津液，得非肺痈乎？不信，仍服前药。翌日，果吐脓，脉数，左三右寸为甚。始信，用桔梗汤一剂，脓数顿止，再剂全止，面色顿白，仍于忧惶，余曰：此症面白脉涩，不治自愈。又用前药一剂，佐以六味丸治之而愈。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“二味桔梗汤”。

67358 桔梗汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】桔梗四两 白术五两 干姜三两 茯苓三两 仓米一升

【用法】上切。以水八升，煮仓米熟，去米，将汁煮药，取二升，绞去滓，分服。

【主治】霍乱食不消，肠鸣腹痛，热不止。

【宜忌】①《外台》引《删繁方》：忌桃、李、雀肉、猪肉、大酢。②《普济方》：忌犬肉。

67359 桔梗汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【异名】桔梗白术汤（《圣济总录》卷五十）。

【组成】桔梗三升 白术二两 当归一两 地黄二两 甘草（炙） 败酱 薏苡仁各二两 桑白皮一升（切）

【用法】上切。以水一斗五升，煮大豆四升，取七升汁，去豆，纳清酒三升，合诸药煮之，取三升，去滓，服六合，日三次，夜二次。

【功用】《重订通俗伤寒论》：肺脾双补，清肃余毒。

【主治】①《外台》引《古今录验》：肺痈经时不愈。②《重订通俗伤寒论》：赤膈伤寒，毒蕴于肺成痈，经治诸证皆安，唯痰中血丝终不能除，胸中尚隐隐痛，大便已转嫩黄，时溏时燥。

【宜忌】忌猪肉、茺荑、桃、李、雀肉、海藻、菰菜。

67360 桔梗汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一二三。

【组成】桔梗二两

【用法】以水三升，煮取一升，顿服之。

【主治】①《千金》：喉痹及毒气。②《圣济总录》：喉痹肿盛，语声不出。

67361 桔梗汤

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《圣济总录》卷一八四。

【组成】枳实二两（麸炒微黄） 白术二两 梔子仁一两 桔梗一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：乳石发动，心膈痞满，腹内妨痛，不思饮食。②《普济方》：心腹痛，冷热相搏。

67362 桔梗汤

【方源】《普济方》卷一一九引《指南方》。

【组成】桔梗二两 人参 麦门冬 甘草各半两 小麦一两

【用法】上咬咀。水三升，煎至一升，去滓，分三服，不拘时候。

【主治】①《普济方》引《指南方》：四肢发热。②《全生指迷方》：肺不调，邪热熏上焦，自胸以上至头发热，口鼻气色时如烟熏，目涩咽燥，唾如凝脂，时咳，毛疏，大便不利，小便赤，其脉疾大。

67363 桔梗汤

【方源】《局方》卷四。

【异名】桔梗半夏汤（《类证活人书》卷十八）、半夏汤（《瑞竹堂方·补遗》）、枳梗半夏汤（《得效》卷二）。

【组成】桔梗（细锉，微炒） 半夏（汤洗七次，姜汁制） 陈皮各十两（去瓢） 枳

实(麸炒赤黄)五两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一中盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】①《局方》：除痰下气。②《类证活人书》：顺阴阳，消痞满。

【主治】①《局方》：胸胁胀满，寒热呕啰，心下坚痞，短气烦闷，痰逆恶心，饮食不下。②《类证活人书》：伤寒冷热不和，心腹痞满，时发疼痛。

67364 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】桔梗(炒)一两 紫菀(去苗土)一两半 桑根白皮(锉) 赤茯苓(去黑皮) 贝母(去心，焙) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 人参各一两 甘草(炙，锉)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣三枚(擘破)，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后咳嗽。

67365 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】桔梗(锉，炒)一两 甘草(炙)半两 知母(焙)半两 柴胡(去苗)一两半 大黄(锉，炒)半两 鳖甲(去裙襴，醋炙)二两

【用法】上锉，如麻豆大，分为六帖。每帖用童子小便二盏，加葱白三茎，豉半合，浸食顷，煎取一盏，去滓，食后分温二服，日一帖。

【主治】寒热似疟。

67366 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】桔梗(锉，炒)一两 甘草(炙)附子(炮裂，去皮脐)各二两 干姜(炮)一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】霍乱。吐利已定，汗出厥冷，四肢拘急，腹中痛不解，脉欲绝。

67367 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】桔梗(炒)五两 白术三两 赤茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 细辛(去苗叶)各二两 当归(切，焙) 吴茱萸(汤浸，焙干，炒) 干地黄(焙) 甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，早、晚食前温服。

【主治】邪热客于肝经，气逆烦躁，面青多怒，怒已胁痛。

67368 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】桔梗(炒) 大黄(锉，炒) 麻黄(去根节) 枳壳(去瓢，麸炒) 大腹皮(锉) 柴胡(去苗) 杏仁(去皮尖双仁，炒) 羌活(去芦头) 木香各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜一枣大(拍碎)，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】肺实上气，面目浮肿，大便秘。

67369 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】桔梗(去芦头，炒) 人参 赤茯苓(去黑皮) 白术 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)各一两 木香半两 枇杷叶(拭去毛，炙)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心掣胸中不利，时咳泄利。

67370 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】桔梗(去芦头，锉，炒) 丹参(切) 白术 枳壳(去瓢，麸炒) 芍药 槟榔(锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】腹胀雷鸣，胸背痛。

67371 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】桔梗(锉，炒)二两 防葵半两 大黄(锉，炒)一两半 桃仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒)四十九枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，加芒消末半钱匕，空腹温服，如人行五六里再服，一日三次。

【主治】臌胀。

67372 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】桔梗(锉，炒) 百合 赤茯苓(去黑皮) 桑根白皮 枳壳(去瓢，麸炒)各一两半 槟榔五枚 木通二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食前温服，良久再服。

【主治】酒疸。腹满如水状，心中懊恼不能下食，时时欲吐。

67373 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】桔梗(锉，炒)三分 半夏(汤洗七遍去滑，姜汁炒)一两一分 白术三分 甘草(炙，锉)一分 桂(去粗皮) 芍药各半两 玄参一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，加生姜半分(拍碎)，煎至七分，去滓，下饴糖一分，空腹温服，夜卧再煎服。

【主治】虚劳，惊恐不安，夜不得眠。

67374 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【异名】退热桔梗饮子(《秘传眼科龙木论》卷四)。

【组成】桔梗(锉，炒) 大黄(锉，炒) 玄参 芍药 防风(去杈) 黄芩(去黑

心)各一两 茺蔚子二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，加芒消末半钱匕，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：眼睛突起。②《秘传眼科龙木论》：五脏毒风之突起睛高外障。

67375 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】桔梗(去芦头) 大黄(锉，炒) 细辛(去苗叶) 黄芩(去黑心) 玄参 芒消(炼过者)各一两 防风(去杈) 车前子各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，食后、临卧温服。

【主治】目生鸡冠蚬肉。

67376 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】桔梗(锉，炒) 甘草(生) 恶实(微炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加竹叶十片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉内生疮疼痛；咽喉干痛，吐咽不利。

【备考】原书卷一二四本方用法：入竹茹一弹丸大。

67377 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】桔梗(炒)二两 半夏(汤洗七遍，切，焙)一两 人参 甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一大盞，加生姜五片，同煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：咽喉中如有物妨碍。②《御药院方》：咽喉疼痛。

67378 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】桔梗(炒) 半夏(汤洗去滑十遍,焙)各等分

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水二盏,加生姜七片,同煎至七分,去滓温服。

【主治】风热搏于咽喉,如有物妨碍。

67379 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】桔梗(锉,炒) 半夏(汤洗七遍,去滑) 白茯苓(去黑皮) 细辛(去苗叶) 芎藭 人参 甘草(炙,锉)各二两 芍药一两 熟干地黄(微炒)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜五片,同煎至六分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】妊娠阻病。心中愤闷,虚烦吐逆,恶闻食气,头眩体重,四肢疼痛,烦热,多卧少起,恶寒汗出,羸瘦。

67380 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】桔梗一两(炒) 茯神(去木)一两 人参半两 当归(炙,锉)半两 钩藤皮一分 桂(去粗皮)半两 独活(去芦头)半两 芍药(锉,炒)半两 生干地黄(焙)一两 桑上寄生(微炒,锉)半两 石膏一两 甘草(炙黄)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,空心温服,一日三次。

【主治】妊娠惊胎。劳伤,心腹急痛,卒下血,胎动不安。

67381 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】桔梗(炒) 当归(切,炒) 刘寄奴(去根,锉碎)各一两半 桂(去粗皮) 延胡索 陈橘皮(汤浸,去白,炒)各一两 芍药 白茯苓(去黑皮)各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后血气攻冲,心腹冷痛,烦满不食。

67382 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】桔梗一两(炒) 漏芦(去芦头) 钟乳粉各半两 蛭蟪三分(炙干)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后乳汁不下。

67383 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】桔梗(锉,炒)半两 黄柏(去粗皮,炙,锉) 大黄(锉,炒)各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕,以水一小盏,加生地黄长二寸(拍破),同煎至四分,去滓,分温二服,早晨、日晚各一次。

【主治】小儿脑疳。头发作穗,头皮光急,或有疮,或时腮颌肿,眼目不明,积渐羸弱。

67384 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】桔梗(炒) 紫菀(去苗土)各三分 麦门冬(去心,焙)一两三分 甘草(炙,锉)一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水七分,煎至四分,去滓温服。

【主治】小儿月内及百晬暴嗽,吐乳呕逆,不得息。

67385 桔梗汤

【方源】《幼幼新书》卷十六引张涣方。

【组成】桔梗(去芦头) 半夏(汤洗七遍,焙干) 紫苏叶(微炒) 石膏 甘草(炙)各半两 皂荚(烧炭存性)一分

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,加生姜三片,煎至五分,去滓,放温时时与服。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方:小儿咳嗽呀呷,咽膈不利。②《卫生总微》:痰壅。

【备考】《医方类聚》引《医林方》有人参。

67386 桔梗汤

【方源】《普济方》卷四十三引《卫生家宝方》。

【组成】前胡(去芦) 赤茯苓 人参(去芦) 枳壳(炒,去瓢) 甘草(炙)各一

两 半夏(切作片子,姜汁浸二宿,焙) 桔梗(去芦) 陈橘皮(去白)各半两

【用法】上为粗末。每服二钱,水一大盏,加生姜五片,煎至六分,去滓带热服,一日二三次,不拘时候。

【主治】中上焦不和,气道隘塞,水饮不利。

67387 桔梗汤

【方源】《普济方》卷二八六引《卫生家宝》。

【组成】桔梗 甘草 薏苡仁各二两

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓服。

【主治】肺痈初萌。

67388 桔梗汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】桔梗一两半 半夏曲二两 陈皮一两(去白) 枳实一两(麸炒) 白茯苓一两(去皮) 白术一两半 厚朴一两(姜制,炒香)

【用法】上咬咀。每服一两,水一盏,煎至七分,取清,温调木香散二钱,隔夜空腹食前服之。三服之后,气渐下吐渐止。

【功用】和中。

【主治】①《保命集》:上焦气热上冲,食已暴吐,脉浮而数。②《云岐子脉诀》:涩脉关前胃气并。

【备考】《嵩崖尊生》有木香。本方方名,《玉机微义》引作“和中桔梗汤”。

67389 桔梗汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归身 马勃各一分 白僵蚕 黄芩各三分 麻黄五分(不去节) 桔梗 甘草各一钱 桂枝少许

【用法】上为粗末,作一服。水二大盏,煎至一盏,去滓,食后稍热服之。

【主治】咽肿微觉痛,声破。

67390 桔梗汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】桔梗 桑白皮各一两 甘草 贝母 河藜勒各五分

【用法】上为细末。每服五钱,水二盏,加五味子、乌梅肉各一钱同煎服。

【主治】伤寒汗下后,喘嗽烦躁,气滞涩,邪气逆者。

67391 桔梗汤

《此事难知》。为《保命集》卷中“桔梗散”之异名。见该条。

67392 桔梗汤

《仙传外科集验方》。为原书“肺痈黄耆散”之异名。见该条。

67393 桔梗汤

《普济方》卷十七。为《外台》卷七引《广济方》“桔梗散”之异名。见该条。

67394 桔梗汤

【方源】《普济方》卷二十七。

【组成】桔梗(炒,锉) 旋覆花 好贝母(去心) 防风(去杈) 陈橘皮(汤浸,去白,炒) 麦门冬(去心,焙) 枳壳(去瓢,麸炒)各半两 桑根白皮(锉) 人参 前胡(去芦头) 鳖甲 白茯苓(去黑皮) 葶藶子(锉,去角) 甘草(炙,锉) 黄耆(锉)各一分 天门冬(去心,焙)一两半

【用法】上为末。每服三钱,沸汤调下,不拘时候。

【主治】肺劳咳嗽,唾痰涎,上气喘急,时发寒热,疼痛;亦治肠风下血,诸气羸弱。

67395 桔梗汤

【方源】《医学正传》卷六引《录验》。

【组成】桔梗 贝母各一钱 当归 瓜蒌子各八分 枳壳(炒)五分 薏苡仁八分 桑白皮五分 防己五分 甘草节三分 黄耆五分 杏仁(去皮,炒,另研) 百合各三分

【用法】上细切,作一服。水一盏半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【功用】《增订治疗汇要》:清热散肿。

【主治】肺痈。心胸气壅,咳嗽脓血,神烦闷,咽干多渴,两脚肿满,小便赤黄,大便多涩。

【加减】若大便秘者,加大黄;小便涩者,加木通。

【备考】《增订治疗汇要》有玄参、防风。

67396 桔梗汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】宁肺桔梗汤（《外科正宗》卷二）、十六味桔梗汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】桔梗（炒） 贝母（去心） 当归（酒浸） 瓜蒌仁 枳壳（麸炒） 薏苡仁 桑白皮（炒） 甘草节 防己（去皮）各一钱 黄耆（盐水拌炒） 五味子（捣，炒） 百合（蒸）各一钱五分 葶苈（炒） 地骨皮 知母（炒） 杏仁各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】肺痈咳嗽，胸膈两肋作痛，咽干口燥，烦闷作渴，时出臭浊。

67397 桔梗汤

【方源】《医宗己任编》卷三。

【组成】桔梗 前胡 红花 荆芥 蝉蜕 僵蚕 大力 灯心 通草

【主治】痘疮五六日已过，痘脚已齐，浆势欲行。

67398 桔梗汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】牛蒡 玄参 升麻 桔梗 犀角 黄芩 木通 甘草

【功用】《医略六书》：疏热开结。

【主治】①《证治汇补》：咽喉诸病。②《杂病证治》：风火结痰，喉痹疼痛，咽物妨碍。

【方论选录】《医略六书》：风火结痰，其喉为痹，故咽物妨碍，咽喉肿痛焉。牛蒡子疏风解热，乃喉痹要药；乌犀角清胃凉心，能善解热毒；桔梗清利咽喉之痛；玄参清降上浮之火；荆芥散热退肿；黄芩清肺凉膈；小木通降心火以热从溺泄；生甘草泻火毒能和药缓中。煎令微温，俾火化风消，则结痰自开而咽喉肃清，喉痹无不退矣。此疏热开结之剂，为喉痹疼痛之专方。

【备考】《医略六书》有荆芥穗，无升麻。

67399 桔梗汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】天冬六分 桔梗一钱半 紫苏八分 知母四分 甘草四分 杏仁十粒 陈皮四分 黄芩八分 贝母八分

【主治】妇人风寒咳嗽。

67400 桔梗汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】桔梗三钱 甘草一钱 抚芎 香附 炒梔 前胡 贝母各一钱

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿郁火，干咳无痰。

67401 桔梗汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】桔梗 半夏 陈皮 枳实

【主治】痰结饱闷眩晕者。

【加减】若恶寒发热，加羌活、防风；里有积热，加梔、连；阳明见症，加白芷、天麻；少阳见症，加柴胡、川芎。

67402 桔梗汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】紫苏叶 桔梗 麻黄 桑白皮 杏仁 赤茯苓 天冬 百合 川贝母 前胡

【主治】风寒子嗽。

67403 桔梗汤

【方源】《一盘珠》卷七。

【组成】桔梗 甘草各三钱 葱三根 豆豉一撮

【用法】水煎，缓缓服。

【主治】产后外感风寒，咳嗽。

67404 桔梗汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】桔梗 香附 山梔 黄芩 前胡 贝母 知母

【主治】火郁于肺，咳嗽。

67405 桔梗汤

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】桔梗三钱 红花 苏木 芒消各五钱 猪苓 泽泻各三钱 大黄一两 归尾五钱 桃仁四钱

【用法】加生姜三片，童便、酒各半，煎服。

【主治】跌扑损伤，大小便不通。

67406 桔梗汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】桔梗 白及 橘红 炒甜葶苈各八分 甘草 贝母各一钱五分 苡仁 金银花各五钱

【主治】肺癰。

67407 桔梗汤

【方源】《焦氏喉科枕秘》。

【组成】桔梗 瓜蒌仁 百合 防风 当归 枳壳 黄耆 贝母 玄参 白鲜皮 薏苡仁各八分 杏仁 甘草各五分 黄芩八分

【用法】水煎服。

【主治】肺癰，咳嗽吐脓血。

67408 桔梗汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川贝 桑皮 瓜蒌 玄参 当归 桔梗 竹叶 甘草 枳壳 杏仁 百合

【主治】上焦风壅热毒，喉痹热肿。

67409 桔梗汤

【方源】《治痢捷要新书》。

【组成】黄芩 连翘 栀子 薄荷 桔梗 竹叶 甘草 大黄各等分

【用法】加灯心，水煎服。

【功用】表里两解。

【主治】感冒时疫挟热者。

67410 桔梗饮

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】桔梗（锉，炒）一两 桑根白皮（锉） 贝母（去心） 白茯苓（去黑皮） 大青 五味子 吴蓝 人参各三分 甘草（炙，锉）一两半

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水八分，煎至四分，去滓，食后温服。

【主治】小儿上气咳嗽，不得安卧。

67411 桔梗饮

《中国医学大辞典》。即《妇人良方》卷五“桔梗饮子”。见该条。

67412 桔梗散

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【异名】桔梗汤（《普济方》卷十七）。

【组成】桔梗 当归 芍药 茯苓 橘皮 厚朴（炙） 白术各八分 葶苈四分 豆蔻子四分 槟榔六分 桂心六分 诃黎勒皮六分（炙）

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹煮姜、枣饮下，一日二次。加至一匕半，不利。

【主治】冷气心痛，肋下鸣转，喉中妨食不消，常生食气，每食心头住不下。

【宜忌】忌生葱、猪肉、酢物、桃、李、雀肉等。

67413 桔梗散

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】桔梗 茯苓各八分 枳实（炙） 人参 厚朴（炙） 芍药 橘皮各六分 桂心五分 槟榔八分 麦门冬（去心）八分

【用法】上为散。每服方寸匕，空肚煮姜、枣饮下。一日三次，渐加至一匕半，热以茶饮下，不利。

【主治】心腹中气时时痛，食冷物则不安稳，及恶水。

【宜忌】忌猪肉、酢物、生葱，生冷、油腻、小豆、粘食、热面、炙肉。

67414 桔梗散

【方源】方出《证类本草》卷十引《外台》，名见《普济方》卷二五四。

【组成】烧桔梗二两（末） 麝香大豆许

【用法】米饮服桔梗末，仍吞麝香佳。

【主治】卒客忤，停尸不能言。

67415 桔梗散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】桔梗一两（去芦头） 白术一两 丹参一两（去芦头） 白豆蔻三分（去皮） 附子三分（炮裂，去皮脐） 高良姜三分（锉） 木香三分 沉香三分 槟榔三分 诃黎勒一两半（用皮） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，微焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】脾脏久积冷气流走，腹内虚鸣，两胁胀满，少思饮食。

67416 桔梗散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】桔梗一两（去芦头） 桑根白皮三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 诃梨勒皮三分 花桑叶半两 贝母半两（煨令微黄）

【用法】上为细散。每服一钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】肺气喘急咳嗽。

67417 桔梗散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】桔梗三分（去芦头） 甘草一两（炙微赤，锉） 赤茯苓二两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺痿咳嗽，胸中满而振寒，脉数，咽干或渴，时时出唾，又吐脓如米粥者。

67418 桔梗散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】桔梗一两（去芦头） 细辛半两 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 麻黄半两（去根节） 白术半两 防风半两（去芦头） 桂心一两 干姜半两（炮裂，锉） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。衣盖出汗，如未汗出，即再服之。

【主治】伤寒一日，壮热，头痛，恶寒。

67419 桔梗散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】桔梗三两（去芦头） 甘草二两（生用） 苦参半两（锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒三二日，咽喉痛。

67420 桔梗散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桔梗一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 赤茯苓一两 槟榔半两 桑根白

皮一两（锉） 木香半两 赤芍药三分 白术三分 鳖甲一两（涂酥炙令黄，去裙襕）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒结胸，不下饮食，四肢烦劳。

67421 桔梗散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】桔梗三分（去芦头） 前胡一两（去芦头） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 旋覆花半两 大腹皮半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓半两 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气心腹痞满，气喘，痰涎不绝。

67422 桔梗散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】桔梗一两（去芦头） 知母一两 柴胡一两（去苗） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 人参一两（去芦头） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒） 赤茯苓一两 白前一两 槟榔半两 半夏一两（汤浸七遍，去滑） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】肺劳。痰唾稠粘，日晚即寒热，面色赤，肋肋妨满。

67423 桔梗散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桔梗一两（去芦头） 柴胡一两（去苗） 赤芍药三分 赤茯苓三分 旋覆花半两 五味子三分 人参一两（去芦头） 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襕） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术三分 槟榔三分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，

加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳痰饮，胸胁气不利。

【宜忌】忌苋菜。

67424 桔梗散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】桔梗三分（去芦头） 黄耆一两（锉） 桑根白皮一两（锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 甘草三分（炙微赤，锉） 桂心三分 前胡三分（去芦头） 五味子三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。上焦气滞，喘促，唾稠如胶，心神烦热。

67425 桔梗散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】桔梗一两（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 人参二两（去芦头） 赤茯苓一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 木香一两 前胡一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。心腹痞满，不思饮食，胸膈不利。

67426 桔梗散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】桔梗三分（去芦头） 当归三分 苍术三分（微炒） 诃黎勒三分（煨，用皮） 芎藭三分 柴胡三两（去苗） 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襴） 川大黄一两（锉碎，微炒） 赤芍药一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】骨蒸痲癖，胁下妨痛，渐加羸劣，

不欲饮食。

【宜忌】忌苋菜。

67427 桔梗散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】桔梗一两（去芦头） 犀角屑一两 羚羊角屑一两 赤芍药一两 川升麻二两 梔子仁一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉肿痛，结毒气冲其心胸。

67428 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】桔梗半两（去芦头） 射干一两 麦门冬一两（去心） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麻黄一两（去根节） 赤茯苓三分 前胡二分（去芦头） 木通三分（锉） 大腹皮三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺实热，上气胸满烦闷，呼吸气促，咽喉不利。

67429 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桔梗（去芦头） 赤茯苓 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 人参（去芦头） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 木香 赤芍药 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 桂心 槟榔各二两

【用法】上为细散。每服一钱，以生姜、大枣汤调下，不拘时候。

【主治】心腹痛胀满，喘促，不欲饮食，四肢少力，心神虚烦。

67430 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桔梗一两半（去芦头） 鬼箭羽

槟榔 木香 川大黄(锉碎,微炒) 赤芍药各一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】急胸胁虚气所致,胀闷疼痛。

67431 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桔梗一两(去芦头) 食茱萸一两 细辛三分 厚朴三分(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 丹参一两 草豆蔻三分(去皮)

【用法】上为散。每服一钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】腹胀肠鸣切痛。

67432 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】桔梗一两(去芦头) 紫菀一两(去苗土) 桑根白皮一两(锉) 木通一两(锉) 旋覆花半两 槟榔一两 款冬花三分

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺气咳嗽,痰唾稠粘。

67433 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】桔梗一两(去芦头) 白术一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 干姜半两(炮裂,锉) 白茯苓三分 枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄) 高良姜半两(锉) 甘草二分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加仓粳米五十粒,枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】霍乱。食不消化,呕吐不止。

67434 桔梗散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】桔梗(去芦头) 桑根白皮(锉) 贝母(煨微黄) 紫苏茎叶 人参(去芦头) 甘草(炙微赤,锉) 各半两 天门冬

一两(去心) 赤茯苓一两 麻黄二分(去根节)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:妊娠肺壅咳嗽,喘急不食。②《妇人良方》:妇人风寒咳嗽。

【宜忌】《医方类聚》引《胎产方》:忌食鲤鱼。

【备考】《广嗣纪要》有杏仁,无贝母。

67435 桔梗散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桔梗半两(去芦头) 当归半两(锉,微炒) 芎藭半两 大腹皮三分 桂心半两 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 赤芍药半两 赤茯苓半两 延胡索半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一钟,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】产后两胁肋胀满,小腹疼痛,不思饮食。

67436 桔梗散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】桔梗一分(去芦头) 紫菀半两(去苗土) 麦门冬半两(去心,焙) 甘草半两(炙微赤,锉) 人参一分(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,量儿大小,以意分减服之。

【主治】小儿卒得咳嗽,吐乳。

67437 桔梗散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】桔梗半两(去芦头) 人参半两(去芦头) 附子一分(炮裂,去皮脐) 葛根半两(锉) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一小盏,加生姜少许,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤寒,头热足冷,囟门张,多

躁啼不睡，小便赤少，四肢热者。

67438 桔梗散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】桔梗煮散（《圣济总录》卷一六八）。

【组成】桔梗 细辛 人参 白术 瓜蒌根 甘草 白茯苓 川芎各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜一片，薄荷二叶，同煎至七分，二岁以下儿作四五服，五岁以上分二服。

【主治】小儿风热，及伤寒时气，疮疹发热等。

67439 桔梗散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】半夏三分（浆水煮四五沸，切，焙干） 桔梗 桑白皮（炙） 天南星（洗过）各一两

【用法】上为末。每服二钱，水二盞，加生姜半分，细切，同煎至半盞，去姜和滓，细呷服，一日三次；久虚痰嗽，劳疾，食后临卧服。

【主治】脾肺寒热，劳痰嗽，不下食，及痰盛呕啰咳嗽者。

67440 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】桔梗（炒）一两 桂（去粗皮） 槟榔（锉） 白术各三分 人参二两 青橘皮（去白，麸炒，锉） 大黄（炒，锉） 木香各三分

【用法】上为细散。每服三钱匕，以冷生姜汤调下。

【主治】霍乱。不吐不利，壅闷腹胀或疔痛。

67441 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】桔梗（炒）三分 当归（切，焙）一两 芍药（锉，炒） 雷丸各三分 陈橘皮（去白，焙）一两 人参三分 贯众半两 槟榔（锉）一两半

【用法】上为细散。每服二钱匕，空心煎姜

汤调下，日晚再服。渐加至三钱匕。

【主治】蛔心痛。

67442 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】桔梗（去芦头，锉，炒） 犀角（镑）各等分

【用法】上为散。每服一钱匕，酒下，一日三次。不能自服者即灌之。药下心中当烦，须臾自静，七日乃止，可食猪脾以补养之。

【主治】蛊痢。下血如鸡肝，疼痛。

67443 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】桔梗（锉，炒） 旋覆花 贝母（去心） 防风（去杈） 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 麦门冬（去心，焙） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两 桑根白皮（锉） 人参 前胡（去芦头） 鳖甲（去裙襖，醋炙） 白茯苓（去黑皮） 煨藜子（炒去角） 甘草（炙，锉） 黄耆（锉）各一分 天门冬（去心，焙）一两半

【用法】上为散。每服三钱匕，沸汤点下，不拘时候。

【主治】肺劳咳嗽，痰涎涕唾，上气喘急，时发寒热，疼痛；亦治肠风下血，诸气羸弱。

67444 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】桔梗（锉，炒） 当归（切，焙） 芍药各三分 橘皮（去白，微炒）半两 槟榔（煨，锉） 鹤虱（去土，微炒） 草薢（锉，炒）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心煎生姜、大枣汤调下，至晚再服。

【主治】蛔虫攻心痛。

67445 桔梗散

《圣济总录》卷一三一。为《鬼遗》卷四“木占斯散”之异名。见该条。

67446 桔梗散

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】桔梗 伏龙肝各等分

【用法】上为散，每服二钱匕，以温酒调下

一日三次。不能下药，斡口开灌之，心中自定，服七日止，食猪肝臠补之。

【主治】卒中蛊毒，下血如鸡肝，昼夜不止，脏腑悉损。

67447 桔梗散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】桔梗汤（《此事难知》）、甘桔汤（《医统》卷六十五引《拔粹》）、甘草汤（《医钞类编》卷十二）。

【组成】薄荷 黄芩 甘草 山梔子各一钱 桔梗半两 连翘二钱

【用法】上锉。每服五钱或七钱，称半两水加竹叶煎服。

【主治】①《保命集》：热在上焦，积于胸中，身热脉洪，无汗多渴者。②《玉机微义》：热肿喉痹。

【加减】大便秘结，加大黄半钱。

67448 桔梗散

【方源】《岭南卫生方》卷中。

【组成】桔梗（去芦，味苦者，锉细微炒）不拘多少

【用法】上为细末。每服三钱，米饮调下，不拘时候。此药不吐不利，加之易为收买，多服者有益。如服吐利药，而后日两三服，使毒气日渐消散，不致再发动也。

【主治】中蛊服药吐利之后，犹觉前后心刺痛，拘急，咽中茅刺者。

67449 桔梗散

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】桔梗末

【用法】每服一刀圭，熟水下。

【主治】被打击，瘀血在腹中，内多不消，时发动者。

67450 桔梗引子

《济阴纲目》卷四。为《妇人良方》卷五“桔梗饮子”之异名。见该条。

67451 桔梗白散

《外台》卷十。即《伤寒论》“白散”。见该条。

67452 桔梗汁方

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】生桔梗不拘多少

【用法】上取汁，每服一小盏，一日三次。

【主治】中蛊吐血。

67453 桔梗芦散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】桔梗芦（生）

【用法】上为末。每服一二钱，白汤调下。

【功用】探吐。

【主治】痰饮在上膈。

67454 桔梗饮子

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】桔梗引子（《济阴纲目》卷四）。

【组成】苦梗 甘草 黄耆 人参（去芦）麦门冬各一两 青皮半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服。

【功用】解劳倦，益血。

【主治】心气不足。

【方论选录】《济阴纲目》：治气不足也，故以参、耆、甘草为君；加麦门冬者，所以通心而清火；苦桔梗载诸药以益上焦之气；青皮利膈气以制诸药之壅，所谓血生于气。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“桔梗饮”。

67455 桔梗煮散

《圣济总录》卷一六八。为《苏沈良方》卷十“桔梗散”之异名。见该条。

67456 桔梗二陈汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】茯苓 陈皮 半夏 甘草 桔梗 枳壳 黑山梔 黄芩 黄连

【主治】火喘。

67457 桔梗甘草汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】桔梗（炒） 甘草（炙，锉） 半夏（汤洗去滑，焙）各三分 旋覆花 大腹皮（锉） 枳壳（去瓢，麸炒） 赤茯苓（去黑皮）各半两 芍药三分 前胡（去芦头）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏

半,加生姜半分(拍碎),同煎至八分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒咳嗽,胸膈壅闷,心神烦躁。

67458 桔梗甘草汤

《经方实验录》卷下。为《伤寒论》“桔梗汤”之异名。见该条。

67459 桔梗白术汤

《圣济总录》卷五十。为《外台》卷十引《古今录验》“桔梗汤”之异名。见该条。

67460 桔梗玄参汤

【方源】《医学摘粹》卷三。

【组成】桔梗三钱 玄参三钱 杏仁三钱 橘皮三钱 半夏三钱 茯苓三钱 甘草二钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯,热服。

【主治】肺气郁升,鼻塞涕多者。

67461 桔梗半夏汤

《类证活人书》卷十八。为《局方》卷四“桔梗汤”之异名。见该条。

67462 桔梗半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】桔梗(锉,炒) 半夏(姜汁制,切,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盞,加生姜三片,同煎至七分,去滓热服。

【功用】顺气消痞。

【主治】①《圣济总录》:伤寒冷热不和,心腹痞满,时发疼痛。②《玉机微义》:胸膈痰涎不利,气逆呕哕;痰气不降,咽肿欲成喉痹者。

67463 桔梗半夏汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】茯苓 陈皮 当归 莪术 枳壳 瓜蒌根各五分 桔梗 半夏各八分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】久喘咳嗽。

67464 桔梗半夏汤

【方源】《医效秘传》卷三。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 甘草 桔梗

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】腹胀满。正虚邪胜,阴阳不和,清浊相混者。

67465 桔梗防风汤

《普济方》卷三八七引《经验良方》。为《小儿痘疹方论》“桔梗甘草防风汤”之异名。见该条。

67466 桔梗麦冬汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】桔梗五钱 牛蒡子五钱 生甘草(锉末)五钱 麦门冬(去心)一两

【用法】上为末。每服三钱,淡竹叶汤调下。

【主治】痘疮毒气上壅,咽喉口舌生疮,不能吮乳者。

67467 桔梗杏仁丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】桔梗 桂各四两 杏仁五分 羌花十二分 巴豆八分

【用法】上除别研者外,为末,后与巴豆、杏仁同研匀,水煮面糊为丸,如绿豆大。每服二三丸,临卧米饮送下

【主治】腹中冷癖,水谷阴结,心下停痰,两胁痞满,按之鸣转,逆害饮食。

67468 桔梗杏仁煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】桔梗 杏仁 甘草各一钱 阿胶 金银花 麦冬 百合 夏枯草 连翘各二钱 贝母三钱 枳壳一钱半 红藤三钱

【用法】水二钟,煎八分,食远服。

【主治】咳嗽吐脓,痰中带血,或胸膈隐痛,将成肺痈者。

【加减】如火盛兼渴者,加天花粉二钱。

67469 桔梗连翘汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】桔梗 连翘 黄芩各一两 薄荷 甘草 川芎各五分 梔子一个

【用法】上锉细。每服一两,水三盞,煮至一盞,去滓温服。

【主治】伤寒汗下后,热结胸中者。

67470 桔梗枳壳汤

《类证活人书》。为《苏沈良方》卷三“枳壳汤”之异名。见该条。

67471 桔梗枳壳汤

【方源】《直指》卷五。

【组成】枳壳(制) 桔梗各二两 甘草(炒)半两

【用法】上为散，每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至中盞，温服。

【主治】①《直指》：诸气痞结满闷。②《医方类聚》：气不下降，大便不通。

【备考】《医方类聚》本方用法：加紫苏茎叶煎。

67472 桔梗枳壳汤

【方源】《得效》卷十一。

【组成】枳壳(去瓢) 桔梗(去芦)各五钱 半夏(汤洗) 黄芩 瓜蒌仁 黄连(去须)各三钱

【用法】上为散。加生姜、麦门冬去心水煎服。利黄涎沫即安。

【主治】热气痞满，胸膈两肋按之则痛。

67473 桔梗荆芥汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】甘草(生用)二钱 桔梗一钱 牛蒡子一钱 荆芥一钱

【用法】水煎服。

【主治】痘疹初发热而声音遂废，热壅肺而金不清者。

67474 桔梗香薷汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】桔梗 香薷 陈皮 枳壳 黄芩 贝母 桑根白皮 地骨皮 青皮 柴胡 泽泻 甘草梢 天门冬 灯心

【主治】肺胀咳。

67475 桔梗独活汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】桔梗 独活 苏梗 条芩各一钱五分 真化橘红八分

【用法】加生姜三片，青果一枚，水煎服。

【主治】子瘕。

67476 桔梗前胡汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】桔梗一钱 前胡 苏子 赤芍 桑白皮(蜜炙) 陈皮各一钱五分 杏仁三钱，姜汁炒 竹茹一钱 生甘草五分

【主治】肺气闭塞闷咳。

67477 桔梗破气丸

【方源】《千金》卷十七。

【组成】桔梗 橘皮 干姜 厚朴 枳实 细辛 葶苈各三分 胡椒 蜀椒 乌头各二分 葶苈十分 人参 桂心 附子 茯苓 前胡 防葵 芎藭各五分 甘草 大黄 槟榔 当归各八分 白术 吴茱萸各六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。酒服十丸，一日三次；有热者，空腹服之。

【主治】气上下痞塞不能息。

【方论选录】《千金方衍义》：上下痞塞不能布息，故用桔梗、橘皮、前胡以散痞，防、葵、葶苈、大黄以荡实，槟榔、枳实、厚朴以泄滞，乌头、附子、细辛以破结，川椒、吴萸、胡椒、葶苈下气，干姜、桂心以温中，川芎、当归以和血，人参、白术、茯苓、甘草以安正气而助药力也。

67478 桔梗消毒汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】甘草(生用)三钱 桔梗一钱五分 牛蒡子一钱 荆芥穗八分 玄参一钱

【用法】水煎服。

【主治】痘疮结靨后，内毒盛甚，其势内攻而上烁肺，咽喉肿痛，声哑者。

67479 桔梗黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】桔梗(炒)二两 黄耆(细锉) 沉香(锉) 当归(切，焙)各一两 芎藭 人参 甘草(炙) 紫苏叶各半两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：胸膈痛。②《普济方》：胸痹。

67480 桔梗甘草防风汤

【方源】《小儿痘疹方论》。

【异名】三味桔梗防风汤（《永类铃方》卷二十一）、桔梗防风汤（《普济方》卷三八七引《经验良方》）、甘桔防风汤（《明医杂著》卷六）、三味甘桔汤（《疮疡经验全书》卷八）、甘草防风汤（《麻科活人书》卷四）。

【组成】桔梗（炒） 甘草（炙） 防风各等分

【用法】上为粗散。每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓，徐徐温服，量大小加减。

【主治】①《小儿痘疹方论》：小儿痘疹，风热咽喉不利。②《普济方》：小儿疹子已出，口舌生疮，咽干壮热，饮水咳嗽，痰涎不利。

67481 桔梗甘草栀子汤

【方源】《医方类聚》卷二六五引《疮疹方》。

【组成】桔梗半两 甘草半两 栀子仁二钱半

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，煎服。

【主治】疮疹心烦者。

67482 桔梗甘草鼠粘子汤

【方源】《医方类聚》卷二六五引《疮疹方》。

【组成】桔梗 甘草 鼠粘子（微炒）各等分

【用法】上为粗末。水一盞煎，食后温服。

【主治】疮疹，咽膈不利。

槲

67483 郴州蛇药片

【方源】《古今名方》。

【组成】丛枝蓼 4000 克 白花败酱草 2000 克 辅料适量

【用法】上制成 1200 片。每服 10 片，首次量加倍，温开水送下，每日四次。亦可外用，将片研成粉，敷在经处理的伤口上。

【功用】清热，解蛇毒，消肿止痛。

【主治】毒蛇、毒虫咬伤。

桓

67484 桓圣丸

《普济方》卷三二四。为《圣惠》卷七十一“抵圣丸”之异名。见该条。

桐

67485 桐油钱

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】桐油三四匙

【用法】先用温汤半碗，加入桐油三四匙搅匀。用硬鸡翎蘸油探入喉中，连探四五次，其痰壅出，再探再吐，以人苏醒声高为度。后服清咽利膈之药。

【功用】探吐顽痰。

【主治】喉风、喉闭。其症先两目紧闭，胸膈气急，呼吸短促，蓦然咽喉肿痛，手足厥冷，气闭不通，顷刻不治。

67486 桐油膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】桐油二两 百草霜 黄丹 发灰 乳香各三钱

【用法】上熬成膏。摊油纸上贴之。血虚甚者尤宜。如经年紫黑者，先用炉灰膏去瘀。

【主治】①《医学入门》：痈疽。②《疡科选粹》：疔疮。

【加减】冷者加鹿角灰。

【方论选录】桐油宣水毒，百草霜生肌止血，黄丹生肌止痛，发灰补阴。

67487 桐律散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引张涣方。

【组成】梧桐律 黄柏（蜜炙） 蛤粉各一分 晚蚕蛾一钱（微炒，上药捣罗为细末，次用后药） 朱砂半两（细研，水飞） 麝香一钱（研） 龙脑半钱（研）

【用法】上研匀。每用少许，掺贴患处。

【主治】口疮。

栝

67488 栝石汤

《金鉴》卷七十五。为《医学入门》卷八“瓜石汤”之异名。见该条。

67489 栝楼丸

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《医心方》卷十二。

【组成】栝楼根三两 铅丹二两 葛根三两 附子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，饮送下，一日三次，渴则服之。

【主治】①《千金》：消渴。日饮一石水者。②《医心方》：小便不通。

【加减】春、夏减附子。

67490 栝楼丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】栝楼根一两 黄连一两（去须）桑根白皮三分（锉） 犀角屑三分 人参三分（去芦头） 地骨皮三分 铁粉三分 黄芩三分 茯神一两 麦门冬一两（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温小麦汤送下，不拘时候。

【主治】热病，脾积热，口干烦渴。

67491 栝楼丸

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《医方类聚》卷一二四引《神巧万全方》。

【组成】栝楼根二两 麦门冬二两（去心，焙） 苦参三分（锉） 人参三分（去芦头） 知母三分

【用法】上为末，用牛胆汁为丸，如小豆大。每服二十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴。四肢烦热，口干心躁。

67492 栝楼丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根二两 麦门冬二两（去心，焙） 知母一两 人参三分（去芦头） 黄芩半两 苦参半两（锉） 土瓜根半两 赤茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴烦躁，小便不利。

67493 栝楼丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】栝楼二枚（割去盔子） 硫黄一两（锉碎） 附子一两（炮裂，去皮脐） 干姜一两（炮裂，锉） 猪牙皂荚一两（去皮，生捣碎）

【用法】上为散，入栝楼内，却以盖子盖之，用竹竿子扎定，以面厚裹，慢火烧面黄焦为度，候冷取出，重研令细，以软饭为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以黄耆汤送下。

【主治】积年肠风下血不止，面色萎黄，肌体枯悴。

67494 栝楼丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】栝楼根五两 黄连（去须）一两 浮萍草二两

【用法】上为末，用生地黄汁半盏，于石臼内木杵捣令匀，再入面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧以牛乳汤送下，一日三次；煎菖蒲汤下亦得。

【主治】消渴。饮水不止，小便中如脂，舌干燥，渴喜饮。

【备考】本方方名，《普济方》引作“栝楼根丸”。

67495 栝楼丸

【方源】《三因》卷九。

【组成】栝楼（去瓢，取子炒香熟，留皮与瓢别用） 枳壳（麸炒，去瓢）各等分

【用法】上为细末，先取栝楼皮瓢研末，水熬成膏，和二物末为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，食后以热熟水送下，一日二次。

【主治】胸痞，胸中痛彻背，气塞喘息，咳嗽，心腹痞闷。

67496 栝楼丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】栝楼一枚（大者，去瓢） 天南星（炮） 半夏（汤洗七次） 细辛（去叶土） 防风（去芦头） 当归（洗，焙） 寒水石

白矾各半两

【用法】上件除栝楼外，余为末，入在栝楼内，用纸数幅紧裹，于饭上蒸二次后，却于新瓦上焙干，研为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，食后以生姜蜜汤送下。

【主治】风热咳嗽，痰涎壅盛，头目不利，鼻塞不通。

67497 栝楼丸

【方源】《普济方》卷一七九。

【组成】栝楼根 黄连（去须） 铁粉（细研）各等分

【用法】上为末，入铁粉研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎茅根汤送下，不拘时候。

【主治】消渴。饮水绝多，身体黄瘦。

67498 栝楼丸

《普济方》卷一八七。为方出《证类本草》卷八引《杜壬方》，名见《普济方》卷一五八“栝楼方”之异名。见该条。

67499 栝楼丸

《普济方》卷三九八。为《得效》卷十二“瓜蒌丸”之异名。见该条。

67500 栝楼丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十三。

【组成】栝楼根（薄切）

【用法】用人乳汁拌蒸，竹沥拌晒，为末，炼蜜为丸，如弹子大，噙化；或丸如绿豆大。每服百丸，米饮送下。

【主治】消渴小便多。

67501 栝楼丸

《类证治裁》卷二。为《丹溪心法》卷二“黄瓜蒌丸”之异名。见该条。

67502 栝楼方

【方源】方出《肘后方》卷六，名见《普济方》卷五十三。

【组成】栝楼根

【用法】上药削令可入耳，以腊月猪脂（一方用鸽膏）煎三沸出，塞耳，每日一次。三七日即愈。

【主治】耳卒得风，觉耳中恍恍者。

67503 栝楼方

【方源】方出《证类本草》卷八引《杜壬方》，名见《普济方》卷一五八。

【异名】栝楼丸（《普济方》卷一八七）。

【组成】大栝楼

【用法】上去瓤取子，熟炒别研，和子皮，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，米饮送下。

【主治】胸膈痛彻背，心腹痞满，气不得通，亦治痰嗽。

67504 栝楼汤

【方源】《外台》卷二引《范汪方》。

【组成】栝楼根（肉黄脉少者）三两

【用法】上切。以水五升，煮取一升，分二服。先以青淡竹沥一升，合水二升，煮好银二两，减半去银，先与病入饮之讫，须臾后，乃服栝楼汤。其银汁须冷服。

【主治】伤寒烦渴；阴阳易。

67505 栝楼汤

【方源】《医心方》卷十二引《范汪方》。

【组成】栝楼二两 黄连一升 甘草二两

【用法】以水五升，煮取二升半，分三服。

【主治】消渴。日饮一斛，小便亦如之。

67506 栝楼汤

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【组成】桑螵蛸（炙） 甘草（炙） 黄连 生姜各二两 栝楼 人参各三两 干枣五十枚

【用法】上切。以水七升，煮取二升半，分三服。

【主治】产后小便数兼渴。

【宜忌】《普济方》：忌猪肉、冷水。

【方论选录】《千金方衍义》：肺胃虚热，用人参、麦冬、栝楼、甘草、大枣生津止渴；黄连、桑螵蛸主足太阳不能涩津而成淋；黄连苦寒，故取生姜之辛散。

【备考】《千金》有麦门冬。

67507 栝楼汤

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【组成】栝楼四两 麦门冬（去心） 人参

各三两 干地黄三两 甘草二两(炙) 干枣二十枚 土瓜根五两

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】产后渴。

【方论选录】《千金方衍义》：肺胃虚热，用人参、麦冬、栝楼、甘草、大枣生津止渴；地黄、土瓜根专主手太阳不能化气而致渴。

【备考】本方方名，《妇人良方》引作“瓜蒌根汤”、《医方类聚》引作“栝楼根汤”。

67508 栝楼汤

【方源】《千金》卷十。

【异名】瓜蒌汤（《普济方》卷一三一）。

【组成】栝楼实一枚 黄芩 甘草各三两 生姜四两 大枣十二枚 柴胡半斤

【用法】上咬咀，以水一斗二升，煮取五升，绞去滓，适寒温服一升，每日三次。

【主治】伤寒、中风五六日以上，但胸中烦，干呕。

【方论选录】《千金方衍义》：于小柴胡方中除去半夏、人参，加入栝楼，治少阳干呕烦渴。

【备考】本方方名，《外台》引作“栝楼实汤”。

67509 栝楼汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】栝楼实一枚 薤白一斤 半夏半斤 生姜四两 枳实二两

【用法】上咬咀。以白馣浆一斗，煮取四升，每服一升，每日三次。

【主治】胸痹。喘息咳唾，胸背痛，短气，寸脉沉而迟，关上小紧数。

【备考】《圣惠》有陈橘皮。

67510 栝楼汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一。

【组成】栝楼根 生姜各五两 生麦门冬(用汁) 芦根(切)各二升 茅根(切)三升

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分

三服。

【主治】①《千金》：消渴。②《普济方》：胃热。

67511 栝楼汤

【方源】《外台》卷三十七引《延年秘录》。

【异名】栝楼根汤（《千金》卷二十四）。

【组成】栝楼根 大麦奴各四两 甘草二两 葱白半斤 豉二升

【用法】上咬咀。先以水一斗五升，煮葱白作汤，澄取八升，纳药煮取三升，分三服。

【主治】白石英动附子毒，服生麦门冬汤后，热势未除，视瞻高而患渴。

67512 栝楼汤

【方源】《幼幼新书》卷二十引《婴童方》。

【组成】栝楼五分 黄芩三分 知母 芦根各二分 生米一合 麦门冬三分(去心)

【用法】上切。水五升，煮二升，如饮浆度服。

【主治】小儿热渴，或吐下后虚热渴。

67513 栝楼汤

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《婴童方》。

【异名】瓜蒌汤（《医部全录》卷四四九）。

【组成】栝楼根 知母 茯苓各八分 甘草 黄柏各四分 人参六分 黄芩 桦皮各十分

【用法】以水五升，煮一升半。五六岁儿为三服。

【主治】小儿有热不调，渴痢不止。

67514 栝楼汤

【方源】方出《圣惠》卷十七，名见《松峰说疫》卷五。

【组成】栝楼一枚(大者，取瓢)

【用法】上锉。置瓷碗中，用热酒一盏沃之，盖之良久，去滓顿服，不拘时候，未效再服。

【主治】热病头痛，发热。

67515 栝楼汤

【方源】方出《圣惠》卷四十二。名见《普济方》卷一八七。

【组成】枳实一两(麸炒微黄) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟) 桂心三分

栝楼一枚

【用法】上为散。每服五钱，以水一盞，加生姜半分，薤白五茎，煎至五分，去滓，温温频服。

【主治】胸痹疼痛，痰逆，心膈不利。

67516 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】栝楼根五两 麦门冬（去心，焙）茅根 芦根各一两半 小麦半升 石膏（研）九两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盞，煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】膈消多渴。

67517 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【异名】瓜蒌汤（《普济方》卷二十八）。

【组成】大栝楼（五枚，去壳取瓢并子，剝令极匀细微，以白面同和作饼子，焙干，捣罗为末）三两 杏仁（去皮尖双仁，麸炒令黄，砂盆内研令极细） 山芋各三两 甘草（炙，取末）一两

【用法】上将山芋与栝楼同于银石器中，慢火炒令香熟，取出，与甘草、杏仁末和拌匀，更用蓝花三分，细研同和匀。每服一钱，沸汤点下。

【功用】润肺化痰，利咽膈。

【主治】肺热痰实壅滞。

67518 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】栝楼一枚（取瓢，入蛤粉一匙同炒黄） 马兜铃（炒） 防己 葛根（锉） 贝母（去心） 甘草 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 阿胶（锉，入糯米二合同炒，去米）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，蜜半匙，煎至七分，去滓温服，日三次，夜一次。

【主治】咳嗽咯血，喘满肺痿。

67519 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】栝楼 陈橘皮（烫去白，焙）各四两 当归（锉，焙）三两 半夏（汤洗七遍，生姜汁制，焙）一两

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱匕，加生姜一枣大（拍碎），水二盞，煎至一盞，去滓温服，一日三次。

【主治】上气，胸胁满，不下食，呕逆，胸中冷。

67520 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】栝楼根 桑根白皮（细锉）各三两 麦门冬（去心，焙）一两 葛根（锉）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】饮酒发渴，又欲饮酒。

67521 栝楼汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】栝楼根一两半（锉） 冬瓜（绞汁） 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 知母（焙）各一两 粟米一合

【用法】上除冬瓜外，为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水六分，煎至四分，去滓，入冬瓜汁半合，若渴，即徐徐饮服。

【主治】小儿下痢不止，烦渴引饮。

67522 栝楼汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷一八四。即方出《圣惠》卷三十八，名见《圣济总录》（人卫本）卷一八四“栝楼根汤”。见该条。

67523 栝楼汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】栝楼根四两 柴胡（去苗）八两 人参 黄芩 甘草（炙）各三两

【用法】上为末。每服二钱，水二盞，加生姜三片，大枣一个（擘开），煎至一盞，去滓温服。

【主治】疟疾热多者。

67524 栝楼汤

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】栝楼散（《奇效良方》卷六十五）。

【组成】栝楼根二钱 白甘遂一钱

【用法】上用慢火炒焦黄色，研匀。每服一字，煎麝香、薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿高热，惊风抽搐，癖结胀满。

①《小儿药证直诀》：小儿慢惊。②《普济方》：癖结胀满。③《医方类聚》引《疮疹方》：小儿斑疹作搐。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：白甘遂即蚤休，苦寒降泄，清热解痉，主治惊痫，摇头弄舌，胎风，手足抽搐等证，专用此一味，以治胎风，可见白甘遂是一味主痉的专药，钱氏用此加栝楼根治慢惊，是佐以润肺滑痰，解渴生津，使润而能收，猛而能缓，从二药性味分析，本方适用于小儿高热、惊风抽搐，但方前明言治慢惊，是谓治标之意。

67525 栝楼汤

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】栝楼一枚（大者，重一二两者，连皮捣烂） 甘草（蜜炙）二钱 红蓝花五分

【用法】上水二钟，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】左胁气痛。

67526 栝楼汤

《普济方》卷一七八。为《千金》卷二十一“枸杞汤”之异名。见该条。

67527 栝楼汤

《普济方》卷二八八。为《传信适用方》卷三引周子明方“瓜蒌汤”之异名。见该条。

67528 栝楼汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】栝楼根 牡蛎 甘草各一钱 连翘 羌活各二钱 反鼻八分

【用法】以水五合，煮取二合半，分温三服。

【主治】结毒咳嗽，似虚劳者。

67529 栝楼汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】瓜蒌 生梔 大力 连翘 柴胡 黄芩 陈皮 青皮 花粉 银花 甘草 皂角 甜酒

【主治】乳痈初起。

67530 栝楼饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】栝楼一枚（黄熟者，去皮，用瓢并子） 冬瓜一枚（中样者，割破头边，纳栝楼瓢子在冬瓜心内）

【用法】上用黄土泥裹冬瓜令匀，可半指厚，候干，簇炭火烧令泥通赤即止，去泥取瓜，就热碎切，烂研，布绞取汁，约七八合，更入白蜜二匙头，搅令调匀，候稍冷，即分三度服。

【功用】救急止渴。

【主治】因好食热面炙肉，及服补治壅热药并乳石，三焦气隔，心肺干热，口干舌焦，饮水无度，小便日夜不知斗数，心欲狂乱。

67531 栝楼饮

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【异名】栝楼散（《普济方》卷三八六）。

【组成】栝楼根三分 黄芩（去黑心）一分 知母（焙） 小麦 粟米各半两

【用法】上除粟米、小麦外，余为粗末。每服二钱匕，水一小盏，入小麦、粟米各一撮，同煎至六分，去滓，分作三服，一日吃尽。

【功用】除热止渴。

【主治】小儿热渴，或虚热吐下。

67532 栝楼酒

【方源】方出《千金》卷二，名见《圣济总录》卷一六六。

【异名】栝楼散（《普济方》卷三四六）。

【组成】栝楼一枚（黄大者，锉碎）

【用法】上熟捣令烂，用好酒五盏，煎取三盏，去滓。每服一小盏，暖服，不拘时候。

【主治】产后浮汗不下或少。

67533 栝楼酒

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】栝楼一枚 甘草二寸

【用法】上锉。用酒一盏，水一盏，量人虚实，加膩粉少许，煎三五沸，去滓，临卧温服。夜半疏动一行，其疮自消。

【主治】痈疔多日不熟，无头者。

67534 栝楼酒

《普济方》卷二八四。为《圣济总录》卷一三一“一醉膏”之异名。见该条。

67535 栝楼粉

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】栝楼根散（《简易》引《桃溪方》，见《医方类聚》卷一二五）。

【组成】大栝楼根

【用法】深掘大栝楼根，厚削皮至白处止，以寸切之，水浸一日一夜，易水经五日，取出烂捣碎研之，以绢袋滤之，如出粉法，干之。每服方寸匕，水送下，一日三四次。亦可作粉粥，乳酪中食之，不限多少，取愈止。

【主治】消渴。

67536 栝楼散

【方源】《医心方》卷十二引《范汪方》。

【组成】石韦二分 通草一分 栝楼二分 葵子四分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，先食以麦粥送下，一日三次。

【主治】淋病。

67537 栝楼散

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一。

【组成】栝楼根 麦门冬 铅丹各八分 茯神（一作茯苓） 甘草各六分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以浆水下，一日三次。

【主治】消渴。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菰菜。

【备考】本方方名，《普济方》引作“栝楼根散”。

67538 栝楼散

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】栝楼 枸杞根 赤石脂 茯苓各一两半 天门冬二两半（去心） 牛膝 干地黄各三两 桂心 菊花 麦门冬（去心） 菖蒲 云母粉 泽泻 卷柏 山茱萸 远志（去心） 五加皮 杜仲（炙） 瞿麦 续断

石斛 黄连 柏仁 石韦（去毛） 忍冬各一两 菟丝 车前子 蛇床子 巴戟天 钟乳（研） 薯蓣 甘草（炙）各五分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三四次。亦可为丸，每服十丸，一日三次。

【主治】消渴。

67539 栝楼散

【方源】《外台》卷十一引《近效方》

【组成】栝楼八分 茯苓八分 玄参四分 枳实六分（炙） 苦参三分 甘草三分（炙） 橘皮三分

【用法】上为末。每服方寸匕，空腹以浆水下，一日二次。

【功用】除风湿，理石毒，止小便，去皮肤疮，调中。

【主治】肾虚热渴，小便多。

【宜忌】忌海藻、大酢、菰菜。

67540 栝楼散

【方源】《医心方》卷七引《令李方》。

【组成】栝楼根四两 葶苈子四分

【用法】上药治下筛。艾汁浸，绵裹，纳下部，日三易。

【主治】蠱虫及蛲虫侵蚀下部。

67541 栝楼散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】栝楼 柴胡（去苗） 知母 黄芩 甘草（炙微赤，锉）各一两半

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】阳毒伤寒五六日以上，但胸中烦热，干呕。

【备考】本方方名，《普济方》引作“瓜蒌散”。

67542 栝楼散

【方源】方出《圣惠》卷四十九，名见《圣济总录》卷七十三。

【组成】栝楼瓢一两 神曲末半两（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以葱白酒调

下。

【主治】酒癖。痰吐不止，两胁胀痛，气喘上奔，不下食饮。

67543 栝楼散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】栝楼一枚（干者） 柴胡半两（去苗） 甘草半两（炙微赤，铍） 款冬花半两 芦根半两（铍） 贝母半两（煨令微黄）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺黄。

67544 栝楼散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】栝楼一枚（出却一半瓢） 白矾一两 白石英一两

【用法】上二味入栝楼中，以湿纸裹烧，候赤为度，待冷，捣细研为散。每服一钱，食前以粥饮调下。

【主治】休息痢。

67545 栝楼散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】栝楼一两（并皮细铍） 白矾一两（研碎） 消石一两 硫黄一两（研碎）（以上栝楼、白矾二味，于铍子内炒令黑色，然后入消石、硫黄，又同炒，令相入为度） 禹余粮五两（烧，醋淬七遍） 狗脊半分（去毛，末） 麝香一钱（细研）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒下。

【主治】妇人赤白带下，久不愈，羸困。

67546 栝楼散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】栝楼根一两 漏芦一两 枳壳二分（麸炒微黄，去瓢） 赤芍药三分 甘草三分（炙微赤，铍） 桑根白皮三分（铍） 黄芩三分 木通一两（铍）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乳无汁。

67547 栝楼散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】栝楼 芦根（铍） 柴胡（去苗） 黄芩各三分 川大黄（铍，微炒） 甘草（炙微赤，铍） 川芒消 石膏 麦门冬（去心，焙） 各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿胃中热，烦闷，不欲乳食，身体黄，多渴。

67548 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】栝楼根二两 郁金 甘草（生）各一两

【用法】上为散。每服一钱，生姜蜜水调下，不拘时候。

【主治】伤寒发热，烦躁，言语谵妄，目赤口干，心神恍惚。

67549 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【异名】香墨散（原书卷五十八）。

【组成】栝楼根三两 墨一两 铅丹半两

【用法】上为细散，和匀。每服一钱匕，新汲水调下，一日三次，不拘时候。

【主治】膈消。

67550 栝楼散

《圣济总录》卷五十九。为《千金翼》卷十九“防己散”之异名。见该条。

67551 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】栝楼实一枚 青盐一两（细研）杏仁（去皮尖）三七粒

【用法】上取栝楼，开顶作盖子，取出瓢并子，用青盐、杏仁同栝楼瓢并子纳入栝楼内，却将顶盖盖了，麻线系定，盐泥固济，炭火煨烟尽，去泥取药为末。早夜揩牙。

【主治】须黄白。

67552 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】栝楼实(大好者)一个 乌梅肉十个

【用法】上二味,先将栝楼切下盖,少取瓢,以乌梅肉实其中,却盖定,用黄泥固济,候泥干,以火煨存性,取出,去泥细研为散。每服二钱匕,空心温酒调下。

【主治】肠痔下血。

67553 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】大栝楼一枚(开口) 猪牙皂荚白矾各半两 鲤鱼皮 鳖甲(去裙襴) 刺猬针各一分

【用法】上除栝楼外同为粗末,入在栝楼内,用盐泥固济,候干,用炭五斤,煨令通赤,放冷取出,捣罗为散。每服二钱匕,研胡桃酒调下。

【主治】痔痿疼痛,行履不得。

67554 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】栝楼实二两 败酱 细辛(去苗叶) 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 桔梗(炒) 人参 防风(去叉) 各半两

【用法】上为散。每服三钱匕,温酒调下;水一盏,煎至八分,温服亦得,不拘时候。

【主治】产后乳痈,脓溃未溃,热痛不已。

67555 栝楼散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】栝楼(锉)

【用法】上为散。以酢醋和涂之。

【主治】小儿风热赤游肿。

67556 栝楼散

【方源】《幼幼新书》卷十五引丁时发方。

【组成】栝楼根 麦门冬 甘草(炙) 柴胡 葛根各半两 枇杷叶一分(拭去毛,炙黄)

【用法】上为末。每服一钱,水一盏,煎七分,温服。

【主治】小儿伤寒,烦躁,热,大便不止。

67557 栝楼散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】栝楼一枚 盐豉一合(入栝楼中,和瓢并烧灰,研末) 灶下黄土一分 腻粉一分

【用法】上为末,入麝香一字拌匀。每用少许,油调涂之,湿者干掺。

【主治】小儿头疮。

67558 栝楼散

《卫济宝书》卷下。为《鸡峰》卷十六“瓜蒌散”之异名。见该条。

67559 栝楼散

【方源】《普济方》卷七十三引《卫生家宝方》。

【组成】小团栝楼(篱上长藤蔓,结实如弹子大,色红,皮上无毛,九十月间采,晒干) 槐花(炒) 赤芍药各等分

【用法】上为末。每服二钱,临卧温酒下。

【主治】赤眼,痛不可忍。

67560 栝楼散

【方源】《集验背疽方》。

【异名】瓜蒌散(《丹溪心法附余》卷十六)。

【组成】栝楼一个(去皮,焙,研为末,急用则烂研,子多者有力) 当归(净洗,去芦,焙,细锉)半两 甘草半两(细锉,生用) 通明没药一分(别研) 乳香一钱(别研)

【用法】上用无灰酒三升,同于银石器中慢火熬,取一升清汁,分三服,食后良久服。如有奶劳,便服此药,可绝病根。如毒已成,能化脓成黄水;毒未成,即于大小便中通泄。疾甚再合服,以退为妙。

【主治】①《集验背疽方》:妇人乳疽,奶劳。②《金鉴》:吹乳、结核。

【备考】本方方名,《妇人良方》引作“神效瓜蒌散”。

67561 栝楼散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【异名】瓜蒌散（《准绳·疡医》卷四）。

【组成】栝楼一个（去皮） 生姜半两 甘草半两 金银花三钱 牛蒡子三钱（微炒）

【用法】上药不犯铜铁器，捶碎，用酒一大升，煎数沸，空心温服。微利为度。

【主治】便痢等恶疮。

67562 栝楼散

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】栝楼二个 明矾一块（如枣子大）

【用法】将明矾入栝楼内，烧煨存性，为末。将萝卜烂煮，蘸药末服之，汁过口。药尽病除。

【主治】喘证。

67563 栝楼散

《普济方》卷一七六。即《得效》卷七“瓜蒌散”。见该条。

67564 栝楼散

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】栝楼一枚 桂心一两（去粗皮）

【用法】上为散。每服二钱，温酒橘皮调下；汤亦可，空心、卧时各二服。

【主治】心痹不得卧，心痛彻背。

67565 栝楼散

《普济方》卷二八九。为《传信适用方》卷三“瓜蒌散”之异名。见该条。

67566 栝楼散

《普济方》卷三四六。为方出《千金》卷二，名见《圣济总录》卷一六六“栝楼酒”之异名。见该条。

67567 栝楼散

《普济方》卷三八六。为《圣济总录》卷一六八“栝楼饮”之异名。见该条。

67568 栝楼散

【方源】《普济方》卷四〇一。

【组成】栝楼 贝母 荆芥各等分

【用法】上为末。用紫草同煎，连三服。

【主治】欲出痘疹。

67569 栝楼散

《奇效良方》卷六十五。为《小儿药证直诀》卷下“栝楼汤”之异名。见该条。

67570 栝楼散

《准绳·幼科》卷五。为《赤水玄珠》卷二十八“瓜蒌散”之异名。见该条。

67571 栝楼煎

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】栝楼根一两 茯神一两 石斛一两（去根节） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 知母一两 黄连半两（去须） 当归半两 五味子半两 人参一两（去芦头） 丹参半两（上并捣罗为末） 地骨皮二两 葳蕤二两 胡麻一两 蜜五合 生地黄汁一升 牛髓一合 淡竹叶五十片 生麦门冬汁五合 生姜汁一合

【用法】以水三升，煮地骨皮、葳蕤、胡麻、淡竹叶四味，去滓，取汁一升，和地黄汁、麦门冬、牛髓、蜜、姜汁等，入前药末，搅令匀，又煎成膏，入于铜器中。每服半匙，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳渴，四体虚乏，羸瘦。

67572 栝楼煎

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】栝楼一颗（熟，去仁，以童子小便一升相和，研绞取汁） 酥一两 甘草一分（生，为末） 蜜三两

【用法】上于银锅中慢火煎如稀汤。每服半钱，以清粥饮调下，一日四五次。

【主治】小儿咳嗽不止，心神烦闷。

【备考】本方方名，《医部全录》引作“瓜蒌散”。

67573 栝楼子散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】栝楼子三分（微炒） 皂荚子仁三分（微炒） 连翘三分 牛蒡子三分（微炒） 牵牛子三分（微炒） 何首乌三分 川大黄一两（锉碎，微炒） 梔子仁一两 甘草一两（生，锉） 白螺壳一两 漏芦一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】瘰癧初结肿痛，寒热，四肢不安。

67574 栝楼子散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】瓜蒌子散（《普济方》卷三四〇）。

【组成】栝楼子二升（干者） 黄耆一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 石膏一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心烦躁热，口干，头目不利。

67575 栝楼子膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】栝楼子一升（汤浸，擘，取仁，细研如膏） 白石脂一两（捣罗为末） 麝香一分（细研） 雄雀粪半两（白色者，细研）

【用法】上为末，用菟丝子苗，研取自然汁调如膏。夜间先煎葱白汤洗面，后涂药，明旦以暖浆水洗之。

【主治】伤寒生豌豆疮愈后，癍痕赤肿不消。

67576 栝楼实丸

【方源】《普济方》卷一五四引《济生方》。

【组成】栝楼实（别研） 枳壳（去瓢，麸炒）半夏（汤泡七次） 桔梗（去芦头）各一两

【用法】上为细末，姜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后用淡姜汤送下。

【主治】胸痞。胸中痛彻背肋，喘急妨闷。

67577 栝楼实汤

《外台》卷二。即《千金》卷十“栝楼汤”。见该条。

67578 栝楼根丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】栝楼根 甘草（炙微赤，锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 乌梅肉（微炒）各一两

【用法】上为末，煮枣肉，入少许蜜为丸，

如弹子大。每服一丸，以绵裹，含咽津，一日四五次。

【主治】虚劳烦热，口干舌燥，烦渴。

67579 栝楼根丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根一两 麦门冬一两（去心，焙） 甘草三分（炙微赤，锉） 黄连三分（去须） 赤石脂半两 泽泻半两 石膏一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴，心神虚烦躁闷。

67580 栝楼根丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根一两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄连一两（去须） 泽泻一两 赤石脂半两 熟干地黄一两 石膏半两（细研） 黄耆三分（锉） 黄丹三分 桑螵蛸二七枚（微炒） 子芩一两 龙骨三分 牡蛎一两（烧为粉） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】肾消，小便数。

67581 栝楼根丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】铅黄丸（《圣济总录》卷五十八）。

【组成】栝楼根三分 黄丹半两 葛根半两 黄连一两（去须）

【用法】上为末，入黄丹，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以温水送下，遇渴吃水，即便服之。

【主治】消渴。饮水过多，不知足限。

67582 栝楼根丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】栝楼根五两 王瓜根三两 铁粉（研） 苦参 黄连（去须） 朴消（研） 芒消（研）各二两 白石英（研） 泽泻（锉） 龙胆 白英 水萍（焙） 菰根各一

两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，早、晚食前用温米饮送下。稍增至三十丸，以知为度。

【主治】中焦热结，肠胃不通，引饮无度。

67583 栝楼根丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】栝楼根（锉） 黄连（去须） 知母（焙） 麦门冬（去心）各五两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】消渴，饮水不止。

67584 栝楼根丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】栝楼根一两一分 铅丹（研）一两干葛粉三分 附子（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上四味，以二味捣罗为细末，与粉干葛、铅丹和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】消渴后，虚热留滞，结成痼疽。

67585 栝楼根丸

【方源】《普济方》卷一七八。

【组成】栝楼根一两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄连一两（去须） 泽泻一两 赤石脂半两 熟干地黄一两 牡蛎一两（烧为灰） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别杵为末）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】肾消，小便数。

67586 栝楼根丸

《普济方》卷一七八。即《圣济总录》卷五十八“栝楼丸”。见该条。

67587 栝楼根方

【方源】方出《证类本草》卷八引《肘后方》，名见《普济方》卷五十四。

【组成】栝楼根三十斤

【用法】上细切，以水煮，用酿酒如常法。久久服之。甚良。

【主治】二三年聾耳。

67588 栝楼根汁

《卫生总微》卷十五。为《圣济总录》卷一七四“栝楼根饮”之异名。见该条。

67589 栝楼根汤

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】黄芩三两 人参二两 桂心二两大黄二两 栝楼根三两 芒消二两 甘草二两（炙）（一方用生姜二两）

【用法】上切。以水八升，煮取三升，去滓。饮一升，须臾当下；不下，复饮一升。得下止，勿复饮。汤药力势歇，乃可食糜耳。

【功用】除热止渴。

【主治】伤寒渴欲饮水。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱、油腻

67590 栝楼根汤

《千金》卷二十四。为《外台》卷三十七引《延年秘录》“栝楼汤”之异名。见该条。

67591 栝楼根汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】栝楼根 甘草各二两 大黄一两 梔子仁十四枚

【用法】上四味合服如解钟乳法。

【主治】海蛤对栝楼毒，或手足烦热，或噤寒清涕。

【方论选录】《千金方衍义》：海蛤、栝楼亦无毒热，服之而烦热口噤者，良由病湿阻积为与。所以仍用栝楼根引入先前误药受病之区，统领大黄、梔子开泄其邪，乃《金匱》大黄甘草汤之变法。

67592 栝楼根汤

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《圣济总录》（人卫本）卷一八四。

【组成】人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤） 栝楼根半两 麦门冬半两（去心） 黄芩半两 芦根一两 半夏一两（汤浸七遍去滑） 前胡三分（去芦头）

【用法】上锉细。每服一两，以水一大盏，加生姜半分，煎至七分，去滓，分温三服，不拘时候。

【主治】乳石发动，虚热痰饮，呕逆烦闷，不下饮食。

【备考】本方方名，圣济总录（文瑞楼本）作“栝楼汤”。

67593 栝楼根汤

【方源】《类证活人书》卷十七。

【组成】栝楼根三分 石膏二两 人参半两 防风半两 甘草半两（炙） 葛根一两半（生用，干者只三钱）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盞半，煎至一中盞，去滓温服。

【主治】风温渴甚。

【备考】方中葛根，《景岳全书》作“干姜”。

67594 栝楼根汤

《圣济总录》卷五十八。为《千金》卷二十一“枸杞汤”之异名。见该条。

67595 栝楼根汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】栝楼根三两 知母（焙）二两 甘草（炙，锉） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，下白蜜少许搅匀，不拘时候服，日可数服。

【主治】胃中干渴。

67596 栝楼根汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】栝楼根（锉） 甘草（炙，锉） 白茯苓（去黑皮）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加麦门冬一分（去心），枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】止渴。

【主治】下痢，冷热相冲，脏腑气不和顺，本来下虚，津液耗少，口干咽燥，常思饮水。

【宜忌】初不许饮水，毒气更增，烦躁转甚，不得令至过度。

67597 栝楼根汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】栝楼根二两（锉） 茅根（锉） 麦

门冬（去心，焙） 黄连（去须） 石膏（碎） 知母（焙） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取八分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】时气病后，目赤涩痛。

67598 栝楼根汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】栝楼根二两 石膏（碎）三分 铅丹（研）三分 赤石脂 白石脂各半两 泽泻三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，入胡粉半钱匕，分温二服，不拘时候。

【主治】口干燥渴。

67599 栝楼根汤

《医方类聚》卷二三六。即《外台》卷三十四引《集验方》“栝楼汤”。见该条。

67600 栝楼根汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】天花粉 麦冬 知母 石膏 甘草

【主治】燥火喘逆。

67601 栝楼根汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】栝楼根 半夏 竹茹 枳壳 桔梗

【主治】肺胃二经痰多喘逆者。

67602 栝楼根汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】蒺藜根三两 人参一钱半 麦冬三钱（去心） 生地五钱 阿胶三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】口渴，脉虚数者。

【方论选录】产后血气两虚，胃家伏热不化，而消烁津液，故口渴不止，善饮善消焉。生地滋阴壮水以制火；麦冬清心润燥以生津；人参扶元补气，壮生水之源；蒺藜根清胃泻热，杜发渴之由；阿胶补阴益血，荣阳光之灼烁；炙草益胃缓中，资太阴之母气也。水煎温服，使胃热顿化，则血气并充，而津液得以上奉，

岂有口渴不止之患乎！

67603 栝楼根饮

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【异名】栝楼根汁（《卫生总微》卷十五）。

【组成】生栝楼根

【用法】上捣取汁二大合，蜜一大匙和匀，火暖分三服。

【主治】小儿忽发黄，面目皮肉并黄。

67604 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】栝楼根一两 黄芩一两 人参半两（去芦头） 桂心半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 梔子仁半两 川芒消一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候，如人行十里再服。以利为度。

【主治】伤寒，大肠秘涩。

67605 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】栝楼根 犀角屑 川升麻 麦门冬（去心） 葛根（锉） 甘草（炙微赤，锉） 梔子仁各三分

【用法】上为散。每服五钱，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气心脾壅热，烦闷口干。

67606 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】栝楼根一两 柴胡一分（去苗） 地骨皮一两 枳壳半两（麸炒微黄） 赤茯苓一两 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襴）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，加生地黄汁三合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】时气余热不退，发作有时。

67607 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】栝楼根三分 牛黄一分（细研） 白僵蚕半两（微炒） 白藓皮半两 子芩三分 滑石一分 胡黄连三分 川大黄半两

（锉碎，微炒）

【用法】上为细散。入牛黄研令匀，每服二钱，煎淡竹叶汤调下，不拘时候。

【主治】风热口中干燥，舌裂生疮。

67608 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根一两 芦根一两（锉） 麦门冬一两（去心） 知母一两 人参一两（去芦头） 地骨皮一两 黄芩一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，小麦半合，竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】暴渴，心神烦闷，体热食少。

67609 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根二两 赤茯苓二两 玄参一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 苦参三分（锉） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以温浆水调下，不拘时候。

【主治】渴利后心烦体热，皮肤生疮，瘙痒。

67610 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】栝楼根三两 榆白皮三两（锉） 胡燕巢土五两 麝壤土三两

【用法】上为细散。取芭蕉根汁和作稀膏。用涂肿上，干即更涂；如溃脓有头者，即四面涂之。

【主治】发背及诸毒肿。

67611 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】栝楼根一两 甘草一分（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 生干地黄一两 芦根二两（锉） 赤茯苓一两 益母草一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，枣二三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后烦渴，体热食少。

67612 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】栝楼根三分 黄芩半两 知母半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加小麦、粟米各一百粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿热渴不止，烦闷。

67613 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】栝楼根半两 苦参一分(锉) 人参一分(去芦头) 寒水石半两 甘草一分(炙微赤，锉) 石膏半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒热渴，头痛心烦。

67614 栝楼根散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】栝楼根半两 白茯苓半两 知母半两 黄芩半两 地榆半两(微炙，锉) 甘草半两(炙微赤，锉) 人参三分(去芦头) 黄柏半两(微炙，锉) 赤石脂一两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓服，不拘时候。

【主治】小儿热痢，体瘦，口干烦躁，不欲饮食。

67615 栝楼根散

《圣济总录》卷五十八。为方出《医心方》卷十二引《葛氏方》，名见《千金翼》卷十九“防己散”之异名。见该条。

67616 栝楼根散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】熟干地黄 生干地黄 葛根 栝楼根各等分

【用法】上药焙干，为细末。每服二钱，温米饮调下，不拘时候。

【主治】消渴，饮水不止。

67617 栝楼根散

《简易》引《桃溪方》(见《医方类聚》卷一二

五)。为《千金》卷二十一“栝楼粉”之异名。见该条。

67618 栝楼根散

《普济方》卷一七六。即方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一“栝楼散”。见该条。

67619 栝楼根散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】栝楼根三两 生人参一两半 生牡蛎三两 桑螵蛸三两(炙) 川黄连六钱 白芍药一两半(炒) 炙甘草一两半

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服

【主治】产后遗尿，脉濡数者。

【方论选录】产后气虚热炽，迫动水府，而溺不能藏，故烦热口渴，小便遗失不知焉。栝楼根清热止渴专除燥火，生人参扶元补气可固下元，川连清心脾之火，牡蛎涩热伤之阴，白芍药敛阴中之不足，桑螵蛸涩膀胱之溺窍，炙草缓中以益胃气也。为散水煎，使气充热化，则膀胱得操蓄泄之权，而水府自无遗漏之患，津液四沕，无不上敷下达，何有烦渴不解，遗尿溺不止哉。

67620 栝楼根煎

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】生栝楼根(去皮，细切)十斤 黄牛脂一合半(碎切，锅内慢火煎令消，去滓)

【用法】先以水三斗，煮生栝楼根至水一斗，用生绢绞，去滓取汁，纳牛脂搅令匀，再以锅中慢火煎，不住手搅，令水尽，候如膏状即止，于瓷盒中密盛。每服鸡子黄大，食后温酒调下，一日三次。

【主治】渴利。

67621 栝楼根羹

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】栝楼根半斤 冬瓜半斤

【用法】上切作小片子，以豉汁中煮作羹食之。

【主治】消渴口干，心神烦躁。

67622 栝楼涂方

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】生栝楼根

【用法】上锉细，捣研如糊。涂之，每日三五次。即愈。

【主治】发背已结成脓。

67623 栝楼粉粥

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】栝楼根

【用法】深掘大栝楼根厚削皮至白处止，以寸切之，水浸一口一夜，易水经五日，取出烂捣，碎研之，以绢袋滤之，如出粉法干之，作粉粥，乳酪中食之不限多少，取愈止。

【功用】《药粥疗法》：清热生津，止渴。

【主治】①《千金》：大渴。②《药粥疗法》：热病伤津，多饮，肺热干咳，消渴。

【备考】本方方名，《药粥疗法》引作“天花粉粥”。《药粥疗法》本方用法：栝楼根煎汁，去滓，或鲜者洗净后切片，煎取浓汁，同粳米煮粥。

67624 栝楼敷方

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】生栝楼根 豉等分

【用法】上捣作饼。敷之，干即易。

【主治】狐尿刺，疼痛不可忍。

67625 栝楼牛蒡汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】栝楼仁 牛蒡子（炒，研） 花粉 黄芩 生栀子（研） 连翘（去心） 皂刺 金银花 甘草（生） 陈皮各一钱 青皮 柴胡各五分

【用法】水二钟，煎八分，入煮酒一杯和匀，食远服。

【主治】胃火郁结之乳疽、乳痈，憎寒壮热，红肿焮热痛。

67626 栝楼牡蛎散

【方源】《金匱》卷上。

【异名】瓜蒌牡蛎散（《普济方》卷一四二）。

【组成】栝楼根 牡蛎（熬）各等分

【用法】上为细末。每服方寸匕，饮送下，一日三次。

【主治】百合病，渴不愈者。

【方论选录】《金鉴》：与百合洗身而渴不瘥者，内热甚而津液竭也。栝楼根苦寒，生津止渴，牡蛎咸寒，引热下行也。

67627 栝楼乳香散

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】栝楼一个（连皮子捣碎） 当归 净银花各三钱 白芷一钱 青皮五分 乳香五分 没药五分 甘草四分 蒲公英五钱

【用法】水煎，加酒温服。

【主治】产后乳疽、乳痈。

67628 栝楼桂枝汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】瓜蒌桂枝汤（《普济方》卷一三二）、桂枝加瓜蒌汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】栝楼根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚

【用法】以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。汗不出，食顷，啜热粥发之。

【主治】太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉。

【方论选录】①《法律》：即系湿热二邪交合，不当从风寒之表法起见，故不用葛根之发汗解肌，改用栝楼根味苦入阴，擅生津散热之长者为君，合之桂枝汤，和荣卫，养筋脉，而治其痉，乃变表法为和法也。②《金匱要略论注》：其原由筋素失养而湿复挟风以燥之，故以桂枝汤为风伤卫主治，加栝楼根以清气分之热而大润其太阳经既耗之液，则经气流通，风邪自解，湿气自行，筋不燥而痉愈矣。

【临床举例】小儿抽搐症 《陕西中医》（1985；7：304）：以栝楼桂枝汤治疗小儿抽搐症 60 例，其中男 38 例，女 22 例，年龄 1～6 岁，病程 1 月～2 年，属于热性病后遗症 25 例，不明原因者 35 例。处方：栝楼根 15 克，桂枝 8 克，白芍 12 克，炙草、生姜各 6

克,大枣5枚;气虚加党参,脾虚加白术,血虚加当归,阴虚加石斛,每日一剂,水煎服,服药忌食生冷油腻。结果,40例15天内治愈。18例1个月内治愈,2例无效,总有效率达96%。

【备考】本方方名,《法律》引作“栝楼根桂枝汤”、《幼幼集成》引作“瓜蒌根桂枝汤”。

67629 栝楼葛根汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】石膏 甘草 人参 栝楼根 葛根 防风

【主治】风温,无大热而渴。

【方论选录】缘风温之热邪内蕴,故借白虎加人参汤裁去知母、粳米,加栝楼根以清热解渴,葛根以布胃行津,防风以开表散邪,人参、甘草佐石膏、栝楼以化热,性虽甘温,当无助长伏邪之虞。

67630 栝楼瞿麦丸

【方源】《金匱》卷中。

【异名】瓜蒌瞿麦丸(《济阳纲目》卷九十二)。

【组成】栝楼根二两 茯苓三两 薯蓣三两 附子一枚(炮) 瞿麦一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,饮送下,一日三次;不知,增至七八丸。以小便利,腹中温为知。

【功用】《金匱要略讲义》:化气,利水,润燥。

【主治】小便不利者,有水气,其人苦渴。

【方论选录】①《金匱要略心典》:此下焦阳弱气冷,而水气不行之证,故以附子益阳气,茯苓、瞿麦行水气。观方后云“腹中温为知”可以推矣。其人苦渴,则是水寒偏结于下,而燥火独聚于上,故更以薯蓣、栝楼根除热生津液也。夫上浮之焰,非滋不息;下积之阴,非暖不消;而寒润辛温,并行不悖,此方为良法矣。欲求变通者,须于此三复焉。②《金鉴》:小便不利,水蓄于膀胱也。其人

苦渴,水不化生津液也。以薯蓣、花粉之润燥生津,而苦渴自止;以茯苓、瞿麦之渗泄利水,而小便自利;更加炮附宣通阳气。上蒸津液,下行水气,亦肾气丸之变制也。然其人必脉沉无热,始合法也。

【临证举例】①慢性肾小球肾炎 《成都中医学院学报》:(1981;1:59):刘某某,女,40岁,重庆建设银行职工,1964年12月20日初诊:水肿,小便不利一年许,口渴增剧,水肿加重两月左右。现证:全身水肿,口渴引饮,腰冷腿软,精神萎靡不振,纳差,每餐约一两米饭,小便不利,短少而淡黄,尿无热感,大便2~3天一次,不结燥,面色浮白,唇淡,无苔乏津,脉沉细。西医诊断为慢性肾小球肾炎,经服中西药,治疗一年左右疗效不显,近两月来,病情加剧,其人苦于渴饮,水肿愈增,小便淡黄短少,于是前来重庆市第二中医院就诊。此系肾阳不足,气化紊乱,形成上燥下寒之渴肿、小便不利证。拟以润燥生津,温阳利水主治,方用栝楼瞿麦丸改用汤剂,加鹿胶以填补精血。方药:栝楼根30克、淮山药30克、茯苓15克、瞿麦15克、制附片15克(另包,先煎两小时)、鹿胶12克(另包,蒸化兑服)。上方服二剂,口渴大减,饮水量减少一半,水肿亦大减,小便量增多而畅利,饮食增加,其余舌脉同上,效不更方,将原方再进二剂。口渴更减,小便畅利,水肿基本消失,饮食接近正常,大便正常,腰冷消失。现觉腰痠腿软,精神仍疲倦,夜尿3~4次,舌质淡,无苔微润脉沉细。于原方中将栝楼根改用15克,其余药物和剂量不变,嘱进二剂。服药后渴饮,水肿消失,饮食正常,精神比原来大有好转,时而仍感疲乏,尿色淡黄无热感,夜尿2~3次,腰痠腿软,面色接近正常,唇淡红,舌质淡,无苔津润,脉沉细。②癃闭 《山东中医杂志》:(1983;2:8):患者余某,年72岁,患小便点滴不通,曾用八正、五苓及西药利尿、导尿诸法均不效。患者拒用手术,经友人介绍余诊,诊见:口渴甚苦而不欲饮,以水果

自憩之,小便点滴不通,少腹胀急难忍,手足微凉,舌质淡胖有齿痕,苔黄腻偏干,脉沉细而数。诊为高年癃闭,投瓜蒌瞿麦丸加车前、牛膝、天花粉 12 克、瞿麦 10 克、茯苓 12 克、山药 12 克、牛膝 12 克、车前子 12 克(包)、熟附子 10 克。药服一剂,小便渐通,胀急略减,再三剂病去若失。

【备考】本方方名,《普济方》引作“瞿麦丸”。

67631 栝楼麝香散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】栝楼(新黄大者)一枚

【用法】上以刀开下顶子,不去瓢,选不蛀皂荚子填满,却取开下顶子盖,别用纸筋泥固济约三指厚,以炭火簇合烧令红,放一地坑内出火毒,一宿取出,加麝香末一钱,研令极细,入瓷盒盛。每服一钱匕,米饮调下,温酒亦得。服一剂,永除根本。

【主治】牝痔,及一切内外痔疮,疼痛不可忍者。

67632 栝楼根桂枝汤

《法律》卷四。即《金匱》卷上“栝楼桂枝汤”。见该条。

67633 栝楼薤白白酒汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】瓜蒌薤白白酒汤(《冯氏锦囊》卷七)。

【组成】栝楼实一枚(捣) 薤白半斤 白酒七升

【用法】上同煮,取二升,分温再服。

【主治】胸痹。喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数。

【方论选录】《古方选注》:君以薤白,滑利通阳;臣以栝楼实,润下通阴;佐以白酒,熟谷之气上行药性,助其通经活络,而痹自开。

67634 栝楼薤白半夏汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】瓜蒌薤白半夏汤(《济阳纲目》卷七十二)、瓜蒌薤白汤(《医醇剩义》卷四)、

瓜蒌半夏白酒汤(《医学金针》卷三)。

【组成】栝楼实一枚(捣) 薤白三两 半夏半斤 白酒一斗

【用法】上同煮,取四升,温服一升,日三服。

【主治】胸痹不得卧,心痛彻背者。

【宜忌】《外台》引《范汪方》:忌羊肉、饴。

【方论选录】①《金匱要略心典》:胸痹不得卧,是肺气上而不下也;心痛彻背,是心气塞而不和也,其痹为尤甚矣。所以然者,有痰饮以为之援也。故于胸痹药中加半夏以逐痰饮。②《古方选注》:君以薤白,滑利通阳;臣以栝楼实,润下通阴;佐以白酒熟谷之气,上行药性,助其通经活络而痹自开,而结中焦而为心痛彻背者,但当加半夏一味,和胃而通阴阳。

【临证举例】冠心病 《福建中医》(1988, 1: 41): 张某,男,54岁,干部。初诊自述心窝部闷痛彻背伴短气,间歇性发作已半个月,常于饭后或劳累时诱发,每次2~3分钟,心电图提示心肌供血不足,诊断为冠心病心绞痛。舌质淡暗,黄白腻,脉细弦,证为气滞血瘀所致之胸痹。处方:栝楼、薤白、葛根、丹参 15 克,半夏、当归各 10 克,赤芍、桑寄生各 12 克,水煎服。每日一剂,连服 5 剂后症减,原方去葛根,加郁金 10 克、黄耆 15 克,连服 30 剂,随访半年胸痛未复发。

67635 栝楼薤白桂枝汤

《金匱要略心典》卷中。为《金匱》卷上“枳实薤白桂枝汤”之异名。见该条。

桦

67636 桦皮汤

《奇效良方》卷六十五。为方出《证类本草》卷十四引陈藏器方,名见《伤寒总病论》卷四“桦皮饮子”之异名。见该条。

67637 桦皮散

【方源】《局方》卷八。

【组成】杏仁(去皮尖,用水一碗,于银铤

子内熬，候水减一半以来，取出放令干）荆芥穗各二两 枳壳（去瓤，用炭火烧存性，取出于湿纸上令冷）桦皮（烧成灰）各四两 甘草（炙）半两

【用法】上药除杏仁外，余药为末，去将杏仁别研令极细，次用诸药末旋旋入研令匀。每服二钱，食后温酒调下，一日三次。疮疥甚者，每日频服。

【主治】肺脏风毒，遍身疮疥，及瘾疹瘙痒，搔之成疮；面上风刺，及妇人粉刺。

67638 桦皮散

【方源】方出《证类本草》卷十四引《灵苑方》，名见《圣济总录》卷一二八。

【组成】真桦皮方寸匕。

【用法】以无灰酒服。卧及觉已愈。

【主治】乳痈初发、肿痛结硬欲成脓。

【备考】《圣济总录》本方用法：桦皮烧灰，酒服方寸匕。

67639 桦皮散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《庄氏家传》。

【组成】桦皮 头发 蛇蛻各半两

【用法】上锉细。净器内点火烧之，候烟尽，研细。每服半钱，煎黑豆汤，入酒三滴调下，一日五次。

【主治】小儿斑疮入眼，及裹黑睛。

67640 桦皮散

【方源】《普济方》卷三四七引《海岱居士秘方》。

【组成】桦皮手掌大一方 皂角子七个

【用法】上烧成灰。好酒空心调服。

【主治】吹奶。

67641 桦皮饮子

【方源】方出《证类本草》卷十四引陈藏器方，名见《伤寒总病论》卷四。

【异名】桦皮汤（《奇效良方》卷六十五）。

【组成】桦皮木

【用法】浓煮汁，冷饮。

【主治】豌豆疮。

【备考】《伤寒总病论》本方用桦皮木二两。

格

67642 格楞藤饮

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】格楞藤不拘多少

【用法】上捣汁。频呷，吐出恶涎立效。

【主治】咽喉肿痛。

桃

67643 桃汤

《外台》卷二十六。即《千金》卷十八“桃皮汤”。见该条。

67644 桃仁丸

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】桃仁八分 鳖甲六分（炙） 枳实六分（炙） 白术六分 桔梗五分 吴茱萸五分 乌头七分（炮） 槟榔五分 防葵五分 芍药四分 干姜五分 紫菀四分 细辛四分 皂荚二分（去皮子） 人参四分 橘皮四分 甘草四分（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，一日二次。

【主治】瘀癖气，漫心胀满，不下食，发即更胀连乳满，头面闭闷，咳气急者。

【宜忌】①《外台》引《延年秘录》：忌猪肉、苋菜。②《普济方》：忌海藻、菰菜、冷水、生菜、桃、李、雀肉。

67645 桃仁丸

【方源】方出《外台》卷十三引《救急》，名见《医方考》卷三。

【组成】毛桃仁一百二十枚（去皮及双仁，留尖）

【用法】上一味，捣令可丸。平旦以井花水顿服使尽。服讫，量性饮酒使醉，仍须吃水，能多最精，隔日又服一剂。

【主治】骨蒸。

【宜忌】百日不得食肉。

【方论选录】《医方考》：骨蒸日久，则络有

留血，不去其瘀，则诸药不效。《外台》此方，以桃仁独味为丸，所以消留瘀也，亦是超人之见。

67646 桃仁丸

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】桃仁八分（去皮尖） 当归六分 芍药八分 诃黎勒六分 甘草六分（炙） 延胡索四分 人参六分 槟榔十四枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心以酒送下，一日二次。取快利。

【主治】心痛，又心撮肋，心闷则吐血，手足烦疼，饮食不入。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生菜、热面、荞麦、猪犬肉、粘食。

67647 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 附子三分（炮裂，去皮脐） 硫黄三分（细研，水飞过） 茴香子三分 木香三分 高良姜三分（锉）

【用法】上为末，用煎醋浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏气虚，触冒风寒，冷气卒攻，脐腹疼痛。

67648 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 阿魏半两（面裹煨，面熟为度） 木香二分 干蝎半两（微炒） 槟榔一两 苦楝子半两 桂心半两 芫花半两（醋拌炒黄）

【用法】上为末，以醋浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸，以热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】盲肠气，疼痛不可忍。

67649 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】桃仁一斤（于新瓦器内用童便一斗煮，候小便尽取出，去皮尖，研如膏） 乌梅肉三两（微炒） 芫荽仁三两 黄连二两（去须）

【用法】上三味为末，入桃仁膏为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心以温水送下，晚食前再服。

【主治】急劳。

67650 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 鳖甲一两（涂酥，炙令黄，去裙襴） 柴胡一两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 天灵盖一两（涂醋，炙微黄） 麝香一分（细研） 龙胆一两（去芦头） 青蒿子二两

【用法】上为末，入麝香都拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用童便一小盏，入豉五十粒，煎五七沸，去滓，温酒送下。

【主治】热劳，肌体羸瘦。

【宜忌】忌苋菜。

67651 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】桃仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，微炒） 猪牙皂荚半两（涂酥，炙令微黑） 紫菀三分（去苗土） 鳖甲一两半（醋涂炙微黄，去裙襴） 芫花根一两 甜葶苈一两（炒令紫色） 白矾三分（烧令汁尽） 蛤蚧一对（涂酥，炙令微黄） 麝香一分（细研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】传尸，骨蒸，复连殄殒气，咳嗽。

67652 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两（煨，用皮） 诃黎勒一两（煨，用皮） 桂心一两 蓬莪术一两 青橘皮二两

(汤洗, 去白瓢, 焙) 槟榔二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以温酒送下, 不拘时候。

【主治】胸胁气连心, 疼痛不可忍。

67653 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桃仁二两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 海藻二两(洗去咸味) 泽泻 防风(去芦头) 防葵 桂心 青橘皮(汤浸, 去白瓢, 焙) 五味子 赤芍药 白蒺藜(微炒, 去刺) 地肤子 赤茯苓 细辛 牡丹各一两 狐阴一具(炙微黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心及晚食前以温酒送下。

【主治】阴癰肿痛。

67654 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 没药 安息香 乳香 麝香(细研) 木香 吴茱萸(汤浸七遍, 焙干微炒) 桂心各一分

【用法】上为末, 用蒸饼为丸, 如小豆大。每服二十丸, 以暖酒嚼下, 不拘时候。

【主治】心疝, 心腹痛, 四肢逆冷, 面色青黑。

【备考】方中桂心用量原缺, 据《医方类聚》补。

67655 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桃仁三合(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 豉三合(炒干) 川椒一两(去目及闭口者, 微炒去汗) 干姜一两(炮裂, 锉)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食前以温酒送下。

【主治】久疝癖气不消。

67656 桃仁丸

《圣惠》卷五十二。为《外台》卷五引《近效方》“常山丸”之异名。见该条。

67657 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 芎藭半两 白术半两 赤茯苓三分 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓢) 赤芍药半两 诃黎勒皮三分 槟榔半两 鳖甲一两半(涂醋, 炙令黄, 去裙襴) 羚羊角屑一两 柴胡一两(去苗) 人参一两(去芦头) 酸枣仁一两(微炒) 生干地黄一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以生姜、荆芥、薄荷汤送下, 不拘时候。

【主治】妇人头目昏重, 心神烦乱, 或时寒热, 肢节疼痛, 不欲饮食。

67658 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】桃仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 麝香半两(细研) 朱砂一分(细研) 水银一分(用枣肉研令星尽) 槟榔三分 阿魏半两 沉香半两 当归三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 空心桃仁汤送下。

【主治】妇人与鬼气交通。

【备考】①方中槟榔、阿魏、沉香、当归用量原缺, 据《医方类聚》补。②《女科指掌》无水银。

67659 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】桃仁三两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 虻虫四十枚(炒微黄, 去翅足) 水蛭四十枚(炒微黄) 川大黄三两(锉碎, 微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 空心以热酒送下。

【主治】①《圣惠》: 妇人腹内有瘀血, 月水不利, 或断或来, 心腹满急。②《圣济总录》: 伤寒八九日至十二日, 病不解, 发热如狂, 少腹满闷, 其脉沉结, 内有瘀血。

67660 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 牛膝一两(去苗) 当归一两(锉,微炒) 桂心半两 瞿麦半两 川大黄一两(锉,微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人月水不利,脐下结痛。

67661 桃仁丸

《圣惠》卷七十二。为《千金》卷四“桃仁煎”之异名。见该条。

67662 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】桃仁四十九枚(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 琥珀末一分 甜葶苈二分(隔纸炒令紫色)

【用法】上先捣葶苈、桃仁如泥,次下琥珀末,更捣令匀,同为丸,如绿豆大。每服五丸,煎桑根白皮汤化破服,一日三次。

【主治】小儿多咳嗽,咽中如呀呷声。

67663 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,微炒) 川大黄半两(锉,微炒) 赤芍药半两 防葵半两 半夏一分(汤洗七遍去滑) 桂心一分 赤茯苓半两 川椒一分(去目及闭口者,微炒令去汗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。三岁儿每服五丸,食前以温酒送下。

【主治】小儿阴癫,日夜疼痛。

67664 桃仁丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】桃仁丹(《幼幼新书》卷三十一引张涣方)、牡丹丸(《普济方》卷三九九)。

【组成】桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 牡丹半两 黄柏一分(微炙,锉) 白蒺藜三分(去刺) 桂心半两 郁李仁三分(汤浸,去皮,微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。三

岁儿每服七丸,食前以温酒送下。

【主治】小儿小肠虚冷,因多啼下,致令阴肿。

67665 桃仁丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】桃仁 杏仁(各汤浸,去皮尖双仁,细研) 各一两 款冬花 贝母各一两(捣细末,与前药和匀)

【用法】上先以沙糖一两,入桃子肉销溶后入药同熬黄熟,入臼捣丸,如弹子大。每服一丸,含化咽津。

【主治】咳嗽。

67666 桃仁丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒研,以酒二升煎成膏) 二两 木香 桂(去粗皮) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 茴香子(炒) 各半两 干姜(炮) 一分 槟榔(锉) 三分

【用法】上为末,入桃仁煎为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,空心温酒送下。

【主治】肾虚积气

67667 桃仁丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】桃仁(去皮尖双仁,炒令香) 一分(别研入) 安息香半两(别研入) 木香半两 诃黎勒(炮,去核) 一两

【用法】上药将木香、诃黎勒为末,与二味研了药相和,重细研,米饮为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心用暖浆水送下,日晚再服。

【主治】气痢久不愈。

67668 桃仁丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒黄) 牡丹皮 当归(微炒) 各三两 芎藭 土瓜根(去土,锉) 芍药 桂(去粗皮) 牛膝(酒浸,切,焙) 防风(去叉) 各二两 甘草(炙) 一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，空心温酒送下。

【主治】妇人月水不利，气血不和，脐下疼痛，面色萎黄，身体羸瘦，饮食不下。

67669 桃仁丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄） 泽泻 白茯苓（去黑皮） 芍药 瞿麦（用穗） 干姜（炮裂） 生干地黄（焙） 甜葶苈（纸上炒） 当归（切，焙） 甘草（炙） 芎藭各一两 大黄（铤，炒）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下；米饮亦得。

【主治】妇人因月水不利，血结成积，气攻疼痛。

67670 桃仁丸

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】草乌头（生用） 五灵脂三两 桃仁（取霜）一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。以青黛为衣。每服五丸，嚼胡桃仁以温酒送下。

【主治】一切风毒，遍身疼痛，四肢拘急。

【备考】方中草乌头用量原缺。

67671 桃仁丸

【方源】《普济方》卷二一七引《卫生家宝方》。

【组成】桃仁（麸炒，去皮尖双仁） 石菖蒲（去石） 茴香（炒） 苍术（米泔浸一宿，去皮） 胡芦巴（炒） 陈皮（去白）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心温酒盐汤送下。

【主治】心肾脾俱虚，水火不相济，少饮多惊，遗溺失精，日渐羸瘦。

67672 桃仁丸

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】桃仁（浸，去皮，麸微炒）三钱 辣桂 牵牛（微炒，碾取仁） 白蒺藜（炒香，捣去刺） 牡丹皮 北大黄各二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸或七丸，青皮、木通、葱白人盐少许，煎汤送下；或煎大流气饮研青木香丸送下。

【主治】小儿阴肿。

【备考】方中牵牛，《袖珍小儿》作黑豆。

67673 桃仁丸

【方源】《普济方》卷三三二引《仁存方》。

【组成】桃仁（去皮，炒）一两半 虻虫四十九个（去翅足，炒） 大黄五钱 朱砂三钱 水蛭四十九个（米内炒二味） 穿山甲（炙）三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，如服未效，加至二十丸，空心温酒送下。下恶滞血片，脐下痛却，吃四物汤五七服效。

【主治】妇人脐腹积滞，月经不调，疼痛气闭，腰腿倦弱，寒热，带下冷脓。

67674 桃仁丸

【方源】《普济方》卷三一九。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 芎藭 白术各半两 赤茯苓三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 赤芍药半两 柴胡一两（去黄） 诃黎勒皮三分 人参一两（去芦头） 酸枣一两（微炒） 生干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜、荆芥、薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】妇人头目昏重，心神烦乱，或时寒时热，骨节疼痛，不欲饮食。

67675 桃仁丹

《幼幼新书》卷三十一引张涣方。为《圣惠》卷九十二“桃仁丸”之异名。见该条。

67676 桃仁方

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桃仁五百颗（大者） 吴茱萸三两

【用法】上药相和，入净铁铛中，著微火炒，经一炊久，取桃仁一颗，捻去皮，看似微黄色，即渐加火令极热，铛中微烟出，即乘热取出，于新瓷瓶子盛，厚著纸封瓶口，勿令泄气。每日空心，只取桃仁二十颗，捻去皮，烂嚼，以温酒下。至重者服五百颗即愈。

【主治】冷劳气，不能饮食，渐加黑瘦。

67677 桃仁方

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）

【用法】上药捣如泥，拈如枣核大，谷叶裹，塞耳中；或以故绯帛裹亦佳。

【主治】聤耳，出脓血。

67678 桃仁汤

【方源】《外台》卷七引《集验方》。

【组成】桃仁（去皮尖） 吴茱萸 橘皮 海藻各三两 生姜 茯苓 羌活 蒺藜子（去角）各三两

【用法】上切。以水三大升，煮取九合，分为三服，空心服。

【主治】疝气

【宜忌】忌酢物。

【备考】《圣济总录》有桂、槟榔。

67679 桃仁汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】桃仁五两 吴茱萸二升 黄耆 当归 芍药各三两 生姜 醍醐（百炼酥） 柴胡各八两

【用法】上咬咀。以酒一斗，水二升，合煮取三升，去滓，适寒温，先食服一升，一日三次。

【主治】①《千金》：产后往来寒热，恶露不尽。②《圣济总录》：妊娠堕胎后，血不出腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》：此因恶露不通而见往来寒热，故用桃仁、芍药散血，即兼黄耆、当归补血。柴胡、吴茱萸、生姜专为寒热而设，吴茱萸散内痹之血，柴胡、生姜开外郁之气。用醍醐者，专通血结，产母痹约之故，若大便不固，殊非所宜，观后柴胡汤可知。

67680 桃仁汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】桃仁 朴消 牡丹皮 射干 土瓜根 黄芩各三两 芍药 大黄 柴胡各四两 牛膝 桂心各二两 水蛭 虻虫各七十枚

【用法】上咬咀。以水九升，煮取二升半，去滓，分三服。

【主治】妇人月水不通。

【方论选录】《千金方衍义》：桃仁汤前后二方，咸本之于抵当汤。其间虻、蛭、消、黄、桃仁、桂心、牛膝、土瓜根等味皆同。而前方用柴胡、黄芩之意，必是干血内逆，热蒸于上，故用少阳经药，兼射干降而泄之，牡丹、芍药，不特和营，兼滋肝血，使之得润而可渐通也。其后方用当归滋燥，即前方牡丹、芍药和营之意。用麻仁润下，即前方射干降泄之意。此无蒸热，故不用少阳经药也。

67681 桃仁汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】桃仁一升 当归 土瓜根 大黄 水蛭 虻虫 芒消各二两 牛膝 麻子仁 桂心各三两

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升半，去滓，纳消令烊，分为三服。

【主治】月经不通。

67682 桃仁汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】桃仁五十枚 泽兰 甘草 芎蒭 人参各二两 牛膝 桂心 牡丹皮 当归各三两 芍药 生姜 半夏各四两 地黄八两 蒲黄七合

【用法】上咬咀。以水二斗，煮取六升半，分六服。

【主治】产后及堕身月水不调，或淋漓不断，断后复来，状如泻水，四体嘘吸不能食，腹中坚痛不可行动，月水或前或后，或经月不来，举体沉重，惟欲眠卧，多思酸物。

【方论选录】《千金方衍义》：此方专调土衰木败。方中芎蒭、芍、地，专调冲脉之虚；参、

甘、姜、半，专扶胃气之衰；桃、丹、蒲、泽，专疏胞宫之滞；桂心、牛膝，一破坚结，一润血枯，血润而下行无阻，坚结散而正气自调，当无前后失期之患矣。

67683 桃仁汤

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《张氏医通》卷十四。

【组成】荆芥半分 廔虫三十枚 大黄芎蒭各三两 蒲黄五两 当归 桂心 甘草各二两 桃仁三十枚

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】腹中瘀血，痛在腹中不出，满痛短气，大小便不通。

【方论选录】《千金方衍义》：破瘀诸汤莫如桃仁承气、抵当、下瘀血三方，最为吃紧。此于桃核承气采用其四，抵当汤中采用其二，下瘀血汤全用其三。既有廔虫，可无藉于虻、蛭，既非坚积，可无取于芒消，加荆芥、芎蒭、蒲黄、当归，缓散其血，以和上药之迅也。

67684 桃仁汤

【方源】《千金》卷二十五。

【异名】桃仁散（《圣惠》卷六十七）。

【组成】桃仁十四枚 大黄 消石 甘草各一两 蒲黄一两半 大枣二十枚

【用法】上咬咀。以水三升，煮取一升，绞去滓，适寒温，尽服之。当下。下不止，渍麻汁一杯饮之即止。

【主治】从高堕下，落大木车马间，胸腹中有血，不得气息。

【方论选录】《千金方衍义》：于桃核承气汤中，退芒消而用消石，退桂心而用蒲黄，虽大展神通，移寒变热而功用一揆，乃南阳先师法外之法。加大枣以运脾津，行药力，仍不出南阳先师法中之法也。

67685 桃仁汤

【方源】《千金》卷二十五。

【异名】桃仁散（《圣惠》卷六十七）。

【组成】桃仁五十枚 大黄四两 芒消三

两 桂心 当归 甘草各二两 虻虫 水蛭各二十枚

【用法】上咬咀。以水八升，煮取三升，绞去滓，适寒温服一升，一日三次。

【主治】①《千金》：堕落瘀血。②《圣济总录》：妇人因冷血瘀不通，结积脐腹，发为气痛，经水痞涩，面黄体瘦。

【方论选录】《千金方衍义》：兼并桃核承气、抵当汤、丸，加当归以和血止痛，攻血之峻剂也。

67686 桃仁汤

【方源】《幼幼新书》卷三十引《婴童方》。

【组成】桃仁二十个（去皮尖）

【用法】以酒一升，煮三沸，去滓，量儿与之。

【主治】小儿暴不得小便。

67687 桃仁汤

【方源】方出《圣惠》卷八十八，名见《圣济总录》卷一七七。

【组成】桃仁二十枚（汤浸，去皮尖，生研用）

【用法】上以水一中盏，煎至五分，去滓，量儿大小，分减与服。当吐为效。如不吐，即非是症也。

【主治】小儿尸疰，劳瘦，或时寒热。

67688 桃仁汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒令黄） 陈曲（炒） 大麦蘖（炒） 桑耳各一分 白术 桂（去粗皮）各一分

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盏，煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后心腹胀痛。

67689 桃仁汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【异名】治惑桃仁汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷三）。

【组成】桃仁（去皮尖双仁，炒） 槐子 艾各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加大枣三枚（擘破），煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒狐感蠱病。

67690 桃仁汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）二两 白术一两 芎藭 附子（炮裂，去皮脐）各三分 葶澄茄半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，盐少许同煎，取七分，去滓，食前稍热服，一日三次。

【主治】肾劳虚损，心腹胀满，骨节烦疼。

67691 桃仁汤

《圣济总录》卷九十三。为《圣惠》卷三十一“桃仁散”之异名。见该条。

67692 桃仁汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄）十枚 干姜（炮） 芍药 当归（微炒） 芒消 吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒）各半两 大黄（锉，炒）一两半 甘草（炙）一分 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓服。血快即止。

【主治】妇人月水不利，脐腹撮痛。

67693 桃仁汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄）十五枚 干姜（炮裂） 木香（炮） 芍药 吴茱萸（微炒） 当归（微炙）各一两 甘草（炙）半两 桂（去粗皮）一两半 大黄（锉碎，炒熟）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞。煎至七分，去滓，加芒消少许，更煎一二沸，温服。

【主治】月水不利，或将下，少腹痛。

67694 桃仁汤

《圣济总录》卷一七四。为《圣惠》卷四十三“桃仁散”之异名。见该条。

67695 桃仁汤

《圣济总录》卷一七四。为《圣惠》卷八十三“桃仁散”之异名。见该条。

67696 桃仁汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】桃仁散（《医略六书》卷三十）。

【组成】苏木 地黄 桃仁（去皮尖，炒）各半两 虻虫（去头足翅，炒） 水蛭（炒）各三十枚

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，煎至一盞，去滓温服。恶露行即住服。

【功用】《景岳全书》：逐瘀血。

【主治】恶露顿绝，或渐少，腰重痛，下注两股，刺痛如锥刀刺，留血于经络，不即通之，大有痛处，必作痼肿。

【方论选录】《医略六书》：产后瘀血不化，遏热于经，而经脉不利，故腰痛不止焉。桃仁破瘀润燥，生地凉血退热，苏木疏经气以破血，虻虫破瘀血以通经，水蛭攻瘀积以流走经络也。水煎温服，使瘀血消化，则遏热自解，而经脉清和，何腰痛之不止哉！

67697 桃仁汤

【方源】《幼幼新书》卷十七引张涣方。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖并双仁者，麸炒黄） 鳖甲（酥炙微黄）各一两 桂心 黄芩 赤茯苓 川升麻各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，水一小盞，煎至五分，去滓温服。

【主治】疟疾。

67698 桃仁汤

【方源】《产孕集》卷下引《妇人良方》。

【组成】桃仁二钱（炒） 杏仁二钱（炒） 当归 贝母各二钱 茯苓二钱 干姜 人参各五分

【用法】若咳逆不止欲死者，以肉桂五钱，姜汁三合同熬，稍服半合许，以手摩肺俞令热，以余汁涂之，时摩时涂，汁尽即愈。

【主治】产后血下少，瘀血入肺，窒碍气道所致的气喘。

67699 桃仁汤

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】木馒头(切碎,用葱炒) 桃仁(盐炒)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,温酒下。

【主治】小儿吊症。

67700 桃仁汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】大桃仁(炒,去皮尖) 茺萸 桂枝 葵藜 青皮 白茯苓 槟榔 木香 海藻 三棱 莪术

【主治】癰疽。

67701 桃仁汤

《普济方》卷三一一。为《外台》卷二十九引《深师方》“桃枝汤”之异名。见该条。

67702 桃仁汤

【方源】《普济方》卷三八八。

【组成】茴香 紫苏 槟榔各一两 木通 当归 人参 巴戟(去心) 赤茯苓各三钱 桃仁(炒,去皮)半两

【用法】上咬咀。每服一钱,水半盏,煎三分,去滓,食前服。

【主治】小儿气淋,水道不通,余沥疼痛。

67703 桃仁汤

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】桃仁 大黄(炒) 牡丹皮 芒消 犀角(镑) 冬瓜仁(研)各二钱

【用法】水煎,入犀角末服。

【主治】肠痈,腹中痛,烦躁不安,壅痛,大便秘涩,亦有绕脐生疮者,但用此药无妨。

67704 桃仁汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】桃仁三钱(研如泥) 丹皮一钱 当归一钱 赤芍一钱 阿胶二钱 滑石二钱

【用法】水煎服。

【主治】疫邪干扰血分所致的溺血。

【加减】小腹痛,按之硬痛,小便自调,有蓄血也,加大黄三钱

【方论选录】《瘟疫论评注》:方以活血祛瘀的桃仁为主,配合丹皮清热凉血,赤芍、当归

活血散瘀,再加滑石、阿胶滋阴清热利尿。全方纯从血分入手,对治疗疫邪干扰膀胱血分而引起尿血等具有一定作用。

67705 桃仁汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】桃仁(炒,研)十粒 当归三钱 牛膝二钱 泽兰三钱 苏木一钱

【用法】水煎,热酒冲,空心服。

【主治】产后腰痛。

67706 桃仁汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归尾 赤芍 生地黄 香附(童便制) 牡丹皮 红花 玄胡索 桃仁(另捣如泥,冲服)

【用法】水煎,临服时入桃仁泥,空心服。

【主治】经来腰腹痛,而气滞血实者。

【加减】形瘦有火,加条芩、黄连;形肥多痰,加枳壳、苍术、半夏。

67707 桃仁汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】桃仁 归尾 赤芍 大黄 牙皂

【用法】上为末。每服二钱,葱酒调下。

【主治】血疝,瓜形,藏小腹。

67708 桃仁饮

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 酸枣仁(炒) 人参 赤茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 丁香 甘草(炙,锉)各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,临卧顿服。

【主治】注气,肩膊刺痛不移。

67709 桃仁酒

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《鸡峰》卷十一。

【组成】桃仁三升(去皮,捣)

【用法】着器中,密封头,蒸之一饮,倾出晒干,绢袋贮,以纳二斗酒中六七日。可饮四五合,稍增至一升。

【主治】猝得咳嗽。

67710 桃仁酒

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《食医心镜》，名见《三因》卷十三。

【组成】桃仁一升（去皮尖者）

【用法】熬令黑烟出，热研，捣如脂膏，以酒三升，搅令相和。一服取汗，不过三愈。

【主治】风劳毒肿疼，挛痛，或牵引小腹及腰痛。

67711 桃仁酒

《圣惠》卷九十五。为《千金》卷三“桃仁煎”之异名。见该条。

67712 桃仁散

【方源】《千金》卷四。

【异名】薏苡仁散（《圣济总录》卷一五一）。

【组成】桃仁五十枚 虻虫二十枚 桂心五寸 茯苓一两 薏苡仁 牛膝 代赭各二两 大黄八两

【用法】上药治下筛。宿勿食，每服一钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】月经来，绕脐痛，上冲心胸，往来寒热，如疟症状。

【方论选录】《千金方衍义》：经来绕脐冲痛，明系干血上逆；往来寒热如疟疾，乃是血室受病，血属少阳也。本方《金匮》下瘀血汤加桂心以破干血，代赭以镇逆气，牛膝、茯苓、薏苡以资诸药润下之力也。

67713 桃仁散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 桂心一两 白术三分 神曲三分（炒令微黄） 麦蘖三分（炒令微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒，心腹胀满疼痛。

67714 桃仁散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桃仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 槐子一两（微炒） 熟艾二两（微炒） 黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒，虻虫蚀下部，躁闷痒痛不已。

67715 桃仁散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 诃黎勒二两（煨，用皮） 桂心一两 半夏一两（汤洗七遍去滑） 五味子一两 槟榔一两 木香一两 赤芍药一两 鳖甲二两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 人参一两（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 白术一两 柴胡一两半（去苗） 京三棱一两（煨，锉） 郁李仁一两（汤浸，去皮尖双仁）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺劳上气，胸满，痰唾不利，右胁有积聚，发歇寒热，肌体羸瘦，食少无力。

67716 桃仁散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 鳖甲（涂酥，炙令黄，去裙襕） 白术 附子（炮裂，去皮脐） 诃黎勒（煨，用皮） 各一两 芎藭 丁香 桂心 毕澄茄 当归 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 各三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至七分，去滓，食前稍热服。

【主治】风劳，脾肾虚冷，心腹胀疼，骨节烦痛，食少无力。

【宜忌】忌苋菜。

67717 桃仁散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桃仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄二两（锉碎，微炒） 鳖甲一两（涂酥，炙微黄，去裙襕） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 诃黎勒一两半（煨，用皮） 京三棱一两（炮裂） 木香半两 桂心半两 当归一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】虚劳，积聚结块，心腹肋肋刺痛。

【宜忌】忌菹菜、生冷。

67718 桃仁散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】桃仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒) 木香半两 京三棱三分(炮，锉) 芎藭半两 桂心半两 白术三分 青橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 柴胡一两(去苗) 诃黎勒三分(煨，用皮) 高良姜二分(锉) 当归半两 槟榔半两 赤芍药半两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】气劳羸瘦，膈肋痞坚，脐下冷疼，不欲饮食。

67719 桃仁散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【异名】桃仁汤(《圣济总录》卷九十三)。

【组成】桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 赤茯苓一两 鬼箭羽三分 赤芍药三分 人参三分(去芦头) 陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙) 槟榔四枚 麝香二钱(细研入)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】传尸、复连、鬼气，发即四肢无力，日渐黄瘦，乍恶乍好，不能食。

67720 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】桃仁汤(《圣济总录》卷一七四)。

【组成】桃仁三七枚(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟) 人参半两(去芦头) 陈橘皮一分(汤浸，去白瓤，焙) 麦蘖半两(微炒) 槟榔半两 附子一两(炮裂，去皮

脐) 桂心一两 当归一两(锉，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】冷邪气攻心腹痛，不欲饮食。

67721 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 桑根白皮一两 赤茯苓一两 槟榔一两 陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙) 紫苏茎叶一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心腹鼓胀，喘促不欲食。

67722 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研入) 牵牛子一两(微炒) 槟榔半两 青橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 木香半两 茴香子一两(微炒) 郁李仁一两(汤浸，去皮，微炒，研入)

【用法】上为细散，研入桃仁、郁李仁令匀。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】奔豚气，上攻心胸，喘闷胀满。

67723 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒) 川乌头一两(炮裂，去皮脐) 槟榔一两 木香一两 当归一两(锉，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】痼气急痛，不能饮食。

67724 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 鳖甲二两半(涂醋，炙令黄，去裙襕) 京三棱一两(炮，锉) 当归三分(锉，微炒) 肉桂一两(去皱皮) 木香半

两 枳实一两(麸炒微黄) 槟榔三分 川大黄三分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】久积癥癖,气结不散,面色萎黄,羸瘦食少。

67725 桃仁散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 防葵一两 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 赤茯苓一两 白术三分 赤芍药三分 京三棱一两(微煨,锉) 桂心三分 甘草半两(炙微赤,锉) 鳖甲三两(涂醋,炙令彻黄,去裙襴) 川大黄一两半(锉碎,微炒) 槟榔一两 芎藭三分 当归三分(锉,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】癖结,气积聚不散。

67726 桃仁散

【方源】方出《圣惠》卷五十,名见《普济方》卷二〇五。

【组成】桑根白皮一两(锉) 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 木香半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,心胸妨闷,常欲呕吐,汤水不下。

67727 桃仁散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 桂心一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 肉豆蔻半两(去壳) 木香半两 皂荚仁二两(炒令黄熟) 白芍药半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮

调下。

【主治】气痔脱肛,肠胃久冷,腹胁虚胀,不思饮食。

67728 桃仁散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】桃仁半两(汤浸,去皮尖,生研令细) 当归一分(捣末) 牵牛子半两(生,捣末) 琥珀末一分 膩粉一分

【用法】上药都研拌匀,分为三服。生地黄二两、生姜一两(切细,炒令紫色),入小便一小盏,酒一大盏,煎至一大盏,去滓,空心调下一服。当取下恶血,疼痛立定。

【主治】从高坠下,伤损,腹中血瘀滞疼痛。

67729 桃仁散

《圣惠》卷六十七。为《千金》卷二十五“桃仁汤”之异名。见该条。

67730 桃仁散

《圣惠》卷六十七。为《千金》卷二十五“桃仁汤”之异名。见该条。

67731 桃仁散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 桂心一两 当归一两(锉,微炒) 延胡索一两 川大黄一两(锉碎,微炒) 阿胶二两(捣碎,炒令黄燥) 乱发如鸡子大 生干地黄一两 芎藭一两 川椒半两(去目及闭口者,微炒去汗)

【用法】上为末。用酒二升,先煎发并阿胶如糖,用绵滤去滓,然后下诸药末,调令匀,焙干,为细散。每服二钱,以温酒调下,一日三四次。

【功用】接骨止痛。

【主治】伤折疼痛。

67732 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】桃仁二分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 桂心半两 柴胡一两(去苗) 鳖甲一两半(涂醋,炙令黄,去裙襴) 琥珀三分(细研) 延胡索三分 牛膝一两(去苗) 紫苑半两(洗去苗土) 细辛半两 羌

活半两 芎藭半两 木香半两 川大黄半两
(锉碎, 微炒) 羚羊角屑一两 当归半两
(锉碎, 微炒) 虎杖半两(锉) 白术半两
赤芍药半两

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】妇人血风劳气, 经脉久滞, 或时寒热, 四肢疼痛, 不思饮食。

67733 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】桃仁半两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 鳖甲二两(涂醋, 炙令黄, 去裙襴) 琥珀一两(细研) 肉桂一两(去粗皮) 赤芍药三分 当归三分(锉碎, 微炒) 白术三分 木香半两 诃黎勒皮半两 干姜半两(炮裂, 锉) 人参半两(去芦头) 延胡索三分 赤茯苓三分 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓤, 焙) 牛膝三分(去苗)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】妇人冷劳气滞, 经脉不通, 腹肋妨闷, 四肢羸瘦, 不思饮食。

67734 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】桃仁半两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 柴胡一两(去苗) 鳖甲一两(涂醋, 炙令黄, 去裙襴) 厚朴三分(去粗皮, 涂生姜汁, 炙令香熟) 槟榔三分 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓤) 乌梅肉三分(微炒) 赤芍药三分 白术三分 甘草半两(炙微赤, 锉) 川大黄一两(锉碎, 微炒)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前稍热服。

【主治】妇人瘀癖气, 令人羸瘦, 寒热食少。

67735 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 鳖甲一两(涂醋, 炙令黄, 去裙

襴) 桂心一两 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓤) 桑寄生一两 芎藭一两 槟榔一两 郁李仁一两(汤浸, 去皮, 微炒)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前温酒调服。

【主治】妇人疝瘕, 腹中拘急, 心胁胀满。

67736 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 诃黎勒皮三分 白术三分 当归三分 京三棱一两(微炮, 锉) 赤芍药三分 鳖甲一两半(涂醋, 炙令黄, 去裙襴) 陈橘皮三分(汤浸, 去白瓤, 焙)

【用法】上为散。每服三钱, 水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前稍热服。

【主治】妇人癥痞, 心腹胀满, 不能饮食, 体瘦无力。

67737 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 泽兰二两 牛膝二两(去苗) 当归二两(锉, 微炒) 桂心二两 牡丹二两 赤芍药二两 生干地黄二两 甘草一两(炙微赤, 锉) 半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 蒲黄二两 芎藭二两

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓温服, 一日三次。

【主治】妇人月水不调, 或淋漓不断, 断后复来, 状如泻水, 四体虚弱, 不能饮食, 腹中坚痛, 举体沉重, 唯欲眠。

67738 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 茜根一两半 虻虫二七枚(微炒, 去翅足) 水蛭二七枚(炒令微黄) 赤芍药一两 木通一两(锉) 川芒消一两 川大黄一两半(锉碎, 微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，空腹温服，如人行十里再服。良久当利下黑血黄涎，亦如泔涎。如下不多，次日再服，使令绝其根本。

【主治】妇人月水不通，年月深远，面上𦞦𦞦，黑如𦞦墨，每思咸酸之物，食之不已，意无足时，此由凝血在脏，热入血室，即歌咏言笑，悲泣不止。

【宜忌】一月以上不得吃面并驴、马、猪、牛等肉。

【备考】《医方类聚》引本方有琥珀一两。

67739 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药三分 琥珀三分 延胡索三分 芎藭半两 鬼箭羽一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桂心半两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后余血不散，结成癥块，疼痛。

67740 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 葵子一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 甜瓜子一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 槟榔一两 当归一两（锉，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后大小便秘涩，心腹胀满，时时抽撮疼痛。

67741 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十。

【异名】牡丹皮汤（《圣济总录》卷一六〇）。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 生干地黄一两 蓬莪术一两 槟

榔一两 牛膝三分（去苗） 桂心三分 牡丹三分 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，脐腹气滞，时攻肋肋疼痛。

67742 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤芍药 芎藭 当归（锉，微炒） 菴蒿子 桂心 琥珀 鬼箭羽各三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不尽，腹肋疼痛。

67743 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归半两（锉，微炒） 木香半两 芎藭半两 干姜一分（炮裂，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后恶露不尽，腹肋疼痛。

67744 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 蓬莪术三分 桂心半两 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后败血不散，上冲心腹，痛不可忍。

67745 桃仁散

《圣惠》卷八十一。为《千金》卷三“桃仁芍药汤”之异名。见该条。

67746 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】桃仁汤（《圣济总录》卷一七四）。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 赤芍药 桔梗(去芦头) 桂心各半两 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿心痛不可忍。

67747 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 知母半两 鳖甲三分(涂醋,炙微黄,去裙襴) 赤茯苓三分 川升麻半两 黄芩半两 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】小儿疟疾,发歇寒热,小便赤黄。

67748 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】桃仁三七枚(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 木香一分 人参一分(去芦头) 虎头骨一分(涂酥,炙令黄) 槟榔一分 京三棱一分(微煨,锉) 白芥子一分 款冬花半两 朱砂半两(细研,水飞过) 麝香一分(细研) 干桃柳叶各半两 桂心一分

【用法】上为细散。每服半钱,以温水调下,不拘时候。

【主治】小儿尸疰、鬼辟,心腹往来疼痛,或加寒热恍惚,形色多般。

67749 桃仁散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒) 木香 狗脊 白芫荑 狼牙草 苦楝根皮(锉) 鹤虱 槟榔各半两

【用法】上为细散。三岁儿每服半钱,煎苦楝根汤调下,一日三四次。

【主治】小儿蛔虫咬心痛。

67750 桃仁散

【方源】《普济方》卷一三七引《博济》。

【组成】桃仁一两(汤浸,去皮尖) 大黄

一两(川者,以湿纸裹煨两度) 桂心一两(去皮) 甘草半两(炙) 牙消一两

【用法】上锉细,熟炒,杵罗为末。每服三钱,用温水调下,不拘时候。如伤寒后有余毒,依法服。

【功用】疏利脏腑。

【主治】伤寒狂乱,霍乱心疼。

67751 桃仁散

【方源】《传家秘室》。

【组成】桃仁(去皮尖,炒令黄) 赤茯苓一两 赤芍药三分 人参三分 陈皮三分 槟榔四个 麝香一钱

【用法】上为细末。每服三钱,加生姜半分,水一盏,煎至六分,和滓,早、晚食前服。

【主治】室女传尸伏连。

67752 桃仁散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)二两 刘寄奴(去根,锉碎) 蓬莪术(炮,细锉) 当归(炙,锉) 茴香子(微炒) 乌药(锉) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 桂(去粗皮) 干姜(炮,锉) 木香 附子(炮裂,去皮脐) 芎藭 白术 桑黄(锉) 高良姜(锉) 各一两

【用法】上为细末。每服二钱匕,温酒或醋汤调下,空心、晚食前服。

【主治】妇人因月水不通,血积不散,气攻疼痛,积聚成块。

67753 桃仁散

【方源】《普济方》卷三一引《圣济总录》。

【组成】好大黄二两 桃仁三十枚(去皮尖及双仁)

【用法】上捣,以水五升,煮取三升,分为三服。去血后,作地黄酒服,随能服多少,或用酒一碗煎,去滓服之。

【主治】从高坠下伤内,血在腹聚不出。

【宜忌】血过百日,或微坚者,不可复下之,虚极杀人也。

67754 桃仁散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】桃仁 当归 干姜 白芷 芎各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水七分，酒三分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血气不调，脐腹撮痛，及产后小腹痛。

67755 桃仁散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】白茯苓（去皮） 五灵脂（去沙土） 马兜铃各半两 杏仁三十枚（去皮尖，蛤粉炒） 桃仁二十枚（去皮尖，蛤粉炒）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏半，加萝卜三片，同煎至一盏，去滓，加黄蜡一块，如皂子大，再煎候蜡熔，食后、临卧通口服。

【主治】远年一切肺疾，咯吐脓血，渐成劳证。

67756 桃仁散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】桃仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄） 大腹子（面裹煨黄色） 白术 赤茯苓（去皮） 紫苏子各一两 木香 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，煎紫苏汤调下，不拘时候。

【主治】脾弱下虚，气不升降，荣卫不调，水道不利，三焦不顺，面目虚浮，环脐肿胀，坐卧不安。

67757 桃仁散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】杜牛膝散（《得效》卷十五）、桃花散（《普济方》卷三三三）。

【组成】红花 当归（洗，焙） 杜牛膝 桃仁（焙）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，空心、食前温酒调下。

【主治】妇人、室女血闭不通，五心烦热。

67758 桃仁散

《妇人良方》卷七。为《圣惠》卷七十一“蛇虫散”之异名。见该条。

67759 桃仁散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】桃仁不拘多少（螺粉炒却，不用粉）

【用法】上为细末。空心酒调服。

【主治】①《朱氏集验方》：男子脾痛不可忍。②《外科大成》：阴肿作痒。

67760 桃仁散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】荆芥半两 大黄（生用） 蒲黄各二两 芎蒭 桂 木通 当归各一两 桃仁四十枚（汤浸，去皮尖，麸炒）

【用法】上为细末。每服二钱，用温酒调下，不拘时候。微利为度。

【主治】被压竿损，瘀血在腹中，疔痛不散，心胸短气，大小便不通。

67761 桃仁散

【方源】《普济方》卷三二四。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 芎蒭 槟榔

【用法】上为散。每服四钱，水一盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温酒服之。

【主治】妇人疝瘕，腹中拘急，心胁胀满。

【备考】方中芎蒭、槟榔用量原缺。

67762 桃仁散

【方源】《普济方》卷三五—。

【组成】桃仁六十枚 厚朴一两 芍药一两 当归一两

【用法】以水三升，煎二升，分二服。

【主治】妇人产后血下不尽，腹痛不可忍。

【加减】未愈，加锦纹大黄一两。

67763 桃仁散

【方源】《上清紫庭追癆仙方》。

【组成】桃仁（汤泡，去皮尖，面炒令黄） 赤茯苓各一两（去皮） 芍药 人参各三分 槟榔四个 陈皮三分（去白） 犀角 安息香各一分 麝香二钱

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜五片，

水一盏，煎至六分，早、晚食前服。若取下虫头赤，便服天竺黄饮子补护心脏，未取下虫，亦须先服之护心。

【主治】妇人室女一切蓄热，腹内闷着，骨蒸，室女经脉不行，瘦劳肌热。

67764 桃仁散

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】桃仁 葵子 滑石 槟榔各等分

【用法】上为细末。每服二钱，空心葱白汤调下。

【主治】妇人膀胱气滞血涩，大小便闭。

【方论选录】《医略六书》：产后稟厚体充，房劳过度而血瘀气滞，故小腹胀满疼痛，大小便秘涩不通焉。桃仁破瘀血以润大肠，槟榔破滞气以通气化，冬葵子滑窍道，飞滑石利小水也。为散葱白汤下，使瘀血顿化，则滞气自消，而膀胱得操施化之令，肠胃自赍传送之权，其小腹疼痛无不退，何大小便有不通之患哉！

67765 桃仁散

【方源】《郑氏家传女科万全方》卷一。

【组成】桃仁 生地 人参 甘草 桂心 蒲黄 半夏 当归 川芎 赤芍 牛膝 丹皮

【用法】加生姜三片，煎七分，空心服。

【主治】妇人月水淋漓不断，或前或后，及腹中疼痛。

67766 桃仁散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】桃仁二十一粒（研烂） 雄黄末二钱 白薇末二钱 炙甘草五分

【用法】上药各为细末。先用针刺鸡肝无数孔，蘸药末，纳阴户中，日三易之。

【主治】阴疳。

67767 桃仁散

《医略六书》卷三十。为《全生指迷方》卷四“桃仁汤”之异名。见该条。

67768 桃仁粥

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《食医心镜》，名见《圣惠》卷九十七。

【组成】桃仁三两（去皮尖）

【用法】以水一升，研取汁，和粳米二合煮粥食之。

【功用】《药粥疗法》：活血通经，祛瘀止痛。

【主治】咳嗽气喘，胸膈痞满，瘀癖血癥，血瘀所致的心腹疼痛；妇女血滞经闭、痛经，及跌打损伤等。

①《证类本草》引《食医心镜》：上气咳嗽，胸膈痞满，气喘；传尸鬼气，瘀癖注气，血气不通，日渐消瘦。②《圣惠》：产后血癥，疼痛，不多食。③《圣济总录》：冷气心腹痛、妨闷。④《药粥疗法》：瘀血停滞所引起的妇女血滞经闭、痛经，产后瘀阻腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛，胸胁刺痛，以及高血压、冠心病、心绞痛。

67769 桃仁粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】桃仁二十一枚（去皮尖） 生地黄一两 桂心一两（末） 粳米三合（细研） 生姜一分（并地黄、桃仁以酒三合，研绞取汁）

【用法】先用水煮米作粥，次下桃仁等汁，更煮令熟，调入桂心末，空腹食之。

【主治】邪气攻心，腹痛。

67770 桃仁煎

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《圣济总录》卷五十五。

【组成】桃仁七枚（去皮尖）

【用法】熟研，水合顿服，良。

【主治】卒心痛，或患三十年者。

67771 桃仁煎

【方源】《千金》卷三。

【异名】桃仁酒（《圣惠》卷九十五）。

【组成】桃仁一千二百枚

【用法】捣令细熟，以上好酒一斗五升，研滤三四遍，如作麦粥法，以极细为佳。纳长颈瓷瓶中，密塞，以面封之。纳汤中煮一伏时不停火，亦勿令火猛，使瓶口常出在汤上，无令没之，熟讫出，温酒服一合，一日二次，丈夫亦可服。

【功用】①《千金》：补益悦泽。②《圣惠》：下

三虫。

【主治】①《千金》：妇人产后百疾，诸气。②《圣惠》：痲癖，心腹疼痛，肌肤瘦弱，面无颜色。

【方论选录】《千金方衍义》：桃仁虽能逐瘀，然随乌药、莪术则专于破血；随芎、归、芍药则相胥和血。若单用一味，破之与和惟在多用少用之间。兼之以酒，为产后和血圣药。但所禀柔脆，坐草无伤，无所留滞者不在此例。

67772 桃仁煎

【方源】《千金》卷四。

【异名】桃仁煎丸、桃仁丸（《圣惠》卷七十二）、攻积桃仁煎（《医略六书》卷三十一）、桃黄煎（《顾氏医径》卷四）。

【组成】桃仁 虻虫各一升 朴消五两大黄六两

【用法】上四味为末，别治桃仁，以醇苦酒四升纳铜铛中，炭火煎取二升，下大黄、桃仁、虻虫等，搅勿住手，当欲可丸，下朴消，更搅勿住手，良久出之，可丸乃止。取一丸和鸡子黄投酒中，预一宿勿食服之，至晡时，下如大豆汁，或如鸡肝凝血、蛤蟆子，或如膏，此是病下也。

【主治】①《千金》：带下，经闭不通。②《医略六书》：血瘕、血积，脉涩洪大。

【方论选录】《医略六书》：妇人血瘀热结，渐成血积、血瘕，故经闭不行，脐腹闷痛不止焉。桃仁破瘀结以消癥积，大黄荡瘀热以化瘕聚，朴消软坚结，虻虫破积血也。醋煮以收之，酒下以行之，使热降瘀消，则冲任调和，而经闭无不通，血瘕无不化，安有脐腹闷痛之患哉！

67773 桃仁煎

【方源】《千金》卷十二。

【组成】桃仁一斤（末） 胡麻一升（末） 酥半斤 牛乳五升 地黄十斤（取汁） 蜜一斤

【用法】上药合煎如饴，旋服。

【功用】补血。

67774 桃仁煎

【方源】《养老奉亲》。

【组成】桃仁二两（去皮尖，熬末） 赤汤四合

【用法】相和微煎三五沸即止。空心含少许，渐渐咽汁尤益。

【主治】老人上气，热，咳嗽引心腹痛满闷。

67775 桃仁煎

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】桃仁一千枚（汤退皮尖双仁，研如面）

【用法】上以牛乳五升，解如浆水，于铜器内盛，在重汤内煎，瓷器中盛。每服两匙，空心温酒调下。

【主治】霍乱转筋不止。

67776 桃仁煎

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】桃仁 茴香各一两 木香半两 硃砂 阿魏各一分 蝎梢五十个

【用法】上为末，以桃仁膏和匀。每服一枣大，空心以葱白酒化下。

【主治】胁肋脐腹气结，疼痛如锥刺，及气奔上不下。

【加减】若气大段不快，加槟榔三个。

67777 桃仁煎

【方源】《直指》卷九。

【组成】大川椒（出汗） 生犀角 当归 续断各一两 桃仁（去皮，炒） 鳖甲（醋炙黄）各一两半 蛤蚧一对（去头足，洗，酥炙） 木香 白矾（煨） 猪牙皂角各半两 安息香 苏合香 雄黄各一分 麝香一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下；或用正川椒泡汤送下。

【主治】劳瘵传尸，骨蒸倦弱。

67778 桃仁煎

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桃仁三钱 当归三钱 赤芍钱半 桂心钱半 砂糖三钱（炒黑）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后恶露不尽，脉弦滞涩。

【方论选录】产后恶露不尽，瘀血留结，故腹中坚痛，不可忍焉。桃仁泥破瘀开结，当归身养血荣筋，赤芍药破血泻血滞，甜桂心通闭温经脉，砂糖炒黑以去瘀和血。水煎温服，务使恶露去尽，则血无瘀结之患，而经脉融和，何虑腹中坚痛不减哉！

67779 桃仁煎

《医略六书》卷三十。即《千金》卷三“桃仁芍药汤”。见该条。

67780 桃仁膏

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十八引《海上方》。

【组成】桃仁

【用法】捣，以猪脂和。敷之。

【主治】①《千金》：冬月唇干坼出血。②《证类本草》：产后遍身如粟粒，热如火者。

67781 桃仁膏

【方源】《三因》卷十八。

【组成】桃仁（去皮尖） 枯矾 五倍子各等分

【用法】上药后二味为末，研桃仁膏拌匀敷之。

【主治】产后阴肿妨闷。

67782 桃仁膏

【方源】《景岳全书》卷五十四引《百一》。

【组成】桃仁（炒，去皮尖） 大茴香（炒）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，先以葱白二寸煨熟，蘸药细嚼，空心以热酒下。

【主治】①《景岳全书》引《百一》：气血凝滞，疝气，膀胱小肠气，痛不可忍。②《会约》：血疝，小腹硬而有形，大便秘结而黑，小水利。

67783 桃仁膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】桃仁不拘多少（汤浸，去皮尖）

【用法】研如泥，同蜜少许，一处用温水化开，涂摩患处，用玉屑膏涂贴。

【功用】悦皮肤。

【主治】皴裂。

67784 桃仁膏

《普济方》卷五十四。即《圣惠》卷三十六“塞耳丸”。见该条。

67785 桃仁膏

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】桃仁 杏仁 巴豆各一枚 朱砂少许

【用法】上为末，饭为丸，如米大。每服一丸，以米饮送下。

【主治】霍乱吐泻。

【备考】本方方名，据剂型，当作“桃仁丸”。

67786 桃术汤

【方源】《观聚方要补》卷一引《本草汇言》。

【组成】桃仁三钱 柴胡 半夏 槟榔 鳖甲 干姜各二钱 白术四钱

【用法】水煎服。

【主治】风暑不调，饮食停结，寒热如疟，日久不愈，内有蓄血。

67787 桃叶汤

【方源】《医心方》卷十四引《深师方》。

【组成】桃叶十四枚 恒山四两

【用法】上以酒二升，渍一宿，露着中庭，刀着器上，明旦发日凌晨漉去滓，微温令暖，一顿服之。必吐。良。

【主治】劳疟。

67788 桃叶汤

【方源】《外台》卷三引《支太医方》。

【组成】桃叶

【用法】以水一石，煮桃叶，取七升，以荐席自围，衣被盖上，安桃汤于床簀下，取热自熏。停少时，当雨汗，汗遍去汤，待歇速粉之，并灸大椎则愈。

【主治】天行病。

67789 桃叶汤

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】桃叶一握 木通二两 灯心五大束 川朴消一两 葱白七茎

【用法】上锉细，用醋浆水三大碗，煎十余沸，去滓，倾向盆中，稍温，便坐儿在盆内，

将滓以手帕裹，熨于脐下，冷即出之。后吃地黄稀粥半盏，良久便通。

【主治】小儿大便不通，脐腹妨闷。

67790 桃叶汤

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《伤寒类要》，名见《普济方》卷三八一引《经验良方》。

【组成】桃叶三两

【用法】杵，和水五升，煮十沸，取汁。日五六遍淋之。后烧雄鼠粪二枚服。

【主治】①《证类本草》引《伤寒类要》：小儿伤寒、时气。②《普济方》引《经验良方》：鼻疳疮。

67791 桃叶饮

【方源】方出《外台》卷二十六引《肘后方》，名见《圣济总录》卷三十八。

【组成】桃叶

【用法】捣，绞取汁，饮一升。

【主治】①《外台》引《肘后方》：三虫。②《外台》引《广济》：霍乱腹痛吐利。

67792 桃白散

【方源】《准绳·幼科》卷八引张涣方。

【组成】桃木白皮 黄柏（蜜炙，锉） 黄连（去须，炒）各一两 蛇蜕皮半两（烧灰） 干蜗牛一分（烧灰） 青州枣五十枚（去核，烧灰）

【用法】上为细末，入定粉、麝香各一分，同研匀。每服一字，乳食前以粥饮调下。

【主治】肠胃俱虚，腹内虫动，侵蚀下部，疳痢湿匿。

67793 桃奴丸

【方源】方出《圣惠》卷四十八，名见《圣济总录》卷七十一。

【组成】桃奴三两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】伏梁气，在心下结聚不散。

【备考】本方方名，据剂型，当作“桃奴散”。

67794 桃奴丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九八。

【组成】猢猻头骨一两（生用） 巴豆一分 砒霜一分（细研） 野桃仁花一分 斑蝥一分（炒微黄） 桃奴（向阳枝上者）半两

【用法】上为末，五月五日午时合，饭为丸，如梧桐子大。令患者手把一丸，时时顾示即愈。仍男左女右，于手臂上以绯帛系一丸。

【主治】疟疾，发作无时。

【备考】方中巴豆用量原缺，据《普济方》补。

67795 桃奴丸

【方源】《幼幼新书》卷三十一引茅先生方。

【组成】桃奴二七个 桃胶 乳香（别研）各二钱 苦瓠子 山柏荔枝各二七个

【用法】上为末，滴水为丸，如芡实大。若肾上至四更，每服五丸至七丸，荆芥、葱汤送下。

【主治】小儿吊起外肾。

67796 桃奴丸

【方源】《幼幼新书》卷十二引《养生必用》。

【组成】桃杲七枚（别为末） 桃仁十四枚（去皮尖，炒，别研） 安息香一两（以无灰酒斟酌多少，研，飞去砂石，银器中入上二味，慢火熬成膏） 生玳瑁（镑过，杵为细末）一两 琥珀三分（别研） 雄黄（用桃叶煮，水研飞）三分 辰砂（研飞）半两 黑犀（石上以水磨，澄去水，取末）半两 脑麝各一分（别研）

【用法】上为细末，以前膏为丸，如鸡头大，阴干，密器封，安静室。每服一丸，食后、临卧以人参汤送下。

【主治】小儿心气虚，有热，恍惚不常，言语错乱，尸疰客忤，魇梦不祥，惊痫。

67797 桃奴汤

【方源】《外台》卷十三引《延年秘录》。

【组成】桃奴 茯苓各三两 鬼箭羽 芍药 人参 橘皮各二两 生姜四两 槟榔七

枚 麝香一分 (别研)

【用法】上切，以水九升，煮取二升七合，去滓，纳麝香，温分三服，如行八九里久。

【主治】伏连鬼气，发即四肢无力，日渐黄瘦，乍好乍恶。

【宜忌】忌大醋、生冷、五辛。

67798 桃奴汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】桃奴 当归 人参 干姜各二两 芎藭 甘草各三两 丹砂 麝香 茯苓 犀角 鬼箭羽 桂心各一两 (一方有雄黄一两，无丹砂、芎藭)

【用法】上咬咀。以水九升，煮取二升半，去滓。分三服，未食服。

【主治】中恶毒气，蛊疰，心腹猝绞痛。

【加减】大便不通、腹满者，加大黄三两、芒消二两。

【方论选录】《千金方衍义》：桃奴汤中专取桃奴杀鬼精物，鬼箭破血除风，其间干姜即前方 (桃皮汤) 萸、附之意，犀角即梔、豉之意，桂心、当归散血温经之用则一，余诸味可以意推。

【备考】《永乐大典》引《风科集验方》无丹砂、茯苓。

67799 桃奴散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】桃奴五枚 甘草一分 (炙微赤，銼) 杏仁二十枚 (汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 麝香一钱 桔梗 (去芦头) 赤芍药 黄芩 柴胡 (去苗) 川升麻 川大黄 (銼，微炒) 鬼臼 (去毛) 各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以利为度。

【主治】小儿中恶，心腹坚紧疼痛，颜色青黑，大便不通。

67800 桃奴散

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《吉氏家传》。

【组成】千桃一合 (枝上自干者) 舶上硫

黄 木香各二钱

【用法】上为末。每服一钱，木香汤调下。

【主治】吊肾。

67801 桃奴散

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】桃奴 (十二月收用) 玄胡索 猥鼠粪 香附子 官桂 五灵脂 砂仁 桃仁 (去皮尖) 各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【主治】妇人或室女月经不通，渐成胀满；及男子坠马，跌仆损伤，以致瘀血停积，成血蛊病。

【方论选录】《医略六书》：血瘀肝脾，不能鼓运气化，而成血蛊，男女皆有之，惟经闭为女科所独焉。桃奴抑心气以生血，延胡化滞血以通经，桃仁破瘀血，灵脂降浊阴；鼠屎通幽降浊，香附解郁调经，肉桂温经以运乎经血，砂仁醒脾以鼓运乎经气也。为散以消之，酒煎以行之，使瘀结顿化，则经脉自通，而经闭无不行，胀满无不退矣。

【备考】本方原名“桃奴丸”，与剂型不符，据《医学入门》改。

67802 桃皮汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】桃白皮一握 (东引者) 真珠 附子各一两 梔子仁十四枚 当归三两 豉五合 桂心二两 吴茱萸五合 (一方无当归以下四味)

【用法】上咬咀。以水五升，煮取二升，去滓，纳真珠末，分作二服。

【主治】中恶气，心腹痛，胸胁胀满，短气。

【方论选录】《千金方衍义》：桃皮汤取桃根白皮辟邪散血，真珠镇心安神，以佐萸、附辛温散结，梔、豉分解旺气也。

【备考】《圣济总录》有白杨皮。

67803 桃皮汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】桃皮 艾叶各一两 槐子三两 大枣三十枚

【用法】上咬咀。以水三升，煮取半升，顿服之。良。

【主治】蛲虫、蛔虫，及痔蟹，虫蚀下部生疮。

【方论选录】《千金方衍义》：桃根白皮散血杀虫，艾叶温血导火，槐子益肾清火，大枣入脾以通津液。

【备考】本方方名，《外台》引作“桃汤”。

67804 桃皮汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】桃皮（锉） 槐子 榧实各一两 石榴根皮（锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加大枣三枚（擘破），同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后蟹虫蚀下部。

67805 桃皮汤

《圣济总录》卷一〇〇。为原书卷三十九“桃枝汤”之异名。见该条。

67806 桃皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】桃皮（去粗黑色者，锉）三两 面（炒） 豉（炒，研）各半两 白米（研）一合

【用法】以水一斗，煮取八升，去滓，放温。沐头，每日用之。

【主治】白秃发落。

67807 桃皮汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】白桃皮 黄连（去须，炒） 龙骨各一两 丁香十四枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，分温三服。

【主治】小儿下痢，烦渴附肿。

67808 桃皮酒

【方源】《外台》卷二十引《小品方》。

【组成】桃皮三斤（削去黑皮，取黄皮） 麦曲一升 秫米一升

【用法】上以水三斗，煮桃皮令得一斗，以五升汁渍女曲，五升汁渍饷饭，酿如酒法，熟，

漉去滓。可服一合，一日三次，耐酒者增之。以体中有热为候，小便多者即是病去便愈。

【功用】《本草纲目》：利小便。

【主治】水肿。

【宜忌】忌生冷、酒、面、一切毒物。

67809 桃皮散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【异名】丁香散（《普济方》卷三九八）。

【组成】桃白皮（炙）半两 黄连（去须）胡粉（炒） 赤茯苓（去黑皮）各一两 黄柏（去粗皮，炙）半两 丁香七粒

【用法】上为散。每服半钱匕，早、晚食前米饮调下。

【主治】小儿疳痢赤白，及一切痢。

67810 桃皮膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】桃皮（去粗黑者）五两（锉，以水一斗，煮取五升，去滓，先温吃半盞，余留洗头） 豉（炒，研）半两 白面（炒）半两

【用法】先以桃皮汁洗头，并吃讫，后以水调豉、面末敷之。

【主治】白秃发落。

67811 桃耳煎

【方源】方出《奇方类编》卷下，名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】大木耳（水泡胀，去蒂，晒干，炒，为细末） 核桃仁（去皮，捣为泥）各一钱

【用法】黄酒煮服。过半炷香时，浑身汗出，是其验也。

【主治】干血癆。

67812 桃红丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】绿矾一两半 赤脚乌半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服三丸，用温米饮送下，次吃补虚丸。

【功用】坠涎安虫。

【主治】小儿脾胃虚弱，风邪中人所致的慢惊风。

67813 桃红丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】丹砂 麝香各半钱(研) 白附子半枚 白僵蚕一枚 干蝎(头尾全,炒)一枚 膩粉一钱匕(研) 金箔 银箔各二片(研)

【用法】上为末,炊饼心为丸,如绿豆大。每服一丸,金银、薄荷汤化下。

【主治】小儿惊啼,眠睡不稳。

67814 桃红丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】石燕一分 燕白粪 白附子 朱砂各一钱 轻粉半钱 黄连半两 巴豆八粒(油煎)

【用法】上为末,粟米饭为丸,如梧桐子大。一岁一丸,惊风,薄荷汤送下;惊积,膩粉汤送下;魇胎,密佗僧酒煎下。

【主治】诸惊。

67815 桃红丸

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】天南星一分(炮) 白附子(炮) 川乌(炮)各一分 石膏二钱(煨) 地龙一钱 白矾(枯)一钱

【用法】上为末,生姜汁为丸,如麻子大,朱砂为衣,令半红半白。每服三五十丸,淡生姜汤送下。

【主治】小儿魇胎,咳嗽,痰涎壅盛,或作喘急。

67816 桃红饮

《类证治裁》卷五。为《杂病源流犀烛》卷十三“桃红饮子”之异名。见该条。

67817 桃红散

【方源】方出《证类本草》卷十四引《肘后方》,名见《普济方》卷二四〇。

【组成】苏方木三两

【用法】上锉细。以水五升,煮取二升,分再服愈。

【主治】①《证类本草》引《肘后方》:血晕。②《普济方》:脚气,举发立止。

67818 桃红散

【方源】方出《证类本草》卷十三引《广利方》,名见《圣济总录》卷一二六。

【组成】麒麟竭

【用法】上为末。敷之。

【主治】金疮出血,瘰癧漏疮,肠风血痔,嵌甲疼痛。

①《证类本草》引《广利方》:金疮血不止兼痛。②《圣济总录》:瘰癧已成漏疮,用紫红散后疮渐敛、紫黑色者。③《本草纲目》引《直指》:肠风血痔。④《本草纲目》引《医林集要》:嵌甲疼痛。

【备考】《圣济总录》本方用法:以自津唾调,日夜频涂。

67819 桃红散

【方源】《理伤续断方》。

【组成】石膏一斤(黄泥封固,煨过) 白矾二两(飞过) 血竭一两(别研) 黄丹(细研,火飞过,水飞过) 松糖(别研) 五倍子 粉霜各三两 龙骨二两(别研)

【用法】上为极细末。临用将此药干摩,次日别用药水洗净再摩。

【功用】散血结口。

【主治】积年不效,朽烂疮口,金疮箭射,打碎皮破,血出不止。

67820 桃红散

【方源】《普济方》卷六十二引《博济》。

【组成】金箔十片 银箔十片 丹砂(研) 马牙消(研) 甘草(炙,捣末)各一两 铅白霜(研,少许) 凝水石四两 太阴玄精石二两(二味捣碎,入一盒子内,煨令通赤,取出黄上内埋一宿)

【用法】上为末。每服一字,甘草水调下。如要丸,以稀糯粥为丸,如碗豆大,含化咽津。

【主治】喉中生疮肿,赤紫色者,咽噎痛,咽物有妨。

67821 桃红散

【方源】《幼幼新书》卷八引《灵苑》。

【组成】半夏(四两,用水浸,每日一度换

水，从夏至前五日，浸至立秋后五日即止，待自成粉，晒干，用细罗子罗去粗者不用，细者取）二两 龙脑（研） 朱砂（研）各一钱 石膏（细研，以水飞过用）一两半

【用法】上一处拌合，再研令匀。每服一字，用生姜熟水调下。

【功用】压惊，治风化痰，解伤寒，退惊热。

【主治】惊热。

67822 桃红散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】赤石脂 石膏（各研） 栝楼根（锉） 白石脂 铅丹各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，冷水调下。

【主治】消渴。

67823 桃红散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【异名】绛雪散（《杨氏家藏方》卷十一）、绛雪（《医统》卷六十四）。

【组成】龙脑（研）一钱 丹砂（研）半两 硼砂（研）一钱 马牙消（研）半钱 寒水石（煨，研如粉）半两

【用法】上为细末。每用一字，掺咽喉中，咽津。

【主治】咽喉痛。

67824 桃红散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】铅丹（炒）半两 白薇（为末）一两 胡粉二两

【用法】上为细散。每用少许，疮上干掺后贴膏药。

【功用】生肌肉。

【主治】诸疮。

67825 桃红散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】干葛粉 染胭脂各一两

【用法】上为细末。干掺在疮上。又用青绢，以鸡清涂绢，按疮口大小贴之，仍先用篦子按去血，令药与肉平，方以青绢蘸鸡清贴之。

【主治】金疮，或竹木所刺，出血不止，及疼痛。

67826 桃红散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】天南星（炮） 乌头（炮裂，去皮脐） 白附子（炮） 天麻各半两 干蝎（微炒）二十一枚 丹砂（研）一分

【用法】上为细散。每服一字，或半钱匕，旋入牛黄、龙脑各少许，煎麻黄汤调下，一日三次。

【主治】小儿慢惊风，手足瘈瘲，神情如醉。

67827 桃红散

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】白附子（新罗者） 黄丹各等分

【用法】上同炒，候黄丹深紫色，筛出黄丹不用，只将白附子为末。每服一钱匕，茶清调下。

【主治】风眩，左手关脉虚弦。

67828 桃红散

【方源】方出《阎氏小儿方论》，名见《卫生总微》卷十八。

【异名】红绵散（《百一》卷十）、红玉散（《保婴集》）、桃花散（《丹溪心法》卷四）、红白散、通云散（《普济方》卷三六四）。

【组成】白矾（火飞）一钱 麝香一字 坯子胭脂一钱

【用法】上为末。每用少许，先用绵裹杖子撮脓尽，掺之。

【主治】小儿脓耳。

67829 桃红散

【方源】《幼幼新书》卷八引《吉氏家传》。

【组成】天南星末 白附子末 朱砂各一钱 全蝎二十个 麝香少许

【用法】上为细末。每服一字，金银薄荷汤调下。

【功用】取积。

【主治】小儿惊风。

67830 桃红散

【方源】《幼幼新书》卷九引郑愈方。

【组成】大天南星一个（去心，入朱砂二钱

在南星内，用南星封口，上面再用生姜自然汁和面饼子裹，慢火内炒熟，取出）蝎一个（全者）蜈蚣一条（二味用酒少许，煮干，焙）

【用法】上为末。每服一字，用金银薄荷汤调下。

【主治】小儿急惊风。

67831 桃红散

【方源】《幼幼新书》卷二十二引刘氏方。

【组成】马牙消 朱砂 茯苓 人参各等分

【用法】上为末。一岁一字，新汲水入蜜调下。

【功用】进食。

【主治】惊积、疳积。

67832 桃红散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引毛彬方。

【组成】人参（去芦，洗，锉）藿香（去梗用叶）曲（红色）各二钱半

【用法】上为细末。每服半钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】脾胃虚弱乘冷，吐泻不定，不问冷热。

67833 桃红散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】天南星三两（用白矾半两，甘草、生姜各一两，切片，河水六升，同煮水尽，去生姜、甘草，将天南星，焙干令用）甘草紫河车各半两 白附子 白僵蚕各一分 蝉壳三钱

【用法】上旋入脑、麝少许。一岁儿一字，食后、临卧时以荆芥、薄荷汤调下。

【主治】小儿惊热，伤风喘嗽，潮热，及斑疮未出者。

67834 桃红散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】朱砂一钱（研，水飞）绿豆粉一两 硼砂半钱 脑 麝各一字

【用法】上为末。每用一字，敷患处；或搽

贴之。

【主治】小儿牙痛，肿烂脓血。

67835 桃红散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】黄丹一两（隔纸炒）硫黄三分 茱萸三分 轻粉四钱

【用法】上为细末，用麻油调和，再干之。洗疮，拭后掺之。

【主治】疮口未合，烂臭，瘀肉未去，时水出。

67836 桃红散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】甘遂半两（半生半炮） 坯十文（别研）

【用法】上为末。每用一钱，以白面四两，水调，入药搜和，切作棋子，白水煮浮，更不得使盐料物，只淡食。候大小便利去五六分，却用平胃散调补。

【主治】正水。胀急，大小便利，逆欲死。

67837 桃红散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】寒水石六钱（煨粉） 五倍子四钱（取末） 坯子胭脂二钱（别研） 麝香一钱（别研）

【用法】上为细末。用温水洗疮净，拭干，掺疮口内。

【功用】生肌，止脓水。

【主治】疮肿。

67838 桃红散

【方源】《百一》卷十三。

【异名】黄丹散（《得效》卷十八），桃花散（《医统》卷七十九）。

【组成】上等虢丹 软石膏不拘多少（火煨通红）

【用法】上为细末，和令如桃花色。掺伤处。

【功用】《外科传薪集》：长肉生肌。

【主治】①《百一》：金疮及一切恶疮。②《外科传薪集》：火烫，烂腿疮。

【备考】《外科传薪集》本方用法：用菜油调

敷。

67839 桃红散

【方源】《百一》卷十六。

【组成】龙骨半两 白矾半两（飞） 黄丹少许（飞）

【用法】上为末。每用少许，掺在疮口上，先用口含浆水，洗净揩干，用药贴之。以愈为度。

【功用】生疮口。

67840 桃红散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】川乌一两 草乌八钱 天南星半两（以上三味，水洗三次） 麝香 脑子一钱 朱砂半两（别研细）

【用法】上为细末。每服半钱，薄荷茶调下；温酒亦得。

【主治】男子、妇人气虚，头目昏眩，偏正头疼，夹脑风，两太阳穴疼，眉棱骨疼；及风痰恶心，头运欲倒；小儿伤风鼻塞，痰涎咳嗽。

【备考】方中麝香用量原缺。

67841 桃红散

【方源】《活法机要》。

【异名】桃花散（《疡科选粹》卷八）。

【组成】滑石四两 乳香 轻粉各二钱 小豆粉一钱 寒水石三两（烧）（一方改小豆粉为定粉一两）

【用法】上为极细末。干贴。

【功用】敛疮生肌定血，辟风邪。

【主治】疮疡。

【备考】《普济方》本方用法：血不止者，和灯草贴疮口，以帛封之。

67842 桃红散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】定粉二两半 乳香一两半 龙骨一两半 白石脂一两半 乌鱼骨（去皮，微炙黄色）一两半 寒水石（火烧通赤）七两 黄丹（慢火微炒，放令冷）二钱

【用法】上为极细末。每用药少许，干掺患

处。

【功用】生肌肉，敛疮口。

【主治】疮肿跌伤。

【备考】方中白石脂用量原缺，据《普济方》补。

67843 桃红散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】粟米粉一两（炒黄） 铅丹三钱（炒）

【用法】上为末。干贴之。

【功用】敛疮。

【主治】恶疮、杖疮迟愈。

67844 桃红散

【方源】《杂类名方》引张正卿方。

【组成】滑石一两 赤石脂三钱 黄丹二钱

【用法】上为细末。干贴。

【功用】生肌止痛。

67845 桃红散

【方源】《永类铃方》卷二十二。

【组成】草乌三个（去皮） 飞罗面半两 国丹二钱 天南星半两

【用法】上为细末。生姜自然汁调贴。如作潮热，茶清调贴。

【主治】损折筋骨肿痛。

【加减】如皮破见血者，去草乌。

67846 桃红散

【方源】《急救仙方》卷二。

【组成】巴豆（去壳）半粒 磁石（研）

【用法】上各为末，拌匀。用葱涎同蜜为膏，以敷疮上。疔自出矣。

【主治】诸疔不出者。

67847 桃红散

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】白及 石膏（煨） 黄丹（炒）

【用法】上为末。干贴之。

【主治】痈疽。

67848 桃红散

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】朱砂 乳香 干胭脂各一两 水银 麝香各半两

【用法】上先研朱砂细后，入水银再研，无银星为度，后入次药，同研极细。宜用帛子先擦净耳内脓，吹药在耳。

【功用】敛疮生肌。

【主治】耳中脓疮，及一切恶疮，口不合者。

67849 桃红散

【方源】《普济方》卷三〇三。

【组成】石灰一升 大黄四两（锉作骰子块，同炒至石灰淡红色，去大黄，用石灰） 当归 海桐皮

【用法】上为末。敷之。

【主治】金疮出血。

【备考】方中当归、海桐皮用量原缺。

67850 桃红散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】辰砂少许 羌活半两 防风半两 人参一钱 白术三钱 茯苓一钱半 蝉蜕三个 甘草一钱

【用法】上为末。每服一钱半，荆芥汤调下。如未止，用天麻四君子汤相间服之为妙。

【主治】惊泻。

67851 桃红散

【方源】《普济方》卷四〇七。

【组成】明矾（煨）二两 嫩松香四两（末） 黄丹二两（煨）

【用法】上为末。用烛油调敷之。

【主治】小儿奶癣疮。

67852 桃红散

【方源】《秘传外科方》。

【组成】蟾酥少许 信石少许 蝉蜕三个（去足翘） 蜈蚣头一个 斑蝥三个（去足翅） 国丹五分 风化石灰一两（砂锅盛，瓦片盖，炭火煨二时久，取出）

【用法】上为极细末。指爪甲刮葱白内涎调药。先以禾叶针针破疮口，令恶血出尽，别将蟾酥一粒如麦粒大，入疮内，却以葱白所调药敷疮口，莫敷在好肉上，用冷水浸湿纸

二三十重，贴在药上，封固疮口。如清早封固，至晚觉疮口热，即去纸，水洗令净，用红玉散掺疮口。

【主治】诸疔疮，虽凶证迭见，六脉俱绝，垂死者。

67853 桃红散

【方源】《证治要诀类方》卷三。

【组成】干胭脂 白矾各等分

【用法】上为末。将鹅翎管蘸药少许吹入耳内。

【主治】聤耳。

67854 桃红散

《准绳·疡医》卷五。为《活幼心书》卷下“桃花散”之异名。见该条。

67855 桃红散

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】轻粉 赤石脂（煨） 石膏（煨熟）各三钱 铅粉二钱 瓜儿血竭一钱 冰片五分

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。用少许扫疮上即愈。

【功用】定痛，生肌，长肉。

【主治】疮疡。

67856 桃红膏

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】风化石灰四两

【用法】上药铁锅炒热，入大黄末一两，再同炒红，取起，入肉桂末五钱，共和匀，米醋调成膏，摊厚帛上。贴之。

【主治】腹胁积痛。

67857 桃花丸

【方源】《千金》卷六。

【组成】桃花二升 桂心 乌喙 甘草各一两（一方有白附子、甜瓜子、杏仁各一两）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服十丸，一日二次，十日易形。

【功用】令入洁白光悦。

【主治】面黑黧。

【方论选录】《千金方衍义》：桃花杀疰恶

鬼，令人好颜色；桂心治结气，利关节；乌喙破积聚寒热；甘草治五脏六腑寒热邪气。皆本经主治。

67858 桃花丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】赤石脂 干姜各十两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如豌豆大。每服十丸，加至二十丸，一日三次。

【主治】①《千金》：冷痢，脐下搅痛。②《扁鹊心书》：小儿脱肛。

67859 桃花丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃花 苏合香 安息香 木香 槟榔 川芒消各三分 水蛭半两（炒令微黄） 虻虫半两（炒令微黄，去翅足） 鳖甲（涂醋，炙令黄，去裙襕） 麒麟竭 附子（炮裂，去皮脐） 柴胡（去苗） 卷柏 当归（锉，微炒） 辛夷 白芷 紫石英（细研，水飞过） 禹余粮（炒，醋拌七遍） 芎藭 牡丹 细辛 麦门冬（去心，焙） 羌活 桂心 肉豆蔻（去壳）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前煎茅香汤送下。

【主治】妇人月水不通，无子，由子宫风冷，积血滞于膀胱，故致腰膝疼痛，手脚心热，背膊妨闷，经络不调，腹内多气，四肢乏力，面无血色，及多黧黯。

67860 桃花丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】赤石脂一两 干姜一两（炮）

【用法】上为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前，一日二次；若血痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下。

【主治】赤白痢，日夜无度，攻脐腹痛。

67861 桃花丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《庄氏家传》。

【组成】寒水石一两（用炭火烧熟，研如面细） 朱砂半钱（细研，合和如桃花色）

【用法】上为末，水浸蒸饼为丸，如粟米大。每服三五丸，冷水送下。

【主治】小儿心脏积热生疳。

67862 桃花丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】信砒 粉霜各一钱 定粉半两 黄丹二分 巴豆七个（末，醋内煎黑色，去皮用）

【用法】上为末，以糯米粥为丸，如黍米大。赤白痢，每服二丸，新汲水送下；治疟，桃心七个煎汤，未发前冷下。立愈。此法常用有效。

【主治】一切疟，及赤痢、白痢。

67863 桃花丸

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】良姜 赤石脂 干姜 五灵脂各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，米饮汤送下。

【主治】泄泻不止。

67864 桃花丸

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】赤石脂 干姜 胡椒

【主治】泄泻。

67865 桃花丹

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】大黄三两（醋煮） 代赭三两（醋煨） 桃花三两（炒黑）

【用法】上为末，薄荷汁为丸。每服三钱，沸汤送下。

【主治】血胀，噎食，脉洪涩大。

【方论选录】产后血瘀，肝胃不能输化，而胃气上逆，故胸腹胀满，噎食不下焉。桃仁破瘀血，以润胃燥，炒黑，不伤好血；代赭镇逆气以平厥阳，醋煨，引之入肝；醋煮大黄，以搜涤其血。薄荷汁丸，百沸汤下，使瘀血消化，则胃气自平，而腹胀无不退，噎食无不下矣。

67866 桃花丹

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】羌活 当归 甘草各三两 陈皮 黄柏 大黄 急性子各二两 南星 白芷 赤芍各一两五钱 马牙消 银朱各一两 绿豆粉四两

【用法】上各为细末,红肿焮热者,以忍冬藤杵自然汁调敷。大青叶、芙蓉叶、马蓝头、马齿苋等自然汁皆可用。时毒发颐,用防风三钱,薄荷叶二钱,煎汤调敷,或加薄荷油十滴许。小证红肿,用茶清调。小块初起,以药末三四分,用太乙膏贴之。阳证初起,未红未热,以甘草煎汤乘热调敷。

【主治】痲疾红肿焮热,或尚未高肿色赤,乳痈疔毒,漫肿坚硬者。

【方论选录】是方清凉而不偏于阴寒,散肿软坚,疏泄郁热,以治阳发红肿焮热,或尚未高肿色赤,乳痈疔毒,漫肿坚硬者,无不应手捷效,其功实在金黄散之上。

67867 桃花丹

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】章丹3克 生石膏60克

【用法】将章丹入乳钵内研细,再加石膏研极细末。用少许掺疮而。

【功用】生肌长肉。

【主治】溃瘍疮面,腐肉已清,已露新肌。

67868 桃花水

【方源】《续名家方选》。

【组成】桃花十钱 大黄八钱 消石五钱

【用法】上以罗牟比喜蒸取汁液,临服人沙糖水一匙服。

【主治】大小便不利,肿胀。

67869 桃花汁

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】桃花不拘多少

【用法】上药子平旦承露采取,以酢醋研绞,去滓取汁,涂敷疮上。有虫即出。无花但桃叶亦得。以腊月猪脂和涂亦佳。

【主治】发背疮,痈疽。

67870 桃花汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】三物桃花汤(《杏苑》卷三)。

【组成】赤石脂一斤(一半全用,一半筛末) 干姜一两 粳米一升

【用法】以水七升,煮米令熟,去滓,温服七合,纳赤石脂末方寸匕,一日三次。若一服愈,余勿服。

【功用】《注解伤寒论》:固下,散寒,止利。

【主治】①《伤寒论》:少阴病二三日至四五日,腹痛,小便不利,下利不止,便脓血者。②《温病条辨》:痢无度,脉微细,肢厥,不进食。

【方论选录】①《注解伤寒论》:涩可去脱,赤石脂之涩以固肠胃;辛以散之,干姜之辛以散里寒;粳米之甘以补正气。②《医方考》:此方用赤石脂,以其性寒而涩,寒可以济热,涩可以固脱;用干姜者,假其热以从治,犹之白通汤加人尿、猪胆,干姜黄连黄芩人参汤用芩、连,彼假其寒,此假其热,均之假以从治耳;用粳米者,恐石脂性寒损胃,故用粳米以和之。向使少阴有寒,则干姜一两,岂足以温?而石脂一斤之多,适足以济寒而杀人矣!岂仲景之方乎?③《古方选注》:桃花汤,非名其色也,肾脏阳虚用之,一若寒谷有阳和之致,故名。石脂入手阳明经,干姜、粳米入足阳明经,不及于少阴者,少阴下利便血,是感君火热化太过,闭藏失职,关闸尽撤,缓则亡阴矣。故取石脂一半,同干姜、粳米留恋中宫,载住阳明经气,不使其陷下;再纳石脂末方寸匕,留药以沾大肠,截其道路,庶几利血无源而自止,其肾脏亦安矣。

【临证举例】①慢性肠炎《浙江中医杂志》(1982;8:378):王某,女,52岁。1981年4月21日诊。患者久有慢性肠炎病史,大便溏薄,腹痛绵绵。今年正月初四因食油腻,下利不止,服土霉素、氯霉素、痢特灵等药后泻利稍减,但仍是日十余行,呈白色粘冻状,兼见小便不利,腹部冷痛,四肢发凉,而色青黄,精神萎靡,口淡不渴,舌淡苔白,脉沉无力。证属脾阳虚衰,下元失固。治宜补脾回阳,温中固涩。方用赤石脂30克,粳米60克,干姜15克。服

六剂,腹痛消失,大便已转正常。②癃闭《中医杂志》(1984;7:18):曾某,女,42岁。1978年4月5日诊。1977年10月起即作腹痛,少腹拘急,尿少而频,日排尿仅100~200毫升左右。曾经双氢克尿塞、速尿治疗,尿量增至1500~2000毫升,腹胀随减,停药诸症又发。中药曾服八正散、五苓散、济生肾气丸、滋肾通关丸等剂,亦仅服药时症状好转,停药复如旧,病趋重笃,刻下面色苍白,形体肥胖,口和纳呆,恶心欲呕,心烦易怒,少腹拘急,腹胀尿少,尿意频频,尿色白浊,大便干,三四日一行,舌暗淡肥大,脉沉紧。此属脾肾阳气衰惫,枢机不运,气化无权。治宜温运脾肾阳气,枢转气机,方拟桃花汤:赤石脂60克,干姜、粳米各30克,清水煎至米烂熟为度,去渣,分昼三夜一温服,二日后大便通,小便利,色白浊,精神好转,寐安,纳食稍增,余症减轻。嘱再二剂,煎服法同前。四日后尿量增,腹胀、少腹拘急和心烦欲呕等证已除,面色转红润,纳增,舌体肥胖,苔净,脉沉紧,此中阳已运,肾气来复,原方再进,十日后舌脉复如常人,小便正常,大便通畅,遂以调理脾肾之剂善后。

67871 桃花汤

【方源】《医心方》卷十一引《范汪方》。

【组成】赤石脂二两(捣筛) 干姜二两 附子一两

【用法】以水五升,煮得三升,服一升,一日三次。

【主治】下痢赤白脓血。

67872 桃花汤

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】桃花(干者)二钱 甘遂(炒)一分 郁李仁(去皮双仁,别研膏) 海蛤(捣碎,炒) 枳实(去瓤,麸炒) 大黄(锉,炒)各半两 木香 陈橘皮(汤浸,去白,炒)各一分

【用法】上八味,先粗捣七味为末,与郁李仁和匀。每服五钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓,空腹温服。良久,以干饭一匙压之,觉

转动,腹如雷鸣,即以热水洗足,宣下诸恶物,以糜粥助之。

【主治】大便秘涩,五脏风壅,膈实不宜。

67873 桃花汤

【方源】《家塾方》。

【组成】桃花二钱 大黄一钱

【用法】以水二合,先纳桃花煮取一合二勺,纳大黄,煮取六勺,顿服。

【主治】浮肿,大小便不通。

67874 桃花面

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】新桃叶二两半(或用干者四两,捣末) 白面半斤

【用法】以水和匀,薄切如常食,煮熟,空心淡食之。至午时,腹中鸣,当下恶物。

【主治】大便不通,燥结,肠内胀痛。

【宜忌】三五日内忌热毒,炙煨。

67875 桃花散

【方源】方出《医心方》卷二十四引葛氏方,名见《外台》卷十九引崔氏方。

【组成】桃花末(舒者,阴干百日)

【用法】上为末,以戊子日三指撮,酒服。

【主治】①《医心方》引葛氏方:妇人不可生子。②《外台》引崔氏方:脚气,腰肾膀胱宿水及痰饮。

【宜忌】忌胡蒜、猪肉,慎生冷、酸滑、五辛、酒面及粘食肥腻,四五日外诸食复常。

67876 桃花散

【方源】《医心方》卷三引《古今录验》。

【组成】石南五两 薯蓣四两 黄耆三两 山茱萸三两 桃花半升 菊花半升 真珠半两 天雄一两(炮)

【用法】上药治下筛。每服半钱止,食竟酒调下,一日三次。稍增之。

【主治】风头眩倒,及身体风痹,走在皮肤中。

67877 桃花散

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《仙人冰鉴》。

【组成】桃花二钱 半夏六钱 厚朴 桂

各一分 干姜 牙消各二分 江豆 当门子各一个

【用法】上为散。每服一钱，空心以煎水调下。服至逡巡转自食。

【主治】小儿膈气。

【宜忌】乳母忌酒、肉、热面等。

67878 桃花散

【方源】《本草纲目》卷二十九引《集验方》。

【组成】桃花 葵子 滑石 槟榔各等分

【用法】上为末。每服二钱，空心葱白汤调下。即利。

【主治】产后秘塞，大小便不通。

67879 桃花散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】桃花三两（当年者） 槟榔三两 缩砂二两（去皮） 马牙消二两 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】五膈气，食饮不下，渐将羸瘦。

67880 桃花散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】桃花一分 干蟾（涂酥，炙令黄） 青黛（细研） 赤芍药 肉豆蔻（去壳） 紫笋茶各半两

【用法】上为细散。每服半钱，以温粥饮调下。

【主治】小儿食疳，腹胀。

67881 桃花散

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】麻黄（去根节） 天南星（炮） 白附子（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 乌头（炮裂，去皮脐）各一两 丹砂（研） 麝香（研）各一两 干蝎（去土，生用）一两

【用法】上为散。每服半钱匕，薄荷温酒调下；一切风，用葱酒调下；小儿每服一字匕，薄荷蜜水调下。

【主治】一切风惊。

67882 桃花散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】桃花半升（焙干） 苦参一两半

【用法】上为散。每服三钱匕，以酒、水各半盏，煎沸调下，空心、日午、夜卧各一服。

【主治】肾心痛，如物从背触心，牵脊伛偻。

67883 桃花散

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】蛤蚧（酥炙）一钱 蛤粉（研）二钱 芎藭一分 丹砂（研）半钱

【用法】上为散。每服半钱匕，温菴汁调下，乳食后服。

【主治】小儿咳嗽。

67884 桃花散

【方源】《永乐大典》卷九七五引《吉氏家传》。

【组成】朱砂一钱 蝎梢四十九个 膩粉一钱 天竺黄 马牙消各一两 片脑 麝香各少许

【用法】上为末。每服半钱，薄荷、金银汤调下。

【主治】小儿急慢惊风，诸般惊，五心热。

67885 桃花散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】天南星（生） 黄丹（生）各等分

【用法】上研匀，干掺。

【主治】刀斧所伤，挟风肿起。

67886 桃花散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】白及 白蔹 黄柏 黄连 乳香（另研） 麝香（另研） 黄丹各等分

【用法】上为极细末。掺在疮上。二三日生肌平满。

【功用】生肌。

【主治】一切疮。

67887 桃花散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】新石灰一两 黄丹半钱

【用法】上为细末。每服一钱，渴时冷浆水调下。

【主治】产后不烦而渴。

【方论选录】《济阴纲目》：丹出于铅，内含

真水，且以镇坠浮火，故能止渴。而石灰最为燥烈之物，何以用之，而况以产后乎？曰：不烦而渴时，用井水调下一钱，须当穷其故也。

67888 桃花散

【方源】方出《百一》卷十九，名见《普济方》卷三八一。

【组成】白矾 上色坯子各少许

【用法】上为细末。敷牙。

【主治】小儿走马牙疳。

67889 桃花散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】天竺黄 白茯苓 朱砂 脑 麝

【用法】上为末。每服一字，薄荷汤下，一日二次。

【主治】惊风，潮热烦闷。

【备考】本方方名，《普济方》引作“桃黄散”。

67890 桃花散

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】干地黄（生） 桃木（取白皮） 刘寄奴（叶） 枯桐皮（取白皮） 生姜 左缠藤叶 国丹各等分

【用法】上为细末。用生饼酒调涂患处。

【主治】伤损。

【加减】如因损而成风，则加服风损药。

67891 桃花散

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《烟霞圣效》。

【组成】膩滑石四两 赤石脂一钱

【用法】上为细末，入黄丹少许，如桃花色。每日上药一遍，上用膏药贴之。

【功用】生肌止痛。

【主治】一切疮口不收。

67892 桃花散

【方源】《施圆端效方》引陈君瑞方（见《医方类聚》卷一九二）。

【组成】青蛤粉一两 黄丹（炒）二钱

【用法】上为细末。干贴之。

【主治】下疳疮。

67893 桃花散

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】桃红散（《准绳·疡医》卷五）。

【组成】好石灰（用纱净筛）十两 清油小半灯盏 大黄（五钱，锉碎，水浸透取汁）大半盏

【用法】上石灰先用铁铛炒令带熟，次入大黄汁，清油和匀，以慢火炒如桃花色，乌盆盛之，倾出在内，浮而不沉，鹅翎拂聚纸上，别着瓦器收藏。凡是破损伤痕，用涂立效。仍服疏风散、活血散。

【主治】①《活幼心书》：一切破损，肢体出血作痛。②《广笔记》：跌损，刀伤，狗咬烂脚。

67894 桃花散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】赤药（炒） 白药（炒） 黄柏（炒）各三钱 轻粉一钱

【用法】上为细末。先煎葱白盐汤洗净，搥干，敷药末于疮口上。

【主治】诸疮口不合。

67895 桃花散

《丹溪心法》卷四。为方出《阎氏小儿方论》，名见《卫生总微》卷十八“桃红散”之异名。见该条。

67896 桃花散

【方源】《普济方》卷二七五。

【异名】桃花活血散（《疡科选粹》卷八）。

【组成】寒水石半斤（煨） 龙骨 虎骨 乌鱼骨各一两 白药 白石脂 赤石脂各半两 黄丹少许 白及半两

【用法】上为细末。量疮外用。

【功用】生肌活血去风。

【主治】一切恶疮、金疮。

【备考】《医方类聚》引《疮科通玄论》有地骨皮半两。

67897 桃花散

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】信一分 千年石灰二分

【用法】上为细末。先利动，津调，贴之。

【主治】远年恶疮，枯瘤。

67898 桃花散

《普济方》卷三三三。为《杨氏家藏方》卷十六“桃仁散”之异名。见该条。

67899 桃花散

《奇效良方》卷十三。为原书同卷“当归活血汤”之异名。见该条。

67900 桃花散

《医统》卷七十九。为《百一》卷十三“桃红散”之异名。见该条。

67901 桃花散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】风化石灰一斤 将军末子四两

【用法】先将灰炒，渐投将军末子，候看灰如桃花色即止。每用少许敷之。杖丹以调做膏药贴之。

【功用】《伤科汇纂》：止血住痛，去腐生肌。

【主治】①《赤水玄珠》：金疮出血及杖疮。②《惠直堂方》：汤火伤。

【备考】《惠直堂方》本方用法：治火伤，以麻油或茶汁调搽。

67902 桃花散

《便览》卷四。即原书同卷“生肌散”加黄丹。见该条。

67903 桃花散

【方源】《回春》卷七。

【组成】桃花信一块

【用法】桑柴火内烧红，淬入细茶浓卤内，如此七次，去信，将茶卤入雄黄一块，研末入卤内。用鸡翎频扫患处。

【功用】止痛生肌。

【主治】瘰气上攻，牙腮腐烂。

67904 桃花散

《疡科选粹》卷八。为《活法机要》“桃红散”之异名。见该条。

67905 桃花散

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】玄胡索一两 黄柏五钱 黄连五钱 青黛二钱 密佗僧二钱

【用法】上为末。用竹管吹入口内。

【主治】口舌生疮，疼痛臭烂。

67906 桃花散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】石灰一升 大黄三两（切片，同炒红色，筛去大黄）

【用法】上炒过石灰以水牛胆汁拌匀后装入胆内阴干，为末。搽患处。

【主治】刀刃所伤，出血不止。

67907 桃花散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】黄柏一钱 青黛二钱 肉桂一钱 冰片二分

【用法】上为末。敷之。

【主治】口破色淡，白斑细点，不渴。

67908 桃花散

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】露桃花（须待将开含笑时取，清晨摘取，饭锅上蒸熟焙干，带蒂入药） 红花 紫草 白芍（加倍） 木通 生地 茯苓 甘草 橘皮 灯心

【用法】水煎服。

【主治】《医方易简》：妇女痘疹，非行经之期，于发热时而经忽至者，毒火内炽，逼血妄行。

【宜忌】桃花不宜多用，多则恐作泻。

【加减】无桃花，多加紫草茸、芍药。

67909 桃花散

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】滑石五钱 龙骨二钱 白及一钱 赤石脂一两

【用法】上为末。搽之。

【主治】痘后疮成毒。

67910 桃花散

【方源】《产科发蒙》。

【组成】乌贼鱼骨十钱 朱砂二钱

【用法】上为末。每服一二钱，白汤送下。

【主治】产后血晕。

67911 桃花散

【方源】《集验良方拔萃》卷一。

【组成】炉甘石六钱（制） 熟石膏八钱 漂东丹二钱 龙骨三钱（煅，研，漂净） 轻

粉二钱 铅粉二钱 白蜡六钱 寒水石六钱
(漂净) 冰片一钱 红升丹二钱 (陈而顶好者)

【用法】上各为极细末,收贮瓷瓶备用。

【功用】拔毒,生肌。

【主治】痈疽诸疮已溃,大毒烂肉,拔出未尽,新肉将生之际。

67912 桃花散

【方源】《沈氏经验方》卷上。

【组成】冰片一钱 铜绿三两 白占二钱 樟脑五钱 浮甘石一两 (黄连制)

【用法】上为细末。如黑腐已尽,肉色红活,以猪骨髓同捣匀,做成夹膏,针刺多孔,贴之,二三日翻身,外用布捆。

【主治】烂腿。

67913 桃花散

《青囊秘传》。为原书“凉血散”之异名。见该条。

67914 桃花散

《青囊秘传》。即原书“八宝丹”加冰片、红升。见该条。

67915 桃花散

【方源】《中国医学大辞典》引马氏方。

【组成】石膏(煨)二两 轻粉一两 桃丹五钱 冰片五分

【用法】研极细末。掺于疮口,外用膏贴。外皮破碎者,以此敷之立结皮。

【功用】提脓拔毒,生肌收口。

【主治】①《中国医学大辞典》引马氏方:痈疽疮疡溃后,脓水淋漓,口不收斂。②《中医皮肤病学简编》:冻疮。

67916 桃花散

《饲鹤亭集方》。为原书“松黄散”之异名。见该条。

67917 桃花散

【方源】《伤科方书》。

【组成】乳香(炙) 没药(炙) 血竭(炙) 各等分

【用法】上为细末。

【主治】跌打损伤。

67918 桃花散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】石膏(煨)二两 枯矾三钱 章丹六钱 官粉八钱 松香八钱

【用法】上为细末,装袋,每袋重三钱。敷患处;或香油调上。

【功用】祛湿拔毒,消肿止痛。

【主治】一般湿疮,黄水疮,流水浸淫,红肿溃烂,痛痒不止。

67919 桃花散

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】松香二钱 枯矾二钱 黄丹五钱 梅片一钱

【用法】上为细末,可作十份。涂搽于患部,一天一次,香油调搽。用温开水洗去疮痂再搽药。

【主治】白秃疮。

67920 桃花散

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】黄柏 松香 黄丹各四两 枯矾二两 轻粉五钱

【用法】上为细末。

【功用】《中药制剂手册》:拔毒,消肿,止痛。

【主治】《中药制剂手册》:由湿毒疮疖引起的浸淫流水,红肿溃烂,痛痒不止。

67921 桃花散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】石膏 川贝母各五钱 朱砂一钱

【用法】上为细末。周岁小儿每服一分,二三岁儿每服二三分,与牛黄千金散合服尤妙,开水送下。

【功用】清肺镇惊,化痰止咳。

【主治】气喘痰鸣,烦渴喜饮,惊恐不宁,肺热咳嗽,痰壅气促,内热喘息。

【宜忌】①《全国中药成药处方集》(沈阳方):忌辛辣,大便溏泻者忌服。②(济南方):忌腥膻食物。

67922 桃花散

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】川贝一两半 法夏一两 月石二钱半 生石膏一两 朱砂二钱半 (一方有冰片二钱半)

【用法】上为细末。每服一钱半。

【功能】清肺宁嗽。

【主治】肺热咳嗽，气喘痰鸣，烦渴思饮，惊恐不宁。

67923 桃花粥

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参三钱 炙甘草三钱 赤石脂六钱 (细末) 白粳米二合

【用法】水十杯，先煮参、草，得六杯，去渣，再入粳米，煮得三杯，纳石脂末三钱，顿服之。利不止，再服第二杯，如上法，利止，停后服。

【主治】温病七八日以后，脉虚数，舌绛苔少，下利日数十行，完谷不化，身虽热者。

【加减】或先因过用寒凉，脉不数，身不热者，加干姜三钱。

67924 桃花膏

【方源】《经验良方》。

【组成】麻油四十钱 白蜡十六钱 赤降汞

【用法】加赤降汞炼和至桃花色为度，贴患处。

【主治】梅毒疮疡。

67925 桃杏散

《点点经》卷一。为原书同卷“润燥汤”之异名。见该条。

67926 桃杏膏

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】杏仁 核桃仁 生姜各等分。

【用法】研为膏，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼生姜汤送下。

【主治】咳嗽。

【备考】本方方名，据剂型，当作“桃杏丸”。

67927 桃灵丸

【方源】《集验良方》卷四。

【组成】五灵脂一两 (水淘) 川乌 (煮熟，去皮，炙干) 三钱 玄胡索三钱 桃仁 (去皮尖) 五钱 防风五钱 乳香三钱 (去油) 没药三钱 (去油)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，姜汤送下。

【主治】妇人一切血气心疼。

67928 桃灵丹

【方源】《回春》卷五。

【组成】玄胡索一两 桃仁 (去皮) 五钱 (另研) 五灵脂五钱 乳香五钱 没药七钱

【用法】上各为细末，醋糊为丸。每服二三十丸，心疼，淡醋汤送下；腹痛，干姜汤送下，或用黄酒送下。

【主治】心腹痛疼及阴症，或绞肠痧。

67929 桃灵丹

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】桃仁五钱 五灵脂五钱 (火煨裂)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，或醋汤送下。

【主治】诸般心腹气痛，或瘀血作痛。

67930 桃灵散

【方源】《痧证汇要》卷一。

【组成】桃仁 (去皮尖，水研，沥干，用红布包好，干灰中压一夜) 三两 五灵脂 (生用，酒拌，晒干) 二两 延胡索 (酒拌，晒干) 二两 广木香 (生研) 一两 广陈皮一两 滴乳香五钱 陈香圆 (炒) 二两 没药五钱

【用法】上为末。每服三钱，淡盐汤调下，重者二服。

【功用】通行气血。

【主治】痧胀腹痛，手足拘挛，俗称蝎蛛蝎瘟。

【宜忌】孕妇忌服。

67931 桃灵散

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】白矾五分 五灵脂一钱 乳香 (去

净油) 八分

【用法】上为细末。遇痛时每服三分，酒送下。

【主治】胃气痛。

67932 桃枝丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】桃符丸。

【组成】巴豆霜 川大黄 黄柏(末) 各一钱一字 轻粉 硃砂各五分

【用法】上为细末，面糊为丸，如粟米大。未晬儿三二丸，一岁儿五七丸，五七岁二三十丸，临卧煎桃枝汤送下。

【功用】疏取积热。

【主治】结胸。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方硃砂苦辛温有毒，主积聚，破结血，合巴豆、大黄、轻粉以攻下，黄柏以清热，故能治积热在里，结胸痰实之证。

67933 桃枝汤

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《圣济总录》卷五十六。

【异名】桃枝散(《普济方》卷三五二)。

【组成】东引桃枝一把

【用法】上切。以酒一升，煎取半升，顿服。

【主治】心腹痛，血痢，崩中下血。

①《肘后方》：卒心痛。②《圣济总录》：心腹注痛不可忍。③《普济方》：崩中下血不止，男子卒痢血。

67934 桃枝汤

【方源】《外台》卷二十九引《深师方》。

【异名】桃仁汤(《普济方》卷三一一)。

【组成】桃枝一握(中指长，铤) 芒消五分 大黄四两 当归 甘草(炙) 桂心各二两 虻虫二十枚(去翅足，熬) 水蛭二十枚(熬) 桃仁五十枚(去皮尖，熬)

【用法】上咬咀。以水八升，煮取三升，去滓，温分三服。内消。

【主治】堕落瘀血。

67935 桃枝汤

【方源】方出《得效》卷十，名见《普济方》卷二五四。

【组成】雄黄

【用法】上为末。每服一钱，桃枝叶煎汤调灌下。

【主治】中恶、中忤，鼻口吸着恶气，蓦然倒地，四肢厥冷，两手握拳，鼻口出清血。

67936 桃枝汤

【方源】《奇效良方》卷二十。

【组成】桃东行枝白皮(切碎)一握 官桂(去粗皮) 当归(焙)各三两 梔子仁十四枚 丹砂(碎) 附子(炮裂，去皮脐) 吴茱萸(汤泡) 豆豉各一两

【用法】上药铤，如麻豆大。每服四钱匕，用水二钟，加生姜三片，煎至一钟，去滓温服，日二次夜一次，不拘时候。

【主治】中恶霍乱心痛，胸肋疼痛，喘急。

67937 桃枝汤

【方源】《医统》卷三十八引《良方》。

【组成】桃东行嫩枝(切)一握 梔子仁十四粒 豆豉一两 吴茱萸一两 桃仁十四粒 麝香二分 当归二两 官桂五钱

【用法】上咬咀。每服四钱，水一钟半，生姜三片，煎七分，温服，日三夜一次。

【主治】中恶霍乱，客邪内干正气，使胃中食物不化，气不宣通，令人心腹卒痛，吐利，烦闷，甚则精神冒昧。

67938 桃枝饮

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】桃枝 柳枝各一握(细铤，东南者) 豉半两 葱白三茎(细切) 童便一升 地胆三钱(为末) 蜀椒(去目及闭口者，炒出汗)半两 生姜(细切)一两

【用法】上五味，为粗末，与姜、葱、豉同和匀，用童便一升，浸一宿，至四更，煎取半升，去滓。分二服，五更初一服，鸡鸣一服。服后汗出慎风，仍取米粉摩身上，若或微利即愈。如未愈，隔日再作，重者不过三

剂。

【主治】一切鬼气邪气，传尸伏连骨蒸。

67939 桃枝散

《普济方》卷三五二。为方出《肘后方》卷一，名见《圣济总录》卷五十六“桃枝汤”之异名。见该条。

67940 桃枝煎

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《伤寒类要》，名见《松峰说疫》卷二。

【组成】桃枝

【用法】浓煎如糖，以通下部中；若口中生疮，含之。

【主治】天行蟹，下部生疮或口疮。

67941 桃枲汤

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】桃枲（微炒）十四枚 鬼箭羽 木香 丁香各一两 桔梗（锉，炒） 陈橘皮（汤浸，去白，微炒） 紫苏（茎叶，微炙） 当归（焙干）各一两半 槟榔（慢火煨，锉）十四枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎取一盏，去滓，分温二服，相去数刻服之。

【主治】遁尸鬼注，腹中刺痛不可忍。

67942 桃柳汤

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】桃枝并叶五斤（细锉） 柳枝并叶五斤（细锉）

【用法】以水一硕，煮取七斗，去滓，带热，避风处淋浴。浴后于密室中刺头并眼后两边及舌下。血断，以盐末涂针处，便宜服葛鼓粥。

【主治】①《圣惠》：热病一日，身体壮热，头痛，骨肉痠楚，背脊强，口鼻手足微冷，小便赤黄。②《幼幼新书》引张涣方：小儿疳虫。

67943 桃姜煎

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】桃仁四十粒（去皮尖，炒黄） 干姜（炒黑）五钱

【用法】上为末。酒煎服。

【主治】瘀血作痛。

67944 桃姜煎

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】桃仁（去皮尖，研）二十粒 干姜（缓则炮）一钱 当归五钱 川芎一钱 黑荆芥五钱 红花二钱 泽兰一钱二分 炒黑豆百粒 童便一杯

【功用】逐瘀血，生新血。

【主治】产后不慎，风冷袭于胞门，恶露不下，而上逆冲心则发晕，额出冷汗，口噤牙紧。

【方论选录】心藏神主血。产后气血两亏，心神已恍惚不定，梦寐惊恐，乃瘀血乘虚冲逆，神为之散，失其主宰，遂至昏晕，不省人事，非辛热之药安能以逐瘀。桃仁、干姜、红花、泽兰，味虽辛热，而性不猛；佐以黑荆，则入血分；配以黑豆，风热尽去；加以童便，清心安神；而芎、归二味，所以生新。

67945 桃核汤

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】虻虫三十枚（熬） 水蛭各三十枚（熬） 桂心二分 大黄五两 桃核五十枚（去皮，切）

【用法】上咬咀。酒、水各五升，煮取三升，去滓，每服一升，一日三次。

【主治】金疮有瘀血。

67946 桃根汤

【方源】方出《伤寒类要》引《徐之才家秘方》（见《证类本草》卷二十三），名见《圣济总录》卷六十。

【组成】东引桃根（切细，如箸若钗股以下者）一握

【用法】以水一大升，煎取一小升，适温空腹顿服。后三五日，其黄离离如薄云散开，百日方平复，身黄散后可时时饮一盏清酒，则眼中易散，不饮则散迟。

【主治】黄疸，身眼皆如金色。

【宜忌】忌食热面、猪、鱼等肉。

67947 桃根汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】桃根 李根 梅根各二两

【用法】上咬咀。以水三斗，煮二十沸，去滓。浴儿。良。

【功用】令终身无疮疥。

67948 桃根煎

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃树根一斤 牛蒡子根一斤 马鞭草根一斤 牛膝二斤（去苗） 蓬蘽根一斤

【用法】上锉散。以水三斗，煎取一斗，去滓，更于净锅中以慢火煎如饴，盛于瓷器中。每服半大匙，食前以热酒调下。

【主治】妇人数年月水不通，面色萎黄，唇口青白，腹内成块，肚上筋脉，腿胫或肿。

67949 桃胶汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《卫生总微》卷八。

【组成】桃胶枣许大

【用法】夏以三合冷水，冬以三合汤，和服，一日三次。当下石子如豆，石尽止。

【主治】①《千金》：石淋，小便出血。②《卫生总微》：疮疹黑靥，发搐危困。

【方论选录】《千金方衍义》：桃胶散结血，通津液，不独治石淋也。

67950 桃胶散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桃胶二两 榆白皮二两 车前子 冬瓜子 鲤鱼齿 葵子 瞿麦 木通各一两 枳实半两

【用法】上为散。每服五钱，水一大盏，加生姜半分 葱白二茎，煎至七分，去滓，食前分温二服。

【主治】妇人气淋、劳淋。

67951 桃胶散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】石膏 木通 桃胶（炒作末）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，煎

至七分，食前通口服。

【主治】血淋。

67952 桃胶散

【方源】《妇人良方》卷二十二。

【组成】桃胶（瓦上焙干） 沉香 蒲黄（隔纸炒）各等分

【用法】上为末。每服二钱，食前陈米饮调下。

【主治】产后痢下赤白，里急后重，痔刺疼痛。

67953 桃梅丹

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】梅花五两 桃仁二钱 丝瓜五钱 辰砂二钱 甘草二钱

【用法】每服五分，参苏汤下。

【主治】痘已出，不起不发，隐在皮肤；并麻痒杂证。

67954 桃梅饮

【方源】方出《肘后方》卷七，名见《圣济总录》卷一四九。

【组成】梅叶 桃叶

【用法】上捣，绞汁三升许，以少水解为饮之。

【主治】中水毒。

67955 桃梅煎

【方源】《古今医鉴》卷十五引陈白野方。

【组成】桃枝连叶七枚（长四寸，捣烂） 乌梅七个（打碎） 白矾（研）一钱 胡椒（研末）一钱 川椒（研末）一钱

【用法】上用香油二两，煎至一两，每早擦一次。

【主治】秃头疮。

67956 桃黄散

《普济方》卷三十四。即《朱氏集验方》卷十一“桃花散”。见该条。

67957 桃黄煎

《顾氏医径》卷四。为《千金》卷四“桃仁煎”之异名。见该条。

67958 桃符丸

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷“桃枝

丸”之异名。见该条。

67959 桃符丸

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《吉氏家传》。

【组成】朱砂 天麻(末) 铅白霜各半钱 轻粉二钱 水银皂子大 巴豆三粒(去皮膜)

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。周岁以下五丸，桃符汤送下。

【主治】惊积，壮热，或吐或泻，脉沉缓，眼色眵。

67960 桃符丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】银朱一钱(研) 乳香一钱(煨) 大蒜一瓣(煨熟，研烂为膏)

【用法】上前二味和匀，蒜膏为丸，如绿豆大。每婴孩三丸，半岁五丸，一岁七丸，二三岁九丸，薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】小儿盘肠内吊，痛不可忍。

67961 桃符丸

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】大黄 郁李仁 黄柏 宣连 郁金各一分 巴豆二七个(去皮，出油为霜) 轻粉二钱

【用法】上为细末，滴水为丸，如绿豆大，以朱砂为衣。每服二丸，用桃符煎汤送下。

【主治】小儿风热。

67962 桃符丸

《普济方》卷三七〇。为《圣惠》卷八十五“红丸子”之异名。见该条。

67963 桃符丸

《中国医学大辞典》。为《普济方》卷三〇七引《全婴方》“比惊丸”之异名。见该条。

67964 桃蜜膏

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】杜仲四两 故纸二两 桃核肉三十个。

【用法】炼蜜为膏。空心滚水服。

【主治】腰痛。

67965 桃熊散

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《梅师方》，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】桃白皮

【用法】煮如稀汤，纳少许熊胆，研。以帛蘸药纳下部疮上。

【主治】热病后下部生疮。

67966 桃蝎散

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】大全蝎二十一个 核桃二十一个(擘开，去肉，将蝎装入扎紧，火煨存性)

【用法】每用一枚，研末。临卧陈酒调下。

【主治】忧思郁结，痰留气滞，乃生瘰癧。

67967 桃仁涂方

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】桃仁(去皮尖双仁，生用) 杏仁(去皮尖，生研)各三两 胡麻(生研) 凝水石(研如粉)各二两

【用法】上药各为末，别研芸苔菜纹取汁，和以白蜜，入前研药，搅为稀膏。用涂患处，干即易之。

【主治】风毒赤疹，浮肿成痞瘤。

67968 桃仁煎丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】桃仁三两(汤浸，去皮尖双仁，细研，以酒三升同礞砂煎成膏) 礞砂一两半(不夹石膏，细研) 鳖甲一两(涂醋炙令黄，去裙襕) 川乌头半两(去皮脐，锉碎，盐拌炒令黄) 紫菀半两(去苗土) 猪牙皂荚半两(去皮子，涂酥炙令焦黄) 防葵半两 木香三分 槟榔三分 干姜(炮裂，锉)

【用法】上为细末，入桃仁、礞砂煎中溶和为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以生姜汤送下。

【主治】息贲气。右胁下结硬如杯，心胸胀痛，不能饮食，胸膈壅闷，咳嗽喘促。

67969 桃仁煎丸

《圣惠》卷七十二。为《千金》卷四“桃仁煎”之异名。见该条。

67970 桃仁煎丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桃仁四十九枚(汤浸,去皮尖双仁,研如膏) 生地黄汁一升 生牛膝汁一升 白蜜五两(以上四味,同于石锅中,慢火熬如稀饬) 鳖甲一两半(涂醋炙令黄,去裙襴) 京三棱一两(微煨,锉) 当归一两(锉,微炒) 延胡索一两 干漆一两(捣碎,炒令烟出) 芫花半两(醋拌炒干) 水蛭四十九枚(炒令黄) 虻虫四十九枚(去翅足,微炒) 槟榔一两 川大黄一两(锉碎,微炒) 桂心二两 琥珀一两

【用法】上为细末,入前煎中搜和,捣三二百杵为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以温酒送下。

【主治】产后恶血,结成瘕块,羸瘦无力。

67971 桃仁澡豆

【方源】《千金》卷六。

【组成】桃仁 芫菁子各一两 白术六合 土瓜根七合 毕豆面二升

【用法】上药治下筛。以酢浆水洗手面。

【功用】悦泽,去黥黥。

67972 桃白皮汤

【方源】方出《肘后方》卷一,名见《圣济总录》卷五十七。

【组成】桃白皮

【用法】煮汁,宜空腹服之。

【主治】卒心痛。

67973 桃白皮汤

【方源】方出《外台》卷二十二引《救急方》,名见《圣济总录》卷一一九。

【组成】桃白皮 李白皮 槐白皮各等分

【用法】以酒煮,含之。取定。

【主治】牙疼。

67974 桃白皮散

【方源】方出《肘后方》卷七,名见《圣济总录》卷一四七。

【组成】斑蝥虫四枚(去足翅,炙) 桃皮(五月初五采取,去黑皮,阴干) 大戟

【用法】上药各治下筛。取斑蝥一分,桃皮、

大戟各二分,合和枣核大,以米清饮服之,吐出尽。一服不愈,十日更一服。

【主治】蛊毒。

67975 桃白皮散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】桃白皮半两(锉) 川大黄半两(锉碎,微炒) 知母一分 生干地黄半两 雌黄一分(细研) 猬皮一两(炙令黄) 独活半两 青黛一分(细研) 川椒一百枚(去目及闭口者,微炒去汗) 白芷一分 松脂半两 赤芍药一分 海苔一分 当归半两 斑蝥一分(以糯米拌炒,米黄为度,去头足翅)

【用法】上为细散,都研令匀。每服一钱,空心及晚食前以温粥饮调下。

【主治】此蟬瘰,发于颈上,初得壮热,后即成疮,出脓水疼痛。

67976 桃白皮散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】桃白皮半两(炙黄,锉) 黄连半两(去须,微炒) 龙骨半两 木香一分

【用法】上为细散。每服半钱,以粳米粥饮调下,一日三四次。

【主治】小儿痢渴,头热烦闷,不欲乳食。

67977 桃红饮子

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【异名】桃红饮(《类证治裁》卷五)。

【组成】桃仁 红花 川芎 当归 麝少许

【用法】水煎服。

【主治】痹证兼有瘀血者。

67978 桃红洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桃仁 90 克 桂枝 90 克 红花 30 克 川芎 30 克

【用法】水煎,熏洗。

【主治】冻疮。

67979 桃枝饮子

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】桃嫩枝一握(长二七寸) 柳嫩枝

一握 (长二七寸) 柴胡一两 (去苗) 白术一两 乌梅肉一两 (微炒) 甘草三分 (炙微赤, 锉) 鳖甲一两 (涂醋炙令黄, 去裙襴) 木香三分 赤芍药一两

【用法】上锉细。每服半两, 以童便一大盏, 加生姜半分, 葱白七寸, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】虚劳羸瘦, 寒热进退如疟, 半眠半起, 或时吃食, 或时不能饮食。

【宜忌】忌菹菜。

67980 桃枝饮子

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】嫩桃枝一握 (长三七寸) 柳枝一握 (长三七寸) 豉心五合 甘草三分 (生用) 生姜半两 葱白二七寸 薤白三握 青蒿二两

【用法】上锉细。以童便二大盏, 煎至一盏五分, 去滓, 分温三服, 不拘时候。

【主治】骨蒸劳瘦, 体痛烦热。

67981 桃柳心汤

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】桃心一握 柳心一握 甘草三分 (生用, 锉) 乌梅五颗 (槌碎) 梔子仁三分

【用法】上件药, 以淡浆水一大盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。良久当吐, 不吐再服。

【主治】时气四日, 胸中痰壅, 憎寒壮热, 头痛。

67982 桃仁大黄汤

【方源】《外台》卷七引《崔氏方》。

【组成】鬼箭羽二两 桃仁六十枚 (去皮尖) 芍药四两 鬼臼二两 (削去皮) 橘皮一两 当归二两 生姜五两 桂心二两 柴胡一两 朱砂二两 (研, 汤成下) 麝香一分 (研, 汤成下) 朴消二两 (研, 汤成下) 大黄三两 (别浸)

【用法】上切, 以水九升, 急火煮取三升, 温分三服, 如人行相去六七里服。但得快利

三四行, 必愈。

【主治】心腹痛不可忍, 似疟病者; 或暴得恶症, 搅刺欲死。

67983 桃仁大黄汤

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】大黄 朴消各五分 丹皮 瓜蒌仁 桃仁 (去皮尖) 各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肠痈未成脓, 肿痛洩闭, 坚硬。

67984 桃仁石膏汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】桃仁 石膏 (煨) 陈皮 枳壳 大黄 归尾 黄芩 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿伤寒至八九十日之间, 传入足厥阴肝经, 大便结塞, 小便赤色, 腹痛, 昏迷作渴者。

67985 桃仁四物汤

【方源】《万民女科》卷一。

【组成】归尾 川芎 赤芍 丹皮 香附 玄胡索各一钱 生地 红花各五分 桃仁二十五粒

【用法】水煎服。

【主治】经水将行, 腰胀腹痛者, 此气滞血实也。

【加减】瘦人责其有火, 加黄连 (炒)、黄芩 (炒) 各一钱; 肥人责其有痰, 加枳壳、苍术各一钱。

67986 桃仁地黄酒

【普济方】卷三一二。即《圣济总录》卷一四五“地黄酒”。见该条。

67987 桃仁芍药汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】桃仁散 (《圣惠》卷八十一)。

【组成】桃仁半升 芍药 芎藭 当归 干漆 桂心 甘草各二两

【用法】上咬咀。以水八升, 煮取三升, 分三服。

【主治】①《千金》: 产后腹痛。②《圣惠》: 产后恶血未尽, 攻心腹痛。

【方论选录】《医略六书》：产后冲任不调，不能操蓄泄之权，而瘀血内结，故腹痛环脐牵引不宁焉。桃仁破瘀血以开结，当归养冲任以荣经，赤芍破瘀泻血滞，桂心通闭温经脉，川芎行血中之气，漆灰化瘀结之血，甘草缓中州以和胃气也。水煎温服，使瘀化结开，则经脉清和，而腹痛无不止，安有牵引环脐之害乎。

【备考】本方方名，《医略六书》引作“桃仁煎”。《圣惠》有干姜。

67988 桃仁当归汤

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】桃仁（去皮尖）二钱 当归尾（酒洗）玄胡索各一钱半 川芎 生地黄 赤芍药（炒） 吴茱萸 青皮（醋炒）各一钱 牡丹皮八分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】疝因瘀血作痛。

67989 桃仁当归汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】桃仁 当归 丹皮 郁金 泽兰叶 楂肉 红花 山梔 赤曲 赤芍药

【主治】血滞腹痛，不作胀，不饱满，饮水作呃，遇夜更痛，痛于一处，定而不移，脉扎涩，或沉细。

67990 桃仁延胡汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】桃仁泥十粒 木香 炮姜各五分 炙甘草三分 香附（醋炒） 延胡索（醋煮） 广皮各一钱 钩藤 泽兰各一钱半 砂仁五分

【用法】水煎服。

【主治】心痛素喜食热物者，瘀血停于胃口也。

67991 桃仁红花汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】桃仁 红花 苍术 生玄胡 生蒲黄 泽兰 芍药 楂肉 枳壳

【主治】产后恶露不行。

67992 桃仁红花汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】藪四（《痧症全书》卷下）、三十六号益象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】桃仁（去皮尖） 红花 苏木各一钱 青皮八分 乌药四分 独活六分 白蒺藜（去刺，捣末）一钱二分

【用法】水二钟，煎七分，微温服。

【主治】痧症血结不散。

67993 桃仁红花汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】桃仁 红花 玄胡 川芎 白芍 连翘 丹皮 牛膝 柴胡 黄芩 青皮 银花

【用法】水煎服。

【主治】疹后月事适来适断，寒热往来如疟，日间了了，暮则谵语，妄见妄闻者。

67994 桃仁苏木汤

【方源】《普济方》卷三四六引《指南方》。

【组成】地黄 芍药各三两 当归 川芎 苏木 桃仁一百个（去皮尖） 水蛭七个

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】恶露正行或绝，忽尔腰痛。

67995 桃仁苦酒汤

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二。

【组成】桃仁十五枚 苦酒二升 盐一合

【用法】煮取六合，服之。

【主治】伤寒蟹疮。齿无色，舌上白，喜睡眠，愤愤不知痛痒处，或下痢。

67996 桃仁承气汤

《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》。为《伤寒论》“桃核承气汤”之异名。见该条。

67997 桃仁承气汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】桃仁十二个（去皮尖） 官桂 甘草 芒消各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三五钱，水一大盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】妇人月事沉滞，数月不行，肌肉不减。

67998 桃仁承气汤

【方源】《普济方》卷一三四引《德生堂方》。

【组成】枳实一钱 厚朴二钱 桃仁二十四个（去皮尖，切碎） 大黄三钱（另研下）

【用法】上咬咀，如法修制，作一服。水一盞半，煎取一盞，却下大黄末，每二三沸，去滓温服。大便内下黑白血粪为愈。此下之重剂。

【主治】伤寒鼻口出血，及大便秘结，小便黑赤如血，此小腹中有瘀血故也。

67999 桃仁承气汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】桃仁 大黄 芒消 甘草 桂枝 丹皮 枳实

【用法】用水煎至一钟，入大黄一二沸，再下芒消一沸，热服。取下黑物。

【主治】①《伤寒全生集》：蓄血证。②《明医指掌》：跌扑伤损。

【加减】外有热，加柴胡；在上，加桔梗、苏木；在下，加牛膝；两胁并小腹硬满痛者，加青皮、川芎、归尾、芍药，痛甚加延胡索、红花；血未下，加童便、姜汁少许；若头面身黄者，姜滓绵裹擦之，其黄自退矣。

【备考】方中枳实，《明医指掌》作“枳壳”。

68000 桃仁承气汤

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】桃仁 芒消 甘草各一钱 大黄二钱

【用法】水煎服。

【主治】伤损，血滞于内作痛，或发热、发狂。

68001 桃仁承气汤

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】桃仁半两 大黄（炒）二两 甘草二钱 肉桂一钱

【用法】姜水煎，发日五更服。

【主治】妇人瘀血，小腹急痛，大便不利，或谵语口干，漱水不咽，遍身黄色，小便自利；或血结胸中，手不敢近腹，寒热昏迷，其人如狂。

【方论选录】《医略六书》：室女血瘀，冲任结滞小腹，而蓄泄不灵，故腹痛不止，经闭不通焉。桃仁生用破积血以开瘀结，大黄醋煮逐瘀血以通经脉，甘草和中缓胃，官桂通经活血也。水煎温服，使瘀血消化则冲任调和，而月事时下，何腹痛之有哉！

68002 桃仁承气汤

【方源】《直指附遗》卷六。

【组成】桃仁 大黄 桂枝 芒消 甘草 当归 苏木 红花

【用法】入酒、童便，煎服。

【主治】跌扑损伤，瘀血作腹痛者。

68003 桃仁承气汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】桃仁二十一个（去皮尖，研泥，勿煎） 大黄二钱 官桂 红花各一钱 甘草半钱

【用法】上三味，锉细，水一盞，煎至七分，去滓，入桃仁泥化开，食前服。

【主治】小儿痘后失血，血自大便出者。

68004 桃仁承气汤

【方源】《疹科正传》。

【组成】桃仁 红花 当归 生地 甘草 青皮 白芍 大黄

【用法】水煎服。

【主治】疹后蓄血证。

68005 桃仁承气汤

《寿世保元》卷二。为《赤水玄珠》卷十八“桃仁承气饮子”之异名。见该条。

68006 桃仁承气汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桃仁 大黄 甘草 桂枝 芒消 枳壳 归尾

【主治】内伤胃脘痛之有死血者。其症日轻夜重，或唧唧作声，得寒则痛，得热暂缓，脉涩结；又治血臌腹胀，下焦蓄血，小腹闷痛，

腹胀不减，肚大紫筋，腿足或见血缕，小便反利，大便或黑，脉芤或涩，或见沉数，或见细微，或见沉伏，或见牢实。

68007 桃仁承气汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】大黄四钱 芒消二钱 桃仁十八粒 当归二钱 芍药二钱 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】蓄血证。

68008 桃仁承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】光桃仁三钱（勿研） 五灵脂二钱（包） 生蒲黄一钱半 鲜生地八钱 生川军二钱（酒洗） 元明粉一钱 生甘草六分 犀角汁四匙（冲）

【主治】肠中瘀热。

【方论选录】何秀山：此方以仲景原方去桂枝，合犀角地黄及失笑散，三方复而为剂，可谓峻猛矣。然急证非急攻不可，重证非重方不效，古圣心传，大抵如斯。

68009 桃仁承气汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】桃仁 大黄 枳壳

【主治】蓄血腹痛。

68010 桃仁承气汤

【方源】《灵验良方汇编》卷上。

【组成】桃仁五钱 大黄一两 甘草二钱 肉桂一钱 生姜二片

【用法】水煎服。

【主治】瘀血，小便急痛，大便不利，发热谵语，或血结胸中，痛不可逆。

68011 桃仁恒山丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】恒山 桃仁 黄耆各一两 香豉一合

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每至发日，空心煎桃仁汤下十丸，于发时再一服。

【主治】痒症发作不定，但热不寒。

68012 桃仁洗面方

【方源】《外台》卷三十二引《延年秘录》。

【组成】桃仁五合（去皮）

【用法】上一味，用粳米饭浆水研之令细，以浆水捣取汁，令桃仁尽即休，微温用，洗面时长用极妙。

【功用】去风，令光润。

68013 桃仁桂心汤

【方源】方出《圣惠》卷六十七，名见《普济方》卷三十一。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁） 桂心一两 菴蒿子一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 荷叶蒂三七枚

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，加朴消一分，搅令匀，空腹分为二服。以利下恶血为度。

【主治】打损瘀血在脏，攻心烦闷。

68014 桃仁常山丸

《外台》卷五引《近效方》。为原书同卷引《近效方》“常山丸”之异名。见该条。

68015 桃仁雄黄膏

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】桃仁 雄黄末

【用法】桃仁研膏，合雄黄末，鸡肝切片，蘸药纳户中。其虫一闻肝腥，皆钻肝内吮食，将肝提出，其病即愈。

【主治】阴痒。

68016 桃仁滑石汤

【方源】《不居集》下集卷十一。

【组成】梔子 丹皮 归尾 赤芍 五灵脂 滑石 桃仁

【功用】去瘀消瘀。

【主治】积瘀。

68017 桃仁鳖甲汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】桃仁三钱 鳖甲三钱 丹皮三钱 丹参三钱 桂枝三钱 甘草二钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】产后瘀血蓄积，木郁腹痛者。

【加减】内热，加生地；内寒，加干姜。

68018 桃心塞耳方

【方源】方出《肘后方》卷六,名见《圣济总录》卷一八一。

【组成】桃叶

【用法】塞两耳。立出。

【主治】百虫入耳。

【备考】《圣济总录》本方用法:先以桃叶塞耳中,其虫必出。如不出,以胡麻子炒令香,以葛袋盛枕头,耳中虫自出。

68019 桃叶汁涂方

【方源】方出《本草纲目》卷二十九引《千金》,名见《圣济总录》卷一三七。

【组成】桃叶

【用法】日午捣桃叶,取汁涂之。

【主治】身面癣疮。

68020 桃叶蒸痔方

【方源】《外台》卷二十六引《删繁方》。

【组成】桃叶一斛 细糠 胡麻各一斗 (熬)

【用法】三味合为一家蒸之,取细糠熟为度,纳小口瓮中,将肛门坐,桃叶气熏入肛门,虫出当死。

【主治】五痔。

68021 桃红四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】川芎三钱 酒芍三钱 熟地三钱 桂心一钱半 (研) 附片一钱半 桃仁一钱 (去皮尖,研) 红花一钱 当归身七钱 (炒)

【主治】经期诸痛。

68022 桃红四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】桃仁一钱 (炒,研) 红花一钱 全当归一两 (生用) 川芎一钱 生地五钱 乳香二钱 生白芍二钱 怀牛膝三钱

【主治】积乳,吹乳,妬乳。

68023 桃红四物汤

《金鉴》卷四十四。为《玉机微义》卷三十一引《元戎》“加味四物汤”之异名。见该条。

68024 桃红四物汤

【方源】《中医妇科学治疗学》引张香南方。

【组成】生地四钱 归尾 赤芍各三钱 川芎 桃仁 红花各二钱 丹皮 五灵脂各三钱

【用法】水煎,空腹服。

【功用】清热通瘀。

【主治】月经先期,血瘀而兼热者,经色紫,质稠粘,中夹血块,腹痛拒按,舌质淡红或略带紫色,苔黄而干,脉沉数或弦滑有力。

68025 桃红消瘀汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】丹参三钱 土牛膝 归尾各二钱 桃仁 红花各一钱 乳香二钱 莪术三钱

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀。

【主治】产后发热,恶露断续而下,并有浊带样分泌物,忽然少腹作痛,痛时不能重压,尿频便结,舌淡,苔细薄,脉弦实。

68026 桃花化浊汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桃仁二钱 红花五分 牛膝二钱 延胡索一钱 归尾一钱五分 赤芍一钱 丹参二钱 茵陈三钱 泽泻一钱五分 车前二钱 降香五分 血余炭一撮

【功用】通利下焦,兼去瘀。

【主治】女劳瘵,膀胱急,小腹满,身尽黄,额上黑,足下热,大便黑而时溏,以因血瘀不行,积于膀胱少腹。

68027 桃花生肌散

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】风化石灰 (水澄过) 半斤 大黄四两 梔子二两

【用法】合炒至石灰红色取起,去大黄、梔子,用石灰。须退冷陈久而后用。

【功用】散瘀生肌,蚀恶肉,敛疮口。

68028 桃花行气丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】桃花七钱 染胭脂五钱 白附子 甘遂 天南星各二钱 大麦面十钱 威灵仙 五钱 大戟三钱

【用法】上为末，生用，滴水为丸，如梧桐子大。每服二十丸，先用水一大盏煎桑白皮三寸，煎五七沸，去皮不用，纳药再煮五七沸，滤出并放温，将丸煮药汤下，食后临卧服。

【功用】疏风气。

【主治】温湿风毒，客伏经络，气壅血涩，肢体闷痛，懊烦壮热，气奔逆冲，心腹痞满，腰脊重痛，脚膝难举，痛不能动，肩背拘强，眩冒神昏；或将温过度，客热内盛，随气升降，游注疼痛，及肿满水气。

68029 桃花活血散

《疡科选粹》卷八。为《普济方》卷二七五“桃花散”之异名。见该条。

68030 桃花隔纸膏

【方源】《医灯续焰》卷十三。

【组成】上好透明松香（水煮，随换水，煮数十次，以色白味不涩苦为度）

【用法】上为细末，入上上飞丹十分之四，再研匀。用猪板油去膜切碎，同药捣匀，摊油纸上。作隔纸膏，上针刺多孔。先将苦茶洗患处净，拭干贴上。以绢帛紧包扎，一日一换。虽二十年疔疮，不消十纸。

【主治】久患疔疮。

68031 桃枝当归膏

【方源】《东垣试效方》卷三。

【组成】当归身（去细梢，洗去土，干）一两 杏仁（汤浸，去皮尖）一百个 肥嫩柳枝三两半（切寸许，水洗，干） 肥嫩桃枝一两半（切寸许，水洗，干） 黄丹（水飞）六两 脂麻油一斤

【用法】上件先令油热，下桃枝、柳枝，熬至半焦，以绵裹当归、杏仁熬至桃枝、柳枝黑焦为度，去药滓滤油净，抹出铍子中滓秽合净，再上火令沸，旋旋入黄丹，熬成滴水中不散为度，或只摊纸上不透为度。

【主治】一切热疮。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“寒疮热膏药”。

68032 桃枝浸浴方

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】桃枝一斤 枫枝一斤 槐枝一斤 柳枝一斤 杉枝一斤 松枝一斤 桑枝一斤 苦参半斤 蒴藿半斤 牛蒡根半斤 枸杞根半斤 秦艽半斤 丹参半斤 莽草半斤

【用法】上锉细。分为四度，每度以东流水一硕，煎取七斗，去滓。看冷热，于暖室内浸洗。后以衣盖卧，避风。

【主治】五脏大风癩，并赤白诸癩，毒疮遍身痛。

68033 桃桂当归丸

《东医宝鉴·杂病篇》卷十。为《全生指迷方》卷六“没药丸”之异名。见该条。

68034 桃核承气汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桃仁承气汤（《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》）。

【组成】桃仁五十个（去皮尖） 桂枝二两（去皮） 大黄四两 芒消二两 甘草二两（炙）

【用法】上以水七升，煮取二升半，去滓，纳芒消，更上火微沸。下火，先食温服五合，一日三次，当微利。

【功用】《中医方剂学》：破血下瘀。

【主治】下焦蓄血，少腹急结，大便色黑，小便自利，甚则谵语烦渴，其人如狂，至夜发热，及血瘀经闭，痛经，跌打损伤。

①《伤寒论》：太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，少腹急结者。②《外台》引《古今录验》：往来寒热，胸胁逆满。③《丹溪心法》：吐血，觉胸中气塞，上吐紫血者。④《柯氏方论》：女子月事不调，先期作痛与经闭不行者。⑤《嵩崖尊生》：牙根出臭汗。⑥《类聚方广义》：痢疾身热，腹中拘急，口干唇燥，舌色殷红，便脓血者；淋家，小便急结，痛连腰腿，茎中疼痛，小便涓涓不通者；打仆疼痛，不能转利。⑦《喉科种福》：刺伤咽喉，肿痛非常，有碍饮食者。

【宜忌】①《外台》引《古今录验》：忌海藻、

菰菜。②《中医方剂学》：孕妇忌服。

【方论选录】①《医方考》：桃仁，润物也，能泽肠而滑血；大黄，行药也，能推陈而致新；芒消，咸物也，能软坚而润燥；甘草，平剂也，能调胃而和中；桂枝，辛物也，能利血而行滞。又曰：血寒则止，血热则行。桂枝之辛热，君以桃、消、黄，则入血而助下行之性矣，斯其治方之意乎！②《古方选注》：桃仁承气，治太阳热结解而血复结于少阳枢纽间者，必攻血通阴，乃得阴气上承，大黄、芒消、甘草本皆入血之品，必主之以桃仁，直达血所，攻其急结，仍佐桂枝泄太阳随经之余热，内外分解，瘀血结无留恋之处矣。

【临证举例】①痢疾 《诸证辨疑》：一妇长夏患痢疾，痛而急迫，其下黄黑色，两尺脉紧而涩，知寒伤官也。细问之，答曰：“行经之时，渴饮冷水一碗，遂得此证。”此乃血被冷水所凝，瘀血归于大肠，热气所以坠下，遂用桃核承气汤，内加马鞭草、延胡索，一服。次早下墨血升许，痛止脏清，次用调脾活血之剂，遂愈。②癫狂 《遼园医案》：李某，年二十余，先患外感，诸医杂治，证屡变，由其父陪来求诊。审视面色微黄，少腹胀满，身无寒热，坐片刻即怒目注人，手拳紧握，伸张如欲击人状，有顷即止，嗣复如初，脉沉涩，舌苔黄暗，底面露鲜红色。病已入血分，前但知用气分药，宜其不效。《内经》言：“血在上善忘，血在下如狂。”此证即《伤寒论》热结膀胱，其人如狂也。当用桃核承气汤，即疏方投之，一剂知，二剂已。嗣以逍遥散加丹、梔、生地调理而安。③慢性前列腺炎《湖南中医学院学报》(1979;1:30)：周某，男，32岁，患慢性前列腺炎，小腹及会阴部灼热胀痛，伴阳萎、小便频数等证经年。经用杜仲、补骨脂、淫羊藿、熟地黄、泽泻等数剂，遂致二便俱闭，小腹胀满剧痛，有灼热感，小便点滴难出，大便未解，心烦口渴，呼吸急迫，痛苦不堪，舌红，苔黄厚糙，脉数。此为膀胱热结瘀阻，水道不通，大便为邪热所干，燥粪难下，治宜急攻瘀热，以桃核承气汤，昼夜

连进两剂，便通痛解，再以草薢分清饮合知柏地黄丸加减，治疗两月而愈。④胞衣不下 《伤寒论今释》：一妇人，小产后胞衣不下，忽然上攻，喘鸣促迫，正气昏冒，不知人事，自汗自涌，心下不硬而少腹满，眼中如注兰，乃予桃核承气汤，须臾，胞衣得下。⑤闭经 《江苏中医》(1960;6:40)：陈某，女，20岁，未婚。自诉小腹胀痛，月经停止不行已有六月之久，缘因正当行经时，在田间插秧，适雷雨骤至，衣服尽湿后即经停不行，小腹日渐痛。询其过去经事，皆按期正常。按其腹，指下有凝滞抵抗之状，腹壁紧急，四肢乏力，头目昏眩，大便微难，小溲如常。余断为蓄血，是因月经时受冷，冷则血凝之故。遂处以桃核承气汤二帖，服后痛胀若失，经事畅行，紫黑色血块甚多，至今月经按月畅行。

68035 桃椒二仁丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】椒仁 桃仁 黑丑 红花 当归 苓皮 甘遂 桑白皮 芫花 川芎 赤芍 生地 米仁 香附

【主治】经水先断，而后发肿。

【方论选录】是方桃、椒二味为君，一以通经，一以利水；甘遂、芫花、苓皮、桑皮、米仁皆佐椒仁以行水消肿，黑丑、红花、香附皆佐桃仁以破滞血、散结气；四物以和血调经，虚人服之亦无损也。

68036 桃溪气宝丸

【方源】《医方大成》卷六引《简易》。

【组成】黑牵牛二两 大黄一两半 槟榔 青皮(去白)各一两 木香 羌活 川芎 陈皮 茴香(炒) 当归各半两

【用法】上为末，用皂角膏为丸，如梧桐子大。每服一百丸，生姜、灯心汤送下。

【主治】腰肋俱病，如抱一瓮，肌肤坚硬，按之如鼓，两脚肿满，曲膝仰卧，不能屈伸，自头至臌中，瘠瘦露骨，一切气积、食积并脚气走注，大便秘结，寒热往来，状如伤寒。

68037 桃溪回阳丹

【方源】《普济方》卷八十八引《简易》。

【组成】川乌(洗) 草乌(洗)各三两 地龙(洗) 五灵脂(洗) 南星(洗)各一两 附子 麝香各少许

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。初服半丸,渐加小丸至大丸,姜汁磨化,先嚼薄荷,日午、夜卧温酒送下。瘫痪不能行,服三十丸必愈,如中风不软,只口眼喎斜,服二三丸效。

【主治】卒暴风中、气中,瘫痪,手足不遂,语言謇涩,口眼喎斜,筋脉挛急,半身不举,不省人事。

68038 桃仁青蒿煎丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】桃仁(汤浸,去皮尖,研)半两 麝香(研)一分 柴胡(去苗) 丹砂(研) 紫菀(去苗土) 鳖甲(去裙襴,醋炙)各一两

【用法】上六味,除麝香、丹砂外,并捣罗为末,共研匀,用青蒿汁、童便、生地黄汁各一盏,于银石器内熬汁,入药末一半,慢火再熬,搅得所,余药未尽和匀,杵为丸,如绿豆大。每服五七丸至十丸,空心、食前煎陈粟米饮送下,一日三次。

【功用】长肌肉,退热。

【主治】小儿十五岁以下,骨蒸热劳,盗汗,体热咳嗽,烦躁发渴。

68039 桃仁承气饮子

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【异名】桃仁承气汤(《寿世保元》卷二)。

【组成】桃仁 桂枝 芒消 大黄 芍药 柴胡 青皮 当归 甘草 枳实

【用法】以水二钟,加生姜三片煎,临服入苏木煎汁三匙服。

【功用】《江西中医药》:疏肝行气,通瘀生新。

【主治】蓄血证。热邪传里,热蓄膀胱,其人如狂,小水自利,大便黑,小腹满痛,身目黄,谵语,烦渴,脉沉有力。

【方论选录】《江西中医药》:桃仁承气饮子为桃仁承气汤加味组成。桃仁承气汤乃仲景为膀胱蓄血证而设。方中大黄、芒消泻结去热,桃仁破瘀行血,桂枝通经脉中瘀血,甘草和中调胃。此加青皮、枳实破血行气,当归、芍药祛瘀生新,柴胡疏肝升清,苏木助桃仁、桂枝以逐瘀血,是方消中有利,升中有降,寒温适度,配伍谨严,功能疏肝行气,通瘀生新,确属治疗气机阻滞,瘀血内停诸症的首方。

【临证举例】宫外孕 《江西中医药》(1984;3:9):陈某,女,40岁。1976年10月5日初诊。主诉:停经50余天,阴道不规则流血二十余天。现病史:左下腹阵发性胀痛拒按,有欲便坠胀感,行走弯腰不便,阴道流血淋漓不尽,时有小血块,遂入院治疗。妇科检查:子宫位置大小触及不满意,后穹窿较饱满,宫颈抬举明显疼痛,阴道内有少量血性分泌物,左下腹可摸到似鸡蛋大的包块,穹窿穿刺可见不凝固的血性液体,确诊为宫外孕。血压104/68mmHg,面色萎黄,形体消瘦,精神倦怠,痛苦呻吟不已,伴有胸闷,食纳欠佳,不发热,二便如常,舌暗淡,苔薄白,脉弦细滑。辨证为气机阻滞,血瘀少腹。法以疏肝行气,通下祛瘀。处方:桃仁6克,大黄6克(后下),芒消6克(冲),甘草5克,桂枝5克,青皮10克,枳实10克,当归12克,白芍10克,苏木10克,柴胡5克。上方服三剂,大便转泄,腹痛见减,阴道流血增多,伴有黑色瘀块,腹部包块缩小。效不更方,继进三剂,腹痛流血均止,少腹包块明显缩小,精神转佳,纳谷始觉有味。仍守上方,去芒消,大黄减量,继服七剂,腹部柔软,包块消失。继以八珍汤加益母草调理而安。

68040 桃叶朱砂煎酒

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】桃仁二升(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,细锉) 朱砂二两(细研)

【用法】以无灰好清酒三斗,取瓷瓶三只盛酒,逐斗分桃仁、朱砂入瓶内,封头。一依

煮酒法度，不拘时候，温饮一小盏。

【功用】益血长肉，除瘦弱，悦颜色。

【主治】肝风，筋脉挛急疼痛。

【宜忌】忌羊血。

核

68041 核桃丸

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】破故纸二两（酒浸，炒） 杜仲一两（炒去丝） 核桃仁一斤

【用法】上为末，将核桃仁共捣成膏为丸，如弹子大。每服一丸，早、晚用酒或滚白水送下。

【主治】诸虚百损。

68042 核桃散

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】炙全蝎 核桃肉各二枚

【用法】上为末。热酒冲服。

【主治】上搭。生柱傍肩后骨上，肿大而硬，红活者生，黑陷者死，乃脾经蕴热及郁忽所致。

酌

68043 酌圣丹

【方源】《普济方》卷三二四引《仁存方》。

【组成】巴豆三十个（去皮心，细研，盐醋一盞，熬膏半盞） 没药半两（末） 蓬莪术四钱

【用法】上为丸，如梧桐子大。每服三五丸，空心、食前用红花酒送下，一日二三次。积滞恶血自去。

【主治】妇入血积、血块、血气，产后诸血滞痛，寒热，四肢困倦，脚顽麻沉重，黄瘦，脐腹久冷。

【加减】虚衰妇人，加干姜一两。

都

68044 都气丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】六味地黄丸加五味子

【功用】①《医方集解》：益肺之源，以生肾水。②《中药成方配本》：补肾纳气。

【主治】肺肾两虚，咳嗽气喘，呃逆，滑精，腰痛。

①《症因脉治》：肺虚身肿，肺气不能收摄，泻利喘咳，面色惨白，小便清利，大便时溏。②《张氏医通》：肾水不固，咳嗽精滑。③《医钞类编》：伤肾咳嗽，气逆烦冤，牵引腰痛，俯仰不利。④《己任编》：阴火呃逆，脉两尺洪盛或弦细而数，面时赤。

【临证举例】①阴虚咳嗽 《静香楼医案》：脉虚数，颧红声低，咳甚吐食，晡时热升，多烦躁。此肝肾阴亏，阳浮于上，精液变化痰沫。病已三年，是为内损，非消痰治嗽可愈。固摄下焦，必须绝欲。以饮食如故，经年可望其愈，都气丸加女贞子、枸杞子、天冬。②遗精 《静香楼医案》：遗精伤肾，气不收摄，入夜卧著，气冲上膈，腹胀，呼吸不通，竟夕危坐，足跗浮肿清冷，小便渐少，此木实先拔，枝将败矣，难治之证也。都气丸加牛膝、肉桂。

【备考】本方改为饮剂，名“都气饮”（见《盘珠集》）。

68045 都气饮

《盘珠集》卷下。即《症因脉治》卷三“都气丸”改为饮剂。见该条。

68046 都艮丸

《摄生众妙方》卷七。为《百一》卷九引杨吉老方“都梁丸”之异名。见该条。

68047 都梁丸

【方源】《百一》卷九引杨吉老方。

【异名】芷弹丸（《直指》卷十一）、都艮丸（《摄生众妙方》卷七）

【组成】香白芷大块（择白色新洁者，先以棕刷刷去尘土，用沸汤泡洗四五遍）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后常服，多用荆芥点腊茶细嚼下；只干嚼咽亦可。

【主治】诸风眩晕，妇人产前产后乍伤风

邪，头目昏重，及血风头痛，暴寒乍暖，神思不清，伤寒头目昏晕。

【临证举例】头痛 王定国因被风吹，项背拘急，头目昏眩，太阳并脑俱痛，自山阳挈舟至泗州求医，杨吉老既诊脉，即与药一弹丸，便服，王因款话，经一时再作，并进两丸，痛若失去。王甚喜，问为何药？答云，但一味白芷耳。是药出自都梁名人，可名都梁丸也。

68048 都梁丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白芷一百六十两（用黄酒三十二两浸蒸晒干） 川芎四十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】散风止痛。

【主治】感冒风寒，头痛眩晕，鼻塞不通，身热倦怠。

68049 都梁散

【方源】《外台》卷二十三引《延年秘录》。

【组成】都梁香二两 紫菀 人参 青竹茹 苁蓉各一两 干地黄二两（熬令燥）

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，水送下，不效，须臾再服。

【主治】汗出如水，及汗出衄血、吐血、小便出血。

【宜忌】忌茺莢。

68050 都梁香散

【方源】《医心方》卷十三引《小品方》。

【组成】都梁香二两 紫菀一两 桂元一两 人参一两 生竹茹一两 肉苁蓉一两 干地黄二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，水送下。

【主治】汗出如水浆，及汗血、衄血、吐血、洩血殆死。

68051 都气加桂汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】熟地八钱 茯苓 泽泻 怀山药各四钱 丹皮 山萸肉各二钱 五味子九粒

肉桂四分

【用法】水煎服。

【功用】纳肾气。

【主治】喘哮之欲愈者。

真

68052 真丸

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】女青二两半 兰草一两半 白菟藿 丹砂（别研）各一两 犀角（镑） 马先蒿 皂荚（酥炙，去皮子） 茵茹各半两 巴豆十粒（去皮，心膜存，油炒紫色，研）

【用法】上药除别研外，为末。炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，夜半冷茶清送下。

【主治】中蛊不深，久变为鬼疟，或中气结邪，或胸藏痰癖，或目中血出，或中恶，或惊魇，或八邪互变，或产妇胎衣不下，或致马刀痈肿，或处女不月。

68053 真丹

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《鸡峰》卷十四。

【组成】常山（捣下筛为末）三两 真丹一两

【用法】白蜜和捣百杵，丸如梧桐子大。先发服三丸，中服三丸，临卧服三丸。无不断者，常用效。

【主治】寒热诸疟。

68054 真汤

《普济方》卷一五一引《简易》。为原书同卷引《资寿方》“膈汤”之异名。见该条。

68055 真一汤

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】大麦 小麦各一升

【用法】上二味，淘洗净，炒黄，取面各四两，用生姜半斤，取汁和成饼子。焙干，人炒甘草二两，肉豆蔻二个，面裹煨熟，同为细末。入盐点服。

【功用】和胃。

68056 真元饮

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】熟地二钱 当归五钱 甘草一钱

【主治】气喘而脉微涩者。

68057 真牙汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】人牙二枚（烧存性） 麝香少许

【用法】上为细末。用紫草、升麻汤调下。

【主治】小儿癰疮黑陷。

68058 真气汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】童便三合 生地黄汁一合

【用法】上二味相和，微煎三四沸，分温二服。

【主治】初产后，血气烦闷。

68059 真丹散

【方源】《外台》卷三十四引《崔氏方》。

【组成】真丹一分（研） 矾石二分（烧，研） 芎藭四分

【用法】上为散，以穀囊盛，著阴中，虫当死尽。

【主治】阴痒似有虫状，烦闷。

68060 真火汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术五钱 巴戟天一两 附子一钱 防风一钱 牛膝三钱 石斛三钱 萆薢二钱 茯苓三钱

【用法】水煎服。连服四剂而皮肉温矣，又服四剂而骨髓热矣，再服四剂脚膝之痛去，更服四剂而步履无艰难之态矣。

【主治】冷痹，脚膝疼痛，行步艰难，自按其皮肉直凉至骨。

【方论选录】方中用巴戟天为君，补火仍是补水之药，而辅佐之味又彼此得宜，不用肉桂，当归之品，温其血分，实有意义。盖补气则生精最速，生精既速，则温髓亦速矣。若一入血分之药，则沾濡迟滞，欲速而不达矣。萆薢原忌防风，使之相畏而相使，更复相宜，所以同群而共济矣。

68061 真功丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】大冰片一分 真熊胆一钱（阴干，

临用乳细末） 芦甘石一钱（用羌活煎汤煨七次，飞去脚，晒干用） 硼砂一钱 牙消二分

【用法】上为极细末，吹患处。

【主治】①《玉钥》：孕妇患喉症者。②《温氏经验良方》：一切喉痛。

【加减】毒肿渐平，去牙消。

68062 真白汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】木香 沉香 丁香各一分 芎藭 蓬莪术（煨） 当归（切，焙） 芍药（锉） 楝实（炒，去核） 茴香子（炒）各半两 甘草（炙）一两 益智（去皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加枣一枚，擘破，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠腹痛，不思饮食。

68063 真圣丸

【方源】《医方类聚》卷九十三引《澹寮》。

【组成】胡椒四十九粒 全蝎七个 巴豆一粒（去皮膜，研） 五灵脂一钱（炒末）

【用法】上为末，水为丸，如绿豆大。每服一丸，菖蒲汤送下。

【主治】九种心痛。

68064 真圣散

《普济方》卷六十二。为原书同卷引《博济》“硼砂散”之异名。见该条。

68065 真朱散

【方源】《千金》卷六引《删繁方》。

【异名】荡风散（《千金》卷六）。

【组成】光明朱砂半两 贝齿五枚（炭上熟烧为末） 衣中白鱼七枚 干姜三铢

【用法】上四味于新瓷钵内研之，厚帛三下为散，仰卧，令人取小指爪挑少许入目中，取愈为度。

【主治】①《千金》引《删繁方》：目白肤风泪下。②《千金翼》：目翳覆瞳，睛不见物。

68066 真阴丹

【方源】《慎斋遗书》卷五。

【组成】红铅

【用法】用初经红铅，先以水浸三宿，以土丸之，入火炮之，久则色白；用文武火炼三日夜，复以水浸之，夜露三宿，再以火炼，则紫色；现日中晒之，又火炼三昼夜，则黄色如珠。凡炼此丹，白则秽尽，黄则毒尽，所谓九还成丹。乃天地之真元，阴中之至阳也。

【功用】回生。

【主治】阴阳脱。

68067 真阴散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】妇人指甲 脚指甲各等分

【用法】上二味，新瓦火上炒黄，待出火气研碎。初服三厘，渐至一分，白滚水下。

【主治】咽膈。

68068 真应散

【方源】《三因》卷十三。

【组成】白石英四两(通明者，以生绢袋盛，用雄猪肚一个，以药入，线缝定煮熟。取药出，再换猪肚一个，如前法煮，三煮了取药出，控干，研)

【用法】上为末，以官局款冬花散二钱，入药末二钱，更桑白皮二寸，生姜三片，枣子一个，水一盞半，煎至七分，通口服，猪肚亦可吃。

【主治】远年喘急，不能眠卧，百药无效者。

【宜忌】不得用醋盐椒姜等调和。

【备考】官局款冬花散，即《局方》卷四款冬花散。

68069 真良汤

【方源】《中国内科医鉴》。

【组成】茶实 南星 薄荷

【主治】小儿喘急。

68070 真武丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】附子一两 冬术四两 白芍四两 茯苓四两

【用法】上为末，姜汁为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】少阴腹痛，四肢沉重，呕咳下利，小便不利，痰饮水气。并治伤寒汗多亡阳，筋惕肉瞤，气虚恶寒。

68071 真武丸

《中国医学大辞典》。即《伤寒论》“真武汤”改为丸剂。见该条。

68072 真武汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】玄武汤(《千金》卷九)、固阳汤(《易简方》)。

【组成】茯苓 芍药 生姜各三两(切) 白术二两 附子一枚(炮，去皮，破八片)

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，每日三次。

【功用】①《注解伤寒论》：益阳气，散寒湿。②《医方集解》：散寒利水，济火而利水。

【主治】脾肾阳虚，水气内停，小便不利，四肢沉重疼痛，腹痛下利，或肢体浮肿，苔白不渴，脉沉；太阳病误汗不解，发热，心下悸，头眩，身瞤动。

①《伤寒论》：太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者；少阴病腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者。②《医方类聚》引《易简方》：虚劳之人，憎寒壮热，咳嗽下利。③《普济方》引《直指》：治少阴肾证，水饮与里寒合而作嗽，腹痛下利。

【宜忌】①《外台》：忌酢、猪肉、桃、李、雀肉。②《法律》：暴病之呕即用真武尚不相当。

【加减】若咳者，加五味子半斤，细辛一两，干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜，足前为半斤。

【方论选录】①《注解伤寒论》：脾恶湿，甘先入脾，茯苓、白术之甘，以益脾逐水。寒淫所胜，平以辛热，湿淫所胜，佐以酸平，附子、芍药、生姜之酸辛，以温经散湿。②《金鉴》：小青龙汤治表不解有水气，中外皆寒实之病也；真

武汤治表已解有水气,中外皆寒虚之病也。真武者,北方司水之神也,以之名汤者,赖以镇水之义也。夫人一身制水者脾也,主水者肾也;肾为胃关,聚水而从其类者;倘肾中无阳,则脾之枢机虽运,而肾之关门不开,水虽欲行,孰为之主?故水无主制,泛滥妄行而有是证也。用附子之辛热,壮肾之元阳,而水有所主矣;白术之苦燥,建立中土,而水有所制矣;生姜之辛散,佐附子以补阳,温中有散水之意;茯苓之淡渗,佐白术以健土,制水之中有利水之道焉。而尤妙在芍药酸敛,加于制水、主水药中,一以泻水,使子盗母虚,得免妄行之患;一以敛阳,使归根于阴,更无飞越之虞。然下利减芍药者,以其阳不外散也;加干姜者,以其温中胜寒也。水寒伤肺则咳,加细辛、干姜者,散水寒也。加五味子者,收肺气也。小便利者去茯苓,以其虽寒而水不能停也。呕者,去附子倍生姜,以其病非下焦,水停于胃也。所以不须温肾以行水,只当温胃以散水,佐生姜者,功能止呕也。③《内台方议》:用茯苓为君,白术为臣,二者入脾走肾,逐水祛湿;以芍药为佐,而益脾气;以附子、生姜之辛为使,温经散寒也。④《寒温条辨》:白术,茯苓补土利水之物也,可以伐肾而疗心悸;附子、生姜回阳益卫之物也,可以壮火而制虚邪;白芍酸以收阴,用白芍者,以小便不利,则知其人不但真阳不足,真阴亦已亏矣,若不用白芍,以固护其阴,岂能用附子之雄悍乎!

【临证举例】①水肿 《中医杂志》(1965;7:39):魏某某,男,59岁。于1963年7月诊治。患者初病时,因头面及下肢午后浮肿,曾服中西药两月余仍未见效,病日增重,而来就诊。现症:全身除胸腹及手心未肿之外,均浮肿,按之凹陷不起,小便稀少,饮食不进,口虽渴,但不饮,神倦体寒,着衣被面不暖,面色灰黯无华,舌苔黑而滑润,舌质红色娇艳,脉浮大无根,此乃真阳衰极,土不制水所致。拟方:炮附子60克,白术24克,白芍24克,茯苓24克,潞党参60克,玉桂6克,炙甘草24

克,生姜30克,水煎三次,头煎一次顿服,二三煎不论次数,频频饮服,一日尽一剂。上药连进三剂,浮肿已消退十之六七,查其苔已不黑,脉不浮而反沉,此乃虚焰渐衰,正气渐复之佳象,上方附片,党参、玉桂、生姜量减半,续服四剂而愈。②喘证 《哈尔滨中医》(1965;2:53):王某某,女,61岁,患者有慢性咳嗽病史,逢寒病作。时值秋末冬初,其病发作,喘息抬肩,动则喘息更甚,伴有咳嗽,吐痰色白,痰稀量多,形瘦神惫,时而汗出。观其面有微绛,舌苔薄白,脉沉弱无力,投二陈、青龙皆不收效,后服白果定喘汤,但只能缓解,不能根除,停药病仍发,百医不效。余诊之曰:此仍肾中真阳不足,水寒射肺也。痰生于饮,治痰必驱其饮。处方:真武汤重用茯苓60克,加干姜6克,细辛24克,服一剂知,二剂病大减。复诊:咳嗽已平,吐白痰仍多,纳食不佳。前方加五味子6克,白术9克,三剂而痊愈。③大汗亡阳 《新医药杂志》(1979;12:17):张某某,男,34岁。1963年8月17日就诊。素体虚弱,外感风寒,服解表药后高热退,但午后潮热不退,继服辛凉解表之剂,则发热渐高,持续不退,又投凉药泻下,则大汗不止,诸法救之无效,抬来我院诊治。症见形体消瘦,精神萎靡,汗出如雨,担架衣被浸湿,低热仍不退,筋脉拘急,眩晕不能站立,二便均无,四肢厥冷,脉沉细。此表阳不固,虚阳外越,治宜温阳固表。处方:炮附片(先煎)、白芍、白术、茯苓、生姜各30克,大剂频频饮之,汗出稍止而神气复,继服上方7剂,发热亦随之而愈。④瘧病 《伤寒解惑论》:张某某,女,47岁,1976年4月28日初诊。患者于产后40天,始觉两臂振颤,以后逐渐加重,发展至全身不自主震颤,已两个半月,阵发性加剧,影响睡眠及进食,病人就诊时亦不能稳坐片刻,并伴有舌颤,言语不利,憋气,以长息为快,食欲差,舌质尖部略红,左侧有瘀斑,舌苔白,两手脉俱沉滑弱。治宜温阳镇水,真武汤加味:茯苓30克,白术24克,制附子12克,白芍15

克, 生姜 12 克, 桂枝 9 克, 半夏 12 克, 生龙牡各 30 克, 炙甘草 6 克。水煎服二剂。4 月 30 日复诊: 患者自述, 29 日晨 8 时服第一剂药, 至当日下午 6 时许, 颤动基本停止, 腹内鸣响, 当晚又进第二剂, 颤动停止, 晚上睡眠明显好转, 仅有时自觉头有阵阵轰鸣, 上方白芍药改用 30 克, 加钩藤 12 克, 磁石 30 克, 再服三剂, 以巩固疗效。

【备考】本方改为丸剂, 名“真武丸”(见中国医学大辞典)

68073 真武汤

【方源】《伤寒广要》卷十一引《叶氏录验方》。

【组成】苦桔梗 荆芥穗 薄荷叶 紫苏叶 干葛 甘草节 瓜蒌根 牛蒡子各等分

【用法】上为粗末。每服三钱, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 每日三五次, 不拘时候。

【主治】四时不正之气, 及伤寒未分证候, 疮疹欲出未出。

68074 真武汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】熟附子三钱 姜一钱 焦术 茯苓 归身各二钱 肉桂一钱 炙甘草八分 白芍(炒)一钱五分 净枣仁(炒)二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后类中风痉症。

68075 真金散

【方源】《袖珍小儿》卷二。

【组成】黄连(去须) 黄柏 当归(去芦) 赤芍药各一钱 杏仁(去皮尖)半钱

【用法】上锉, 乳汁浸一宿, 晒干, 为极细末。用生地黄汁调一字, 频频点眼; 新绵裹, 荆芥煎汤浸, 放温, 时时洗浴。

【主治】①《袖珍小儿》: 小儿胎赤眼。②《幼科类萃》: 小儿初生, 洗眼不净, 则秽汁浸于眼眇中, 使睑赤烂, 至长不愈。

68076 真珍散

【方源】《普济方》卷二〇二。

【组成】附子二个(一生一炮, 各去皮脐)

半夏(汤浸二十一夜, 洗去滑)一两半 滑石 成炼钟乳各半两 辰砂三钱(别研)

【用法】上为末。每服二钱, 水二盞, 加生姜七片, 香薷二三叶, 蜜半匙, 煎至七分, 食前冷服。

【主治】喜怒不常, 忧思兼并, 致脏气郁结, 渐积涎饮, 胸胀满闷, 或腹疼痛, 憎寒发热, 吐痢交作。

【加减】小便不利, 加木通、茅根煎。

68077 真珠丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】麦门冬双丸子(《普济方》卷三九二)。

【组成】真珠半两 麦门冬一两 蕤仁二百枚 巴豆四十枚

【用法】上为末, 炼蜜为丸。期岁儿服二丸, 如小豆大; 二百日儿服如麻子二丸。渐增, 以知为度。当下病 赤黄白黑葵汁, 下勿绝药, 病尽下自止。久服使小儿肥白, 已试验。

【主治】小儿痰实结聚, 宿癖羸露, 不能饮食。

68078 真珠丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】真珠一两(细研如粉) 玳瑁一两 雄黄半两(细研如粉) 虎睛一对(酒浸一宿, 微炙) 胡黄连半两 远志半两(去心) 乌犀角屑半两 朱砂一两(细研, 水飞过) 牛黄半两(细研如粉) 马牙消半两 铁粉半两(细研) 龙脑一钱(细研) 麝香一钱(细研)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服十丸, 温酒送下, 不拘时候。

【主治】心脏风邪, 恍惚, 夜卧惊恐, 不得眠卧。

68079 真珠丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】真珠半两(细研) 牛黄一分 朱砂半两(细研) 金箔三十片 铁粉半两 天竺黄半两 玳瑁半两 胡黄连半两 犀角屑

半两 沙参半两 (去芦头) 苦参三两 (锉) 玄参半两 石膏一两 (细研, 水飞过) 龙齿半两 (细研) 甘草半两 (炙微赤, 锉)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 麦门冬汤送下, 不拘时候。

【主治】风热, 心神壅闷, 头目不利, 口舌干燥, 皮肤枯槁。

68080 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】珍珠丸 (《普济方》卷三八五)。

【组成】真珠末 羌活 防风 (去芦头) 钩藤 龙胆 (去芦头) 天竹黄 (细研) 川升麻 牛黄 (细研) 各一分 茯神 人参 (去芦头) 羚羊角屑 犀角屑各半两 铅霜 (细研) 龙脑 (细研) 麝香 (细研) 各一钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服五丸, 荆芥、薄荷汤研下, 一日三四次。

【主治】小儿风热, 心神惊悸, 卧不安眠。

68081 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】珍珠丸 (《普济方》卷三八四)。

【组成】真珠末一分 牛黄一分 雄黄一分 犀角末半两 龙齿一分 麝香二钱 金箔三十片 银箔二十片 朱砂半两 (细研, 水飞过)

【用法】上为末, 以糯米饭为丸, 如绿豆大。每服三丸, 煎金银汤送下, 不拘时候。

【主治】小儿惊热, 口干烦闷, 眠卧不安, 及变蒸诸疾。

68082 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】珍珠丸 (《普济方》卷三八四)。

【组成】真珠一分 天竹黄一分 朱砂一分 雄黄半两 麝香半两 丁头代赭半两 杏仁三十枚 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 巴豆十粒 (去皮, 用油煎令褐色, 与杏仁同研)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服一丸, 生姜汤送下。三岁以上, 加丸数服之。

【功用】化聚滞奶食, 坠涎, 利大肠。

【主治】小儿惊热。

68083 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】真珠一分 牛黄一分 朱砂一分 雄黄一分 膩粉一分

【用法】上为细末, 用粳米饭为丸, 如黄米大。一二岁儿每服三丸, 以薄荷汤送下, 一日三次。

【功用】坠涎。

【主治】小儿慢惊风。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“珍珠丸”。

68084 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】珍珠丸 (《普济方》卷三七〇)。

【组成】真珠末半两 白附子半两 (末) 天南星半两 (炮裂) 滑石末一分 膩粉一分 巴豆三十枚 (去皮, 水浸三日, 取出晒干, 研如膏)

【用法】上为末, 以糯米饭为丸, 如黄米大。百日以上儿服一丸, 一岁两丸, 三四岁三丸, 葱白汤送下。

【主治】小儿急惊风, 多发搐搦, 或夹食腹痛, 面色变青, 或大小便不通。

68085 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】真珠一分 (末) 天竹黄一分 (细研) 朱砂一分 (细研) 代赭半两 雄黄半两 (细研) 蛭螂半两 (微炒) 麝香半两 (细研) 巴豆十粒 (用油煎令褐色, 与杏仁研) 杏仁半两 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服二丸, 以生姜汤送下。

【功用】化奶食, 坠涎, 利大肠。

【主治】小儿食痢。

68086 真珠丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】真珠末一分 天竹黄一分 雄黄一分 巴豆一分（去皮心，压去油） 麝香一分 丁头代赭一分（捣罗为末） 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如麻子（黄米）大，一二岁儿每服五丸，以温水送下。

【主治】小儿食痢，喘息。

68087 真珠丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】真珠一两（先使细研） 丁香三分 巴戟一两 黄耆一两（锉） 石斛一两（去根，锉） 韭子半两（微炒） 芎藭三分 龙骨一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，捣为末） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 熟干地黄一两半 五味子三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 覆盆子一两半 沉香一两 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙令微黄） 人参一两（去芦头） 山茱萸一两 肉桂三分（去皱皮） 白茯苓一两 薯蓣一两 木香一两 麝香半两（细研） 槟榔三分 朱砂一两（细研，水飞过）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下；盐汤送亦得。

【功用】补元气，益精髓，悦泽颜色，治一切冷气，明耳目，助脏腑，安心神，强筋力。

【宜忌】忌生冷、羊血。

68088 真珠丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】天南星（为末）一钱 巴豆二十四枚（去心膜，以水浸一宿，研末，不出油用）

【用法】先研巴豆令熟，次下南星，以糯米粥为丸，如绿豆大，随儿年龄服之。泻痢，米饮送下；取食，葱汤送下；惊悸，薄荷荆芥汤送下。

【主治】小儿惊热有痰，及多温肚，夜卧不

稳，吃食过多。

68089 真珠丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《博济》。

【异名】珍珠丸（《医方类聚》卷二四六引《新效方》）。

【组成】天南星 半夏 膩粉 滑石各一钱 巴豆二十四粒（去心膜，水浸一宿）

【用法】研巴豆熟，次入众药，糯米粥为丸，如绿豆大。随年岁服，泻痢，米汤送下；取食，葱汤送下，膈上有食即吐，在中脘泻；惊悸，薄荷荆芥汤送下。

【主治】①《幼幼新书》引《博济》：治惊热有痰，及多温肚，痰卧不稳，吃食过多。②《幼幼新书》：五脏烦满，及惊风痰涎积滞疳积。

68090 真珠丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】银粉丸（《普济方》卷三九二）、木香真珠丸（《普济方》卷三九二）。

【组成】木香 白丁香（真者） 丁香（末）五分 巴豆仁十四个（水浸一宿，研极膩） 轻粉各五分（留少许为衣） 白滑石（末）二钱

【用法】上为末，湿纸裹烧，粟米饭为丸，如麻子大。一岁一丸，八九岁以上至十五岁服八丸，炮皂子煎汤，放冷送下；挟风热难动者，先服凉药一服；乳癖者，减丸数，隔日临卧一服。

【功用】①《小儿药证直诀》：疗腹胀，行滞气。②《小儿药证直诀类证释义》：行气攻痰，杀虫消积。

【主治】小儿虚中，一切积聚，惊涎宿食乳癖，大小便涩滞。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方行气攻痰与杀虫消积诸味相辅而成，方中三香（木香、白丁香、丁香）理气行滞，轻粉、巴豆化痰泻下，滑石渗湿利窍，可治积聚惊涎，单腹膨胀等证。方中的白丁香即麻雀屎，腊月采得，去两畔，钵中细研，以甘草水浸一夜，去水焙干。用治癥瘕久痼诸病，取雀食诸谷，易

致消烂之义。

68091 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】真珠末 獭肝(炙干) 茯神(去木) 贝母(去心) 柴胡(去苗) 龙胆 黄连(去须) 赤芍药各一两半 白槟榔(煨、锉) 旋覆花各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后温浆水送下，一日二次。

【主治】传尸骨蒸，咳嗽上气，痰喘寒热，四肢瘦弱。

68092 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】真珠(研如粉)半两 甘草(生末)一两一分 龙脑(研)三钱 硼砂(研)半两 凝水石六两(煨令赤，候冷，以纸裹，埋地坑内一宿，出火毒，研取四两) 马牙消二两(用膩粉半两于纸内同拌匀裹定，安在一新砖上，以火煨烟尽，放冷入在瓷合子内埋地坑，入地可一尺深，候一宿研半两)

【用法】上为末，糯米粥为丸，如鸡头大。每服一丸，食后、临卧含化咽津。

【主治】心肺客热，虚烦多痰，咽喉不利。

68093 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】真珠末一钱匕 太阴玄精石(煨赤，研末)四两 不灰木(用牛粪烧赤，取末)四两

【用法】上为细末，用糯米粥为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后用生地汁、粟米泔研化下，一日二次。

【主治】手足心烦热壅闷，咽喉肿痛。

68094 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇

【异名】伏龙肝丸(《普济方》卷三六一)。

【组成】真珠末 伏龙肝 丹砂各一分 麝香一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服一丸，候啼即温水送下。

【主治】小儿惊啼，及夜啼不止。

68095 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】真珠(研)一分 虎睛(左睛为上，酒浸，晒干，研)一只 露蜂房 麻黄(去根节) 钩藤各半两 铁粉(研细)三分 防葵一两 大黄(锉，炒) 黄芩各三分 龙齿(研)一分 银屑 梔子仁各三分 独活(去芦头)半两 柴胡(去苗) 升麻 白鲜皮各三分 雷丸一分 沙参 细辛(去苗叶)各半两 蛇蛻(烧灰)一分 石膏(研)半两 牛黄(研)一分 蚱蜢(去翅足，熬)四枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。一二岁儿每服五丸，研破，米饮送下。

【主治】小儿自一岁至大患癫痫，发动无时，口内沫出，小便不觉，呼唤不应。

68096 真珠丸

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】真珠(细研)一两 牛黄(细研)杏仁(去皮尖双仁，炒，研如膏)各半两 丹砂(细研) 牡蛎(熬，研粉)各一两 虎睛(炙干)一对 甘遂(切，炒)半两 芍药三分 白茯苓(去黑皮)一两 甘草(炙，锉)半两 巴豆(去皮心，研如膏，纸裹出油尽)半两 麝香(研细)一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服一丸至二丸，米饮或桃仁汤送下。取下恶物如鱼脑青色效。

【主治】小儿食痢，五疳八痢，惊风天钓。

68097 真珠丸

【方源】《本事》卷一。

【异名】真珠母丸(《保婴撮要》卷十)、真珠丹(《丹溪心法附余》卷十)、珍珠母丸(《张氏医通》卷十四)。

【组成】真珠母三分(未钻真珠也，研如粉，同碾) 当归(洗，去芦，薄切，焙干后称) 熟干地黄(酒洒，九蒸九晒，焙干)各一两半 人参(去芦) 酸枣仁(微炒，去

皮,研) 柏子仁各一两 暹罗犀角(镑为细末) 茯神(去木) 沉香(忌火) 龙齿各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,辰砂为衣。每服四五十丸,日午、夜卧金银薄荷汤送下。

【功用】《本事方释义》:安神熄风。

【主治】①《本事》:肝经因虚,内受风邪,卧则魂散不守,状若惊悸。②《女科百问》:小便赤色,不痛不涩。

【方论选录】《本事方释义》:此安神熄风之方也。真珠母气味咸寒,入足厥阴,以之为君;熟地黄味甘寒微苦,入足少阴,当归气味苦辛甘微温,入少阴,二味为臣;人参味甘微温,入足阳明,柏子仁气味苦辛微温,入足厥阴,枣仁气味苦平,入手少阴,茯神味甘平,入手少阴,犀角气味苦酸咸寒,入足厥阴,龙齿气味凉涩,入足厥阴,沉香气味辛微温,入足少阴,以之为佐使者。因肝虚受邪,内风鼓动,致神魂不守,藉水之滋养,肝风得熄,飞扬者得以镇静,使坎离交合,神旺气和,自然安适矣。

68098 真珠丸

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】滑石末三钱 轻粉三钱 干蝎七个 南星末一钱 巴豆四十个(去皮膜,出油尽用) 半夏曲末二钱 麝香少许

【用法】上为细末,蒸饼为丸,如绿豆大。一岁下者一丸,上者二丸,乳食前葱汤送下。

【主治】食痢发搐。

68099 真珠丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】知母一两一分 川连一两(去毛) 苦参一两 玄参一两 铁胤粉一两一分(研) 牡蛎(煨)一两一分 朱砂(另研)二两 麦门冬(去心) 天花粉各半两 金箔银箔二百片 白扁豆(煮,去皮)一两

【用法】上为末,炼蜜入生栝楼根汁少许,丸如梧桐子大,用金银箔为衣。每服二十丸

至三十丸,先用栝楼根汁下一服,次用麦门冬熟水送下,病退一日二次。

【主治】心虚烦闷,或外伤暑热,内积愁烦,酣饮过多,皆致烦渴口干舌燥,引饮无度,小便或利或不利。

【宜忌】忌炙煨酒色。

68100 真珠丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】真珠末 白术 朱砂(别研,一半入药,一半为衣) 白茯苓(去皮)各半两 人参(去芦头)一两 麝香(另研) 脑子(别研)各一钱

【用法】上为细末,用猪心血为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服三十丸,食后煎人参汤送下。

【主治】心气不足,及上焦有热,涎壅上盛,睡卧不宁,身体发热,口燥咽干。

68101 真珠丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】真珠末 生附子尖 川乌头尖 蝎梢 蛇含石(煨) 半夏曲各等分

【用法】上为细末,粟米糊为丸,如黍米大。半岁小儿每服五丸,周岁十丸,三岁十丸加至十五丸。昏困,冬瓜子煎汤送下;惊搐,金银花薄荷汤送下;夜卧不安,薄荷汤送下;夜啼,乳香汤送下;肠急,五皮汤送下。

【主治】小儿诸惊疾。

68102 真珠丸

《普济方》卷二三七。为《圣惠》卷三十一“獭肝丸”之异名。见该条。

68103 真珠丸

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】滑石三分 天南星二钱 膩粉一钱 巴豆七粒(去皮,纸裹,压去油)

【用法】上为细末,以糯米为丸,如黄米大。每服一丸至三丸,若腹内有癥积,临卧时炮皂角子煎汤送下;惊着,用葱白汤送下;若有涎吐逆,用丁香母一个煎汤送下。

【功用】止吐逆,疏脏腑。

【主治】惊风，腹内有瘕积。

68104 真珠丸

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】水银（砂子） 轻粉各一钱 丁香一分 红芽大戟一两半（煮过） 乳香 五灵脂（末）各半两

【用法】上为细末，用黄蜡三钱，入药末，搅匀，为丸如粟米大。每服五丸，煎马齿苋汤送下。

【主治】小儿久吐，诸药不效。

68105 真珠丸

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【组成】南星（泡） 半夏各一两（泡） 明矾五钱（炒）

【用法】上为末，姜糊为丸，如麻子大，辰砂为衣。每服三十丸，姜汤送下。

【功用】化风痰。

【主治】喘嗽。

68106 真珠丸

【方源】《痘疹金镜录》卷上。

【组成】南星（泡） 天麻 白附子（泡）各一钱 膩粉五钱 巴霜一匙 芫荇（炒） 全蝎（面煨） 滑石各二钱半

【用法】面糊为丸，如麻子大。患得一日一丸，至七日七丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿急惊风及撮口。

68107 真珠丸

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】真珠一钱（另研） 玉蛤蜊壳四两（煨） 黄柏（末）四两（盐水炒） 知母四两（盐水炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，青黛为衣。每用二钱，空心盐汤送下。

【主治】遗精，白浊。

68108 真珠丸

《准绳·类方》卷六。为《圣惠》卷三十“镇精真珠丸”之异名。见该条。

68109 真珠丹

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】真珠（末） 巴豆霜（去油用霜）

滑石各一分 半夏三分（姜汁浸七次） 续随子仁三分 白附子半两 寒食面一分 天南星半两（姜浸七次）

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服一丸，二岁者一二丸，用葱白汤送下，疳疾使君子汤送下。

【功用】退积滞，化风涎，利膈。

【主治】小儿久积惊疳。

68110 真珠丹

《丹溪心法附余》卷十。为《本事》卷一“真珠丸”之异名。见该条。

68111 真珠汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】熟真珠一两 榆白皮（切）一升

【用法】以苦酒三升，煮取一升，顿服。

【主治】胎死腹中。

68112 真珠粉

【方源】方出《证类本草》卷二十，名见《普济方》卷五十三。

【组成】真珠

【用法】绵裹，塞耳中。

【主治】耳聋。

68113 真珠散

《千金》卷六。为《外台》卷十六引《删繁方》“真珠煎”之异名。见该条。

68114 真珠散

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《圣济总录》卷一三四。

【组成】青珠一分 干姜二分

【用法】上为末。敷疮上，每日三次。

【主治】①《千金》：手足指逆肿。②《圣济总录》：被冻瘡损疼痛。

68115 真珠散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】真珠一分（细研） 水精一分（细研） 铅霜一分（细研） 人参一两（去芦头，为末） 朱砂一两（细研） 雄黄半两（细研） 金银箔各五十片（细研） 琥珀一分（细研） 牛黄一分（细研）

【用法】上药都拌匀。每服半钱，食后薄荷

汤调下。

【主治】心风狂语，神思不安，如见鬼神。

68116 真珠散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】真珠粉 琥珀末 寒水石 天竹黄 铁粉 朱砂 栝楼根末各一分 马牙消半分 甘草末（生用）半分

【用法】上为细末。每服半钱，以竹叶汤放温调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：心胸烦热，口舌干燥，心神不利。②《局方》：五脏积热，毒气上攻，心忪闷乱，坐卧不宁。

68117 真珠散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】真珠半两（细研） 牛黄半两（细研） 天竹黄三分（细研） 黄芩一两 龙齿三分 朱砂半两（细研） 防风半两（去芦头） 人参三分（去芦头） 茯神三分 麦门冬一两（去心，焙） 远志半两（去心） 白鲜皮半两 金箔五十片（细研） 银箔五十片（细研） 麝香一钱（细研） 犀角屑半两 甘草三分（炙微赤，锉） 胡黄连三分 铁粉三分 白附子三分（炮裂） 甘菊花三分 羚羊角屑半两

【用法】上为细散。每服一钱，以薄荷温水或梨汁调下，不拘时候。

【主治】风狂乱语，心热狂走。

【宜忌】忌生血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“珍珠散”。

68118 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】珍珠散（《普济方》卷八十二）。

【组成】真珠（细研，水飞过） 犀角屑 琥珀（细研，水飞过） 羚羊角屑 朱砂（细研，水飞过） 车前子 地肤子 甘菊花 甘草（炙微赤，锉）各一两 茺蔚子二两 川升麻一两半 薺葵子二两 胡黄连半两 细辛半两

【用法】上为细散。每服二钱，食后以竹叶汤调下。

【主治】眼生胬肉翳膜，赤脉风赤，涩痛难开。

68119 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末三分 胡黄连三分 石决明二两（捣碎，细研，水飞过） 地肤子一两 琥珀三分 天灵盖三分（烧灰） 母猪肝半两（切，炙干）

【用法】上为细散。每服二钱，空心以温水调下，一日二次。

【主治】眼青盲。

68120 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末半两 石决明一两（捣碎，细研，水飞过） 黄芩二两 甘菊花一两 青箱子二两 芎藭一两 甘草一两（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头）

【用法】上为细散。每服一钱，食后以温浆水调下。

【主治】眼忽生翳膜，赤涩疼痛。

68121 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末一两 蕤仁三分（汤浸，去赤皮） 秦皮三分（锉） 石决明一两（细研，水飞过） 车前子一两 细辛一分 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 羚羊角屑一两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服三钱，食后以甘豆汤调下。

【功用】祛风毒，消翳障。

【主治】眼生肤翳。

【宜忌】忌炙煨油腻热面。

68122 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠一分 龙脑半分 琥珀一分 朱砂半分 硼砂二豆大

【用法】上为细末。以铜箸取少许，点在眦

上,一日三五次。

【主治】风热眼中生赤脉,冲贯黑睛,及有花翳。

68123 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末半两 水精半两 琥珀末半两 朱砂一两 马牙消半两 龙脑一分

【用法】上为细末。每以铜箸取如半小豆大,点之。

【主治】眼血灌瞳人,生障膜。

68124 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末一分 琥珀一分(细研) 牛黄一分(细研) 龙脑二钱(细研) 天竹黄半两(细研) 羚羊角屑一分 犀角屑半两 人参半两(去芦头) 川升麻三分 赤茯苓半两 车前子半两 赤芍药三分 决明子半两 甘草三分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服一钱,食后煎竹叶汤调下。

【主治】斑豆疮入眼,赤涩肿痛,或生翳渐长。

【宜忌】忌炙煨热面。

68125 真珠散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】真珠 白矾(烧为灰) 桂心 细辛各一两 木通半两(锉)

【用法】上为细散。每用半钱,绵裹纳鼻中,日三易之。

【主治】鼻中息肉,不通利。

68126 真珠散

《圣惠》卷五十五。为《千金翼》卷二十“真珠附着散”之异名。见该条。

68127 真珠散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】真珠三分(细研,水飞过) 水精三分(细研,水飞过) 铅霜三分(细研) 人参一两(去芦头) 茯神一两 朱砂一两(细研,水飞过) 雄黄半两(细研) 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研) 琥

珀一分(细研)

【用法】上为细散。每服半钱,用薄荷汁调下,不拘时候。

【主治】妇人风邪,神识不安,癫狂,言语失次,如见鬼神。

68128 真珠散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】真珠末一分 马牙消一分 龙齿一分 铅霜半分 寒水石一分 牛黄半分 朱砂半两 太阴玄精一分 麝香半分

【用法】上为细散。每服一钱,以新汲水调下,不拘时候。

【主治】小儿热病,心神狂躁,身热如火,头痛烦渴,眠卧不得。

68129 真珠散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】真珠末半两 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研) 没石子一枚 犀角屑 羚羊角屑 天竹黄(细研) 胡黄连 甘草(炙微赤,锉) 川大黄(锉,微炒) 当归(锉,微炒) 朱砂 雄黄(细研) 牛黄(细研) 麝香(细研) 各一分

【用法】上为细散。每服半钱,以茵陈汤调下,一日三次。

【主治】小儿惊疳,体热黄瘦。

68130 真珠散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】真珠末一分 青箱子一分 牛黄(细研) 黄连(去须) 甘草(炙微赤,锉) 各半两 蔓菁子半两

【用法】上为细散。每服半钱,以熟水调下。

【主治】小儿肝脏风热,上攻于眼目,赤痛。

68131 真珠散

【方源】《袖珍》卷十二引《圣惠》。

【组成】盆消七钱半 白滑石一两 乳香一钱半 片脑少许

【用法】上为细末。用一字,口噙水,搐鼻内。

【主治】偏正头疼头风。

68132 真珠散

【方源】《博济》卷四。

【异名】石亭脂散(《圣济总录》卷一七六)、珍珠散(《医方类聚》卷二四五引《施园端效方》)、香云散(《观聚方要补》卷十引《医林方》)。

【组成】石亭脂(炒) 一钱匕 白滑石(炒) 三钱匕

【用法】上为极细末。每服一字,生姜糯米泔调下。

【主治】小儿吐奶,及霍乱吐泻不止。

68133 真珠散

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《万全方》。

【异名】珍珠散(《金鉴》卷五十二)。

【组成】真珠 麦门冬各半两 金银箔各五十片 天竹黄 牛黄 麝 胡黄连 甘草(炙) 羚羊角 川大黄(炒) 当归(炒) 朱砂 雄黄 茯神 犀角各三分

【用法】上为散。每服半钱,茵陈汤调下。

【主治】小儿心疳体热黄瘦。

68134 真珠散

【方源】《局方》卷六。

【组成】瓜蒌根末 琥珀 真珠粉 寒水石(煨,醋淬,研) 铁粉 朱砂(研,飞) 甘草末(生) 川大黄 牙消(枯,研) 各等分

【用法】上为末。每服一钱,以竹叶汤温调下,不拘时候。

【主治】丈夫、妇人五脏积热,毒气上攻,心胸烦闷,口干舌燥,精神恍惚,心忪闷乱,坐卧不宁。

68135 真珠散

【方源】《斑疹备急》。

【组成】栝楼根一两 蛇蛻皮(全,炙) 一钱

【用法】上为末。用羊子肝一枚,批开去筋膜,掺入药二钱,用麻缕缠定,以米泔内煮熟,任意与吃,如少小未能吃羊肝,以熟羊肝研和为丸,如黄米大,以生米泔下十丸,乳

头上与亦可,一日三服,儿小未能食肝,与乳母食之佳。

【主治】斑疱疮疹入眼疼痛,翳膜眼赤羞明。

68136 真珠散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】真珠末 丹砂(研) 各三分 贝齿五枚(灰火中烧,为末) 干姜末一分

【用法】上为细末,用熟绢帛罗三遍。每仰卧点少许,敷眼中,合眼少时。

【主治】肝虚,目风泪出。

68137 真珠散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】真珠末 琥珀末各一分 丹砂末半分 硃砂两豆大(好者,研)

【用法】上为细末。点之,每日三五次。

【主治】风热上攻,眼生花翳,及有赤脉,冲贯黑睛。

68138 真珠散

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【异名】珍珠散(《普济方》卷三八五)。

【组成】太阴玄精石一两 石膏三分 龙脑半钱

【用法】上为极细末。每服半钱匕,新汲水调下。

【主治】小儿夹风蕴热。

68139 真珠散

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】真珠(末) 牛黄 龙脑各一钱(并细研) 瓜根 茯神 朱砂(研,水飞) 各半两 马牙消 寒水石(并为细末) 各一分

【用法】上药都拌匀。每服半钱,蜜水调下。

【主治】热病口干,心神烦闷。

68140 真珠散

【方源】《幼幼新书》卷十六引《朱氏家传》。

【组成】真珠 生犀角各半钱 香附子四钱 龙脑少许

【用法】上为末。每服半铜钱,婴儿一字,一岁以下半钱,桃仁汤调下。

【主治】小儿气喘多涎，硬气筑心。

【宜忌】乳母忌生冷、油腻、毒物。

68141 真珠散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】真珠末（研） 龙脑（研） 牛黄（研）各半钱 瓜蒌根 茯神（去心内木） 朱砂（研）各一分 牙消 寒水石（煨）半分

【用法】上为末。每服半钱，蜜水调下，不拘时候。

【主治】伤寒口干，心神烦躁。

68142 真珠散

【方源】《三因》卷十一。

【组成】附子二个（一生一炮，各去皮脐）半夏（汤二十一次洗去滑）一两半 滑石 成炼钟乳各半两 辰砂三分（另研）

【用法】上为末。每服二钱，水二盏，加生姜七片，藿香二三叶，蜜半匙，煎七分，食前冷服。小便不利加木通茅根煎。

【主治】喜怒不常，忧思兼并，致脏气郁结，留积涎饮，胸腹满闷，或腹疝痛，憎寒发热，吐利交作。

68143 真珠散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】定粉一两半（研） 白藜末一两白及末半两 龙骨末二钱 黄丹二两（飞，研） 乌贼鱼骨末一分

【用法】上为极细末。干掺疮上；疮干，以津唾润动敷之。

【主治】一切浸淫恶疮，久不生肌，疮口不敛。

【加减】赚疮，加乳香二钱。

68144 真珠散

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【组成】真珠末 海螵蛸 滑石各一钱 茯苓 人参 白附子各二钱 甘草 全蝎各半钱 朱砂一钱 脑子 麝香各半钱 金银箔三片

【用法】上为末。每服半钱，灯心麦门冬煎汤，入蜜少许调下。

【功用】《普济方》引《医方大成》：辟惊邪，顺经安神舍。

【主治】①《医方大成》引《汤氏方》：小儿客忤，惊风，痰热，心烦恍惚，睡卧惊跳，时或咬牙，啼叫不已，小便赤色，或吐黄沫。②《普济方》引《医方大成》：鬼注，心舍不宁，精神不定，心常怔忡，五心烦热，有汗煎啼，面赤舌白，呵发烦渴。

68145 真珠散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】白牵牛二两（微炒） 白术（炒） 陈皮（不去瓢） 木通（去皮） 桑白皮各半两

【用法】上为细末。每服二钱，食前、日午、临卧生姜汤调下。初服旦进一服，未觉验再服。

【功用】导利留滞。

【主治】膀胱蕴热，风湿相乘，外肾肿胀，小便不利，塞痛。

68146 真珠散

【方源】《永乐大典》卷九七六引《仁存方》。

【组成】朱砂一分 真珠末二钱 雄黄一分 全蝎一钱 蝉蜕七个

【用法】上为末。每服一字至半钱，煎金银薄荷汤调下，竹沥调下尤好。

【功用】化痰退热。

【主治】惊风发搐。

68147 真珠散

《普济方》卷一五一。为《肘后方》卷八“辟病散”之异名。见该条。

68148 真珠散

《疡科捷径》卷中。为《古今医鉴》卷十五“珍珠散”之异名。见该条。

68149 真珠煎

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】真珠散（《千金》卷六）。

【组成】真珠四分（研） 白蜜二合 鲤鱼胆一枚 鲤鱼脑一枚

【用法】上药和合，微火上煎两沸，绵裹纳目中，汁当出，药歇，更为之。

【主治】肝气虚寒，眼青盲，眵眵不见物。

【方论选录】《千金方衍义》：真珠散热消障，鲤鱼胆、脑除风涤热，兼用蜜解毒润燥。总取异类有情，功胜草木实。

68150 真珠煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末一两 白蜜二合

【用法】合和，微火煎两沸，绵滤取汁。每日三四度点之。

【主治】眼青盲，不见物。

68151 真珠膏

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】真珠末一两 贝齿五枚（烧灰）麝香一分 朱砂一分 胡粉一分 鲤鱼胆二枚 白蜜四两（煎，滤过）

【用法】除鱼胆、蜜外，都研如粉，以鱼胆汁、蜜，于铜器中调令匀，用慢火煎成稀膏。每以铜箸取少许点之，一日三四次。

【主治】眼虚热，目赤痛，卒生翳膜，昏暗。

68152 真珠膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】真珠末 龙脑 蕤仁（汤浸，去皮） 膩粉 朴消 青盐 朱砂各一分

【用法】上为细末，以酥和如膏。每点如黍米大，一日三四次。

【主治】小儿热风，眼生翳膜。

68153 真珠膏

【方源】《幼幼新书》卷三十三引张涣方。

【组成】真珠末 甘菊花（为末） 香豉（炒黄，为末） 井泉石（细研）各一分

【用法】上药都拌匀，用白蜜一合，鲤鱼胆一枚，同药慢火熬成膏，次入好龙脑一钱同拌匀。每用少许，时时点眼中。

【主治】眼久不愈，茫茫不见物。

68154 真珠膏

《幼幼新书》卷十引《张氏家传》。即原书同卷引《刘氏家传》“白附丸”。见该条。

68155 真黄散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】鸡胞胚黄皮不拘多少

【用法】油灯上烧存性，研细末，入黄柏、枯矾、麝香一字，用米泔水搅，口内贴。

【主治】小儿走马疳。

68156 真酥粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】真酥一两 粟米（净淘）三合 淡浆水三升

【用法】以浆水煮米作粥，候粥将熟，下酥，更煮取熟。适寒温，空腹恣意食之。

【主治】热淋，小便不通。

68157 真蛤散

【方源】方出《直指》卷十九。名见《普济方》卷三十。

【组成】芦甘石（绿者）一分 真蚌粉 黄连 五倍子各半分

【用法】上为细末。以蜂房、大腹皮煎汤温洗，敷之。

【主治】阴汗湿痒。

68158 真犀丹

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】乌犀角二钱 石菖蒲 黄芩 生地黄各三钱 银花 连翘各五钱 板蓝根 香豆豉 玄参 花粉各三钱 紫草二钱

【用法】上为极细末，再以香豆豉煮烂为丸，每丸二钱重。每服一丸，小儿减半，白开水化下。

【功用】清热，解毒，强心。

【主治】四时疫病，发斑发疹，咽喉肿痛，昏狂谵语，全身倦怠，一切暑热之症。

【宜忌】孕妇忌服。

68159 真玉磨方

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】真玉

【用法】取平处一面，磨癰痕，久则无痕。

【主治】面上癰痕。

68160 真龙骨散

【方源】方出《直指》卷二十一。名见《普济方》卷五十五。

【组成】真龙骨 白矾（煨） 赤小豆 黄丹（煨） 乌贼骨各一两（分） 胭脂半两

(分)

【用法】上为细末。掺耳。

【主治】脓耳。

68161 真阿胶丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】真阿胶一片 肉枣一个 胡椒七粒

【用法】上三味，以坩锅子烧存性，蜡丸如麻子大。每服二三丸，白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下；泄泻，以温水送下，食后临卧服。

【主治】赤白痢。

68162 真珠母丸

《保婴撮要》卷十。为《本事》卷一“真珠丸”之异名。见该条。

68163 真珠涂方

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】真珠（细研如粉）一两 慎火草（研，绞汁，景天是也）

【用法】上二味和调如糊，涂之。以愈为度。

【主治】小儿烟火丹，从背上起，或走两臂足，赤如火。

68164 真珠粉丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】蛤粉 黄柏各等分

【用法】水为丸。酒送下。

【功用】滋阴降火。

【主治】遗精白浊。

【加减】或加橘皮、青黛、滑石、知母尤妙。

68165 真珠粉丸

《景岳全书》卷五十七。为《内经拾遗》卷一“珍珠粉丸”之异名。见该条。

68166 真珠粉丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】盐柏 知母 牡蛎 蛤粉

【用法】米糊为丸服。

【主治】年壮久无欲事，满泄。

68167 真珠粉丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】黄柏一两 冰片一钱

【用法】炼蜜为丸。每服十丸，麦冬汤送下。

【主治】年壮久无欲事，满泄。

68168 真人化铁汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】三棱 莪术 青皮 陈皮 神曲（炒） 山楂肉 香附（炒） 枳实（麸炒） 厚朴（姜制） 黄连（姜汁炒） 当归 川芎 桃仁（去皮） 红花 木香各三分 槟榔八分 甘草二分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，枣一枚，水煎服。

【主治】五积六聚，痃癖癥瘕，不论新久。

68169 真人夺命饮

《惠直堂方》卷三。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异方。见该条。

68170 真人安胎散

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】旧葵扇（烧灰）三钱 二蚕沙二钱

【用法】上为末。用凤凰衣十四张，煎汤送下。

【功用】安胎。

68171 真人还少丹

《中国医学大辞典》。为《洪氏集验方》卷一引陈晦叔方“西川罗赤脚仙还少丹”之异名。见该条。

68172 真人还少丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄精（炙）三十六两 党参（去芦）十六两 山药二十四两 大茴香二十四两 远志（炙）二十四两 甘草二十四两 苁蓉（炙）二十四两 牛膝二十四两 九菖蒲二十四两 茯苓二十四两 熟地二十四两 莲须二十四两 杞子二十四两 五味子（炙）二十四两 续断二十四两 巴戟肉（炙）二十四两 楮实子二十四两 杜仲炭二十四两 山萸肉（炙）二十四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱，每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】理气健脾，滋补心肾。

【主治】气血不足，精髓不固，腰痛腿痠，

发热盗汗。

68173 真人明目丸

【方源】《医方考》卷五。

【组成】生地黄 熟地黄 川椒(去目及闭口者，微炒)等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐米饮送下。

【功用】明目。

【主治】目昏多泪。

【方论选录】肾主目之瞳子，肾水虚竭，故令目昏；肝之液为泪，肝有风热，故令泪出。是方也，生地所以凉肝，熟地所以补肾，乃川椒者，味辛而热，可以疗肝肾之痹气，痹气者，湿热着而不散之气也。又于空心之时，以盐饮吞之，宜其直达肝肾之区矣。病在标而治其本，可谓神于病情者，此其所以为真人之方欤！

【临证举例】目昏多泪 江陵傅氏，目昏多泪，家贫鬻纸为业，性喜云水，见必邀迎。一日，有客方巾布袍过之，授以此方治目，如方修服，不一月目明，夜能视物。

68174 真人活命饮

《摄生众妙方》卷十一。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

68175 真人活命散

《痈疽神秘验方》。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

68176 真人养脏汤

【方源】《百一》卷六。

【组成】丁香 木香 肉豆蔻(面裹煨，去面) 当归(洗去芦) 白茯苓(去黑皮) 罂粟壳(去顶蒂，炙) 人参(去芦) 各一两二钱半 楝草一两(炙) 乌梅肉二钱半 酸石榴皮 陈皮(去白) 赤芍药 黄连(去须) 白芍药 厚朴(去粗皮，姜汁制，炒) 干姜(炮裂) 阿胶(蛤粉炒) 地榆 诃子(炮，去核) 各七钱半

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盂半，煎至八分，去滓，通口服，食前两服，滓再

作一服。

【主治】一切痢疾。

68177 真人养脏汤

《直指》卷十三。为《局方》卷六(绍兴续添方)“纯阳真人养脏汤”之异名。见该条。

68178 真人换白丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】白芷 甘菊花 桂(去粗皮) 巨胜子 旋覆花 白茯苓(去黑皮)各三分 牛膝(酒浸，切，焙) 萆澄茄各半两 覆盆子一分 莲子草一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心温酒送下三十丸，晚食前再服二十丸，饮少酒引药力。

【主治】气血不荣，髭发衰白，兼治风疾。

68179 真人积德丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】白艾叶五两(用陈米醋润炒) 当归(去芦)二两(酒浸) 川芎二两(微炒) 官桂一两(去粗皮，不见火) 熟干地黄五两(酒浸) 白芍药二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】温暖子宫，久服令人有孕。

68180 真人萃仙丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】蒺藜(炒)八两 茯苓 牡蛎 莲须 枣仁 芡实 菟丝子 山药(人乳汁制)各二两 龙骨一两 山茱萸肉四两

【用法】上为细末，金樱膏四两和炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【主治】肾水亏损，元气不足，神思恍惚，夜梦遗泄，腰腿痠软。

68181 真人解毒汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】忍冬花半斤 甘草节一两 木通 防风 荆芥 连翘各三钱

【用法】上分作三剂。用水、酒各一钟煎服，以肿消痘出为度。

【主治】痘母。

68182 真人碧雪膏

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】羯羊胆十数个

【用法】腊月内三辰日，取羯羊胆十数个，将蜜装胆内，绵纸虚笼，吊簷下一七日，鸡翎扫下胆上霜，瓷瓶密贮，以骨簪挑点眼角内。

【主治】男妇冷泪常流，并暴赤眼。

68183 真方木香散

【方源】《百一》卷十九引钱都廂方。

【异名】木香散（《普济方》卷三九五）。

【组成】木香 藿香叶 青皮（去白） 甘松 丁皮 香附子 益智仁各半两 甘草（炙） 缩砂仁各一两 姜黄一钱

【用法】上为末。每服一钱，食前紫苏姜汤调下，大人增至三钱。

【主治】小儿脾胃虚弱，泄泻气滞，饮食不进。

68184 真方五色丸

【方源】《普济方》卷三九一引《保婴方》。

【异名】真方五色丸子（《永类铃方》卷二十）、五色丸（《诚书》卷十）。

【组成】青丸子：青黛（别研） 天南星（生姜制）各半两 巴豆霜半钱

红丸子：朱砂（水飞） 半夏（汤洗七次，生姜制）各半两 巴豆霜半钱

白丸子：白附子（生） 寒水石（煨）各半两 巴豆霜半钱

黑丸子：五灵脂（炒） 全蝎（炒）各半两 巴豆霜半钱

黄丸子：大黄（煨） 郁金各半两 巴豆霜半钱

【用法】上件前五色药，各另为细末，入巴豆霜半钱，同研令匀，水面糊为丸，如粟米大。每一岁服五丸，二三岁儿十丸至十五丸，乳汁送下；五六岁如麻子大，每服十五丸至二十丸，温生姜汤送下；急惊风，煎金银薄荷汤送下；慢惊风，熬生姜全蝎汤送下，食后、临卧日进二服，不拘时候。

【主治】小儿一切所伤，痰涎壅塞，胸膈不利，乳食不消，变生癖积，肋肋片硬，按之疼痛，及一切急慢惊风，发搐。

68185 真方白丸子

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】大半夏（汤泡七次） 白附子（洗净，略泡） 天南星（洗净，略泡） 天麻 川乌头（去皮尖，略泡） 全蝎（去毒，炒） 木香 枳壳（去瓢，麸炒）各一两

【用法】上为细末，生姜汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧茶清热水送下，一日三次；瘫痪，温酒送下；小儿惊风，每服二丸，薄荷汤送下。

【主治】①《瑞竹堂方》：诸风，可常服，永无风疾隔壅之患。②《丹溪心法附余》：中风痰涎壅盛，口喎不语，半身不遂，及小儿惊风潮搐。

68186 真方圣散子

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】御米壳三两（捣碎，醋炒黄色） 肉豆蔻（面裹煨，去面） 赤石脂 乌鱼骨（去皮） 甘草（炙黄） 楝丁香 诃子皮 干姜（炮）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食前以水一盞，入乳香少许煎五七沸调下。

【功用】固养脾胃，温中，止心腹痛。

【主治】男子妇人脾胃受湿，中脘停寒，吃物频伤，心胸满闷，肋肋膨胀，肠鸣虚痞，小腹坚痛，脐下强急，或大便不调，米谷迟化，里急后重，下痢脓血，或下五色，或便如鱼脑，或如豆汁，或有鲜血，或如烂肉相似，日夜无度，久而不愈，嗜卧怠堕，虚羸，肢体沉困，寒热时作。

68187 真君妙贴散

《仙传外科集验方》。为《本草纲目》卷十一引《坦仙皆效方》“真君妙神散”之异名。见该条。

68188 真君妙神散

【方源】《本草纲目》卷十一引《坦仙皆效方》。

【异名】真君妙贴散(《仙传外科集验方》)、妙贴散(《中国医学大辞典》)。

【组成】好硫黄三两 荞麦粉二两

【用法】上为末，井水和，捏小饼，晒干收之。临用细研，新汲水调敷之。

【主治】①《本草纲目》引《坦仙皆效方》：一切恶疮。②《金鉴》：痢疽诸毒顽硬恶疮，散漫不作脓，及皮破血流，湿烂痛苦，天泡，火丹，肺风酒刺、赤白游风、鱼脊疮。

68189 真法枳壳散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】枳壳四两 厚朴一斤(去皮，锉。用大黄二两，生姜四两，枣五十枚，乌头二两，并锉细，以水煮枣烂熟，只用厚朴)

【用法】上药各为细末，每厚朴八钱匕，枳壳三钱匕，腻粉三钱匕，同研为散。每服半钱匕，熟米饮调下，一日三次，不拘时候，连服三日。重者不过五日，遂下黑恶物瘀血，疾便愈。

【主治】①《传家秘宝》：发狂若疟，及五膈气噎塞病，兼脾积气。②《普济方》引《卫生宝鉴》：气血结滞，腹胀或蛊，身瘦面黄，吐急如鼓。

68190 真珠天麻丸

【方源】《活幼口议》卷十三。

【组成】天南星(炮) 天麻 白附子(炮) 各一钱 腻粉半钱 巴霜一字 芫荇(炒) 全蝎(面炒) 滑石各一钱半

【用法】上为末，面糊为丸，如麻子大。初生患儿三日三丸，五日五丸，七日七丸，茶清送下。

【功用】①《活幼口议》：下惊风，祛痰热。②《普济方》引《永类铃方》：疏利，截风定搐。

【主治】①《活幼口议》：急惊风、吊肠、锁肚，撮口。②《普济方》引《永类铃方》：郁结腹胀，青筋阻乳。

68191 真珠天麻丸

《袖珍小儿》卷二。为《普济方》卷三七〇“珍珠天麻丸”之异名。见该条。

68192 真珠天麻丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】天南星(炮) 天麻(泡) 白附子(泡) 各一钱 巴豆霜十七个 全蝎(炮) 滑石二钱半 防风 半夏(姜汁炒) 各一钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如小豆大，百草霜为衣。每服五六十丸，淡姜汤送下。

【主治】惊风痰热壅盛及撮口。

【备考】方中全蝎用量原缺。

68193 真珠贝母散

《圣济总录》卷三十三。为《肘后方》卷八“辟病散”之异名。见该条。

68194 真珠牛黄丸

【方源】《痧喉汇言》。

【组成】珍珠八分 硼砂四分 辰砂六分 人中白八分 青黛四分 冰片一分 儿茶四分 琥珀八分 牛黄二分

【用法】上为极细末。吹之。

【主治】咽喉臭烂不收口

68195 真珠附著散

【方源】《千金翼》卷二十。

【异名】真珠散(《圣惠》卷五十五)。

【组成】真珠 雄黄 丹砂各半两 干姜一两 蜈蚣一枚(炙) 桂心一两 天雄半两(炮) 莽草半两 细辛一两 蜀椒半两(汗，去目及闭口者)

【用法】上为散。每服方寸匕，酒调服，一日二次。

【主治】诸风、鬼注、毒气、猫鬼所着。

68196 真珠退翳散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】白泽石膏 乌贼骨 真蚌粉各等分 小珠少许

【用法】上为细末。每服一钱，食后、临卧用第二次米泔调下。

【功用】退翳。

【备考】本方方名，《普济方》引作“珍珠退翳散”。

68197 真料重明散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经后录》。

【组成】炉甘石一两（黄连三钱，童便浸三日，滤出黄连，为末，汁碎石）井泉石四钱（山梔五钱，捶碎，浸水一盞，淬干；又用乳汁一蛤蜊许淬）石燕子二钱（用好醋二蛤壳许淬干）金星石二钱 银星石二钱

【用法】上五石别制后，共为极细末。南明砂三钱，海螵蛸、白丁香（雄雀屎）、硃砂、青盐、枯矾、铜青、胆矾、焰消、片脑、乳香各一钱，芒消、半夏、麝香（少许），轻粉上药各为极细末，入前药研匀。每用少许点眼中。

【功用】明目。

68198 真料济阴丹

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】净香附子八两（二两咬咀，好醋浸；二两无灰酒浸；二两盐汤浸；二两用二三岁童便浸一日夕，长流水洗；如无童便，用姜汁，艾煎汁浸亦可，炒干）乌药 当归 泽兰 赤芍 百草霜 五灵脂 陈皮 熟苍术 川芎各半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸。每服三十丸，诸疾各汤使。

【主治】胎前产后百疾。

【加减】无孕，加三棱、莪术、白芷各一两，桂半两，四味为末，醋糊为丸服；产后，加百草霜或添益母草，蜜浸炒干为末，入前药内用。

68199 真碓儿眼药

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】炉甘石二两 朴消一两半（二味坩内固济，烧一日，水飞末，出火毒）黄丹 密陀僧各一两（水飞）朱砂 铜绿各半两 青盐 玄精石 硃砂 硼砂各三钱 白丁香（雄者）三钱 轻粉二钱

【用法】上为细末，用黄连一两碎，水一碗，

熬煮至一盞，滴水不散，去滓，下白沙蜜一斤，用慢火熬，入前药拌匀，文武火熬至稀稠得所。每夜点二三箸，觉眼内及涩是验，便睡至早晨。觉眼微效，频点；点有涩难开莫怪，是效，点十日验。

【功用】磨消翳膜。

【主治】远年日近，翳膜瘀肉，昏晕隐涩不明。

68200 真精妙合丸

【方源】《济阳纲目》卷六十七。

【组成】紫河车一具（用男子初胎者佳，米泔水洗净，用竹刀挑去筋内紫血，以老酒洗过入瓶，重汤煮一日，捣烂如泥）秋石二两（择童男女洁净无体气者，具以精洁饮食及盐汤，忌韭肉茶等，取便熬成秋石）人乳（干）四两（取壮实妇人初胎者浓乳汁，置大瓷盘内，烈日中速晒干）红铅五钱（择女子洁净无体气者，候天癸初至，以铅打红样合阴户上，随到随取，中有凝结如粟米珠子，或三或五或七颗者名曰枚子，尤妙。然北方女子多有，南方未易得，既取以澄过茯苓末收之）

【用法】上为末，同河车和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一二十丸，空心白沸汤送下。

【功用】补虚生子。

【主治】男女虚弱，阴阳俱耗者。

68201 真人去三尸方

【方源】《圣济总录》卷一九九。

【组成】狗脊（去毛）七两 干漆二两 芫荽三两

【用法】上药同熬，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，米饮送下。三七日，三尸自去。

【主治】尸虫，痈疽、痔、漏、疥癣、蚤虱。

68202 真方五色丸子

《永类铃方》卷二十。为《普济方》卷三九一引《保婴方》“真方五色丸”之异名。

68203 真传温脐脐丸

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】前服：当归（酒洗） 熟地（砂仁、沉香炒） 生地（姜、酒炒） 肉苁蓉（酒浸） 梔子（炒）各五钱 黄芩三钱 黄柏（盐、酒炒）二钱 木香 沉香各一两三钱 槟榔四钱 脘肭脐四钱 海牛一个 海马一对 蛤蚧一对（酥炙）

后服：枸杞子 五味子 肉苁蓉（酒洗） 当归（酒洗） 生地黄（酒洗） 熟地黄（酒蒸）各五钱 牛膝（酒浸） 白茯苓 沉香 木香各一两 天冬（去心） 麦冬（去心）各五钱 甘草三钱 枳壳五钱 海马一对（酥炙） 海牛一个（酥炙） 蛤蚧一对（酥炙） 脘肭脐四两（酥炙）

【用法】上二料，俱为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心温酒或盐汤下。

【功用】补精益血，壮元阳，暖丹田，滋容颜，利腰膝。

68204 真金不换正气散

【方源】《普济方》卷一五一引《局方》。

【组成】藿香一两 厚朴（姜汁制）一两 陈皮（去白）一两 苍术（浸炒）一两 半夏一两 甘草（炒）一两 川芎一两

【用法】上咬咀，如法修制。每服五钱重，水一盞半，加生姜三片，枣一枚，同煎八分，去滓温服，滓再煎服，不拘时候。

【功用】和脾胃，止吐泻，温中，下痰饮，止腹痛满，止汗，解山岚瘴气。

【主治】四时伤寒，五种膈气，吞酸，噎痞噎塞，干呕恶心；内受湿寒，外感风邪，身体沉重，肢节痠疼，头昏鼻塞，未分阴阳之间，尤宜服之；八般疟疾，遍身浮肿，五劳七伤，或风气所灌，手足肿痛，全不思饮；孕妇产前产后，皆可服饵。又治霍乱吐泻，心腹疼痛，脾气虚弱，脏腑时鸣，小儿脾胃不和，时气诸疾，及治四方不伏水土。

【加减】如欲出汗，加葱白；若酒后得证，加干葛；小腹疼，加炒小茴香；心疼，加玄

胡索；若阴证，手足微冷，大便虚，加丁香、干葛，姜；食后得证，加香附子，淡豆豉；泻痢，加肉豆蔻。

68205 真方不换金正气散

《普济方》卷一四七。为《易简方》“不换金散”之异名。见该条。

索

68206 索血散

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】干葛 防风 赤芍 细辛 羌活 桔梗（炒） 甘草 肉桂 白芷各三钱

【用法】上为散。加生姜、葱水煎服。

【主治】刀刃伤有潮热、面肿、气喘，及破伤风者。

【加减】虚弱老人出血多者，去干葛，加川芎。

68207 索豆散

《普济方》卷二九三。即《圣惠》卷六十六“赤小豆散”。见该条。

68208 索氏三和汤

《济阳纲目》卷三十九。为《医学纲目》卷二十四“索氏三和汤三倍加白术方”之异名。见该条。

68209 索矩三和汤

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】橘皮 厚朴 槟榔 白术各三两 甘草（炙） 紫苏各二两（去粗梗） 木通 海金沙各一两

【用法】上锉。每服五钱，水一盞，加生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】病愈后面肿，或腰以下肿。

68210 索氏三和汤三倍加白术方

【方源】《医学纲目》卷二十四。

【异名】索氏三和汤（《济阳纲目》卷三十九）。

【组成】白术 厚朴 陈皮各三两 木通一两 槟榔 紫苏各二两 甘草 海金沙 大腹皮 白茯苓 枳壳各一两

【用法】水煎服。

【主治】小腹胀。

【临证举例】疟久腹胀 一男子年四十余，患疟久而腹胀，脉不数而微弦，重取则来不滑利，轻重又皆无力，遂与本方人姜汁服之，数服而疟愈，小便利二三行，胀稍减，遂又小便短少，予作气血两虚，于前药内入人参、牛膝、当归身尾作大剂料，百服而愈。

【备考】①本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“三和汤”。②《济阳纲目》本方用法：上锉。每服八钱，加生姜三片，水煎服。

袁

68211 袁二白散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】半夏 柿霜

【主治】咳嗽，痰症。

壶

68212 壶公丹

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】附子一个（半生半熟，以面包煨）倍子五钱（炒微黑） 麻黄五钱 枯芩五钱 甘草节五钱

【用法】上为细末。用米醋调涂留头。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：回阳化毒。

【主治】诸般肿毒阴症。

68213 壶公妙剂散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】穿山甲（炒） 葫芦巴 槐花 黑丑（头末） 当归各等分

【用法】上为末。每服五钱，用温酒调成块，挑入口内，温酒送下，随饮几杯，以助药力。

【主治】一切诸毒，乳痈，便毒，筋骨疼痛不问新久。

68214 壶隐子双鹿丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】雄麋一只 雌鹿一只 枸杞子十六斤 当归（合用酒浸） 川芎（不得见

火） 白芍（炮） 生地（酒煮捣膏） 人参 白术（东壁土炒） 白茯苓（去皮） 甘草（蜜炙）各三斤

【用法】上药各为细末，各另收贮；取雄麋宰血，和四君如弹子；雌鹿宰血，和四物如弹子，晒干，复为末；二鹿各去毛秽，二脑二髓和地黄膏，再捣如泥；二骨酥炙，各磨为粉；二肉二皮二杂，各炼为膏；麋角煮为霜，角汁熬为胶，和前药末为丸，如不成丸，少加炼蜜，如梧桐子大。每服五十丸，加至一百丸，空心温酒送下；盐汤亦得。药性回润，仍须常晒。

【主治】肾精亏，失精。

【方论选录】麋能补阳，鹿能补阴，气血两虚，麋鹿兼用，故曰双鹿。惟此方不寒不热，大都用雄麋四君以补气；雌鹿四物以补血；枸杞者，取其能壮筋骨，坚精髓，延龄益寿，返老还童耳。

菩

68215 菩菜汤

【方源】《产科发蒙·附录》。

【异名】长荣汤、山田摆药。

【组成】当归 川芎 芍药 人参 白术 黄芩 黄连 丁子 沉香 木香 肉桂 萍蓬根各等分 甘草减半（一方加郁金、熟地黄）

【用法】上锉。除丁、沉、木、桂，余药炒黄色。每服三钱，水煎服。

【主治】产前产后诸病及金创。

萆

68216 萆芥退翳散

【方源】《中医眼科学讲义》。

【组成】硼砂 冰片 麝香 萆芥粉

【用法】点眼。

【主治】宿翳。

68217 萆芥熟地汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地三两 地栗三两（捣汁）

【用法】水煎服。

【主治】肾水无济于大肠，故火旺而致大便出血者，或粪前而先便血，或粪后而始来。

莽

68218 莽草丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】莽草一两（微炙） 天麻一两 川升麻一两 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 蝉壳一两（微炒） 细辛一两 赤茯苓一两 蛇蛻半两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 芎藭一两 甘草一两（炙微赤，锉） 麝香一分（细研）

【用法】上为末，入麝香，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前温酒送下。

【主治】风，皮肤搔痒如虫行，头目旋闷。

68219 莽草汤

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】莽草七叶 蜀椒九个

【用法】上以浆水二升，煮取一升。适寒温含满口，冷即吐之，一日二三次。

【主治】齿痛有孔，不可食饮，面肿。

68220 莽草汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】莽草半斤 牡蛎四两 雷丸三十枚 蛇床子一升 大黄一两

【用法】上咬咀。以水三斗，煮取一斗半，适寒温以浴儿，避风及阴。

【功用】《千金方衍义》：荡邪热，逐毒气。

【主治】小儿伤寒。

【备考】本方方名，《千金方衍义》引作“莽草浴汤”。

68221 莽草汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】六物莽草汤（《外台》卷三十五引崔氏方）

【组成】莽草 丹参 桂心各三两 菖蒲

半斤 蛇床子一两 雷丸一升

【用法】上咬咀。以水二斗，煮三五沸，适寒温以浴儿，避目及阴。

【功用】《千金方衍义》：荡邪热，逐毒气。

【主治】小儿卒寒热不休，不能服药。

【备考】本方方名，《千金方衍义》引作“莽草浴汤”。

68222 莽草汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】莽草 薰本（去土） 桔梗（去芦头，炒） 地榆 谷精草 生干地黄 枳壳（去瓢，麸炒）各一两 蜂窝一枚（大者细锉）

【用法】上为粗散。每用三两，水一斗，煎至八升，乘热淋患处。

【主治】风，皮肤痹麻，疼痛瘙痒。

68223 莽草汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】莽草 滑石 冬葵子（炒）各三两 瞿麦穗 牛膝（酒浸，切，焙） 当归（切，炒）各二两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盂半，煎至八分，去滓温服，以下为度。

【功用】令胞衣烂。

【主治】妊娠堕胎，胞衣不出。

68224 莽草汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】莽草 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐） 牡蛎（煨过）各一两

【用法】上为粗散。以水一斗，煮取七升，去滓，适寒温浴儿。避风。

【主治】小儿隐疹。

68225 莽草散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】莽草三两（微炒） 附子二两（炮裂，去皮脐） 干姜二两（炮裂，锉） 石斛二两（去根锉） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 细辛二两 踯躅花半两（酒拌，炒令干） 白薇二两 川乌头二两（炮裂，去皮

脐) 石南一两 川椒一两(去目及闭口者, 微炒去汗) 桂心二两

【用法】上为细散。每服三钱, 以温酒调下, 后以羊脯下药, 一日二次。勿大饱食。

【主治】十年大风, 毛发秃落, 隐疹生疮, 气脉不通, 抓搔不觉痛痒。

68226 莽草散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】莽草一两(微炙) 细辛三分 人参三分(去芦头) 麻黄半两(去根节) 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 芎藭三合 甘草三分(炙微赤, 锉) 黄耆一两(锉) 天麻一两半 防风一两(去芦头) 凌霄花三分 白蒺藜三分(微炒, 去刺) 当归三分

【用法】上为散。每用药一分, 水一大盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。又取此药二两, 用苦参五两、白矾五两、桃、柳枝各五两, 水一石二斗, 同煎至七斗, 布滤去滓, 暖室中浴, 浴后宜服前散。

【主治】风, 身体如虫行。

68227 莽草散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】莽草一两 细辛一两 枳壳半两(去瓢) 附子一钱(生用, 去皮脐) 川椒一分(去目及闭口者, 微炒去汗)

【用法】上为末。每用半两, 以水二大盏, 煎至一盏, 去滓, 热含冷吐, 不得咽之。

【主治】牙痛连颊肿。

68228 莽草散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】莽草一分 猪椒根皮半两

【用法】上锉。以浆水二中盏, 煎十余沸, 去滓, 热含冷吐。

【主治】牙齿虫蚀, 蛀孔疼痛, 不能食, 面肿。

68229 莽草散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】莽草半两 山椒皮一握

【用法】上为粗散。每用三钱, 以酒、水各半盏, 煎至五七沸, 去滓, 热含冷吐。

【主治】牙齿虫蚀, 有蛀孔。

68230 莽草散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】莽草一两 皂荚两挺(去黑皮及子) 鹿角屑一两 白及一两 白薇一两 半夏一两 天南星一两 附子一两(生用, 去皮脐) 蛇蛻皮一条

【用法】上为细散, 用醋面糊调为膏。涂贴于肿处, 干即再上, 以肿散为度。

【主治】缓疽初结, 微肿痛。

68231 莽草散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】莽草一两 羌活三分 羚羊角屑三分 景天三分 白蒺藜三分(微炒, 去刺) 芫蔚子三分 凌霄花三分 鬼箭羽三分 丹参三分 防风三分(去芦头) 细辛三分 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓢)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人血风, 皮肤瘙痒, 心胸烦闷。

68232 莽草散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】莽草一两 麻黄三分(去根节) 沙参三分(去芦头) 独活半两 黄耆半两(锉) 白蒺藜三分(微炒, 去刺) 防风半两(去芦头) 芎藭半两 犀角屑半两 天门冬三分(去心) 凌霄花半两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人风瘙, 隐疹遍身, 搔痒, 状若虫行, 或发或歇。

68233 莽草散

【方源】《普济方》卷九十三引《博济》。

【组成】莽草一两半(炙, 去毛出汗) 蝎梢一分 官桂(去皮)一分 当归一两 羌活半两 荆三棱一两 蓬莪术一两

【用法】上为末。如人卒中恶风，昏迷未省，风涎方盛，即时以药四钱，用二钱生末，先置盏中，以二钱末，用酒一盏半，煎至八分，倾在生药盏内，调匀带热服，但不得咽喉，扶起须臾，即吐出恶涎，立愈。如诸般风疾，并依此法。每日一服，永无中风及痰涎。如久患瘫痪，旦暮常服，经月余必被上有臭汗气，痕迹如人形状，其患永愈。

【主治】瘫痪等风疾。

68234 莽草散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】莽草（浸洗过，炙）二两半 石斛（去根）二两 萆薢 柏子仁（生用） 石龙芮 泽泻 牛膝（酒浸，切，焙） 芍药 防风（去叉） 山茱萸 菟丝子（酒浸，别捣） 白术 细辛（去苗叶） 芎藭各三分 牛黄（研） 松脂各半两 附子（炮裂，去皮脐） 杜仲（去粗皮，炙） 羌活（去芦头） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）各一两 桂（去粗皮）一两半 天麻 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）各二两

【用法】上二十三味，将二十一味捣为细末，与牛黄、菟丝末拌匀。每服一钱匕，温酒调下，日二夜一。若中风脚手甲青者，每服二钱至二钱半匕，酒调下，顿服。盖覆良久，以生姜稀粥投之，汗出即愈。

【主治】破伤中风。

68235 莽草散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】莽草 生姜 干漆 猪牙皂荚 胡麻子 生地黄 菟丝子各四两

【用法】上锉，如麻豆大，入藏瓶内，盐泥固济，火煨一日后，入地一尺二寸深埋，三伏时取出，露三夜，不得着日气，研罗为细散。用如齿药法揩牙。

【功用】①《圣济总录》：乌髭。②《普济方》：延寿。

【主治】肾虚齿痛。

68236 莽草散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】莽草一两 白芷三分 细辛（去苗叶） 荆芥穗各一两半 芎藭半两 升麻一两

【用法】上为散。揩齿良久，以盐汤漱口。

【主治】风牙疼。

68237 莽草散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】莽草（锉） 附子（去皮脐，生锉） 木香 白藜 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为细末。别以榆根锉，捣绞取汁，调药于故熟帛上贴，开一小窍子出毒，干则易之。

【主治】猝得恶毒风肿不消，结成坚核。

68238 莽草散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】莽草叶一两 紫葛 大黄各半两 赤小豆二两

【用法】上为细末。用醋调如糊，敷贴核上，频易之。每易则先以热葱汤洗。

【主治】产后乳结核，或坚硬疼痛。

68239 莽草散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引张焕方。

【组成】莽草 寒水石 消石各半两

【用法】上为细散。每用以新汲水调涂患处。

【主治】小儿废灶火丹，丹发从足趺起，正匀赤。

68240 莽草散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】细辛 莽草各半分

【用法】上为细末，入麝香少许。每用一钱半，水一盏，煎至八分，热含冷吐。

【主治】风肿牙疼。

68241 莽草散

【方源】《济生》卷五。

【组成】莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鹤虱 地骨皮 藁本（去芦） 槐白皮

【用法】上咬咀。每服一两，水一盏，入盐少许，煎至七分，去滓，热含冷吐之，一日

三次。

【主治】风壅热气上攻，齿龈浮肿，或连颊车疼痛，或宣露出血。

68242 莽草散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】莽草 生姜 柳枝皮（取白） 牛膝（去苗） 胡蒜子 生干地黄 菟丝子 无食子 桐子漆 猪牙皂角各六两

【用法】上锉，如麻豆大。入藏瓶，盐泥固，火煨一日后，入地一尺二寸深埋，三伏时取出，露三夜，不得见日气，研罗为细散。每用手指蘸药，于牙上旋擦。

【功用】乌髭鬓，牢牙。

【主治】牙齿痛。

68243 莽草散

【方源】方出《得效》卷十，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】莽草

【用法】上为末，用浸椒水调涂。

【主治】狗咬昏闷。

68244 莽草膏

【方源】《肘后》卷八。

【组成】莽草一斤 乌头 附子 踯躅各三两

【用法】上切，以水苦酒一升，渍一宿，猪脂四斤，煎三上三下，绞去滓，向火以手摩病上三百度，应手即瘥。耳鼻病，可以绵裹塞之。

【主治】诸贼风、肿痹；风入五脏、恍惚；诸疥癣、杂疮。

68245 莽草膏

【方源】《外台》卷二十四引《范汪方》。

【组成】莽草 芎藭 当归 细辛 附子（炮） 黄芩 乌头（炮） 牛膝 踯躅 野葛 茯苓 防风 杜蘅各一两 猪脂二斤

【用法】上切，用猪肪合煎，去滓。敷疮上，一日二次。

【主治】痈肿牢核，发背成脓。

【宜忌】①《外台》引《范汪方》：忌海藻、菰

菜。②《普济方》：忌猪肉、冷水、生菜、大酢。

68246 莽草膏

【方源】《外台》卷十九引《苏恭方》。

【组成】莽草五两 附子八两（生用，去皮） 丹参四两 汉防己三两 芎藭四两 椒三两 吴茱萸四两 白芷三两 沉香半两 零陵香半两 鸡舌香半两 犀角二两（屑） 当归三两 商陆根四两 青木香半两

【用法】上切，以酢渍一宿，以好酥三大斤煎九上九下，布绞去滓。用摩顽痹并肿处。膏入肉亦无损伤，服诸药不相妨。

【主治】风毒顽痹。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

68247 莽草膏

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】莽草一两 当归二两 芎藭二两 大戟二两 川椒一两 附子二两（去皮脐） 细辛二两 赤芍药二两 芫花二两 踯躅花二两 蒺藜二两

【用法】上细锉，以醋三分浸一宿，用猪脂三升都煎，令附子色黄为度，绵滤去滓。每取摩病处，一日二三次。

【主治】风瘙痒，皮肤生痞瘤，体肿疼痛。

【备考】《准绳·疡医》有苦参。

68248 莽草膏

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】莽草三分 牡丹半两 川椒一两（去目） 藜芦三分 芫花半两 川大黄一两 皂荚半两 附子三分（去皮脐）

【用法】上为末，用绵裹。以醋半升，渍一宿，以不中水猪脂一斤，于微火上煎令药色黄，膏成，绞去滓，收瓷盒中。以摩肿处。

【主治】脚气风毒，肿满疼痛。

68249 莽草膏

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】莽草半两 当归一两 芎藭一两 羊踯躅一两 大戟一两 细辛一两 赤芍药一两 芫花一两 附子一两（去皮脐，生用）

【用法】上细锉，用猪脂三斤煎之，候附子色黄，膏成，滤去滓，于瓷盒内贮之。取少许敷于疹上，一日四五次。

【主治】赤丹，瘾疹而痒，搔之随手肿起。
68250 莽草膏

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】莽草三分 当归一两 芍药一两 大戟一两 细辛一两 苦参二两 芫花一两 川椒一两 附子一两 踯躅花一两 景天一两 蒴藿根一两

【用法】上细锉，用炼成猪膏二斤，入药煎，候附子黄赤色，膏成，去滓，倾入瓷器中盛。涂于病上，一日三次。

【主治】妇人风搔，遍身生隐疹，痒搔之，随手肿起。

68251 莽草膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】莽草 当归 薤白 黄芩 甘草(炙)各二两 生地黄五两 白芷三两 大黄四两 续断一两

【用法】上咬咀，以猪脂三升，微火煎三沸，三上下，白芷黄，膏成。敷疮。

【功用】生肉。

【主治】痈疽败坏。

68252 莽草叶散

《普济方》卷六十五。为《圣济总录》卷一一九“槐枝汤”之异名。见该条。

68253 莽草浴汤

《千金方衍义》卷五。即《千金方》卷五“莽草汤”。见该条。

68254 莽草浴汤

《千金方衍义》卷五。即《千金方》卷五“莽草汤”。见该条。

莱

68255 莱子丸

【方源】方出《丹溪心法》卷二，名见《惠直堂方》卷二。

【组成】杏仁(去皮尖) 萝卜子各半两

【用法】上为末，粥为丸服。

【主治】①《丹溪心法》：痰嗽。②《惠直堂方》：风痰咳喘，或吐脓血，并老人痰喘。

【备考】《惠直堂方》本方用法：共捣烂，加蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，清汤送下。

68256 莱菔丸

【方源】方出《证类本草》卷二十七引《胜金方》，名见《圣济总录》卷六十五。

【组成】莱菔子半升(淘择洗，焙干，炒黄)

【用法】上为末，以沙糖为丸，如弹子大。绵裹含化。

【主治】肺疾咳嗽。

68257 莱菔丸

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】莱菔子丸(《片玉痘疹》卷十二)。

【组成】胡椒(厚朴煎汤，浸过晒干)二钱 白术(壁土炒)一两 莱菔子(炒)五钱

【用法】上为末。蒸饼糊丸，如梧桐子大。陈皮汤送下。

【功用】下气消胀。

【主治】《痘疹仁端录》：痘后中气虚作胀者。

68258 莱菔汁

【方源】《卫生总微》卷八。

【异名】萝卜汤(《痘治理辨》)。

【组成】开花萝卜

【用法】煎汁，时时与饮。

【主治】疮疹出不快。

68259 莱菔饮

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】萝卜饮(《直指》卷二十六)。

【组成】萝卜

【用法】捣取自然汁一盞，入盐一钱调匀，顿服。

【主治】①《杨氏家藏方》：鼻衄不止。②《直指》：诸热吐血、衄血。

68260 莱菔酒

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】莱菔不拘多少

【用法】上细锉。每用一合，用酒一盞，先

煎百沸，次下莱菔再煎一二沸，放温，滤去滓，顿服。

【主治】大衄不止。

68261 莱菔散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】炒莱菔 豆腐皮各五两 川贝母三钱 冰糖 白糖各二两半 白果仁三钱

【用法】将莱菔子、豆腐皮、川贝母、白果仁四味用砂锅焙干，为细面，过绢罗，再将冰糖研细同白糖入药拌匀。每服二钱，早晚开水送下。

【功用】消食化痰，止嗽定喘。

【主治】老年痰喘，冬令即发，或气滞呕吐，胸膈饱闷；或少年咳嗽而兼胃病之实证者。

【宜忌】忌咸物、五辛。

68262 莱菔粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】莱菔

【用法】生捣汁，煮粥食。

【功用】宽中下气，消食去痰，止嗽止痢，制面毒。

【主治】消渴。

68263 莱菔膏

【方源】《得效》卷十三。

【组成】皂角(不蛀者，炙去皮子) 萝卜(如无，以子代之)

【用法】上以皂角为末，以萝卜同酢醋研。鸡翎蘸药涂牙龈，即醒。

【主治】大人、小儿噤口风。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“萝卜膏”。

68264 莱菔膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】鲜萝卜缨

【用法】杵烂罨之。

【功用】消肿止痛。

【主治】烫火伤未溃，红肿热痛者。

68265 莱菔子丸

《片玉痘疹》卷十二。为《万氏家抄方》卷六“莱菔丸”之异名。见该条。

68266 莱菔子汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】莱菔子(焙，研) 山楂各一钱半 厚朴(姜制) 枳实 广皮各一钱 蓬术八分(醋制) 炙甘草三分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】因面食坚硬等味，过用不化所致的心痛。

68267 莱菔子粥

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】莱菔子三合

【用法】煮粥食。

【功用】①《老老恒言》：化食除胀，利大小便，止气痛。②《长寿药粥谱》：化痰平喘，行气消食。

【主治】①《寿世青编》：气喘。②《长寿药粥谱》：老年慢性气管炎，肺气肿，咳嗽多痰，胸闷气喘，不思饮食，噎气腹胀。

68268 莱菔子煎

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】莱菔子(烂研)半两·桃仁(去皮尖双仁，研如膏) 杏仁(去皮尖双仁，研如膏) 蜜酥 饴各一两

【用法】上药慢火同煎，如稀饴。每服半匙，沸汤化下，不拘时候。

【主治】咳嗽多痰，上喘，唾脓血。

68269 莱菔木香散

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】莱菔子二两 粟米一两半 陈橘皮(汤浸，去白，焙)一两 巴豆(肥大者)三十枚(去皮，于瓦石器内与上三味同炒，候药焦黑色，拣去巴豆不用) 木香一分

【用法】上为散。每服二钱匕，用煮莱菔汤调下。或以生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，莱菔汤下。

【主治】五膈气，喘促，腹胁胀满，胸膈不快，痰逆恶心，不思饮食。

莲

68270 莲子丹

【方源】《三因》卷十三。

【组成】新莲肉四两（去心皮） 白龙骨一两（醋煮） 甘草一分

【用法】上为末。车前草汁，入面少许，煮糊为丸，如绿豆大。每服三五十丸，盐汤，酒任下。

【主治】真气虚惫，口苦舌干，心常惨戚，夜多异梦，昼少精神，或梦鬼交通，遗泄白浊，小便余沥，阳事不举，目暗耳鸣，面色黧黑。

68271 莲子散

【方源】《普济方》卷三十八引《家藏经验方》。

【组成】旱莲子

【用法】上于新瓦上焙干为末。每服二钱，食前米饮调下。

【主治】新旧肠风脏毒，下血不止。

68272 莲子散

【方源】《直指》卷七。

【组成】石莲肉

【用法】上为末。入肉豆蔻末少许，米汤乘热调服。

【主治】翻胃，噤口痢。

68273 莲子散

【方源】《得效》卷七。

【组成】莲子十四个 草芽茶十四个 乳香随上二药多少入

【用法】上同捣，以纸裹煨透。先以黄连汤洗患处，然后以药生贴之。

【主治】诸痔。

68274 莲子粥

《饮膳正要》卷二。为《圣惠》卷九十七“莲实粥”之异名。见该条。

68275 莲子粥

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】莲肉（去心皮）六两 芡仁（炒）四两 白茯苓（水飞）三两

【用法】上为末和匀。每一两用海松子细屑五钱，水一升，同碎米心煮成粥，和蜜少许，长服极佳。

【功用】止渴，止痢，益神安心强志，益气聪耳明目，补脏腑，养气力，润皮肤，肥五脏，补虚羸。

【主治】水气。

68276 莲子膏

《普济方》卷四十八。为《外台》卷三十二引《崔氏方》“莲子草膏”之异名。见该条。

68277 莲心饮

《普济方》卷二二八。为《医方大成》卷四引《简易方》“莲心散”之异名。见该条。

68278 莲心散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】石莲心半两 人耳塞半两 乳香一分（别研） 人参半两 灯花一字 丹砂一分（别研）

【用法】上为散。每服半字匕，薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿夜啼。

68279 莲心散

【方源】方出《百一》卷六引孙仲盈方，名见《得效》卷七。

【组成】莲子心七个 糯米二十一粒

【用法】上为细末。酒调服。

【主治】劳心吐血。

68280 莲心散

【方源】《医方大成》卷四引《简易方》。

【异名】莲心饮（《普济方》卷二二八）。

【组成】莲肉一两 白术 人参 白茯苓 五味子 木香 薏苡仁（炒） 北桔梗（炒） 甘草（炙） 白扁豆（炒） 丁香 白芷 当归各半两 桑白皮 干葛（炒） 黄耆（炒） 杏仁（去皮尖，炒） 干姜（炮） 山药（炒） 半夏曲 百合 神曲（炒） 各一两

【用法】上咬咀。每服三分，水一盞，姜、枣同煎，空心温服。

【主治】虚劳或大病后心虚脾弱，盗汗，遗

精。

68281 莲心散

【方源】《脉因证治》卷上。

【异名】二十四味莲心散(《济阳纲目》卷六十六)。

【组成】当归 黄耆 甘草(炙) 鳖甲(醋炙) 前胡 柴胡 独活 羌活 防风 防己 茯苓 半夏 黄芩 陈皮 官桂 阿胶 赤芍 麻黄(去节) 杏仁 莲心(去心) 天南星 川芎 芫花(醋炒黑) 枳壳(炒)

【用法】除芫花,每服二钱半,水二盏半,生姜三片,大枣一枚,入芫花一抄,煎至八分,先服三拗汤,后服此方。须吐有异物,渐减芫花及甘草,杀虫少之。

【主治】传尸劳瘵,寒热交攻,久嗽咯血,羸瘦。

【备考】方中“杀虫少之”,《医学纲目》引作“芫花渐减,盖芫花反甘草,多之所以杀虫,少之所以去寒热,妙处在此”。

68282 莲心散

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】莲心四十九粒(瓦上焙干,为末) 建茶一小挑 蜜一匙

【用法】上作一服,用井花水半盏,调匀服之。

【功用】通阴阳,利大小便。

【主治】大小便不通。

68283 莲心散

《普济方》卷一八八。即原书同卷引《澹寮方》“神效丸”改作散剂。见该条。

68284 莲叶饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】莲叶三个(炙焦揉碎) 甘草(炙)二两(锉如麻豆大) 生蜜一匙 生地黄汁三合 蒲黄二两(汤成下)

【用法】上五味,以前二味用水五盏,煎取二盏,去滓,下蜜并地黄汁再煎三五沸,入蒲黄搅匀,分五次温服。

【主治】产后血晕不识人,狂言乱语。

68285 莲叶散

【方源】《跌损妙方》。

【组成】莲叶不拘多少(炒存性)

【用法】上为末。童便调一二服,大便下瘀血愈。若身弱气虚,用八珍汤加骨碎补、续断服。

【主治】瘀血腹胀。

68286 莲肉丸

【方源】《普济方》卷三十三引《海上良方》。

【组成】莲肉(去心) 白茯苓各等分

【用法】上为末。空心白汤调下。

【主治】梦泄白浊。

68287 莲肉汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】莲心(去心)半斤 猪肉(去油皮)一斤

【用法】共水煮熟,下砂仁、伏酱,朝夕与啖,其胃气接养,虫自安居不出矣。切不宜投以使君子、槟榔之物,痘中一投,命遂丧矣。

【主治】小儿痘后或吐蛔,或利下蛔者。

68288 莲肉散

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【异名】石莲散(《医学入门》卷七)。

【组成】莲肉 益智仁 龙骨(五色者)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,空心用清米饮调下。

【主治】小便白浊,梦遗泄精。

68289 莲肉粥

【方源】《医便》卷四。

【组成】豕猪肚一具(洗净) 人参五钱 干姜一钱(炮) 葱白五茎(去须叶) 川椒一钱(炒出汗,去目闭口者) 糯米五合

【用法】上为末,以米合和相得,入猪肚内缝合,勿令泄气。以水五升,用砂锅内慢火煮令极烂,空心服之,次饮酒三五杯。

【功用】补脾胃,养心肾。

【备考】本方名莲肉粥,但方中无莲肉,疑

脱。

68290 莲肉粥

《老老恒言》卷五。即《圣惠》卷九十七“莲实粥”。见该条。

68291 莲肉膏

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】莲肉 粳米(各炒)四两 茯苓二两

【用法】上为末,沙糖调成膏。每服五六匙,白滚汤送下。

【主治】病后胃弱,不能饮食。

68292 莲汤散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】粉霜(研极细)

【用法】每婴孩一字,三四岁下者半钱,煎莲花汤调下。冬月无花时,莲肉代之。

【主治】小儿发渴心燥。

68293 莲米散

【方源】《验方新编》卷七。

【组成】黄老米(炒)三合 莲肉三两(去心) 猪苓 泽泻(炒) 白术(土炒)各五钱 木香一钱半 白沙糖一两 干姜二钱(用湿纸包煨熟)

【用法】上为细末。每服三钱,空心白汤下。

【主治】老人五更泄泻。

68294 莲壳散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】棕皮(烧灰) 莲壳(烧灰存性)各半两 香附子三两(炒)

【用法】上为末。每服三四钱,食前米饮调下。

【主治】血崩。

68295 莲花饮

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】甘草 知母 莲花须 川莲仁 瓜蒌根 五味 人参 干葛 白茯苓 生地 竹叶

【主治】《幼科铁镜》:消渴。心火动而消上,上消乎心,移热于肺,渴饮茶水,饮之又渴,名曰上消者。

68296 莲花饮

【方源】《痧痘集解》卷六。

【组成】牛蒡 苍术 当归 荆芥 白芍 木通 苦参(酒炒) 黄连 生地 甘草 槐花 莲花

【用法】水煎,分上、中、下三部,早、中、晚温服。

【主治】痘后疮痍。

68297 莲花肚

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】猪肚一个 莲肉一两 红枣一两 肉桂一钱 小茴香三钱 白糯米一合

【用法】先用清水照常洗去肚之秽气,将各药同米俱入肚中,以线扎住口,外用清水煮之,煮极烂为度。蘸甜酱油顿食;如未饱再用米饭压之。其痛如失。

【主治】胃寒、脾寒而痛,痛在心之上下左右者。

68298 莲花散

【方源】方出《本草纲目》卷三十三引《孙氏集效方》,名见《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】莲花蕊 黑牵牛头(末)各一两半 当归五钱

【用法】上为末。每服二钱,空心酒送下。

【主治】久近痔漏。

【宜忌】忌热物。

68299 莲实丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】莲实(去皮) 附子(炮裂,去皮脐) 巴戟天(去心) 补骨脂(炒)各二两 山茱萸 覆盆子各一两 龙骨(研)半两

【用法】上为末,煮米糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心盐汤送下。

【主治】下元虚冷,小便白淫。

68300 莲实汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】莲实三十枚(炒黄,捶碎) 浮萍一分

【用法】上用水一盞,加生姜少许,煎至五

分,去滓,分三次温服。

【主治】小儿热渴不止。

68301 莲实粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】莲子粥(《饮膳正要》卷二)。

【组成】嫩莲实半两(去皮,细切) 粳米三合

【用法】上先煮莲实令熟,次以粳米作粥候熟,入莲实搅令匀,熟食之。

【功用】健脾和中,益神固精。

①《圣惠》:益耳目聪明,补中强志。②《寿世青编》:健脾胃,止泄痢。③《老老恒言》:养脾益神固精,除百疾。

【备考】本方方名,《老老恒言》引作“莲肉粥”。

68302 莲房汤

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】朴消 荆芥 防风 五倍子 莲房 枳壳 甘草节 地榆

【用法】上锉。煎汤熏洗。

【主治】痔疮。

68303 莲房饮

【方源】《温热经解》。

【组成】莲房炭二枚 阿胶三钱 棉花子炭十四粒

【主治】妇人血崩者。

68304 莲房散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】莲房壳 荆芥 枳壳 槐花 黄柏 防风 独活各等分

【用法】上锉散。每用一两,煎汤熏洗。

【主治】脱肛不上。

68305 莲砂散

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】湖莲肉(去心)四两 缩砂仁(连壳炒,去壳,研)二两

【用法】上为细末。每早服三四匙,用米饮调下。

【功用】保胎。

68306 莲菡饮

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】大葱白(连根)三茎 莲根五钱

【用法】新水一盏煎之,葱烂熟,去葱、莲,入阿胶珠二钱,搅令溶化,空心服。

【主治】老人、虚人大便秘结。

【宜忌】忌和蜜服。

68307 莲蓬散

【方源】方出《妇入良方》卷一引《妇入经验方》,名见《丹溪心法附余》卷二十。

【组成】旧瑞莲蓬(烧作灰)

【用法】每服八字,热酒一杯调服。

【主治】经血不止。

68308 莲藕汁

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】莲藕 生葛根

【用法】各捣汁一钟,和服。

【主治】热毒下血。

68309 莲子房散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】莲子房二两(秋前者) 甘草一分(炙微赤,锉) 人参一两(去芦头) 麦门冬三分(去心) 芦根一两(锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后烦渴不止。

68310 莲子草散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一二一“指齿莲子草散”之异名。见该条。

68311 莲子草膏

【方源】《外台》卷三十二引《崔氏方》。

【异名】莲子膏(《普济方》卷四十八)。

【组成】莲子草汁二升 松叶 青桐白皮各四两 枣根白皮三两 防风 芎藭 白芷 辛夷仁 藁本 沉香 秦艽 商陆根 犀角屑 青竹皮 细辛 杜若 蔓荆子各二两 零陵香 甘松香 白术 天雄 柏白皮 枫香各一两 生地黄汁五升 生麻油四升 猪鬃脂一升 马髻膏一升 熊脂二升 蔓荆子油一升

【用法】上细切，以莲子草汁并生地黄汁浸药再宿；如无莲子草汁，如地黄汁五小升浸药，于微火上纳油脂等和煎九上九下，以白芷色黄育成，布绞去滓。欲涂头，先以好泔沐发后，以敷头发，摩至肌；又洗发，取枣根白皮锉一升，以水三升，煮取一升，去滓，以沐头发，涂膏。验。

【功用】长发令黑。

【主治】头风、白屑。

【备考】方中枣根白皮、青竹皮、蔓荆子，《圣惠》作桑根白皮、青竹茹、牡荆子。本方加升麻一两，名“旱莲膏”（见《圣济总录》）。

68312 莲子草膏

【方源】《近效方》引婆罗门方（见《外台》卷三十一）。

【组成】莲子草汁三升 生巨胜油一升 生乳一升 甘草一大两（末）

【用法】上于锅中煎之，缓火熬令鱼眼沸，数搅之勿住手，看上沫尽，清澄滤，不津埴器中贮之；另用青莲蕊六分，龙脑花三分，郁金香二分，并为末，先煎诸药三分减一，次下汁及油等，膏成。每欲点，即仰卧垂头床下，一孔中各点如小豆，许久乃起，有唾唾却，勿咽之。起讫，即啜少热汤饮，点经一年，白发尽黑，秃处并出。

【功用】生发黑发，坚齿延年。

【主治】一切风，耳聋眼暗。

68313 莲子草膏

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】莲子草汁一斤 熊白脂一合 猪鬃膏一合 生麻油一合 柏树皮（切）三合 韭根（切）三合 瓦上青衣（切）三合

【用法】上件药相和，于铜器中煎三上三下，膏成，去滓，瓷盒中收。每夜用涂，其须发即生。

【功用】令须发重生并黑润。

【主治】须发脱落。

68314 莲花蕊散

【方源】《医学纲目》卷二十七引丹溪方。

【组成】莲花蕊 黑牵牛头末各一两半 当归半两 硃红少许

【用法】上为末。先忌食肉五七日，空心令食肉一顿，取温酒下药三钱。约两时辰，取下脓血或虫是效。

【主治】痔漏二三十年不愈者。

68315 莲子六一汤

【方源】《直指》卷十。

【异名】甘莲散《仙拈集》卷二。

【组成】石莲肉（连心）六两 甘草（炙）一两

【用法】上为末。每服二钱，食后灯心一小撮，煎汤调下。

【主治】心热，小便赤浊。

【备考】本方方名，《医统》引作“莲子六一散”。

68316 莲子六一散

《医统》卷七十二。即《直指》卷十“莲子六一汤”。见该条。

68317 莲子生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎 茯苓各二钱 当归四钱（黄土炒） 炮姜四分 桃仁十粒（去皮尖） 炙草五分 莲肉十枚（去心）（一方无桃仁）

【用法】水煎服。

【主治】产后血块未消，泄泻。

68318 莲子黄连丸

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】黄连五钱（猪胆汁浸一宿，晒干） 胡黄连三钱 瓜蒌根二钱 乌梅（去核）二钱 杏仁（浸去皮，焙）二钱 石莲子二钱

【用法】上为末，用猪胆汁浸糕糊为丸，如麻子大。每服十五丸，煎乌梅、姜蜜汤送下。

【功用】敛阴和脾。

【主治】小儿潮热往来，五心烦热，盗汗骨蒸，喘咳，疳而成癆者。

【方论选录】方中黄连、胡黄连拔骨蒸，瓜蒌根清胸膈之热，乌梅敛真阴，伏虫蠹，杏仁润心肺，以破坚结，石莲子理脾胃，以交

心肾。

68319 莲子清心饮

《医方集解》。即《局方》卷五(宝庆新增方)“清心莲子饮”。见该条。

68320 莲子清心饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】石莲肉 麦冬 黄芩 地骨皮 人参 车前子 甘草 赤芍 黄耆

【主治】白浊。并治带下赤白，五心烦热。

【加减】如发热，加柴胡、薄荷；上盛下虚，加酒炒黄柏、知母。

68321 莲子清心饮

【方源】《王氏医存》。

【组成】莲子 潞党参 生箭耆 麦冬 条芩 骨皮 甘草 大车前子 云苓 远志 石菖蒲各一钱

【用法】水煎服。

【主治】酒后色欲受风所致的赤白浊。

68322 莲心清火汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】玄参 生地各五钱 丹参三钱 山药 芡实各一两 莲子心二钱 麦冬一两 北五味五分 天冬一钱

【用法】水煎服。

【主治】心气素虚，心包之火大动之，梦遗，阳痿不振，易举易泄，日日梦遗，后且不必梦亦遗，面黄体瘦，自汗夜热。

68323 莲枣麦豆汤

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷五。

【组成】莲子七粒 黑枣七个 浮麦一合 马料豆一合

【用法】用水一大碗，煎八分，服三剂愈。

【主治】盗汗。

68324 莲房枳壳汤

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】干莲房 荆芥各一两 枳壳 薄荷 朴消各五钱

【用法】上为粗末。水三碗，煎至二碗半，趁热熏洗。

【主治】痔疮。

莫

68325 莫愁汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍 生地各五钱 当归一两 炒栀子 天花粉 香附各二钱 甘草 苍术 各一钱 炒荆芥三钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人火盛血亏，因怒发热，经来之时，两耳出脓，两太阳作痛，乳房胀闷，寒热往来，小便不利，脐下满筑。

蒺

68326 蒺萝丸

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】蒺萝

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。三岁每服三十丸，青皮汤送下。

【主治】小儿气胀，霍乱呕逆、腹冷、食不下及胁痛。

68327 蒺萝散

【方源】方出《便易经验集》，名见《卫生鸿宝》卷三。

【组成】荞麦面四两 葫芦巴四两(酒浸，晒燥，勿炒) 蒺萝一两(炒，即小茴香)

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心盐汤送下。服至一月，大便必有湿热之物如脓者泄出。

【主治】小肠疝气。

【备考】本方方名，据剂型，当作“蒺萝丸”。

葛

68328 葛苳饮

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【异名】葛苳子粥(《药粥疗法》)。

【组成】葛苳子一合(淘) 糯米 粳米各半合(淘)

【用法】用甘草半两，煎汁一升，研前三味，滤去滓，分作三服。服之立下。

【功用】补脾胃，通乳汁。

【主治】产后乳汁不下。

【方论选录】《药粥疗法》：莪苳微苦，配合甘草以矫味，同米煮粥以增强补脾胃通乳汁之功效。

68329 莪苳酒

《仙拈集》卷四。方出《本草纲目》卷二十七，名见《仙拈集》卷三“莪苳散”之异名。见该条。

68330 莪苳散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】莪苳子一两（黑色者，炒） 乳香半两（研）

【用法】上为细散。每服二钱匕，热酒调下，不拘时候。服讫，向痛处卧。

【主治】腕伤折，疼痛不可忍。

68331 莪苳散

【方源】方出《本草纲目》卷二十七，名见《仙拈集》卷三。

【异名】莪苳酒（《仙拈集》卷四）。

【组成】莪苳子三十枚

【用法】上为细末。酒服。

【功用】《仙拈集》：催乳，接骨。

【主治】①《本草纲目》：乳汁不行。②《仙拈集》：跌打损伤。

68332 莪苳子粥

《药粥疗法》。为《圣济总录》卷一六六“莪苳饮”之异名。见该条。

68333 莪苳熨方

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】莪苳（切）半斤 皂荚（锉碎）三挺 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）一两

【用法】少用水煮令相得，不可太稀，乘热用布三两重裹熨肿处，冷即易，频熨自消。

【主治】阴疽肿缩疼痛。

莪

68334 莪术丸

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【异名】木香莪术丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】莪术（炮，锉） 三棱（炮，锉） 净香附各四两（醇醋浸七日，慢火煮干再焙） 槟榔一两（薄锉） 生牵牛末一两（另研） 青木香（去芦） 谷芽（净洗，焙干） 青皮（去白）各半两 茱澄茄 丁香 南木香各四钱

【用法】上除槟榔、丁香、木香不过火及牵牛末，余七味锉、焙，仍同槟榔、木香为末，临入牵牛末和匀，水煮面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸至五十丸，用淡姜汤送下；温茶、温酒皆好，不拘时候。儿小者，丸如粟米大，粒数、下法如前。

【功用】和脾益胃，消进饮食，宽膈快气，悦色清神。

【主治】小儿宿食。

68335 莪术汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】莪术 三棱 红花 苏木 牛膝

【用法】水煎，空心服。

【主治】因伤食生冷，血滞不行，内有瘀血，经来一半，遍身潮热，头痛口渴，小便作痛。

68336 莪术散

【方源】《得效》卷十五。

【组成】当归（去尾） 川芎 莪术（煨） 甘草 杨芍药 熟地黄（酒蒸、洗） 茴香 白芷

【用法】上为末。每服二钱，盐汤调下。

【功用】《准绳·女科》：抑气养血。

【加减】月经不调，加银器、灯心；安胎，加黄耆、生地黄；补虚调气，加生姜、红枣；遍身虚肿，当归酒调；小便不通，加滑石末；心虚发狂，加朱砂研调；败血冲心，腹痛如刀刺，烧秤锤红，淬酒调，不退，五灵脂酒调；血闭身疼，炒姜酒调；吐酸水，加丁香七粒煎汤；血风上攻，眼目浮肿，加荆芥；小腹痛，加木瓜；浑身浮肿，姜汤或葱汤调；胃恶，加藿香；头面肿，赤豆、荆芥汤调；下血不止，木香汤调；咳嗽，加桑白皮、干柿；

头痛，加川芎、细辛；血风热潮，加生姜、红枣；虚汗，加麻黄根；吐不止，加陈青蒿；血风腰痛，加芸苔子捶碎，女人血结不通，手发挛急不知苦，加荠菜一握，顺流水掷汁；手足痹，樟柳根浸酒调；血海虚冷，加大艾；腹胀不消，加芝麻一合，炒姜酒调；月水不匀，当归浸酒调；女人血气成块筑心，加银子、灯心；血崩赤白带，加真龙骨末、好红酒调；血风中心，狂言乱语，浑身壮热，加桃柳枝七寸；血刺成块不散，加菴藁；女人癖气、膈气，炒茴香酒调；妇人不问虚热伤风，血气潮热，憎寒，一切百病，先以参服，随症汤饮投之，服以它药调理，无不应效。咳嗽，加猪血；心燥，猪肝酒调；催生，加顺流水、滑石、禹余粮、榆白皮、坯子乳香、葵子、酸车草汁煎汤或黄柞叶垂下者；胎衣不下再加莪术、地黄、竹青；行血，加菴藁、生地黄、红花、苏木、陈艾，减杨芍药，加赤芍药梢。

68337 莪术散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】香附三两 当归（酒洗） 莪术（醋煨） 玄胡索 赤芍药 枳壳（麸炒） 熟地黄 青皮（去瓢） 白术（去芦） 黄芩各一两 三棱（醋煨） 小茴香（炒） 砂仁各八钱 干漆（炒尽烟） 红花各五钱 川芎八钱 甘草一钱

【用法】上为细末。每服二钱，空心好米酒调服。

【功用】逐去瘀血。

【主治】妇人三十八九岁，经血断早，瘀血未尽，不时攻痛成疾，经水不行，腹中有块痛，头晕眼花，不思饮食。

68338 莪术脾积丸

《医统》卷六十九。为《直指》卷十五“脾积丸”之异名。见该条。

68339 莪术溃坚汤

【方源】《济阳纲目》卷三十九。

【组成】莪术 红花 升麻 吴茱萸各二分 生甘草 柴胡 泽泻 神曲 青皮 陈

皮各三分 黄芩 厚朴（生用） 黄连 益智仁 草豆蔻仁 半夏 当归各三分

【用法】上锉，如麻豆大。水二大盏，煎至一盏，稍热服。二服之后，中满减半，有积不消，再服半夏厚朴汤。

【主治】中满腹胀，内有积聚，坚硬如石，其形如盘，令人不能坐卧，大小便涩滞，上喘气促，面色萎黄，通身虚肿。

【加减】渴，加葛根四分。

【宜忌】忌酒面。

荷

68340 荷叶丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】荷叶（酒蒸一半、炒炭一半）一百六十两（每荷叶十六两用黄酒八两，蒸炒相同） 藕节三十二两 大小蓟（炒炭）四十八两 知母三十二两 黄芩炭三十二两 生地（煨炭）四十八两 棕榈炭四十八两 梔子（炒焦）三十二两 香墨四两 白茅根（炒炭）四十八两 玄参（去芦）四十八两 白芍三十二两 当归（炒炭）十六两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱。每服二丸，温开水送下，一日二次。

【功用】清热凉血，化瘀止血。

【主治】咳嗽吐血，痰中带血，咯血、衄血、溺血。

68341 荷叶汤

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】荷叶（燥者）一斤

【用法】以水一斗，煮取五升，洗了，以贯众末掺之，干则以油和调涂。

【主治】漆疮。

68342 荷叶汤

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】裹盐荷叶 藤瓢各等分

【用法】上锉。水煎浓汁，洗三五次愈。

【主治】癣疥并白秃疮。

68343 荷叶汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】荷叶蒂汤（《普济方》卷三四八）。

【组成】荷叶蒂七枚 苏枋木（锉碎）三分 牛膝（切、焙，去苗） 芍药 延胡索各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒共一盞，煎至六分，去滓温服。如晕甚不省，宜先用生鸡子清一枚打匀，灌入口即定却服本汤。

【主治】产后血晕闷绝，唇口青色，不省觉者。

68344 荷叶散

【方源】方出《外台》卷三十四引《广济方》，名见《圣惠》卷八十。

【异名】地黄汤（《普济方》卷三四八）。

【组成】荷叶二枚（炙） 蒲黄一两 甘草二两（炙） 白蜜一匙 地黄汁半升

【用法】上切。以水三升，煮取一升，绞去滓，下蒲黄、蜜、地黄汁，暖服。

【主治】产后血晕，心闷不识人，或神言鬼语，气欲绝者。

68345 荷叶散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】荷叶三分 延胡索三分

【用法】上为散。水一大盞，煎至六分，去滓，入地黄汁二合，更煎三二沸，分二次温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：产后七日内，恶血不散，时时冲心，闷绝不识人。②《医略六书》：产后烦心，脉涩数者。

【宜忌】《济阴纲目》：忌肉食一日。

【方论选录】《医略六书》：产后血滞夹热，心包阳气不舒，故不能滋养心主而发烦不安焉。延胡化血滞以通心；生地滋心血以退热，荷叶升阳散瘀以和中也。为散，米饮煎，使血滞化而热自解，则心包之阳气发舒而心气清和，心神得养，何发烦之不痊哉。

68346 荷叶散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】干荷叶二两 鬼箭羽一两 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 蒲黄一两 刘寄奴一两

【用法】上为散。每服三钱，以童子小便一中盞、生姜半分、生地黄一分，拍碎，同煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，腹中疼痛，心神烦闷。

【方论选录】《医略六书》：产后瘀血凝结挟热，而心神烦闷，恶露不行，故胁腹阵痛不已。荷叶升阳散瘀以除胁痛，鬼羽破血辟邪以止腹疼；刘寄奴通经破血，生蒲黄破瘀通经，桃仁泥破血润燥以开瘀结也。为散，大黄以涤之，生姜以温之；童便以降之，使瘀热消化，则结闷自开，而恶露无不下，何胁腹烦痛之不止哉。

【备考】《医略六书》无生地黄，有大黄三分。

68347 荷叶散

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《经验后方》，名见《医方考》卷三。

【组成】荷叶（焙干）

【用法】上为末。每服二钱匕，米汤下。

【主治】吐血、咯血。

【方论选录】《医方考》：荷叶有仰盂之形，得震卦之象；有清香之气，得清和之体，故能和阳定咯而运血。

68348 荷叶散

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】干荷叶（大者）一片 砒霜（研）一分 绿豆半两 甘草一分（炙）

【用法】上为散。每服半钱匕，冷水调下。吐出痰效。

【主治】山岚瘴气，痰滞呕逆，时发寒热。

68349 荷叶散

《普济方》卷四〇三。为《闻人氏痘疹论》卷下“紫背荷叶僵蚕散”之异名。见该条。

68350 荷叶粥

【方源】《饮食治疗指南》。

【组成】荷叶二张

【用法】煎水后和粳米煮粥食。

【功用】升清、消暑、化热、宽中、散瘀。

【主治】①《饮食治疗指南》：暑热、水肿、瘀血症。②《长寿药粥谱》：高血压病，高血脂症，肥胖症，以及夏天感受暑热，头昏脑胀，胸闷烦渴，小便短赤者。

【备考】《长寿药粥谱》本方用法：用荷叶煎汤同粳米二两、沙冰糖少许煮粥食。

68351 荷叶蒂汤

《普济方》卷三四八。为《圣济总录》卷一六〇“荷叶汤”之异名。见该条。

68352 荷叶藁本汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】干荷叶四张 藁本一分

【用法】上锉散。以水二斗，煎成五升，去滓，温暖得所，淋澡。

【主治】脚胫生疮，浸淫腿膝，脓汁淋漓，热痹痛痒。

68353 荷杏石甘汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】苏薄荷一钱 光杏仁三钱 石膏四钱 知母三钱 生甘草六分 细辛三分 鲜竹叶三十片

【主治】伤寒愈后，伏热未尽，复感新邪，邪郁于内，其病复作，烦躁，头痛发热，恶风或恶寒，舌燥口渴，或兼咳嗽。

荃

68354 荃薺金银散

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】黄耆五钱 当归五钱 金银花一两 稀荃草三钱 薺薺五钱 茯苓三钱 肉桂一钱

【用法】水煎，急服之。

【主治】筋疽、癰疽、足疽之阴症黑烂者。

菱

68355 菱苏汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】大胡葱一把 紫苏叶二两 水杨柳三四斤 芫荽一握（如无，以芫荽子亦可）

【用法】以河水一大锅，同煎数沸。先将半锅放于桶内，候适手时，患者浑身洗净，熨其腹，渐加热汤浴透，出汗为度，将厚被盖之即发，发出之秽稀再决生死。

【主治】小儿反关痘。狂言谵语，烦躁不宁，手足抽掣，目割腹胀，隐隐不振，昏睡不省，或视斑点即没，或大小便并口鼻失血者。

莎

68356 莎芎散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】香附 川芎各一两 黄连 山梔各五钱 木香 干生姜各三钱 槟榔 酒黄芩 芒消各二钱

【用法】上为末。每服二钱，用姜汁同滚白汤调，痛时呷下。

【主治】胃脘痛，曾服香燥热药，以致病根深固者。

68357 莎芎散

《医学入门》卷七。为《丹溪心法》卷二“芎附饮”之异名。见该条。

68358 莎根酒

【方源】方出《证类本草》卷九引《本草图经》，名见《本草纲目》卷二十五。

【组成】莎草根二斤

【用法】切，熬令香，以生绢袋贮之，于三大斗无灰清酒中浸之，春三月浸一日即堪服；冬十月后，即七日，近暖处乃佳。每空腹服一盞，日夜服三四次。常令酒气相续，以知为度。

【主治】心中客热，膀胱间连胁下气妨，常日忧愁不乐，兼心忪者。

68359 莎草根丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】莎草根（用猪胆炒令香） 草乌头（用净水浸，一半生，一半炒熟，去皮尖）各

二两 威灵仙(去土) 踯躅花 刘寄奴各一分

【用法】上为末,用乳香、没药各半两研入,醋煮面糊为丸,如梧桐子大,火煨自然铜,细研为衣。每服五丸,渐加至十丸,煨葱酒送下。

【主治】风走注,循入经络疼痛,及腰膝苦痛。

68360 莎草根散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】莎草根(炒去毛) 丁香(炒) 各等分

【用法】上为细散。每服半钱匕,以酒煎三二沸,热服。

【主治】心痛。

68361 莎草根散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】莎草根(去毛)一两 白茯苓(去黑皮)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,陈粟米饮调下,不拘时候。

【主治】消渴累年不愈者。

68362 莎草根散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】莎草根(炒去毛) 甘草(炙、锉)各半两

【用法】上为散。每服一钱匕,水七分,煎至四分去滓,温分二服,早、晚各一次,细细呷之。

【主治】小儿吐乳。

苳

68363 苳蓉丸

【方源】方出《本草图经》引《小品方》(见《证类本草》卷十,名见《圣济总录》卷十五。

【组成】苳蓉三升

【用法】上为末,酒一升,渍数日,出捣之,以向汁和绞去滓,汤上煎令可丸,即丸如小豆大。每服三丸,一日三次。当觉口面急,头

中有虫行,额及手足有赤色处,如此并是愈候;未知再服。

【主治】癫狂。

68364 苳蓉丸

【方源】方出《千金》卷二十一,名见《千金翼》卷十九。

【组成】苳蓉子一升 粘羊肺一具(青羊亦佳)

【用法】上二味,先洗羊肺,汤微漂之,薄切,晒干作末,以三年大酢渍苳蓉子一啐时出,熬令变色,熟捣如泥,和肺末,蜜合捣三千杵作丸,如梧桐子大。每服四丸,食后一食久,以麦门冬饮服,一日三次。以喉中干,口粘浪语为候,数日小便大利佳。

【主治】水气肿,鼓胀,小便不利。

【方论选录】《千金方衍义》:苳蓉走而不守,故须醋制稍留其性,以去痰涎垢腻;用粘羊肺为引,以通气化;服用麦门冬饮,以通肺之津液也。

68365 苳蓉丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】苳蓉子二两(水淘去浮者,煮令芽出,晒干,炒令黑黄色) 干姜二两(炮裂,锉) 白矾二两(烧令汁尽)

【用法】上为末,以醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,一日三次。

【主治】久痢,肠滑不止,下肠垢,羸困。

68366 苳蓉丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】苳蓉子一斤(水淘去浮者,水煮令芽出,晒干,炒令黄黑色,细碎研) 醋二升 青州枣一升(煮,去皮核)

【用法】上以醋煮二味为膏,候可丸即丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以粥饮送下。

【主治】痢疾时久不愈,变种种痢,兼脱肛。

68367 苳蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】苳蓉子一两(醋浸一宿,炒黑色) 木香 胡黄连 芦荟(研)各一钱 诃黎勒

皮二枚，肉豆蔻（大者）一枚（去壳）

【用法】上为末，用烧粟米饭为丸，如黄米大。每服五丸至十丸，空心米饮送下。

【主治】小儿疳痢，面黄体瘦，盗汗壮热，心腹虚胀，皮毛焦枯。

68368 苘蓉酒

【方源】方出《史记》卷一〇五，名见《医方考》卷六。

【组成】苘蓉一撮

【用法】上以酒饮之。

【主治】怀子而不乳。

【方论选录】《医方考》：乳、产也，怀子而不乳者，气血凝滞，宜产而不产也。苘蓉能行痹气，酒性能行滞血，故主之而旋乳。

【临证举例】难产 菑川王美人，怀子而不乳，来召臣意，臣意往，饮以苘蓉药一撮，以酒饮之，旋乳。臣意复诊其脉，面脉躁，躁者有余病，即饮以消石一剂，出血，血如豆比五六枚。

68369 苘蓉散

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】苘蓉子（炒黄）半两 鳖头二枚（烧灰） 铁精半两（研）

【用法】上为末。每服二钱匕，空心米饮调下，日晚再服；仍将药末少许裹肛上，炙故麻履底按入，即不出。

【主治】痢后脱肛。

68370 苘蓉煎

【方源】《证类本草》卷十引《饌中方》。

【组成】苘蓉实一升（晒干，捣筛） 生姜半斤（取汁）

【用法】二物相合，于银锅中更以无灰酒二升投之，上火煎如稠饧，即旋投酒，度用酒可及五升即止，慢火煎令可丸，即丸如梧桐子大，若丸时粘手，则以菟丝粉衬隔之，火候忌紧，药焦则失力也。每旦服三丸，酒饮送下，增至五、七丸止。初服微热勿怪；疾甚者，服过三日当下利，疾去利亦止。

【主治】肠风下血。

68371 苘蓉膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】苘蓉二合 白薇（末） 芎藭（末） 丁香（末） 沉香（末） 乳香（末） 木香（末） 鸡舌香（末）各一两 黄丹七两 麻油一升半

【用法】上药唯苘蓉子别捣，绵裹入油铛中煎，候色焦黑，滤出，次下白薇、黄丹等，先用柳木篦不住手搅，候稀稠得所，即膏成，贮于瓷盒中。以故帛上摊贴，每日换二次。

【主治】一切恶毒疮肿。

68372 苘蓉膏

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】苘蓉子一分（生用） 葶苈子一分（生用） 硫黄一分（细研） 雄黄一分（细研） 白矾灰一分 熊胆一分（细研） 芦荟一分（细研） 蚺蛇胆一分（研入） 麝香一分（细研）

【用法】上为末，取腊月猪油二两，入子桃子内，以慢火上熔化，然后下诸药末相和，搅匀为膏。每用约杏仁大，以绵裹，火炙烙齿龈及疮上。

【主治】小儿疳蟹，口齿疮。

68373 苘蓉子丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】苘蓉子一两半（水淘去浮者，水煮芽出，焙干，炒令黄黑色，别杵为末） 蛇床子一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别杵为末） 附子一两（炮裂，去皮脐） 蜀茶半两 硃砂半两（细研） 黄（雄）雀粪一两

【用法】上为末，先取苘蓉子、雄雀粪、硃砂三味，用白蜜四两，同以浆水三升煮，勿住手搅，煎如饧，即入诸药末为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心及晚食前盐汤送下。

【主治】肾脏虚损，阳气萎弱，手足不和。

68374 苘蓉子丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】苘蓉子（水浸，石灰清汁煮一复时，

掬出芽，晒干，炒） 附子（炮裂，去脐皮） 干姜（炮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桂（去粗皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各半两

【用法】上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，加至三十丸。如觉发热，以绿豆汁解之。

【主治】一切冷气，积年气痢。

68375 苘若子散

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】猪卵一具（阴干百日） 苘若子三升 牛黄八分（研） 鲤鱼胆五分 桂心十分（研）

【用法】上切，以清酒一升渍苘若子，晒令干，尽酒止，乃捣合下筛。每服五分匕，酒送下，一日二次。当如醉，不知稍增，以知为度。

【主治】五癰，反侧羊鸣，目翻吐沫，不知痛处。

【宜忌】忌生葱等。

68376 苘若子散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】苘若子一分（水淘去浮者，微炒） 细辛 鲫鱼（烧灰） 黄连各一分 人粪灰一两 干蛤蟆半两（烧灰） 石胆半两（细研） 甘草半两 麝香半分（细研）

【用法】上为散。每取少许，以绵裹纳蛀孔中，一日换三次，即愈。

【主治】齿齬作孔，有虫疼痛。

68377 苘若子散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】苘若子（新者） 木香 雄黄（无石者，研）各半两

【用法】先捣前二味为细散，与雄黄同研，令匀，用青纸一张，先以羊脂涂，次以散药再渗脂上，卷裹之。早晨空腹，烧令烟出，吸十咽，每日三次。

【主治】三十年呬嗽。

68378 苘若浸方

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】苘若根

【用法】上煮水浸之，冷即易。

【主治】恶刺。

莼

68379 莼菜羹

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】莼菜 鲫鱼（纸裹，炮令熟，研）各四两

【用法】加橘皮、生姜、葱白煮羹。空腹食之。

【主治】脾胃气弱，不下饮食，四肢无力，日渐羸瘦。

【备考】本方方名，《普济方》引作“鲫鱼羹”。

68380 莼羹方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】莼菜 鲫鱼（纸裹烧熟，去鳞，切）各四两 陈橘皮（汤浸，去白、切） 生姜（切）各一两 葱白十四茎（擘破） 羊骨一斤（熬汁去骨）

【用法】将前五味就羊骨汁中作羹。空腹食。

【主治】脾胃气弱，不下食，四肢无力，渐羸瘦。

莹

68381 莹玉膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】猪脂油三两（入） 白蜡一两（熔化，离火入） 樟冰一两 轻粉五钱 冰片三分 麝香二分

【用法】上为末，加入和匀，收用。

【功用】消瘀定痛。

【主治】杖疮，疔疮。

【加减】疮黑者，加银珠五钱。

【备考】《家庭治病新书》无麝香，有龙骨。

68382 莹肌丸

【方源】《医方类聚》卷一九二引《吴氏集验方》。

【组成】乌梢蛇一条（剑脊者，须头尾全，锉二寸段，酒浸一伏时，去皮骨，用肉，烘干细切）川乌头一只（重一两者，不去皮尖，作骰子块，以盐炒川乌黄色为度，去盐，只用川乌）荆芥穗半两（焙干，切）赤土二钱半

【用法】上为末，用浸蛇酒打糊为丸，如梧桐子大。空心温酒送下，茶清亦得，一日三次。月日之后，肌肤莹然。

【主治】顽疮。

68383 莹肌散

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】赤芍药 防风 苦参 薄荷 甘草（身） 刘寄奴 黄柏各等分

【用法】上煎汤，洗去患处宿脓后，以前三黄真珠散末掺疮上，三二次，即成痂而愈。

【主治】小儿瘰疮。

68384 莹肌膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】乳香二钱（研） 沥青二两

【用法】上用慢火同化开，入小油一处，煎沸硬软得所。临卧涂患处，明旦用温淡浆水洗去，以膏贴之。次日随膏药茸毛自退，莹净不复长。

【主治】毛发乱长茸散，频剃复生不尽者。

68385 莹泉散

【方源】《续易简》卷三。

【组成】川厚朴一两（去皮，生用） 白茯苓一钱

【用法】上锉散，作一服。用酒二碗，如不能饮，入水酒各一碗，慢火煎至一小碗，分为二服，去滓，食前温服。

【主治】心脾不调，肾气独盛，便溺白浊。

68386 莹珠膏

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】猪脂油十两 白蜡三两（熔化离火，候温，入轻粉、樟冰各一两五钱）

【用法】上为末，搅匀，俟稍凝，再入冰片末一钱，搅匀成膏，罐收听用。先用甘草、苦参各三钱，水煎洗净，贴膏。杖疮用荆川纸摊极薄贴之，热则易之，其疗瘕即散，疼痛立止。

【功用】去腐、定痛、生肌。

【主治】溃疡，并梅疮、杖疮、疔疮，下疳。

【加减】杨梅疮，加红粉三钱；顽疮、乳癌，加银珠一两；疔疮，加水龙骨三钱，或龙骨四钱。

68387 莹肌如玉散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】白丁香 白及 白牵牛 白薇各一两 白芷七钱 当归梢 白蒺藜 升麻各五钱 白茯苓 楮实子各三钱 麻黄（去节）二钱 白附子 连翘各一钱五分 小椒一钱

【用法】上为细末。用之如常。

【功用】去垢腻，润泽肌肤。

【主治】面有黥点或疮，痤疮，及粉刺，皮肤燥痒。

68388 莹肌如玉散

【方源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】楮实五两 白及（肥者）一两 升麻（内白者）半斤 甘松七钱 白丁香 连皮砂仁各半两 糯米一升二合（末） 三赖子三钱 绿豆五两（另用绢罗子罗，一本用一升） 皂角三斤（水湿烧干，再入水中再烧干，去弦皮子，可得二斤半，为末，另用纱罗子罗）

【用法】上为末，入糯米、绿豆、皂角末，一处搅匀。

【功用】去垢腻，润泽肌肤。

【主治】①《卫生宝鉴》：黥点粉刺。②《济阳纲目》：皮肤搔痒。

盐

68389 盐曲

【方源】《千金翼》卷二十一。

【组成】曲末五升 盐末一升五合

【用法】上熟捣，分作五袋，旦取二袋炒令热，以薄袋各受一升，纳药于中，更递盛之。于室内卧，以脚踏袋，以被覆之取汗，其药冷，即易，初一日一夜，限以十度炒之，于后连日连夜数炒频蹑，不得暂停，其药既易，多无力，即弃之，别取新者。唯候遍体汗尽，其病方愈，特须细心，多日久候汗尽乃止，未尽时间数有闷乱，唯食香浆粥饭。风汗并尽，然后乃补之。

【主治】一切风冷气。

【宜忌】忌生冷；三部脉微弱者勿用之。

68390 盐汤

【方源】方出《金匱》卷下，名见《三因》卷十一。

【异名】独圣散（《得效》卷六）、盐水饮（《玉案》卷四）。

【组成】盐一升 水三升

【用法】上二味，煮令盐消，分三次服。当吐出食便愈。

【主治】宿食停滞不消，心腹胀痛，吐泻不得。

①《金匱》：贪食，食多不消，心腹坚满痛。②《千金》：霍乱蛊毒，宿食不消，积冷，心腹烦满，鬼气。③《普济方》：病涉三因，或脏虚，或肠胃素实，忽然心腹胀满，疔刺疼痛，蛊毒烦惋，欲吐不吐，欲痢不痢，状若神灵所附，顷刻之间，便至闷绝。

68391 盐水饮

《玉案》卷四。为方出《金匱》卷下，名见《三因》卷十一“盐汤”之异名。见该条。

68392 盐水锭

《良朋汇集》卷三。为原书同卷“观音救苦锭”之异名。见该条。

68393 盐术散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】苍术四两（日换米泔，浸七日，刮去皮，细切，入青盐一两，同炒黄，去盐不用） 木贼（去节，童尿浸一宿，晒）二两

【用法】上为末。每服一钱，温米泔调下，或掺入饮食中任服。

【主治】目内外障。

68394 盐花丸

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】甜葶苈一两（长流水洗净，微火熬，捣令细） 山杏仁半两（汤浸，去皮） 盐花二钱

【用法】上为细末，更入腊月猪脂一钱，和捣如泥，看硬软得所，丸如枣核大。每用一丸，绵裹，纳耳中，二日一换。初安药三二日，耳痛，出恶水，四体不安，勿惧之。

【主治】两耳肿痛，或耳中常有哄哄者。

68395 盐花散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【异名】盐矾散、玉珍散（《普济方》卷六十引《经验良方》）。

【组成】盐花 白矾（烧令汁尽）各一两

【用法】上为细末。以箸头点在痈上。

【主治】喉痛，及悬痈。

68396 盐矾散

《普济方》卷六十引《经验良方》。为《圣济总录》卷一二三“盐花散”之异名。见该条。

68397 盐拓方

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】盐三合

【用法】以水五升，煎取三升，浸青布拓转筋上。

【主治】霍乱转筋入腹。

68398 盐津丸

【方源】《三因》卷八。

【组成】独头蒜不拘多少（每个开七窍，入去皮江子七粒，湿纸裹煨，研为膏） 丁香 橘红 木香 荜茇 胡椒各等分

【用法】上为末，用蒜膏为丸，如梧桐子大。先嚼盐少许，令生津液，干咽二丸，渐加至三五丸，临卧服。

【主治】五疳八痞。

68399 盐姜汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】盐一两 生姜（切）五钱

【用法】上同炒色变，以童溺二盏，煎一盏，温服。

【主治】干霍乱，欲吐不吐，欲泻不泻，垂毙者。

68400 盐脂汤

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】猪脂 盐

【用法】猪脂和盐煮令消，热纳指中一食久，住。

【主治】指痛欲脱。

68401 盐烧酒

【方源】《仙拈集》卷二引程氏方。

【组成】烧酒一杯 食盐一钱

【用法】水内顿滚，热含一口，即浸痛处；待温漱口，又含一口，浸漱如前。酒尽愈。

【主治】牙痛。

68402 盐梅丸

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】古文铜钱十数枚 白梅十个（盐淹过宿即烂）

【用法】每服一丸，如绿豆大，清晨取流水吞下，即吐出。

【主治】误吞铁钱，及骨鲠之类。

68403 盐梅汤

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】乌梅十四枚 钱四十文 盐三撮 苦酒一升

【用法】于铜器内总渍九日，洗之。

【主治】阴囊下湿痒皮剥。

68404 盐梅散

《疡科选粹》卷三。为《医统》卷六十三引丹溪方“盐白梅散”之异名。见该条。

68405 盐豉丸

【方源】《活幼口议》卷十九。

【组成】咸豉七粒（口内含，去皮） 腻粉一钱匕

【用法】上研，为丸如麻子大。每服三丸至

五丸，藿香汤送下；乳头吻亦得。

【主治】幼儿吮乳不止。

68406 盐豉饮

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】盐豉

【用法】浓煎盐豉汁，停冷，渴即饮之。

【主治】消渴。

68407 盐黄散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】盐二黄米大 牛黄二粟米大（研） 人参 白茯苓各一小豆大 甘草二小豆大（炙）

【用法】上先捣研四味为末，以乳汁半合，煎三五沸，入牛黄末搅匀。分减服之。

【主治】小儿初生，吐不止。

68408 盐黄散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】蓬莪术少许 盐二黄米大

【用法】上以奶汁一合，煎三五沸，去滓，即加牛黄末二粟米大。分减服之。

【主治】初生儿，不饮乳，吐不止，目呆面青，不得啼哭。

68409 盐绿散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】盐绿 麝香（细研） 黄连（去须）各一分 石胆一钱

【用法】上药同于乳钵内细研为散。每用一字，掺于湿纸片子上贴之，日二三度，不过十日即愈；忽患口疮者，绵裹半钱含之。

【主治】齿漏疳，虫蚀齿疼痛，出脓水不绝。或疳齿虫蚀不觉，片片自落，齿痒痛。

68410 盐滚丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】丁香 木香 肉豆蔻 缩砂 青皮 陈皮 胡椒 草拨 沉香各半两

【用法】上为末，以大蒜瓣子不拘多少，每瓣作二片，入去壳巴豆一粒，用饼药调面裹蒜片，慢火煨熟，去巴豆及面，只将蒜研成膏，将前项药末一半搜和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐内滚过，萝卜汤调前药末二

钱吞下。

【主治】翻胃膈气。

68411 盐煎散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】川乌头四两（去皮，生用） 益智子（去皮）三两 青橘皮二两 白姜一两半（炮） 舶上茴香一两

【用法】上为散，每服一大钱，入盐煎五分，热呷。

【主治】小肠虚冷，小腹疼痛不可忍。

68412 盐煎散

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】乌头（水浸三日，炮裂，去皮脐） 茴香子（炒） 附子（水浸三日，炮裂，去皮脐） 各一两 楝实七枚（炮） 青橘皮（汤浸，去白，焙）二两 干姜（炮）一分 木香 硃砂（去砂石）各一钱 萆澄茄半两

【用法】上为散。每服一钱七，水八分，入盐煎至四分，空心、食前和滓温服。

【主治】脾脏冷气攻脏腑不调，心腹撮痛，及下元久冷。

68413 盐煎散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】川楝子（麸炒，去核） 青橘皮（去白） 草乌头（炮，去皮脐）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，入盐少许，煎至六分，食前温服。

【主治】冷气攻冲，心腹撮痛。

68414 盐煎散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】草果仁（去皮，煨） 缩砂（去壳，取仁） 槟榔（炮，锉） 厚朴（去粗皮） 肉豆蔻（煨） 羌活（去芦） 苍术（米泔浸二宿） 陈皮（去白） 萆澄茄 枳壳（去瓤，麸炒） 良姜（油炒） 茯苓（去皮） 大麦芽（炒） 茴香（炒） 川芎（洗，锉） 甘草（燼）各二两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞半，入盐一字，同煎至八分，空心、食前服之。

【主治】男子、妇人一切冷气，攻冲胸胁，及前后心连背臀疼痛，转项拘急；或脾胃虚冷，不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷疼，泄泻不止，及膀胱成阵刺痛，小肠气吊，内外肾疼；又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛。

68415 盐煎散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】益智仁 白芷 白干姜（炮） 茴香（炒） 甘草（炙） 天台乌药（去心） 香附（净）各一两 槟榔 麻黄（去节） 川芎 枳壳（制）各半两 青皮一两半

【用法】上为末。每服二钱，盐少许，水煎，食前服。

【主治】小肠气吊，腹中成阵刺痛，兼治风证。

68416 盐煎散

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】良姜（炒） 苍术（去皮）各十二两 缩砂（去皮） 茴香（炒）各五两 肉桂（去粗皮，不见火） 丁皮各二两 橘红十两 甘草（炒）六两 青皮（去白）四两 山药半斤

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞半，入盐一字，煎至八分，空心食前服。

【主治】男子、妇人一切冷气，攻冲胸胁，及前后心连背臀疼痛，转项拘急；或脾胃虚冷，不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷疼，泄泻不止，及膀胱成阵刺痛，小肠气吊，内外肾疼；又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛。

68417 盐煎散

【方源】《医方类聚》卷九十引《经验良方》。

【组成】青皮（去白） 肉桂（去皮） 干姜（炮）各一钱半 茴香（炒） 南木香 益智仁 川乌（炮）各半钱 甘草（炙）少许

【用法】上咬咀。每服四钱，水一大盞，盐一捻，煎七分，空心服。

【主治】小肠久积寒气筑痛。

68418 盐煎散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归 川芎 芍药 三棱 莪术 青皮 枳壳 茯苓 厚朴 神曲 麦芽 小茴 木香各等分

【用法】每服四钱，葱白一根，食盐少许，水煎服。

【主治】男妇形寒饮冷，胸胁心腹疼痛，及膀胱小肠气痛。

【加减】冷痛，加官桂。

68419 盐煎散

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】槟榔一两半 厚朴一两半（制） 草果一两（炒） 良姜一两 澄茄一两 甘草五钱 青皮一两半 陈皮一两半 葛根一两半

【用法】上为散。每服三钱，入盐少许，煎服。

【功用】温中破滞。

【主治】冷气攻冲，胸腹刺痛，脉沉者。

【方论选录】《医略六书》：澄茄温中散冷，良姜暖胃驱寒，槟榔破滞气，厚朴除腹满，草果散寒消滞，甘草和胃缓中，青皮破气平肝，陈皮利气调胃，葛根升阳开胃，入盐润下以降逆也。俾逆气平而肝胃调，则清气升而浊气降，其胸腹冷气无不散，攻冲胸腹无不平，何刺痛之不瘳哉。此温中破滞之剂，为冷冲胸腹刺痛之专方。

68420 盐精丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】补骨脂八两 金铃六两 山茱萸 木香各一两 附子 茴香各一两 海蛤一分 青盐三两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心酒送下。

【主治】膀胱小肠气痛。

68421 盐蜜煎

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】盐（捣末）半两 蜜二合 皂荚

（捣末）一分

【用法】先将盐入桃子内，次下蜜、皂荚末，慢火煎可丸，候冷，丸如枣核大，以膩粉滚为衣。纳下部中，良久大便通利。

【主治】脾黄。胀满，气冲胸膈，大肠不通。

68422 盐醋煎

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】盐一撮 醋一盂

【用法】同煎至八分，温服。

【主治】吐泻转筋，头眩肢冷，须臾不救者。

68423 盐熨方

【方源】《直指》卷十三。

【组成】炒盐二碗

【用法】纸包纱护，顿其胸前并腹肚上，以熨斗、火熨，气透则苏，续又以炒盐熨其背。

【主治】霍乱吐泻，心腹作痛。

68424 盐白梅散

【方源】《医统》卷六十三引丹溪方。

【异名】盐梅散（《疡科选粹》卷三）。

【组成】盐白梅（烧存性） 明矾（枯） 黄丹（炒）各一钱 人中白（煨）五分 麝香少许（另研）

【用法】上为细末。干掺。

【主治】口疮。

【加减】甚者，加硼砂五分，冰片一分。

68425 盐韭敷方

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】韭 盐各等分

【用法】上并捣。置疮上，以火炙药上，热彻即愈。

【主治】金疮因风水肿。

68426 盐豉熨方

《圣惠》卷八十二。为《外台》卷三十六引《古今录验》“暖盐豉熨方”之异名。见该条。

膏

68427 耆归汤

《周慎斋遗书》卷五。为《内外伤辨》卷中“当归补血汤”之异名。见该条。

68428 耆归汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】黄耆一两（蜜水涂，炙） 当归（酒洗，焙干） 白芍药 川芎各半两 甘草三钱（炙）

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盏，煎七分，温服，不拘时候。

【主治】小儿禀赋素弱，痘疮出不快者；及肝虚目视不明。

68429 香丝丸

《普济方》卷二一七。即《三因》卷十三“宣和赐香丝丸”。见该条。

68430 香老丹

《经验秘方》引《疮科经义》（见《医方类聚》卷一九一）。为《外科精义》卷下“化毒丹”之异名。见该条。

68431 香老丹

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】白浮石半两 没药二钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六丸，冷酒送下。

【主治】一切疔疮、发背、恶疮。

68432 香豆汤

【方源】《仙拈集》卷二引《集验》。

【组成】黄耆 黑豆各等分

【用法】煎汤饮之。半月全愈。

【主治】诸汗。

68433 香陈汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄耆 赤芍 茵陈各一钱 石膏二钱 麦门冬 豆豉各五分

【用法】姜煎，温服。

【主治】黄汗。

【备考】《杂病源流犀烛》有甘草。

68434 香附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】附子二钱（炮、去皮脐） 黄耆一钱（盐水或蜜拌，炙）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一枚，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】阳虚盗汗、自汗。

①《魏氏家藏方》：盗汗。②《医方类聚》引《济生续方》：气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。③《济阳纲目》：阳气虚脱，恶寒自汗，或口噤痰涌，四肢逆冷，或吐泻腹痛，饮食不入，及一切虚寒等证。

68435 香附汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】黄耆 附子 当归 防风 全蝎

【用法】水煎服。

【主治】痘后发痼，手足难动，出汗。

68436 香附汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参 茯神各三钱 白术 黄耆各五钱 附子二分

【用法】水煎服。

【功用】补气消痰。

【主治】气虚不能化痰，痰聚于胸中，气不能通于手足，而觉手足麻木，无口眼喎斜。

68437 香味丸

【方源】《普济方》卷三二三引《兰室秘藏》。

【组成】黄耆四两（盐水浸，火炙） 北五味二两

【用法】上为末，米糊为丸，空心盐酒送下。

【功用】补虚败。

【主治】《准绳·女科》：妇人虚劳。

68438 香桂酒

《玉案》卷三。为《金匱》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

68439 香婆丸

《千金》卷十二。为原书同卷“香婆万病丸”之异名。见该条。

68440 香婆丸

《医心方》卷十四。为原书同卷引《深师方》“西王母玉壶赤丸”之异名。见该条。

68441 香婆汤

【方源】《千金翼》卷十二。

【异名】酥蜜汤。

【组成】酥一斤（炼） 生姜一合（切） 薤白三握（炙黄） 酒二升 白蜜一斤（炼） 油

一升 椒一合(炒去汗) 胡麻仁一升 橙叶一握(炙令黄) 豉一斤 糖一升

【用法】上先以酒渍豉一宿，去滓，纳糖、蜜、油、酥于铜器中煮令匀沸，次纳薤、姜、煮令熟，次下椒、橙叶、胡麻，煮沸，下二升豉汁，又煮一沸，出，纳瓷器中密封。每服一合，空腹吞，如人行十里，更一股，冷者加椒。

【主治】大虚冷风，羸弱无颜色。

【备考】冷者，加椒。

68442 香婆汤

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】麻油一升 牛酥一斤 葱白一握 胡麻仁一升(研) 豉二升(以水二升渍，取汁) 蜜一升 上酒二升

【用法】上先于锅中入油煎令沸，著葱白令色黄，下酥、蜜、豉汁、麻仁，沸，下酒成煎，收不津器中盛之。日服一二匙，或和酒服亦妙，冷即加生姜一斤取汁，干姜末亦可用之。

【功用】补髓令人健。

【主治】风劳虚损。

68443 香术防桂汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术四两 黄耆二两 防己一钱 肉桂一钱

【用法】水煎服。十剂轻，二十剂愈。

【主治】大病之后，湿气入于肾官，误服补肾之药，腰痛如折，久而成为伛偻者。

68444 香术两活汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】人参 肉桂各三钱 白术 黄耆各一两 茯苓五钱 甘草一钱 羌活 独活各五分

【用法】水煎服。四剂愈。

【主治】风湿入于骨髓，一身上下由背而至腰膝两胫无不作痛，饮食知味，然不能起床，即起床席，而痛不可耐，仍复睡卧，必须捶敲按摩，否则其痛走来走去，在骨节空隙之

处作楚而不可忍。

68445 香术调经散

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参 三七根末各三钱 白术 当归 黄耆各一两 生地五钱

【用法】水煎调服。一剂即止，四剂愈。

【主治】妇人肝不藏血，脾不统血，至五十之外，或六七十岁者，忽然行经，或如紫血之块，或如红血之淋，乃血崩之渐。

68446 香归敛血汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】黄耆 玄参各一两 当归五钱 麦冬一两 北五味一钱 苏子二钱 三七根末三钱

【用法】水煎，调三七根末服。一剂即止血。

【主治】肺肾两经之亏，火乘隙而外越，皮毛中出血，或标出如一线，或渗出如一丝，或出于头上，或出于身中，或出于两胫之间。

68447 香芍桂酒汤

《金匱》卷中。《金匱》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”之异名。见该条。

68448 香参五味汤

【方源】《普济方》卷一八〇引《如宜方》。

【组成】人参 五味子 粉草(炙) 麦冬 黄耆各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，用水一盏半，煎至一盏，入朱砂少许，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴后，虚热留滞，结成痼疽。

68449 香婆万病丸

【方源】《千金》卷十二。

【异名】万病丸、牛黄丸、香婆丸。

【组成】牛黄 麝香 犀角(一方云一铢)各一分 朱砂 雄黄 黄连 禹余粮 大戟 芫花 芫青六枚 人参 石蜥蜴一寸 茯苓 干姜 桂心 当归 芍药 芍药 甘遂 黄芩 桑白皮 蜀椒 细辛 桔梗 巴豆 前胡 紫菀 蒲黄 葶苈 防风各一分 蜈蚣三节

【用法】牛黄、麝香、犀角、朱砂、雄黄、

禹余粮、巴豆别研，余者合捣，重绢下之，以白蜜和，更捣三千杵，为丸，如梧桐子大，密封之。每服三丸，破、除日平旦空腹酒送下。取微下三升恶水为良。若卒暴病，不要待平旦，无问早、晚即服，以吐利为度；若不吐利，更加一丸至三五丸，须吐利为度，不得限以丸数，病强药少即不吐利，更非他故；若其发迟，以热饮汁投之，若吐利不止，即以醋饭二三口止之。一日服，二日补之，得食新米，韭骨汁作羹粥臠饮食之，三四顿大良，亦不得全饱。吐利以后，常须闭口少语，于无风处温床暖室将息。若旅行卒暴，无饮，以小便送之佳；若一岁以下小儿有疾者，令乳母服二小豆，亦以吐利为度；近病及卒病皆用，多积久病即少服，常取微溏为度。卒病欲死，服三丸如小豆，取吐利即愈；卒得中恶口噤，服二丸如小豆，暖水一合灌口，令下微利即愈；五疰鬼刺客忤，服二丸如小豆，不愈，后日更服三丸；男女邪病，歌哭无时，腹大如妊娠，服二丸如小豆，日二夜一，间食服之；猫鬼病，服三丸如小豆，未愈更服；蛊毒、吐血、腹痛如刺，服二丸如小豆，不愈更服；疰病未发前，服一丸如小豆，不愈，后日更服；诸有痰饮者，服三丸如小豆；冷癖，服三丸如小豆，一日三次，皆间食，常令微溏利；宿食不消，服二丸如小豆，取利；癥瘕积聚，服二丸如小豆，日服三次，皆间食，以利愈止；拘急、心腹胀满、心痛，服三丸如小豆，不愈更服；上气喘逆，胸满不得卧，服二丸如小豆，不愈更服；大痢，服一丸如小豆，一日三次；痞湿，以一丸如杏仁，和酢二合灌下部，亦服二丸如小豆；水病，服三丸如小豆，一日二次，皆间食服之，愈止，人弱隔日服；头痛恶寒，服二丸如小豆，覆取汗；伤寒时行，服二丸如小豆，一日三次，间食服之；小便不通，服二丸如小豆，不愈，明日更服；大便不通，服三丸如小豆，又纳一丸下部中，即通；耳聋、聃耳，以绵裹一丸如小枣核，塞之愈；鼻衄，服二

丸如小豆即愈；痈肿、疔肿、破肿，纳一丸如麻子，日一敷，其根自出愈；犯疔肿血出，猪脂和敷有孔内孔中，愈止；胸背腰肋肿，以酢和敷肿上，日一易，又服二丸如小豆；癰疮，以酢泔洗之，取药和猪脂敷之；痿疮有孔，以一丸如小豆纳孔中，且和猪脂敷之；痔疮，涂绵箸上，纳孔中，日别易，愈止；瘰病，以酢和敷上愈；诸冷疮积年不愈者，以酢和涂其上，亦饼贴，愈；癰疮，以布揩令汁出，以酢和敷上，日别一易，立愈；恶刺，以一丸纳疮孔中，即愈；蝮蛇螫，取少许纳螫处，若毒入腹，心闷欲绝者，服三丸如小豆；蝎螫，以少许敷螫处；蜂螫，以少许敷螫处；妇人诸疾。胞衣不下，服二丸如小豆，取吐利即出；小儿客忤，服二丸如米，和乳汁敷乳头，令啮之；小儿惊痫，服二丸如米，涂乳头，令啮之，看儿大小量之；小儿乳不消，心腹胀满，服二丸如米，涂乳头，令啮之，不愈更服。

【主治】七种癖块，五种癰病，十种疰忤，七种飞尸，十二种蛊毒，五种黄病，十二时疟疾，十种水病，八种大风，十二种瘰癧；并风入头，眼暗漠漠；及上气咳嗽，喉中如水鸡声，不得眠卧；饮食不作肌肤，五脏滞气，积聚不消，壅闭不通，心腹胀满及连胸背，鼓气坚结，流入四肢，或复心膈气满，时定时发，十年二十年不愈；五种下痢，疰虫、寸白诸虫；上下冷热，久积痰饮，令人多睡，消瘦无力，荫入骨髓，便成患滞，身体气肿，饮食呕逆，腰脚酸疼，四肢沉重，不能久行立；妇人因产，冷入子脏，脏中不净，或闭塞不通，胞中瘀血冷滞，出流不尽，时时疼痛为患，或因此断产；并小儿赤白下痢；及狐臭、耳聋鼻塞等病。

【方论选录】《千金方衍义》：方中牛黄、麝脐开关利窍；犀角、黄连消瘀散热，朱砂、雄黄镇惊豁痰，蜈蚣、蜥蜴、芫青攻毒祛风，巴豆、芫花、甘遂、大戟、葶苈破积利水，干姜、桂心、蜀椒、细辛开痹逐湿，芎藭、当归、芍药、蒲黄、

紫菀和血通经,桑皮、前胡、防风、黄芩、茯苓、桔梗透表达气,人参助诸药力,禹余粮固诸药性,共襄搜根剔弊之功。凡系实证,便可谅用,不必拘以方例等治也。予尝用治十年二十年痼疾,如伏痰悬饮,当背恶寒,无不神应;肢体沉重,腰脚酸痛,服之即捷;而坚积痞块,虽未全瘳,势亦大减,惜乎世罕知用耳。

【宜忌】忌陈臭,生冷,酢、滑、粘食,大蒜,猪、鱼、鸡、狗、马、驴肉,白酒,行房,七日外始得。产妇勿服之。

【备考】方中朱砂、雄黄、黄连、禹余粮、大戟、芫花、人参用量原缺。

68450 香芍桂苦酒汤

《准绳·类方》卷五。即《金匱》卷中“黄耆芍药桂枝苦酒汤”。见该条。

晋

68451 晋凡散

《普济方》卷六十六。为原书同卷引《海上方》“赴筵散”之异名。见该条。

68452 晋福散

【方源】《寿世保元》卷十。

【组成】晋矾 福建茶各一两

【用法】上为末。每服三钱,新汲水调下,即吐出也。未吐,再服必吐。

【主治】蛊毒。

恶

68453 恶阻汤

【方源】《方氏脉症正宗》卷一。

【组成】当归一钱 白术一钱 贝母一钱 陈皮八分 砂仁五分 梔子八分 香附一钱 藿香八分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠恶阻。

68454 恶实丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】恶实(微炒)一两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,米饮送下,勿嚼破。

【主治】水蛊,身体洪肿。

68455 恶实丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】恶实四两(炒) 麝香半两 牵牛子一两半(一半生,一半炒) 漏芦(去芦头,锉)二两 大黄(煨) 薄荷叶各二两

【用法】上为末。用羊胫骨髓打破,煎浓汁,面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,日午、临卧嚼,以薄荷汤送下。

【主治】诸种瘰癧,不限年久日近,或已破,或未破,及诸痛肿疮疖。

68456 恶实丸

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】恶实(炒)二两 山梔子(去皮)五两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后良久以熟水送下,日再夜一。

【主治】热毒肿。

68457 恶实酒

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】恶实根(细切)半斤 枳壳(去瓢)四两 磁石(生捣末)半斤 薏苡仁半升 玄参三两 乌蛇(酒浸,炙,去皮骨)三两 生地黄(切)一升 小黑豆半升

【用法】上为粗末,以绢袋盛,无灰酒二斗浸三日,然后任性多少下前漏芦丸,更以后白敛汤洗之。

【主治】干湿脚气。

68458 恶实散

【方源】方出《证类本草》卷九引《经验方》,名见《圣济总录》卷一二三。

【组成】恶实一合(半生半炒)

【用法】上杵为末。热酒调下一钱匕。立愈。

【主治】风热闭塞咽喉,遍身浮肿。

68459 恶实散

【方源】方出《本草衍义》卷十,名见《圣济总录》卷一二三。

【组成】牛蒡子(微炒) 荆芥穗各一两 甘草(炙)半两

【用法】上为末。每服二钱，食后夜卧汤点服。当缓取效。

【功用】疏风壅涎唾。

【主治】咽膈不利。

68460 恶实散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】恶实（炒） 乌梅（去核）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为散。每服三钱匕，童便一盏，煎至三五沸，和滓乘热含漱，冷吐，一日三次。

【主治】唇肿生核。

68461 恶实散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】恶实（炒） 木通（锉） 蒺藜子（炒去角）各一两

【用法】上为散。每服半钱匕，以水捣羊子肝汁调下，早晨、日晚各一服。

【主治】小儿风翳，散漫侵瞳人；及风疳眼。

68462 恶实膏

【方源】《丹溪心法附余》卷二十三。

【组成】恶实子

【用法】上为末。蜜调贴卤门上。

【功用】免患眼疾。

68463 恶疮方

《伤寒标本》卷七。为原书同卷“金刀如圣散”之异名。见该条。

68464 恶实叶菹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】恶实叶（嫩肥者，切）一斤 酥半两

【用法】上先以汤煮恶实叶三五沸，取出以新水淘过，布绞去汁，入于五味汁中，略煮点酥食之。

【主治】中风，烦躁口干，手足不随，及皮肤热疮。

68465 恶实根酒

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】恶实根（洗去土，控干） 生蒴藋根（洗去土，控干）各一斤

【用法】上锉细。以酒一斗，浸七日后，每温服一盏，一日三四次。

【主治】刺风，游风。

68466 恶实根粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】恶实根（去黑皮，切）一升 生姜（切）三两 陈橘皮（去白，切）二两 青粱米（净淘）三合

【用法】上以水五升，先煮三味至二升，去滓，下米煮粥。空腹食之。

【主治】中风不语。

68467 恶疮锭子

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】信一钱 麝香五分 归尾五分 恶味五分 蟾酥一钱 草乌一钱 轻粉二钱 川乌一钱 硼砂五分 血竭一钱 全蝎二个 硃砂一钱 铜绿五分 银朱五分 雄黄

【用法】上为细末，用人乳化蟾酥拌成锭子，如大麦样一锭，分作两段，治二人。将疮用针刺破，见血纳入药粒，用纸贴在疮上，内成脓为度，去药洗净。

【主治】恶疮。

【备考】方中雄黄用量原缺。

68468 恶实根涂敷方

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】恶实根末四两 猪脂三两

【用法】上调和如糊，涂疮上，一日三四次。

【主治】反花疮并积年诸疮不愈者。

68469 恶疮死肉锭子

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】巴豆一钱（去皮油） 五灵脂半两 黄丹二钱（飞） 枯白矾一钱

【用法】上为细末，以糊和丸为锭子。入疮内用之。

【主治】恶疮死肉。

栗

68470 栗子粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】栗子 粳米

【用法】煮粥食之。

【功效】①《本草纲目》：补肾气，益腰脚。②《济众新编》：益气，厚肠胃。

【主治】①《济众新编》：一切风头风旋，手战，筋伤肉润，恶心厌食，气虚嘈杂，风痹麻木不仁，偏枯。②《长寿药粥谱》：老年肾虚，腰酸腰痛，腿脚乏力，脾虚泄泻。

【备考】《济众新编》本方用法：黄粟细米不拘多少，和水煮，入碎米心或米泔心煮粥。和蜜服。

68471 栗皮丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】栗子肉上皮半两（为末） 乳香（研） 鲇鱼肝各一分

【用法】上同研为丸，如梧桐子大。看骨远近，绵裹一丸，水润，外留绵线吞之，即钩出。

【主治】诸骨鲠在喉不出。

68472 栗灰散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生栗（宣州大者）七枚

【用法】上逐一微刮破皮，连皮烧存性，碗盖候冷，入麝香少许同研。每服二钱匕，温水调下。

【主治】鼻衄不止。

68473 栗粉丸

《医门八法》卷四。即《石室秘录》卷二“消积化痞丹”。见该条。

68474 栗树叶洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鲜板栗树叶 250 克 生甘草 31 克 雄黄粉 15 克 铁锈粉 31 克。

【用法】水煎，外洗。

【主治】漆性皮炎。

贾

68475 贾同知通圣散

《宣明论》卷三。即原书同卷“防风通圣散”去芒消。见该条。

速

68476 速效饮

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】荆芥穗 薄荷叶（微炒） 草决明（微炒）各一两 甘草三钱（生用）

【用法】上为粗末，和半生半炒芝麻等分。抄二钱，掌中盛，干嚼之，味尽，吐去滓。如此法投三五次即效。

【主治】长成小儿，因他物或跌着触损，两目血胀肿痛。

68477 速效散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】地龙一条（盛在白葱管内，当门挂阴干）

【用法】上一味，同麝香少许，研为细散。渗在耳中。

【主治】耳聋脓出，久不愈。

68478 速效散

【方源】《普济方》卷二九九引《大衍方》。

【组成】吴茱萸 赤芍药各等分

【用法】上为粗、细末。每于临卧，先用粗末二大匙，沸汤泡，淋洗腿脚，拭干；以细末二钱，米醋调匀，摊两脚心，用软纸贴定，再以帛子系定，天明再易则愈。

【主治】口疮。

68479 速效散

【方源】《袖珍》卷二。

【组成】川楝子（取肉，巴豆五粒，去壳，同炒赤，去巴豆） 茴香各一两（盐炒熟，去盐） 补故纸（炒）一两

【用法】上为末。每服一钱，食前以热酒调下。

【主治】腰痛不可忍者。

68480 速效散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子 连翘 薄荷 荆芥穗 柴胡 归尾 生地黄 地骨皮 天花粉 甘菊花 蔓荆子 牛蒡子 白蒺藜 草决明 枳壳 甘草

【用法】上锉。水煎，食后服。

【功用】《杂病源流犀烛》：疏肝清热。

【主治】眼疾。

【加减】如大眦头红肉堆起，乃心经实热，宜清心补肾，加黄连、生地黄，减菊花、牛蒡子；小眦头红丝血胀，乃心经虚热，宜补心补肾，加茯苓、莲肉，减荆芥、蔓荆子；大乌睛上有红白翳障，乃肝经病，宜清肝补肾，加柴胡、连翘；白珠上死血红，加地骨皮、天花粉，减薄荷；若白珠有红箭翳膜，清肺为主，加羚羊角为君；上睑胞肿如桃，此脾经病，泻脾，加砂仁、连翘，减草决明、天花粉；日夜疼痛，加防己、玄参。火眼后昏暗，加柴胡、游草。

68481 速验饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】艾叶三钱 香薷 藿香各四钱 黄连二钱

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】寒暑相搏，霍乱转筋，烦渴闷乱。

68482 速产免脑丸

《饲鹤亭集方》。为《局方》卷九“催生丹”之异名。见该条。

赶

68483 赶经汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】归全 川芎 熟地 香附各一钱 桃仁 红花 莪术 木通各四分 炙草 肉桂各三分

【主治】虚中有寒或有滞所致的月经后期。

68484 赶经汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】人参 白术 归身各一钱 川芎五分 熟地八分 白芍六分 香附六分 肉桂四分 炙草四分

【主治】妇人素体脾虚，血不化生所致的月经后期。

68485 赶毒散

《验方新编》卷十一。为《仙传外科集验方》

“冲和仙膏”之异名。见该条。

68486 赶痛汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】乳香 没药 地龙（酒炒） 香附（童便浸） 桃仁 红花 甘草节 牛膝（酒浸） 当归 羌活 五灵脂（酒淘去土）

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】瘀血湿痰，蓄于肢节之间，筋骨之会，空窍之所，而作痛也。肢节沉重者，是湿痰，晚间病重者，瘀血也。

起

68487 起右汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】陈皮 半夏 南星 茯苓 甘草 人参 白术 乌药 羌活 秦艽 桂皮 酒芩 酒柏 防风 白芷

【用法】上水一盞半，加生姜五片，煎服。

【主治】中风，痰右者，气虚痰盛，言语蹇涩。

【加减】肥白人，加熟附子三分；言语难，加菖蒲、桔梗；手足不遂，加威灵仙、续断；血少，加川芎、当归；足肿，加防己；大便燥，常服搜风顺气丸。

68488 起左汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】乌药（童便煮）一钱 桔梗 枳壳（炒） 秦艽 橘红 生地各八分 半夏（姜炒） 白茯苓 黄芩（酒炒）各一钱 当归（酒洗） 芍药（酒炒） 羌活 川芎各七分 甘草（炙） 枳实（去穰，炒）各五分 细辛二分 南星（炮）八分

【用法】上水一盞半，加生姜五片，煎服。

【主治】中风，气厥、痰厥、血虚，瘫左者。

【加减】心神不宁，加茯神、远志、归身。

68489 起生丸

【方源】《急救应验良方》。

【组成】茅山苍术一两二钱 公丁香一两 雄黄（水飞净、晒燥）八钱 大劈砂（水飞

净, 晒燥) 九钱 当门子二钱 真蟾酥 (切薄片, 灰燥透, 研, 取净细末) 四钱

【用法】上药各为细末, 端午时和匀, 以堆花烧酒法丸, 如细绿豆大, 灰燥, 瓷瓶收储, 勿使泄气。每服七粒, 重者九粒或十二粒, 含舌上觉麻, 用凉水吞下或津咽亦可; 若遇轻痧只须三粒。常宜备带以救济, 务须干燥勿使霉黴。若研细可代闻药更妙。

【主治】一切危急痧症。

【宜忌】孕妇忌服。

68490 起伛汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】薏仁三两 白术二两 黄耆一两 防风三分 附子一分

【用法】水煎服, 日用一剂。服一月而腰轻, 服两月而腰可伸矣, 服三月而全愈。

【主治】大病之后, 湿气入于肾宫, 误服补肾之药, 腰痛如折, 久而成为伛偻者。

【方论选录】此方利湿而又不耗气, 气旺则水湿自消。加入防风、附子子耆、术之中, 有鬼神不测之机, 相畏而相使, 建功实奇。万不可疑药剂之大, 而少减其品味, 使废人不得为全人也。

68491 起阳汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】炮附 皂角各一钱 (酥炙, 去皮弦) 干姜 (炒) 甘草各二分半 麝香一分

【用法】水煎服。

【主治】寒证, 阳物缩入腹内。

68492 起阴汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参五钱 白术一两 巴戟天一两 黄耆五钱 北五味子一钱 熟地二两 肉桂一钱 远志一钱 柏子仁一钱 山茱萸三钱

【用法】水煎服。连服四剂而阳举矣, 再服四剂而阳旺矣, 再服四剂必能久战不败; 苟长服至三月, 如另换一人, 不啻重坚一番骨,

再造一人身也。

【功用】大补心肾之气。

【主治】心气不足之阳痿。交感之时, 忽然阳痿不举。

68493 起枕汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三钱 赤芍一钱半 官桂一钱半 蒲黄一钱半 五灵脂三钱 白芷一钱半 丹皮一钱半 炙草一钱半

【用法】水煎, 去滓, 入童便一杯, 温服。

【主治】产后冲任受风, 波及阳明, 而瘀血凝结, 故恶露不下, 脐腹作痛, 脉浮滞涩者。

【方论选录】当归养血活血脉, 赤芍破血泻血滞, 生蒲黄破瘀通经脉, 五灵脂破瘀降浊阴, 官桂温经通闭, 白芷升阳散风, 丹皮凉血散瘀, 炙草缓中益胃也。水煎入童便温服, 使风邪外解, 则瘀结内消, 而恶露无不下, 何脐腹作痛之不止哉。

68494 起枕散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归三钱 白芍 (酒炒) 三钱 川芎二钱 白芷 官桂 蒲黄 牡丹皮 玄胡索 五灵脂 没药各一钱

【用法】上锉一剂。水煎, 入童便, 空心服。

【主治】产后心腹痛, 恶血不行, 或儿枕作痛, 甚危。

68495 起枕散

【方源】《理渝》。

【组成】延胡 当归 官桂

【用法】上为末。掺膏贴。

【主治】妇人产后儿枕痛。

68496 起顶散

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】人参六分 白术 当归 川芎 陈皮各五分 黄耆 山楂各八分 甘草 肉桂各三分 木香 淫羊藿 (去刺, 羊油炒) 穿山甲 (土炒为末) 各二分 生姜一片 大枣二枚

【主治】痘疮不起。

68497 起废丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【异名】赤虎子丹。

【组成】川乌头四两(炮,去脐皮尖) 五灵脂(去砂石,炒)四两 附子(炮,去皮脐) 白花蛇(酒浸,去皮骨) 肉桂(去粗皮) 羌活(去芦头) 天南星(炮) 干姜(炮)各二两 虎骨(酥炙) 甘菊花 零陵香 金牙石(煅红、醋淬三次) 藿香叶(去土)各一两半 血竭(别研) 香白芷 川芎 麻黄(去根节) 甘草(炙) 狼毒(炮)各一两 干蝎(去毒,炮) 皂角(炙,去皮子) 白姜蚕(炒,去丝咀) 朱砂(别研) 雄黄(别研) 细松烟墨(烧)各半两 脑子一钱(别研) 麝香一分(别研) 生地黄 当归各四两(同入少许砂盆内,研成膏子,又用无灰酒三升,煮膏子令半干)

【用法】上为细末,入地黄当归膏子内,搜和,放木臼内捣千余杵,如膏子,和药,硬时即用浸花蛇酒打面糊,渐渐添入杵匀,每一两作十丸,阴干。每服一丸,用热豆淋酒(用黑豆炒焦,乘热以酒浸之,去豆取酒)送下,不拘时候。初得病之日,即服神柏散,次服本药,不致为废人。

【主治】一切中风瘫痪,口眼喎斜,语言蹇涩,步履艰难,筋脉拳缩,骨节疼痛。

68498 起胃散

【方源】《永类铃方》卷六。

【组成】黄耆(炙)二两 白术(炒)一两 白芷半两 人参半两 山药一两(一方加沉香、茯苓、甘草各半两)

【用法】上咀咀。每服三钱,加木瓜煎。

【主治】骨蒸劳瘵,不论阴阳二证者。

68499 起迷丹

【方源】《傅青主男女科·男科》卷下。

【组成】人参 半夏各五钱 菖蒲二钱 菟丝子一两 茯苓三钱 皂荚 生姜各一钱 甘草三分

【用法】水煎服。

【功用】攻痰而开心窍。

【主治】素有痰气,忽然发厥,闭目撒手,喉中有声,有一日死者,有二三日死者。

68500 起痔汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】黄芩 槐花 防风 梔子 苦参 黄连 黄柏 大黄各一两 芒消半两

【用法】上咀咀。煎汤洗,每日三次。有痔四围根裂开,用生肌散上。

【主治】痔瘕。

68501 起痔汤

【方源】《外科正宗》卷八。

【异名】落痔汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 大黄 防风 荆芥 梔子 槐角 苦参 甘草各一两 朴消五钱

【用法】上药分作三次,用水煎洗。待痔落之后,换搽生肌散。

【主治】诸痔上枯药之后,黑色坚硬,裂缝者。

68502 起脾汤

《外台》卷十六。为《千金》卷七“越婢汤”之异名。见该条。

68503 起脾汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】炙黄耆二两 甜白术五钱 薏仁五钱 杜仲八钱(炒净丝) 山萸肉五钱(酒炒) 当归三钱 川牛膝二钱

【用法】木瓜二钱为引,酒、水各半,煎服。

【功用】大补气,理脾。

【主治】痢后脾气大虚,四肢酸软无力。

68504 起痛汤

【方源】《蒿崖尊生》卷十四。

【组成】当归二钱 甘草三分 白术 牛膝 独活 肉桂各八分 韭白八根 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】气血虚而有滞,遍身痛。

68505 起嚏汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】白术 9 克 茯苓 6 克 甘草 3 克
当归 白芍各 9 克 蔓荆子 防风各 3 克

【功用】培土生金，养血舒筋，少佐除风。

【主治】倒睫拳毛。

【方论选录】方中白术、茯苓、甘草健脾以培土生金。当归、白芍养血以舒筋，白芍配甘草敛阴和营，缓解挛急。蔓荆子、防风疏散风邪，且无伤阴之弊，并能助白芍、甘草解散挛急。

【临证举例】倒睫生翳 邢某某，男，72 岁。初诊：二目下胞睫毛倒入年余，刺痛流泪，羞明难睁，右目视物不真。检查：双目下胞皮宽弦紧，睫毛倒入，右重左轻，右目白睛红赤，青睛下方生翳，此为倒睫生翳。治以起睫汤加黄芩、木贼各 6 克，服药 6 剂。复诊：皮宽稍轻，倒睫部分已起。右目白睛有少量赤丝，云翳渐退。又服上方 6 剂。三诊：左目下睑稍有宽纵，还有数根倒睫没起；右目睫毛仍大部倒入，白睛稍赤，云翳甚微。以前方去黄芩、木贼又服 24 剂。二年后，因他事来本院，左目倒睫已愈，右目还有数根没起。嘱其用生姜 3 片、红糖 1 撮，浸水喝，每日一次。

68506 起睫膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】木鳖子（去壳）一钱 自然铜五分（制）

【用法】上捣烂，为条子。搐鼻；又以石燕末，入片脑少许，研水调敷眼弦上。

【主治】《审视瑶函》：倒睫拳毛。

68507 起痿丹

【方源】《医方大成》卷四。

【组成】附子（炮、去皮脐） 枸杞子（拣去枝梗） 肉苁蓉（酒浸，焙干） 沉香（不见火） 官桂 朱砂（别研） 熟地黄（酒浸，蒸） 母丁香各一两 木香（不见火） 阳起石（火煨） 天雄（炮，去皮脐，或鹿茸亦可） 硫黄 麝香（别研） 各一两

腻粉半两 白丁香（少许）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，以生姜汁火上入药溶化，却用手点药于腰眼上，磨搽至药尽，用至二十丸。若有他处瘫痪风疾，加皂角一片，去筋捶烂，姜汁浸一宿，瓦上焙干为末，入前药内，依法用。

【主治】肾经虚败，遂成骨痿，腰脚难举，日加困乏。

68508 起痿丹

【方源】《奇效良方》卷四十五。

【组成】连翘 防风 荆芥穗 蔓荆子 羌活 独活 牡丹皮 山梔仁 秦艽 麻黄（去根） 木香各等分

【用法】上为细末。每服一钱，食后用白汤调下。

【主治】筋痿。两手握固无力，两腿行动无力，急饥食少，口舌生疮，忽生痰涎，忽然睡中涎溢，身上躁热，忽时憎寒，项颈强急，小便赤白不定，六腑忽冷忽热不调。

68509 起痿丹

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】菟丝子（酒洗，煨，烂捣饼，晒干）二两五钱 肉苁蓉（酒浸）二两 川草薢 破故纸（酒炒） 胡芦巴（酒炒） 沙苑蒺藜（微炒） 川牛膝（去皮，酒洗） 川杜仲（酒炒） 防风（酒洗） 甘枸杞子各二两

【用法】上为末，酒煮猪腰子，捣烂为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心酒送下。

【主治】肾气虚惫，腰膝痠痛，行步无力。

68510 起痿汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】杜仲 故纸 枸杞 菟丝 胡巴 牛膝 草薢 防风 沙蒺藜（一方去枸杞，加肉桂）

【主治】肾气虚惫之痿证。

68511 起痿汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】生箭耆四钱 生赭石六钱（轧细）
怀牛膝六钱 天花粉六钱 玄参五钱 柏子
仁四钱 生杭芍四钱 生明没药三钱 生明
乳香三钱 廑虫四枚（大者） 制马钱子末
二分

【用法】将前十味煎汤，送服马钱子末；至
煎滓再服时，亦送服马钱子末二分。徐服此
药，久自能愈。

【主治】因脑部充血以致肢体痿废，迨脑充
血治愈，脉象和平，而肢体仍痿废者。

68512 起废神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】麦冬 熟地 玄参 五味子

【用法】上药用量均略大于常量。水七碗，
煎三碗，早晨服一碗，下午服一碗，半夜服
一碗。一连二日，必能坐起。

【主治】阳明火烧尽肾水，痿症久不效者。

68513 起陷神丹

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】人参一两 白芍五钱 当归一两
麦冬一两 白术一两 肉桂二钱 附子一钱
熟地二两 北五味三钱 山药五钱

【用法】水煎服。十剂可安。

【主治】夏生背痈，疮口不起，脉大无力，
发热作渴，自汗盗汗，用参耆补剂，益加手
足逆冷，大便不实，喘促呕吐，阴症似阳者。

68514 起痿神汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】玄参 熟地 麦冬 山茱萸 沙
参 五味子

【用法】上药用量均须略大于常用之量。水
煎服。

【主治】痿症。

68515 起死回生丹

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】丁香九枚 干姜一钱

【用法】每用五分，酒服。被盖片时，令脾
胃温暖，阴退阳回，痘自红活起发。

【主治】痘疹。寒气逆上，身凉，痘色灰白
塌陷，不食腹胀，呕吐，泄泻清水，肚腹疼
痛，手足俱冷。

68516 起死回生丹

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】活雄地鳖虫（身小而带长者雄，
洗净，焙干）五钱 上血竭二钱 当门子三
分 自然铜三钱（煅红，醋淬七次，研） 上
辰砂二钱 滴乳香二钱（去油，每两用灯草
二钱五分同炒枯） 净巴豆霜二钱。

【用法】上研极细末，收入小口瓷瓶，塞紧
勿使走气。每服一分五厘，小儿减半，温陈
酒冲服。如牙关不开者，用乌梅肉擦之，如
仍不开者，只得用物打去一齿，以便灌药。灌
时多用陈酒，使药下喉。虽遍体受伤似死，只
要身体尚软，急用此丹灌服，少顷即有微气，
再灌一服，便活。如下紫血更妙。惟体已僵
硬者，难救。救活后，宜避风调养，如心腹
疼痛，乃瘀血未净，速再予调治。

【主治】跌伤、打伤、压伤、刀伤、锐伤、
自刎、自缢。

68517 起死回生散

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 生地黄 升
麻 红花

【用法】上锉一剂。半水半酒煎服。从新发
出脚下有黑疔，至七八日用针挑去，以太乙
膏贴之，即拔去毒，须连进二三服。

【主治】痘疮至七八日，忽然变黑收入，遍
身抓破，吭喘慌乱，生死须臾。

【加减】上陷，加白芷；下陷，如牛膝；遍
身黑陷，加麻黄、象粪（微炒），如一岁用二
钱，大则用至三五钱者。

68518 起死回生散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】蜈蚣三钱（炮存性） 胆矾一钱
全蝎三钱（炒存性） 蝉退一钱（焙存性） 僵
蚕（去丝嘴，炒）一钱 穿山甲（麸炒）三
钱 蟾酥一钱 乳香五分 川乌一钱

【用法】上为细末。每服一钱五分或二钱。小儿每服一分或六七厘，用葱头捣烂和药，酒送下。出汗为度；如口不开，灌服。

【主治】喉风。

【宜忌】忌猪、羊油、鸡、面七日。

68519 起死轻骨丹

《幼幼新书》(人卫本)卷十三引《保生信效方》。即原书(古籍本)“起死轻骨膏”。见该条。

68520 起死轻骨膏

【方源】《幼幼新书》(古籍本)卷十三引《保生信效方》。

【异名】起死神应丹(《儒门事亲》卷十五)。

【组成】麻黄(去根节)五斤(河水二石熬成膏) 桑白皮(土下者佳) 川芎 白芷 苍术(去皮) 甘松(只用腿子)各二两 苦参三两半

【用法】上为细末，麻黄膏为丸，如弹子大。每服一丸，温酒一盏，研化顿服之。临卧取汗，五七日再服，手足当轻快。小儿惊风量与之；卒中涎潮，分利涎后用之。

【主治】中风瘫痪，四肢不随，风痹，及小儿惊风。

【备考】本方方名，原书(人卫本)作“起死轻骨丹”。

68521 起死神应丹

《儒门事亲》卷十五。为《幼幼新书》(古籍本)卷十三引《保生信效方》“起死轻骨膏”之异名。见该条。

68522 起死救儿丹

【方源】《辨证录》卷三十四。

【组成】人参三钱 玄参一两 金银花一两 白术二钱 当归三钱 麦冬三钱 甘草一钱 荆芥二钱 天花粉二钱 茯神三钱

【用法】水煎服。一剂黑变为红，再剂而陷者起，干者润，饮食知味。

【主治】小儿痘疹五六日后，色变纯黑或炭灰之色，头顶陷下不起，饮食到口即吐，所谓坏症者。

【方论选录】此方之妙，全在金银花与玄参

之多，即能解毒，复善散火，而又助之参、术、归、冬，则足以济二味之力，而益成其祛除之功，所以能变败而为胜，起死而变生也。万勿惊其药品之重与用参之多，而减其分量。盖药不重，火毒难消，参不多则阴阳难复矣。

68523 起异复光丸

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】黄牛粪(不令落地)

【用法】净水和黄土，将牛粪包裹做球，放炭火内埋一宿，日取出，去泥土，晾干，研细末八两，再加明净硼砂末二两，同粪研匀，江米面打糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，菊花汤送下，食远服。

【主治】目病久昏，内外翳膜胀蔽，夜光红散，昼怯阳明，黑珠作痛，瞳人有蝇翅，恍惚不明，上生白点，下生如粟，赤缕红丝。

【宜忌】切忌房事、椒、蒜、火酒发气之物。

68524 起阳至神丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】熟地半两 山茱萸四钱 远志一钱 巴戟天一钱 肉苁蓉一钱 肉桂二钱 人参三钱 枸杞子三钱 茯神三钱 杜仲一钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】过于琢削，日泄其肾中之水，而肾中之火亦日消亡，致痿而不振者。

【方论选录】此方用热药于补水之中，则火起而不愁炎烧之祸，自然煮汤可饮，煮米可餐。断不致焦釜沸干，或虞爆碎也，此皆男治之法也。

68525 起祖三棱丸

《得效》卷三。即《局方》卷三“三棱煎丸”加阿魏五钱。见该条。

68526 起蒸中央汤

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】黄连五两

【用法】上咬咀，以醇酒二斗，同熬成膏。每夜服以好酒化下，弹子大一丸。汗出为度，仍服补药磨脐丸。

【主治】气血相搏，久而消瘦，遂成劳伤，骨蒸，肉消毛落，亡血喘咳者。

68527 起痿至神丹

《吉人集验方》下集。为《傅青主男女科》卷上“起痿至神汤”之异名。见该条。

68528 起痿至神汤

【方源】《傅青主男女科·男科》卷上。

【异名】起痿至神丹(《吉人集验方》下集)。

【组成】熟地 玄参 山药 菊花各一两 当归 白芍 人参各五钱 神曲二钱 白芥子三钱

【用法】水煎服。三十剂愈。

【功用】《吉人集验方》：泻阳明、补肾水、生肝血、健脾气、消痰涎。

【主治】痿证。两足无力，不能起立而口健饭，少饥即头面皆热，咳嗽不已。

68529 起痿延生丹

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】麦冬五钱 百部五分 款冬花五分 白薇五分 生甘草一钱 天门冬一钱 生地一钱 天花粉一钱 桔梗一钱 玄参三钱 山豆根三分

【用法】水煎服。

【主治】肺痿损伤，焦瘦气促。

68530 起痿降火汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地三两 山茱萸一两 苡仁五钱 金钗石斛五钱 牛膝五钱

【用法】水煎服。四剂腿颤足痛之病去，十剂可以步履，饮食不至易饥，二十剂全愈。

【功用】补肾阴。

【主治】痿证。因素常贪色，加之行役劳瘁，伤骨动火；复又行房鼓勇大战，遂至两足痿弱，立则腿颤，行则膝痛，卧床不起，然颇能健饭易消者。

68531 起痿至神汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 麦冬一两 茯苓五钱 山药五钱 芡实三钱 肉桂三分 白术三钱 杜仲一钱 鳖甲五钱 百

部二钱

【用法】水煎服。连服十剂，痿虫死矣；再服一月，肾气旺而心气安；再服一月全愈。

【功用】补肾安心，杀虫。

【主治】痿痹，夜卧常惊，或多恐怖，心悬悬不安，气吸吸欲尽，淫梦时作，盗汗日多，饮食无味，口内生疮，胸中烦热，终朝无力，惟思睡眠，唇似朱涂，颧如脂抹，手足心热，液燥津干。

【方论选录】此方全是补肾安心之剂，惟鳖甲、百部乃杀虫之药。鳖甲深攻，引百部直入于至阴之内，又是补阴而不伤于髓，虫以为养身之味，讵知是杀身之味耶。虫死而肾无异气，则心气受益，而又有麦冬、茯苓、白术之相扶，自然庆安莫于宫中，喜救宁于殿上也。

殊

68532 殊圣散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】天麻 菖蒲(九节者，米泔浸，焙干) 何首乌 乳香(研) 菊花 蔓荆实 威灵仙(去土) 地骨皮 仙人骨 胡麻 防风(去叉) 枳壳(去瓤，麸炒) 益母草 乌蛇(酒浸，去皮骨，炙) 小荆子 苍耳 苦参 丹参 沙参 人参 玄参 紫参 荆芥各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，食前后各一服，隔宿先吃猪脂一枚，早晨并服三服。

【主治】恶风。

68533 殊圣散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】白术 甘草(炙) 五味子 石膏各四两 干姜(炮) 三两半

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，同煎至七分，通口服，不拘时候。

【主治】伤寒，头痛壮热，骨节酸痛，昏沉

困倦，咳嗽鼻塞，不思饮食。

68534 殊圣散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白矾 胆矾各等分

【用法】上为细末，飞过，入麝香。擦牙。

【主治】牙疼。

68535 殊圣散

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】蜗牛二个（细研） 瓜蒌瓢弹子大五块（为末） 黄蜀葵花、叶（皆可为末）二钱

【用法】上用蜀葵花捣汁，以前药末和研调粘。涂疮上，留口。一日换三次。

【主治】一切痈疽肿毒不消。

68536 殊胜汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二引夏三议方。

【组成】半夏七枚（汤泡七次） 甘草一寸（锉）

【用法】用水一盏半，加生姜七片，同煎至一盞，空心稍热服。

【功用】去痰涎，进饮食。

68537 殊胜散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】乌贼鱼骨（去甲） 海浮石 桔梗（锉，炒） 葛根（锉） 丹砂（研，水飞） 虎杖（烧过）各一分

【用法】上为散。每服二钱匕，渴时煎麦门冬汤调下，空心、日午、夜卧各服一次。

【主治】消渴。

68538 殊胜散

【方源】《普济方》卷一七六引《卫生家宝方》。

【异名】朱砂散（《普济方》卷一七六）。

【组成】海浮石 乌贼鱼骨（去甲） 丹砂（研，水飞） 虎杖（烧过）各一两（一方有人参）

【用法】上为散。每服二钱，渴时煎麦门冬调下，日午、空心及夜卧时各进一服。

【主治】消渴。

【宜忌】忌酒色、湿而、油煎、生冷、酢酱。

68539 殊效汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】干柿（细切，炒令焦黑） 干薄荷叶 陈橘皮（去白，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】咳逆。

68540 殊验清中汤

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】川升麻半两（锉）

【用法】井水浓煎服。少顷，吐出毒气。

【主治】伤寒头痛，咽喉肿痛，口舌生疮，一切肿毒之疾。

顾

68541 顾耳汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】柴胡二钱 白芍二两 金银花二两 熟地二两 当归一两 天花粉五钱 生甘草三钱

【用法】水数碗，煎一碗半，饥服，一连二剂。

【主治】耳前初发恶疽。

【备考】若十日之后此方救之亦可生，然脾胃一坏恐难救。

68542 顾步汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【异名】顾步保脱汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】牛膝一两 金钗石斛一两 人参三钱 黄耆一两 当归一两 金银花三两

【用法】水煎服。一剂而黑色解，二剂而疼痛止，三剂全愈。若已溃烂，多服数剂，无不愈也。

【功用】大补气血，泄毒。

【主治】脚疽。因气血大亏，不能遍行经络，火毒恶邪，固结于骨节之际，以致脚趾头忽先发痒，已而作痛，指甲现黑色，第二日脚指俱黑，第三日连足而俱黑，黑至脚上胫骨即死；及无名肿毒。

【方论选录】此方用金银花以解毒，非用牛膝、石斛不能直达于足趾，非用人参、归、耆亦不能流通气血而散毒也。故用此方治脚疽多效。

68543 顾步汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】黄耆五钱 当归（酒洗）四钱 黄柏（盐酒炒）二钱 知母（酒炒）二钱 熟地黄三钱 肉桂一钱 干姜一钱 牛膝三钱 虎胫骨（酥炙）三钱 金银花二钱

【用法】酒煎服。

【功用】大补气血，滋阴壮阳。

【主治】脾肾阴亏，湿热下流之足疽。起于足大趾，初痒疼痛，趾甲黑，渐而肉黑，上于足跗。

【方论选录】黄耆、当归以补气血为主，黄柏、知母以滋阴行湿热，熟地黄以壮肾水，肉桂以行血去毒，干姜以益阳去湿，牛膝、虎胫骨以峻劲达之下行，金银花解毒。阴阳兼滋，气血交补，而后毒壅可消。

68544 顾首汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】蔓荆子一钱 川芎五钱 白芷一钱 甘草一钱 半夏一钱 细辛一钱

【用法】水煎服。

【主治】头疼。

68545 顾母理脏汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】枳壳一钱五分（麸炒） 青皮一钱五分 厚朴一钱 干姜五分 谷芽二钱（炒） 当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 木香五分 白蔻六分 橘饼三钱（切片）

【功用】温通肠胃，上下兼顾。

【主治】大肠胀。肠鸣而痛濯濯，冬日重感于寒，则飧泄不化。

68546 顾步保脱汤

《中国医学大辞典》。为《辨证录》卷十三“顾步汤”之异名。见该条。

砥

68547 砥柱丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】破故纸（炒）四两 杜仲（去皮，锉片，用生姜二两半捣汁，炒断丝）四两（一方加乳香 木香各四钱）

【用法】上为末，取核桃肉三十个，去皮研和，少加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，用茴香汤或酒任下。

【主治】肾虚腰痛。

破

68548 破气丸

【方源】《普济方》卷一八一引《鲍氏方》。

【组成】硫黄 焰消（炒成子） 陈皮 青皮各四两

【用法】上为末，糊为丸。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】气积块，久近一切气。

68549 破气汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】青皮（不去白） 陈皮（不去白） 茴香（拣，炒）各十二两 杏仁（去皮尖，麸炒，别捣） 桂心各一斤 良姜（炒） 姜黄 萆澄茄 木香各六两 甘草（炒）八斤半 盐（炒）十四斤 丁香皮九两

【用法】上为末。每服一钱，食前沸汤点服。

【主治】一切冷气攻心、腹、胁、肋，胀满刺痛，噫气吞酸，呕逆恶心，胸膈噎寒，饮食减少。

68550 破气汤

【方源】《医方类聚》卷二一八引《居家必用》。

【组成】乌药 香附子各一两 紫苏叶 橘红 檀香 片子姜黄 缩砂仁 甘草各半两

【用法】上为粗末。每服半两，生姜三片，葱白二枚，水二盏，煎至一大盏，滤去滓，入

磨化沉香汁、木香汁各一呷服之。

【主治】妇人气上逆作痛，胸膈满闷。

68551 破气散

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】木香一两 萆澄茄二两 香附四两 姜黄二片 砂仁二两 枳壳 甘草 豆蔻各二两

【用法】上为末，沸汤调服；或用甘草煎膏子，为饼嚼服。

【主治】一切气。

68552 破邪汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】石膏三钱 柴胡一钱 半夏一钱 茯苓三钱 甘草一钱 麦冬一两 玄参三钱 陈皮一钱

【用法】水煎服。

【主治】其人少阳之间原有寒邪，冬月伤寒，阳明火邪不散，身热二日即有如疟之状。

【方论选录】此方用石膏、玄参以治阳明之火，用麦冬以滋肺中之燥。盖肺燥即不能制肝，胆之过旺也。且肺燥必取给于胃，则胃土益加干枯，其火愈炽矣。今多用麦冬，使肺金得润，不必有借于胃土，则肺气得养，自能制肝胆之木，而少阳之邪，何敢附和胃火以作祟乎！况柴胡原以舒少阳之气，而茯苓、甘草、半夏、陈皮之类，更能调和于阳明、少阳之间，邪无党援，安得不破哉！

68553 破血丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】牡丹皮 苦参 赤芍药 当归（锉，焙） 大黄（锉，炒）各二两 食茱萸（洗，焙，炒） 延胡索 五味子各一两 贝母（去心）一两半 槟榔（锉）十枚 莲叶一斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三十丸，空腹酒送下。渐加至四十丸。

【主治】妇人腹中血结，月候不调。

68554 破血丹

《仙传外科集验方》。为原书“洪宝丹”之异

名。见该条。

68555 破血汤

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】桃仁（去皮尖，研） 红花（酒洗） 川芎 香附（童便浸） 青皮各等分

【用法】上咬咀。水煎服。

【功用】破血行气。

【主治】瘀血所致的胁痛。

68556 破血汤

【方源】《眼科纂要》卷下。

【组成】刘寄奴 红花 生地 赤芍 菊花 苏木 丹皮 桔梗 生甘草

【功用】《古今名方》：清热凉血、活血化瘀。

【主治】眼目击伤，红肿，凝血疼痛。

【加减】如出血，加血竭；肿甚，加赤小豆；祛翳，加海螵蛸、秦皮、草决明等。

【临证举例】目外伤，永邑卢龄长左目被物击伤，红肿而不能开视。用生番椒叶捶黄糖贴之，一服目开痛止，又用破血汤二剂全安。

68557 破血药

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】柴胡 黄芩 五灵脂 枳实 当归 赤芍药 川芎 生地黄 大黄 朴消 桃仁 红花 苏木

【用法】水煎，入酒、童便和服。皮破血流者不用酒。

【主治】打扑堕马，从高跌下，皮肉不破，此瘀血停积内攻，不能言语，而或谵妄。

68558 破血散

《秘传外科方》。为方出《千金》卷二十四，名见《三因》卷十五“破结散”之异名。见该条。

68559 破血散

《玉机微义》卷四十三。即《兰室秘藏》卷中“破血散疼汤”。见该条。

68560 破血散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】当归须 川芎 赤芍药 熟地黄各一钱 桃仁 红花 牛膝 黄芩 陈皮各八分 生甘草五分

【用法】上咬咀。用生姜汁、酒少许，水煎，

温服。

【主治】痢用涩药，恶血流入经络，患成痛风者。

68561 破合汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】石膏三钱 葛根三钱 茯苓三钱 柴胡一钱 白芍三钱 陈皮一钱 甘草一钱

【用法】水煎服。一剂而目痛愈，再剂而头痛除，三剂而寒热解。

【主治】冬月伤寒，六七日，太阳、阳明、少阳合病，头疼目痛，寒热不已。

【方论选录】此方治阳明者十之七，治太阳者十之一，治少阳者十之二，虽合三经同治，其实仍专治阳明也。

68562 破关丹

《外科理例·附方》。为《本草纲目》卷十一引《经验方》“破棺丹”之异名。见该条。

68563 破阴丹

【方源】《本事》卷八。

【组成】硫黄（舶上者） 水银各一两 陈皮（去白） 青皮（去白）各半两（为末）

【用法】先将硫黄铤子内熔，次下水银，用铁杖子打匀，令无星，倾入黑茶盏内研细，入二味匀研，用厚面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸。如烦躁，冷盐汤送下；如阴证，冷艾汤送下。

【主治】①《本事》：伤寒时疫，阴中伏阳。②《通俗伤寒论》：伏阳伤寒，身虽大寒，反不欲近衣，胸满恶心，头痛脊疼，指末虽冷而内热烦躁，舌苔绛底浮白，甚或嫩红胖大。

【方论选录】《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入命门；水银气味辛寒，能行九窍，伏五金为泥；陈皮气味苦辛微温，入手足太阴；青皮气味辛酸平，入足少阳、厥阴；厚面糊丸，缓其药性也。此阴中伏阳之证，冷热皆在难投，故以冷汤送药，排达直入，则所伏之阳得透，自必汗出而解矣。

【临证举例】伏阳伤寒 乡人李信道得疾，六脉沉不见，深按至骨，则沉紧有力，头疼，

身温烦躁，指末皆冷，中满恶心。更两医矣，医者不识，只供调气药。予因诊视曰，此阴中伏阳也，仲景法中无此证，世人患此者多，若用热药以助之，则为阴邪隔绝，不能导引真阳，反生客热，用冷药，则所伏真火愈见消铄，须用破散阴气，导达真火之药，使火升水降，然后得汗而解。予授此药二百粒，作一股，冷盐汤下。不半时，烦躁狂热，手足躁扰，其家大惊。予曰，此俗所谓换阳也。须臾稍定，略睡已得汗，自昏达旦方止，身凉而病除。

68564 破阴丹

《杂病源流犀烛》卷十九。为《圣惠》卷十一“返阴丹”之异名。见该条。

68565 破块丸

【方源】《得效》卷三。

【组成】萆薢一两 大黄一两（各生用）

【用法】上为末，入生麝香少许，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心冷酒送下，或温冷汤送下，一日三次。

【主治】受瘴结成气块，留于腹中，不能消散者。

【备考】本方方名，《普济方》引作“阴阳丸”。

68566 破坚丹

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】商陆根

【用法】杵烂，频擦。

【主治】耳后石痈。

68567 破坚散

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】白胶香 海螵蛸 降真香（取心）各等分

【用法】上为末。搽患处，外以湿纸掩之。一夕而退。

【主治】瘰癧未破者。

68568 破饮丸

【方源】《三因》卷十三。

【异名】破痰丸（《医统》卷四十三引《医林方》）。

【组成】萆薢 丁香 胡椒 缩砂仁 乌梅肉 青皮 巴豆(去皮) 木香 蝎梢各等分

【用法】将青皮、巴豆以浆水同浸一宿，次日滤出，同炒青皮焦，去巴豆，将所浸水淹乌梅肉，蒸一炊久，细研为膏，入药末和匀为丸，如绿豆大。每服五七丸，临睡生姜汤送下；津液下尤佳。久服不伤脏气。

【主治】五饮停蓄胸腹，结为癥癖，支满胸膈，傍攻两胁，抢心疼痛，饮食不下，反胃吐逆，九种心疼，积年宿食不消，久疟久痢，遁尸疟忤，癫痫厥晕，心气不足，忧愁思虑，妇人腹中诸病。

68569 破饮丸

【方源】《局方》卷四(淳祐新添方)。

【组成】旋覆花八两 白术一斤一两 肉桂(去粗皮) 干姜(炮)各六两 赤茯苓(去皮)七两 枳实(麸炒)二两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，熟水送下。

【主治】一切停饮不散，时呕痰沫，头眩欲倒，膈脘不快。

68570 破灵丹

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】红花 苏木各五分

【用法】无灰酒煎服。

【主治】妇人身弱，血少水干，胎衣不下，瘀子小腹者。

【宜忌】若面色青黄，指甲红色，其子久生，不可轻用破灵丹。

68571 破郁丹

【方源】《回春》卷三。

【组成】香附米(醋煮)四两 梔子仁(炒)四两 黄连(姜汁炒)二两 枳实(麸炒)二两 槟榔一两 莪术一两 青皮(去瓤)一两 瓜蒌仁一两 苏子一两

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后滚水送下。

【主治】妇人噎气胸紧，连十余声不尽，噎

出气心头略宽，不噎即紧。

【备考】本方改为汤剂，名“破郁汤”(见《嵩崖尊生》三溪堂本)、“解郁汤”(见《嵩崖尊生》锦章书局本)。

68572 破郁汤

《嵩崖尊生》(三溪堂本)卷九。即《回春》卷三“破郁丹”改作汤剂。见该条。

68573 破疟散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术 黄耆各五钱 半夏 防风羌活 陈皮 甘草各一钱

【用法】水煎服。

【主治】春温之症，伤风而邪留子阳分，日间发热，口干舌燥，至夜身凉，神思安闲，似疟非疟。

68574 破疔汤

【方源】《医编》卷四。

【组成】木香 玄胡 橘核 荔枝核 茴香 川楝子 没药 地肤子 青皮

【用法】马鞭草根煮汁，煎服。

【主治】诸疔。

【加减】寒疝，加吴萸、附、桂；辜丸升上入腹者，加飞盐、沉香，或用鸡鹅蛋壳烧灰，空心酒下三钱；胁旁动气，横入阴处，响声如蛙，照前方去盐。

68575 破经丸

【方源】《普济方》卷三一九引《仁存方》。

【组成】川大黄一两 硃砂(研) 川芎各半两 红娘子四十九个 马鸣退灰三钱 当归六钱(切，焙)

【用法】上煎醋一小盏，入大黄末作膏，和后五味，如小豆大。每服十丸至十五丸，食前煎红黄酒送下。三两时间觉脐腹下微痛，药行大小便取恶血浓枯为效；如未觉，加至二十丸，三五服效；要内消，只服三五丸，每日常服，视患老少轻重，以意加减。

【主治】妇人干血，气久滞，腿脐腹冷痛，寒热往来，血块，血刺，瘰癧，癥瘕，四肢无力，饮食渐减，久变成虚劳痰嗽。

68576 破经汤

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】巴豆七个 苦葶苈三钱 皂角二钱（一方不用皂角）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每次一丸，先用麻丝缠定，坐一夜；不行，再一丸。如觉寒热取下赤白水，再用一丸，取一行。后用四物汤补之。

【主治】妇人血气不行，脐腹疼痛。

【备考】本方方名，据剂型，当作“破经丸”。

68577 破毒丹

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】巴豆一枚

【用法】上用纸裹，火内炮令擘破声为度，去纸，揭起头皮些子。左雕于右鼻内着，右雕于左鼻内着，双雕则着两个。得时恣，破脓血下也。

【主治】单双雕。

68578 破毒散

【方源】《东垣试效方》卷三。

【组成】滑石末三钱 斑蝥三个（炒去头足翅，为末）

【用法】上和匀。分三次，空心、食前服，一日服毕，少用茶汤调下。毒气俱从小便中出。如小便疼痛，浓煎车前子、木通、灯芯、泽泻汤顿服即已。

【主治】横痃，已成未成。

68579 破毒散

【方源】《医学正传》卷六引《疮疡集》。

【组成】信石 硃砂 黄丹 雄黄 乳香各一字 斑蝥五个（去翅足） 麝香少许

【用法】上为末，取新蟾酥为丸，如绿豆大。以铍针破开疔头，纳药一丸在内，外以膏药护之。如无蟾酥，加面糊少许。

【主治】疔肿。

【备考】本方方名，据剂型，当作“破毒丸”。

68580 破故纸

【方源】《朱氏集验方》卷三引胡周卿方。

【组成】破故纸

【用法】上酒浸一宿，炒熟，酒煮为丸。更用破故纸少许，炒为末，酒调送下。

【功用】补肾。

【主治】阴冷伤肾，腰痛。

68581 破痼丹

方出《百一》卷十六，名见《医方类聚》卷一八〇。为方出《博济》卷五，名见《圣济总录》卷一二六“皂子丸”之异名。见该条。

68582 破结丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】琥珀 玄胡索 降香 五灵脂 莪术 牛膝各五钱 桃仁 归尾各一两 肉桂心 血竭各三钱

【主治】妇人过食生冷酸涩而经闭者。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：上为细末，滴水为丸，熟汤送下。

68583 破结丹

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】辰砂 青礞石 葶苈 肉豆蔻 木香 官桂 牵牛 黑附子 巴豆各五钱 轻粉半分 麝香五分 金箔五片

【用法】上为末，用米醋半盏，入辰砂、附子、牵牛三味，熬成膏，次入余药为丸，如皂角子大，轻粉为衣。每服二丸，蜜汤送下。

【功用】《中国医学大辞典》：消痰破结。

【主治】阴阳伏逆，变为结胸，五六日大便结，攻之不可，达之不及者。

68584 破结汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】防风一钱 荆芥一钱 川芎一钱 当归（酒洗）一钱 连翘一钱 白鲜皮（炒）一钱 白牵牛（炒）一钱 牛膝七分 皂角刺一钱 生甘草五分 金银花一钱 细辛三钱 土茯苓四两

【用法】水煎服。

【主治】杨霉结毒。

【方论选录】防风、荆芥散经隧之毒；川芎、当归活血而行之；连翘散结热；白鲜皮泻毒，

使出于小肠膀胱；白牵牛走气分，逐小肠膀胱之毒而出之，盖毒本自肾，故仍自肾腑而逐之；牛膝达周身之毒，使之下行；皂角刺达于毒所结之所，而破其结；生甘草，金银花解毒而以和缓；用细辛以尽拔肾部之积毒而散之行之；土茯苓解下部之毒为君，而臣以细辛以拔根本之毒。

68585 破结散

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《三因》卷十五。

【异名】破血散（《秘传外科方》）。

【组成】海藻 龙胆 海蛤 通草 昆布 礞石（一作矾石） 松萝各三分 麦曲四分 半夏二分

【用法】上为细末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。十日知，二十日愈。

【主治】石瘕、气瘕、劳瘕、土瘕、忧瘕等。

【宜忌】禁食鱼、猪肉、五辛、生菜、诸难消之物。

【临证举例】瘰癧 《医学正传》：有人于项上生瘰，大如茄子，潮热不食，形瘦日久，百方不效，后得此方，去松萝，加真桑寄生一倍服。三五日后，其疮软而散，热退而愈。屡医数人皆效。

【备考】《秘传外科方》有贝母（去心）三分。改为丸剂，名“海藻散坚丸”（见《医学入门》卷八），蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，临卧葱白煎汤送下，并含化咽之。

68586 破根散

【方源】《风劳臌膈四大证治》。

【组成】南星五分 冰片少许

【用法】以中指末点末，擦牙根。

【主治】中风闭证，口噤不开。

68587 破积丸

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】大黄一斤 牡蛎三两 凝水石一两 石膏一两 石钟乳一两 理石一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，先食服，酒、饮任下，一日三次。

不知，稍增，以知为度。

【主治】积聚坚癥。

68588 破积丸

《外台》卷七。为原书同卷引《深师方》“芫花丸”之异名。见该条。

68589 破积丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】木香一两 青橘皮（汤浸，去白，焙）一两 桂（去粗皮）一两 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）三两 硃砂（醋熬成霜，研末）一钱匕 巴豆霜半钱匕

【用法】前四味为末，与硃砂、巴豆霜同拌研匀，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服三丸，加至五丸，早、晚食后临寝服。大便溏为度。

【功用】化肠胃食滞。

【主治】小儿哺露，疳气腹满，发热。

68590 破积散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】秦艽一钱 乌药（童便炒）一钱 黄芩 益母草 海藻 当归各一钱半

【用法】杉节三个为引。

【主治】酒凝血注作疽，红肿作痛，骨节痠麻。

68591 破积散

【方源】《回春》卷五。

【组成】香附米四两（醋浸煮干） 梔子仁（炒黑）二两 三棱 莪术 郁金 枳壳 黄连 大黄各一两

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服三二十丸，淡姜汤送下。

【主治】心气痛，食积肚腹痛，饮热积块痛，症属实热者。

【备考】本方方名，据剂型，当作“破积丸”。

68592 破假汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参三钱 白术五钱 陈皮一钱 神曲五分 柴胡二钱 山楂十粒 甘草五分 白芍五钱 鳖甲三钱 石膏一钱 半夏一钱

【用法】水煎服。一剂恶寒除，二剂发热解，

四剂如疟之症全愈。

【主治】春月伤风八九日，如疟之状，发热恶寒，热多寒少，口不呕吐。

68593 破棺丸

《痘疹仁端录》卷十。为《卫生宝鉴》卷十三“破棺丹”之异名。见该条。

68594 破棺丹

《圣惠》卷二十五。即原书同卷“灵宝丹”加芒消。见该条。

68595 破棺丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】硫黄一两（无灰酒煮三日三夜，如耗，旋添暖酒，日足取出，研为末） 丹砂一两（研匀细）

【用法】上以酒煮糊为丸，如鸡头大。有此病者，先于净室中，勿令人知，度病人长短，掘一地坑子，深一尺以来，用苜蓿火烧，令坑子极热，以醋五升沃，令气出，内铺衣被盖坑，以酒化下一丸，与病人服之。后令病人卧坑内，盖覆，少时汗出，即扶病者，令出无风处盖覆。令病人四肢温，心下软，即渐去衣被，令通风。然后看虚实调补。

【主治】阴厥。面目俱青，心下硬，四肢冷，脉细欲绝者。

68596 破棺丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】大黄一两半 甘草二两 荆三棱一两半 山梔子三两半 牵牛末二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，食后酒半盏研化。

【主治】一切恶疮。

【宜忌】忌冷水。

68597 破棺丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】破棺急救丹（《外科启玄》卷十一）、破棺丸（《痘疹仁端录》卷十）。

【组成】大黄二两（半生半熟） 芒消 甘草各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，食后茶清、温酒任化下，童便半盏

研化服亦得。

【主治】诸热疮肿，疮气入腹，谵语发狂。

①《卫生宝鉴》：疮肿，一切风热。②《准绳·疡医》：疮气入腹，危者。③《外科理例》：疮肿热极，汗多大渴，便秘，谵语或发狂，结阳之证。

【宜忌】忌冷水。

68598 破棺丹

【方源】《瑞竹堂方》卷五引史相方。

【组成】赤芍药二两 当归二两 山梔子二两半 甘草 牵牛（头末）一两半 大黄三两半 牡蛎（煅）一两半 金银花一两半 京三棱一两（切片，焙干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食前用童子小便化开服之。病重者服一丸半。

【主治】疔黄走晕不止。

【宜忌】忌酒、生硬物。

【备考】《普济方》有连翘、地黄。

68599 破棺丹

【方源】《本草纲目》卷十一引《经验方》。

【异名】破关丹（《外科理例·附方》）。

【组成】蓬砂 白梅各等分

【用法】捣为丸，如芡实大。每噙化一丸。

【主治】咽喉肿痛。

68600 破棺丹

【方源】《口齿类要》。

【异名】通关散（原书同卷）、破棺散（《良朋汇集》卷三）、破管散（《沈氏经验方》）。

【组成】青盐 白矾 硃砂各等分

【用法】上为末。吹患处。有痰吐出。

【主治】①《口齿类要》：咽喉肿痛，水谷不下。②《良朋汇集》：乳蛾闭塞，缠喉。

68601 破棺汤

【方源】《医心方》卷十四引《唐本草》。

【异名】干粪汤（《外台》卷三引《救急方》）、逐疫七宝丹（《松峰说疫》卷二）。

【组成】人屎（干者）

【用法】烧之烟绝，水渍。饮汁。

【主治】伤寒热病，热极口渴，谵妄，口鼻出血，及诸热毒、蛊毒。

①《医心方》引《唐本草》：伤寒热毒。②《外台》引《救急方》：天行病，舌燥如锯，极渴，不能服药者。③《东医宝鉴·杂病篇》：伤寒热病发狂，心燥，言语不定，不省人事。④《松峰说疫》：时疫热毒，口鼻出血；及诸热毒并蛊毒。

【备考】《松峰说疫》本方用人尿尖七枚，约枣栗大，烧红色，取出即入冷水中研细，再顿服。

68602 破棺散

《得效》卷十。为《本事》卷十“半夏散”之异名。见该条。

68603 破棺散

《普济方》卷八十九引《经验良方》。为《证类本草》卷十一引《经验方》“开关散”之异名。见该条。

68604 破棺散

《良朋汇集》卷三。为《口齿类要》“破棺丹”之异名。见该条。

68605 破棺煎

【方源】《医方类聚》卷一〇五引《备预百要方》。

【组成】猪胆汁 生姜汁

【用法】用米醋半合和。灌下部中，以手急捻，待气上至喉中乃除手，必下五色恶物及细赤小虫子。若未愈，更灌，不过三次。

【主治】干呕羸瘦，多睡，面痿黄，不下食，变为陋。见该条。

【宜忌】忌一切毒物。

68606 破隘汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】桔梗三钱 甘草二钱 柴胡一钱 白芍五钱 玄参三钱 麻黄一钱 天花粉三钱 山豆根一钱

【用法】水煎服。一剂而咽喉宽，再剂而双蛾尽消矣。

【主治】感冒风寒，阳火壅阻于咽喉，一时咽喉肿痛，其势甚急，变成双蛾者，其症痰涎稠浊，口渴呼饮，疼痛难当，甚则勺水不

能入喉。

【方论选录】方中散太阳之邪者居其二，散各经之邪者居其五，尤加意子散肺之邪者，由近以散远也。

68607 破瘀丹

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】水蛭（炒干黑）二钱 当归 白芍各一两 茯苓三钱 肉桂三分 桃仁十四个 生地五钱 枳壳五分 猪苓一钱

【用法】水煎服。二剂全愈。

【主治】太阳膀胱之经，有瘀血结住而不散，人一过午时，吐酸水一、二碗，至未时心前作痛，至申痛甚厥去，不省人事，至戌始苏，日日如是。

68608 破瘀汤

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《伤科汇纂》卷八。

【组成】荆芥半分 廋虫三十枚 大黄 川芎各三两 蒲黄五两 当归 桂心 甘草各二两 桃仁三十枚

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三次服。

【主治】腹中瘀血痛，瘀在腹中不出，满痛短气，大小便不通。

68609 破瘀汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】甘草三钱 茯苓三钱 丹皮三钱 桂枝三钱 丹参三钱 桃仁三钱（泡，去皮尖） 干姜三钱 首乌三钱（蒸）

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】肝血瘀滞，肌肤枯槁，目眦青黑者。

68610 破瘀丸

《医统》卷四十三引《医林方》。为《三因》卷十三“破饮丸”之异名。见该条。

68611 破管散

《沈氏经验方》。为《口齿类要》“破棺丹”之异名。见该条。

68612 破颜丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】丹砂三分 麝香半分 冰片一分

雄黄一钱

【用法】上为细末。将末搽于痛处。口吐涎而痛立止。

【主治】人有多食肥甘，热气在胃，胃火日冲于口齿之间，而湿气乘之，湿热相搏而不散，乃虫生于牙齿，牙破损而作痛，如行来行去者，乃虫痛也。

68613 破癖方

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】白术 枳实(炙) 柴胡各三两

【用法】上咬咀。以水五升，煮取二升，分三次服，每日三次。可至三十剂。

【主治】癖积。

【宜忌】《医方类聚》引《烟霞圣效方》：忌桃李、雀肉，一切发病之物。

【备考】本方方名，《医方类聚》引《烟霞圣效方》作“破癖汤”。

68614 破癖汤

《医方类聚》卷一一三引《烟霞圣效》。即《千金翼》卷十九“破癖方”。见该条。

68615 破癥丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】巴豆十枚(去皮心，研，纸裹压去油) 川乌头一分(炮裂，去皮脐) 胆子矾一分 五灵脂一分 芫花二分(醋拌，炒令干) 百草霜一分

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如绿豆大。每服五丸，以生姜醋汤送下。

【主治】妇人食癥块，攻心腹疼痛。

68616 破癥丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】硃砂一两半 硫黄一两 水银一钱

【用法】以不着油桃子，先下硫黄，次下硃砂，以箸搅令匀，次入水银，又搅炒令稍黑，不绝烟便倾出，候冷细研，以醋浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服三丸，食前以当归酒送下。

【主治】妇人产后，积聚癥块疼痛。

68617 破癥散

【方源】方出《外台》卷十二引《集验方》，名

见《普济方》卷一七三。

【组成】雄鸡一只

【用法】饲之令肥，肥后饿二日，以好赤朱搜饭，极令朱多以饲鸡，安鸡着板上，取粪晒燥为末。每服五分匕，可至方寸匕，温清酒送下，一日三次。若病困急者，昼夜可服五六次。一鸡少，更饲余鸡取足。

【主治】①《外台》：引《集验方》：心腹宿癥及卒得癥。②《普济方》：久积癥癖不愈，渐至羸弱。

68618 破伤风散

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】苍术(火烧) 草乌

【用法】上为细末。酒服之。汗出为度。

【主治】破伤风。

68619 破伤风膏

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】血竭 藁本各三钱 茴香六钱 乳香 没药各一钱 轻粉二钱 黄丹 黄蜡各一两 麻油四两

【用法】上各另为末，将油、蜡熬化调匀，入麝香、朱砂少许。摊贴。

【主治】小儿破血伤风，跌仆、破损皮肤，风邪乘袭发肿。

68620 破血金丹

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】香附十两(醋制) 艾叶四两(焙干) 当归二两(酒浸一宿，醋煮，焙干) 红花一两(焙干) 桃仁一两(去皮尖)

【用法】上为末，醋糊为丸。每服二钱，淡醋汤送下，早、晚各服一次。经通药止。

【主治】妇女月经不通，腹痛有块者。

68621 破块验丸

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】吴茱萸 黄连 木香 槟榔 桃仁 郁李仁

【主治】积聚。

68622 破故纸丸

【方源】《普济方》卷二四一引《海上方》。

【异名】健步丸。

【组成】破故纸(炒) 葫芦巴(炒) 牛膝(酒浸一宿) 舶上茴香(酒浸一宿,炒) 肉苻苳(酒浸一宿) 川续断(拣净,生) 杜仲(削去粗皮,生姜汁制一日一夜,炒丝断,黄) 各四两 (一方无苻苳)

【用法】上为细末,用艾四两(去枝梗秤),以大木瓜四个,切作合子,去尽瓢,以艾及药末实之,用麻线扎定,饭上蒸三次,烂研,和药为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,食后温酒盐汤送下。

【主治】寒湿脚气,疼痛不止。

68623 破故纸丸

《魏氏家藏方》卷六。即《圣济总录》卷九十一“补骨脂散”改作丸剂。见该条。

68624 破故纸散

【方源】《普济方》卷三十三引《三因》。

【组成】破故纸 青盐(同炒香) 各等分

【用法】上为末。每服二钱,用米饮调下。

【主治】丈夫元气虚惫,精气不固,余沥常流,小便白浊,梦寐频泄,及妇人血海久冷,白带、白浊、白淫,下部常湿,小便如米泔,或无子息。

68625 破故纸散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】破故纸 石菖蒲各等分(并锉,炒)

【用法】上为末。每服二钱,用菖蒲浸酒调,温服,更人斑蝥五分(去翅、头、足,糯米同炒黄,去米)。

【主治】赤白带下。

68626 破故纸散

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】破故纸一两(炒)

【用法】上为末。每服一钱,热汤调下。

【主治】①《袖珍小儿》:小儿遗尿。②《准绳·幼科》:小儿膀胱虚冷,夜间遗尿或小便不禁。

【备考】《续名家方选》本方用法:破故纸一味,酒蒸七次,为散。令病者含一蚬壳许,胡

麻、盐和匀服。

68627 破滞气汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】木香化滞散(原书同卷)、木香化滞汤(《赤水玄珠》卷五)。

【组成】炙甘草四分 白檀 藿香 陈皮 大腹子 白豆蔻仁 白茯苓 桔梗各五分 砂仁 人参 青皮 槟榔 木香 姜黄 白术各二钱

【用法】上咬咀。每服三钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【功用】破滞气。

【主治】心腹满闷。

【宜忌】《准绳·杂病》:忌生冷硬物。

68628 破瘰点药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】水银 硼砂 轻粉 鹊粪 鸢粪 各一钱 冰片五分 樟脑五分 绿矾一钱 皂矾一钱 麝香三分

【用法】上为细末。用针将瘰刺一小孔,然后乘其出血之时,将药点上,则粘连矣,约用一分,以人乳调之,点上大如芡实,一日点三次,第二日必流水,流水之时不可再点,点则过疼,转难收口矣。三日后水尽,而皮宽如袋,后服煎方:人参三钱,茯苓五钱,苡仁一两,泽泻二钱,猪苓一钱,黄耆一两,白芍五钱,生甘草一钱,陈皮一钱,山药三钱,水煎服。十剂全消。

【主治】瘰癧。

【宜忌】忌房事半年。若犯房事,必破不能收口,终身成漏矣。

68629 破瘰癧散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】当归 生地 白芍(炒) 各一钱 川芎七分 黄连(炒) 五分 胡黄连三分

【用法】水二钟,煎七分服。

【主治】瘰癧血虚,五心烦热,昼则平安,夜则发热。

68630 破血红花散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】当归梢 川芎 赤芍药 枳壳 苏叶 连翘 黄连 黄耆 栀子 大黄 苏木 红花 白芷 薄荷 升麻各等分

【用法】水煎，加酒三盏，温服。

【主治】心热血旺，血翳包睛，痛者。

68631 破血红花散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】红花 归尾 赤芍 肉桂 枳壳 甘草各一钱 人参六分 藏灵仙七分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，热服。如不下，加酒一钟，再服一帖，立下。

【主治】胞衣不下。

68632 破血明目汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】生地 18 克 赤芍 当归尾 刘寄奴各 9 克 苏木 6 克 茜草 9 克 血竭 6 克 益母草 9 克

【功用】祛瘀通络。

【主治】由外伤而致之血灌瞳神。

【加减】痛甚者，加没药 6 克以活瘀止痛；眼眶青肿者，加大黄 9 克以逐瘀消肿。

【方论选录】方中生地、赤芍、当归尾活血凉血；刘寄奴、苏木、血竭活血祛瘀；茜草止血活血；益母草去瘀生新。

【临证举例】血灌瞳神 崔某，女，38 岁。初诊：10 天前被土块打伤右眼，现已不痛，稍有胀感，满目红光，不能见物。检查：白睛淡赤，青睛内面下方有少量积血，瞳神散大，呈一片鲜红，仅辨明暗，不辨人物。眼底不能窥见。此为血灌瞳神，治以破血明目汤加香附 9 克。服药 15 剂。复诊：青睛下方积血已尽，瞳神稍有缩小，色转暗红。上方再服十剂，视力：右眼达 0.08，左眼 1.5。给明目地黄丸常服。

68633 破血消痛汤

《准绳·疡医》卷六。即《兰室秘藏》卷中“破血散疼汤”。见该条。

68634 破血散疼汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】破血散痛汤（《东垣试效方》卷六）、破血散（《玉机微义》卷四十三）。

【组成】羌活 防风 中桂各一钱 苏木一钱五分 连翘 当归梢 柴胡各二钱 水蛭三钱（炒去烟尽，别研） 麝香少许（别研）

【用法】分二次服，每服酒二大盏，水一大盏，除水蛭、麝香另研如泥，煎余药作一大盏，去滓，上火令稍热，调二味，空心服之。

【主治】乘马损伤，跌其脊骨，恶血流于肋下，其痛苦楚，不能转侧，妨于饮食。

【备考】本方方名，《准绳·疡医》引作“破血消痛汤”。

68635 破血散痛汤

《东垣试效方》卷六。为《兰室秘藏》卷中“破血散疼汤”之异名。见该条。

68636 破血散聚汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】桃仁 红花 归尾 牛膝各一钱 三棱 蓬术各二钱 苏木 木通 官桂 青皮 穿山甲各八分

【用法】酒煎，空心服。

【主治】血臌肿胀，坚硬如石，朝宽暮急，脐凸发喘。

68637 破血紫金丹

【方源】《便览》卷四。

【组成】红娘子（去足翅）三钱 斑蝥（去足翅）六双 血竭五分 头红花三分

【用法】上为细末。每服五七分，黄酒调下。

【主治】妇人经水不调，干血气劳。

68638 破证夺命丹

【方源】《百一》卷七。

【异名】人参汤（《直指》卷二十六）、破证夺命散、独参汤、独柱汤（《内经拾遗》卷一）、夺命独参汤（《普济方》卷一三三引《德生堂方》）、破证夺命汤（《普济方》卷一三五）、坏证夺命散（《丹溪心法附余》卷一）、夺命散（《医统》卷七十六）。

【组成】人参一两（去芦，薄切）

【用法】水一大升，银石器内煎至一盞，以新水沉之，取冷一服而尽。汗不自它出，只在鼻梁尖上，涓涓如水，是其应也。

【功用】《中医大辞典·方剂分册》：益气固脱。

【主治】伤寒坏证，元气大亏，阳气暴脱，喘息脉微，吐血咯血等。

①《百一》：伤寒阴阳二症不明，或投药错误致患人困重垂死，七八日以后皆可服。②《直指》：吐血咯血。③《内经拾遗》：气虚喘急。④《中医大辞典·方剂分册》：元气大亏，阳气暴脱，面色苍白，神情淡漠，肢冷汗出，脉息微弱；近代也用于大出血，创伤性休克，心力衰竭等重症的抢救。

【临证举例】时疫坏证 申某之子妇，产后病时疫已二十余日，已成坏证，偶见闻，因劝其只服一味人参遂安。

【备考】①本方方名，《本草纲目》引作“复脉汤”。②《内经拾遗》本方用法：水二钟，红枣十个，煎八分，食后温服。

68639 破证夺命汤

《普济方》卷一三五。为《百一》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

68640 破证夺命散

《内经拾遗》卷一。为《百一》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

68641 破毒无比散

《准绳·疡医》卷一。为《医方类聚》卷一八九引《修月鲁班经》“破毒天下无比散”之异名。见该条。

68642 破毒雄黄丸

【方源】《得效》卷十九。

【组成】通明雄黄 颗块大朱砂各三钱 水银二钱 斑蝥二十八个（去足翼，用糯米炒黄）

【用法】上先以斑蝥为末，续以雄黄、朱砂另研为末，再入水银研细合和，用鸡子清和糯米稠糊为丸，如绿豆大。每服二七丸，米

饮或温酒下。立见逐下恶物，自小便中来。如恶物未见，半朝再一服。

【主治】瘰癧久作不愈，寒热往来，项筋挛急，已破未破者。

68643 破逆化斑汤

【方源】《仁端录》卷十四。

【组成】山楂 丹参 荷鼻 苏木 紫草

【主治】痘疮逆血发斑；及儿受跌扑责打，发热之极，脐下发棱角斑者。

【备考】本方治上症与解毒化斑汤同服。

68644 破逆化斑汤

【方源】《痧痘集解》卷六。

【组成】玄参 川连 黄芩 知母 山梔 柴胡 芦根 丹参 荷鼻 桃仁 丹皮 石膏 木通 茜草 苏木

【主治】痘疮逆血发斑，及脐下有棱角者。

68645 破积导引丸

《医统》卷三十三。为《卫生宝鉴》卷十四“破积导引丸”之异名。见该条。

68646 破积导引丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【异名】破积导引丸（《医统》卷三十三）。

【组成】槟榔 陈皮（去白） 广木香 青皮（去白） 枳壳（麸炒） 枳实（麸炒） 广茂（炮） 半夏（泡七次） 京三棱（泡） 神曲（炒） 麦蘖（炒） 干生姜 茯苓（去皮） 甘草（炙） 泽泻各五钱 牵牛（头末）二钱 巴豆三个（去心膜，取霜）

【用法】上为末，入巴豆匀，生姜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温姜汤送下。

【主治】积块坚硬，饮食不消，心下痞闷。

【备考】《理渝》无茯苓、枳实，有黄连、车前子。

68647 破脓如神散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】老紫皂角针（麸炒令黄色） 当归（去芦） 赤芍药 川芎（不见火）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，人乳香少许，酒一大盞，煎一二沸服之，不溃再服。

【主治】痈疽未溃者。

68648 破黄七神丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】朴消二斤 朱砂五两 大黄七两 甘遂二两 山梔二两 轻粉一两 豆豉半斤 (以绢袋盛之)

【用法】上以水二斗，熬令水尽，除去甘遂、豉、梔子、大黄，只取朴消、朱砂、轻粉为末，以水浸豉汁，研匀后入末三味同和，煮糯米糊为丸，如弹子大。每服一丸，新水化下。吐泻为度。

【主治】阳厥发狂，将成疸。

68649 破蛊全生汤

【方源】《疡医大全》卷三十九。

【组成】人参 当归各一两 白矾 生甘草 半夏各三钱 白茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】中蛊毒。

【方论选录】矾石消痰，又善化坚，蛊积腹中，内必坚硬，而外以痰包之，所以一物二用，奏功颇神。惟人身柔弱者多，强健者少，而蛊结胸腹间必正气大虚，尚用矾石，不更虚其虚乎？必于补气血之中加消痰化蛊之味，有益无损，始称万全也。

68650 破棺千金汤

《外台》卷三引《张文仲方》。为《肘后方》卷二“破棺千金煮汤”之异名。见该条。

68651 破棺夺命丹

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】山甲 黄芩各四两 紫草 蝉蜕 牛蒡 龙胆草 防风 荆芥 黄柏 知母 连翘各五钱

【用法】同煮二昼，令汁收尽，独将山甲瓦罐固济，煨半炷香，冷定为末，每用三两，麝香一钱，蟾酥五分，共为末。每服三分五厘，好酒下；重者五分，如欲出不出，只服一分，俱要禁口；虚者，保元汤下。

【主治】痘青干紫黑，已出未出。

68652 破棺急救丹

《外科启玄》卷十一。为《卫生宝鉴》卷十三

“破棺丹”之异名。见该条。

68653 破滞回源汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】当归 赤芍 青皮 桃仁各一钱 陈皮 天冬 香附 厚朴 麻仁各一钱五分 元胡 灵脂各六分 甘草三分

【用法】木香（另研）三分为引，兑服。

【主治】吐血不休，口作血腥，左胁作痛。

68654 破痰消饮丸

【方源】《百一》卷五引何自然方。

【组成】青皮（洗） 陈皮（洗） 川姜（炮） 京三棱（灰炮碎用） 蓬术（灰炮碎用） 良姜（湿纸裹煨） 草果（面裹炮）各一两 半夏三两（汤泡七次）

【用法】上并焙干，为细末，水煮糊为丸，如梧桐子大，阴干。每服五十丸，姜汤或热水送下，不拘时候。

【主治】一切气，一切饮。

68655 破壁擒王饮

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】大黄四两 黄芩五钱 连翘四钱 防风三钱 黄连二两 莪术三钱 梔子五钱 荆芥三钱 黄柏五钱 槟榔三钱 薄荷二钱 桔梗一钱 前仁五钱 甘草一钱

【主治】瘟疫黄喉。

【方论选录】破壁擒王一方，为专治黄疫喉之专剂而最峻者。以三黄攻毒；以荆、防、薄、翘解散其党；以莪术、槟榔作先锋，领猛将健卒直捣巢穴；以山梔泻三焦之热，桔梗载其上浮，车前引其下行，三路合兵，俾无隙漏；以甘草调和诸将，协力同心，以成大功。

【临证举例】黄疫喉 邑庠生某故弟，蔚南肆业师也。一日，弟过其馆，以喉初起微痛，令诊视，曰：得毋黄疫喉乎？曰：然。以破壁擒王饮与之，大黄、黄连各四两，三服不下，弟邀余同往视之，服大黄、黄连各六两，始下而愈。弟又治一老妇，年七十，骨瘦如柴，染疫黄喉，亦投本方，大黄、黄连各重至六两始痊。

68656 破棺千金煮汤

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】破棺千金汤(《外台》卷三引《张文仲方》)、苦参汤(《圣济总录》卷二十二)、苦参酒(《卫生总微》卷七)。

【组成】苦参一两

【用法】上咬咀。以酒二升半，令得一升半，去滓，适寒温，尽服之。当间苦寒，吐毒如溶胶便愈。

【主治】①《肘后方》：时气行，垂死者。②《外台》引《延年秘录》：夫行病四五日，结胸满痛，壮热者。

68657 破毒天下无比散

【方源】《医方类聚》卷一八九引《修月鲁般经》。

【异名】破毒无比散(《准绳·疡医》卷一)。

【组成】猪牙皂角(去皮，如法醋炙焦黄，为末)半钱 川山甲(蛤粉炒，为末)一钱

【用法】相合，温酒调下。证在上，食后服；证在下，食前服。

【主治】①《医方类聚》：疔疮。②《准绳·疡医》：痈疽无头，但肿痛。

夏

68658 夏炷丹

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】硫黄三分 茴香半两 朱砂三分 木香 草澄茄 附子各半两 川楝子十个 天麻一两 胡芦巴 白矾各半两 沉香 天南星 乌头各一两 延胡索一百个

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，更用朱砂为衣。每服作绵灰三钱，热酒调下，嚼破一丸，立效。如鸡头大，可加至二丸。

【主治】小肠元气发不可忍者，脚膝疼无力，脐腹冷疼，脾元冷气。

【宜忌】忌房色四十九日。

夏

68659 夏冰

《眼科锦囊》卷四。为原书同卷“神效水”之异名。见该条。

68660 夏枯膏

《良朋汇集》卷五。即《增补内经拾遗》卷四引《经验良方》“夏枯草汤”改作膏剂。见该条。

68661 夏枯草汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四引《经验良方》。

【异名】夏枯草散(《医学入门》卷八)。

【组成】夏枯草六两

【用法】上作一服。水二钟，煎七分，食远温服；虚甚当浓煎膏服，并涂患处。

【功用】《全国中药成药处方集》(天津方)：化痰止痛，解热散结。

【主治】①《增补内经拾遗》引《经验良方》：瘰癧马刀、不问已溃未溃，或日久成漏。②《良朋汇集》：痈疽发背，无名肿毒。

【备考】本方改作膏剂，名“夏枯草膏”(见《医学入门》)，又名“夏枯膏”(见《良朋汇集》)。《良朋汇集》本方用法：茎叶捣烂，取汁熬膏，贴之；破者，白滚水调服二三茶匙。

68662 夏枯草汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】夏枯草散(《一盘珠》卷五)。

【组成】夏枯草二钱 当归三钱 白术茯苓 桔梗 陈皮 生地 柴胡 甘草 贝母 香附 白芍各一钱 白芷 红花各三分

【用法】先用夏枯草，水三碗，煎至二碗，滤清，同药煎至八分，食后服；将药滓同前夏枯草滓，共再煎六七分，临卧时入酒半小钟和服。

【主治】瘰癧马刀，不问已溃未溃，或已溃日久成漏，形体消瘦，饮食不甘，寒热如疟，渐成瘰癧。

【宜忌】宜食淡味物件。

68663 夏枯草汤

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】金银花五钱 夏枯草二两 柴胡七分 贝母二钱 土茯苓(白色者)二两 鼠

粘子一钱(微炒) 鳖虱胡麻仁二钱(微炒) 酸枣仁二钱 栝楼仁二钱(略炒) 陈皮一钱 皂角子一钱 白芍药(酒炒)一钱 当归身二钱 粉甘草一钱 荆芥穗一钱 连翘一钱五分 何首乌五钱 漏芦二钱

【用法】水煎，食后服。

【主治】瘰癧。

68664 夏枯草汤

【方源】方出《临证指南医案》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】桑叶 夏枯草 连翘 草决明 赤芍

【主治】风温上郁，目赤，脉左弦。

68665 夏枯草汤

【方源】《名家方选》。

【组成】夏枯草三钱 大黄三分 甘草二分

【用法】水煎，顿服。

【主治】瘰癧马刀，不问已溃未溃。

【宜忌】宜节食肉物，饮醇酒。

68666 夏枯草汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】夏枯草三钱 玄参 黄芩 土贝母 金银花 连翘 天花粉 薄荷 桔梗各一钱 甘草节三分

【用法】灯心一握，水煎。

【主治】瘰癧。

【加减】郁怒，加香附、柴胡、钩藤、远志；血虚加当归、白芍；血热，加生地、牡丹皮。

68667 夏枯草汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】夏枯草 防风 荆芥 苍术 甘菊 川芎 蔓荆子 白芷

【主治】疹正潮时，冷风入眼或扇风入眼，或冷水洗眼，致余毒留于锐眦，蕴结不散，迎风流泪，遇夏暂愈，逢冬益甚，久之则四季常流，遂成终身风泪久病者。

68668 夏枯草散

【方源】方出《本草纲目》卷十五引《圣惠》，名见《普济方》卷三五二引《海上名方》。

【组成】夏枯草

【用法】上为末。每服方寸匕，米饮调下。

【主治】血崩不止。

68669 夏枯草散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六引《简要济众方》。

【异名】补肝散(《东医宝鉴·外形篇》卷一引《本事》)。

【组成】夏枯草 香附子各一两 甘草四钱

【用法】上为末。每服一钱五分，茶清调下。

【主治】厥阴郁火，目珠痛，夜则痛甚，或用苦寒药点上反疼甚者。

【备考】本方方名，《仙拈集》引作“茶调散”。

68670 夏枯草散

【方源】《普济方》卷二九六引《卫生家宝》。

【组成】夏枯草一两 荆芥一两 枳壳半两 轻粉半钱 龙胆草半两 朴消一两 灯芯一握

【用法】上为粗末。用水七碗，煎至三碗，先乘热熏，通手洗之，冷即止。

【主治】痔漏。

68671 夏枯草散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】夏枯草 大香附(杵净，童尿浸一宿，晒) 木贼(去节，童尿浸，晒) 蚕蜕纸(炒焦存性) 细辛 连翘 川芎 当归须 赤芍药 蝉蜕(洗，晒)各半两 甘草(微炙) 脑荷各二钱半

【用法】上为末。每服二钱，茶清、米泔任下。无蚕纸，以夜明砂代用。

【主治】眼痛痒，翳膜。

68672 夏枯草散

《医学入门》卷八。为《增补内经拾遗》卷四引《经验良方》“夏枯草汤”之异名。见该条。

68673 夏枯草散

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷八引《医学入门》。

【组成】夏枯草末六钱 甘草末一钱

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下。

【功用】散结气，补养厥阴血脉。

【主治】瘰癧。

68674 夏枯草散

《济阳纲目》卷一〇一。为《证类本草》卷十一引《简要济众方》“补肝散”之异名。见该条。

68675 夏枯草散

《一盘珠》卷五。为《外科正宗》卷二“夏枯草汤”之异名。见该条。

68676 夏枯草散

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】夏枯草 生香附 厚朴 橘红 神曲 牡蛎 泽泻 半夏 茯苓 赤芍 郁金

【功用】疏肝解郁，活络软坚。

【主治】颈项痰核。

68677 夏枯草膏

《医学入门》卷八。即《增补内经拾遗》卷四引《经验良方》“夏枯草汤”改作膏剂。见该条。

68678 夏枯草膏

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】京夏枯草一斤半 当归 白芍(酒炒) 黑参 乌药 浙贝母(去心) 僵蚕(炒)各五钱 昆布 桔梗 陈皮 抚芎 甘草各三钱 香附(酒炒)一两 红花二钱

【用法】上药共入砂锅内，水煎浓汤，布滤去滓，将汤复入砂锅内，慢火熬浓，加红蜜八两，再熬成膏，瓷罐收贮。每用一二匙，滚水冲服；亦可用薄纸摊贴。

【功用】化硬消坚。

【主治】①《金鉴》：男妇小儿，忧思气郁，肝旺血燥，瘰癧坚硬。②《全国中药成药处方集》(杭州方)：瘰癧坚硬，结核肿痛，痈疖肿毒，目珠夜痛等症。

【宜忌】戒气怒、鱼腥。

68679 夏冰对配丹

《种福堂方》卷四。即原书同卷“白降丹”加半夏、冰片。见该条。

68680 夏冰对配丹

《许订外科正宗》卷二。即原书同卷“白降丹”加半夏、冰片。见该条。

68681 夏陈六君汤

【方源】《镐京直指》。

【组成】西潞党三钱 江西术二钱(炒) 白茯苓三钱 仙半夏二钱 橘红八分 炙甘草四分 怀山药三钱 炒枣仁三钱 生苡仁六钱 老姜二片(去皮) 大枣三个(擘)

【主治】劳倦伤中，脾虚咳嗽，饮食不强，痰薄易出。

68682 夏枯扶桑丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】金银钝花二斤 百合一斤 真阿胶八两(炒) 川贝母(去心)八两

【用法】上为末，用夏枯草、桑叶各二十斤，熬汁煎膏为丸，重三钱。肺痿、肺癰，百合汤下；心颤，朱砂、麦冬汤下；久嗽，五味汤下；肠痈、乳痈，带壳瓜蒌仁汤下；肝中少血，烦躁不宁，白芍、地骨皮汤下；痲痺，雄黄冲开水下；疔疮，醋磨敷患处，仍用引经药服之；阴疮不可言者，痛痒难当，车前子、牡蛎粉煎汤下。

【主治】一切疮疡，内伤阴虚，癆瘵咳嗽，痰喘血症，及目疾等。

68683 夏姬杏仁方

【方源】《千金》卷十二。

【异名】杏金丹、草金丹(《证类本草》卷二十三引《左慈秘诀》)、夏姬杏金丹(《遵生八笺》卷五)。

【组成】杏仁三升

【用法】纳汤中，去皮尖双仁，熟捣，盆中水研，取七八升汁，以铁釜置塘火上，取羊脂四斤，摩釜消之，纳杏仁汁，温之，四五日，色如金状。每服如弹子大，一日三次。

【功用】①《千金》：肥白易容。②《遵生八笺》：驻颜悦色。

【备考】本方方名，《千金方衍义》引作“夏姬杏仁煎”。

68684 夏姬杏仁煎

《千金方衍义》卷十二。即《千金》卷十二“夏姬杏仁方”。见该条。

68685 夏姬杏金丹

《遵生八笺》卷五。为《千金》卷十二“夏姬杏仁方”之异名。见该条。

68686 夏英公酒浸饮子

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】防风(细锉) 草薢 羌活 秦艽 牛膝 败龟 虎骨 桔梗 晚蚕沙(炒黄)各二两 枸杞子(炒)五两 苍耳五升(去刺,捶碎,酥炙) 干茄根八两(洗,锉,蒸熟)

【用法】用好酒二斗浸,瓶盛封闭二七日,开不得面向,恐气冲头目。每日午时空心及早晨各服一盏,常令有酒气一月。

【主治】风毒、湿痹、瘫痪。

68687 夏季补肾肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】附子一两(炮裂,去皮脐) 桂心一两半 白茯苓一两 石南三分 山茱萸三分 石斛三分(去根,锉) 人参一两(去芦头) 杜仲三分(去粗皮,炙微黄,锉) 当归一两(锉,微炒) 五味子一两 熟干地黄二两 泽泻一两 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皴皮,炙令干) 磁石二两(捣碎,水淘去赤汁,以帛绢包之)

【用法】上为粗散。每服五钱,水一大盏,以羊肾一对,切去脂膜,人生姜半分、大枣三个,每与磁石包子同煎至五分,去滓,食前温服。

【功用】补肾。

【主治】肾虚。

原

68688 原蚕茧汤

《医学正传》卷五。为《直指》卷十七“茧丝汤”之异名。见该条。

68689 原蚕蛾散

【方源】《普济方》卷一一一引《圣惠》。

【组成】原蚕蛾(炒)一分 白僵蚕(炒)

半两 蝉蜕(炒) 地龙(白色少泥者,微炒)各一两

【用法】上为散。先用干脯一片炙熟,安病人所卧席底当痛处,不得令知。若其夜痛甚难治,痛缓即易治,来日待病人起后,取脯看必有异色者。脯色赤,每服用散三钱匕;脯色青黯,每服四钱匕,温酒或米饮调下。空心服药后,更吃酒令小醉,汗出即愈。

【主治】白虎风,昼夜游走疼痛。

逐

68690 逐尸饮

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参三分 白术二钱 山茱萸五钱 鳊鱼骨(烧灰)一钱

【用法】水煎服。

【主治】人有感染尸虫,遂至酿成传尸癘。

68691 逐气丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】沉香二钱 破故纸(微炒) 槟榔各半两 郁李仁二十五枚 黑牵牛四两(一半生,一半熟用) 大皂角十挺(水浸,捶碎,滤去滓,慢火熬成膏,临膏将欲成,更下生蜜一匙,熬如稀饧相似,是膏也)

【用法】上将前五味为细末,用皂角膏和丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,生姜汤下;食后如欲下利,临时或虚或实加减服之;若治肿满及腹胀,用葱白汤送下。

【主治】脾胃停饮,攻注腹胁,痞滞疼痛,或停痰饮,留渍胸膈,痞闷不快,或咳或喘,并水气流注,四肢浮肿,及大腹满。

68692 逐气丸

【方源】《永乐大典》卷一四九四八引《经验普济加减方》。

【组成】缩砂仁 红豆 良姜 青皮 陈皮(去瓢) 枳壳(炒,去瓢皮)一两 甘草(炙) 干姜(炮) 木香 硝砂各半两 木瓜(干者)一两半 当归六钱

【用法】上为细末,以蜜和丸,如弹子大。

每服一粒,病重每服三丸,食前细嚼,酒或生姜汤送下,一日三丸。或作散子,酒调三五钱,老幼加减。

【主治】妇人血气衰弱,小腹痠癖,气痛率心,阴户浮肿胀闷;男子疝气下坠。

68693 逐气散

【方源】《博济》卷三。

【组成】樟柳根不拘多少(去皮,薄切,阴干,日晒,亦可为末)

【用法】上用黄颡鱼三头,大蒜三个,绿豆一合,以水一大碗同煮,以豆烂为度,先将豆任意吃后,却以汁调药末二钱。其水即化为气消也。

【主治】①《博济》:水疾。②《苏沈良方》:水气,或四肢悉满,不能坐卧。

【临证举例】水气 《苏沈良方》:省郎王申病水气,四体悉满,不能坐卧,夜倚壁而立,服一剂顿愈。

68694 逐风汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆六钱 当归四钱 羌活二钱 独活二钱 全蝎二钱 全蜈蚣(大者)两条

【主治】中风抽掣及破伤后受风抽掣者。

【临证举例】狂犬病 曾治一媼,年六旬,其腿为狗咬破受风,周身抽掣。延一老医调治,服药十余日,抽掣愈甚。所用之药,每剂中皆有全蝎数钱,佐以祛风、活血、助气之药,仿佛此汤而独未用蜈蚣。遂为拟此汤,服一剂而抽掣即止,又服一剂,永不反复。

68695 逐风散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】防风一钱 荆芥一钱 甘草一钱 黄芩一钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】伤风,头痛身疼,咳嗽痰多,脉浮。

68696 逐火丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】大黄五钱 当归四两 荆芥三钱

(炒黑) 生甘草五钱 黄芩三钱 防风三钱 黄耆三两 茯苓三两

【用法】水煎服。一剂痛减半,三剂痛全减,又剂疮自全愈。

【主治】汤火伤。

【方论选录】此方妙在重用大黄于当归、黄耆之内,既补气血,又逐火邪;尤妙用荆芥、防风,引黄耆、当归之补气血,生新以祛瘀;更妙用茯苓三两,使火气尽从膀胱下泻,而皮肤之痛自除;至于甘草、黄芩,不过调和而清凉之已耳。

68697 逐水散

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】生章陆 赤豆各三两 鲫鱼三个

【用法】三味实鱼腹中,以麻线缚之,水三升,煮赤豆烂,去鱼,只取二物,空腹中食之,以鱼汁送下。不汗利即愈。甚者,过二日再作之,不过三剂。

【功用】消肿满。

68698 逐邪丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二,名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】湿生虫四十九枚 百节虫四十九枚 砒霜三钱(细研) 棕子角一七枚

【用法】五月五日,日未出时,于东南上寻取两般虫令足;至午时,面向南,都研,丸如小豆大。每于发前,手内把一丸,嗅七遍。

【主治】疟疾,往来寒热,发歇无时。

68699 逐邪散

【方源】《博济》卷五。

【组成】皂子不计多少(以绢袋盛,入厕中浸三七日,取出洗净,安地坑中,刺盖出毒一宿,焙干,捣为末) 斑蝥五十个(去头翅,麸慢火炒黄色,去却麸后捣为末)

【用法】上用皂子末二钱匕,斑蝥末一钱匕,水银粉二钱,生鸡卵一个,取白倾盏内,更入饭饮半盏,并药一处打匀。四更初服。至五更取下毒物,或从小便中下出,如有些小涩痛,不妨。

【主治】瘰癧。由风邪毒气客于肌肉，随虚而停，结为疮，如李梅枣核大小，两三相连皮肉间，时发寒热，久则溃脓，连属而生，久不愈者。

68700 逐虫丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】水银（生者）十钱 锡粉二十钱 硫黄五钱 大黄五十钱

【用法】先混和汞、锡二味，次加硫黄、大黄二物，调匀糊为丸，如梧桐子大。每服二丸，鸬鹚菜汤送下。

【功用】杀虫，下粘液。

【主治】疳眼及烂眼。

68701 逐虫丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白薇 茯苓各三钱 雷丸 甘草 槟榔各一钱 黄连五分 使君子十个 乌梅一个

【用法】水煎服。

【主治】腹内生虫，腹痛，得食则减，遇饥则甚，面黄体瘦，日加困顿者。

68702 逐虫煎

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】苦楝根皮二两 使君子肉 生姜各一两

【用法】水三碗，熬至一碗，加蜜二两，又熬至一碗，露一宿，择初旬五更，徐徐热服。虫尽下，立愈。

【主治】诸虫。

68703 逐血丹

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】当归尾一两 大黄三钱 红花三钱 桃仁二十粒 天花粉三钱 枳壳五分 厚朴二钱 丹皮三钱 水蛭（火煨烧黑）一钱

【用法】水煎服。

【主治】太阳膀胱之经有瘀血结住而不散，一过午时，吐酸水一二碗，至未时心前作痛，至申痛甚厥去，不省人事，至戌始苏，日日

如是。

【方论选录】此方用水蛭同入于大黄、厚朴之中，以逐有形之血块，则病去如扫，而痛与厥尽去也。倘不用水蛭，虽亦能止厥定痛，而有形之血块，终不能尽逐，必加入水蛭而建功始神，不可以此物为可畏，而轻弃之，遗入终身之病也。

68704 逐衣汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】三棱 蓬术 官桂 赤芍 香附 甘草 乌药

【用法】用好醋一蛤蜊煎服。

【主治】妇人产后胞衣不下，血闷冲心。

68705 逐狐丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】白术五钱 沙参七钱 柴胡三钱 白芍三钱 王不留行三钱

【用法】水煎服。

【主治】狐疝。

68706 逐狐汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】人参五钱 白术三钱 茯苓三钱 肉桂三分 橘核五分 白薇五分 荆芥一钱 五分 半夏一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】狐疝。日则缩而痛，夜则出而安。

68707 逐疝汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】人参 茯苓 泽泻各四钱 丹皮 沉香各三钱 花椒 吴萸 桂 附各一钱

【主治】冲疝。便闭，气上冲。

68708 逐毒丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】连翘一钱 赤芍一钱 生栀子一钱 黄芩一钱 银花一钱 白芷一钱 防风一钱 当归尾一钱 花粉一钱 薄荷一钱 大黄一钱 甘草一钱 乳香（炙）三两 没药（炙）三两 元明粉五钱 麝香二分 牛黄二分

【用法】共研细，混合均匀，炼蜜为丸，重

一钱，蜡皮封固。每服二丸，温开水送下，日服二次。

【功用】清热散风，消肿败毒。

【主治】疮疡初起，憎寒发热，风湿疥癣，瘙痒不休。

68709 逐毒丹

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】贝母三钱

【用法】上为末。酒调敷伤处，然后尽醉一饮，毒自伤处流出，流尽，仍以余末敷上。

【主治】蛇虫伤。

68710 逐客汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】柴胡二钱 茯苓五钱 半夏三钱 白芍一两 炒栀子三钱 菖蒲一钱 枳壳一钱 神曲三钱 甘草一钱 白术三钱 白矾二钱

【用法】水煎服。

【主治】中肝气之邪，无端见邪，口中大骂，以责自己，口吐涎涎，眼目上视，怒气勃勃，人不可犯。

【方论选录】此方平肝气而泻火，补肝血而化痰，痰火既清，邪又何藏？况方中半是攻邪之药，木邪即旺，何敢争战乎？

68711 逐黄散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】栝楼（青者，焙，为末）

【用法】每服一钱，水一盞，煎七分，去滓，临卧服。五更初泻下黄立可。

【主治】小儿黄疸，脾热眼黄及酒黄。

68712 逐虚汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白术五钱 防风五分 黄耆五钱 人参二钱 陈皮五分 甘草一钱 桂枝五分

【用法】水煎服。

【主治】气虚而中风湿，手麻木。

【方论选录】方中黄耆、人参、白术，俱补气去湿之药，防风乃去风之品，然必得桂枝始能入于手经也。经络既清，自能奏功。

68713 逐蛊汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归 焦术 莱菔 大黄各二两 丹皮五钱 人参 雷丸 白薇 红花各三钱 甘草一钱

【主治】虫肿，面红带点。

68714 逐秽丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】当归尾五钱 大黄三钱 甘草一钱 枳实一钱 丹皮三钱

【用法】水煎服。

【功用】滋阴祛逐。

【主治】多食生冷燔炙之物，或难化之品，食积于肠，闭结而不得出，有燥屎存于腹内作痛，手按之而痛甚者。

【方论选录】此方用大黄、枳实以逐秽，加入当归、丹皮以补血生阴，攻补兼施，复何患于亡阴哉。

68715 逐痛丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】灵砂九钱 乳香二钱 胆南星四钱 川连一钱

【用法】上为末，以南蛇胆二分，入猪心血研开和为丸，如粟米大。每服五分，临卧时橘皮汤送下。

【主治】癫痫。

68716 逐痛丸

《圣济总录》卷一七七。为《圣惠》卷八十二“雀粪丸”之异名。见该条。

68717 逐湿汤

《永乐大典》卷一三八七九引《风科集验方》。为《金匱》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

68718 逐湿汤

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】牵牛一钱 大黄一钱 木通一钱 黄柏一钱 芍药五钱 牛蒡子一钱 茯苓三钱 茵陈一钱

【用法】水煎服。二剂渐愈，再用土茯苓散擦之即痊。

【主治】胞漏。因肝经湿热，而致囊中起窠子作痒，乃搔抓破损而水遂外滴。

68719 逐寒丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地八钱 当归五钱 桂枝三钱 麻黄 加皮 灵仙 川乌 续断 牛膝各二钱 炙草一钱 甜酒

【功用】补肝益肾，兼祛外邪。

【主治】肝肾亏损，外邪乘虚而入之筋骨痛。

【备考】方中甜酒用量原缺。

68720 逐寒散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】蛇床子二两 藁本 茵陈各一两 防风半两

【用法】上咬咀。每用半两，以水五升，同煎五七沸、放温，去滓，淋洗。

【主治】膀胱肿硬，下部痒痛，阴汗不止。

68721 逐痹丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参一钱 茯苓五钱 肉桂三分 升麻五分 甘草一钱 薏仁一两 神曲五分 白术五钱

【用法】水煎服。

【功用】益大肠之气，祛风寒湿邪。

【主治】风寒湿同结于大肠，两足牵连作痛，腹又微滞，人不能寐，卧倒足缩，而不能伸、伸则愈痛者。

【方论选录】此方治湿为多，而治风治寒反轻者，盖水湿最难分消，治其难而易者更易。况治湿之中不伤元气，则大肠自有传化之妙，力能使风寒随湿而同解也。

68722 逐瘀汤

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】川芎 白芷 生干地黄 赤芍药 五灵脂 枳壳（制） 阿胶 蓬莪术 茯苓 茯神 木通 生甘草 大黄（生用） 桃仁（去皮，焙）各一分半

【用法】上锉散。每服三钱，井水一碗，加

生姜三片，蜜三匙，煎服。以利为度。

【功用】通利大小便，取下恶物。

【主治】①《直指》：痔疮，瘀血作痛。②《寿世保元》：赤痢血痢，痛不可忍，又治血痔。

68723 逐瘀汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 红花 生地各二钱 官桂 乌药 桃仁（去皮尖）各一钱五分

【用法】水一钟，煎服。

【主治】产后瘀血凝滞，头疼发热，胸膈不宽，肚腹绞痛。

68724 逐瘀汤

【方源】《傅青主男女科·男科》卷上。

【组成】水蛭（炒黄，为末） 雷丸 红花 枳壳 白芍 牛膝各三钱 当归二两 桃仁四十粒

【用法】水煎服。服一剂血尽者，可改服四物汤调理，于补血内加白术、茯苓、人参，补元气而利水。

【主治】或因跌闪而瘀血不散，或郁忧而结血不行，或风邪而蓄血不散，留在腹中致成血臌，腹胀如臌，而四肢手足并无臌意。

68725 逐瘀汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】刘寄奴二钱 茜根一钱 王不留行一钱五分 漆渣八分（可炒尽烟） 归尾三钱 赤芍二钱 生地三钱 桃仁七粒 红花一钱 紫草一钱 楂肉一钱五分 青皮一钱 苏木一钱五分

【用法】水煎，酒兑服。

【主治】瘀血气滞腹痛。

68726 逐瘀饮

【方源】《观聚方要补》卷九。

【组成】冬葵子一钱 红花八分 滑石 桃仁 牛膝 延胡索各六分 牡丹皮 木香各四分

【用法】水煎服。

【主治】妇入血水壅遏，遍身洪肿。

68727 逐痰煎

【方源】《仙拈集》(三槐堂本)卷一引程氏方。

【组成】当归 白芍各三钱 青皮 槟榔 黄芩 黄连 大黄 木香各一钱 桂心 甘草各五分

【用法】加生姜三片，水煎服。小儿减半。

【主治】痢疾垂危。

【宜忌】忌生冷、油腻、腥荤。

【备考】本方方名，原书大文堂本作“散痰煎”。

68728 逐痰丸

《医统》卷十。为方出《中藏经·附录》、名见《卫生宝鉴》卷九“坠痰丸”之异名。见该条。

68729 逐痰丸

【方源】《济阳纲目》卷七十四。

【组成】紫海蛤(如鸡子大者一斤，火煨红，淬入童便内，如此三次，为末，却用鲜瓜蒌拌粉，捣千余下乃匀，稀稠得宜，作饼子，将麻绳穿，悬当风处吹干，为末)四两 南星(牛胆制) 黄连 半夏四两(用姜矾者，滴香油数点，煮令透，炒黄色) 陈皮(去白) 青皮(炒)各二两 大黄(酒拌，九蒸九晒)五两 青黛一两 木香五钱

【用法】上为末，姜汁、竹沥为丸，如绿豆大。每服三四十丸，姜汤送下。

【主治】上焦郁火，痰涎壅盛，胸膈不利，咽喉烦躁，噎塞如有所梗，吐不出，咽不下。

【备考】方中南星、黄连用量原缺。

68730 逐痰丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】陈皮(皮白) 半夏(热水泡七次) 南星(热水泡七次) 香附子(去毛)各一两

【用法】用白矾一两，热水溶化，煮四味，后用牙皂一两煎水，打米糊为丸。不拘多少，空心姜汤送下。

【主治】梅核气。因积热生痰后，痰积如核在喉中，吞之则不下，吞则在喉，但可以进

水，不可以进饮食。

68731 逐痰汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】广橘红二钱 半夏 甘草各一钱二分 大附子 川贝母各一钱

【用法】水二钟，加竹沥、姜汁，煎服。

【主治】寒痰发厥。

68732 逐痰汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄四钱 黄芩 沉香 枳实 半夏各二钱 南星一钱

【用法】加竹沥半杯，生姜五片，水煎服。

【主治】痰壅塞上焦不行。

68733 逐痰饮

【方源】《医碁》卷四。

【组成】南星 半夏 竹沥 姜汁 瓜蒌 僵蚕 天麻 龙齿 石菖蒲 远志 附子

【用法】先一夕勿食，次早捣茶子煎汤，束小腹饮之即吐。虚者先补后攻。

【主治】癫痫，有六畜之声。

【加减】声如犬吠，加柴胡，如羊叫，加黄连，如牛叫，加白芍，如鸡鸣，加黄芩，如猪叫，加知母。

68734 逐瘟丹

《瘟疫论》卷下。为《韩氏医通》卷下“五瘟丹”之异名。见该条。

68735 逐魃丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】苍术二两 干姜三钱 良姜二钱 茯苓一两 甘草一钱 肉桂一钱 管仲三钱

【用法】水煎服。

【主治】寒湿泄泻。

68736 逐鳖汤

【方源】《仙拈集》卷一引王牧斋方。

【组成】当归二钱 川芎一钱半 赤芍一钱 三棱 莪术各三钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】血痞，血鳖。

68737 逐呆仙丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 白术二两 茯神三两 半夏五钱 白芥子一两 附子五分 白薇三钱 菟丝子一两 丹砂三钱（研末）

【用法】先将各药煎汤，调朱砂末，与半碗服。如患者不肯服，以炭焙之，欣然服矣；又焙之，又服半碗，然后听其自便。患者必倦怠欲卧，乘其睡熟，将其衣服被褥尽行火化，单留身上所着之衣，另用新被盖之，切不可惊醒。此一睡有睡至数日者，醒来必觅衣而衣无，觅被而被非故物，患者必大哭，然后又以前药与一剂，必不肯服，即焙之炭亦断不肯，不妨以鞭责之，动其怒气，用有力之人将前药执而灌之，彼必大怒，已而又睡。此时断须预备新鲜衣服被褥等项，俟其半日即醒，彼见满房皆是亲人，心中恍然如悟，必又大哭不已，诸人当以好言劝之，彼必说出鬼神之事，亲人说幸有某人治疗，已将鬼神尽行祛遣，不必再虑，听之欣然而病亦全愈。

【主治】呆病如痴，默默不言，悠悠如失，意欲癫而不能，心欲狂而不敢；有时睡数日不醒，有时坐数日不眠；有时将他人物件深深藏掩；与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉；与之食，则厌薄而不吞；不与食，则吞炭而若快，因胸膜之中有痰气所致。

【方论选录】此方妙在大补心脾，以茯神为君，使痰在心者尽祛之而出，其余之痰药，又得附子引之，无经不入，将遍身上下之痰，尽行祛人膀胱之中而消化。白薇、菟丝子皆是安神妙药，而丹砂镇魂定魄，实多奇功，所以用之而奏效也。

68738 逐风通痹汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生箭耆六钱 麻黄三钱 全当归五钱 丹参三钱 乳香三钱 没药三钱 全蝎二钱

【主治】风袭肌肉经络，初则麻木不仁，寢至肢体关节不利。

【加减】脉象迟弱无力，恶寒者，将黄耆重用一两，再照加乌头二三钱；脉象有力，恶

热者，以薄荷易麻黄，再加天花粉一两。初服以遍体皆得微汗为佳；至汗后再服，宜将麻黄减半，或只用一钱；筋骨软弱者，加明天麻三钱；口眼歪斜者，加蜈蚣二条，其病剧者，可加三条。

【方论选录】方中以黄耆为主药，取其能升补胸中大气以通卫气，自能逐风外出。故《本经》谓：黄耆能主大风，而又以最善发表之麻黄辅之，一则扶正以祛邪，一则发汗以透邪，二药相济为用，其逐风之力虽猛，而实不至伤正气也；至于当归、丹参、乳没、全蝎诸药，或活血以祛风，或通络以祛风，皆所以赞助黄耆、麻黄以成功也。至于病偏凉者加乌头，更将黄耆增重；病偏热者加花粉，更以薄荷易麻黄，此随病机之所宜，以细为调剂，不使服药后有觉凉觉热之齟齬也；筋骨软弱者加明天麻，取其能壮筋骨兼能祛风也；口眼歪邪者加蜈蚣，取其善理脑髓神经，而有牵正口眼之力也。

【临证举例】半身不遂 曾治一人，夏月开轩当窗而寝，为风所袭，其左半身即觉麻木，肌肉渐形消瘦，左手足渐觉不遂，为拟此方。其病偏于左，又加鹿角胶二钱作引（若偏于右，宜用虎骨胶作引），一剂周身得汗，病愈强半，即方略为加减，又服二剂全愈。

68739 逐邪四物汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】四物汤加白附子 羌活 独活 薄荷 白芷

【主治】产后四肢麻痹。

68740 逐邪至神丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花四两 蒲公英二两 人参一两 当归二两 生甘草一两 大黄五钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【功用】补虚化毒。

【主治】囊痈。因少年贪于酒色，致痈毒生于囊之下，粪门谷道之前者。

【方论选录】此方用金银花四两,用蒲公英二两,佐之参、归、大黄之大料,未免过于霸气。然大虚之病,又用大黄祛逐,似乎非宜。谁知毒正盛,乘其初起之时,正未甚衰,大补泻火之为得乎。倘因循失治,或畏缩而不敢治,及至流脓出血,正气萧索,始用参、耆补气,往往有用至数斤而尚能复元,何不早用于化毒之中,正又无伤,而毒又易散哉。此因势利导之法,又不可不知也。

68741 逐邪杀蛇汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】当归 白芍各五钱 枳壳一钱 槟榔一钱 莱菔子三钱 地榆五钱 大黄一钱

【用法】水煎,饭前服之。二剂后,外用冰片点之。先用木耳一两,煎汤洗之,洗后将冰片一分,研末而扫,扫尽往往即缩进而愈。

【主治】大肠湿热之极,肉长于直肠之间,粪门内拖出一条,似蛇非蛇,或进或出,伸缩如意,便粪之时又安然无碍。

68742 逐血四物汤

【方源】《保命歌括》卷十一。

【组成】四物汤加香附一钱 红花五分 桃仁泥一钱半

【用法】水煎服。

【主治】血郁病。四肢无力,能食便红,脉沉而芤结。

68743 逐血补心汤

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】红花 赤芍药 生地黄 桔梗 苏叶 前胡 茯苓 防风 牛胆南星 黄连 粉葛各二钱 当归三钱 薄荷 人参 升麻各一钱五分 半夏二钱五分 甘草一钱

【用法】上为散,分作二服。每服水一钟半,生姜三片,煎至七分,空心服,滓再煎服。

【主治】①《准绳·女科》:产后失音不语。②《济阴纲目》:产后心肺二窍为血所侵,又感伤风,故失音不语。

【方论选录】《医略六书》:产后中风,痰热

内滞,故心气闭塞,而心窍闭塞,令人不语焉。生地壮水以交心,黄连清热以燥湿,赤芍泻血滞,当归养心血,防风疏风邪之外袭,人参助心气之内虚,胆星豁痰以益肝胆,菖蒲开窍以通神明,生姜散痰涎,甘草和胃气也。水煎温服,使风邪外解,则痰热内消,而心窍自通,神机鼓舞,何不语之有哉。

68744 逐血破瘀汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】水蛭二至四钱 虻虫二至四钱 地龙三至五钱 廬虫二至四钱 黑丑三至五钱 路路通五钱至一两 透骨草三至五钱 水红花子三至五钱 盘龙参三至五钱 紫草三至五钱

【功用】活血破瘀,通经活络。

【主治】深部栓塞性静脉炎(血痹),腹腔瘀血(血瘕),腹腔肿物(癥瘕)。

【加减】寒凉重者,加紫油肉桂一至二钱。

【方论选录】本方为活血汤方的重剂。方中水蛭、虻虫、地龙、廬虫破血逐瘀;紫草、水红花子软坚理气化痰;黑丑峻下,可以清除陈旧的瘀滞;路路通、透骨草活血通络化瘀;盘龙参益气滋阴而扶正。本方祛邪扶正兼顾,但以祛邪为主。

68745 逐污化痰丸

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】红花三钱 苏木五钱 桃仁 陈皮 半夏曲 贝母 香附 山楂 白术 五灵脂各一两

【用法】姜汁打曲糊为丸。

【主治】痰裹污血肿胀。

68746 逐虎负隅煎

【方源】《引经证医》卷四。

【组成】升麻 薄荷 姜皮 通草 藁本 防风 甘草 香附 蜀漆 皂角刺

【用法】水煎服。

【主治】疟疾。

68747 逐疫七宝丹

《松峰说疫》卷二。为《医心方》卷十四引《唐

本草》“破棺汤”之异名。见该条。

68748 逐贼出壁饮

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】大黄四两 防风二钱 梔子五钱
玄参八钱 赤芍四钱 黄连二两 荆芥四钱
甘草二钱 花粉三钱 薄荷二钱 连翘五钱
前仁五钱 灯心一扎 银花三钱

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫黄喉。

68749 逐秽消胀汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术一两 雷丸三钱 白薇三钱
甘草一钱 人参三钱 大黄一两 当归一两
丹皮五钱 莱菔子一两 红花三钱

【用法】水煎服。一剂腹内必作雷鸣，少顷下恶物满桶，如血如脓，或有头无足之虫，或色紫色黑之状。又服一剂，大泻大下，而恶物无留矣。然后以人参一钱，茯苓五钱，薏仁一两，山药二两，白芥子一钱，陈皮五分，白术二钱，调理而安。

【主治】虫臌，血臌。虫结于血之中，面色淡黄之中有红点或红纹，单腹胀满，未饮食而腹痛，既饮食而不痛，四肢手足不浮肿，小便利而胃口开，经数年不死，非水臌者。

【宜忌】忌盐一月。虫血之臌，若胃弱者，虽本方补多子攻，亦未可轻用。

【方论选录】前方用攻于补之中，虽不至大伤脏腑，然大泻大下，毕竟元气少损，故秽尽之后，即以参、苓、薏、药之类继之，则脾气坚固，不愁亡阴之祸也。

68750 逐寒回阳汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参五钱 白术九钱 附子一钱
肉桂一钱 干姜五分

【用法】水煎服。

【主治】寒邪直中肾经。

【方论选录】此方妙用人参、白术。盖寒邪直中人，宜只用附、桂以逐之，何必用参、术？而且多加之也。不知寒邪直犯肾宫，元阳遁

出于脾胃之间，只此一线之微气在焉，若不用人参以救之，何能唤回于无何有之处，不多加白术，何能利其腰脐而回其元气，故又加附子、肉桂以祛散其寒邪也。

68751 逐寒返魂汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 良姜三钱 附子五钱
茯苓五钱 白术三两 丁香一钱

【用法】水煎服。

【功用】逐邪，返元阳。

【主治】阴寒直中肾经，心痛欲死，呕吐不纳食，下利清水。

【临证举例】阴寒直中肾经 《齐氏医案》：曾治王尚贤，患阴寒直中肾经，心痛欲死，呕吐不欲食，下利清水，其兄求治。予曰：乃弟病犯不治，寒邪犯心，脾胃立绝，此时药缓不济事，速以针刺一下心窝穴，出紫血少许，然后用逐寒返魂汤救之，或可得生否。予以黄耆一两，良姜三钱，附子五钱，茯苓五钱，白术三两，丁香一钱，煎二服，苏。

68752 逐寒荡惊汤

【方源】《福幼编》。

【组成】胡椒一钱（研） 炮姜一钱 肉桂一钱 丁香十粒（打）

【用法】上四味，用灶心土三两，煮水澄极清，煎药大半茶杯，频频灌之。一二剂后呕吐渐止，即其验也。再服加味理中地黄汤。

【功用】开寒痰，宽胸膈，止呕吐，汤惊邪，回元气。

【主治】小儿气体本虚或久病不愈，或痘疹后，或误服凉药，泄泻呕吐，转为慢惊，清热败风，愈治愈危者。

【方论选录】①《卫生鸿宝》：凡因风热不退，及吐泻而成者，总属阴虚阳越，必成慢惊，非感寒可比，故不宜发散，治当培元固本，引火归元，先用辛热冲开寒痰，再进温补。用椒、姜者，补土所以敌木也。②《成方便读》：夫慢惊一证，无不皆从久虚而来。小儿为稚阳之体，元气未充，虚则生寒，以致生气日索，阴气

日甚。斯时也,若仅以区区温补之剂,缓不济事。故以炮姜、肉桂、丁香等破阴回阳,以复下焦之生气;但寒痰之在上膈者,格拒汤药,呕不能下,故以胡椒之大辛大热者,冲开寒痰,而以伏龙肝散逆和中,自不致呕而不纳。药力直行中下,以建大功。

【临证举例】慢惊 《衷中参西》:族侄荫霖六岁时,曾患此证。饮食下咽,胸膈格拒,须臾吐出。如此数日,昏睡露睛,身渐发热。投以逐寒荡惊汤原方,尽剂未吐。欲接服加味理中地黄汤,其吐又作。恍悟此药取之乡间小药坊,其胡椒必陈。且只用一钱,其力亦小。遂于食料铺中,买胡椒二钱,炮姜、肉桂、丁香,仍按原方,煎服一剂。而寒痰开豁,可以受食。继服加味理中地黄汤,一剂而愈。

68753 逐寒趁痛散

【方源】《济阳纲目》卷七十七。

【组成】麻黄一钱半 官桂 紫苏 藿香 羌活 细辛各一钱 白术 茯苓各八分 防己一钱二分 甘草四分

【用法】上锉。加生姜三片,水煎,食前温服。

【主治】寒湿脚气。

【加减】寒甚,加干姜(炮)、附子(炮)各一钱。

68754 逐瘀止血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】逐瘀止崩汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】生地一两(酒炒) 大黄三钱 赤芍三钱 丹皮一钱 当归尾五钱 枳壳五钱(炒) 龟版三钱(醋炙) 桃仁十粒(泡、炒、研)

【用法】水煎服。

【功用】行血祛瘀,活血止痛。

【主治】妇人升高坠落,或闪挫受伤,以致恶血下流,有如血崩之状者。

【加减】若血聚胃中,宜加厚朴一钱半(姜汁炒)。

【方论选录】此方之妙,妙在活血之中,佐

以下滞之品,故逐瘀如扫,而止血如神。或疑跌闪升坠,是由外而伤内,虽不比内伤之重,而既已血崩,亦不为轻,何以又治其瘀而不顾气也?殊不知跌闪升坠,非由内伤以及外伤者可比。盖本实不拔,去其标病可耳,故曰急则治其标。

68755 逐瘀止崩汤

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上“逐瘀止血汤”之异名。见该条。

68756 逐瘀化痰汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】桃仁泥四钱 粉丹皮三钱 当归三钱 川芎二钱 半夏三钱 胆星三钱 青礞石二钱 天竺黄五分 大白三钱 陈皮一钱半 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】胞轮跳动症。两眼不赤不疼,跳动不安,常觉心乱,目胀头晕。

68757 逐瘀夺命丹

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】益母草 白芷 泽兰 甘草 冬葵子 生地 丹皮 干姜 官桂 当归 附子 赤芍 南星 苏木 牛膝

【主治】产后儿已生,而胞衣不下,或儿生后,产母体疲,不能复用力,经停之间,外冷乘之,则血道阻涩或恶血流入胞中,衣为血所胀满,故胞衣不下也。

【方论选录】是方姜、桂、附子辛热以逐瘀;苏木、归尾以行血;白芷、南星之燥,可以束胞中之水;冬葵、牛膝之滑利下行,可以使胞速下;益母、泽兰、芎、归、生地、丹皮、赤芍又能行血、养血、破血,胞中无瘀血填塞,则自下矣。

【临证举例】①不孕症 《陕西中医》(1986;10:453):张某,女,32岁。1983年4月30日诊。婚后七年未曾受孕,症见经期小腹冷痛,先后不定期,经量少色紫,夹有血块,面色不华,头痛唇干,心悸气短,腰痠肢冷,白带淋漓,舌黯苔白,脉细涩。辨证为瘀阻胞宫,

寒凝脉络, 气血两虚, 津不上承。治宜活血化瘀, 温宫通络, 养血滋阴, 益气调经。予本方加减化裁。处方: 泽兰、益母草、当归、苏木、牛膝、赤白芍、冬葵子、生熟地、党参各 10 克, 白芷、官桂、制附片、干姜、丹皮、甘草各 6 克, 三剂。药后白带减少, 经期小腹冷痛好转, 诸恙亦有减轻, 效不更方, 守原方继进五剂。三诊诸症愈其大半, 仍嘱原方连服七剂。四诊诸恙悉除, 按原方略具增损还服七剂, 以资巩固, 后即怀孕得子。②闭经《陕西中医》(1986; 10: 453): 范某, 女, 18 岁。1984 年 7 月 15 日诊。于田间农活时, 月经适来, 突遇雨淋, 回家后即感全身不适, 继而畏寒发热, 经治已愈。但月经未潮已半年。妇检未孕, 诊为闭经。症见小腹冷痛, 白带较多, 形若蛋清, 纳谷不香, 有时恶心, 头痛腰酸, 舌暗红, 苔薄白, 脉沉涩。证属寒凝经脉, 瘀滞胞宫。治应祛寒通经, 逐瘀温宫。用本方化裁主治。处方: 制附子、干姜、当归、泽兰、益母草、冬葵子、炒赤芍、苏木、川牛膝各 10 克, 官桂、白芷、丹皮、制南星、甘草各 6 克, 熟地 20 克, 三剂。药后小腹冷痛轻, 白带少, 纳谷香, 仍守原方连服五剂, 闭经遂通。

68758 逐瘀至神丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】当归五钱 大黄二钱 生地三钱 赤芍药三钱 桃仁一钱 红花一钱 丹皮一钱 败龟版一钱

【用法】水一碗, 酒一碗, 煎服。

【主治】忽然跌仆, 断伤受困。

【方论选录】方中最妙当归、芍药和其血, 大黄、桃仁逐其瘀, 生地、红花动其滞, 一剂即可去病也。倘以大黄为可畏, 或不用改为别味, 则虽有前药亦用之而不当。用大黄之药, 始能消去其瘀血, 而终不能大下其脾中之物, 又何必过忌哉。

68759 逐瘀定痛散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】归尾三两 元胡索二两 红花一

两 五灵脂三两 赤芍一两五钱 桃仁二两 甘草五两 川山甲一两 乳香 没药各一两五钱

【用法】上为细末。陈酒调服。

【主治】夹棍后瘀血不散。

68760 逐瘟神圣丹

【方源】《石室秘录》卷五。

【组成】大黄三钱 玄参五钱 柴胡一钱 石膏二钱 麦冬三钱 荆芥一钱 白芍三钱 滑石三钱 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫。

【方论选录】此方之妙, 用大黄以荡涤胸腹之邪, 用荆芥、柴胡以散其半表半里之邪气, 用天花粉以消痰去结, 用石膏以逐其胃中之火, 用芍药以平肝木, 不使来克脾气, 则正气自存, 而邪气自出。

振

68761 振中汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】于白术六钱 (炒) 当归身二钱 陈皮二钱 厚朴一钱半 生明乳香一钱半 生明没药一钱半

【主治】腿疼, 腰疼, 饮食减少者。

【方论选录】此方重用白术以健补脾胃, 脾胃健, 则气化自然旁达。且白术主风寒湿痹, 《神农本草经》原有明文。又辅以太活气血之药, 不惟风寒湿痹开, 而气血之痹而作疼者必自开也。

【临证举例】腿疼 一室女腿疼, 几不能步, 治以拙拟健运汤而愈, 次年旧病复发, 又兼腿疼, 再服前方不效, 诊其脉, 右关甚濡弱, 询其饮食减少, 为制此汤, 数剂, 饮食加多, 二十剂后, 腰疼腿疼皆愈。

68762 振阳丹

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】振阳汤加海狗肾一具 (即鳔肭脐, 煨燥)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，淡盐汤送下。

【主治】阳痿。

68763 振阳汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】鹿角霜二钱 淡苁蓉三钱 怀牛膝三钱 枸杞子三钱 远志肉六分 菟丝子三钱 茯神二钱 破故纸（炒）三钱 杜仲（炒）三钱 豨莶草二钱 大枣五枚

【主治】阳痿。

【加减】如禀赋不足者，加人参二钱；如色伤肾阳，相火不足，加肉桂五分、川柏、知母各五分；如高年阳衰者，加黄耆三钱、木香五分。

68764 振颓丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】人参二两 子术（炒）二两 当归一两 马钱子（法制）一两 乳香一两 没药一两 全蜈蚣（大者，不用炙）五条 穿山甲（蛤粉炒）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，无灰温酒送下，一日二次。

【主治】痿废，偏枯，痹木诸证。

【备考】制马钱子法：将马钱子先去净毛，水煮两三沸即捞出。用刀将外皮皆刮净，浸热汤中，旦、暮各换汤一次，浸足三昼夜，取出。再用香油煎至纯黑色，擘开视其中心微有黄意，火候即到。将马钱子捞出，用温水洗数次，将油洗净。再用沙土同入锅内炒之；土有油气，换土再炒，以油气尽净为度。

68765 振颓汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆六钱 知母四钱 野台参三钱 于术三钱 当归三钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 威灵仙一钱半 干姜二钱 牛膝四钱

【主治】痿废。

【加减】热者，加生石膏数钱，或至两许；寒者，去知母，加乌附子数钱；筋骨受风者，

加明天麻数钱；脉弦硬而大者，加龙骨、牡蛎各数钱，或更加山萸肉亦佳；骨痿废者，加鹿角胶、虎骨胶各二钱（另炖同服），然二胶伪者甚多，若恐其伪，可用续断、菟丝子各三钱代之；筋骨受风者，加明天麻；手足皆痿者，加桂枝尖二钱。

【方论选录】方中黄耆以补大气；白术以健脾胃；当归、乳香、没药以流通血脉；灵仙以祛风消痰；恐其性偏走泄，而以人参之气血兼补者佐之；干姜以开气血之痹；知母以解干姜、人参之热，则药性和平，可久服而无弊。其阳明有实热者，加石膏以清阳明之热，仿《金匱》风引汤之义也；营卫经络有凝寒者，加附子以解营卫经络之寒，仿《金匱》近效术附汤之义也；至其脉弦硬而大，乃内风煽动，真气不固之象，故加龙骨、牡蛎以息风敛真气；骨痿者加鹿胶、虎胶取其以骨补骨也；筋骨受风者，加明天麻取其能搜筋骨之风，又能补益筋骨也；若其痿专于腿，可但用牛膝以引之下行，若其人手足并痿者，又宜加桂枝兼引之上行。

捕

68766 捕更丸

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】麻绳

【用法】寻多年悬挂麻绳，上有灰尘堆积者，连绳解来，用新瓦盛之，炭火煨枯存性，研末，洋糖为丸，如芡实大。每用一丸，含在口中化下。不十丸，其梗物不出即消，虽梗死之人，但有微气，服之必治。

【主治】诸骨梗喉。

捍

68767 捍齿膏

《圣济总录》卷一二一。为《圣惠》卷三十四“捍齿牢牙方”之异名。见该条。

68768 捍齿牢牙方

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】捍齿膏（《圣济总录》卷一二一）。

【组成】腊月猪脂三两 朱砂一两（细研）
青矾一两 绿矾一两 白矾一两（烧令汁
尽） 马牙消一两 防风（去芦头）一两 细
辛一两 蜡二两 松脂二两 黄耆二两
（炒） 当归一两 麻油三两

【用法】上为末，先煎油令沸，次下猪脂及
蜡，次下药末，煎三上三下止。每夜卧时，厚
贴于患处。

【主治】齿风动摇。

捏

68769 捏头散

《鸡峰》卷二十四。为《小儿药证直诀》卷下
“捻头散”之异名。见该条。

捉

68770 捉虎丸

《医学入门》卷七。为《宣明论》卷十三“一粒
金丹”之异名。见该条。

68771 捉虎丹

《骊仙活人心方》卷下。为《宣明论》卷十三
“一粒金丹”之异名。见该条。

68772 捉虎膏

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】独蒜汁 韭汁 艾汁 姜汁 葱
汁各四两 滴花烧酒二十两

【用法】上同煎滚，入麻油四两，熬至汁枯，
滤清，用丹收成，加入冰片、乳香，摊贴患处。

【主治】风痹痛。风寒湿踞于经络，以致手
足麻木，屈伸不利，筋骨疼痛，畏风怕冷。

68773 捉疳丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】蛆退

【用法】上先用米泔浸三日，以杖子搅击漉
出，又以泔水浸三五日，搅击，淘漉如前，次
入清水浸淘二日，至无秽气净时，于日晒
干，男子患用黄连，女儿患用黄柏，与蛆退
等分为末，每药末半两，入麝香半钱，同研
匀，以猪胆汁为丸，如黍米大。每服三四十

丸，空心陈米饮送下。

【主治】小儿一切诸疳。

68774 捉疳丸

【方源】《医统》卷八十九。

【组成】丁香 木香各半两 黄连 芩薹
（去皮，炒） 蚌粉 神曲（炒） 三棱
（煨） 青皮各二钱

【用法】上为细末，猪胆汁煮糊为丸，如黍
米大。食远米饮送下。

【主治】小儿脾胃受疳，面黄腹胀，多睡，
吃生米、酒、土。

68775 捉疳丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】虾蟆一只 芦荟 胡连 香附
地骨皮各五钱 枳壳 黄芩 青皮 胆草各
四钱 黄连 陈皮 人参 芩薹 柴胡 砂
仁各三钱 广木香 甘草各二钱 神曲 鸡
心槟榔各四钱

【用法】上为末，猪胆汁和蒸饼为丸，如黍
米大，青黛为衣。每服三五十丸，米饮送下。

【主治】小儿恣食生冷油腻，损伤脾胃，致
成脾疳，久则皮肤干燥，肢体消瘦，胸胁结
块，面目浮肿，身热脚细，肚大硬胀，吐逆
中满，水谷不消，泻下酸臭，尿如米泔，夜
热日凉，困睡口渴。

68776 捉痛散

【方源】《医方类聚》卷七十三引《吴氏集验
方》。

【组成】晋矾四两 生姜一斤（连皮切片）

【用法】上以银石器熬令黄色，不得焦，入
升麻一分，北细辛半两，同为末。擦之。

【主治】风蛀牙疼。

损

68777 损伤膏

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】当归 生地 白杨皮 香附 红
花 桑寄生 牛膝 合欢皮各二两 川芎
草乌 茜草 续断 刘寄奴 地榆 木瓜

小蓟 川乌 苏木 骨碎补 乌药 羌活 泽兰各一两

【用法】用麻油五斤，煎枯去滓，再煎至滴水成珠，下炒透黄丹一斤半，搅匀成膏，用自然铜（醋煨）、海螵蛸、乳香、花蕊石、没药、血竭各五钱，白占四两，研末搅和。摊贴。

【主治】跌打损伤。

68778 损余汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】地骨皮一两 茯苓五钱 黄柏二钱 生地五钱 炒黑荆芥三钱 玄参五钱

【用法】水煎服。四剂而经调矣。

【功用】清火。

【主治】妇人有先期经来者，其经水甚多，人以为血热之极也，谁知肾中之水火旺乎，夫火旺则血热，水旺则血多，此有余之病，非不足之症也。

68779 损伤药酒

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】红花二钱 黄芩 乌药 茯苓 生地 五加皮 杜仲 牛膝 远志 麦冬 秦艽 丹皮 松节 泽泻 玄胡索各五钱 当归 枸杞子各六钱 虎骨八钱 桃仁 阿胶各四钱 续断 补骨脂 枳壳 桂枝 香附各三钱

【用法】浸酒。每日饮一小杯。

【功用】活血舒筋。

【主治】远年宿伤。

68780 损益草散

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】人参 附子（炮去皮）各三分 干姜 桂心各五分 防风一两半 牡蛎（熬）黄芩 细辛各三分 桔梗 椒（去目闭口者，炒去汗） 茯苓 秦艽 白术各一两

【用法】上为散，治千杵。每服方寸匕；治霍乱，每服二方寸匕，旦以温酒送下。老入频服三剂良，常用之佳。

【功用】消谷，助老入胃气，可以延年。

【主治】男子女人老少虚损，及风寒毒冷下

痢，癖饮咳嗽，霍乱，休息下痢，垂命欲死。

68781 损伤风湿膏

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】生川乌 生草乌 生南星 生半夏各四两 细辛一两 当归 黄金子 紫荆皮 生地各四两 红花 丹皮 落得打 白芥子各二两 苏木 桃仁 桂枝 僵蚕 青皮 甘松 木瓜 山奈 地龙 乳香各四两 没药 羌活 独活 川芎 白芷 苍术 木鳖子 山甲片 川断 山梔 地鳖虫 骨碎补 赤石脂各二两

【用法】洗净后，切片或打碎，再用麻油二十斤，将药浸入麻油中七至十天，然后入锅，文火煎熬至色枯，去渣，再将油继续熬两小时左右，视其滴水成珠，将锅离火，再加黄铅粉（炒，筛细）六十两，徐徐筛入锅内，边筛边搅，膏成收贮。摊用。

【主治】一切损伤风湿。

68782 损伤回生散

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】麝虫（京都象房所产最佳，酒炙）五钱 自然铜（醋煨淬）三钱 乳香（去油） 没药（去油） 辰砂（水飞） 簪竭 巴霜（去壳及心膜，纸裹，压去油）各二钱 原麝三分（后下）

【用法】上为细末。每服一钱五分，黄酒、童便对冲调服。

【主治】跌扑损伤，筋断骨折。

68783 损伤接骨方

【方源】《本草纲目》卷九引《多能鄙事》。

【组成】无名异 甜瓜子各一两 乳香 没药各一钱

【用法】上为末。每服五钱，热酒调服；小儿三钱。服毕，以黄米粥涂纸上，掺左顾牡蛎末裹之，竹篦夹住。

【功用】接骨。

【主治】创伤骨折。

挫

68784 挫气丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】山楂子（去核）四两 北茴香（炒）一两

【主治】挫气腰痛。

换

68785 换肌丸

【方源】《医方类聚》卷二十一引《济生续方》。

【组成】苦参三两 大风油一两

【用法】上将苦参为细末，入大风油及少酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用温酒送下，不拘时候。仍将苦参煎汤，带热洗之为佳。

【主治】诸癩大风疾。

68786 换肌丸

《医林纂要》卷九。为《婴童百问》卷八“神效换肌丸”之异名。见该条。

68787 换肌丸

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】白砒 水银各三分 油核桃五钱 大风肉一钱

【用法】上为末，不见星为度，绢包。每临卧时，擦心口片时。

【主治】疥疮。

【宜忌】忌口味。

68788 换肌散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】胡麻子 蔓荆子 枸杞子 牛蒡子各半两（并炒熟） 防风（去芦头） 苦参 白蒺藜 栝楼根各半两（并生用） 轻粉四钱（别研）

【用法】上为细末，和匀。每服二钱，用淡茶清汤调下，煎甘草、贯众汤漱口，每日三次，不拘时候。

【主治】大风毒气，蕴积攻冲，溃疡。

68789 换肌散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】洗麸脚三两（炒黄色） 柏叶一两（炒黄色）

【用法】上为细末，用清麻油调稀。翎毛搨

药拂伤处。疼痛立止。

【主治】汤火伤，疼痛不可忍。

68790 换肌散

【方源】《普济方》卷三〇一引《卫生家宝》。

【组成】密陀僧（研细，炒）一钱 腻粉一钱 黄柏皮（研为末，用炒）一钱半

【用法】上为末。先以温汤洗，软帛搨干，掺上。患甚者不过三次，敷药即愈。

【主治】下疳，兼一切恶疮。

68791 换肌散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】白花蛇 黑乌蛇（各酒浸一宿） 地龙（去土） 蔓荆子 威灵仙 荆芥 甘菊花 沙苑蒺藜 苦参 紫参 沙参 甘草（炙） 不灰木 木贼 九节菖蒲 天门冬 赤芍药 定风草 何首乌 胡麻子（炒黄） 木鳖子 草乌（去皮） 苍术 川芎各三两 天麻二两 细辛 当归 白芷各一两

【用法】上为末。每服五钱匕，食后温酒调下。酒多为妙，服至逾月。

【主治】大风年深久不愈，以至眉毛坠落，鼻梁崩塌，额颅肿破。

【方论选录】《医方考》：身半以上，病则气受之，气受之则上病，故眉落、鼻坏而颅破也。高巅之上，惟风可到，故用细辛、白芷、天麻、蔓荆、威灵、甘菊、木贼、川芎、蒺藜、木鳖子、定风草诸物者，气味轻清，可以亲上，可以驱风，可以胜湿；乃不灰木、石菖蒲、草乌、苍术则直可以疗湿矣；若苦参、紫参、沙参、何首乌皆用之以解毒；当归、甘草、门冬、赤芍、胡麻皆养血清气于驱风燥湿之队者也；地龙者，泥蟠之物，湿土所化也，故能引诸药以就湿；白花、乌梢者，奔腾之类，风动之象也，故能君诸药以驱风，此《易》所谓云从龙，风从虎也。

【备考】《外科百效》无不灰木，有石灰、木通。

68792 换肌散

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】土茯苓 银花 荆芥 熟地 制

首乌

【用法】上为末，炼蜜为丸。

【主治】妇女疥疮久不愈，肌肤粗裂。

【备考】本方方名，据剂型，当作“换肌丸”。

68793 换形散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】青黛 黄柏 枯矾 雄黄 百药煎 硫黄各等分

【用法】上为末。先用涤垢汤洗之，后用此散搽之，湿则干搽，干则香油调搽。以愈为度。

【主治】小儿乳癖，起于手足，次遍腹背，缠绵不已。

68794 换肠丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】御米壳一两（去隔蒂，碎，微炒，净秤） 木香 诃子皮 白芍药 甘草（炒） 当归（去芦头，炒） 人参各一两 白术 白茯苓（去皮）各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏煎化，食前稍热服。

【主治】泄泻不止，及诸下痢之疾。

68795 换肠丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】当归（切，焙）半两 青皮（去白） 木香各一分 陈皮（去白） 诃子皮各七钱 甘草（炒） 豆蔻各四钱 御米壳（蜜浴，炒）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，小儿樱桃大。每服一丸，姜汤化下。

【主治】大人、小儿泻痢脓血，腹中疝痛，困倦减食，里急后重，日夜不止。

68796 换金丹

【方源】《医学六要·治法汇》卷四。

【组成】荆芥穗 白僵蚕 甘草 防风各一两 天麻 川乌头（生用） 白附子（生用） 蝎稍（炒，去毒） 羌活（去芦） 细辛 川芎 藿香各半两 薄荷三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，茶、酒送下；如左喎以此涂于右，右喎涂于左。

【主治】风热客于上焦，口眼喎斜。

68797 换金丹

【方源】《玉案》卷五。

【组成】广木香 青皮（醋炒） 芦荟 肉豆蔻（面包煨） 麦芽（炒） 神曲（炒） 山楂肉 千金子（去壳、油）各三两 白术（土炒） 黄连各二两 槟榔一两 沉香七钱

【用法】黑蝉七只，洗净入雄猪肚内，扎口，煮半熟，取出去蝉骨与肠，再同煎极烂，和前药捣为丸。每服五分，白滚汤送下，加至一钱止；如上膈胀，白豆蔻汤送下；下膈胀，砂仁汤送下，此丸服后，要合参苓白术散间服。

【主治】一切鼓胀。

68798 换金散

【方源】方出《孙真人海上方》，名见《普济方》卷二九九。

【组成】黄连 干姜

【用法】口中细嚼，流涎出。

【主治】①《孙真人海上方》：满口生疮疼痛。②《普济方》：毒热口疮，或下虚，邪热不可忍者。

【备考】《普济方》本方用干姜二钱、黄连三钱，为末，掺疮上。

68799 换骨丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】苦参 浮萍各一两半 大黄 槐花 白芷 川芎各一两二钱 苍术一两 乳香 没药 沉香 木香各三钱 麝香五分

【用法】上为末，用麻黄五斤煎膏为丸，如弹子大。每服一丸，临卧温酒化下。

【主治】癩风，及一切疥癣风疾。

【宜忌】忌风二三日。

68800 换骨丹

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】桑白皮 川芎 吴白术 紫河车 威灵仙 蔓荆子各二两 人参 防风 何首

乌各二两 地骨皮 五味子 木香 苦参各一两 犀角半两 麝香 龙脑各半钱

【用法】上为细末，用苍术半斤、槐角半斤，以地黄三斤去根、不去节，锉细，上用河水一斗八升（井水亦得），同熬至三四升，去滓，留清者，再熬成膏，和前药，每两作八丸，朱砂为衣。截四时伤寒，妇人血滞，产前产后，每服一丸，酒一盏，碎捶，浸至夜，温动化散，临睡和滓服；小儿惊搐，每服半丸，米饮化下。

【主治】一切卒中，手足顽麻，腰膝沉重，左瘫右痪，四时伤寒，妇人血滞，小儿惊搐。

68801 换骨丹

【方源】《幼幼新书》卷二十六。

【组成】陈粟米一合 陈皮 青皮 黑牵牛各半两 巴豆一分

【用法】上炒焦黄，去巴豆，入木香半两，为末，面糊为丸，如黍米大。每服十丸，橘皮汤送下。

【主治】小儿疳积。

68802 换骨丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】当归 芍药 人参 铁脚威灵仙各二两 南星三两 乳香（去油）二两 没药（去油）二两 麻黄三斤（去节，另煎膏）

【用法】上为末，先将前五味和匀，后人乳香、没药，以麻黄膏和匀，为丸，如弹子大。先灸脐下三百壮，服金液丹一斤，再服此药。每服一丸，五日一服，以无灰酒送下，出汗，仍常服延寿丹、金液丹。

【主治】中风，半身不遂，言语蹇涩，失音者。

68803 换骨丹

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】麻黄（煎膏） 仙术 香白芷 槐角子（取子） 川芎 人参 防风 桑白皮 苦参 威灵仙 何首乌 蔓荆子 木香 龙脑（研） 朱砂（研） 麝香（研） 五味子各等分

【用法】上为末，桑白单捣细，以麻黄膏和就，杵一万五千下，每两分作十丸。每服一丸，以硬物击碎，温酒半盏浸，以物盖不可透气，食后、临卧一呷咽之。衣盖覆，当自出汗即愈，以和胃汤调补，及避风寒。

【主治】①《宣明论》：瘫痪中风，口眼喎斜，半身不遂，一切风痼，暗风。②《御药院方》：血滞而不流，卫气遏而不通，风寒湿气相搏筋骨之间，内舍偏虚，发为不遂之病，气感八风，血凝五痹，筋挛骨痛，瘫痪偏枯，一切风证。

68804 换骨丹

【方源】《三因》卷十五。

【组成】九肋鳖甲（去裙） 海蜈蚣（细锉）各半两

【用法】以盐泥固济，候干，火煨存二分性，为末；巴豆半两，去皮膜，顺手研，青州枣七斤，去核，入巴豆膏在枣中，火烧令焦，存巴豆五分性，将枣、巴豆烂研如泥，入前二味末，同研匀，以醋煮糊为丸，如绿豆大。每服七丸，虚者四五丸，用温童汁下。候利恶物如脓血、烂鱼肠即住。即此三两服，未利，更加一二丸，次服遇仙丹。

【主治】大风。

68805 换骨丹

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】麝香（研）半分 桂（去粗皮）一两半 麻黄一十斤（去根节，河水七斗，煮减半，去滓，澄清，再煎如汤，瓷器收贮） 朱砂二两（细研，为衣） 甘松（去土） 川乌头（生，去皮脐） 白芥子（炒） 藿香 草乌头（生，去皮脐） 海桐皮（炒） 何首乌 羌活 龙脑（研） 骨碎补（去毛，炒） 牛膝（酒浸） 威灵仙（去土） 桑白皮（炒） 槐角 木鳖子仁（炒） 自然铜（醋淬七返，研细） 青皮（去白） 陈皮（去白）各一两 白芷 防风 甜瓜子（炒） 草薺（炒） 五灵脂 川芎 甘草（盐炙） 苦参 白胶香各半两

【用法】上为细末，用煎麻黄膏子，加少熟

蜜，搜和成剂，为丸如弹子大，以朱砂为衣。每服一丸，捶碎，食后茶、酒任下；或用生姜自然汁，更入酒半盏，化开服药，可更进酒一二盏投之，一日二次。至三日，于当病处微有汗为效，至十日外大效，无不愈者，但药性稍热，病寒者多效。

【主治】中风瘫痪久不愈，四肢躄曳不随，服诸药不效者。

68806 换骨丹

【方源】《急救仙方》卷六。

【组成】草乌六两

【用法】上为末，用生豆腐二两，捣和成饼子，沸汤煮令浮，再沸，取出，煮时最要斟酌，盖煮太过则药力轻，煮不及则药力又过重也。又用米泔浸过苍术三两（焙干），天麻一两（明净者），全蝎半两（洗去头足，微炒），与草乌饼子同研为末，米糊为丸，如梧桐子大。至晚勿食，每服二十丸，临卧嚼木瓜、温酒送下。中夜药透遍身及脚上，觉麻痺即其效也。

【主治】风湿腰脚诸疾。

68807 换骨丹

【方源】《医方类聚》卷二十三引《医林方》。

【组成】人参 丹参 紫参 沙参 玄参 苦参 天麻 定风草（如无此，以天麻代之） 防风 细辛根 白附子 威灵仙 何首乌 蒺藜 山豆根 穿山甲 蔓荆子 川芎各半两 胡麻子一斤（三棱者真，水淘，微炒香熟，另研） 蜈蚣一对

【用法】上除胡麻子外，为细末，后入胡麻子，同研细为丸，每丸半两重。每服一丸，细嚼，温浆水送下，日进一服，不拘时候。

【主治】诸风。

68808 换骨丹

【方源】《医学纲目》卷十二。

【组成】防风 牛膝 当归 虎骨（酥炙）各一两 枸杞子二两半 羌活 独活 败龟板 秦艽 草薢 松节 蚕沙各一两 茄根二两（洗） 苍术四两

【用法】酒浸或酒糊为丸皆可。

【主治】诸风兼鹤膝风。

68809 换骨丹

《普济方》卷九十六。即原书同卷引《卫生家宝》“换骨酒”改作丸剂。见该条。

68810 换骨丹

【方源】《王氏医存》。

【组成】制南星 川贝母 秦艽 首乌 制半夏 五加皮 石榴叶各一两 沉香五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸重二钱五分，朱砂为衣。每服一丸，生姜汤送下。取汁。

【主治】瘫痪，口眼歪斜，半身不遂；久患腿疼及破伤风。

68811 换骨酒

【方源】《普济方》卷九十六引《卫生家宝》。

【组成】白茯苓 晚蚕沙（炒）各三两 虎胫骨（酒浸，炙黄）半两 甘草一两 槟榔一两 郁李仁（汤浸，去皮） 附子（炮，去皮脐）各半两 何首乌半两 防风半两 瓜蒌半两 牛蒡子根 牛膝各半两 干菊花半两 杜仲（去皮丝） 黄耆各半两 白附子 益智仁各一两 石菖蒲半两 天麻一两 山茱萸一两 牡蛎 牡丹皮 枸杞子各半两 蛇床子 肉苁蓉各一两 羌活 鼠粘子各半两 狗脊（去毛）一两 天雄（炮，去皮脐尖） 干姜（炮） 苍耳子（炒）各半两 菟丝子一两 紫菀半两 白术 桔梗 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）半两

【用法】上为粗末，用好无灰酒三五斗，生绢袋盛药，在坛子内封闭，令蜜浸之，春、夏二七日，秋、冬三七日，开时人面不得向坛口上，取浸药酒。每服一盞，温暖服，日进三服。久患者不过月，日近者只三五服。其药滓阴干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温酒送下。服药三日，便能手梳头，七日四肢渐舒，十日行步，半月觉身轻眼明，常服乌髭发，身轻骨健，爽精神，净房修养一月妙。

【功用】益精补虚，活血驻颜，润皮肤，退

一切风疾，乌髭发，轻身健骨，爽精神。

【主治】早年患偏风证，四肢不举，非人回转，不能自动，兼眼目疾。

【宜忌】净房修养一月。

【备考】本方改作丸剂，名“换骨丹”（原书同卷）。

68812 换骨散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】乌蛇（去头尾，酒煮，取肉） 白花蛇（同上制法） 石菖蒲 荆芥穗 蔓荆子 天麻（酒炒） 胡首乌（小黑豆拌，蒸，晒） 白杨树皮（炒）各二两 甘草（炒） 地骨皮（酒炒） 枳壳（麸炒） 杜仲（盐水炒） 当归（酒炒） 川芎（酒炒） 牛膝（盐水炒）各一两

【用法】上为末。每服二钱，酒送下。

【主治】癩风。面上黑肿，肌肉顽麻，手足疼痛，遍身生疮。

68813 换骨散

【方源】《古今医鉴》卷十五引毛东园方。

【组成】川归 荆芥 麻黄 栀子 连翘 花粉各一两 角刺一两半 乳香 没药各一钱半 土茯苓四两

【用法】上锉，分十剂。水三碗，煎一碗，分二次服之。

【主治】天泡疮，筋骨疼痛。

68814 换骨膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】槟榔一分 没药一分 盐一分 麝香一分（细研） 当归一分 干蝎一分 芎藭一分 黄丹三两 清油五两 垂柳枝二两（锉）

【用法】上为末，先以油煎柳枝令黄黑色，滤去，以绵滤过，都入铛中，下盐、黄丹，以柳木篦搅，慢火熬令黑色，下诸药末，急搅令匀，盛瓷盒中。摊膏于故帛上贴，一日三两度换之。

【主治】一切风毒流注，筋骨疼痛。

68815 换神丹

【方源】《医方类聚》卷一一三引《烟霞圣效》。

【组成】黑牵牛一两 葛根一两（锉） 缩砂三十个（去皮）

【用法】上为细末。每服一大钱，用热酒调，空心送下，更用热酒一盏再服。

【主治】一切酒病，通身黄肿，不思饮食者。

68816 换容散

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《海上仙方》。

【组成】蝉退半斤，广胶一斤

【用法】上用铅一斤，打成小盒，置前二味于内，外仍用铅滴周围固密，以皮消三斗，锅内煮之，取出，去铅盒，只用前二味为细末。每服三分，温酒送下。紫黑风，以青松枝剪碎，煎汤洗浴；白风，以小麦浮壳，煎汤洗浴。

【主治】疔风。

68817 换脚丸

《古今医鉴》卷十。为《局方》卷一（续添诸局经验秘方）“秘方换腿丸”之异名。见该条。

68818 换痘丹

【方源】《痧痘集解》卷六。

【组成】犀角五钱 朱砂一钱五分 红梅瓣（落地针取，阴干）五分 雄黄五分 滑石一钱二分 霜打丝瓜（焙）一钱五分 射干三分

【用法】上为末，麻黄汁为丸。周岁五分，十岁一钱，白酒酿送下。

【主治】痘初出，势危急者。

68819 换睛散

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】荆芥穗二两 蝉壳 草龙胆 川芎 甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱，食后茶、酒调下。一月见效，小可病眼，三服效。

【主治】目昏病，发痛赤肿，渐生翳膜，眵泪。

68820 换腿丸

【方源】《三因》卷三。

【组成】石楠 天南星(炮) 石斛(酒浸) 牛膝(酒浸) 羌活 薏苡仁(炒) 防风(去叉芦) 萆薢 黄耆(蜜炙) 天麻 当归(酒浸) 续断各一两半 木瓜四两 槟榔二两半

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒、盐汤任下。

【主治】足三阴经虚,为风寒暑湿进袭,挛痹缓弱,上攻胸胁肩背,下注脚膝疼痛,渐成风湿脚气,行步艰难,足心如火,上气喘急,全不进食。

68821 换腿丸

《普济方》卷二十九。为《局方》卷一(续添诸局经验秘方)“秘方换腿丸”之异名。见该条。

68822 换皮麻药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】羊蹄躄三钱 茉莉花根一钱 当归一两 菖蒲三分

【用法】水煎,服一碗。即如睡熟,任人刀割,不疼不痒,换皮后三日,以人参五钱,生甘草三钱,陈皮五分,半夏一钱,白薇一钱,菖蒲五分,茯苓五钱,煎服即醒。

【功用】凡欲去皮之疮癣,先服此药,使其不知痛苦,然后开刀。

【备考】茉莉花根务宜慎用,《本草》言其醉人,每至不醒。

68823 换金煮散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】延胡索 蓬莪术(炮) 威灵仙 鬼箭羽 姜黄 苦楝根(洗,锉)各一两

【用法】上为散。每服三钱匕,水一盞、酒少许,同煎七分,温服,日二夜一。

【主治】九种心痛。

68824 换肌消毒散

《口齿类要》。为原书“萆薢散”之异名。见该条。

68825 换肌消毒散

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】土茯苓(即萆薢) 当归 白芷 甘草 皂角刺 薏苡仁 白鲜皮 木瓜(忌

铁) 金银花 木通 连翘 防风 黄芩 川芎 生地 芍药各等分 (一方用至木瓜止)

【用法】水煎服。

【主治】一切恶毒疔肿,杨梅疮。

68826 换肌消毒散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】当归 生地黄 赤芍药 川芎 皂刺 土茯苓 金银花 连翘(去心) 甘草(生) 白芷 苦参 白鲜皮 防风

【用法】灯心为引,水煎服。外用清凉膏或鹅黄散敷之。

【主治】父母素有杨梅结毒,传染胞胎,致生下婴儿上半身赤烂,或下半身赤烂,甚至色带紫黑者。

挽

68827 挽流汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地二两 山药一两 白术一两 泽泻三钱 玄参一两 北五味二钱 山茱萸五钱

【用法】水煎服。十剂热解,二十剂遗绝。

【主治】肾水干涸,火炎于上,至夜脊心自觉如火之热,梦遗。

捣

68828 捣姜饼

【方源】《医方类聚》卷一〇四引《吴氏集验方》。

【组成】丁香 水银(研,不见星) 胡椒各一钱 硫黄三钱(用水银研) 藿香 桂木香 半夏各三钱(姜汁制) 甘锅子二钱(醋煨过,酒煨)

【用法】上为极细末,生姜自然汁为饼子,作四十九饼。每服一饼,姜汁化开,沸汤浸,晨空心服。

【主治】翻胃,膈气。

68829 捣毒散

《洞天奥旨》卷十四。即《准绳·疡医》卷一“搗毒散”。见该条。

68830 搗薤膏

【方源】方出《圣惠》卷三十五，名见《圣济总录》卷一二二。

【组成】薤一把

【用法】上搗熬。乘热以熨肿上，冷复易之。以醋和涂亦佳。

【主治】咽喉卒生肿痛，食饮不通。

68831 搗关救肾汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参五钱 白术一两 山药一两 芡实五钱 薏仁一两 白芥子三钱 泽泻三钱 半夏三钱 玄参五钱 知母一钱 厚朴一钱

【用法】水煎服。一剂痰涎消，二剂心魂定，三剂痊愈。

【功用】补肾攻胃。

【主治】卒中肾气之水邪，眼目昏花，遂至心魂牵缠，谵语淫乱，低声自语，忽忽如失。

挨

68832 挨积丸

【方源】《局方》卷十(宝庆新增方)。

【组成】京三棱(炮) 丁香皮(不见火) 各三两 丁香(不见火) 青皮(去白) 各一两 干姜(炮) 巴豆(去皮膜油) 各二钱半

【用法】上为细末，入巴豆研匀，面醋糊为丸，如粟米大。每服五十丸至六十丸，二岁儿可服七至十丸，生姜汤吞下，熟水亦得，不拘时候。

【功用】消积滞，进乳食，退黄长肌。

【主治】小儿脾胃不和，宿滞不化，腹胀肠鸣，呕逆恶心，便利不调，乳食减少，或疳泻积泻，大便酸臭；丈夫、妇人胸膈不快，酒积食积，呕逆恶心，吐泻脾疼。

68833 挨痞丸

《保婴撮要》卷五。为《直指小儿》卷三“挨痞

丸”之异名。见该条。

68834 挨痞丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】挨痞丸(《保婴撮要》卷五)。

【组成】代赭石(火煅，醋淬至碎，研十分细) 青皮(去白) 木香 蓬术 五灵脂 北大黄各三钱 巴豆(压去油尽) 一钱

【用法】上为末，醋面糊为丸，如麻子大。每服二丸，食后擦姜泡汤送下。

【主治】乳癖谷瘕，腹中块病。

頓

68835 頓止丹

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】黄丹一两 巴豆四十丸粒 乳香二钱 麻油二钱

【用法】蜡半两，熔汁为丸。

【主治】小儿泻痢。

【加减】冷证，加木香二钱半。

致

68836 致和丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟地五两 厚朴二两 胡桃肉十二两 茅术二两 胡椒一两 当归二两 甘草二两 砂仁一两 广皮一两 香附四两

【用法】上为末，黑枣煮烂为丸。每服二钱。

【主治】脾虚作肿，及气肿者。

68837 致和汤

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】北沙参 生扁豆 石斛 陈苍米 各四钱 枇杷叶(刷) 鲜竹叶 麦冬各三钱 陈木瓜六分 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】霍乱后津液不复，喉干舌燥，渴短便溲。

68838 致新汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】木香二分 槟榔五分 京三棱(醋煨) 山楂 枳壳 桃仁各七分 滑石一钱

五分 黄连(吴茱萸制)三分

【用法】水煎,食前服。

【主治】食积肠胃,脱肛。

热

68839 热牙散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】麝香散。

【组成】熟地黄二分 益智仁二分半 当归身 生地黄 麻黄根 酒汉防己 人参各三分 升麻一钱 草豆蔻 黄连各一钱五分 羊胛骨灰二钱 麝香少许

【用法】上为细末。先用温水漱口,擦牙痛处。

【主治】大热,牙齿瘴露,根肉龈脱血出,齿动欲落,疼痛,妨食物嚼,反忤热多。

68840 热见愁

【方源】《玉案》卷六。

【组成】烧人粪一两 黄芩 黄连 黄柏 山梔(俱用酒炒)各一两 升麻三钱

【用法】上为末。每服一二钱,加人煎剂同服。

【主治】痘疮。唇燥,舌苔燥。

68841 热郁汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山梔(炒) 青黛 香附 苍术 抚芎

【主治】热郁。瞽闷,小便赤,脉沉数。

【加减】春,加芎;夏,加苦参;秋、冬,加吴茱萸。

【备考】本方为原书六郁汤之第四方。

68842 热郁汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】连翘四钱 薄荷叶 黄芩各一钱五分 山梔仁二钱 麦门冬(去心)三钱 甘草五分 郁金一钱 瓜蒌皮瓢二钱 竹叶七片

【用法】水煎服。

【主治】①《准绳·类方》:郁热,非阴虚、非

阳陷,亦不发热,而常自蒸蒸不解者。②《杂病源流犀烛》:肺因壅热生风,在外风适与之相袭,症见声重鼻塞,咳嗽咽干音哑。

68843 热郁汤

【方源】《证因方论集要》卷二。

【组成】熟地 麦冬 沙参 阿胶 五味子 胡桃

【主治】阴人火灼肺金,气膈郁喘咳,壅塞而胀。

【方论选录】用熟地补益真阴;麦冬保肺;肺气散而不收,以五味敛之;沙参、阿胶以宣膈郁;胡桃定喘。

68844 热逆汤

【方源】《简明医彙》卷三。

【组成】黄芩 梔子 柿蒂 陈皮 香附(盐水炒) 连翘 白芍药 半夏各一钱 砂仁 藿香各六分 甘草三分

【用法】加莲肉七个,乌梅一个,竹茹一团,水煎服。

【主治】热呃。发热烦渴,便秘脉数。

【加减】有痰,加茯苓、贝母;气虚并久痢,加人参、白术、茯苓;阴火,加黄连、黄柏、滑石。

68845 热粘皮

【方源】《回春》卷八。

【组成】龙骨(煅)三钱 无名异一两 白矾(半生半枯)各一两 乳香 没药各二钱 五倍子二两(半生半炒)

【用法】上为末。干掺患处。不作脓,不怕风。

【功用】止血,住痛,生肌。

【主治】金疮出血不止。

68846 热痢丸

《普济方》卷一七六。为原书同卷引《十便良方》“黄连丸”之异名。见该条。

68847 热熨针

《全国中药成药处方集》(北京、南京方)。为《疡医大全》卷二十九“雷火针”之异名。见该条。

68848 热蘸汤

【方源】方出《圣惠》卷六十五，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】牛胆 猪胆

【用法】上用热汤急蘸之出，使满七度，便以冷水浸之讫，又复如此三度，即涂牛胆，后便以猪胆笼代指上，用物缠之。

【主治】代指。五脏之气注于十二经脉，热冲于手指不还，其指先肿，焮焮热痛，其色不黯，然后爪甲边结脓，剧者爪甲脱。

68849 热六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤加黄连 梔子

【主治】发热而烦，不能睡卧者。

68850 热疔神效膏

【方源】《疡医大全》卷三十。

【组成】麻油四两（熬成珠） 松香末四两 炒黄丹二两

【用法】上搅成膏。摊贴。

【主治】疔于。

68851 热疔争攻散

《普济方》卷三九〇。为《得效》卷十一“争功散”之异名。见该条。

68852 热战咬牙汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】归尾 陈皮 郁金 防风 生地 牛蒡子 川连 赤芍 黄芩 红花 连翘 梔炭 楂肉 石膏 竹叶 木通

【用法】灯心一扎为引，磨羚羊角尖三分，冲服。

【主治】痘出热战咬牙，口渴，大便不泄者。

68853 热疮寒膏药

《医学纲目》卷十八。即《东垣试效方》卷三“柳枝当归膏”。见该条。

鸬

68854 鸬鹚散

【方源】方出《圣惠》卷三十五，名见《普济方》卷六十四。

【组成】鸬鹚粪

【用法】水调，涂咽喉外。即出。

【主治】鱼骨鲠在喉中，众法不去者。

68855 鸬鹚散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】鸬鹚毛翅十片

【用法】上烧灰为细末。每服一钱匕，浓煎橘皮汤调下；或以绵裹含咽，即下。

【主治】诸鱼骨鲠在喉中。

68856 鸬鹚涎丸

【方源】《中国医学大辞典》

【组成】光杏仁 梔子（炒黑） 石膏 蛤粉 天花粉各二两 牛蒡子三两 生甘草四钱 麻黄八钱 青黛 射干各一两 细辛五钱

【用法】共为细末，鸬鹚涎三两加蜜为丸，如弹子大。每服一丸，灯心、竹叶煎汤化下。

【功用】《中药成方配本》：理肺止咳。

【主治】①《中国医学大辞典》：小儿鸬鹚瘟。②《中药成方配本》：百日咳（即小儿顿嗽）。

68857 鸬鹚屎膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】鸬鹚屎一升

【用法】上药治下筛。腊月猪脂调和，敷之。

【主治】皲疱。

柴

68858 柴平汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》。

【异名】柴平饮（《证治宝鉴》卷二）、柴平煎（《中医大辞典·方剂分册》）。

【组成】银柴胡二钱 黄芩一钱五分 人参（去芦） 半夏（汤泡七次）各一钱 甘草五分 陈皮一钱二分 苍术（泔浸）一钱半 厚朴（姜制）一钱

【用法】上用水二钟，加生姜三片，红枣二枚，煎八分，未发先服。

【主治】疟症，湿疟，食疟；春嗽。

①《增补内经拾遗》引《宦邸便方》：由夏伤暑所致痄症。②《医方考》：湿症，发时一身尽痛，手足沉重，寒多热少，脉濡。③《医方集解》：春嗽。④《金鉴》：小儿饮食无节，复受风暑之气，以致食症，寒热交作，胸腹胀满，痞闷不通，面黄恶食，症轻者。

【加减】发于午前为阳，属气虚，加白术（土炒）八分，白茯苓（去皮）七分；发于午后为阴，属血虚，加当归（酒浸）九分，川芎七分；发于午前，延及午后，此气血两虚，上四味俱加；食积，加神曲（炒）八分，麦芽（炒）七分，山楂一钱，枳实（麸炒）一钱。

【方论选录】①《增补内经拾遗》引《宦邸便方》：方用小柴胡汤以散风寒，平胃散以消饮食，故曰柴平。②《医方考》：用小柴胡汤以和解表里，平胃散以健脾制湿，二方合而为一，故名曰柴平。

68859 柴平汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】人参 柴胡 黄芩 半夏 甘草 苍术 陈皮 厚朴 川芎 草果各等分

【用法】水煎服。

【主治】疟疾热多寒少，及疟寒热交作，胸膈痞满，饮食不进，头目昏眩。

68860 柴平汤

《杂病广要》。即《回春》卷三“柴胡汤”。见该条。

68861 柴平饮

《证治宝鉴》卷二。为《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》“柴平汤”之异名。见该条。

68862 柴平散

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡三钱 白术三钱 人参 半夏三钱 甘草一钱 苍术三钱

【用法】加生姜五片，大枣一枚，水煎，未发时先服。发遍身大汗。若病重者，连三服为妙。

【主治】疟疾。

【备考】方中人参用量原缺。

68863 柴平煎

《中医大辞典·方剂分册》。为《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》“柴平汤”之异名。见该条。

68864 柴归饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二三钱 芍药（或生或炒）一钱半 柴胡一钱或一钱半 荆芥穗一钱 炙甘草七分或一钱

【用法】水一钟半煎服；或加生姜三片。

【功用】托毒散邪。

【主治】①《景岳全书》：痘疮初起，发热未退，无论是痘是邪，疑似之间，无实邪者。②《会约》：麻疹无实邪者。

【加减】血热，加生地；阴虚，加熟地；气虚脉弱，加人参；虚寒，加炮姜、肉桂；火盛，加黄芩；热渴，加干葛；腹痛，加木香、砂仁；呕恶，加炮姜、陈皮；麻疹，去荆芥，加干葛；阴寒盛面邪不能解，加麻黄、桂枝。

【方论选录】《成方便读》：以当归和营益血，可导可宣；而以柴胡、荆芥领之出表；然其解散之性，与夫痘疮之出，诚恐扰乱营阴，故特用白芍以护之；炙甘草取其镇守中州，专资解毒，庶邪尽化而正不伤耳。

【备考】《会约》有干葛，无荆芥穗。

68865 柴半汤

【方源】《引经证医》。

【组成】柴胡 半夏 甘草 陈皮 黄芩 姜皮 薄荷

【主治】疟疾寒热不清。

68866 柴皮汤

《杏苑》卷六。为《圣济总录》卷一一七“柴胡汤”之异名。见该条。

68867 柴朴汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】柴胡 独活 前胡 黄芩 苍术 厚朴 陈皮 半夏曲 白茯苓 藿香各一钱 甘草三分

【用法】水二钟，加生姜五片，煎一钟，发

日五更服。

【主治】①《准绳·杂病》：疟热多而脾气怯。②《法律》：暑湿及食滞致疟。

【加减】气弱，加人参、白术；食不克化，加神曲、麦芽、山楂。

68868 柴朴汤

【方源】《医碁》卷六。

【组成】柴胡 独活 前胡 黄芩 苍术 厚朴 半夏曲

【主治】疟挟痰湿及食滞者。

【加减】气弱，加参、术；食不化，加神曲、山楂、麦芽。

68869 柴芍饮

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】柴胡 9 克 赤芍 9 克 丹皮 9 克 桑叶 9 克 防风 6 克 银花 15 克 连翘 12 克 苦参 4 克 白鲜皮 9 克 生甘草 6 克 土茯苓 12 克 苍术 6 克 黄耆 9 克 当归 6 克

【用法】水煎服。

【主治】带状疱疹。

68870 柴芎汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】川芎 白茯苓 柴胡 苏薄荷 细辛 制半夏 黄芩 炙甘草 陈皮 蔓荆子

【用法】上锉，加生姜三片，水二钟，煎至八分，食后服。

【主治】太阳经头风头痛，寒热而呕。

68871 柴防煎

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】柴胡 防风 桔梗各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】温热时症。

68872 柴苓汤

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【异名】柴苓汤（《景岳全书》卷五十四）、柴苓散（《治疹全书》卷上）、柴胡汤（《不知医必要》卷三）。

【组成】柴胡 黄芩 猪苓 泽泻 茯苓 白术各一钱五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《保婴撮要》：痘疹，小便不利。②《景岳全书》：身热烦渴，泄泻。

68873 柴苓汤

《医林绳墨大全》卷一。为《慈幼新书》卷九“柴苓汤”之异名。见该条。

68874 柴苓汤

《痘科金镜赋》卷六。为《痘科类编》卷三“柴苓汤”之异名。见该条。

68875 柴苓煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡二三钱 黄芩 梔子 泽泻 木通各二钱 枳壳一钱五分

【用法】水二钟，煎八分，温服。

【主治】①《景岳全书》：伤寒表邪未解，外内俱热，泻痢，烦渴喜冷，气壮，脉滑数；及疟痢并行，内热去血，兼表邪发黄。②《会约》：湿热伤脾，下及肝肾，热渴下血，表邪未解。

【加减】疟痢并行，鲜血纯血者，加芍药一钱、甘草一钱；湿胜气陷者，加防风一钱。

68876 柴苓煎

【方源】《会约》卷四。

【组成】柴胡 梔子 黄芩 泽泻 木通各二钱 甘草一钱 白芍一钱半 枳壳一钱半

【用法】水煎服。

【主治】伤寒表邪未解，内外俱热，烦渴喜冷，下利脉实者。

【加减】小便短，大便多水，加革薢四钱。

68877 柴陈汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】小柴胡汤合二陈汤

【主治】痰气胸胁不利及痰症。

68878 柴陈汤

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】柴胡 黄芩 人参 半夏 陈皮 茯苓 草果 甘草

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】疟疾。外感内伤，郁聚成痰，热多，头痛肉跳，吐食呕沫，甚则昏迷卒倒。

68879 柴陈煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡二三钱 陈皮一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 生姜三五七片

【用法】水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】伤风兼寒，咳嗽发热，痞满多痰。

【加减】寒胜，加细辛七八分；风胜气滞，加苏叶一钱五分；冬月寒甚，加麻黄一钱五分；气逆多嗽，加杏仁一钱；痞满气滞，加白芥子五七分。

68880 柴陈煎

【方源】《医级》卷七。

【组成】柴胡 苏叶 细辛 广皮 半夏 茯苓 甘草 杏仁 白芥子

【主治】外感风寒，咳嗽发热，多痰痞满。

68881 柴附汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】柴胡 香附 郁金 丹参 枳实 当归 赤芍 益母草

【功用】疏肝解郁，养血通经。

【主治】流产后肝气郁结闭经，下腹胀或胀痛，或少腹疼痛，或乳房发胀。

68882 柴苓汤

【方源】《得效》卷二。

【组成】小柴胡汤合五苓散

【用法】每服加生姜三片，麦门冬二十粒（去心），地骨皮少许，煎，温服。

【主治】伤风伤暑症。

68883 柴苓汤

《袖珍小儿》卷四。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

68884 柴苓汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱（炒） 猪苓八分 泽泻八分 茯苓一钱半 白术一钱 官桂三分 半夏一钱 甘草二分

【用法】上咬咀。水二钟，加生姜三片，煎一钟，不拘时候服。

【主治】伤寒七八日，发热泄泻，作渴引饮，烦躁不宁。

【加减】渴甚，去白术、半夏，加干葛、芍药各一钱。

68885 柴苓汤

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】柴胡一钱六分 半夏（汤泡七次）七分 黄芩 人参 甘草各六分 白术 猪苓 茯苓各七分半 泽泻一钱二分半 桂五分

【用法】水二盏，生姜三片，煎至一盏，温服。

【功用】《古今医鉴》：分利阴阳，和解表里。

【主治】伤寒、温热病、伤暑、疟疾、痢疾等，邪在半表半里，症见发热，或寒热往来，或泻泄，小便不利者，以及小儿麻疹、痘疮、疝气见有上述症状者。

①《丹溪心法附余》：温热病发热泄泻里虚者，及邪传半表半里，内伤发热，杂病发热。②《回春》：疟发寒热，病在半表半里，阴阳不分。③《幼科折衷》：痢疾有表证，表解而痢仍不止者。④《西塘感症》：太阴症，腹胀满，咽干自利，脉不浮而沉数者。⑤《麻科活人》：麻至出尽之时，如有寒热似疟者。⑥《幼幼集成》：中湿恶热如疟，及少阳胆经有邪而病疝。⑦《医碥》：疟挟湿而小便不利者。⑧《医林纂要》：伤暑泄泻，发热口渴，及疟疾热多寒少，口燥心烦者，痘痢当落不落。

【临证举例】①小儿下利 《汉方临床》（1987；9：66）：本方治疗20例小儿下利，用药量为：未满7岁者每日3克，7岁以上者每日6克，乳儿每日0.18克，均分三次服用，使用时间为7~14日。结果：显效7例，有效8例，略有效1例，无效2例，恶化1例，效果不明者1例。认为对容易陷于脱水状态的小儿下利，柴苓汤是一种有价值的药剂。②变形性膝关节症 《汉方临床》（1987；34：66）：用柴苓汤治疗14例伴有膝痛、膝浮肿的变形性膝关节症，每日予柴苓汤9克，分三次服；治疗

时间最短者 3 周,最长者 4 个月,膝关节浮肿减轻或消失者 8 例,有效率 57%。

68886 柴苓汤

【方源】《穷乡便方》。

【组成】半夏 黄芩 赤芍药各一钱 人参三分 柴胡 泽泻各八分 猪苓七分 羌活九分 木通一钱

【用法】加生姜三片,煎,半饥服。

【主治】春初发头痛,怯寒潮热,是阳证者。

68887 柴苓汤

《景岳全书》卷五十四。为《保婴撮要》卷十八“柴苓汤”之异名。见该条。

68888 柴苓汤

【方源】《痘科类编》卷三。

【异名】柴苓汤 (《痘科金镜赋》卷六)。

【组成】小柴胡汤合四苓汤

【主治】①《痘科类编》:痘疮,风火相搏,喉中痰鸣,目睛上视,面赤引饮,喜居冷处;及邪气并于里,肠胃热甚,传化失常而致痘疮未出而泻利。②《痘科金镜赋》:少阳胆经半表半里,恶寒发热;阳明胃经水谷不化;太阳小肠经小便不清;及痘初发热时火泻。

68889 柴苓汤

【方源】《慈幼新书》卷九。

【异名】柴苓汤 (《医林绳墨大全》卷一)。

【组成】柴胡 白术 黄芩 茯苓 猪苓 泽泻 厚朴 甘草 人参 香薷 (暑症加)

【主治】症初发一二日。

【备考】《医林绳墨大全》本方用柴胡一钱五分,黄芩一钱,猪苓五分,泽泻五分,白茯苓八分,白术一钱五分,厚朴八分,甘草三分,人参五分(量用),香薷二钱(暑天用,余不用)。水二碗,煎一碗,服一二剂。

68890 柴苓汤

《医林绳墨大全》卷二。为《圣惠》卷十七“柴胡散”之异名。见该条。

68891 柴苓汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 半夏 甘草 茯苓 猪苓

【主治】寒湿伤于少阳,下利,时寒时热,六脉弦大。

【备考】《家秘》有干葛、木通。

68892 柴苓饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】柴苓煎 (《医级》卷七)。

【组成】柴胡二三钱 猪苓 茯苓 泽泻各二钱 白术二三钱 肉桂一二三钱

【用法】水一钟半,煎服。

【主治】风湿发黄,发热身痛,脉紧,表里俱病,小水不利,中寒泄泻。

【加减】寒邪胜,加生姜三五片;汗出热不退,加芍药一二钱。

68893 柴苓散

《南北经验方》卷十引汤氏方。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

68894 柴苓散

《治疹全书》卷上。为《保婴撮要》卷十八“柴苓汤”之异名。见该条。

68895 柴苓煎

《医级》卷七。为《景岳全书》卷五十一“柴苓饮”之异名。见该条。

68896 柴胡丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】柴胡(去苗) 桔梗(去芦头) 子芩 赤芍药 黄耆(锉) 枳壳(麸炒微黄,去瓢) 鳖甲(涂醋炙微黄,去裙襴) 人参(去芦头) 各一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温水送下,不拘时候。

【主治】时气余热不退,烦躁发渴,四肢无力,不能食饮。

68897 柴胡丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】柴胡一两(去苗) 鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襴) 麦门冬一两半(去心,焙) 葳蕤三分 枳壳一两(麸炒微黄,去瓢) 人参一两(去芦头) 天门冬一两半(去心,焙) 地骨皮三分 川大黄一两(锉

碎, 微炒) 黄连一两 (去须) 知母一两 羚羊角屑一两 大麻仁一两半 (锉如膏) 生干地黄一两半

【用法】上为末, 入大麻仁膏, 研匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以温水送下, 不拘时候。

【功用】利心肺, 除烦热, 利大肠。

【主治】热劳。

【宜忌】忌苋菜、鲤鱼、猪肉。

68898 柴胡丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】柴胡半两 (去苗) 赤茯苓一分 人参一分 (去芦头) 木香一分 桂心一分 川大黄半两 (锉碎, 微炒) 枳壳一分 (麸炒微黄, 去瓢) 甘草一分 (炙微赤, 锉) 鳖甲半两 (涂醋炙微黄, 去裙襕)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。每服五丸, 用温水送下, 二日二次。

【主治】小儿寒热结实, 或热攻冲心肺, 气急, 昼夜有汗, 日渐消瘦, 不吃乳食。

68899 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】柴胡 (去苗土) 枳壳 (麸炒, 去瓢) 各一两半 白术三分 白茯苓 (去黑皮) 一两 丹参 (去根, 炙) 黄耆 (锉) 各二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空腹以粥送下, 一日三次。

【主治】大肠虚, 腹痛不能久立, 或腹中虚鸣。

68900 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】柴胡 (去苗) 紫菀 (去土) 各一两 白茯苓 (去黑皮) 雄黄 (研) 人参 黄芩 (去黑心) 各一分 牛膝 (生) 丹砂 (研) 马兜铃各半两

【用法】上为末, 酒糊为丸, 如弹子大。每服一丸, 烧绵灰, 温酒送下, 不拘时候, 每日三次。

【功用】宁心志, 止咳嗽, 除肌热。

【主治】热劳。

68901 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡 (去苗) 一两 鳖甲 (醋炙, 去裙襕) 二两 厚朴 (去粗皮, 生姜汁炙, 焙) 山梔子仁 常山 知母 (切, 焙) 秦艽 (去苗土) 黄芩 (去黑心) 白术 槟榔 (锉) 桔梗 (炒) 芍药 枳壳 (去瓢, 麸炒) 白茯苓 (去黑皮) 贝母 (去心) 人参 熟干地黄 (焙) 前胡 (去芦头) 防风 (去叉) 紫菀 (去苗土) 麻黄 (去根节) 黄耆 (细锉) 陈橘皮 (去白, 麸炒) 桂 (去粗皮) 各一两 京三棱 (炮, 锉) 三两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以温酒送下, 空心日午、夜卧服。

【主治】虚劳寒热, 羸瘦食减, 肢体困倦。

68902 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】柴胡 (去苗) 一两 贝母 (去心) 知母 (焙) 麦门冬 (去心, 焙) 芎藭 款冬花各半两 黄耆 (锉) 一两半

【用法】上为末, 以童便五盏, 入药在内, 慢火熬, 柳枝搅成煎, 放冷, 候可丸即丸, 如小弹子大。每服一丸, 以人参汤化下, 不拘时候。

【主治】虚劳吐血, 胸膈烦满。

68903 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】柴胡 (去苗) 胡黄连 龙胆 桃胶 (干者) 升麻 茯神 (去木) 黄芩 (去黑心) 地骨皮 生干地黄 (焙) 芍药 大黄 (锉, 焙) 知母 (锉, 焙) 麦门冬 (去心, 焙) 甘草 (炙, 锉) 龙齿 犀角 (镑) 玄参 山梔子 (去皮) 桔梗 (炒) 各一两半 丹砂二两 (别研入药)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。

每服三十丸，空心以熟水送下。

【主治】骨蒸热劳，心烦闷，手足背膊痠疼，四肢沉重，食不作肌肤，日渐黄瘦。

68904 柴胡丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】柴胡（去苗） 黄连（去须） 知母（焙） 赤芍药 龙胆 黄芩（去黑心） 地骨皮 麦门冬（去心，焙） 茯神（去木） 甘草（炙） 各一两 槟榔（锉） 三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】妇人血风劳气，头目昏眩，胸背拘急，四肢痠痛，心躁烦热，气满腹胀，腰膝无力，经候不调。

68905 柴胡丸

《幼科证治大全》。为《卫生总微》卷十五“柴胡黄连膏”之异名。见该条。

68906 柴胡汤

《金匱》卷中。为《伤寒论》“小柴胡汤”之异名。见该条。

68907 柴胡汤

【方源】《外台》卷三十三引《古今录验》。

【组成】甘草（炙） 柴胡各二两 麻黄二两（去节，煎去沫） 大枣十二枚（擘） 食茱萸一升

【用法】上切。以水六升，煮取三升，适寒温服一升，每日三次。

【功用】除热下气。

【主治】妊娠不欲食，或吐，或食噫醋。

【加减】食噫醋，春秋冬夏，去茱萸，加枸杞一斤；六月，加小麦一斤，石膏三两；秋，去石膏，加甘草一两；九月，去麻黄，加干姜一两；十月，加芎藭三分。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

68908 柴胡汤

【方源】《医心方》卷十四引《古今录验》。

【组成】知母二两 生姜三两 萎蕤三两 柴胡八两 大黄三两 黄芩二两 甘草一两（炙） 人参一两 半夏二两（洗） 桑螵蛸七枚（炙）

【用法】上切。以水一斗，煮得三升，温饮一升，每日三次。

【主治】伤寒八九日，腹满，外内有热，心烦不安。

68909 柴胡汤

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】柴胡三两 枳实三两（炙） 栝楼三两 黄芩三两 梔子仁三两 茵陈三两 龙胆二两 大黄三两（切）

【用法】上切。以水九升，煮取二升七合，去滓，分温三服。

【主治】天行五六日，壮热，骨烦疼，兼两胁连心肋下气胀急硬痛，不能食，恐变发黄者。

【宜忌】忌热面、蒜。

68910 柴胡汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】柴胡四两 白术 芍药（一方作紫葳） 甘草各二两 苡蓉一两 芎藭二两 麦门冬二两 干地黄五两 大枣三十枚 生姜六两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。中间进糜粥，七日更服一剂。

【主治】曾伤六月胎者。

【宜忌】勿食生冷及坚硬之物。

【方论选录】《千金方衍义》：前胎伤在六月，法当预培胃气，而反不用参、苓，必是妊娠大便艰燥，更衣时微有寒热，故用苡蓉、柴胡佐麦冬、地黄以滋血气。不费努挣，胎自安矣。设本妇大便不实，则退苡蓉而进参、苓，可预拟也。

68911 柴胡汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】柴胡八两 桃仁五十枚 当归 黄耆 芍药各三两 生姜八两 吴茱萸二升

【用法】上咬咀。以水一斗三升，煮取三升，去滓，先食服一升，每日三次。

【主治】产后往来寒热，恶露不尽。

【备考】《千金翼方》以清酒一斗煮。

68912 柴胡汤

【方源】《外台》卷三引《救急方》。

【组成】麻黄二两（陈者，去节） 柴胡三两 黄芩三两 甘草二两（炙） 干葛二两 石膏五两（碎，绵裹） 葱白根（切）一升（勿令有青处，青即熟，白即冷。一作桑根皮） 豉七合（绵裹，三沸出之）

【用法】上切。以水九升，宿渍药，明旦先煮麻黄令沸，掠去上沫，然后并诸药煮取一升七合，分三服，服别相去三食顷。良久覆取汗。汗出以粉拭之。

【主治】天行热气，头痛，骨肉痠痛，壮热，已进豉尿汤，病不除者。

【加减】恶寒多，加桂心一两。

【宜忌】忌海藻、菰菜。

68913 柴胡汤

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】柴胡八分 升麻六分 芍药六分 黄芩六分 甘草五分 石膏十二分（碎，绵裹） 生麦门冬六分（去心） 葱白半分 香豉六合（绵裹） 生姜六分 竹叶（切）一升（洗）

【用法】上切。以水九升，煮取二升五合，绞去滓，分温三服，服别相去如人行六七里进一服。不吐不利愈。

【主治】天行后乍寒乍热，昏昏不省觉，胁下痛，百节骨痛，咳不能下食，及口舌干生疮。

【宜忌】忌海藻、菰菜、热面、油腻。

68914 柴胡汤

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】柴胡七分 茵陈七分 大黄十二分（别渍） 升麻七分 梔子四枚（擘） 芒消四分（汤成下） 芍药七分 黄芩十二分

【用法】上切。以水四升，先渍药，少时猛火煮取一升五合，分温三服，服别相去如人行六七里吃一服。以快利为度；第二服则利，更不须服之。

【主治】天行恶寒壮热，头痛，大小便赤涩，不下食饮。

【宜忌】忌热食、炙肉、蒜、粘食。

68915 柴胡汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】柴胡八分 茯苓八分 橘皮六分 人参六分 厚朴八分（炙） 桔梗六分 紫苏五分 生姜十六分 诃梨勒七枚（去核，煨） 甘草五分（炙）

【用法】上切。以水八升，煮取二升五合；绞去滓，分温三服，服别相去如人行六七里进一服。不吐利。

【主治】两胁下妨，呕逆不下食。

【宜忌】忌海藻、菰菜、醋物、猪肉。

68916 柴胡汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】柴胡十分 茯苓八分 枳实八分（炙） 白术八分 生姜八分（合皮，切） 麦门冬八分（去心） 甘草六分（炙）

【用法】上切。以水六升，煮取二升三合，绞去滓，分温三服，每服相去如人行六七里。

【主治】身体烦疼，头痛，吃食呕逆不得食。

【宜忌】忌海藻、菰菜、酢物、桃、李、雀肉、热面、炙肉、油腻。

68917 柴胡汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【异名】柴胡散（《圣惠》卷五十）。

【组成】柴胡六分 当归六分 青木香六分 犀角（屑）六分 槟榔十个 甘草二分（炙）

【用法】上切。以水七升，煮取二升半，绞去滓，纳麝香末，分温三服，如人行四五里。微利为度。

【主治】胸膈满塞，心背振痛，走注气闷。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生菜、热面、荞麦、猪、鱼、蒜。

68918 柴胡汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】柴胡三两 枳实三两 生姜三两 白术三两 甘草（炙）一两 槟榔七个

【用法】上切。以水六升，煮取二升，绞去

滓，分温二服，服别如人行六七里进一服。小弱人微利。

【主治】胸膈间伏气不下食，脐下满。

【宜忌】禁生冷、蒜、腥、海藻、菰菜、桃、李、雀肉。

68919 柴胡汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡一两（去苗） 犀角屑一两 赤芍药三分 黄芩一两 梔子仁十四枚 川大黄一两（锉碎，微炒） 川朴消一两半

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候，如人行四五里再服。以利为度。

【主治】伤寒五日，舌干而渴，烦热不解，大小肠皆涩。

68920 柴胡汤

【方源】《圣惠》卷十三。

【异名】柴胡散（《伤寒广要》卷八）。

【组成】柴胡（去苗） 枳实（麸炒微黄） 赤芍药 半夏（汤洗七遍，去滑） 黄芩各三分 甘草半两（炙微赤，锉） 桔梗一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒十余日，热气结于胸中，往来寒热不定。

68921 柴胡汤

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡（去苗） 枳实（麸炒令黄色） 知母 黄芩 梔子仁 麦门冬（去心，焙） 龙胆（去芦头） 川大黄（锉碎，微炒） 甘草（炙微赤，锉） 各一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病五日，壮热，骨节烦疼，目眩，胁下胀痛，不能饮食，欲变成黄。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“柴胡散”。

68922 柴胡汤

【方源】《苏沈良方》卷九。

【组成】柴胡 荆芥穗 秦艽 知母 当归 官桂 藿香 甘松 败龟（醋炙） 川乌头（炮） 地骨皮 白胶香 芍药各半两 京芎一两 苈根（湿秤）二两（切碎）

【用法】上并净洗晒干，为粗末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎七分，去滓，早、午食后、夜睡各一服。三服滓并煎作一服吃。

【主治】瘰癧。

【宜忌】忌一切鱼、面等毒及房事。

68923 柴胡汤

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】柴胡 前胡 防风 杏仁（去皮尖） 羌活 茯苓 甘草 芍药各一分 麦门冬（去心）一分 干地黄八铢 半夏二铢

【用法】上为粗散。水一盏，葱白一根，同煎三四钱匕，取八分，去滓，食后服，或不拘时候。

【主治】肝心气实，风血相搏，大府结涩，口苦舌粗，甚则口干胶，小府赤，头痛眼昏，六脉洪大而实。

68924 柴胡汤

【方源】《普济方》卷二十七引《护命》。

【组成】柴胡（去苗） 射干 防葵（去芦） 牡丹皮 大黄（皂荚水二钟煮干） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 紫菀（去土） 葶苈子（隔纸炒） 紫苏子各二两

【用法】上药治下筛。每服二钱，水一盏，加生姜二片，同煎至八分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】肺壅热，上膈昏滞，头面及鼻内生疮，精神不爽，胸中烦渴。

【加减】小便多，减射干。

【备考】方中防葵，《圣济总录》作“防风”。

68925 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】柴胡（去苗） 前胡（去芦头） 桔

梗(炒) 贝母(去心) 牡丹皮 黄芩(去黑心) 麻黄(去根节) 各一两 甘草(炙, 锉) 枳壳(去瓢, 麸炒) 各一钱 升麻半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎两三沸, 去滓, 食后、临卧服。

【主治】因于露风成寒热, 精神昏困, 肢节烦疼。

68926 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】柴胡(去苗) 麻黄(去根节) 石膏各一两 甘草半两(炙)

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加盐豉三十粒, 葱白二寸, 煎至六分, 去滓, 并三服。汗出为度。

【主治】伤寒三日以前, 表证不除; 或时行一日至三日, 头痛壮热, 心神烦闷。

68927 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 各一两 犀角(镑) 芍药各三分 山栀子仁半两 大黄(细锉, 炒) 一两半 木通(锉) 三分 朴消一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加竹叶三片, 同煎至一盞, 去滓, 空腹服。大小肠通为度, 如未通再服。

【主治】伤寒四日以后, 烦热不解, 大小肠涩。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“柴胡散”。

68928 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】柴胡(去苗) 二两 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 各一两 牡蛎(生用) 甘草(炙) 各半两 栝楼根一两半 木通(锉) 一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜半分(拍碎), 葱白五寸, 同煎至七分, 去滓, 食后温服。

【主治】伤寒发汗下之后, 过经不解, 胸胁满结, 渴而不呕, 但头汗出, 往来寒热, 小便不通。

68929 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】柴胡(去苗) 一两 麻黄(去根节) 一两半 升麻一两 桂(去粗皮) 三分 大黄(锉, 炒) 一两 甘草(炙) 三分 鳖甲(醋炙, 去裙襴) 一两一分 枳实(去瓢, 麸炒) 知母(焙) 各三分 梔子仁一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜三片, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】时行疫疠, 数日未得汗, 浑身壮热, 呕逆不下食。

68930 柴胡汤

《圣济总录》卷二十二。为《圣惠》卷十七“柴胡散”之异名。见该条。

68931 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡(去苗) 一两 大黄(锉, 微炒) 黄芩(去黑心) 芍药 半夏(汤洗七遍, 焙干) 各三分 枳壳(去瓢, 麸炒) 半两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜一分(拍碎), 煎至七分, 去滓温服。

【主治】伤寒热实, 得汗不解, 腹满胀痛, 烦躁谵语。

68932 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡(去苗) 人参 黄芩(去黑心) 各一两 犀角(镑) 朴消 茯神(去木) 各三分 甘草(炙, 锉) 半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】伤寒热实, 烦躁谵语。

68933 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】柴胡(去苗) 桑根白皮 羌活(去芦头) 百合 当归(切, 焙) 各一两半

石膏(碎) 麻黄(去根节,先煎,掠去沫,焙) 天雄(炮裂,去皮脐)二两 黄连(去须) 贝母(煨,去心) 五味子 桂(去粗皮) 枳壳(去瓢,麸炒) 白石脂 款冬花各一两 黄芩(去黑心)半两 杏仁十枚(去皮尖双仁,炒)

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜一枣大(切),煎至八分,去滓温服。

【主治】伤寒后咳嗽经旬未愈。

68934 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】柴胡(去苗) 桑根白皮 天雄(炮裂,去皮脐) 芎藭 赤石脂 五味子各一两半 桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 黄连(去须) 百合 地榆各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服。

【主治】伤寒咳嗽,肢体疼痛,烦热。

68935 柴胡汤

《圣济总录》卷二十八。为原书卷二十一“柴胡大黄汤”之异名。见该条。

68936 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】柴胡(去苗)一两 升麻 芎藭 麦门冬(去心,焙) 甘草 黄芩(去黑心)各三分 知母(焙) 黄连各五钱

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜一枣大(拍碎),豉一百粒,葱白五寸,煎至一盞,去滓,食后温服。

【主治】伤寒热病后,乍寒乍热,骨节痛,口舌生疮。

【备考】方中知母、黄连用量原缺,据《普济方》补。

68937 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡(去苗) 黄耆(锉) 赤茯苓(去黑皮)各一两 秦艽(去苗土) 地骨皮 黄芩(去黑心) 葛根(锉) 枳壳

(去瓢,麸炒)各半两 人参 甘草(炙)各三分 鳖甲(去裙襕,醋浸,炙)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳,五心烦热,背膊疼痛,手足无力,不能饮食。

68938 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡(去苗) 芍药 知母(焙) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒黄) 木香 山梔子仁 升麻 大青 白芷 黄芩(去黑心)各半两 细辛(去苗叶) 甘草(炙,锉)各一分 石膏一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜半分(拍碎),同煎至七分,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】伤寒后百节疼痛,壮热头疼。

68939 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡(去苗) 茵陈蒿 甘草(炙,锉) 人参各一两 大黄(锉,炒)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,小麦五十粒,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后余毒不解,颊赤口干,四肢烦热。

68940 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡(去苗)半两 酸枣仁(微炒)二两 远志(去心)一分 当归(切,焙) 防风(去叉) 甘草(炙,锉) 茯神(去木) 猪苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 黄耆(锉) 人参 生干地黄 芎藭 麦门冬(去心,焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一大盞,加生姜三片,煎至七分,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】伤寒后虚劳烦热,惊悸,不得眠睡。

68941 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】柴胡(去苗)一两 人参 栝楼根 黄芩(去黑心) 甘草(炙, 锉) 黄耆(锉) 各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜半分(切), 大枣两枚(去核), 煎至一盞, 去滓温服, 空腹、欲发前各一服。

【主治】劳疟。

68942 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】柴胡(去苗) 葛根(锉) 枣肉(焙) 甘草(炙) 槟榔(锉) 常山 乌梅(去核, 焙) 草豆蔻(去皮) 厚朴(去粗皮, 姜汁炙) 各四两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 酒半盞, 水一盞, 煎至一盞, 去滓, 未发前温服。

【主治】脾疟, 寒多热少, 有汗, 头目昏暗, 背胛拘急, 或胸膈痞闷, 呕逆咳嗽, 心腹胀痛, 面黄肌瘦, 肢节疼痛。

68943 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】柴胡(去苗) 秦艽(去苗土) 麦门冬(去心, 焙) 芦根 淡竹叶各一两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓, 加青蒿自然汁半合, 再煎沸, 未发前五更初温服。

【主治】足少阳疟, 热多汗出。

68944 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】柴胡(去苗) 常山(锉) 鳖甲(去裙襴, 醋炙令黄色) 知母(焙) 青蒿(干者) 甘草(炙, 锉) 枳壳(去瓢, 麸炒) 桂(去粗皮) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕。水一盞, 加柳枝心七枚, 葱白二寸(细切), 同煎至七分, 去滓, 空腹温服, 发前再服。

【主治】足太阳疟, 寒热。

68945 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】柴胡(去苗)二两 甘草(炙微赤, 锉) 半两 知母 人参 麦门冬(去心, 焙) 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】疟病大渴, 烦躁引饮不止, 身体皆黄, 小便不利。

68946 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】柴胡(去苗)一两半 五味子 桔梗(炒) 熟干地黄(焙) 白茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心, 焙) 紫菀(去苗) 人参 地骨皮 黄耆(锉) 白术 桂(去粗皮) 牡蛎(研粉) 各一两 半夏(去滑, 汤洗七遍) 甘草(炙) 各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜半分(拍碎), 大枣三枚(擘破), 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】寒热往来, 夜卧盗汗, 四肢无力, 饮食口苦, 上气咳嗽。

68947 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】柴胡(去苗) 厚朴(去粗皮, 姜汁炙) 白茯苓(去黑皮) 各二两 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 人参 诃黎勒(煨, 去皮) 桔梗(去芦头, 炒) 各一两半 紫苏茎叶 甘草(炙) 各一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜一枣大(拍碎), 煎至一盞, 去滓温服, 一日二次。

【主治】霍乱逆满, 两胁下妨闷, 呕不下食。

68948 柴胡汤

《圣济总录》卷四十一。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“柴胡散”之异名。见该条。

68949 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】柴胡(去苗) 地骨皮 犀角(镑) 麦门冬(去心, 焙) 葛根(锉) 黄

连(去须) 赤芍药 黄芩(去黑心) 升麻各一两 甘草(炙, 锉) 半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食后温服。

【主治】心脏实热, 上焦壅滞, 口舌生疮, 或多烦渴。

68950 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】柴胡(去苗) 竹茹 桔梗(炒) 紫菀(去土) 知母(炒) 贝母(去心, 炒) 各二两 诃黎勒皮一两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞, 生地黄汁半盞, 乌梅一个(拍碎), 煎至八分, 去滓温服, 日再夜一。

【主治】肺痿。久嗽不已, 四肢烦热, 颊赤咽燥。

68951 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】柴胡(去苗) 甘草(炙) 各一两 芎藭 独活(去芦头) 羌活(去芦头) 贝母(去心) 款冬花各半两 麻黄(去根节) 桑根白皮(锉) 各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】肺壅痰毒, 头眩呕逆。

68952 柴胡汤

《圣济总录》卷五十三。为《医心方》卷六引《删繁方》“柴胡发泄汤”之异名。见该条。

68953 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 梔子仁 石膏(碎) 羚羊角(镑) 生干地黄(焙) 各一两 芒消半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 日二夜一。

【主治】下焦热结, 大小便不通。

68954 柴胡汤

《圣济总录》卷五十七。为《外台》卷七引《广济方》“柴胡厚朴汤”之异名。见该条。

68955 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】柴胡(去苗) 鳖甲(去裙襴, 醋炙, 锉) 郁李仁(汤浸, 去皮尖, 捣碎) 芍药 大黄(锉, 炒) 各一两半 桃仁二十一枚(汤浸, 去皮尖双仁, 炒) 诃黎勒皮一两半 桂(去粗皮) 一两

【用法】上除郁李仁外, 锉如麻豆大, 再同和匀。每服四钱匕, 水一盞半, 煎至七分, 去滓, 加朴消少许, 空腹温服, 如人行四五里再服。

【主治】鼓胀坚块。

68956 柴胡汤

《圣济总录》卷五十九。为《圣惠》卷五十三“柴胡散”之异名。见该条。

68957 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】柴胡(去苗) 茵陈蒿各一两 升麻 龙胆各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓, 加地黄汁一合搅, 食后温服。

【主治】黄疸, 通身并黄。

68958 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【异名】柴胡甘草汤(《直指》卷十六)。

【组成】柴胡(去苗) 半两 甘草(炙) 一分

【用法】上锉细。以水一碗, 白茅根一握, 同煎至七分, 去滓温服。

【主治】①《圣济总录》: 黄疸。②《直指》: 热疸。

68959 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】柴胡(去苗) 枳壳(去瓢, 麸炒) 升麻 黄连(去须) 各一两 麻黄(去根节) 一两半 甘草(炙, 锉) 知母(切, 焙) 梔子仁各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至七分, 去滓, 食后温服, 每日三次。后饮少热粥, 以助药力, 汗出为度。

【主治】心黄。面赤口张，气喘多惊，饶睡，手脚烦疼，舌上疮生，心下急闷，不欲饮食，舌缩口干，七八日内必发狂走。

【备考】此证先烙上脘穴，次烙关元，及灸十八壮，若不愈，再灸七壮，次烙背心下廉及天聪，如不愈者宜服本方。

68960 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】柴胡（去苗） 延胡索 百合 枳壳（去瓢，麸炒） 麻黄（去根节） 款冬花（炒） 天雄（炮裂，去皮脐）各一两半 代赭 黄连（去须） 桂（去粗皮） 地榆 贝母（去心，煨）各一两 黄芩（去黑心）半两 旋覆花（炒）三分 杏仁十五枚（去皮尖双仁，炒令黄）

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盞，煎取七分，去滓温服。

【主治】咳嗽久不愈。

68961 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【异名】柴胡饮（原书卷七十三）。

【组成】柴胡（去苗） 赤茯苓（去黑皮）各三分 桔梗（炒） 木通（锉）各一两 芍药 鳖甲（去裙襕，醋蘸，慢火炙令黄色） 郁李仁（汤浸，去皮）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，空腹、午后各一次。

【主治】癥癖气胀，腹痛，胁肋胀满，不思饮食。

68962 柴胡汤

《圣济总录》卷八十一。为原书同卷“柴胡猪苓汤”之异名。见该条。

68963 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】柴胡（去苗） 赤芍药各一两半 旋覆花 紫苏茎叶各一两 桑白皮（炙，锉）二两 大腹（连皮，锉）二枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分（拍碎），同煎至七分，去滓，下

朴消一字，更煎一两沸，温服。

【主治】脚气，上气喘满，及毒气冲心烦闷。

68964 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】柴胡（去苗）一两一分 葛根（锉）二两 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 麻黄（去根节）各一两半 桂（去粗皮）三分 菱蕤（切，焙）二两 黄芩（去黑心）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取八分，去滓，食后温服。衣被覆取微汗，汗不可太过。

【主治】服乳石脚气发动，或憎寒壮热，头痛心闷，眼目疼，恶心欲吐，头旋脑痛。

68965 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】柴胡（去苗） 黄芩（去黑心） 泽泻 葛根（炙，锉） 升麻各一两半 玄参 三两 生干地黄（切，焙）二两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水一盞半，加竹叶七片，煎至一盞，去滓，下芒消一钱匕，分为二服，空心、食后各一次。

【功用】调气下热。

【主治】肝劳。关格不通，精神不守，气逆上冲，胸中烦闷。

68966 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】柴胡（去苗） 白术 牡蛎（烧令透）各二两 桑根白皮（炙黄） 知母（锉，焙） 木通（锉） 甘草（炙）各半两 鳖甲（去裙襕，醋炙黄）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分（拍碎），竹叶三片，煎至六分，去滓，空心温服，夜卧再服。

【主治】热劳。潮热盗汗，羸瘦减食。

68967 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】柴胡（去苗） 当归（切，焙） 麦门冬（去心，焙） 半夏（汤洗去滑，焙）各

一两半 人参 白茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙, 锉) 陈橘皮(去白, 炒) 甘草(炙, 锉) 杏仁(去皮尖双仁, 炒) 大腹(锉) 各一两 黄耆(锉) 二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜五片, 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】男子妇人急劳。咳嗽上气, 饮食减少, 痰涎壅盛, 手足痠痛, 唇口干燥, 心虚惊悸, 气乏羸劣。

68968 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡(去苗) 麻黄(去根节, 汤煮, 掠去沫) 各一两

【用法】上为粗末。用童便五盞, 同煎至两盞, 去滓, 分温二服。出汗即愈。

【主治】虚劳发热, 肢体烦疼。

68969 柴胡汤

《圣济总录》卷八十九。为《博济》卷二“柴胡散”之异名。见该条。

68970 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】柴胡(去苗) 鳖甲(去裙襕, 醋炙) 枳壳(去瓢, 麸炒) 人参 乌梅肉(炒) 白茯苓(去黑皮) 各半两 桂(去粗皮) 白术(锉) 款冬花 紫菀(去土) 桔梗(炒) 甘草(炙) 各一分 槟榔(大者, 锉) 一枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜二片, 青蒿少许, 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】虚劳。阳气外虚, 腠理不密, 荣卫发泄, 盗汗不止, 骨节热痛。

68971 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】柴胡(去苗) 三两 枳壳(去瓢, 麸炒) 二两 白茯苓(去黑皮) 三分 白术 二两 人参一两 麦门冬(去心, 焙) 一两

半

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜半分(拍碎), 煎至七分, 去滓, 空腹温服, 日午、夜卧各一次。

【主治】虚劳气逆, 心腹痞满, 四肢羸瘦, 腹胀不下食。

68972 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】柴胡(去苗) 一两半 鳖甲(去裙襕, 醋炙) 秦艽(去苗土) 知母(焙) 桂(去粗皮) 人参 白茯苓(去黑皮) 附子(炮裂, 去皮脐) 黄耆 五味子 羌活(去芦头) 木香 沉香各半两 枳壳(去瓢, 炒) 一分 枸杞子一分 槟榔(炮, 锉) 二枚

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】五劳七伤, 四肢少力, 肌瘦盗汗, 遗精心忪, 不思饮食, 咳嗽唾脓血。

68973 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】柴胡(去苗) 三分 黄耆(锉) 一两 厚朴(去粗皮, 涂生姜汁炙) 半夏(汤洗去滑, 焙干) 各三分 人参 白茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 各半两 当归(切, 焙) 麦门冬(去心, 焙) 各二两 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 甘草(炙, 焙) 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 别研) 槟榔各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜一分(切碎), 煎至一盞, 去滓, 空腹顿服, 夜卧再服。

【主治】虚劳羸瘦, 心虚惊悸, 气乏力劣。

68974 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】柴胡(去苗) 赤茯苓(去黑皮) 各一两半 枳壳(去瓢, 麸炒) 三两 白术 地骨皮各一两 葛根(锉) 二两 甘草(炙, 锉) 一两 木通(锉) 二两 麦门冬(去心,

焙)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(切碎)，煎至一盞，去滓，空腹温服，一日二次。

【主治】虚劳发热，心中烦闷，面黄口干，腹中虚满，腰背急痛。

68975 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】柴胡(去苗)四两 大枣(去核，焙)六枚 黄芩(去心) 人参 甘草(炙，锉) 半夏(汤洗去滑，生姜汁制) 桂(去粗皮) 芍药各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大(切)，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】寒疝心腹痛。

68976 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】柴胡(去苗)一两半 当归(切，焙) 食茱萸(去枝茎)各一两 芍药一两半 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙熟，锉)一两 槟榔(炮，锉)三枚 郁李仁(汤浸，去皮)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】虫心痛。

68977 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】柴胡(去苗)一两 升麻一两半 车前子 决明子(微炒) 梔子仁 黄芩(去黑心) 黄连(去须) 甘草(炙，锉) 防风(去叉) 羚羊角(镑) 马牙消各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食后、临卧服。

【主治】肝虚风热上冲，目暗赤痛。

68978 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】柴胡(去苗)二两 黄芩(去黑

心)一两 芎藭二两 芍药二两 大黄(锉碎，炒香)二两 石膏五两 羚羊角(镑)二两 茯神(去木)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，加竹叶七片，煎至一盞，去滓，投芒消半字，放温，空心顿饮。以利为度；如利频，去芒消，以粥止之。

【主治】积年风毒瘀热，目赤时痛。

【宜忌】如秋月肝弱时，不宜泻肝，宜加补药，即不用此方。

68979 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】柴胡(去苗) 大黄(锉，炒)各一两半 决明子(炒) 泽泻 升麻 芍药 白茯苓(去黑皮) 枳壳(去瓢，麸炒) 梔子仁 黄芩(去黑心) 黄连(去须) 细辛(去苗叶) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁)各一两 甘草(炙，锉)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，苦竹叶十片，煎至一盞，去滓，投芒消末一钱匕，食后临卧温服。

【主治】眼赤息肉，生翳膜，漠不见物。

68980 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 梔子仁 赤芍药 升麻 麦门冬(去心) 甘草(炙，锉)各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一小盞，去滓放温，食后、临卧服。

【功用】去脾肺热毒气。

【主治】斑痘疮入眼。

68981 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】柴胡地骨皮汤(《宣明论》卷一)、柴胡地骨散(《赤水玄珠》卷三)、柴皮汤(《杏苑》卷六)、柴胡地骨皮散(《外科集腋》卷三)。

【组成】柴胡(去苗) 地骨皮各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，细含咽之。

【主治】①《圣济总录》：口糜生疮。②《宣明论》：小肠有热，胀满。

【方论选录】《古方选注》：以柴胡内开腑间结气，外通开阖之机，佐以地骨皮之甘寒，专泻下焦热淫，仍赖柴胡引领清气上升而行阳道，则热解糜平。

68982 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】柴胡（去苗）一两 枳壳（去瓢，麸炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙烟尽）各三分 黄连（去须）半两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后分二服。

【主治】肾虚，牙齿龈肿，膈上热。

68983 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】柴胡（去苗）一两 桃仁（去皮尖双仁，炒）半两 天门冬（去心）三分 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙） 白茯苓（去黑皮） 山芋 黄耆（锉） 阿胶（炙令燥） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠咳嗽，胸满气急，减食。

68984 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】柴胡（去苗） 白术各一两（米泔浸半日，炒） 芎蒭 当归（焙干） 芍药 防风（去叉） 赤茯苓（去黑皮）各一分 黄耆（细锉） 生干地黄（焙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加大枣二枚（擘破），生姜三片，煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，憎寒壮热，头痛体疼。

68985 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】柴胡（去苗） 芍药 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓢，麸炒） 人参 当归（切，炒）各一两 半夏半两（汤洗去滑，姜

汁炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒，呕逆烦躁，热盛头疼。

68986 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】柴胡（去苗） 黄芩（去黑心） 人参 当归（切，焙） 生干地黄（焙） 甘草（炙） 猪苓（去黑皮）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎八分，去滓，当未发前及空心、日午、临卧服。

【主治】产后诸症，寒热往来，烦渴。

68987 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】柴胡（去苗） 生干地黄（焙） 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 人参 白茯苓（去黑皮） 芎蒭 黄耆 芍药 肉苁蓉（去皱皮，切，酒浸，焙） 石斛（去根）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚热久不解，渐成劳气。

68988 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】柴胡（去苗） 麻黄（去根节煎，掠去沫，焙） 紫苏茎叶 陈橘皮（去白，焙） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后咳嗽，喘急烦闷。

68989 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】柴胡（去苗） 附子（炮裂，去皮脐） 黄耆 秦艽（去苗土） 鳖甲（醋炙，去裙襕）各一两 芎蒭 桂（去粗皮） 牡丹皮 白茯苓（去黑皮） 知母（焙） 当

归(切,焙) 桃仁(去皮尖双仁,炒) 芍药(炒)各三分

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜五片,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后虚羸寒热,骨节疼痛,四肢无力。

68990 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】柴胡(去苗,锉)一两 甘草(炙,锉) 人参 白茯苓(去黑皮) 当归(切,炒) 赤芍药(锉) 枳壳(去瓢,麸炒) 厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙) 黄耆(锉)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞半,先煮猪肾一只,取汁一盞,去肾入药,加生姜三片,葱白三寸,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后蓐劳。寒热,日渐瘦损。

68991 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 陈橘皮(汤浸,去白,切,炒) 泽泻 羚羊角(镑)各三分 梔子仁 赤茯苓(去黑皮)各一两 石膏(捶碎) 芒消(别研)各一两半

【用法】除芒消外为粗末。每服三钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,下芒消末半钱匕,更煎一沸,温服。

【主治】产后内热,大小便不通。

68992 柴胡汤

《圣济总录》卷一六七。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

68993 柴胡汤

《圣济总录》卷一六八。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

68994 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】柴胡(去苗) 升麻 黄芩(去黑心) 甘草(炙赤) 大黄(锉,炒令香)各

半两 石膏(碎)三分 钩藤一分 蛭蟬(去翅足,微炙)一枚 蛇蛻皮二寸(炙令黄色)

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水一小盞,煎至半盞,去滓,加竹沥半合,更煎一两沸,半月至一月儿,斟酌与之;稍大,以意增加。

【主治】未满月及出月儿壮热发病。

68995 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【异名】柴胡饮(《医部全录》卷四四二)。

【组成】柴胡(去苗)一分 枳壳(去瓢,麸炒)二枚 诃黎勒大者一颗(煨,取皮用) 黄芩(去黑心) 甘草(炙,锉) 芍药 知母(焙)各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水七分,煎至四分,去滓温服。

【主治】小儿疟发寒热,腹胀下痢,呕逆黄瘦。

68996 柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】柴胡(去苗)三分 当归(切,焙)一分 赤茯苓(去黑皮) 大黄(锉,炒)各半两 甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盞,煎至三分,去滓,分温二服,早、晚各一次。

【主治】小儿百日以来痰实。

【备考】《普济方》有黄芩,无当归。

68997 柴胡汤

《普济方》卷二十七。即《圣惠》卷二十六“柴胡散”。见该条。

68998 柴胡汤

《普济方》卷二十七。为《圣惠》卷四十六“柴胡散”之异名。见该条。

68999 柴胡汤

《普济方》卷七十四。即《朱氏集验方》卷九“柴胡散”。见该条。

69000 柴胡汤

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】柴胡一两半(去苗) 贝母(煨微黄) 葛根(锉) 赤芍药 黄芩 梔子仁

各一两 石膏二两 知母 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)各三分

【用法】上为粗末。每服四钱,水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽,烦热,四肢骨节头目疼痛。

69001 柴胡汤

《普济方》卷一三九。即《圣惠》卷十二“柴胡散”。见该条。

69002 柴胡汤

【方源】《普济方》卷二二九。

【组成】柴胡 杏仁各三两 秦艽 青蒿子各三两 犀角 知母 桔梗 人参 桑根白皮 葳蕤 甘草 鳖甲(蜜炙)各一两 山梔子仁半两 赤茯苓二两

【用法】上为散。水一盏,煎七分,去滓服,不拘时候。

【主治】劳热烦躁,不进饮食。

69003 柴胡汤

【方源】《普济方》卷二三〇。

【组成】前胡(去芦头) 柴胡(去苗) 桔梗(炒) 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 人参 枳壳(去瓤,麸炒) 鳖甲(去裙襴,醋炙)各一两 旋覆花一两半 甘草(炙,锉)半两 石膏(碎)一分

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】虚劳荣卫不调,寒热羸瘦,肢体烦倦,头目昏疼,饮食无味,多困少力。

69004 柴胡汤

【方源】《普济方》卷二三六。

【组成】柴胡(去苗)一两 胡黄连半两 紫菀(去土) 知母各三分 鳖甲(小者)半斤(小便浸一宿,醋炙) 天灵盖(醋炙)一两 秦艽(去苗土)一两 甘草(炙黄)半两 杏仁(去皮尖双仁,炒)一两 地骨皮三分

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盏,加青蒿少许,同煎至七分,露天处安一夜,去

滓,平旦空腹温服。

【主治】骨蒸劳热。

69005 柴胡汤

【方源】《普济方》卷二六一。

【组成】柴胡 黄芩 甘草(炙) 茯苓 麦门冬(去心) 枳实(炙) 生地黄各三两 竹叶(切)一升

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,去滓分服。

【主治】膈上热。

69006 柴胡汤

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】柴胡 当归 细辛各三分 黄芩 大黄 升麻 五味子 紫菀各三分 牛黄(无牛黄以麝香代之) 杏仁四十个(去皮,炒)

【用法】上切。以水五升,煮取一升,每服二合,日进三服,夜二服。

【主治】小儿胁下实,肌惕惕,已发温壮伤寒。

69007 柴胡汤

【方源】《婴童百问》卷一。

【异名】柴胡饮(《医学入门》卷六)、柴胡人参汤(《医林纂要》卷九)。

【组成】人参 甘草(微炙) 麦门冬(去心)各二钱 龙胆草 防风各一钱 柴胡三钱

【用法】上锉散。每服三钱,水煎服。

【主治】①《婴童百问》:小儿变蒸骨热,心烦,啼叫不已。②《医方易简》:小儿无辜痞。

69008 柴胡汤

【方源】《广嗣纪要》卷九。

【组成】柴胡一钱半 赤茯苓 麦冬 条芩各一钱 人参 橘皮 甘草(炙)各五分

【用法】水一盏半,加生姜三片,煎八分,温服。

【主治】妊娠子烦,烦闷不安,呕吐恶阻。

69009 柴胡汤

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】柴胡 半夏 黄芩 甘草 常山

白茯苓 苍术 乌梅 干姜 草果 槟榔
苏叶 青皮 陈皮

【用法】水煎服。

【主治】小儿疟，久不愈。

69010 柴胡汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】柴胡 芍药 龙胆草 当归 青皮 山梔 连翘各一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】肝火盛，水气实，或胁痛，或气从左边起者，或目红肿痛。

69011 柴胡汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏(姜汁炒) 苍术(米泔浸) 厚朴(姜炒) 陈皮 青皮(去瓢) 枳壳(麸炒) 神曲(炒) 山楂肉 三棱 莪术各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一枚，水煎服。

【主治】积块属热者。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“加味柴平汤”；《杂病广要》引作“柴平汤”。

69012 柴胡汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 半夏(姜炒)二钱 人参一钱 紫草二钱 黄连二钱 茯苓二钱 甘草二钱

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】气分有热发斑。

69013 柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 防风 荆芥

【主治】病在少阳，风寒发热，脉弦而数。

【加减】伤寒，加羌活、独活；伤风，加防风。

69014 柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 甘草 青皮 山梔 枳壳 木通 苏梗

【主治】运气胁痛。病起于仓卒，暴发寒热，

胁肋刺痛，沿门相似，或在一边，或在两边，痛之不已，胀及遍身，甚则指甲紫黑而死。此天灾流行之疫症，俗名刺肋伤寒，又名痧胀者。若少阳司政者，本方主之。

69015 柴胡汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱 陈皮一钱 甘草一钱 生姜一钱 大枣一枚

【主治】①《瘟疫论》：瘟疫里症下后，续得盗汗，表有微邪者。②《会约》：疫病下后，内无邪热，犹未汗者。

69016 柴胡汤

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】柴胡 黄耆 赤苓 白术二两 人参 地骨 枳壳(麸炒) 桑皮 赤芍 生地 麦冬 甘草

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】肝热，热在肌肉之下，骨之上，寅卯间尤甚。

69017 柴胡汤

【方源】《幼科指掌》卷一。

【组成】柴胡 人参 甘草 龙胆草各一钱

【用法】河水一碗，煎三分，略饮数匙。

【主治】小儿变蒸实热。

69018 柴胡汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄芩 柴胡 白芍(炒) 丹皮 陈皮 甘草 山楂 神曲

【用法】水煎服。兼服和中丸或抱龙丸。

【主治】小儿湿热出汗。

69019 柴胡汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】当归一钱二分 白芍 柴胡 黄芩各一钱 熟地 甘草各三分 半夏(制) 川芎各七分 人参 麦冬(去心)各五分 生姜三片

【用法】水煎，空心热服。

【主治】妇女十七八岁，因脾胃虚弱，气血不行，而致经脉不通，或阻隔半年百日，面

色青黄，饮食不思，或作寒热，头痛眩晕，腹中结块，烦闷呕吐，或作膨胀。

【加减】不睡，加枣仁（炒）；呕吐，加砂仁七分，白术六分（蜜炙），香附七分（制）；咳嗽，加杏仁六分（去皮尖），五味子五分，苏叶、桔梗各七分。

69020 柴胡汤

【方源】《验方新编》卷十五。

【组成】生地四钱 白芷三钱 天冬一钱 青蒿六钱 柴胡一两 玄参 生耆 连翘各三钱 百合五钱 知母三钱

【用法】水煎服。

【主治】中蛊。额焦口腥，神昏性躁，目见邪鬼形，耳闻邪鬼声，如犯大罪，如见恶役持练锁至，如有刀兵、健卒追赶，常思自尽。

【宜忌】宜戒荤盐，俟毒净自愈，愈后不用戒鱼虾等物。

69021 柴胡汤

《不知医必要》卷三。为《保婴撮要》卷十八“柴芩汤”之异名。见该条。

69022 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】柴胡（去苗） 芎藭 桑根白皮（炙，锉）各一两半 白槟榔 羚羊角（镑） 人参 黄连（去须） 天雄（炮裂，去皮脐）各一两 旋覆花（炒） 桂（去粗皮） 枳壳（去瓢，麸炒）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盞，加生姜三片，煎取七分，去滓温服。

【主治】首风，头重呕哕。

69023 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】柴胡（去苗） 赤茯苓（去黑皮）各三分 槟榔（煨，锉） 五味子（炒）各半两 桂（去粗皮） 高良姜 羌活（去芦头）各一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒柔痉，四肢逆冷，汗不止，腹

中痛，筋脉急。

69024 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡（去苗） 升麻 茯神（去木） 芍药 犀角（镑） 百合 地骨皮 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心） 人参各半两 鳖甲（去裙襕，醋炙） 石膏各一两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分（拍碎），竹叶三七片，同煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】伤寒后骨节疼痛，咳嗽不能食，口舌干燥，乍寒乍热，唇口生疮。

69025 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】柴胡（去苗）半两 常山三分 甘草（生）半两 附子（炮裂，去皮脐）半两 干姜（炮裂）一分

【用法】上锉，如麻豆大。每用五钱匕，酒一盞半，煎至一盞，去滓，分二服，空心未发时一服，食后再服。

【主治】久疟不愈，将成骨蒸劳，寒热无时。

69026 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】柴胡（去苗）二两 桑根白皮（锉） 防风（去叉） 芍药 玄参 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服半两，水三盞，加生姜五片，煎至二盞，去滓，日午、临卧分温两服。

【主治】心热多汗，骨蒸盗汗，咳嗽，五心烦热。

69027 柴胡饮

《圣济总录》卷四十九。为《圣惠》卷四十六“柴胡散”之异名。见该条。

69028 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】柴胡（去苗） 葛根（锉） 芦根（锉） 地骨皮 百合（干者） 桑根白皮（锉） 知母（切，焙） 萎蕤各三分 贝母

(去心,炒) 茅根(锉) 犀角(镑) 甘草(炙,锉) 木通(锉) 半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盞,加生地黄半分,同煎至七分,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】消渴,上焦虚热,心中烦躁。

69029 柴胡饮

《圣济总录》卷七十三。为原书卷七十二“柴胡汤”之异名。见该条。

69030 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡(去苗)半两 白术 赤茯苓(去黑皮) 鳖甲(去裙襕,醋炙)各一分半 知母(切,焙) 犀角屑各一分 枳壳(去瓢,麸炒)一分半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至半盞,去滓温服,早晨、日午、夜卧各一服。

【主治】虚劳咳嗽,气喘颊赤,心忪烦躁,两胁胀闷,肌瘦少力,不思饮食。

69031 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】柴胡(去苗) 枳壳(去瓢,麸炒) 白茯苓(去黑皮) 京三棱(煨,锉) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各一两 白术(炒令黄色)半两

【用法】上锉细,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜一分(拍碎),煎至八分,去滓温服。

【主治】虚劳,心腹痞满,不思饮食。

69032 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】柴胡(去苗)一两半 半夏(汤洗七遍,焙)三分 牡丹皮二两 当归(锉,焙)一两半 白茯苓(去黑皮)一两半 桃仁(去皮尖双仁,炒)四十枚 吴茱萸(洗,焙,微炒) 大黄(饭甑中蒸三遍,炒) 白术 桑寄生 桂(去粗皮) 芎藭各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盞,

煎至一盞,去滓,空腹温服。

【主治】妇人月经不通,腰腹冷痛,面无颜色,渐至羸瘦,腹胀气满,欲成骨蒸。

69033 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】柴胡(去苗) 牛膝(去苗) 枳壳(去瓢,麸炒)各二两 菴苣子 大黄(锉,炒) 土瓜根各二两半 牡丹皮 桂(去粗皮)各一两半 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒)五十枚 朴消二两

【用法】上咬咀。每服三钱匕,水一盞,加生姜一枣大(拍碎),煎至六分,去滓温服,有顷再服。

【主治】室女月水不通,心腹胀满。

69034 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】柴胡(去苗) 赤芍药 麦门冬(去心,焙) 人参 黄耆(微炒,锉) 甘草(炙)各半两 生地黄一两半(研,绞取汁)

【用法】上七味,六味为粗末。每服三钱匕,以水一盞,入地黄汁一分,同煎至六分,去滓温服,一日二次。

【主治】妊娠阻病,头疼,四肢羸弱,不思食饮,唯思眠睡。

69035 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】柴胡(去苗) 桑上寄生 知母(切,焙) 百合(洗) 麦门冬(去心,焙) 升麻各一两 甜竹茹(新竹刮用)三兩

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,同煎至一盞,去滓,食后温服。

【主治】妊娠虚烦懊热,胎气不宁,手足烦倦。

69036 柴胡饮

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】柴胡(去苗) 人参 知母(焙) 羚羊角(镑) 甘草(炙) 陈橘皮(汤浸,

去白，焙） 赤茯苓（去黑皮） 半夏（汤洗七遍去滑，焙） 木通（锉） 芍药各等分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，加生姜一片，同煎至五分，去滓温服，一日二次。

【主治】小儿潮热。

69037 柴胡饮

【方源】《幼幼新书》卷二十引《庄氏家传》。

【组成】柴胡（去苗） 青蒿 嫩桃枝 嫩柳枝（各阴干取） 地骨皮 甘草（炙）各二两

【用法】上锉细。每服二钱，加乌梅一个（拍破），小麦四十九粒，水一盞，煎七分，食后、临卧温服。

【主治】小儿肌热盗汗，不思饮食。

69038 柴胡饮

《医学纲目》卷二十六。即《卫生宝鉴》卷五“柴胡散”。见该条。

69039 柴胡饮

《校注妇人良方》卷五。为《宣明论》卷四“柴胡饮子”之异名。见该条。

69040 柴胡饮

《医学入门》卷六。为《婴童百问》卷一“柴胡汤”之异名。见该条。

69041 柴胡饮

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】北柴胡（去芦，净洗） 人参（去芦） 当归（酒洗） 黄芩 赤芍药 甘草（炙）各一两 大黄（生用） 桔梗（去芦，锉，炒） 北五味子（去梗） 半夏（汤煮透，去滑）各半两

【用法】上锉。每服二钱，水一盞，加乌梅一个，生姜二片，煎七分，温服，不拘时候。

【主治】小儿骨蒸痞气，五心烦热，日晡转盛，口干无味，渴多身瘦，胸满痰紧，小便黄色，食减神昏。

69042 柴胡饮

《准绳·幼科》卷九。即《颅凶经》卷下“柴胡引子”。见该条。

69043 柴胡饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】柴胡 防风 荆芥 黑参各八分 大黄二钱 黄芩 滑石各一钱半 甘草五分

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】痘疮初起热甚，表里俱实。

69044 柴胡饮

《医部全录》卷四四二。为《圣济总录》卷一七四“柴胡汤”之异名。见该条。

69045 柴胡饮

【方源】《观聚方要补》卷一引《孝慈备览》。

【组成】柴胡一钱五分 广皮 细辛 厚朴 半夏一钱半 甘草八分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】四时感邪，或三阳并病，或时逢寒胜，症无内热，而用凉药致寒邪凝滞。

【加减】阴寒胜，加桂枝。

69046 柴胡饮

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】赤芍药 柴胡 黄连 半夏（姜制） 桔梗 夏枯草 龙胆草 浙贝母 黄芩 甘草（生）

【用法】引用灯心，水煎服。服后需配以芦荟肥儿丸以消其痞。

【主治】小儿无辜痞。证见颈项生疮，或项内有核如弹，按之转动，软而不疼，其中有虫如米粉，便利脓血，身体羸瘦，面黄发热。

69047 柴胡饮

《会约》卷十。为《景岳全书》卷五十一“一柴胡饮”之异名。见该条。

69048 柴胡饮

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】柴胡五钱 红花三钱 大桃仁（不去尖）三钱（研末）

【用法】将柴胡、红花用酒煎好，调桃仁末热服。

【主治】大怒及从高坠下，血积肋下，左边疼。

69049 柴胡饮

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】柴胡 生地 赤芍 羌活 防风 荆芥 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【主治】烂弦风眼。

【加减】烂甚，加薄荷、消、黄。

69050 柴胡饮

【方源】《白喉全生集》。

【组成】柴胡（去芦） 羌活 法夏（姜汁炒） 僵蚕各二钱（姜汁炒） 桔梗 银花各五分 蝉退七只（去头足翅） 厚朴五分（姜汁炒） 陈皮 粉草各一钱 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】白喉寒证初起，满喉淡红，微肿略痛，头痛，恶寒发热，饮食如常，舌苔白，二便和。

69051 柴胡散

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷八十一。

【组成】柴胡六铢 决明子十八铢

【用法】上药治下筛。人乳汁和，敷目。

【主治】眼暗。

【方论选录】《千金方衍义》：柴胡升提肝气，决明滋益精光，乳汁以和血气。

69052 柴胡散

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】柴胡八分 茵陈十分 青木香十分 黄芩八分 土瓜根十分 白鲜皮八分 梔子仁十分（擘） 大黄二十四分 芒消十二分

【用法】上为散。每服五六钱匕，平辰空肚以新汲水调下。少时当三两行微利，利后煮葱豉稀粥食之；热如未歇，明辰更服四钱匕，热歇停药。

【主治】天行热气，恶寒头痛壮热，大小便涩。

【宜忌】忌热食、猪犬肉、油腻。

69053 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】柴胡一两（去苗） 赤茯苓三分

玄参三分 大青一两 龙胆三分（去芦头） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川芒消二两 络石二两 川升麻一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾实热，舌本强，咽喉不利，体重不能行步。

【宜忌】忌炙爆热面。

69054 柴胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】柴胡（去苗） 桔梗（去芦头） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 麦门冬（去心） 鳖甲（涂醋炙令黄，去裙襴） 地骨皮 生干地黄 人参（去芦头） 葳蕤 赤茯苓 木通 赤芍药 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏壅热，胸膈烦闷，四肢疼痛。

【宜忌】忌热面、炙燂、苋菜。

69055 柴胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】柴胡一两（去苗） 赤芍药一两 枳实三分（麸炒微黄） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄芩三分 川大黄二两（锉碎，微炒） 槟榔一两 汉防己三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】大肠实热，气壅不通，心腹胀满，发歇寒热。

69056 柴胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡一两（去苗） 人参一两（去芦头） 甘草一两（炙微赤，锉） 麻黄一两半（去根节） 黄芩一两 赤芍药一两 桂心一两 石膏二两 葛根一两（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。以衣盖取汗。如人行五里，

未汗再服。

【主治】伤寒二日，头项四肢烦热疼痛。

69057 柴胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡一两半（去苗） 川大黄一两（锉碎，微炒） 常山一两半 茵陈一两 知母一两 赤芍药一两 甘草一两（炙微赤，锉） 鳖甲一两半（涂醋炙令微黄，去裙襴）

【用法】上为散。每服五钱，以淡浆水一大盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。以微吐为度，未吐再服。

【主治】伤寒四日，头痛背膊急疼，心腹壅滞。

69058 柴胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡一两（去苗） 川升麻三分 黄芩三分 知母一两 赤芍药一两 大青三分 石膏二两 梔子仁一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，豉五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒六日，头痛壮热，百节疼痛。

69059 柴胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡二两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍，去滑） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉） 知母一两 黄芩一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 人参一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，温温频服，不拘时候，稍利为度。

【主治】伤寒七日不解，心烦，肠中有结燥，谵语。

69060 柴胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】柴胡一两（去苗） 赤芍药半两 知母半两 人参一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏半两（汤浸七遍，去滑） 葳蕤半两 黄芩半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候，以微利为度。

【主治】伤寒八日不解，默默烦闷，腹中干燥，大肠结涩，狂言。

69061 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】柴胡一两半（去苗） 石膏三两人参一两（去芦头） 茯神一两 枳实一两（麸炒微黄） 桑根白皮一两（锉） 麦门冬一两（去心） 桂心三分 白术三分 防风三分（去芦头） 地骨皮三分 甘草二分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，日三服，夜一服。

【主治】伤寒中风，汗后虚燥，头痛，四肢乏力。

69062 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】柴胡一两半（去苗） 白术一两 白茯苓三分 甘草三分（炙微赤，锉） 五味子一两 干姜三分（炮裂，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 防风三分（去芦头） 桂心半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒阴痞，闭目合面，手足厥逆，筋脉拘急，汗不止。

69063 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】柴胡（去苗） 赤芍药 黄芩 梔子仁 枳壳（麸炒微黄，去瓢） 麦门冬（去心） 人参（去芦头） 赤茯苓 石膏 葛

根(銼) 甘草(炙微赤,銼)各三合

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒得汗后热不除,朝暮壮热。

69064 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】柴胡(去苗) 赤芍药 知母 梔子仁各二两 川升麻 黄芩 大青 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 甘草(炙微赤,銼)各三分 石膏四两 川大黄三分(銼碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加豉五十粒,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒谵语,头痛壮热,百骨节疼痛。

69065 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】柴胡三分(去苗) 地骨皮三分 玄参半两 黄芩三分 石膏一两 甘菊花三分 甘草半两(炙微赤,銼) 羌活半两 防风半两(去芦头) 川朴消一两半

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加竹叶三七片,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒热毒气攻眼,障翳赤涩疼痛。

69066 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十一。

【异名】六味柴胡汤(《圣济总录》卷二十三)。

【组成】柴胡一两(去苗) 桂心半两 黄芩三分 栝楼根半两 牡蛎一分(烧为粉) 甘草一分(炙微赤,銼)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒经十日以上,潮热不解,日晡即发,壮热如火,胸满呕逆。

69067 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】柴胡一两半(去苗) 黄芩三分 麦门冬一两(去心,焙) 半夏半两(汤洗

七遍去滑) 枳壳一两(麸炒令黄,去瓤) 枇杷叶三分(拭去毛,炙微黄) 甘草半两(炙微赤,銼) 人参半两(去芦头)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,干呕不止,心胸烦躁,四肢热。

69068 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】柴胡一两半(去苗) 贝母一两(煨微黄) 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 葛根一两(銼) 赤芍药一两 石膏二两 玄参(黄芩)一两 知母三分 梔子仁一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,咳嗽烦热,四肢骨节头目疼痛。

69069 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】柴胡(去苗) 川大黄(銼碎,微炒) 枳壳(麸炒微黄,去瓤) 鳖甲(去裙襕,涂醋炙令黄) 槟榔 人参(去芦头) 木香 子芩 赤芍药 赤茯苓 紫菀(去苗土)各三分 犀角屑半两 甘草半两(炙微赤,銼) 桑根白皮一两(銼)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒余热不退,发渴烦躁,胸膈气滞,不思饮食。

69070 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】柴胡一两半(去苗) 枳实半两(麸炒微黄) 黄芩半两 赤芍药三分 半夏三分(汤洗七遍去滑)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温

服，不拘时候。

【主治】伤寒发热，汗出不解，心腹痞坚，痰逆不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“柴胡汤”。

69071 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】柴胡三分（去苗） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 黄芩三分 赤芍药三分 半夏半两（汤洗七遍去滑） 大腹皮半两（锉） 槟榔三分 木香半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒发汗后气壅不散，攻心腹胀痛。

69072 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十三。

【异名】百合柴胡汤（《圣济总录》卷二十九）。

【组成】柴胡一两（去苗） 知母二两 黄连一两（去须） 甘草三分（炙微赤，锉） 百合二两 秦艽一两（去苗） 栝楼根一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒百合病久不愈，欲成癆。

69073 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】柴胡（去苗） 白茯苓 陈橘皮（汤浸，去白瓢，焙） 知母 桔梗（去芦头） 黄耆（锉） 各一两 百合二两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒百合病，羸瘦，不食少力。

69074 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】柴胡（去苗） 茵陈 木通（锉） 黄芩 土瓜根 白鲜皮 川朴消各一两 栀子仁 川大黄二两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，

加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候，以得利为度。

【主治】伤寒四五日，壮热头痛，大便不通。

69075 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡一两（去苗） 贝母一两（煨令微黄） 知母一两 人参一两（去芦头） 赤芍药一两 石膏一两 黄芩三分 白术半两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 栀子仁半两 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襖）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳，骨节烦疼，时有寒热，咳嗽，头目疼痛。

69076 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡一两（去苗） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襖） 白术三分 人参三分（去芦头） 天门冬一两（去心） 桑根白皮半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 百合三分 紫菀三分（洗，去苗土） 桔梗半两（去芦头） 款冬花半两 麦门冬半两（去心） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 黄芩半两 枇杷叶三分（拭去毛，炙令黄） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳，体瘦少力，四肢疼痛，心膈痰壅，时有咳嗽，不思饮食。

69077 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡三分（去苗） 鳖甲一两半（涂醋炙微黄，去裙襖） 知母一两 桑根白皮一两半（锉） 旋覆花三分 甘草三分（炙微赤，锉） 天灵盖一两半（涂酥炙微

黄)

【用法】上为粗散。每服四钱，以童便一中盏，煎至五分，去滓，加地黄汁半合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】伤寒后发疟，寒热不定，四肢无力，心烦头痛，不思饮食。

69078 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡三分（去苗） 桔梗三分（去芦头） 紫菀三分（洗，去苗土） 知母三分 贝母三分（煨令微黄） 诃黎勒皮三分 乌梅肉半两（微炒） 百合三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，下地黄汁半合，搅匀，温服，不拘时候。

【主治】伤寒后肺萎劳嗽，连连不绝，四肢烦热，两颊色赤，饮食全少。

69079 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡一两（去苗） 旋覆花三分 青橘皮三分（汤浸，去白瓤） 大腹子三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 桑根白皮一两半（锉） 紫苏茎叶三分 马牙消二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后脚气上攻，心胸烦闷，喘促食少。

69080 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡三分（去苗） 木香半两 茯神半两 赤芍药半两 犀角屑半两 石膏一两 葛根半两（锉） 麻黄三分（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉） 生干地黄半两 黄芩半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】解肌退热。

【主治】伤寒后劳复，体热，鼻衄。

69081 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】柴胡三分（去苗） 木香半两 当归半两（微炒） 木通三分（锉） 紫苏茎叶半两 竹茹半两 黄芩三分（锉）

【用法】上为散。每服五钱，用水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后阴阳易，小腹急胀，卵缩，小便不通。

69082 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡一两（去苗） 麻黄一两（去根节） 葛根三分（锉） 桂心三分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加豉五十粒，薄荷二七叶，煎至六分，去滓，不拘时候，先吃粥少许，后以热水淋浴，然后服此药。衣覆取汗。

【主治】时气二日，壮热憎寒，头痛，腰脊强重。

69083 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡（去苗） 人参（去芦头） 犀角屑 黄芩 麦门冬（去心）各一两 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气三日，头痛壮热，心神烦壅，胸膈不利。

69084 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡（去苗） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 梔子仁 黄芩 石膏 大青 川芒消 川大黄（锉碎，微炒）各一两 麦门冬一两半（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，

铍)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气五日，热毒不除，心神烦闷，大小肠秘涩，或时头痛。

69085 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡（去苗） 枳实（麸炒微黄） 栝楼根 黄芩 梔子仁 茵陈 白鲜皮 川大黄（铍碎，微炒） 甘草（炙微赤，铍）各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气六日，壮热，骨节烦疼，头痛，目眩，心胁气胀急硬，不能饮食，恐变为黄。

69086 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡一两（去苗） 黄耆一两（铍） 赤茯苓三分 秦艽半两（去苗） 地骨皮半两 黄连三分（去须） 葛根半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 川大黄三分（铍碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，铍） 鳖甲一两半（涂醋炙黄，去裙襕）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气八九日，骨热，四肢烦疼，背膊劳闷，手足无力，不能饮食。

69087 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】柴胡（去苗） 黄芩 桔梗（去芦头） 玄参 地骨皮各一两 麦门冬一两半（去心，焙） 赤茯苓半两 人参半两（去芦头） 紫菀半两（去苗土） 甘草半两（炙微赤，铍）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气热势未退，壅滞，虚羸，咳嗽。

69088 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】柴胡一两（去苗） 川升麻三分 黄芩三分 石膏二两 麦门冬一两（去心） 犀角屑三分 葛根三分（铍） 甘草三分（炙微赤，铍）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加葱白二茎，竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：时气心神壅闷，烦渴不止。②《普济方》：时气头痛，骨肉烦疼，口燥心闷，外寒内热，已自下利，虚热未退。

69089 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】柴胡（去苗） 枳实（麸炒令微黄） 栝楼根 黄芩 梔子仁 茵陈 龙胆（去芦头） 川大黄（铍碎，微炒）各一两 甘草半两（炙微赤，铍）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气五六日，壮热，骨节烦疼连心，两胁气胀急，硬痛，不能食，变为黄。

69090 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】柴胡（去苗） 茵陈 木通 土瓜根 白鲜皮 梔子仁各一两 川芒消二两 川大黄二两（铍碎，微炒）

【用法】上为细散。每服三钱，以温水调下，不拘时候。少时当利一两行，利后煮葱豉稀粥食之；如热未歇，再服。

【主治】时气恶寒，头痛，壮热，大便不通。

69091 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】柴胡（去苗） 茵陈 川大黄（铍碎，微炒） 黄芩 木通（铍） 川升麻 梔子仁 川芒消 茅根（铍）各一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以得通利为度。

【主治】时气恶寒壮热，头痛，小便不通。

69092 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【异名】柴胡汤 (《圣济总录》卷二十二)。

【组成】柴胡一两 (去苗) 赤芍药一两 梔子仁半两 黄芩半两 (分) 石膏二两 葛根一两

【用法】上为散。每服四钱,用水一大盏,加葱白二茎,豉半合,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:热病一日,头痛,壮热烦闷。②《圣济总录》:时行疫疠一二日,头痛壮热。

69093 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【异名】柴苓汤 (《医林绳墨大全》卷二)。

【组成】柴胡一两 (去苗) 人参一两 (去芦头) 甘草一两 (炙微赤, 锉) 黄芩一两 赤茯苓一两 半夏半两 (汤洗七遍去滑)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加葱白五寸,生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。令自有汗即解。

【主治】①《圣惠》:热病二日,头痛口苦,虽经发汗未解。②《医林绳墨大全》:风温温热,小便微热,腹满。

69094 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两 (去苗) 葛根一两 (锉) 川大黄一两 (锉碎, 微炒) 石膏一两 赤芍药三分 黄芩三分 梔子仁半两 川朴消一两 前胡一两 (去芦头) 甘草半两 (炙微赤, 锉) 鳖甲一两 (涂醋炙微黄, 去裙襴)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病四日,壮热,四肢沉重,吃食不下。

69095 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两 (去苗) 紫苏茎叶一两

陈橘皮一两半 (汤浸, 去瓢, 焙) 桑根白皮一两 (锉) 石膏二两 麻黄半两 (去根节) 杏仁一两 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病肺热,上气奔喘。

69096 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两 (去苗) 川大黄三分 (锉碎, 微炒) 黄芩三分 赤芍药三分 枳壳半两 (麸炒微黄, 去瓢) 半夏三分 (汤浸七遍去滑)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病已得汗,热不解,腹满胀痛,烦躁发狂。

69097 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两 (去苗) 麻黄一两半 (去根节) 川升麻一两 人参一两 (去芦头) 麦门冬一两 (去心) 甘草三分 (炙微赤, 锉) 枳实三分 (麸炒微黄) 知母三分 梔子仁三分 鳖甲三两 (涂醋炙令黄, 去裙襴)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病数日,未得汗,遍身壮热,呕逆,不下食。

69098 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两 (去苗) 白术半两 枳壳三分 (麸炒微黄, 去瓢) 黄芩三分 赤芍药一两 河黎勒皮三分 槟榔半两 桔梗半两 (去芦头) 甘草半两 (炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时

候。

【主治】热病得汗后热不解，心腹胀满。

69099 柴胡散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】柴胡一两（去苗） 生干地黄一两 黄连一两（去须） 地骨皮一两 枳壳一分（麸炒微黄，去瓢） 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 知母半两 鳖甲三分（涂醋炙令微黄，去裙襴）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病后虚劳烦热，四肢疼痛，小便赤黄，不欲饮食。

69100 柴胡散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】柴胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 羚羊角屑一两 细辛一两 麦门冬一两（去心） 决明子一两 梔子仁一两 子芩一两 车前子一两 石膏四两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【功用】泻肝除热。

【主治】肝劳虚热，两目赤涩，烦闷宛转，热气壅滞，胸里炎炎。

【宜忌】忌炙煨热面。

69101 柴胡散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】柴胡一两（去苗） 白术三分 木香半两 紫苑二分（洗，去苗土） 赤茯苓三分 赤芍药一两 鳖甲一两半（涂醋炙令黄，去裙襴） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 前胡三分（去芦头） 诃黎勒一两半（煨，用皮） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】肺劳，胸膈壅滞，痰嗽不止，四肢无力，少思饮食。

【宜忌】忌饴糖、羊肉、苋菜。

【备考】本方方名，《普济方》引作“柴胡汤”。

69102 柴胡散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】柴胡一两半（去苗） 五味子一两 桔梗一两（去芦头） 熟干地黄一两 白茯苓一两 麦门冬一两（去心） 紫苑一两（洗，去苗土） 人参一两（去芦头） 地骨皮一两 黄耆一两（锉） 甘草三分（炙微赤，锉） 桂心一两 牡蛎粉一两 半夏三分（汤浸七遍去滑） 白术一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳寒热，夜卧盗汗，四肢无力，吃食口苦，上气咳嗽。

69103 柴胡散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】柴胡一两（去苗） 黄耆一两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 麦门冬一两半（去心，焙） 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襴） 地骨皮三分 生干地黄三分 人参一两（去芦头） 萎蕤三分 赤茯苓一两 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，四肢疼痛，不欲饮食。

【宜忌】忌苋菜。

69104 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】柴胡二两（去苗） 秦艽一两（去苗） 犀角屑三分 知母三分 桔梗三分（去芦头） 人参三分（去芦头） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 鳖甲一两

半(涂醋炙令黄,去裙襖) 葳蕤三分 生干地黄一两 甘草半两(炙微赤,铍) 赤茯苓一两 桑根白皮三分(铍) 梔子仁半两 紫菀一两(去苗土)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热劳体热,心烦不食,四肢无力。

【宜忌】忌猪肉、菰菜、苋菜、醋物。

69105 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】柴胡一两(去苗) 麦门冬二两(去心,焙) 黄芩一两 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 人参一两(去芦头) 甘草三分(炙微赤,铍) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 桔梗半两(去芦头) 赤茯苓三分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿,咳嗽唾涎,心神烦热,不欲饮食。

69106 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】柴胡一两(去苗) 甘草半两(炙微赤,铍) 贝母三分(煨微黄) 人参三分(去芦头) 桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 鳖甲一两(涂醋炙微黄,去裙襖)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿,咳嗽,寒热多涕。

69107 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】柴胡一两(去苗) 赤茯苓三分 甘草半两(炙微赤,铍) 白术三分 枳壳一两(麸炒) 川大黄一两(铍碎,微炒) 芎藭半两 桂心半两 京三棱一两(炮,铍)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】骨蒸痿痹,体瘦食少。

69108 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】柴胡(去苗) 川升麻 黄芩 黄连(去须) 梔子仁 车前子 决明子 防风(去芦头) 羚羊角屑 马牙消 甘草(炙微赤,铍) 玄参各一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】肝脏风热,眼中生疮肿痛。

69109 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩 梔子仁 赤芍药 川升麻 麦门冬(去心) 甘草(炙微赤,铍) 玄参各一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加淡竹叶二七片,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】斑痘疮人眼,疼痛壮热,口干烦渴。

69110 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】柴胡二两(去苗) 川升麻二两 梔子仁二两 赤芍药二两 木通二两(铍) 黄芩一两半 大青一两半 杏仁一两半(汤浸,去皮尖双仁) 石膏三两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,食后温服。

【主治】腹中虚热,舌本强直,口吻两边痛,舌上有疮,咽食不得。

69111 柴胡散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】柴胡一两(去苗) 赤芍药三分 知母三分 子芩三分 莽苳三分 秦艽二分(去苗) 甘草半两(生,铍)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,豉一百粒,葱白七寸,煎至六分,去滓,温服,不拘时候。

【主治】乳石发动,四肢疼痛,口干烦渴,起卧不安,少思饮食。

69112 柴胡散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】柴胡一两（去苗） 葛根半两（锉） 赤茯苓半分 麦门冬三分（去心） 石膏二两 葳蕤三分 甘草半两（炙微赤，锉） 玄参三分（去芦头） 川升麻三分 黄芩半两 犀角屑一两 川芒消一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】因服乳石，至脏腑壅滞，及脚气欲发，或憎寒壮热，头痛心烦，眼目昏闷，头旋欲吐，不纳饮食。

69113 柴胡散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】柴胡饮（《圣济总录》卷四十九）、柴胡汤（《普济方》卷二十七）。

【组成】柴胡一两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 桑根白皮一两（锉） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襴） 槟榔一两 旋覆花半两 川大黄二两（锉碎，微炒） 桔梗一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】肺气暴热，大便不通，时时咳嗽，喘息促急。

69114 柴胡散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】柴胡一两（去苗） 黄芩一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 泽泻二两 梔子仁一两 石膏二两 羚羊角屑一两 生干地黄二两 芒消二两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，稍温频服。以利为度。

【主治】下焦壅热，大小便俱不通。

69115 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】柴胡一两半（去苗） 桔梗三分

（去芦头） 槟榔三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 诃黎勒皮三分 赤茯苓三分 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙）半两 桂心半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】膈气全不思食，或食即欲呕，咽中噎塞，食难稍下。

69116 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】柴胡二两（去苗） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤茯苓一两 槟榔二两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤芍药一两 诃黎勒皮二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】气膈，心腹痞满，不下饮食，肩背壅闷，四肢烦疼。

69117 柴胡散

《圣惠》卷五十。为《外台》卷七引《广济方》“柴胡汤”之异名。见该条。

69118 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】柴胡汤（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】柴胡二两（去苗） 乌梅肉二两（微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】暴渴，心神烦闷，口舌干焦。

69119 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】柴胡一两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 决明子半两 车前子半两 羚羊角屑半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝黄。

69120 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】柴胡一两（去苗） 茵陈半两 犀角屑半两 麦门冬一两（去心） 鳖甲二两（涂醋炙微黄，去裙襴） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】劳黄。

69121 柴胡散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】柴胡一两（去苗） 葵根三分 甘草一分（炙微赤，锉） 当归三分（锉，微炒） 白茅根三分（锉） 石韦三分（去毛） 木香三分 榆白皮三分（锉） 木通三分（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】劳淋。每小便茎中痛，卒不能出，引小腹急胀，淋漓，痛不止。

69122 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柴胡一两（去苗） 人参三分（去芦头） 黄耆一两（锉） 赤茯苓一两 地骨皮三分 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襴） 麦门冬三分（去心） 白术一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 生干地黄三分 桔梗三分（去芦头） 桑根白皮三分（锉） 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人寒热体瘦，肢节疼痛，口干心烦，不欲饮食。

【方论选录】《医略六书》：人参扶元补气，黄耆补中托邪，生地滋阴生血，赤芍破血散滞，柴胡疏腠理以达邪，白术健脾土以强胃，鳖甲滋肝阴兼散结气，麦冬润肺燥兼清心火，

桑白皮清肺气，地骨皮退肌热，桔梗清咽利膈，赤苓渗湿和营，枳壳泻滞气以宽胸，甘草缓中州以和胃，生姜温卫气而散外邪也，使郁散气充，则邪得外解而寒热自除，肢节疼痛无不退，何体瘦经少之足患哉！

69123 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柴胡一两（去苗） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 川大黄三分（锉碎，微炒） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 百合三分 桑根白皮一两（锉） 麦门冬二两（去心） 赤茯苓一两 秦艽三分（去苗） 紫菀三分（洗，去苗土） 黄芩三分 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉） 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襴） 知母三分 木通三分（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人骨蒸劳热，咳嗽，胸膈痰壅；腹胁妨闷，不欲饮食。

69124 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】柴胡一两（去苗） 黄芩半两 人参半两（去芦头） 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉） 犀角屑半两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 麦门冬半两（去心）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半两，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，外证未去，身体重，发热恶寒，肢节烦疼，微呕，心下支满。

69125 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】柴胡一两（去苗） 续断一两 芎藭三分 当归半两（锉，微炒） 白术一两 赤芍药一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 枳壳三钱（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠七八月伤寒，头痛壮热，心腹虚胀，四肢少力。

69126 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】柴胡二两（去芦头） 黄芩一两 石膏一两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 麦门冬三两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，壮热，心烦头痛。

69127 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】柴胡半两（去芦头） 大青三分 葛根半两（锉） 石膏一两 知母半两 梔子仁半两 川升麻三分 黄芩三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加葱白七茎，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】妊娠热病，发即背痠疼，头痛壮热。若不急疗，热势不止，多致损落。

【备考】《袖珍》有茯苓，无黄芩。

69128 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】柴胡一两半（去苗） 赤茯苓一两 麦门冬一两（去心） 人参半两（去芦头） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。

【主治】妊娠心烦，头昏躁闷，不思饮食，或时呕吐。

69129 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】柴胡一两半（去苗） 赤芍药一两 麦门冬一两（去心） 人参一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠阻病，头疼，四肢少力，不思饮食，多睡少起。

69130 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】柴胡一两（去苗） 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 紫苏茎叶半两 木通三分（锉） 大腹皮半两（锉） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠三四月，气壅恶食，呕哕，肢节烦疼，或脚膝虚肿。

69131 柴胡散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】柴胡二两（去苗） 紫葳一两 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两（去心） 熟干地黄一两 芍药一两 肉苁蓉一两（汤浸一宿，刮去皱皮，炙令干）

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，加大枣三枚，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】曾伤六月胎。

69132 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】柴胡汤（《圣济总录》卷一六八）、柴苓散（《南北经验方》卷十引汤氏方）、柴苓汤（《袖珍小儿》卷四）、柴苓竹叶饮（《不知医必要》）。

【组成】柴胡二分（去苗） 黄芩一两 人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤茯苓半两 麦门冬半两（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，

加小麦一撮，青竹叶一片，煎至五分，去滓，放温服。

【主治】小儿腹中有伏热，温壮来去。

69133 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】柴胡汤(《圣济总录》卷一六七)、柴胡麦门冬散(《小儿痘疹方论》)、柴胡麦门冬汤(《普济方》卷四〇四)、二参饮(《普济方》卷四〇四)、六味柴胡散(《疮疡经验全书》卷八)、二参汤(《医学入门》卷八)、柴胡麦冬汤(《治痘全书》卷十四)、六味柴胡麦冬散(《痘麻紺珠》卷六)。

【组成】柴胡一两(去苗) 龙胆半两(去芦头) 麦门冬一两半(去心，焙) 玄参一两 甘草一两(炙微赤，锉) 人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿变蒸，经时不止，挟热心烦，啼叫无歇，骨热面黄。

69134 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】柴胡半两(去苗) 赤芍药一分 麻黄半两(去根节) 黄芩一分 石膏一两 葛根一分(锉) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，葱白三寸，豉二十粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以汗为效。

【主治】小儿伤寒，表里俱热，壮热头痛，口干烦渴，无汗；小儿凶填，有表热症者。

①《圣惠》：小儿伤寒，壮热头痛，口干烦渴。
②《婴童百问》：小儿表里俱热，面黄颊赤，身体痛，唇燥口干，小便赤涩，大便焦黄，无汗，夹惊腮肿。
③《幼科金针》：小儿凶填，有表热症者。

69135 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】柴胡三分(去苗) 当归一分 赤茯苓半两 川大黄半两(锉碎，微炒) 甘

草一分(炙微赤，锉) 赤芍药一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒挟实，壮热心烦。

69136 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】柴胡半两(去苗) 石膏一两 川大黄一分(锉碎，微炒) 麻黄一分(去根节) 秦艽一分(去苗) 常山一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿寒热往来，面色萎黄。

69137 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】柴胡一两(去苗) 人参半两(去芦头) 赤芍药半两 桔梗半两(去芦头) 鳖甲一两(涂醋炙令黄，去裙襕) 河黎勒皮半两 地骨皮半两 杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 前胡半两(去芦头) 陈橘皮半两(汤浸，去白瓢，焙) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿寒热往来，乳食不下，四肢无力，心腹胀满，上焦疼，渐渐羸瘦。

69138 柴胡散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】柴胡半两(去苗) 赤茯苓半两 芎藭半两 鳖甲半两(涂醋炙令黄，去裙襕) 枳壳半两(麸炒微黄，去瓢) 赤芍药半两 槟榔半两 甘草一分(炙微赤，锉) 桃仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿腹内痞结，身体壮热，中焦壅闷，肠胃不利。

69139 柴胡散

【方源】《博济》卷一。

【组成】柴胡一两(去苗) 大黄一两 朴消一两 甘草半两 枳壳一两(去瓢)

【用法】上为末。每服三大钱，水二盏，煎至六分，温服，日只二服，候大小便通，即自然汗出。

【主治】伤寒日数过多，心中气闷，或发疼痛，狂言不定，狂躁不得眠，大小便不通。

【宜忌】不可多服。

69140 柴胡散

【方源】《博济》卷二。

【异名】柴胡汤(《圣济总录》卷八十九)。

【组成】柴胡(去芦)二两 鳖甲二两(醋浸一宿，炙令黄) 甘草 知母各一两 秦艽一两半

【用法】上为末。每服二钱，水八分盏，加大枣二枚，煎六分，热服。

【主治】①《博济》：荣卫不顺，体热黄瘦，筋骨疼痛，多困少力，饮食进退。②《圣济总录》：虚劳羸瘦，盗汗。

69141 柴胡散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】柴胡汤(《圣济总录》卷四十一)。

【组成】柴胡一两半(去苗) 石膏二两 黄芩一两 赤芍药一两 甘草一两(炙黄)

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏壅热上攻，头目不利，四肢拘倦。

69142 柴胡散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】柴胡二两 枳壳半两(麸炒) 黄芩一两 赤芍药一两 半夏一两(洗去滑) 人参一两

【用法】上为末。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】阳明病，外证身热汗出而不恶寒，但恶热，脉迟，发热头眩，小便难，欲作谷

疸，胁下坚满，大便秘而呕，口燥；中风，其脉浮大，短气心痛，鼻干，嗜卧，不得汗，一身悉黄，有潮热而哕，身前后肿，刺之虽小愈，外若不解；伤寒三日，少阳受病，口苦干燥，目眩，若已吐下，发汗，谵语；少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦，不可吐下，吐下则悸而惊；少阴病，胁下坚满，干呕不能饮食，往来寒热，若未吐下，其脉沉紧，恶寒而蜷，时时自烦，不欲厚衣，利清水，色青者，心下必痛，口干燥；伤寒六日，阳脉涩，阴脉弦，当腹中急痛，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身不可转侧。

69143 柴胡散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】鳖甲三两(醋炙令黄) 柴胡(去芦头) 川大黄(煨熟) 干漆(炒) 秦艽(去芦头) 甘草(炙)各一两 常山一两

【用法】上为粗散。每服一钱半，水一盞，加小麦一撮，同煎七分，放冷，去滓，服二服，滓再煎服之。

【主治】童稚骨蒸热劳，及伤寒后肌热。

69144 柴胡散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】柴胡一两 川芎 独活 羌活各半两 甘草(炙)一两 桑白皮一两半 贝母 冬花各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，煎七分，去滓温服。

【主治】劳嗽及风虚痰涕。

69145 柴胡散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】柴胡半两 子芩三分 甘草半两(炮) 干葛三分 黄连半两 牛黄少许

【用法】上为细末。每服二钱，新汲水半盞调下，每日二次。

【主治】劳热。

69146 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷十三。

【异名】地熏散。

【组成】柴胡(去苗土)一斤 人参五两 甘草(炙)四两 白术三两 半夏(汤浸,煮软,切作片子,焙干) 黄芩(去黑心)各五两 防风(去叉)三两

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞,加生姜五片,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】阴阳不和,寒热往来,头目昏重,身体烦疼,咳嗽咽干,鼻塞清涕。

69147 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 栝楼根 山梔子仁各一两 大黄(銼,醋炒) 芒消各一两半 木香 白鲜皮 茵陈蒿半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,食前以新汲水调下。

【主治】伤寒壮热,肢节疼痛,大小便涩。

69148 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】柴胡(去苗) 大黄(銼,炒) 赤芍药 槟榔(銼) 枳实(麸炒,去瓤)各一两 半夏半两(姜汁浸令透,焙)

【用法】上为散。每服二钱匕,浓煎苦楝根汤调下;米饮亦得。

【主治】伤寒狐惑,神思昏闷,大便难,肌肤热。

69149 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】柴胡(去苗) 蛇衔各一两 黄连(去须) 芒消(研)各三分 细辛(去苗叶) 竹叶(焙)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,水一盞,煎至六分,去滓,食后、临卧温服。

【主治】风邪攻目,目睛疼痛。

69150 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】柴胡(去苗)一两 地骨皮 赤茯苓(去黑皮) 枳壳(去瓤,麸炒) 旋覆

花各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,生姜汤调下,一日三次,不拘时候。

【主治】口中干燥,心膈痰壅。

69151 柴胡散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】柴胡(去苗) 升麻各一两 梔子仁半两

【用法】上为散。每服一钱匕,熟水调下,一日三次。

【主治】舌本强,两边痛。

69152 柴胡散

【方源】《幼幼新书》卷二十六引茅先生方。

【组成】柴胡 知母 贝母 茯苓 茯神 干葛 甘草(炙)各等分

【用法】上为末。小麦、药各一匙,水一盞,煎六分服。

【主治】小儿疳热,四肢如柴,不能起止。

69153 柴胡散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】柴胡 半夏 人参 茯苓各六分 白术 枳壳各五分 黄橘皮四分

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞,加生姜三片,大枣一枚,煎至六分,去滓温服。

【主治】妊娠呕逆。

69154 柴胡散

【方源】《本事》卷四。

【组成】柴胡四两(洗,去苗) 甘草一两(炙)

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,同煎至八分,食后热服。

【功用】推陈致新,冬月润心肺,止咳嗽,除壅热,春、夏御伤寒时气,解暑毒。

【主治】伤寒时疾,中喝伏暑,邪入经络,体瘦肌热,发热不解,有类伤寒,欲作劳瘵。

【方论选录】《本事方释义》:柴胡气味辛甘平,入足少阳;甘草气味甘平,入足太阴,能行十二经络,缓诸药之性。此药虽辛散为君,而以甘缓佐之,则伏邪之入经络、体瘦肌消、发

热不解、有类伤寒、欲作劳瘵者，自能和解也。

69155 柴胡散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 升麻 知母 陈皮 前胡 白术 云苓 麦冬 贝母 甘草 苍术 川芎 当归 紫苏 葱白

【主治】冬时严寒之气，身体虚弱为寒所伤，即发于冬而致妊娠正伤寒，轻则寒热微咳，鼻塞声重，重则头疼体痛，后或转为壮热，腰疼四肢沉重，甚则堕胎。

【方论选录】柴胡、葱、升、苍、芎皆解肌表之邪，从汗而散；芩、归、苓、术养血安胎；陈、贝、知、麦顺气清热，乃标本兼治意也。

69156 柴胡散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】柴胡根一两 半夏五钱（洗）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】伤寒，往来寒热而呕。

【加减】心下痞，加枳实一钱；有里证，加大黄，初一服一钱，次二钱，又三钱，邪尽则止。

69157 柴胡散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】柴胡 羌活 防风 生地黄 芍药 甘草各等分

【用法】上咬咀。水煎，临卧服之。

【功用】明目，益肾水。

69158 柴胡散

【方源】《医方类聚》卷十引《济生》。

【组成】柴胡（去芦） 地骨皮（去木） 玄参 羚羊角（镑） 甘菊花（去枝梗） 赤芍药 黄芩各一两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盂半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《医方类聚》引《济生》：肝气实热，头痛目眩，眼目赤痛，胸中烦闷，梦寐惊恐，肢节不利。②《异授眼科》：目纵横赤脉，沙涩，眵膜多泪，怕日羞明者。

69159 柴胡散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】柴胡 苍术 甘草各等分

【用法】上为末。水煎服；如头痛、壮热，则用生姜、葱煎。

【主治】眼目暴赤肿痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“柴胡汤”。

69160 柴胡散

【方源】《岭南卫生方》卷中。

【组成】柴胡（去芦）一两 半夏（汤洗）一分 桂心（去粗皮）二钱 白芍药一钱 甘草（炙）一钱半

【用法】上为细末。加生姜七片，大枣一个，水煎温服。寒热欲退，便止此药。

【主治】①《岭南卫生方》：寒热。②《普济方》引《广南卫生方》：伤寒后发疟。

69161 柴胡散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】柴胡 前胡 川芎 当归 人参 芍药 粉草 生地黄各等分

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜三片，大枣三枚，水煎服。

【主治】①《云岐子保命集》：孕妇伤寒。②《医方类聚》引《徐氏胎产方》：妊娠伤寒，头痛项强，身热口干，胸胁疼。

【加减】要出汗，加葱。

【备考】《医方类聚》引《徐氏胎产方》有葱白三根。

69162 柴胡散

【方源】《得效》卷十一。

【组成】柴胡二两 人参 甘草 黄芩各一两 半夏（泡七次） 麻黄（去节）各五钱

【用法】上锉散。每服二钱，加生姜三片，薄荷三钱，白竹青少许煎，温服。

【主治】伤风伤寒，热气壅，涎盛，胸膈不利；或时行疹痘未分，或痢疾潮热，一切积热温壮。

【加减】鼻衄，加生地黄；疟疾，加姜一钱，桃、柳枝、地骨皮；痢疾作热，涎盛，加桑白皮。

69163 柴胡散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】柴胡 黄芩 芍药各半两 甘草一分

【用法】上锉散。每服三钱，水一盞煎服。兼以药坠洗之。

【主治】小儿眼胞患斑疮，热气冲透睛中，疼痛泪出，翳如银片，肿涩难开。

69164 柴胡散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】地骨皮一两半 柴胡 鳖甲（去裙，醋炙） 知母各一两 五味子半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盞半，加乌梅四个，青蒿五叶，煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】虚劳羸瘦，面色痿黄，四肢无力，不思饮食，夜多盗汗，咳嗽不止。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“柴胡饮”。

69165 柴胡散

【方源】《永乐大典》卷八〇二〇引《经验普济本事方》。

【组成】柴胡（去苗）一两 大黄 秦艽 甘草 常山各半两 干漆七钱（炒） 鳖甲一两半（炙黄）

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加小麦二钱，同煎六分，去滓温服。加人参、石膏各半两妙。

【主治】童男室女，骨蒸热劳；或因伤寒时疾后，余热不解，瘦弱，减食，困倦，寒热嗽喘，面赤口干，眼涩多睡。

69166 柴胡散

【普济方】卷一三〇。即《圣济总录》卷二十一“柴胡汤”。见该条。

69167 柴胡散

【普济方】卷一三五。为《活人书》卷十六“梔子仁汤”之异名。见该条。

69168 柴胡散

【方源】《普济方》卷一四八。

【组成】柴胡一两（去苗） 石膏一两（碎） 麻黄一两（去根节，掠去沫，焙）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加豉三十粒，葱白二寸，同煎六分，去滓，热服，并三服，不拘时候。汗出效。

【主治】时气一日至三日，头痛壮热，心神烦闷。

69169 柴胡散

【普济方】卷二〇〇。为《圣济总录》卷三十五“祛劳汤”之异名。见该条。

69170 柴胡散

【方源】《补要袖珍小儿》卷四。

【组成】柴胡 地骨皮 甘草各五钱

【用法】上锉散。每服二钱，加水一小盞煎服。

【主治】小儿骨蒸潮热，面黄瘦弱。

69171 柴胡散

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】北柴胡三钱 地骨皮一钱 黄芩三钱 桂二钱 甘草三钱 京芥二钱

【用法】上咬咀。水煎服，仍服小柴胡汤三五帖。

【主治】妇人受胎杂病，阴阳相胜，寒热往来。

69172 柴胡散

【方源】《医方类聚》卷二二七引《徐氏胎产方》。

【组成】柴胡二钱 生大黄二钱 黄芩一钱半 甘草一钱

【用法】上咬咀，作一服。水煎，临发日，五更温服。必取利为愈。

【主治】①《医方类聚》引《徐氏胎产方》：妊娠疟疾。②《医略六书》：孕妇疟疾，脉洪数者。

【宜忌】忌油、面、辛热等物。

【方论选录】《医略六书》：柴胡升解抑遏之阳邪，黄芩清降内壅之邪热，甘草缓中泻火，大黄泻热退胀也。为散水煎，使热壅下泄，则

清阳上敷，而寒热无不退，胎孕无不安矣！

69173 柴胡散

《医方类聚》卷五十一。即《圣惠》卷十七“柴胡汤”。见该条。

69174 柴胡散

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】柴胡（去芦）三钱 人参 茯苓（去皮）各一钱 桔梗 芍药（酒浸，炒） 川归（酒浸）各二钱 青皮（去白） 麦门冬各三分（去心） 甘草一分

【用法】上细切，作一服，为细末。水一盞，煎七分，温服。

【主治】虚劳。

69175 柴胡散

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】柴胡 人参 茯苓 桔梗 芍药 当归（酒浸） 麦门冬 青皮 桑白皮 川芎 白术 升麻 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，煎七分，通口连滓服。

【主治】虚劳。

69176 柴胡散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【异名】柴胡引子（《张氏医通》卷十五）。

【组成】柴胡 羌活 防风 赤芍药 桔梗 荆芥 生地黄 甘草

【用法】水煎服。

【主治】因风而眼眶涩烂。

69177 柴胡散

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】黄芩三分 甘草二分 大黄四分 芍药 柴胡 当归各四分 人参五分

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】风食两感发热。

69178 柴胡散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】柴胡三钱 黄芩 赤芍药 黄柏各五钱 甘草二钱

【用法】水煎服。后用胜金膏调乳汁热汤泡洗。

【主治】小儿斑痘眼疾。

69179 柴胡散

《伤寒广要》卷八。为《圣惠》卷十三“柴胡汤”之异名。见该条。

69180 柴胡煎

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】柴胡（去苗）一两 知母（焙）一两 木通一两半 淡竹叶一百片 瞿麦穗一两 连翘一两 防己二两 大黄（生）二两（细锉） 生麦门冬汁三合（汤成下） 生藕汁三合（汤成下） 甜消四两（汤成下）

【用法】先将八味锉如麻豆大。以水三升，煮取一升半，去滓，下甜消令散，次入麦门冬、藕汁等，共分为八服，空腹两服。以溽利为度，余药食后缓缓服之。

【主治】热毒痈肿，血不散，初觉憎寒干渴，四肢烦闷。

69181 柴胡煎

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】柴胡（去苗） 升麻 梔子仁 芍药各三分 钓藤一分 凝水石（研） 黄芩（去黑心） 知母（切，焙）各一两 生葛汁一合 甘草（炙）一分 蜜二合 淡竹叶（细锉）三握 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，别研）半两

【用法】上十味为粗末。以水三升，入银石铫内，文武火煎至一升，绵滤去滓，再入锅内，下蜜并葛汁、杏仁等，煎如饴，以瓷器盛。百日儿每服如绿豆大，一岁儿如杏仁大，温浆水化破服，每日三次。

【主治】小儿频惊，壮热欲作痢。

69182 柴胡煎

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】柴胡（去苗） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫） 甘草（炙） 木通（锉） 紫菀（去苗土） 五味子 大青 干百合各一两半 款冬花 蓝叶 人参 赤茯苓（去黑皮）各三分 大黄（锉，炒）半两 酥一斤 蜜（炼熟，去白沫）一升

【用法】除酥、蜜外，上锉细。水七升，慢火煎至三升，去滓入酥、蜜，同熬成煎，瓷器盛。五六岁儿每服一钱匕，食后温熟水调下，一日三次。

【主治】小儿脑热肺壅，鼻干无涕，喘息不得。

69183 柴胡膏

【方源】《博济》卷一。

【组成】柴胡半两（去芦） 红芍药一两一分 蒺藜根一两一分 青橘皮 川附子（炮） 吴茱萸 陈橘皮各半两 青木香一分 乌鸡一只（净，去骨皮毛肠肚，唯择肉）

【用法】上为末。入乌鸡肉内再杵成膏，于瓷器内收贮。每用膏一匙头，食前用盐酒一盞调服。常令患者有酒容，只服两日，便见效验。

【主治】五劳七伤，肢体烦倦，日渐消瘦，行步稍难，饮食不进。

69184 柴荆饮

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡 薄荷 荆芥 甘菊各一钱 甘草三分 茯苓三钱 白芍四钱 白蒺藜 草决明 炒栀子各二钱 密蒙花 半夏各五分

【用法】水煎服。

【主治】因肝木风火作祟，脾胃之气不能升腾，而致目痛如刺触，两角多眵，羞明畏日，两胞浮肿，泪湿不已。

69185 柴香散

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】柴胡七分 黄芩七分 赤芍药五分 枳实一钱 厚朴五分 香薷五分 黄连五分 地骨皮一钱 三棱一钱 莪术一钱 玄胡索五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】心腹有气一块，略痛，及心腹疼痛膨胀，寒热往来。

69186 柴桂汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】柴胡一钱 桂枝三分 花粉五分 牡蛎 炮姜 炙草各二分

【用法】水煎服。汗出愈。

【主治】妇人热病，经来寒热如疟，狂妄。

69187 柴桔汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】柴胡二钱 黄芩 枳壳 半夏 桔梗各一钱 人参七分 甘草五分 生姜 大枣

【主治】支结症，即伤寒未曾下，而心下妨闷，不满不硬，非痞亦非结胸者。

69188 柴陷汤

【方源】《医学入门》卷四。

【异名】柴胡陷胸汤（《寒温条辨》卷四）。

【组成】小柴胡汤合小陷胸汤

【功用】疏表和中。

【主治】结胸痞气初起有表，及水结、痰结、热结。

69189 柴梗汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】小柴胡汤去人参合枳梗汤

【主治】胸胁痞满或痛。

69190 柴常汤

【方源】《医编》卷六。

【组成】柴胡（酒炒）一钱五分 黄芩（炒）一钱 人参五分 甘草五分 草果（煨）一钱 槟榔一钱 青皮 厚朴（姜汁炒）各一钱 常山（酒炒）二钱 何首乌二钱

【用法】加大枣二枚，生姜三片，水煎服。

【主治】寻常之疟，三四发后。

【加减】热痰，加川贝母；湿痰，加半夏；无汗，加羌活、紫苏；汗多，加黄耆、白术；夜发在阴分中，加白芍、鳖甲、红花、酒炒升麻；挟暑，加川黄连、香薷；挟湿，加苍术、茯苓；挟食，加山楂、麦芽、神曲；胸满，加枳壳；渴，加花粉、乌梅、石膏；风热在胃，津液消耗，加梨汁、蔗浆，或生地、生葛、西瓜等汁。

69191 柴葛煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡 干葛 芍药 黄芩 甘草 连翘

【用法】水一钟半，煎服。

【功用】散毒养阴。

【主治】痘疹表里俱热及瘟疫。

69192 柴胡引子

【方源】《颅凶经》卷下。

【组成】柴胡 鳖甲（米醋涂炙） 知母 桔梗 枳壳（麸炒，去瓤） 玄参 升麻各等分

【用法】上锉细。三岁以下取药半两，水五合，煎二合，去滓，分两服，空心食前、后各一服。后用澡浴方。

【主治】小儿行迟，小儿自小伤抱，脚纤细无力，行止不得，或骨热疳劳，肌肉消瘦。

【宜忌】忌毒物。

【备考】本方方名，《准绳·幼科》引作“柴胡饮”。

69193 柴胡引子

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 人参 甘草 大黄

【主治】气热不得卧，左关数大。

69194 柴胡饮子

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡一两半（去苗） 木通一两半（锉） 赤芍药一两半 豉一合 石膏二两半（捣） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上锉细和匀。每服半两，用水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病三日，头痛口苦，寒热往来。

69195 柴胡饮子

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】柴胡二两（去苗） 川升麻一两半 赤芍药一两 黄芩一两半 甘草一两（炙微赤，锉） 枳壳一两半（麸炒微黄，去瓤） 麦门冬二两（去心） 竹叶二两 梔子仁一两

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大

盏，加豉五十粒，葱白一茎，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病五日，已得汗，毒气不尽，犹乍寒乍热，昏昏如醉，胁下牢满，骨节疼痛，不能食下，舌本干燥，口内生疮。

69196 柴胡饮子

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】柴胡饮（《校注妇人良方》卷五）、人参柴胡饮子（《准绳·类方》卷一）。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药各半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，温服，每日三次。

【主治】伤寒发汗未解，气血已虚，寒热往来，口干烦渴，大便秘结，脉洪实弦数。

①《宣明论》：一切肌骨蒸积热作，发寒热往来，蓄热寒战，及伤寒发汗不解，或中外诸邪热，口干烦渴，或下后热未愈，汗后劳复或骨蒸肺痿喘嗽，妇人余疾，产后经病。②《儒门事亲》：妇人产后一二日，潮热口干；双身妇人病症。③《永类铃方》：小儿伤寒五六日，发热潮热，大便秘，母多服。④《保婴撮要》：脉洪实弦数，太便坚实。

【方论选录】《杏苑》：用人参、当归、芍药益阴血以胜阳热，黄芩解肌热，柴胡退蒸热，大黄下积热，生甘草泻火兼和药。

【临证举例】二阳病 《名医类案》：张子和治常仲明病寒热往来，时咳一二声，面黄无力，懒思饮食，夜寝多汗，日渐瘦削，诸医作虚损治之，用二十四味烧肝散、鹿茸、牛膝，补养二年，口中痰出，下部转虚，戴人断之曰，上实也，先以涌剂吐痰二三升，次以柴胡饮子降火益水，一月余复旧，此二阳病也。

69197 柴胡饮子

《御药院方》卷五。为《活人书》卷十七“柴胡半夏汤”之异名。见该条。

69198 柴胡饮子

【方源】《普济方》卷一三二。

【组成】柴胡 黄芩 人参 甘草 升麻

地骨皮 赤茯苓 赤芍药 草龙胆各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，加薄荷、沙糖，同煎七分，温服，不拘时候，小儿分作三服。

【主治】大人、小儿伤寒，余热不已。

69199 柴胡饮子

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】柴胡 常山 青蒿 甘草 秦艽 人参 茯苓 枳壳（炒） 半夏（汤浸七次）各等分

【用法】焙干，为粗末。每服二钱，用水一盞半，加乌梅三枚，生姜五片，煎取一盞，去滓，食后温服，逐日一服。

【主治】岚瘴。

【宜忌】切忌空心，不得行路，须服汤水白粥之类；酒色不可太过；不得吃柑子、紫菜、猪羊心并牛肉。

69200 柴胡饮子

【方源】《医统》卷八十八引《经验方》。

【组成】软柴胡 紫苏叶 薄荷叶 陈皮 黄芩各五分 炙甘草三分 桔梗五分 芍药五分

【用法】上锉。水一盞，加大枣、生姜，煎三四分服，不拘时候。

【主治】小儿变蒸之期，有似伤寒，两疑之间。

69201 柴胡饮子

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 人参 大黄 广皮 甘草 当归 白芍药

【主治】伤热咳嗽，面赤潮热；肝经咳嗽，寒热往来；内伤嗽血，怒动肝火，木火刑金。

69202 柴胡饮子

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 半夏 甘草 人参 大黄

【主治】便秘，寒热气弱者。

69203 柴胡饮子

《张氏医通》卷十五。为《准绳·类方》卷七“柴胡散”之异名。见该条。

69204 柴胡饮子

《幼科指掌》卷二。为《景岳全书》卷六十三“柴胡散子”之异名。见该条。

69205 柴胡饮子

《伤寒大白》卷二。为《补要袖珍小儿》卷二“柴胡加大黄汤”之异名。见该条。

69206 柴胡饮子

【方源】《温热经解》。

【组成】柴胡一钱半 酒芩一钱 防风八分 甘草八分 白芍一钱半 黑荆芥六分

【主治】产后温病。

69207 柴胡散子

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【异名】柴胡饮子（《幼科指掌》卷二）。

【组成】柴胡 防风 当归 人参 白芍药 甘草 黄芩 滑石 大黄各等分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】痘疮表里俱实。

69208 柴胡煮散

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【异名】柴胡人参汤（原书卷一七九）。

【组成】柴胡（去苗） 人参 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 桔梗（锉，炒） 青橘皮（去白，炒） 芍药 芎藭 麦门冬（去心，焙） 白术 升麻 桑根白皮（锉） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：虚劳潮热，肢节烦疼，肌肤枯燥，面赤咽干。②《卫生总微》：小儿骨热盗汗，肌瘦减食。

69209 柴胡煎丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】柴胡一两半（去苗） 犀角屑 知母 胡黄连 桔梗（去芦头） 川升麻 地骨皮 黄芩 诃黎勒皮各一两 栝楼一枚 鳖甲二两（涂醋炙令微黄，去裙襕） 甘草三分（炙微赤，锉） 赤茯苓三分 人参三分（去芦头）

【用法】上为末。用猪胆五枚取汁，及蜜半

斤，搅和令匀，慢火煎成膏，和药末为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎乌梅、小便送下。

【主治】虚劳骨热，肢节烦疼，心膈躁闷。

【宜忌】忌菟菜。

69210 柴胡煎丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】童便七升 甘草一尺二寸 雄鼠粪四十九粒 桃柳枝各一握（长三寸） 豉心半斤 糯米一合 葱 薤白各一握

【用法】上锉细，入小便内，煎至三升，去滓更煎，如稀汤，以柴胡一升为末，入前药煎中为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下；温水下亦得。

【主治】骨蒸劳。颊赤口干，心神烦闷，体瘦，发渴，寒热。

69211 柴胡煎丸

《普济方》卷三九〇。为《普济方》卷二三六引《博济》“鳖甲煎丸”之异名。见该条。

69212 柴术六君汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓各二钱 甘草（蜜炙）二钱 陈皮 半夏（制） 苍术各二钱五分 柴胡二钱 升麻（炒）五分 生姜三片

【用法】水煎，空心服。

【主治】肥人气虚生痰，多下白带。

69213 柴术参苓汤

【方源】《校注妇入良方》卷二十四。

【组成】白术（炒） 人参 茯苓各一钱 柴胡 川芎 山梔 芍药（炒） 甘草（炒）各五分 熟地（自制） 当归各八分

【用法】水煎服。

【主治】妇人肝火血热，遍身瘙痒，或起赤晕，或筋挛结核。

69214 柴芍六君丸

【方源】《全国中药成药处方集》（福州方）。

【组成】香砂六君丸加柴胡、白芍各一两五钱

【主治】脾胃虚寒，饮食少进，水谷不化，

呕吐吞酸，便溏泄泻，肚腹疼痛。

69215 柴芍六味丸

《全国中药成药处方集》（福州方）。为《饲鹤亭集方》“柴芍地黄丸”之异名。见该条。

69216 柴芍地黄丸

【方源】《饲鹤亭集方》

【异名】柴芍六味丸（《全国中药成药处方集》福州方）。

【组成】六味地黄丸加柴胡、白芍各三两

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【功用】滋肾平肝，益阴养血。

【主治】血虚肝燥，骨蒸内热。

69217 柴芍参苓饮

《保婴撮要》卷十一。为《明医杂著》卷八“柴芍参苓散”之异名。见该条。

69218 柴芍参苓散

【方源】《明医杂著》卷八。

【异名】柴芍参苓饮（《保婴撮要》卷十一）。

【组成】柴胡 芍药 人参 白术 茯苓 陈皮 当归各五分 甘草 丹皮 山梔（炒）各三分

【用法】上为末。每服一钱，白汤送下。或作丸服。

【主治】①《明医杂著》：脾胃不和，饮食少进，或呕吐泄泻。②《保婴撮要》：小儿肝火血热，遍身搔痒，或起赤晕，或筋挛结核；肝胆经分患天泡等疮，或热毒瘰癧。

69219 柴防二陈汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】柴胡 防风 桔梗 枳壳 陈皮 半夏 茯苓 甘草

【主治】外感寒热，胸闷胁疼，痰咳。

69220 柴苓七物汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】柴胡一钱 黄芩 法夏 厚朴各一钱半 茯苓二钱 紫苏一钱

【用法】水煎，食前服。

【功用】调气行滞。

【主治】妊娠气滞腹痛证。妊娠数月，胸腹及两胁胀痛，性情暴躁易怒，口苦，头晕，兼

有咳嗽，苔白腻或薄黄，脉弦而滑。

【加减】胃脘胀痛，呕吐吞酸，加左金丸一钱。

69221 柴芩双解汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】柴胡一钱半 生葛根一钱 羌活八分 知母二钱 炙草六分 青子芩一钱半 生石膏四钱（研） 防风一钱 猪苓一钱半 白蔻末六分（冲）

【功用】和解表里，调剂阴阳。

【主治】少阳相火，郁于腠理而不达，表邪未罢，里邪已盛，寒热，身疼无汗，口渴，恶热。

【方论选录】少阳相火，郁于腠理而不达，则作寒热，非柴胡不能达，亦非黄芩不能清，与少阳经气适然相应，故以为君；若表邪未罢，而兼寒水之气者，则发寒愈重，证必身疼无汗，故必臣以葛根、羌、防之辛甘气猛，助柴胡以升散阳气，使邪离子阴，而寒自己；里邪已盛，而兼燥金之气者，则发热亦甚，证必口渴恶热，亦必臣以知母、石膏之苦甘性寒，助黄芩引阴气下降，使邪离于阳，而热自己；佐以猪苓之淡渗，分离阴阳，不得交并；使以白蔻之开达气机，甘草之缓和诸药。而为和解表里之重剂，亦为调剂阴阳，善止寒热之良方也。

69222 柴芩四物汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 生地 当归 白芍药 牡丹皮

【主治】热入血室，及血虚发热。

69223 柴芩竹叶饮

《不知医必要》。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

69224 柴芩两解汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】柴胡二钱 黄芩三钱 梔子一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】表邪未解，里证又热，尿赤，口渴，

烦躁，脉滑数者。

【加减】黄疸，加茵陈二钱。

69225 柴芩承气汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】金银藤 蒲公英各 30 克 柴胡 黄芩各 15 克 青香藤 金铃子 陈皮各 10 克 大黄 10 克 芒消 10 克（冲服）

【用法】水煎服，每日一至二剂。

【功用】清肝解郁，通腑行气。

【主治】急性水肿型胰腺炎。

【方论选录】金银藤、蒲公英、黄芩清热燥湿；柴胡、青香藤、金铃子、陈皮行气止痛；大黄、芒消通里攻下。

【临证举例】急性水肿型胰腺炎 治疗 97 例病人，治愈 96.9%，减轻 2.1%，只 6 例并发胆道感染使用了抗菌素。

69226 柴芩退热汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 紫苏 陈皮 川芎 当归 杜仲 茯苓 川断 甘草 前胡 荆芥 生姜 大枣

【主治】妇人妊娠寒热如疟。

【加减】热盛，加竹茹、麦冬；寒盛战栗，手足厥，加草果、白术、黄耆、黑姜。

69227 柴芩清膈煎

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】川柴胡八分 生锦纹（酒浸）一钱半 生枳壳一钱半 焦山梔三钱 青子芩一钱半 苏薄荷一钱半 苦桔梗一钱 青连翘二钱 生甘草六分 鲜淡竹叶三十六片

【功用】攻里清膈。

【主治】少阳表邪，内结膈中，膈上如焚，寒热如疟，心烦懊恼，大便不通。

【方论选录】君以凉膈散法，生军领梔、芩之苦降，荡胃实以泄里热；佐以枳、桔，引荷、翘、甘、竹之辛凉，宣膈热以解表邪；妙在柴胡合黄芩分解寒热。此为少阳、阳明攻里清膈之良方。

69228 柴芩解托汤

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】柴胡 黄芩 干葛各一钱 陈皮八分 山楂 泽泻各一钱 甘草五分 赤苓

【主治】外感之症，寒热往来，热重寒轻，有似虚劳寒热者。

【加减】内热甚，加连翘七分；外邪甚，加防风一钱；痰甚，加贝母、橘红六分；兼风热，加玉竹一钱；小便不利者，加车前子一钱。

【方论选录】柴芩解托汤，治热胜之症，用黄芩之苦而清，以彻外邪蒸灼之热；重用柴、葛之升，取其凉润而解托入内之邪；陈皮利气，山楂消滞，再加赤苓、泽泻，与柴葛一升一降而邪自解矣。

【备考】方中赤苓用量原缺。

69229 柴连解毒汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】柴胡 黄芩 黄连 玄参 知母 贝母 防风 赤芍 连翘 牛蒡子 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻出不透，毒未尽出，气因热逼，热极而致目红，发痰作喘。

69230 柴陈五苓散

【方源】《会约》卷十一。

【组成】白术 茯苓 猪苓各一钱半 泽泻二钱二分，肉桂一钱半 茵陈三钱 车前子一钱 木通 柴胡各一钱半

【用法】灯草为引，水煎服。

【主治】湿热发黄，小水赤黑，烦渴发热。

【加减】酒疸，加干葛。

69231 柴陈化滞汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮 白茯苓 枳壳 厚朴 山楂 赤芍

【主治】疟疾发散之后，痰与食积，痰食在胃，荣卫从出之原闭塞不舒，肌表之中郁而生热，热多寒少，胸膈不宽，脉来弦滑者。

69232 柴陈四妙汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮 白茯苓 苍术 黄柏 防风 金银花 贝母 花粉 山梔

【主治】湿痰脚气，脉来弦数，白肿不红。

69233 柴陈拈痛汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮 白茯苓 枳壳 厚朴 玄明粉 香附 鳖甲 归尾 赤芍

【主治】疟母。老痰食积留于胁下，按之有形，多成痃疟，连岁不已，脉来弦细无力。

69234 柴陈解托汤

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】柴胡 干葛 半夏 厚朴 泽泻各六分 甘草三分 秦艽 藿香各六分 陈皮五分 生姜 大枣 山楂八分

【主治】外感之症，寒热往来，寒重热轻，有似虚劳寒热者。

【加减】外邪盛，加防风、荆芥七分；营虚，加当归八分；气陷，加升麻五分；脾胃热或泻，加白术八分；腹中痛，加芍药八分，甘草五分；有汗，加桂枝五分；气滞，加香附子六分。

【方论选录】此方小柴胡合二陈加减，仿佛乎正疟之治，以其热轻于寒，故去黄芩；以其寒重于热，故加厚朴；有二陈之祛痰、藿香之快气、山楂之导滞启胃、泽泻之分利阴阳，加秦艽以治太阳，葛根以治阳明，倘二经伏有余邪，而邪无不托出矣。

69235 柴青泻肝汤

【方源】《济阳纲目》卷二十五。

【组成】柴胡 黄芩各一钱半 人参 半夏 黄连 青皮各一钱 甘草五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】男子肝火旺极，阴茎肿裂，健硬不休。

69236 柴苓二妙汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤苓 赤芍 泽泻 苍术 黄柏 木瓜 续断 牛膝 杜仲

【用法】水煎服。

【主治】风湿，下体疼痛不止者。

69237 柴苓平胃汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】柴胡一钱半 黄芩 苍术 半夏 各一钱 甘草三分 白术一钱半 白茯苓 陈皮 厚朴 人参 猪苓 泽泻各八分 桂枝五分

【主治】疟初起，热多寒少。

69238 柴苓四物汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】四物汤加茯苓 黄芩 陈皮 甘草 柴胡 黑山栀 木通

【用法】水煎服。

【主治】疹没绵绵发热，不知早治，而成疳症，腹胀，午后发热，头痛。

69239 柴苓扶元汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 人参各一钱五分 猪苓 泽泻 白术 青皮各一钱 何首乌二钱 茯苓 肉桂各八分

【用法】水二钟，加大枣二枚，食远服。

【主治】疟疾。阴阳不和，元气虚弱，寒热渐盛。

69240 柴苓栀子汤

【方源】《医统》卷十八。

【组成】柴胡 黄芩 人参 半夏各八分 陈皮 炙甘草 白术 茯苓各一钱 猪苓 泽泻 山栀各七分

【用法】水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎一盏，食远服。

【主治】黄疸。

69241 柴苓清热汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】茯苓 柴胡 知母 人参各一钱 天花粉八分 甘草五分 白芍 黄芩各一钱二分

【用法】加灯心三十茎，食远服。

【主治】虚损，手心、足心发热。

69242 柴胡二术汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷七引《必用》。为原书同卷“驱邪汤”之异名。见该条。

69243 柴胡二连丸

【方源】《保婴撮要》卷十九。

【组成】柴胡 宣黄连 胡黄连

【用法】上药各为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，以白汤送下。

【主治】小儿痘后，因肝经实火而致寅、卯、申、酉时热甚，或兼搐。

69244 柴胡二陈汤

【方源】《明医指掌》卷三。

【组成】二陈汤加柴胡

【主治】内伤发热。

【加减】内伤饮食发热，加枳实、山楂、神曲；房劳内伤发热，加知母、黄柏。

69245 柴胡丁香汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】生地黄二分 丁香四分 当归身 防风 羌活各一钱 柴胡一钱五分 全蝎一个

【用法】上作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】妇人年三十岁，临经先腰脐痛，甚则腹中亦痛，经缩三两日。

【方论选录】《医略六书》：柴胡疏风通腠，丁香散滞温中，羌活散太阳游风，全蝎搜厥阴伏风，生地以滋暗伤之阴，当归以养荣运之血。水煎温服，使经脉濡润，则沟满渠通而风邪外解，经候自长，何致腰腹有预先痛甚之患哉！

69246 柴胡人参汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡（去苗） 人参 知母（焙） 石膏（碎） 葛根（锉） 赤茯苓（去黑皮）各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓温服，

不拘时候。

【主治】伤寒汗下后，潮热不退，口干烦躁。

69247 柴胡人参汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】柴胡（去苗） 人参 生干地黄（焙）各三分 桔梗（锉，炒） 知母 紫菀（去苗土） 桑根白皮 枳壳（去瓤，麸炒令黄） 赤芍药 桂（去粗皮） 当归（微炙）各半两 附子大者一枚（炮裂，去皮脐）

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘破），同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后失于将理，血气虚损，日渐困瘁，少寒多热，烦渴嗽逆，痰壅减食。

69248 柴胡人参汤

《圣济总录》卷一七九。为原书卷八十八“柴胡煮散”之异名。见该条。

69249 柴胡人参汤

【方源】《幼幼新书》卷十七引《王氏手集》。

【组成】柴胡 人参 芍药 茯苓 甘草（炙）各等分

【用法】每服二钱，水一盏，加生姜三片，煎至四分，温服。

【主治】小儿脾热生风，往来寒热。

69250 柴胡人参汤

《医林纂要》卷九。为《婴童百问》卷一“柴胡汤”之异名。见该条。

69251 柴胡人参汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷九。

【组成】柴胡三钱 人参一钱 麦冬三钱 白芍二钱 鲜生地三钱 阿胶三钱 炙甘草三钱

【用法】水三杯，煎取一杯，顿服之；不愈再服。

【主治】热入血室，邪少正虚，夜微烦热者。

69252 柴胡人参散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】柴胡（去芦） 人参（去芦） 白术 白茯苓 青皮（去瓤） 桔梗（去芦） 麦

门冬（去心） 川芎 白芍药 甘草（炙） 桑白皮 升麻各等分

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】肌热盗汗。

69253 柴胡三白汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】柴胡三钱 人参一钱五分 半夏 白芍药 白术各一钱 白茯苓一钱 甘草五分 黄连八分 生姜五片

【用法】上锉一剂。加大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】身热，泄泻，烦渴。

69254 柴胡三棱饮

【方源】《医便》卷五。

【组成】柴胡 神曲 黄芩 莪术 人参 三棱 枳实 陈皮 半夏 乌梅 青皮 茯苓 厚朴 槟榔 甘草

【用法】加生姜二片，草果三瓣，水煎服。

【主治】小儿食积。

69255 柴胡下热汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】柴胡 黄芩 泽泻 升麻 芒消各三两 玄参六两 淡竹叶（切） 生地黄（切）各一升 干姜二两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，下芒消，平旦分三服。

【主治】肝劳。热闷，关格不通，精神不守，气逆上胸，热炎炎不止。

【宜忌】忌芜荑。

69256 柴胡大黄汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【异名】柴胡汤（原书卷二十八）。

【组成】柴胡（去苗） 大黄（湿纸裹，煨） 朴消 枳壳（去瓤，麸炒）各一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，每日二次。不可过多，若大小肠通，则汗自出。

【主治】伤寒日数过多，热结在里，心中气闷，或发疼痛，狂言不定，烦躁欲走，不得眠，大小便不通。

69257 柴胡山梔散

【方源】《灵验良方汇编·胎产要诀》卷上。

【组成】丹皮 柴胡 山梔 川芎 当归 芍药 甘草 牛蒡子 白术

【主治】妇人肝火漏血。

69258 柴胡天水散

【方源】《观聚方要补》卷一引《统旨》。

【组成】柴胡 黄芩 人参各二钱 甘草一钱 滑石二钱半

【用法】加竹叶十片，水煎服。

【主治】中暑。咳嗽寒热，盗汗不止，脉数。

69259 柴胡木香汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】柴胡（去苗）十两 木香一两 半夏（汤选七遍，去滑） 人参各二两 黄芩（去黑心） 甘草（炙）各三两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜二片，大枣一枚（擘破），煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿风热潮作，不思饮食，肌体消瘦。

69260 柴胡五味汤

【方源】《普济方》卷一八三。

【组成】柴胡五两 五味子 橘皮 紫菀 贝母 杏仁（去皮尖双仁者，熬）各三两 麻黄四两（去节） 甘草（炙） 黄芩各三两

【用法】上细切，捣极碎。每服加麦门冬一两（去心），生姜半两，竹叶一两半，煎服。

【主治】肺痰气，上气、气急及咳。

69261 柴胡化滞汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 枳实 厚朴 山楂 杏仁 赤芍 陈皮

【主治】风温。喘渴多睡，四肢不收。

【加减】便秘，加大黄。

69262 柴胡化滞汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 枳壳 厚朴 山楂 苏子 桔梗

【主治】饮食郁遏，少阳三焦之气不得宣通，日晡寒热，头亦微痛，全与风寒无异，神气如故，身无疼痛。

69263 柴胡化滞汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 丹参 当归 枳壳 厚朴 山楂 木香 槟榔

【主治】痢疾初起，表邪未净；或久痢身热者。

【加减】脉沉细滑，表里无热，脾气郁结，加藿香一钱。

【方论选录】柴、芩、甘草，用之以治暑也；枳、朴、山楂，用之以消食也；河间曰：行血则便脓自愈，故用丹参、当归；调气则后重自除，故用木香、槟榔。

69264 柴胡升阳汤

《准绳·类方》卷一。为《内外伤辨》卷中“升阳散火汤”之异名。见该条。

69265 柴胡升麻汤

《局方》卷二（宝庆新增方）。为原书卷二“柴胡石膏散”之异名。见该条。

69266 柴胡升麻汤

《兰室秘藏》卷下。为《内外伤辨》卷中“升阳散火汤”之异名。见该条。

69267 柴胡升麻汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 升麻 干葛 枳实 桔梗 知母 贝母 玄参 桑皮 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】伤寒咳嗽声嘶，或咽喉痛。

69268 柴胡片姜散

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】归尖二钱五分 赤芍一钱五分 柴胡一钱 片姜三钱 桃仁十一粒 红花一钱 花粉一钱五分 山林一钱 甲珠一钱五分 石菖一钱

【主治】两胁坚硬，兼腹痛瘀凝。

69269 柴胡六合汤

【方源】《元戎》。

【异名】柴胡四物汤（《金鉴》卷七十四）。

【组成】四物汤四两 柴胡 黄芩各七钱

【主治】妊娠伤寒，胸胁满痛，烦躁，蓄血呕血；妇人经行身热，及产妇头昏项强，脉弦或数。

①《元戎》：妊娠伤寒，胸胁满痛而脉弦，少阳也；产妇头昏项强。②《丹溪心法》：妇人经行身热，脉数头昏。③《伤科汇纂》：烦躁胁痛，蓄血呕血。

69270 柴胡双解饮

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】柴胡双解散（《赤水玄珠》卷十八）。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 人参 陈皮 芍药

【用法】水二钟，加生姜一片，大枣二枚，加生艾汁三匙，煎之，温服。

【主治】足少阳胆经受证，耳聋胁痛，寒热呕而口苦，脉来弦数。

【加减】小便不利，加茯苓；呕，入姜汁、竹茹；胁痛，加青皮；痰多，加瓜蒌仁、贝母；寒热似疟，加桂枝；渴，加天花粉、知母；齿燥无津液，加石膏；嗽，加五味、金沸草；心下饱闷，未经下者，非结胸，乃表邪传至胸中未入于腑，加枳、桔；虚烦类伤寒证，加竹叶、炒粳米；与阳明合病，加葛根、芍药；妇人热入血室，加当归、红花；男子热入血室，加生地黄；妇人伤寒无表症，其热胜，加大黄，甚者加芒消。

69271 柴胡双解散

《赤水玄珠》卷十八。为《伤寒六书》卷三“柴胡双解饮”之异名。见该条。

69272 柴胡平肝汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 白芍 川芎 香附

【主治】气怒郁于下焦而致气疝，不痛不

痒，但觉肿坠。

69273 柴胡甘草汤

《直指》卷十六。为《圣济总录》卷六十“柴胡汤”之异名。见该条。

69274 柴胡石膏汤

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【组成】柴胡四两 甘草二两 石膏八两

【用法】上咬咀。每服八钱，水一盞半，加生姜五片，煎八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《袖珍》引《圣惠》：妊妇伤暑，头痛恶寒，身热躁闷，四肢疼痛，项背拘急，口干燥。②《景岳全书》：少阳阳明，外感挟火，头痛口干，身热恶寒拘急。

【加减】气虚体冷，加人参四两。

69275 柴胡石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡（去苗） 石膏（碎） 赤茯苓（去黑皮） 白术 萎蕤 羚羊角（镑）各一两 梔子仁一分 桑根白皮（锉）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒十日以上，潮热不退。

69276 柴胡石膏汤

《奇效良方》卷十。为《局方》卷二“柴胡石膏散”之异名。见该条。

69277 柴胡石膏汤

【方源】《医方集解》。

【组成】白虎汤加柴胡 黄芩 半夏

【主治】暑嗽喘渴。

69278 柴胡石膏汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】柴胡 石膏 黄芩 荆芥 前胡 茯苓 升麻 桑皮 甘草

【主治】妇人湿热阴痛、阴痒。

69279 柴胡石膏散

【方源】《局方》卷二。

【异名】柴胡升麻汤（原书同卷宝庆新增方）、柴胡石膏汤（《奇效良方》卷十）。

【组成】赤芍药 柴胡（去苗） 前胡（去苗） 石膏（煨） 干葛各五十两 升麻二

十五两 黄芩 桑白皮各三十七两 荆芥穗(去土)三十七两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，豉十余粒，同煎七分，去滓，稍热服。小儿分作三服，不拘时候。

【主治】外感风热、少阳、阳明合病，壮热恶风，头痛身疼，鼻塞咽干，口渴心烦，咳嗽自汗，脉浮缓。

①《局方》：时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，心胸如满，寒热往来，痰实咳嗽，涕唾稠粘。②《医方集解》：少阳阳明合病，伤风，及阳气郁遏，元气下陷。③《杂病源流犀烛》：春夏感冒，头痛身热，鼻塞流涕，恶风恶寒，声重声哑，甚至痰壅气喘，咳嗽咽干，自汗，脉浮缓。

【方论选录】《医方集解》：柴胡平少阳之热，升、葛散阳明之邪，前胡消痰下气而解风寒，桑皮泻肺利湿而止痰嗽，荆芥疏风热而清头目，赤芍调营血而散肝邪，黄芩清火于上中二焦，石膏泻热于肺胃之部；加姜、豉者，取其辛散而升发也。

69280 柴胡归芍汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 山梔 甘草 当归 白芍药 生地 丹皮

【主治】血分感热。

69281 柴胡归芍汤

《寿世保元》卷五。为《回春》卷五“柴胡芍归汤”之异名。见该条。

69282 柴胡四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】川芎 熟地黄 当归 芍药各一两半 柴胡八钱 人参 黄芩 甘草 半夏曲各三钱

【用法】上为粗末。煎服。

【主治】妇人虚劳日久，血虚阴亏，微有寒热；经行感冒，热入血室；经枯发热；妊娠吐衄。

①《保命集》：日久劳虚，微有寒热，脉沉而

浮。②《便览》：血虚阴虚，午后或夜分发热。③《东医宝鉴·杂病篇》：三阴经温疟或夜发者。④《张氏医通》：妇人经行感冒，热入血室。⑤《医略六书》：经枯发热，脉虚弦数者。⑥《叶氏女科》：妊娠吐衄。妊娠忧虑惊怒伤其脏腑，气干于上，血随溢而心闷，胸满久不已，必致堕胎。

【方论选录】《医略六书》：以四物汤滋荣血室，柴胡汤疏热扶元，二方合剂，异路同归，水煎温服，务使正气内充而邪热外却，何患发热不止，天癸不来乎！

69283 柴胡四物汤

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 当归身 川芎 生地黄 白芍药 地骨皮 麦门冬 知母 淡竹叶

【用法】上锉细。水一盞，煎七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】麻疹后余热，发枯毛竖，肉消骨立，渐渐羸瘦，或妇女经血方净，适逢痘疹作热。

①《痘疹心法》：疹后余热。②《准绳·幼科》：疹于收后身有微热，发枯毛竖，肉消骨立，渐渐羸瘦。③《幼幼集成》：妇女经血方净，适逢痘疹作热。④《麻科活人》：麻后余热。⑤《医钞类编》：阳盛阴虚，往来寒热。

69284 柴胡四物汤

《医统》卷八十四。为原书同卷“逍遥散”之异名。见该条。

69285 柴胡四物汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】柴胡八分 仙半夏一钱 归身一钱 生白芍二钱 条芩八分 清炙草六分 生地一钱半 川芎七分

【功用】疏气和血。

【主治】妊妇邪陷入于足厥阴之肝络，寒热如疟，胸胁串痛，至夜尤甚者。

【方论选录】此方君以柴胡入经和气，即臣以川芎入络和血，妙在佐以归、地、白芍之养血敛阴，即使以半夏、甘草之辛甘化阳。庶

几阴阳和，俾阴液外溢则汗出，而寒热胁痛自止矣。

69286 柴胡四物汤

《金鉴》卷七十四。为《元戎》“柴胡六合汤”之异名。见该条。

69287 柴胡四物汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】生地 当归 川芎 柴胡 芍药

【主治】妇人中风，寒热火盛错经，致热入血室，昼则了了，夜则谵妄。

【加减】热甚，加丹、梔、忍冬藤。

69288 柴胡生化汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】柴胡（酒炒）一钱 川芎二钱 当归五钱 桃仁十三粒 炙甘草五分 炮姜五分 荆芥一钱 酒炒黄芩一钱

【用法】水煎，加酒半盏冲服。

【主治】产后郁冒寒多，复汗，身热。

69289 柴胡白虎汤

【方源】《育婴家秘》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 知母 甘草 石膏

【用法】上咬咀。加淡竹叶，水煎服。

【主治】伤寒半表半里，大热大渴，自汗不止。

69290 柴胡白虎汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】小柴胡汤加石膏 知母

【主治】①《明医指掌》：暴疟自汗烦渴。②《幼幼集成》：伤暑发疟，但热不寒。

【备考】《幼幼集成》本方用人参、知母、炙甘草、片黄芩、法半夏各一钱，熟石膏一钱五分，北柴胡一钱二分。加晚粳米一撮，生姜三片，红枣三枚，水煎，未发前服。

69291 柴胡白虎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】川柴胡一钱 生石膏八钱（研）天花粉三钱 生粳米三钱 青子芩一钱半 知母四钱 生甘草八分 鲜荷叶一片

【功用】《湿温时疫治疗法》：清胃泄热。

【主治】《湿温时疫治疗法》：温疟，热重寒轻，脉多弦数，或右脉洪盛。

【方论选录】柴胡达膜，黄芩清火，本为和解少阳之君药；而臣以白虎法者，以其少阳证少而轻，阳明证多而重也；佐以花粉，为救液而设；使以荷叶，为升清而用。合而为和解少阳阳明，寒轻热重，火来就燥之良方。

【备考】《湿温时疫治疫法》有仙露夏，无天花粉、鲜荷叶。

69292 柴胡白虎汤

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】官拣参一钱 熟石膏二钱 净知母一钱 北柴胡一钱 炙甘草一钱

【用法】合一剂，用早粳米一撮为引，水煎，热服。

【主治】表里皆热，大热大渴，自汗。

69293 柴胡白虎煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡二钱 石膏三钱 黄芩二钱 麦冬二钱 细甘草七分

【用法】加竹叶二十片，水一钟半，煎服。

【主治】阳明温热，表邪不解。

【方论选录】《证因方论集要》：柴胡疏达流通，散邪外出；黄芩清肺胃火，使里热内彻；麦冬清润止渴；甘草泻热和中；竹叶之加，又仿竹叶石膏汤之制，外托表邪，内清里热。

69294 柴胡半夏汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】柴胡饮子（《御药院方》卷五）。

【组成】柴胡八两 人参三两 半夏二两半（洗） 甘草三两（炙） 黄芩三两 白术二两 麦门冬三两（去心）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，枣子一枚，煎至八分，去滓温服。

【功用】消痰利膈除烦。

【主治】痰热头痛，手足烦热，荣卫不调，肢节拘倦，身体疼痛，嗜卧少力，饮食无味，及五饮，痰癖。

69295 柴胡半夏汤

《兰室秘藏》卷中。为原书同卷“补肝汤”之异名。见该条。

69296 柴胡半夏汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡 半夏各一钱半 黄芩 白术 陈皮 麦门冬各一钱 甘草五分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎，温服。

【主治】伤风发热恶寒，头痛无汗而咳嗽，或协热自利，及一切痰证，状似伤寒。

【加减】小便不利，加茯苓；冬月无汗，加麻黄；三时无汗，加苏叶；冬月有汗，加桂枝；三时有汗，加防风；咽痛，加桔梗；咳嗽，去白术，加杏仁、桑白皮；酒热，加黄连；食积，加山楂、神曲；痰伏胁下作痛，加白芥子；痰盛，喉中如牵锯，加竹沥、姜汁；痰稠如胶，加金沸草、前胡；胸膈痞闷，加枳壳。

69297 柴胡加桂汤

《三因》卷四。为《伤寒论》“柴胡桂枝汤”之异名。见该条。

69298 柴胡加桂汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡三钱 黄芩 桂枝各二钱 半夏一钱 甘草四分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎，温服。

【主治】①《医学入门》：半表里症，盗汗，身热不欲去衣；及不满不硬，但心下妨闷，谓之支结。②《东医宝鉴·杂病篇》：少阳症往来寒热。

69299 柴胡加豉汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】小柴胡汤加淡豆豉

【主治】愈后，劳感复病。

69300 柴胡发泄汤

【方源】《医心方》卷六引《删繁方》。

【异名】柴胡汤（《圣济总录》卷五十三）。

【组成】柴胡三两 升麻三两 黄芩三两

泽泻四两 细辛三两 枳实三两 淡竹叶（切）一升 梔子仁三两 生地黄（切）一升 芒消三两

【用法】以水九升，煮取三升，去滓，下芒消，分三服。

【主治】其人禀偏阳，壮火食气，肝热髓实，勇悍过甚，或热遗精窍，痛楚不宁。

【方论选录】《千金方衍义》：髓脏有虚无实，有补无泻，而此专用发泄以折强暴之威。升麻、柴胡发之于上，枳实、芒消泄之于下，黄芩、梔子佐升、柴为开发之上使，竹叶、泽泻佐枳、消为分泄之下使，独取地黄保护真阴以制亢阳，细辛引入中精以通疏泄。

69301 柴胡地骨散

《赤水玄珠》卷三。为《圣济总录》卷一一七“柴胡汤”之异名。见该条。

69302 柴胡地黄汤

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】柴胡八两 人参 黄芩 甘草 地黄各三两 半夏二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，大枣一个，煎至一盏，去滓温服。

【主治】产后恶露方下，忽尔断绝，热入血室，昼日明了，暮则谵语，寒热往来，如见鬼状。

69303 柴胡地黄汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 川芎 归须 生地 人参 甘草 香附 陈皮 黄耆 半夏 丹皮 童便 大枣 赤芍

【功用】清热行血。

【主治】产后恶露方下，忽然一断，热入血室，寒热往来，妄言谵语，如见鬼神。

【方论选录】柴胡、黄芩、人参、半夏、甘草，小柴胡也；生地、川芎、赤芍、当归，四物汤；半夏、陈皮，二陈汤也，佐以丹皮、童便凉血清热，加耆、枣，佐参、甘以益气除热，痰化热退，结血消而自无妄言见鬼之症矣。

69304 柴胡地黄汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】柴胡三钱 黄芩三钱 甘草二钱 芍药三钱 丹皮三钱 地黄三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】热入血室，胸胁痞满，状如结胸，语言谵妄，神识不清。

【加减】表未解，加苏叶、生姜。

69305 柴胡芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】柴胡（去苗） 芍药 黄芩（去黑心）各三分 半夏（汤洗去滑，炒干） 大腹皮 枳壳（去瓢，麸炒）各半两 槟榔（锉）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分（拍碎），同煎至半盞，去滓温服。

【主治】伤寒发汗后，邪热不除，腹胁胀痛。

69306 柴胡芍药汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】柴胡芍药散（《普济方》卷二二八引《指南方》）。

【组成】柴胡（去苗） 芍药各一两 地骨皮 石膏各半两

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，小麦五十粒，同煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】肾咳。潮热有时，五心烦热。

69307 柴胡芍药汤

【方源】《鸡峰》卷五。

【异名】柴胡去芩加芍汤（《医级》卷七）。

【组成】柴胡二两 赤芍药 人参 甘草各二分 半夏六钱

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，加生姜五片，大枣三个，煎至八分，温服，不拘时候。

【主治】①《鸡峰》：伤寒瘟疫，身体壮热，头痛项强，腰背四肢烦疼，胁下牢满，干呕哕逆，不能饮食；及妇人经水方来适断，热入血室，寒热如疟，谵言妄语。②《医级》：少阳寒热腹痛。

69308 柴胡芍药汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 白芍药 青皮 钩藤 香附 山梔 乌药 独活

【主治】湿热腰痛，左关细数者。

【加减】热甚，加黄柏、胆草。

69309 柴胡芍药汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 花粉 甘草 麦冬 白芍 知母 黄连

【功用】生津止渴。

【主治】身体黑瘦之人，精血为时令所耗，中喝，口渴喜饮，其人洒洒恶寒，渐渐发热，脉来细数；及上消、中消，气分病。

【加减】中消大便不利，去黄连，加大黄。

69310 柴胡芍药汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 花粉 甘草 白芍 麦冬 知母

【主治】燥病，身热咳嗽，内烦口干；黄疸，渴而饮水者；疟疾，邪传阳明胃经，小便自利，渴欲饮水者。

69311 柴胡芍药散

《普济方》卷二二八引《指南方》。为《全生指迷方》卷四“柴胡芍药汤”之异名。见该条。

69312 柴胡芒消汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】柴胡四两（洗，去苗） 黄芩 甘草（炙） 赤茯苓各一两半 半夏（汤洗七遍）一两一分

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，加生姜五片，大枣二个（擘破），同煎至一盞，去滓，入芒消一钱，搅和温服。以大便利为度。

【主治】由三阳气盛，蕴于经络，内属脏腑，或因他病而致热证，但热不歇，日晡尤甚，口中勃勃气出，耳无所闻，昼多昏睡，睡即浪言，喜冷，小便赤涩，大便不通，脉短疾而数。

69313 柴胡芎归汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】柴胡 桔梗(去芦) 当归 川芎 芍药 人参 厚朴(姜汁炒) 白术(去芦) 干葛 茯苓(去皮) 陈皮各一钱 红花 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,大枣二枚,乌梅一个,水煎,食远服。

【主治】夜间阴疟。

69314 柴胡归芍汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】柴胡归芍汤(《寿世保元》卷五)。

【组成】柴胡 川芎 白芍 青皮(去瓤) 枳壳(麸炒)各一钱半 香附 当归 龙胆草 木香(另研) 砂仁 甘草各五分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,水煎服,不拘时候。

【主治】肝火盛而木气实,胁下痛。

69315 柴胡达原饮

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】柴胡一钱半 生枳壳一钱半 川朴一钱半 青皮一钱半 炙草七分 黄芩一钱半 苦桔梗一钱 草果六分 槟榔二钱 荷叶梗五寸

【功用】和解三焦。

【主治】湿重于热,阻滞膜原。

【方论选录】俞氏以柴、芩为君者,以柴胡疏达膜原之气机,黄芩苦泄膜原之郁火也;臣以枳、桔开上,朴、果疏中,青、槟达下,以开达三焦之气机,使膜原伏邪,从三焦而外达肌腠也;佐以荷梗透之;使以甘草和之。虽云达原,实为和解三焦之良方。

【宜忌】若湿已开,热已透,相火炽盛,再投此剂,反助相火愈炽,适劫胆汁而烁肝阴,酿成火旺生风,痉厥兼臻之变矣。用此方者宜慎之。

69316 柴胡百合汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 知母 百合 生地黄 陈皮

【用法】水二钟,加大枣一枚,生姜三片,

槌法醋煮鳖甲煎之,温服如圣饮。

【主治】伤寒愈后,昏沉发热,渴而错语失神,及百合劳复。

【加减】渴,加天花粉;胸中烦躁,加山栀;有微头痛,加羌活、川芎;呕吐,入姜汁炒半夏;胸中饱闷,加枳壳、桔梗;食复者,加枳实、黄连;甚重大,大便实,加大黄;胸中虚烦,加竹茹、竹叶;愈后干呕,错语失神,呻吟,睡不安,加黄连、犀角;咳喘,加杏仁、百合、麻、连;心中惊惕为血少,加当归、茯苓、远志;虚汗,加黄耆;脾倦,加白术;腹如雷鸣,加煨生姜;劳复时热不除,加葶苈、乌梅、生艾叶。

69317 柴胡百合汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】柴胡 人参 黄芩 百合 知母 茯苓 芍药 鳖甲 甘草

【用法】加生姜、大枣,水煎,临服入生地捣汁一匙,温服。

【主治】伤寒愈后,昏沉发热,渴而谵语,失神,及百合、劳复、食复。

69318 柴胡当归汤

【方源】《活人书》卷十九。

【异名】当归汤(《妇人良方》卷六)。

【组成】柴胡三两 白术二两 人参 甘草(炙) 当归 赤芍药各一两 五味子 木通各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盂半,加生姜四片,枣子二枚,煎至七分,去滓温服。

【主治】妇人伤寒,喘急烦躁,或战而作寒,阴阳俱虚,不可下者。

【备考】本方方名,《袖珍》引作“当归散”。

69319 柴胡当归汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】柴胡(去苗)四两 当归(切,焙)一两 细辛(去苗叶)半两 防风(去叉)一两 麻黄(去根节)一两 桂(去粗皮)一两 半夏(汤洗去滑,生姜汁制,焙

干)二两半 人参半两 黄耆(锉)一两 黄芩(去黑心)半两 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)二十五枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加生姜一枣大(拍碎),大枣二枚(擘),水一盞,煎至七分,去滓温服,每日三次。

【主治】五脏虚乏不足,上气;五脏闭塞,不得饮食,胸胁支胀,乍来乍去,虚气在心,滞气在胃,唇干口燥,肢体动摇,手足冷疼,梦寐恐怖。

69320 柴胡当归汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡(去苗) 当归(切,焙) 防风(去叉) 白芷 附子(炮裂,去皮脐) 白术 牡丹皮 桂(去粗皮) 天仙藤 秦艽(去苗土) 桔梗(炒) 芍药 人参 麻黄(去根节) 木香各一两 知母(切,焙)半两 甘草(炙,锉)半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,大枣一枚(擘),同煎至七分,去滓,空心温服。

【主治】虚劳寒热,日渐羸瘦,行步艰难,饮食不进,状如疟疾。

69321 柴胡当归汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】柴胡二钱五分 黄芩 半夏 人参各一钱五分 甘草五分 生姜五片 枣子二枚 生地黄一钱

【用法】上咬咀。用水煎八分,食前热服;外用大豆甘草汤。

【主治】茎上湿痒作疮,及注干疮。

69322 柴胡竹茹汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 竹茹 知母 甘草

【用法】上锉。加生姜一片,水煎服。

【主治】伤寒潮热作渴,呕逆不止。

69323 柴胡后生汤

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】羌活 独活 柴胡 白茯苓 桔梗 五味 黄芩 薄荷 藁本 甘草 白芷 川芎 芍药 蔓荆

【主治】眼劳役及珠陷。

69324 柴胡导热汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 生地 丹皮 赤芍 红花 薄荷 苏叶 山梔

【功用】化痰清热。

【主治】妇人经正行时,血室未净,热入血室,忽寒热往来似疟,经乍来又断。

【方论选录】以柴、苏、荆、薄荷解其表,丹、红、赤、地略行其血,黄芩退热,半夏消痰,甘、梔引热下行。热邪既清,则血不结而经自通矣。

69325 柴胡防风汤

【方源】《普济方》卷一〇三引《指南方》。

【组成】柴胡 防风 梔子 甘草 桔梗 薄荷各等分

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盞,煎一盞,去滓服。

【主治】风热。

69326 柴胡防风汤 《赤水玄珠》卷十四。即《此事难知》“小柴胡加防风汤”。见该条。

69327 柴胡防风汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 防风 羌活 川芎 青皮 甘草

【主治】少阳风寒而成之齿痛。

69328 柴胡防风汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 防风 羌活 甘草 荆芥 川芎 干葛 广皮

【主治】寒湿伤于少阳,外感筋挛。症见素无筋骨挛缩之候,一旦恶寒身痛,手足拘挛,不能转侧。

69329 柴胡防风汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡 防风 羌活

【主治】风木之邪所致风气霍乱,头痛身

热，上吐下泻，心腹绞痛，甚则转筋。

69330 柴胡防风汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】柴胡 防风 干葛 甘草

【主治】少阳、阳明表邪。

【加减】恶寒身痛，加羌活；饱闷，加枳壳、厚朴；呕吐，加半夏、厚朴。

69331 柴胡防风汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】柴胡 防风 荆芥 甘草

【主治】少阳身痒。

69332 柴胡防风汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡 防风 荆芥 前胡

【主治】少阳自汗，表症多。

69333 柴胡防归汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡 人参各一钱 当归三钱 川芎一钱半 半夏 陈皮 防风各八分 甘草五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】产后发热，不困难产伤力及亡血过多、恶露未尽、无子蒸乳四症，系外感风寒表症，脉实，挟食积瘀血者。

69334 柴胡麦冬汤

《治痘全书》卷十四。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

69335 柴胡麦冬散

【方源】《便览》卷四。

【组成】柴胡 麦冬各二钱半 甘草（炙） 人参 玄参各一钱半

【用法】水煎服。

【主治】痘疮已靨，身壮热，经日不退。

69336 柴胡麦冬散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】官拣参 软柴胡 北沙参 大拣冬 润玄参 草龙胆 炙甘草

【用法】灯心一团为引，水煎，热服。

【主治】小儿麻疹收后大热不退，毒未出尽。

69337 柴胡苍术汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 苍术 川芎 防风 广皮 甘草 独活

【主治】少阳寒湿腰痛。

【加减】寒甚，加生姜。

69338 柴胡抑肝汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】柴胡抑肝散（《古今医鉴》卷十一）、柴胡益肝散（《寿世保元》卷七）。

【组成】柴胡二钱半 赤芍 牡丹皮各一钱半 青皮二钱 连翘 生地各五分 地骨皮 香附 苍术 山梔各一钱 川芎七分 甘草三分 神曲八分

【用法】水煎，空心临卧服。

【功用】《济阴纲目》：疏肝开郁，散结气结血，凉心启脾。

【主治】寡居独阴，寒热类疟。

【方论选录】《医略六书》：生地黄滋阴凉血，地骨皮退热清肌，柴胡疏热解郁，青皮破气平肝，丹皮凉血以化瘀结，赤芍破血以通经隧，川芎行血中之气，山梔清屈曲之火，神曲消食滞，苍术燥脾湿，香附调气解郁，甘草泻火缓中也。

69339 柴胡抑肝散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】柴胡 青皮 香附 丹皮 焦梔 当归 川芎 白芍 生地 蒲黄（炒） 荆芥（炒） 棕榈灰

【功用】和肝气，清肝火，养肝血。

【主治】妇人因事暴怒，经行气逆而厥；怒伤肝，肝藏血，因而崩注。

【方论选录】肝气不和，青皮、香附和肝气也；肝火独盛，柴胡、丹皮、梔子清肝火也；肝血暴竭，四物养肝血也；犹恐崩注之势来而不已，故用蒲黄、荆芥、棕皮俱炒黑存性以止之。

69340 柴胡抑肝散

《古今医鉴》卷十一。为《医学入门》卷八“柴

胡抑肝汤”之异名。见该条。

69341 柴胡连翘汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】中桂三分 当归梢一钱五分 鼠粘子二钱 炙甘草 酒黄柏 生地黄各三钱 柴胡 黄芩(炒) 酒知母 连翘各五钱 瞿麦穗六钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热，食后服之。

【主治】①《兰室秘藏》：男子、妇人马刀疮。②《医钞类编》：男妇热毒、瘰癧，并气寒血滞经闭。

【方论选录】《古方选注》：以柴胡散少阳之结气，连翘散外疡之血结气聚，瞿麦穗决上焦之壅肿，鼠粘子消上焦之热肿，生地、当归和手足少阳之血脉，黄芩、知柏解三焦之郁热，炙甘草调和寒热之剂。微加中桂者，马刀坚硬，用以消皮肤浮冻之气也。

69342 柴胡连翘汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 枳壳 赤芍药 桔梗 连翘 山梔 瓜蒌仁 黄连 黄柏 甘草

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】伤寒大热，谵语呻吟，睡卧不得。

69343 柴胡牡蛎汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】柴胡三钱 牡蛎一钱(粉) 甘草二钱 瓜蒌三钱 半夏三钱 芍药三钱 生姜三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】心腹疼痛，痛在心胸，热多者。

69344 柴胡羌活汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 羌活 防风 枳壳 桔梗 青皮 苏梗

【主治】感冒胁痛，风邪在表。

69345 柴胡羌活汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 羌活 防风 川芎

【主治】少阳风寒眩晕，左脉弦紧。

69346 柴胡羌活汤

【方源】《医方集解》。

【组成】小柴胡汤加羌活 防风

【主治】瘟疫少阳证。

69347 柴胡羌活汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】柴胡一钱 羌活一钱五分 紫苏一钱五分 淡豆豉三钱 制半夏二钱 青皮一钱五分 草薢仁一钱(研) 生甘草五分

【用法】煨姜三钱，大枣三枚为引，水煎服。

【主治】因感风而得风症，初病，恶风自汗，烦躁头痛，先热后寒。

【加减】胸口腹胀，加槟榔一钱五分，炒枳壳一钱五分；恶心，加藿香一钱五分；口渴，加葛根三钱；内热甚，加青蒿三钱；大便结，加瓜蒌仁三钱；作泻，加赤芍五钱，车前子三钱；虚人一眼轻，即去羌活、紫苏，再一服。

69348 柴胡青黛汤

【方源】《杂病广要》引《粹言》。

【组成】柴胡五分 青黛五分 香附一钱 川芎一钱 青皮八分 黄连八分(酒炒) 梔子八分(姜汁炒黑) 甘草八分

【用法】水二钟，煎一钟，温服。

【功用】泻肝火。

【主治】怒气伤肝。

69349 柴胡和胎饮

【方源】《育婴家秘》卷一。

【组成】柴胡 黄芩(条实沉水者佳) 白术(无油者佳) 当归身(酒洗) 白芍 陈皮 甘草 紫苏(茎叶)

【用法】水煎，食前服。

【主治】孕妇伤风，伤食，伤热，胸满，腹满，胎中痛，漏下血。

【加减】挟伤风，加葛根、葱白；挟伤食，加枳壳、神曲；挟伤热，加知母、石膏；胸满，加桔梗、枳壳；腹满，加大腹皮；胎中痛，加枳壳、砂仁；漏下血，加阿胶、陈艾

叶。

69350 柴胡知母汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡（去苗）一两 知母（焙）三分 鳖甲（去裙襴，醋炙）一两 石膏（捣碎）一两半 雄鼠粪（炒）三七粒 秦艽（去苗土）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，入豉一百粒，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒愈后，因食劳复如初，壮热头疼。

69351 柴胡知母汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】柴胡 知母 桔梗（炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 熟干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮） 山芋 黄耆（锉） 紫菀（去苗土） 地骨皮各一两 黄芩（去黑心）半两 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮） 半夏（汤洗七遍，炒）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服，一日二次。

【主治】伤寒后体虚成劳，遍身盗汗，四肢无力，口苦憎寒，又多咳嗽。

69352 柴胡知母汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】柴胡一钱五分 人参 黄芩 知母 白术各一钱 甘草五分 归身一钱

【用法】加生姜、大枣为引，水煎，多服，以平为期。

【主治】孕妇病疟。

69353 柴胡知母汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷七引节斋方。

【组成】柴胡 知母各一钱半 苍术 黄芩 干葛 陈皮 半夏 川芎各一钱 甘草（炙）七分

【用法】上锉作一帖。加生姜三片，乌梅二个，水煎，清晨服，午前又服。

【主治】热疟及瘧症。

【加减】久疟，加人参、当归。

69354 柴胡知母饮

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】柴胡（去苗）一两 知母（焙）半两 芦根（锉）三分 槟榔一两 陈橘皮半两 人参半两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盞，加生姜五片，同煎至六分，去滓热服。

【主治】呕吐不下食，头痛身热。

69355 柴胡泻肝汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】柴胡一钱二分 甘草五分 青皮（炒）一钱 黄连（炒）八分 山梔（炒）八分 当归（酒制）一钱二分 芍药一钱 龙胆草一钱

【用法】水煎服。

【主治】郁怒伤肝，胁肋痛在左者。

69356 柴胡泻肝汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 甘草 当归 川芎 青皮 山梔 连翘 龙胆草

【主治】火症目赤，喉痛，胸满气喘。

69357 柴胡泻肝汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】柴胡 川芎 赤芍 胆草 决明 归尾 密蒙 荆芥 尖生 蝉退 甘草

【主治】麻症，毒壅上焦，邪毒入肝，目赤。

69358 柴胡泽泻汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】柴胡 泽泻 橘皮（一方用桔梗） 黄芩 枳实 旋覆花 升麻 芒消各二两 生地黄（切）一升

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，去滓，下芒消，分三服。

【主治】小肠热胀，口疮。

【方论选录】《千金方衍义》：以升、柴升散于上，旋、橘开发于中，芩、泽分利于前，枳、消荡涤于后，四通分泄其源，庶免迁延之患。然恐药力过峻，即以地黄保护心包，不使热邪干

犯心也。

69359 柴胡参术汤

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】人参（去芦） 白术（土炒） 熟地黄 白芍各一钱五分 甘草（蜜制）八分 川芎七分 当归身二钱 青皮四分 柴胡三分

【用法】上锉一剂，水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】怒伤元阴元阳，眼目昏花，视物不明。

【方论选录】用芎、归、白芍、熟地以养荣，用人参、白术、甘草以益卫，青皮平肝，柴胡泻肝。

69360 柴胡参归汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参（去芦） 半夏（制） 归身 紫苏各一钱五分 柴胡二钱 陈皮一钱 炙甘草一钱

【用法】加生姜三片，红枣二枚，水煎服。

【主治】虚弱人疟疾初起。

【加减】有汗，去紫苏；羹溏，去归身；口渴，加葛根、麦冬各一钱五分；无汗腹痛，胁胀或痛，去红枣，加煨牡蛎粉一钱五分。

69361 柴胡细辛汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】柴胡 细辛 薄荷 归尾 地鳖虫 丹参 制半夏 川芎 泽兰叶 黄连

【用法】水煎服。

【功用】去瘀生新，调和升降。

【主治】脑震伤。

【临证举例】脑外伤后遗症 《中医杂志》（1982；10：11）：石某某，女，29岁，1979年9月8日初诊。患者于1978年不慎从高处摔下，与石头相撞而外伤。头巅、后脑及两颞部疼痛如裂，家属视病情严重，特来求治。患者伏驴背上而来，精神欠佳，动弹不得，自己不能上床。诊视：头项强痛，头昏，畏风，恶寒，汗出如洗，面色黧黑，胸脘痞闷，泛泛欲吐，默默

不愿言，眼球发红并有牵引性疼痛。形体消瘦，腹满便秘，小便不利，口唇紫绀，爪甲发黑，舌苔微黄，中间黑，脉弦涩。诊为脑外伤后遗症。处方：柴胡细辛汤加石菖蒲。七剂后诸症减轻，上方加紫草根10克，五剂诸症大减。继用上方七剂为粗末，早、晚各冲服15克以巩固疗效。随访二年半再未复发。

69362 柴胡枳芎汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】柴胡二钱 黄芩 人参 白芍药 半夏 枳壳各一钱 甘草五分 川芎一钱 枣子二枚

【用法】上咬咀。加生姜五片，水煎，食远温服。

【主治】两胁疼痛，身热者。

【加减】左疼甚，加青皮六分；气血不和，加乌药八分。

69363 柴胡枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】柴胡（去苗） 枳壳（去瓢，麸炒） 黄芩（去黑心） 梔子仁 茵陈蒿 龙胆 大黄（锉，炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，煎至一盞，去滓，早、晚食后温服。

【主治】伤寒发黄，壮热，骨节烦疼，两胸下气胀急硬痛，不能食。

69364 柴胡枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】柴胡（去苗） 枳壳（去瓢，麸炒） 升麻 麦门冬（去心，焙） 鳖甲（去裙襴，醋浸，炙令黄） 甘草（炙，锉） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，别研）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，未发前温服，不拘时候。

【主治】劳疟久不愈，翕翕发热，骨节痛，不下食，小便赤，渐加瘦弱。

69365 柴胡枳壳汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡一钱半 枳壳 黄芩 山梔

知母 麦门冬 干葛各一钱 大青 生地 石膏各二钱 升麻八分 甘草四分

【用法】水煎，温服。

【主治】孕妇伤寒，邪传于里，口渴烦热，腹满便闭，谵语，或发斑，昼夜不安。

【加减】大便闭甚，加大黄。

69366 柴胡枳壳汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】柴胡 枳壳 赤苓各七分 大黄一钱 甘草四分

【主治】小儿出疹，腹胀气促。

69367 柴胡枳桔汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 枳壳 桔梗 瓜蒌仁

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】伤寒小结胸。脉弦数，口苦，心下硬痛，胸中满硬，或肋下满硬而发热，或日晡潮热，或往来寒热，或耳聋目眩，或心烦而呕，痰热烦渴。

【加减】有痰，加陈皮；心下痞满硬，加枳实；渴，加天花粉；烦热，加黄连、山栀。

69368 柴胡枳桔汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】麻黄 杏仁 桔梗 枳壳 柴胡 黄芩 半夏 知母 石膏 干葛 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】伤寒胸肋痛，潮热作渴，痰气喘。

69369 柴胡枳桔汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【异名】枳桔柴胡汤。

【组成】小柴胡汤加枳壳 桔梗

【主治】少阳寒痞满。

69370 柴胡枳桔汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】川柴胡一钱至一钱半 枳壳一钱半 姜半夏一钱半 鲜生姜一钱 青子芩一钱至一钱半 桔梗一钱 新会皮一钱半 雨前茶一钱

【功用】和解表里。

【方论选录】柴胡疏达腠理，黄芩清泄相火，为和解少阳之主药，专治寒热往来，故以之为君；凡外感之邪，初传少阳三焦，势必逆于胸胁，痞满不通，而或痛或呕或哕，故必臣以宣气药，如枳、桔、橘、半之类，开达其上中二焦之壅塞；佐以生姜，以助柴胡之疏达；使以绿茶，以助黄芩之清泄。

69371 柴胡栀子饮

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【组成】柴胡 栀子 桔梗各一两 生地 黄 地骨皮 人参 茯苓 白术 甘草 当归各一两半 薄荷五钱 滑石一两半 草参二钱半

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏，加生姜三片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】劳热。

69372 柴胡栀子饮

《幼科发挥》卷四。为《保婴撮要》卷十三“栀子清肝散”之异名。见该条。

69373 柴胡栀子散

《保婴撮要》卷十五。为原书卷十三“栀子清肝散”之异名。见该条。

69374 柴胡栀子散

《景岳全书》卷五十六。为《保婴撮要》卷十三“加味小柴胡汤”之异名。见该条。

69375 柴胡栀连汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 陈皮 甘草 川连 山栀

【主治】肝火五更泄泻。

69376 柴胡茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】柴胡（去苗）二两 白茯苓（去黑皮） 白术 枳壳（去瓤，麸炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】癥癖气壮热，咳嗽骨蒸。

69377 柴胡茯苓汤

【方源】《普济方》卷二三三。

【组成】柴胡 茯苓各一钱二分 枳实(炙) 白术 人参 麦门冬(去心) 生姜(合皮,切)各六分

【用法】上切。以水六升,煮取一升八合,绞去滓,分温二服。服别相去七八里,吃一服。

【主治】腹胀瘦病,不下食。

【宜忌】忌生冷、油腻、小豆、粘食、桃李、醋物、雀肉。

69378 柴胡厚朴汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【异名】柴胡汤(《圣济总录》卷五十七)。

【组成】柴胡 厚朴(炙)各十分 茯苓 橘皮 紫苏各八分 生姜十二分 槟榔五分(末)

【用法】上切。以水七升,煮取二升五合,绞去滓,分温三服。服别相去如人行六七里,进一服,微利。

【主治】心腹胀满。

【宜忌】忌酢物、生冷、油腻、粘食。

69379 柴胡厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡(去苗) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 朴消(研)各一两 大黄(锉,炒)一两半 枳壳(去瓢,麸炒)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至七分,去滓温服。以利为度。

【主治】伤寒后,腹中有结燥,潮热不退,或时头痛目眩。

69380 柴胡厚朴汤

【方源】《普济方》卷一九八。

【组成】柴胡 厚朴 青皮 陈皮 常山 草果 乌梅 甘草 缩砂 槟榔各等分

【用法】上咬咀。每服三钱,水一碗,煎八分,露一宿,五更冷服,正发一服,过后又一服。

【主治】脾寒。

69381 柴胡复生汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】柴胡复明汤(《医统》卷六十一)。

【组成】藁本 川芎各三分半 白芍药四分 蔓荆子 羌活 独活 白芷各三分半 柴胡六分 炙草 薄荷 桔梗各四分 五味子二十粒 苍术 茯苓 黄芩各五分

【用法】作一服。水二盞,煎至一盞,去滓,食后热服。

【主治】目红赤羞明,泪多眇少,脑顶沉重,睛珠痛应太阳,眼睫无力,常欲垂闭,不敢久视,久视则酸疼,翳陷下,所陷者或圆或方,或长或短,如缕如锥如凿。

【方论选录】以藁本、蔓荆子为君,升发阳气也;川芎、白芍药、羌活、独活、白芷、柴胡为臣,和血补血疗风,行厥阴经也;甘草、五味子为佐,为协诸药,敛脏气也;薄荷、桔梗、苍术、茯苓、黄芩为使,为清利除热去湿,分上下,实脾胃二土,疗目中赤肿也。此病起自七情五贼劳役饥饱,故使生意下陷,不能上升,今主以群队升发,辅以和血补血,导人本经,助以相协收敛,用以清利除热实脾胃,如此为治,理可推也。

69382 柴胡复明汤

《医统》卷六十一。为《原机启微》卷下“柴胡复生汤”之异名。见该条。

69383 柴胡独活汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 独活 防风 川芎 苍术 青皮 甘草

【主治】少阳经风湿腰痛,痛如锥刺皮中。

69384 柴胡胜湿汤

《兰室秘藏》卷下。为原书同卷“清魂汤”之异名。见该条。

69385 柴胡洗眼汤

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】柴胡(去苗) 蕤仁(研) 黄连(去须) 川升麻 玄参各一两

【用法】上为粗散。以水三大盞,煎取一大盞半,滤去滓,微热淋洗,不勒度数,冷即重暖用之。

【主治】丹石毒上攻，眼目赤痛，微肿，眦烂。

69386 柴胡养阴汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】柴胡四钱 当归二钱 陈皮二钱 知母一钱

【功用】《医略六书》：养营解表。

【主治】①《明医指掌》：阴分虚，邪气盛，无汗而疟。②《医略六书》：久疟不解，脉弦数。

【方论选录】《医略六书》：柴胡解表散邪，知母润燥清热，当归养血脉以益营，陈皮利中气以和胃。水煎温服，使胃气调和，则营阴自充，而卫气振发，疟邪自外解，何久疟之不愈哉！

69387 柴胡养荣汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 陈皮 甘草 当归 白芍 生地 知母 天花粉

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《瘟疫论》：瘟疫解后，表有余热。②《重订通俗伤寒论》：伤寒经水适断，血室空虚，邪乘虚传入，邪胜正亏，经气不振，不能鼓散其邪者。

69388 柴胡养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十。

【组成】柴胡 黄芩 陈皮 甘草 生地 当归 白芍 厚朴 大黄 枳实 姜

【主治】瘟疫，血因邪结，经水适新，血室乍空，邪乘虚入，如结胸状；新产亡血，冲任空虚，与素崩漏，经气久虚者。

69389 柴胡养荣汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 陈皮一钱 甘草一钱 当归二钱 白芍一钱五分 生地三钱 知母二钱 花粉二钱 蝉蜕（全）十个 白僵蚕（酒炒）三钱 大枣二枚

【用法】水煎，温服。

【主治】温病阴枯血燥，邪热不退。

69390 柴胡姜桂汤

《玉机微义》卷九。为《伤寒论》“柴胡桂枝干

姜汤”之异名。见该条。

69391 柴胡姜桂汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 干姜 桂枝 厚朴 山楂 陈皮

【主治】因当风露卧，冷水浴澡，阴邪客于荣卫而致疟疾，寒多热少，脉来洪弦无力。

69392 柴胡姜桂汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】柴胡一钱五分 半夏二钱 人参一钱 黄芩一钱 桂枝二钱 甘草五分

【用法】加煨姜三钱，大枣三枚。二服全愈。

【主治】疟痢寒多热少，或但寒不热。

【加减】恶心，加藿香梗三钱；饱闷，加炒枳壳一钱二分。

69393 柴胡姜桂汤

【方法】《家庭治病新书》。

【组成】柴胡 黄芩各一钱 干姜 桂枝各八分 甘草八分

【用法】水煎服。

【主治】疟疾，寒多热少者。

69394 柴胡退翳丸

《银海精微》卷下。为《兰室秘藏》卷上“羌活退翳丸”之异名。见该条。

69395 柴胡秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】柴胡（去苗）一两 秦艽（去苗土）白芷 藿香（去梗）半两 桔梗（锉，炒） 甘草（炙，锉） 莎草根（炒） 沉香（锉） 麻黄（去根节）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，入小麦五十粒，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳身体疼痛，咳嗽发热。

69396 柴胡秦艽汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】柴胡（去苗） 秦艽（去苗土） 常山 贝母（去心） 甘草（微炙） 乌梅肉（焙干） 山梔子仁 豉 鳖甲（去裙襕，醋炙） 黄芩（去黑心）各一两 生姜（切） 大

黄(锉,炒)各半两 桃枝(锉) 柳枝(锉) 葱白(切) 薤白(切)各一握 糯米半合

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盏,酒二分,同煎至四分,去滓温服,早晨、日午、临卧各一。五岁以下分作二服,二岁以下分作三服。

【主治】小儿盗汗。

69397 柴胡桂枝汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】柴胡加桂汤(《三因》卷四)、柴胡加桂枝汤(《医学纲目》卷三十)、桂枝柴胡各半汤(《痰症论疏》)。

【组成】桂枝(去皮)一两半 黄芩一两半 人参一两半 甘草一两(炙) 半夏二合半(洗) 芍药一两半 大枣六枚(擘) 生姜一两半(切) 柴胡四两

【用法】以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

【主治】外感风寒,发热自汗,微恶寒,或寒热往来,鼻鸣干呕,头痛项强,胸胁痛满,脉弦或浮大。现用于感冒、癫痫、流行性出血热等。

①《伤寒论》:伤寒六七日,发热,微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者。②《外台》:寒疝腹中痛。③《活人书》:伤寒发汗多,亡阳谵语者。④《元戎》:伤寒脉浮大。⑤《伤寒指掌图》:风湿汗后,风热病而心下妨闷动气。⑥《玉机微义》:伤寒发热,潮热脉弦,自汗,或渴或利。⑦《校注妇人良方》:伤风发热,自汗,鼻鸣干呕。⑧《医学入门》:少阳病,头额痛,项强,胁痛胸满,发热恶寒,乍往乍来。⑨《准绳·幼科》:疟,身热多汗。⑩《证治宝鉴》:行痹走注,历节。⑪《张氏医通》:太阳少阳并病、合病。

【方论选录】①《伤寒来苏集》:桂、芍、甘草,得桂枝之半;柴、参、芩、夏,得柴胡之半;姜、枣得二方之半,是二方合并非各半也。取桂枝之半,以解太阳未尽之邪;取柴胡之半,

以解少阳之微结;凡口不渴,身有微热者,当去人参,此以六七日邪虽不解,而正气已虚,故用人参以和之也。外证虽在,而病机已见于里,故方以柴胡冠桂枝之前,为双解两阳之轻剂。②《古方选注》:以柴胡冠于桂枝之上,即可开少阳微结,不必另用开结之方;佐以桂枝,即可解太阳未尽之邪;仍用人参、白芍、甘草,以奠安营气,即为轻剂开结之法。③《医门棒喝》:此小柴胡与桂枝汤合为一方也。桂枝汤疏通营卫,为太阳主方,小柴胡和解表里,为少阳主方。因其发热微恶寒,肢节烦疼之太阳证未罢,而微呕,心下支结之少阳证已现,故即以柴胡为君,使少阳之邪开达,得以仍从太阳而解也。少阳证必呕,而心下支结,逼近胃口,故小柴胡用人参、姜、半,通胃阳以助气,防其邪之入府也。然则虽曰和解,亦为开达驱邪之法,故可仍从汗解。世俗反畏人参之补而去之,乃失其功用,而中虚之人,邪不能外出,必致内陷而致危,是皆不明表里证治故也。

【临证举例】①太阳少阳合病 《辽宁中医杂志》(1981;10:39):某某,女,65岁。外感风邪,头痛发热,肢节酸痛,皮肤苍白,胸胁苦满,默默不欲食,口苦咽干,舌苔白,脉象浮数。经服柴胡桂枝汤,每日一剂,二天即愈。②腹痛 《丛桂草堂医案》:王善余次子,年十六岁,陡患腹痛呕吐,恶寒发热,痛甚则出汗,舌苔薄腻,脉缓滑。与柴胡桂枝汤去人参,加薏仁、木香,一剂痛呕俱止,寒热亦退,接服一剂痊愈。③感冒引发胃痛 《伤寒论方运用法》:患者男性,32岁。患十二指肠球部溃疡已两年,每因感冒或饮食不节,胃痛即发。周前又发作,服药无效。胸骨下时觉疼痛,五天来每餐只能饮稀粥少许。询知其此次胃痛系感冒之后转剧,现仍微有寒热(37.5℃),头晕,口苦,肢倦,不思饮食,深呼吸时觉胸部不舒,微咳,时欲呕,大便三天未行,舌苔薄白,脉浮数。予柴胡桂枝汤五剂愈。④癫痫 《中成药研究》(1982;12:20):用本方制成桂芍镇痛

片,治疗 36 例不同类型的难治型癫痫患者,经过 6~12 个月的临床治疗,显效者 11 例,有效者 5 例,总有效率达 44.44%。⑤流行性出血热 《辽宁中医杂志》(1984;8:17):沈阳市传染病院用柴胡桂枝汤为主治疗流行性出血热 112 例,仅死亡 1 例,疗效优于对照组,经统计学处理,两组差异非常显著。⑥失眠 《浙江中医杂志》(1983;5:223):虞某某,女,24 岁。2 月来夜寐不安,多梦易醒,甚至彻夜难眠,精神不振,周身不适,不可名状。脉浮软,苔薄白,舌淡红。予柴胡桂枝汤加当归,4 剂获愈。

【现代研究】①抗癫痫及镇静作用 《Planta medica》(1978;3:294):对柴胡桂枝汤加芍药进行神经药理研究,结果表明,其 2% 的溶液对戊四氮所致日本蜗牛食管下神经节的 D 神经细胞放电有显著的抑制作用,这一放电效应与注射戊四氮和用其它方法引起哺乳动物大脑皮层细胞放电的类型极为相似,故作为抗癫痫药的筛选模型。《生药杂志》(1978;4:273):实验表明,本方溶液能使蛙的离体坐骨神经纤维的复合活动电位消失,其强度约为 0.5% 的普鲁卡因之 0.3 倍,表明本方具有一定的局部麻醉作用。这种局麻作用也可能与本方抗癫痫效果有关。②抗溃疡作用及对肠平滑肌的影响 《诊断与治疗》(1987;11:176):实验表明,本方能抑制半胱胺所致大鼠胃溃疡的形成,胃液检测发现本方可抑制胃酸分泌,尤其是能明显抑制胃蛋白酶的分泌,血清胃泌素测定表明本方还可抑制胃泌素分泌和防止半胱胺所致胰泌素的下降,可见本方抗胃溃疡的作用是从增强机体对胃溃疡形成的防御因子和对抗攻击因子两方面而获效的。《药理学杂志》(1982;4:371):本方还具有显著的解痉作用,实验证明对于乙酰胆碱所致离体豚鼠回肠收缩,有显著的解痉作用,此作用与小柴胡汤类似而弱于大柴胡汤。③保肝作用 《国外医学·中医中药分册》(1984;2:121):本方组成药

柴胡、甘草、人参、黄芩、白芍和大枣均有保肝作用。对于 D-半乳糖胺所致大鼠肝损害,本方有与大、小柴胡汤类似的保肝效果,能抑制 SGPT 的上升及肝透明变性。④抗炎作用 《日本东洋医学会志》(1972;3:28):本方对大鼠巴豆油性肉芽囊的渗出和棉球肉芽肿增生均有显著抑制作用,以对前者为强;而大、小柴胡汤的抗炎作用则以对晚期炎症为强,本方抗炎作用的上述特点与其适用于治太阳少阳合病而有表证未去者,即多用于急性炎症性疾病相符。⑤毒性 《药理学杂志》(1980;6:602、607):本方毒性小,大鼠连续口服 4 周,对生长发育、肝、脾、肾上腺、胸腺的重量等均无显著影响,电镜观察肝脏之超微结构变化以及生化检测等均表明本方对肝脏蛋白含量、葡萄糖-6-磷酸酶、5-核苷酸酶、琥珀酸胞嘧啶还原酶以及 NADH 胞嘧啶还原酶等活性也均无影响。

69398 柴胡桂枝汤

《伤寒全生集》卷三。为《伤寒论》“柴胡桂枝干姜汤”之异名。见该条。

69399 柴胡桂姜汤

《金匱》卷上(附方)引《外台》。为《伤寒论》“柴胡桂枝干姜汤”之异名。见该条。

69400 柴胡桂姜汤

【方源】《痢症纂要》卷十二。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 人参 甘草 酒芍 桂枝 瓜蒌 牡蛎 干姜

【用法】水煎服。

【主治】由阳气素虚,而盛暑之时贪凉饮冷,以致阴气益盛,阳气愈微而发牡疟,属肾,但寒不热,其症四肢厥逆,口鼻冷气,头眩目涩,胸满肚疼。

69401 柴胡桔梗汤

【方源】《成方切用》卷五。

【组成】小柴胡汤加桔梗

【主治】春嗽。

69402 柴胡栝楼汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】柴胡(去苗,洗)八钱 芍药 人

参各二钱 半夏(汤洗七遍)二钱半 甘草(炙)二钱 栝楼二钱

【用法】上咬咀。水二升，加生姜十片，大枣二个(擘破)，同煎至一升，分三服，去滓服。

【主治】肺素有热，气盛于身，厥逆上冲，中气实而不外泄，其气内藏于心，外舍于分肉之间，而致痺疟，间日发热，发必数欠，头痛拘倦，消烁脱肉，其脉弦大而数。

69403 柴胡桃仁汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】柴胡三钱 桃仁三钱 石膏三钱 骨碎补三钱

【用法】水煎半杯，热服，徐咽。

【主治】虫牙。

69404 柴胡破瘀汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤芍 当归 生地各等分 五灵脂 桃仁各减半

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《医学入门》：蓄血症，及热入血室。②《东医宝鉴·杂病篇》：产后因伤寒，热入血室或恶露不下。

【加减】大便闭，加大黄一片。

【宜忌】非瘀血症，不可轻用。

69405 柴胡破瘀汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】羌活 防风 中桂各一钱 苏木一钱五分 连翘 归尾 柴胡各二钱 麝香少许 水蛭三钱(炒烟尽，研)

【用法】分二服。每水一盞，酒二盞，除蛭、麝另研如泥，入煎药服。

【主治】心胁痛。

69406 柴胡铁锈汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】柴胡 铁锈 人参 茯苓 桂枝 蔚金 牡蛎 大黄 甘草

【用法】水煎，温服。

【主治】妊娠痛症。

69407 柴胡消肿汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】黍粘子(炒) 黄连各五钱 归尾 甘草各一两 花粉 黄耆各一钱五分 黄芩 柴胡各二钱 连翘三钱 红花五分 玄参一钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水二钟，煎八分，食后热服。

【主治】马刀疮肿盛。

【宜忌】忌酒、湿面、房劳、气怒。

69408 柴胡消痈汤

【方源】《古今名方》。

【组成】柴胡 10~20 克 夏枯草 紫地丁 三颗针各 10 克 黄芩 白芍 芒消各 5~10 克 野菊花 5 克 郁金 大黄 法半夏 甘草各 3~5 克

【功用】清热解毒，通里泻火。

【主治】胆道感染，痈疡型(脓毒型)。

【加减】热重，重用柴胡、黄芩，选加紫地丁、野菊花、黄连；大热、大渴、脉洪大者，加石膏、知母、天花粉、鲜芦根；湿重，重用茵陈、郁金、金钱草、栀子、大黄；痛重，加玄胡、川楝子；呕吐，加半夏、竹茹、生姜；驱蛔，加苦楝根皮、槟榔、使君子；瘀血，加丹参、川芎、红花；气阴欲脱，加独参汤、生脉散。

69409 柴胡益肝散

《寿世保元》卷七。为《医学入门》卷八“柴胡抑肝汤”之异名。见该条。

69410 柴胡调经汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】升阳调经汤(《医略六书》卷二十六)。

【组成】炙甘草 当归身 葛根各三分 独活 藁本 升麻各五分 柴胡七分 羌活 苍术各一钱 红花少许

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水四大盞，煎至一盞，去滓，空心稍热服。取微汗立止。

【主治】经水不止，鲜红，项筋急，脑痛，脊骨强痛。

【方论选录】《医略六书》：羌活、藁本散太阳巅顶之邪；独活、葛根散少阳阳明之邪；升麻、柴胡升阳散郁以通肌；苍术、甘草燥湿强脾以和胃；当归、红花引入血分也。水煎服，使邪从汗解，则经气清和而血自归经，何有崩下如筛之患？

69411 柴胡陷胸汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】柴胡一钱 姜半夏三钱 小川连八分 苦桔梗一钱 黄芩一钱半 栝楼仁(杵)五钱 小枳实一钱半 生姜汁四滴(分冲)

【功用】和解开降达膜。

【主治】少阳结胸，症见少阳证具，胸膈痞满，按之痛，用柴胡枳桔汤未效者。现用于慢性胆囊炎急性发作、急性支气管炎。

【临证举例】①慢性胆囊炎急性发作 《云南中医杂志》(1982;3:33):李某某,女,55岁,营业员,1980年10月5日初诊。患者11年前患急性胆囊炎后,常觉右胁胀痛,近年来渐觉怠倦乏力,大便艰涩,二、三日方一行。前日突觉右胁胀痛难忍,恶寒发热,口苦,胸闷,恶心,大便秘结,小便黄少,面色黯黄,精神不振,舌苔薄黄,脉沉细。证属肝胆湿热气滞,然因病久体弱,不可过用苦寒攻剂,当辛开苦降,调达气机,予柴胡陷胸汤加郁金10克,木香10克,二剂之后,大便畅行,证情减轻,再进四剂,诸证消失。②急性支气管炎 《云南中医杂志》(1982;3:33):胡某某,男,40岁,工人,1981年1月27日初诊。病人素体清瘦,面白无华,胃纳不佳。五天前开始恶寒发热,鼻塞流清涕,头痛,咽痒,咳嗽吐少许白稠痰,自服西药后,头痛恶寒鼻塞减轻,但咳嗽频频,痰多黄稠,微觉喘急,汗出畏风,动则发热,口粘苦,脘闷不饥,苔白黄而腻,脉濡滑。证属风寒咳嗽化热,痰热互结,而表邪未净,当透表清热,化痰止咳,用柴胡12克,黄芩

10克,黄连5克,姜半夏10克,瓜蒌仁15克,枳实10克,桔梗10克,生姜15克,杏仁10克。连进三剂痊愈。

69412 柴胡陷胸汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡 瓜蒌 半夏 黄连 甘草 青皮 枳壳

【功用】开豁气道。

【主治】伤寒，胸满心烦，发热。

69413 柴胡陷胸汤

《寒温条辨》卷四。为《医学入门》卷四“柴陷汤”之异名。见该条。

69414 柴胡通经汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】柴胡 连翘 当归梢 生甘草 黄芩 鼠粘子 京三棱 桔梗各二分 黄连五分 红花少许

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热食后服。

【主治】小儿项侧马刀疮，坚而不溃。

【宜忌】忌苦药泄大便。

69415 柴胡通塞汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】柴胡 黄芩 橘皮 泽泻 羚羊角各三两 生地黄一升 香豉一升(别盛) 梔子四两 石膏六两 芒消二两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，去滓纳芒消，分三服。

【主治】下焦热，大小便不通。

【方论选录】《千金方衍义》：取柴胡提挈清阳，与手少阳同秉枢机，并取羚羊伐肝散结，黄芩泻肝胆火，橘皮和水谷气，生地治伤中血痹，泽泻行水清阴，梔子泻三焦火，以为通塞泄热之去路。

69416 柴胡通塞汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩(去黑心) 陈橘皮(汤浸去白，微炒) 泽泻 羚羊角(镑)各三分 梔子仁一两 石膏一两 大黄(锉，炒)一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞，入生地黄一分（拍破），豉半分（微炒），同煎至七分，去滓，食前服。

【主治】妊娠大小便不通，下焦热结。

69417 柴胡梅连汤

《傅青主女科·产后编》卷下。为《杨氏家藏方》卷十“前胡散”之异名。见该条。

69418 柴胡梅连散

《玉机微义》卷九引《瑞竹堂方》。为《杨氏家藏方》卷十“前胡散”之异名。见该条。

69419 柴胡梅连散

【方源】《金匱翼》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 胡黄连 当归 芍药各半两

【用法】上为末。每服三钱，童便一盞，乌梅一个，猪胆五匙，猪脊髓一条，韭根半钱，水一钟，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《金匱翼》：骨蒸劳热，久而不愈。②《血证论》：肝经怒火逆上，侮肺作咳。

69420 柴胡黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】柴胡（去苗） 黄芩（去黑心） 土瓜根 白鲜皮各一两 木香 茵陈蒿各一两一分 山梔子仁三分 大黄（细锉，醋炒）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，下朴消末半钱匕，空心温服，如人行五里再服；未通，以葱鼓粥投之。

【主治】寒热气未解，恶寒头痛，壮热，四五日大便不通。

69421 柴胡黄连膏

【方源】《卫生总微》卷十五。

【异名】柴胡丸（《幼科证治大全》）。

【组成】柴胡（去苗） 胡黄连各等分

【用法】上为末，炼蜜和膏为丸，如鸡头子大。每服一二丸，银器中用酒少许化开，入水五分，重汤煮二三十沸，温服，不拘时候。

【主治】盗汗，潮热往来。

69422 柴胡猪苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【异名】柴胡汤。

【组成】柴胡（去苗） 猪苓（去黑皮） 紫苏茎叶（细锉）各一两半 陈橘皮（汤去白，焙） 防己 大麻仁（炒，研） 郁李仁（汤去皮尖，炒，研） 桑根白皮（锉碎，炒令黄）二两半

【用法】除麻仁、郁李仁研外，上为粗末，入研药和匀。每服三钱匕，以水一盞，煎至七分，去滓，空腹服，日午晡时再服。

【主治】风寒湿毒脚气，疼痛，皮肤不仁，缓弱痹痹，足胫肿满，心下急，大便涩。

69423 柴胡清中汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 枳实 杏仁 石菖蒲 黄连 赤芍

【主治】湿温，胸满妄言，两胫逆冷。

【加减】脉来洪数，或上盛下虚，加大黄以下之。

69424 柴胡清肌散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 荆芥 丹皮 生地 元参 桔梗 赤芍 苏叶 薄荷 前胡

【功用】退热凉血。

【主治】妇人经正行，客邪乘虚所伤，忽然口燥咽干，手足壮热。

69425 柴胡清肝汤

《医学入门》卷八。为《校注妇人良方》卷二十四“柴胡清肝散”之异名。见该条。

69426 柴胡清肝汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】川芎 当归 白芍 生地黄 柴胡 黄芩 山梔 天花粉 防风 牛蒡子 连翘 甘草节各一钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】①《外科正宗》：鬓疽初起未成者，毋论阴阳表里。②《医部全录》：肝火壅盛，并胁生痛疽。

【临证举例】耳廓湿疹 《北京中医》

(1985;2:30);谢某,男,57岁,1966年3月16日初诊。右耳廓红肿瘙痒已三天,听力好,无耳鸣,但感口苦,大便干,小便黄。查:右耳廓红肿发热,外耳道未见异常。舌尖红,苔白腻微黄,脉弦滑。证属肝胆湿热,循经上攻。治宜清利肝胆湿热之法:醋柴胡5克,当归10克,赤芍6克,生地10克,川芎3克,炒山栀5克,炒牛蒡子10克,防风4.5克,天花粉6克,连翘10克,车前子15克(包煎),甘草3克。水煎服两剂。药后,耳廓肿消痒止而告痊愈。

69427 柴胡清肝汤

【方源】《外科真铨》卷上。

【组成】北柴胡七分 小生地一钱五分 炒白芍一钱五分 西当归一钱五分 川贝母一钱 牡蛎粉三钱 北连翘一钱 玄参一钱 炒山甲一片 金银花一钱五分 甘草七分

【主治】谋虑不决,郁火凝结少阳胆经而成天疽、锐毒,生于耳后一寸三分高骨之后,左名天疽,右为锐毒。

69428 柴胡清肝汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 南沙参 川芎 黑栀

【主治】怒火上升,憎寒恶热,肝胆风热疮疡。

69429 柴胡清肝饮

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】柴胡 丹皮 茯苓 山栀子 川芎 白芍 当归 牛蒡子 甘草 连翘

【用法】水煎服。

【主治】肝经风热疮毒。

69430 柴胡清肝饮

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 白芍药 山栀 黄芩 丹皮 当归 青皮 钩藤 甘草

【主治】肝胆有火而头痛;少阳风热而齿痛。

69431 柴胡清肝饮

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 山栀 白芍药 青皮 枳壳

【主治】肝经郁火胁痛。

69432 柴胡清肝饮

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 青皮 山栀 川芎 钩藤 香附 木通 枳壳 木香 独活 乌药

【主治】怒气郁结而腰痛。

【加减】寒,加姜、桂;热,加黄柏。

69433 柴胡清肝饮

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】柴胡 山栀 丹皮 青皮 苏梗 白芍药 钩藤

【主治】胆胀者,口苦胁痛,善太息。

【加减】肝胆热,加龙胆草、青黛。

69434 柴胡清肝饮

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡 青皮 枳壳 山栀 木通 钩藤 苏梗 黄芩 知母 甘草

【主治】燥火腹痛,肝胆有热,攻刺肋肋者。

69435 柴胡清肝饮

《审视瑶函》卷四。为《校注妇人良方》卷二十四“柴胡清肝散”之异名。见该条。

69436 柴胡清肝饮

《证治汇补》卷四。为《明医杂著》卷六“柴胡清肝散”之异名。见该条。

69437 柴胡清肝饮

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 山栀 青皮 荆芥 甘草

【主治】少阳之火,恒结喉旁,而为喉痹。

69438 柴胡清肝饮

【方源】《不知医必要》。

【组成】柴胡 白芍(酒炒)各一钱五分 黑栀 连翘 黄芩各一钱 甘草七分

【主治】怒动肝火而耳闭。

69439 柴胡清肝散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】柴胡 龙胆草 当归 川芎 黄芩 白芍 知母 生地 桔梗 甘草 黄连

(吴茱萸汁炒)

【主治】由肝火郁遏而致妊娠吐酸者。

【方论选录】是方清肝火、和肝血为主，四物、知、草以滋阴生血，柴、胆、芩、连以清肝火，桔梗之苦辛以升提气血之郁也。

69440 柴胡清肝散

【方源】《明医杂著》卷六。

【异名】柴胡清肝饮(《证治汇补》卷四)。

【组成】柴胡 黄芩(炒)各一钱 黄连(炒) 山梔(炒)各七分 当归一钱 川芎六分 生地黄 牡丹皮各一钱 升麻八分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】肝气郁结，风热外侵，颈项结核，肿痛不消，或有寒热；肝热犯脾，口唇肿裂；妇人肝火内盛，月经光期而量多者。

①《明医杂著》：肝胆二经风热、怒火，颈项肿痛，结核不消，或寒热往来，呕吐痰水；及妇人暴怒，肝火内动，经水妄行，胎气不安。②《口齿类要》：肝经怒火，风热传脾，唇肿裂，或患茧唇。③《证治汇补》：肝火口酸。

【加减】脾胃弱，去芩、连，加苓、术。

69441 柴胡清肝散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】柴胡清肝汤(《医学入门》卷八)、柴胡清肝饮(《审视瑶函》卷四)。

【组成】柴胡 黄芩(炒)五分 人参 山梔(炒) 川芎各一钱 连翘 桔梗各八分 甘草五分

【用法】水煎服。

【功用】《医略六书》：清肝解郁。

【主治】肝胆热盛，头昏目眩，乍寒乍热，或寒热往来，口中味酸，或耳前后肿痛，或发疮疡，或患乳痈，脉弦数。

①《校注妇人良方》：肝胆三焦风热怒火，以致项胸作痛，或头目不清，或耳前后肿痛，或寒热体疼。②《保婴金镜录》：鬓疽，及疮毒发热。③《保婴撮要》：肝胆三焦风热怒火，或乍寒乍热，往来寒热发热，或头发疮毒，或乳母

怒火，患一切疮疡。④《医学入门》：嗜热不食，寒热往来，呕吐泄泻。⑤《症因脉治》：内火喘逆，肝火上冲。⑥《医略六书》：肝热口酸，脉弦数者。⑦《性病》：内吹乳，色红多热者。

【方论选录】《医略六书》：柴胡疏肝郁以达热，桔梗清咽膈以达肝，黄芩清膈热凉肝，连翘清心热散结，川芎入血海以解郁，人参入气海以助化，山梔清利三焦，甘草调和中气。为散，竹叶汤下，俾木郁得伸，则肝火自散而胃气敷化有权，安有口酸之患乎？

69442 柴胡清肝散

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】柴胡 黄芩 胆草 川芎 芍药 山梔 连翘 甘草 漏芦

【用法】水煎服。

【主治】①《痘疹传心录》：乳母情欲厚味积热，传儿患淋者。②《慈幼心传》：小儿肝热下淋。

69443 柴胡清肝散

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】柴胡五钱 黄芩一两半(炒) 人参一钱 生地五钱 当归一两 赤芍一两 连翘三两 甘草五钱 山梔一两半(炒)

【用法】上为散。每服五钱，水煎，去滓，微温服。

【功用】调血清火。

【主治】肝火伤营，耳衄，脉弦数者。

【方论选录】山梔清肝，能降曲屈之火；黄芩清肺，善涤胸中之热；归、芍调营气以降血；参、草扶元气以缓肝；柴胡疏肝解热；连翘清心泻热；生地凉血以止耳衄。此调血清火之剂，为肝火伤营耳衄之专方。

69444 柴胡清肝散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】银柴胡 梔子(微炒) 连翘(去心) 胡黄连 生地黄 赤芍 龙胆草 青皮(炒) 甘草(生)

【用法】灯心、竹叶为引，水煎服。

【主治】肝疳。面目爪甲皆青，眼生眵泪，

隐涩难睁，摇头揉目，合面睡卧，耳疮流脓，腹大青筋，身体羸瘦，燥渴烦急，粪青如苔。

69445 柴胡清骨散

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】秦艽 知母 炙草 胡连 鳖甲 青蒿 柴胡 地骨皮 韭白 猪脊髓 猪胆汁 童便

【主治】骨蒸久不痊，热甚者。

69446 柴胡清骨散

【方源】《血证论》卷七。

【组成】柴胡三钱 青蒿三钱 秦艽三钱 白芍三钱 丹皮三钱 地骨皮三钱 鳖甲三钱 知母三钱 黄芩二钱 甘草一钱 童便少许 胡黄连一钱

【主治】血虚火旺，烦渴淋闭，骨蒸汗出。

【方论选录】方用丹皮、知母、枯芩、黄连、童便大清相火；而又恐外有所郁，则火不能清也，故用柴胡、青蒿、秦艽以达其郁；又恐内有所结，则火不能清也，故用白芍、丹皮、鳖甲以破其结，佐甘草一味以和诸药。务使肝经之郁结解，而相火清。

69447 柴胡清胆汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 陈皮 甘草 竹茹

【主治】少阳外感，呕吐苦水。

69448 柴胡清热饮

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】柴胡 黄芩 赤芍 生地 麦冬 (去心) 地骨皮 生知母 生甘草

【用法】生姜、灯心为引，水煎服。

【主治】疹已没落，余热留于肌表。

69449 柴胡清燥汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 陈皮 甘草 花粉 知母

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】瘟疫下后，或数下，膜原尚有余邪，未尽传胃，邪与胃气并，热不能顿除。

69450 柴胡清燥汤

【方源】《温热暑疫全书》卷四。

【组成】白芍药 当归 生地黄 陈皮 甘草 竹心 灯心 栝楼根 知母 柴胡

【用法】水煎，温服。

【主治】疫病，应下失下，阳气伏，口燥舌干而渴，身反热减，四肢时厥，欲得被近火，既下厥回，邪去而郁阳暴伸，脉大而数，舌上生津，不思水饮。

69451 柴胡清燥汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 陈皮一钱 甘草一钱 知母二钱 花粉二钱 蝉蜕 (全) 十个 白僵蚕 (酒炒) 三钱 大枣二枚

【用法】水煎，温服。

【主治】温病数下后余热未尽，邪与卫搏，热不能顿除。

69452 柴胡羚角汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】鳖血柴胡二钱 归尾二钱 杜红花一钱 碧玉散三钱 (包煎) 羚角片三钱 (先煎) 桃仁九粒 小青皮一钱半 炒川甲一钱 吉林大参一钱 醋炒生锦纹三钱

【用法】临服调入牛黄膏一钱。

【功用】和解阴阳，大破血结。

【主治】妇人温病发热，经水适断，少阳内陷阳明厥阴，昼日明了，夜则谵语，甚至昏厥，舌干口臭，便闭尿短。

【方论选录】此方君以鳖血柴胡，入经达气，入络利血，提出少阳之陷邪；羚角解热清肝，起阴提神。臣以归尾、桃仁破其血结，青皮下其冲气。佐以川甲、碧玉散、炒生军直达瘀结之处，以攻其坚，引血室之结热，一从前阴而出，一从后阴而出。妙在人参大补元气，以协诸药而神其用。牛黄膏清醒神识，以专治谵语如狂。此为和解阴阳，大破血结，背城一战之要方。

69453 柴胡葛根汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】柴胡 天花粉 干葛 黄芩 桔

梗 连翘 牛蒡子 石膏各一钱 甘草五分 升麻三分

【用法】水二钟，煎八分服，不拘时候。

【功用】清热解毒。

【主治】颐毒。表散未尽，身热不解，红肿坚硬作痛者。

69454 柴胡紫苏饮

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】柴胡 连翘 苏子 川楝 青皮 苍术 玄胡索 泽泻 猪苓 赤芍药 木香

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】内素有热，偶为外寒所束，致患假寒症，脉左尺弦洪，挟湿洪弦而缓，挟风浮弦，按之洪缓，由七情所致癰疽，脏气下坠，肿胀急痛；号哭忿怒所致气疝，乍满乍减。

69455 柴胡舒肝散

《验方新编》卷五。为《准绳·类方》卷四引《统旨》“柴胡疏肝散”之异名。见该条。

69456 柴胡温胆汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】柴胡 陈皮 半夏(姜制) 茯苓 甘草(生) 竹茹 枳实(麸炒)

【用法】引用生姜。水煎服。

【主治】小儿感冒夹惊，病虽退，尚觉心惊不寐者。

【临证举例】症 《徐渡渔医案》：暑风为症，症日作于夜，脉弦而数，寒热俱甚，解达之。柴胡温胆汤加枇杷叶、大麦仁。

69457 柴胡疏肝汤

《不知医必要》卷二。为《准绳·类方》卷四引《统旨》“柴胡疏肝散”之异名。见该条。

69458 柴胡疏肝散

【方源】《准绳·类方》卷四引《统旨》。

【异名】柴胡舒肝散(《验方新编》卷五)、柴胡疏肝汤(《不知医必要》卷二)。

【组成】柴胡 陈皮(醋炒)各二钱 川芎 芍药 枳壳(麸炒)各一钱半 甘草(炙)五分 香附一钱半

【用法】上作一服。水二钟，煎八分，食前服。

【功用】《杂病证治新义》：疏肝理气。

【主治】因怒气郁而胁痛，寒热往来，痛而胀闷，不得俯仰，喜太息，脉弦。现用于神经官能症、中耳炎等。

①《准绳·类方》引《统旨》：胁痛。②《景岳全书》：肋肋疼痛，寒热往来。③《医钞类编》：肝实胁痛，不得转侧，喜太息。④《内科概要》：胁痛，因怒气郁者，痛而胀闷，不得俯仰，脉弦。

【方论选录】①《景岳全书》：柴胡、芍药以和肝解郁为主；香附、枳壳、陈皮以理气滞；川芎以活其血；甘草以和中缓痛。②《谦斋医学讲稿》：本方即四逆散加川芎、香附和血理气，治疗胁痛，寒热往来，专以疏肝为目的。用柴胡、枳壳、香附理气为主，白芍、川芎和血为佐，再用甘草以缓之，系疏肝的正法，可谓善于运用古方。

【临证举例】①神经官能症《四川中医》(1989;4:23)：一患者，自觉咽中有异物，多方检查结果均无异常，并见精神抑郁，时叹息，其症状每随情志波动而变化。治用本方加半夏、瓜蒌各15克。服药2剂，咽部异物感明显减轻，继服5剂而痊愈。②中耳炎《四川中医》(1989;4:23)：一患者，自觉耳内胀闷堵塞，听力下降。西医诊断为“非化脓性中耳炎”。检查：耳鼓膜轻度充血并呈内陷。证属：肝气郁结，气血凝滞。治用本方加陈皮、僵蚕各12克，菖蒲6克。服药5剂，耳闭塞明显减轻，继服上方19剂，听力恢复，余症消除。

【现代研究】对泌胆功能的影响 《实用中医内科杂志》(1989;1:11)：王昕等用雄性大白鼠制成肝郁模型，然后用本方灌胃给药，在腹腔麻醉条件下，做胆汁引流，记录1小时胆汁流量。结果表明本方对肝郁动物的泌胆功能有显著的促进作用($P < 0.01$)，其具体作用机制有待进一步研究。

69459 柴胡疏肝散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】柴胡 橘皮(醋炒)各二钱 川芎

(童便浸,切) 芍药 枳壳(炒)各一钱半
甘草(炙)五分 香附(醋炒)一钱半 山
梔(姜汁炒黑)一钱 煨姜一片

【用法】水煎,食前温服。

【功用】《医略六书》:解郁调肝。

【主治】①《张氏医通》:怒火伤肝,胁痛,血
菀于上。②《医略六书》:怒火伤肝,胁痛而呕
血,脉弦数者。

【加减】吐血,加童便半盏。

【方论选录】《医略六书》:柴胡疏肝木以解
郁,山梔清郁火以凉血,白芍敛肝阴以止血,
川芎化凝血以归肝,枳壳破滞气,陈皮利中
气,香附调气解气郁,薄荷解郁疏肝,甘草缓
中以泻肝火也;更用童便降火以涤瘀结。为散
煎冲,生者力锐而熟者性醇,务使怒火顿平则
肝郁自解,肝络清和,安有胁痛呕血之患乎!

69460 柴胡疏肝散

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮
白茯苓 白芍 香附 枳壳 玄胡

【主治】痞块,痛无形质,不时而发者,非
痃即癖。

【加减】内热,加山梔。

69461 柴胡疏肝散

【方源】《医医偶录》卷二。

【组成】柴胡 陈皮各一钱二分 川芎
赤芍 枳壳 醋炒香附各一钱 炙草五分

【主治】肝气左胁痛。

69462 柴胡疏肝煎

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】柴胡 前胡 当归各二钱 赤芍
琥珀(研,冲)各八分 左牡蛎四钱 砂仁
末五分 枳壳一钱

【用法】加灯草一九,金箔一张,拌水煎服。

【主治】阳气暴张而为煎厥。

69463 柴胡解肌汤

《回春》卷二。为《伤寒六书》卷三“柴葛解肌
汤”之异名。见该条。

69464 柴胡解毒汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱五分 半夏
一钱 人参八分 甘草三分 黄连一钱五分
梔子一钱 黄柏八分

【用法】上咬咀。水二钟,加生姜三片,煎
一钟,不拘时候服。

【主治】伤寒八九日,热不退,脉弦数,口
干烦躁,大便不通。

69465 柴胡解毒汤

【方源】《古今名方》。

【组成】柴胡 5~20 克 黄芩 白芍 芒
消各 5~10 克 黄连 郁金 广木香 姜半
夏 大黄 梔子 甘草各 3~5 克 夏枯草
茵陈(后下)各 10 克

【功用】疏肝清热,通里攻下。

【主治】胆道感染湿热型或实火型。症见身
热,口干,舌苔黄腻,脉洪大。

【加减】热重,重用柴胡、黄芩,选加紫地
丁、野菊花、黄连;大热、大渴、脉洪大者,
加石膏、知母、天花粉、鲜芦根;湿重,重
用茵陈、郁金、金钱草、梔子、大黄;痛重,
加玄胡、川楝子;呕吐,加半夏、竹茹、生
姜;驱蛔,加苦楝根皮、槟榔、使君子;瘀
血,加丹参、川芎、红花;气阴欲脱,加独
参汤、生脉散。

69466 柴胡截疟饮

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】小柴胡汤加常山 槟榔 乌梅
桃仁

【用法】加生姜、大枣,水煎,并滓露一宿,
次日发前一二时,小温服;恶心,以糖拌乌
梅肉压之。

【主治】不足之人疟疾。

【宜忌】戒鸡、鱼、豆腐、面食、羹汤、热
粥、热物。

69467 柴胡聪耳汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】连翘四钱 柴胡三钱 炙甘草
当归身 人参各一钱 水蛭五分(炒,别
研)麝香少许(别研) 虻虫三个(去足,炒,

别研)

【用法】上除三味别研外，加生姜三片，水二大盏，煎至一盏，去滓，再下三味，上火煎一二沸，食远稍热服。

【主治】耳中干结，耳鸣耳聋。

69468 柴胡橘皮汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】柴胡 橘皮 黄芩 半夏 人参 白茯苓各等分

【用法】上锉细。加竹茹一团，生姜三片，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】疹子出后，毒邪壅遏，尚未出尽，拂拂发热，烦闷不宁，如蛇在灰，如蚓在尘之状，烦躁呕泄者。

69469 柴胡鳖甲丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】柴胡（去苗） 鳖甲（醋浸一宿，炙黄） 地骨皮 人参（去芦头） 枸杞子 白茯苓（去皮） 白芍药 知母 贝母（去心） 麦门冬（去心） 黄耆（蜜炙） 山梔子仁（炒）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎乌梅、青蒿、小麦汤送下，不拘时候。

【主治】虚劳客热，荣卫不和，全不思食，寒热相间，咳嗽痰涎，肢体倦怠，及伤寒汗后，余热不解，潮作寒热，日渐消瘦。

69470 柴胡鳖甲汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襴，醋炙） 赤茯苓（去黑皮）各一两 黄芩（去黑心） 知母（焙） 桑根白皮（锉）各三分 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒过经，潮热不解，或时作寒如疟状。

69471 柴胡鳖甲汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡（去苗）一两 鳖甲（小便浸三日，逐日换小便，炙黄，去裙襴脊骨）一两半 秦艽（去苗土） 桔梗（炒） 人参 芍药 当归（切，焙） 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 槟榔（锉） 紫苑（去苗土） 桑根白皮（锉） 地骨皮 生干地黄（焙） 白术 知母（焙） 芍药各一两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、童便各半盏，同煎至七分，去滓，通口服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】虚劳潮热，心神烦躁，咳嗽盗汗，肢节痠痛，夜卧不安。

69472 柴胡鳖甲汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襴，醋炙令熟）各一两 地骨皮一两半 知母（焙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，乌梅半个，青蒿少许，同煎至六分，去滓，食后临卧温服。

【主治】虚劳夜多盗汗，面色萎黄，四肢无力，不思饮食，咳嗽不止。

69473 柴胡鳖甲饮

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】鳖甲三钱（醋炙） 柴胡三分（盐水炒） 青蒿一钱半 地骨皮一钱半 丹皮一钱半 生地五钱 知母一钱半（盐水炒） 麦冬三钱（去心） 茯神二钱（去木） 乌梅三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】滋阴疏热。

【主治】虚劳，骨蒸烦渴，脉弦数。

【方论选录】生鳖甲滋阴散结，软柴胡疏热解蒸，青蒿叶解蒸热之余，地骨皮退肌表之热，丹皮凉血退蒸，茯神安神定志，麦冬清心热润肺，生地壮肾水滋阴，知母滋肾涤热以存阴，乌梅敛液生津以止渴。水煎温服，使

热退阴生，则津液得全而骨蒸自退，虚劳无不愈矣。

69474 柴胡鳖甲散

《普济方》卷二〇〇。即《博济》卷一“大柴胡鳖甲散”。见该条。

69475 柴独苍术汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 独活 苍术 防风 黄柏 黄芩

【主治】湿热腰痛，左关沉数。

【加减】热甚，加胆草。

69476 柴前梅连散

《玉机微义》引《瑞竹堂方》（见《医方类聚》卷六十三）。为《杨氏家藏方》卷十“前胡散”之异名。见该条。

69477 柴桂干姜汤

《医原》卷下。为《伤寒论》“柴胡桂枝干姜汤”之异名。见该条。

69478 柴桂地黄汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】六味地黄汤加柴胡 肉桂

【主治】阴虚感时，寒热如疟，其寒如冰，其热如烙。

【方论选录】以六味补肾，以柴、桂平肝胆之邪。

69479 柴梗半夏汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡二钱 黄芩 半夏 枳壳 桔梗 瓜蒌仁各一钱 青皮 杏仁各八分 甘草四分

【用法】水煎，温服。

【主治】邪热挟痰攻注，发热咳嗽，胸满，两胁铢痛。

【加减】口燥渴，去半夏；痰在肋下，加白芥子或竹沥、姜汁。

69480 柴葛二陈汤

【方源】《景岳全书》卷五十四引《辨疑》。

【组成】柴胡 干葛 陈皮 半夏 茯苓 甘草 白术 苍术（制） 川芎 黄芩各等分

【用法】加生姜三片，水二钟煎服。

【主治】一切疟。

【加减】阴疟，去黄芩，加干葛、川芎、苍术，若久疟及发散过者除之；阳分汗多，加人参、黄耆，去干葛；阴分虚，加酒炒芍药、当归、生地；久疟微邪潮热，加四君子汤，去祛邪之药；截疟，加常山、槟榔、青皮、贝母各一钱。

69481 柴葛二妙汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 干葛 赤芍 苍术 黄柏

【主治】湿从内中，如茶酒汤水，脾虚不能消散，积于上焦，而为上焦之湿，其人头面发肿，是为湿中生热，或生瘾疹，身热内烦，脉洪数或沉细缓。

【加减】在上者，去黄柏，加连翘。

69482 柴葛二妙汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 干葛 赤芍 苍术 黄柏 枳壳 厚朴 川芎 香附

【主治】寒疝，标寒束其本热，囊冷如冰，坚硬如石，阴茎不举，或控睾丸而痛，脉来滑大有力。

69483 柴葛二妙汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤芍 干葛 苍术 黄柏 厚朴 山楂 木瓜 槟榔

【主治】脚气，腿足肿痛。

69484 柴葛五苓散

【方源】《瘟疫明辨》卷末。

【组成】柴胡 葛根 茯苓 泽泻 猪苓 白术 桂枝

【主治】时疫兼痢，太阳症不见，而微见少阳、阳明症者。

69485 柴葛平胃散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 柴胡

干葛 黄连 山梔各等分

【用法】上为末。

【主治】肝火乘胃，呕吐酸水。

69486 柴葛平胃散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 柴胡 干葛

【主治】湿热症，右脉弦长，呕逆胸满。

【加减】头痛身痛，加羌活；无汗，加防风。

69487 柴葛各半汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】升麻 葛根 甘草 黄芩 半夏 赤芍药 柴胡

【用法】加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】伤寒发热，遍身大汗不解。

69488 柴葛安胎饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】柴胡 葛根 青黛各八分 石膏一钱五分 升麻五分 梔子一钱 知母七分 葱白三根

【用法】水煎服。

【主治】孕妇热病，骨节疼痛。

【加减】有痰，加竹沥一小杯，姜汁二匙。

69489 柴葛芩连汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡 干葛 黄芩 川连

【用法】水煎服。

【主治】中热泻，热在表。

69490 柴葛败毒散

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】柴胡 干葛 人参 羌活 防风 荆芥 桔梗 苏叶 甘草

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】疑似伤寒。

69491 柴葛败毒散

【方源】《痘科金镜赋》卷六。

【组成】柴胡 葛根 前胡 防风 苏叶 荆芥 桔梗 羌活 甘草 人参 生姜

【主治】疹欲出之时面颊红，或头眩身体拘急；及既出身应凉，毒火极热，更反热甚而

勿解。

69492 柴葛桂枝汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】柴胡 葛根 羌活 防风 人参 甘草 桂枝 牛蒡子（炒）

【用法】加淡竹叶十片，水一盞，同煎服。

【主治】表气素虚，邪气流注于腠理之间，邪正争攻，致痘疹发热之时，憎寒振振战动，痘疹欲出不出。

69493 柴葛桂枝汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】柴胡 葛根 甘草 桂枝 防风 人参 白芍药各等分

【用法】上锉细。加生姜三片，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痘疹初热。

69494 柴葛桂枝汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】嫩桂枝一钱 杭芍药一钱五分 北柴胡一钱 粉干葛一钱 炙甘草八分 老生姜一钱 大红枣五两

【用法】净水浓煎，热服。

【主治】小儿伤风，自汗发热。

69495 柴葛解肌汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】葛根解肌汤（《古今医鉴》卷三）、柴胡解肌汤（《回春》卷二）。

【组成】柴胡 干葛 甘草 黄芩 芍药 羌活 白芷 桔梗

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，槌法用石膏末一钱，煎之热服。

【功用】①《伤寒六书》：解肌清热。②《方剂学》：辛凉解肌，兼清里热。

【主治】三阳合病，头痛发热，心烦不眠，恶寒无汗，啞干耳聋，眼眶痛，衄血，脉浮洪而紧。现用于外感热病、沙门氏菌属感染、小儿上呼吸道感染高热等。

①《伤寒六书》：足阳明胃经受证，目疼，鼻干，不眠，头疼，眼眶痛，脉来微洪，属阳明经

病;太阳、阳明合病,衄血,脉浮洪而紧者。②《幼科指南》:小儿发热胎疾。③《金鉴》:三阳合病,头痛发热,心烦不眠,噤口耳聩,恶寒无汗,三阳证同见者。

【加减】本经无汗,恶寒甚者,去黄芩,加麻黄,冬月宜加,春宜少,夏、秋去之,加苏叶。

【方论选录】①《医方集解》:此足太阳、阳明药也。寒邪在经,羌活散太阳之邪(用此以代麻黄),芷、葛散阳明之邪,柴胡散少阳之邪;寒将为热,故以黄芩、石膏、桔梗清之(三药并泄肺热),以芍药、甘草和之也。②《删补名医方论》:葛根、白芷解阳明正病之邪;羌活解太阳不尽之邪;柴胡解少阳初入之邪;佐石膏、芩治诸经热,而专意在清阳明;佐芍药敛诸散药而不令过汗,桔梗载诸药上行三阳;甘草和诸药通调表里。③《成方便读》:以柴胡解少阳之表,葛根、白芷解阳明之表,羌活解太阳之表,如是则表邪无容足之地矣。然表邪盛者,必内郁而为热,热则必伤阴,故以石膏、黄芩清其热,芍药、甘草护其阴,桔梗能升能降,可导可宣,使内外不留余蕴耳。用姜、枣者,亦不过借其和营卫,致津液,通表里,而邪去正安也。④《方剂学》:方用葛根、柴胡解肌退热为主药;羌活、白芷解表邪,并宣痹痛,黄芩、石膏清泄里热,四药均以为辅;白芍、甘草酸甘化阴,和营泄热,桔梗宣利肺气,以助疏泄邪气,生姜、大枣调和营卫,并以和中,五药均以为佐;甘草又兼调和诸药,是以为使。诸药寒温并用,辛凉为主,共成辛凉解肌、兼清里热之功。

【临床举例】①阳明伏暑 《徐渡渔医案》:阳明伏暑,经府交病,表热里泄,脉弦细数,五日。予柴葛解肌汤。②沙门氏菌属感染 《云南中医杂志》(1984;4:28):乔某,男,7个月。发热咳嗽,喉中痰鸣,咽赤,全身灼热,体温 $39^{\circ}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。白细胞 $9700/\text{mm}^3$,分叶核45%,淋巴42%,嗜酸性0。西医诊断为沙门氏菌属感染,诸抗菌素用后症不减。精神不

振,面赤气粗,烦躁不宁,咳嗽痰鸣,身灼无汗,口干咽赤,时而呕逆,小便短少。舌红苔腻,指纹紫黑。投本方两剂,加生姜一小片。当晚体温降至 37.5°C ,其它症状缓减,二剂后体温正常,诸症消失,仅见精神欠佳,口唇干燥。投益气养阴之剂调理之。两剂后愈。③外感热病 《湖北中医杂志》(1983;2:25):万某某,男,发热、微恶风寒4天,伴头痛流涕,周身关节酸痛,曾用抗生素,退热镇痛剂治疗无效。诊见体温 38.4°C ,大汗出,咳嗽,咯痰白色,口渴欲饮,苔淡黄舌干,脉浮数。胸透提示Ⅱ型肺结核(增殖期)。时值炎夏,病由外感温热时邪所致,治宜清热解肌。拟柴葛解肌汤化裁:粉葛、柴胡、二花、石膏各30克,羌活、白芍、黄芩各18克,前胡、桔梗各15克,白芷12克,进一剂,诸证平息。④小儿上呼吸道感染高热 《新中医》(1986;9:29):夏某某,男,9岁,1984年7月16日就诊。发热7天,初起微恶风寒,继则发热渐增,汗出不解,体温 $39\sim 40.5^{\circ}\text{C}$,头痛神烦,鼻干口渴,舌红少津,苔薄黄,脉浮洪数。白细胞 $7600/\text{mm}^3$,中性65%淋巴35%,肺部X线检查未见异常,肥达氏反应结果正常。诊断为病毒性上感,静滴红霉素、氢化考的松等药,体温不降。辨证为寒郁化热,内传阳明,故从阳明经治,用柴葛解肌汤加减:柴胡、黄芩、知母各10克,葛根12克,生石膏50克,羌活、白芷各7.5克,薄荷、甘草各5克。连服两剂,体温平复,诸症悉除。

69496 柴葛解肌汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】柴胡 干葛 黄芩 桂枝 赤芍 人参 甘草 竹叶七皮

【用法】加生姜、大枣为引。

【功用】疏风解肌退热。

【主治】小儿解脱受风,而致伤风发热,其症汗出,身热,呵欠,目赤涩,多睡,恶风,喘急。

【备考】热退之时,再服凉惊丸,以防内热。

69497 柴葛解肌汤

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 葛根 白芍

【用法】水煎服。

【主治】伤寒瘟疫七日之时。

69498 柴葛解肌汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】羌活 干葛 柴胡 川芎 半夏 枳壳 桔梗 厚朴 山楂 黄芩 山梔 甘草

【主治】伤于酒，湿热在经，闭塞本身元气，恶寒发热，身首俱痛。

69499 柴葛解肌汤

【方源】《医学心得》卷二。

【组成】柴胡一钱二分 葛根一钱五分 赤芍一钱 甘草五分 黄芩一钱五分 知母一钱 贝母一钱 生地二钱 丹皮一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】春温夏热之病，其症发热头痛，与正伤寒同，但不恶寒而口渴。

【加减】心烦，加淡竹叶十片；谵语，加石膏三钱。

【现代研究】解热作用 《中西医结合杂志》(1985;6:378):实验表明，本方有显著的解热效果，对于内毒素所致家兔发热，给药后4小时，对照家兔仍处明显发热状态，体温无下降趋势，但给予柴葛解肌汤的家兔，体温下降0.9℃。

69500 柴葛鳖甲汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷九。

【组成】柴胡二钱 青蒿一钱半 生鳖甲三钱 黄芩二钱 白芍三钱 丹皮三钱 鲜生地四钱 麦冬二钱 梔子二钱 生甘草一钱

【用法】水五杯，煎二杯，分两次服。

【主治】妇人病温，经水适来或适断，热入血室，耳聋口苦，昼则脉静身凉，夜则发热脉数。

【加减】渴，加花粉；胸胁痞满而痛，加枳

实、栝楼仁、牡蛎各三钱。

69501 柴磁地黄丸

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《饲鹤亭集方》“耳聋左慈丸”之异名。见该条。

69502 柴芍六君子汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】人参 白术(土炒) 茯苓 陈皮 半夏(姜制) 甘草(炙) 柴胡 白芍(炒) 钩藤钩

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】慢惊。脾虚肝旺，风痰盛者。

【临证举例】①眼睑跳动 《湖南中医学院学报》(1989;4:209):瞿某，男，8岁。双目上眼睑不自主跳动，时作眨眼状，历时3个月。发作较剧时1分钟达20余次，父母劝阻不能罢，打骂不能止，苦于不能自制。伴见色萎形瘦，纳差，神疲懒动，咳嗽吐痰，舌淡红，苔白微腻，脉虚。证属土虚木贼，肝风内动之候。治当健脾化痰，柔肝止风。予柴芍六君子汤加天麻6克，僵蚕5克。服药2剂，眼睑跳动即现好转，精神稍佳，仍纳差，守原方加鸡内金6克，又4剂。服后精神振，胃纳增，眼睑跳动恢复正常。②慢惊风 《湖南中医学院学报》(1989;4:209):欧某，女，18个月。阵发性抽搐2月余。始则10日半月一次，最近日发2~3次，多方诊治，疗效不好。惊风发作则手呈鸡爪，目上视，面呈青色，不省人事。须臾自止。症见面色苍白，头发稀疏而直立，纳呆，舌淡，指纹浅红。证属脾虚血少，木失滋荣，肝风内动。方以柴芍六君子汤加僵蚕3克，天麻6克，全蝎2克。服上方2剂惊风止，4剂胃纳增，后去虫药，守原方复进3剂，追访至年底，惊风未再发，神态颇佳。

69503 柴芍六君子汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】六君加柴胡 芍药 葛根

【功用】健脾退热。

【主治】小儿表热，退后又热。

69504 柴胡五味子汤

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【组成】小柴胡汤加五味子

【主治】小儿麻疹喘嗽。

69505 柴胡六君子汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱五分 半夏一钱 茯苓一钱 甘草三分 人参八分 白术一钱 陈皮一钱半 枳壳(炒)一钱

【用法】上咬咀。水二钟，加生姜三片，煎一钟，食后服。

【主治】伤寒热解，平复后，或劳碌过食，复作大热。

【加减】头痛，加川芎一钱；口渴，加干葛一钱。

69506 柴胡加大黄汤

【方源】《袖珍小儿》卷二。

【异名】柴胡饮子(《伤寒大白》卷二)。

【组成】柴胡一两 黄芩 人参 半夏 甘草各一钱 生姜三钱半 大黄(量虚实加之)

【用法】上锉散。每服三字，加枣子，水煎服。

【主治】小儿惊风，痰热。

69507 柴胡加芒消汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两(炙) 生姜一两(切) 半夏二十铢(本云，五枚，洗) 大枣四枚(擘) 芒消二两

【用法】上以水四升，煮取二升，去滓，纳芒消，更煮微沸，分温再服，不解更作。

【主治】①《伤寒论》：伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，医以丸药下之而反利。②《张氏医通》：少阳过经不解。

【方论选录】①《医方集解》：此少阳、阳明药也。表证误下，邪热乘虚入胃，以致下利而满呕，潮热之证犹在，故仍与柴胡汤以解少阳，加芒消以荡胃热，亦与大柴胡两解同意。

②《古方选注》：芒消治久热胃闭，少阳热已入胃而犹潮热、胁满者，则热在胃而证未离少阳，治亦仍用柴胡，但加芒消以涤胃热，仍从少阳之枢外出，使其中外荡涤无遗，乃为合法。

【临证举例】①热入血室 《伤寒论方医案选编》：郑某某，女，29岁，工人。患者月经来潮忽然中止，初起发热恶寒，继即寒热往来，傍晚发热更甚，并自言乱语，天亮时出汗，汗后热退，又复恶寒。口苦咽干，目眩目赤，胸胁苦满，心烦喜呕，不欲饮食，神倦，9天不大便。查询病史：结婚多年，未曾生育。月经不正常，一般3~4个月来潮一次，经期甚短，量少，继即恶寒发热，虽服药未能根治。舌苔白，脉弦数。予柴胡加芒消汤煎服，当日上午10时服药，下午4时许通下燥屎，所有症状解除，嘱常服当归流浸膏，月经恢复正常。至今4年未见复发，并生育2个女孩。②潮热腑实 《伤寒论方运用法》：患者女性，49岁。1961年8月6日初诊。发热十余日，经芳香清解，渗利导滞而寒热不退，入晚热高，微汗，连日来体温升降于37.8~38.8℃之间。不恶寒而恶热，头重目眩，四肢酸重，口苦，咽干，唇燥，面垢，喜饮而饮不多，不欲进食，胸闷，时作叹息，大便干燥难解，小便短少，腹胀满不舒，舌燥苔黄，脉弦而迟。病处少阳阳明两经之间，迭经汗下，中气嫌虚，拟小柴胡汤轻剂，加知母、芒消(冲服)泄热去实，服一剂。8月7日二诊，昨夜解燥屎二三枚，腹满减，胸腹较舒。今晨体温37.3℃，舌略润，苔薄黄，脉仍弦迟。续前法，原方加减共服四剂，热退净，调理而愈。

69508 柴胡加防风汤

《医学纲目》卷十一。为《此事难知》“小柴胡加防风汤”之异名。见该条。

69509 柴胡加细辛汤

【方源】《痰疟论疏》。

【组成】柴胡(去头芦，削去黄薄皮少许，拭净，锉碎)一两 黄芩(取中空者，用流

水润透，蒸半炷香，晒干，锉碎）七钱 人参（饭上蒸熟）三钱 甘草（去头尾，酒润，炙令黄色，锉碎）四钱 生姜（切）六钱 半夏一合（用白芥子末半合、酃醕二合搅浊令匀，投半夏洗数次，再以水漂晒干，锉碎）大枣（劈）四枚 细辛（取北地一根，只一叶，茎柔根细，端直而长，色紫味辛，嚼之细细如椒者始真，修事拣去双叶者，切去头上子，以瓜水浸一宿，晒干，锉碎）三钱

【用法】以水三升，煮取二升，去滓；纳细辛，再煎取一升半，去滓，分温三服，未发、已发、发后各一服。

【主治】少阴痙疟。

69510 柴胡加桂枝汤

《医学纲目》卷三十。为《伤寒论》“柴胡桂枝汤”之异名。见该条。

69511 柴胡地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】柴胡（去苗） 地骨皮 赤茯苓（去黑皮） 芎蒭 大黄 葛根（锉） 芍药 茵陈蒿 甘草（炙） 当归（切，焙） 升麻各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食后、临卧服。

【主治】膈痰结实，气不升降。

【加减】心躁，加麦门冬一倍。

69512 柴胡地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】柴胡（去苗） 地骨皮 桔梗（炒）各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一小盞，煎至五分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】小儿潮热，饮食不为肌肉，黄瘁，夜卧不安，时有虚汗。

69513 柴胡地骨皮汤

《宣明论》卷一。为《圣济总录》卷一一七“柴胡汤”之异名。见该条。

69514 柴胡地骨皮散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 地骨皮 知母 甘草 紫

苏 广皮 干葛

【主治】气分感热劳伤，内热躁闷，喘咳气逆，唇焦口渴，小便赤涩，右脉浮数者。

69515 柴胡地骨皮散

《外科集腋》卷三。为《圣济总录》卷一一七“柴胡汤”之异名。见该条。

69516 柴胡麦门冬汤

《普济方》卷四〇四。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

69517 柴胡麦门冬散

《小儿痘疹方论》。为《圣惠》卷八十二“柴胡散”之异名。见该条。

69518 柴胡梔子豉汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡三钱 半夏一钱五分 黄芩二钱 人参八分 甘草三分 梔子一钱半 豆豉一大合

【用法】上咬咀。水二钟，加生姜三片，煎一钟服，不拘时候。

【主治】伤寒热退身凉，因过食复发热，烦躁口干，胸膈满闷，夜卧不宁。

69519 柴胡栝楼根汤

《御药院方》卷二。为《外台》卷五引《伤寒论》“小柴胡去半夏加栝楼汤”之异名。见该条。

69520 柴胡桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】柴胡（去苗） 桑根白皮 天雄（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头） 枳壳（去瓢，麸炒） 大腹（连皮，锉）各一两半 黄连（去须） 当归（切，焙） 麻黄（去根节） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一两 白梅（拍碎）四枚 黄芩（去黑心） 旋覆花（微炒）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服。

【主治】咳嗽，上气促急，心躁寒热，四肢烦疼，夜间甚者。

69521 柴胡羚羊角散

《杏苑》卷五。为《济生》卷五“羚羊角散”之异名。见该条。

69522 柴胡黍粘子汤

《疡科选粹》卷二。即《兰室秘藏》卷下“黄耆肉桂柴胡酒煎汤”。见该条。

69523 柴苓桔梗芍药汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【组成】柴胡三钱 黄芩一钱 半夏二钱 甘草一钱（生） 生姜二钱 大枣三枚 桔梗根三钱 芍药三钱

【用法】流水煎半杯，热服。

【主治】少阳疹病，目眩耳聋，口苦咽干，胸痛胁痞。

69524 柴胡二桂枝一汤

【方源】《吴鞠通医案》。

【组成】柴胡六钱 焦白芍二钱 青蒿二钱 桂枝三钱 藿香梗三钱 生姜三钱 半夏六钱 广橘皮三钱 大枣（去核）二枚 黄芩二钱 炙甘草一钱

【用法】煮三杯，分三次服。

【主治】中焦虚寒泄泻，六脉俱弦。

【临证举例】泄泻 丙寅六月初六日，某，其人本有饮咳，又加内暑外凉，在经之邪倾疟而未成，在腑之邪泄泻未止，恐成滞下，急以提邪外出为要；按六脉俱弦之泄泻，古谓之木泄，即以小柴胡汤为主方，况加之寒热往来乎？六脉俱弦，故谓脉双弦者寒也，指中焦虚寒而言，岂补水之生熟地所可用哉！现在寒水客气燥金司天，而又大暑节气，与柴胡二桂枝一汤。

69525 柴胡六味地黄汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】熟地五钱 淮山二钱 柴胡 萸肉 茯苓 丹皮各一钱五分 泽泻（盐水炒）一钱

【主治】久疟热未退，口干唇焦。

69526 柴胡去芩加芍汤

《医级》卷七。为《鸡峰》卷五“柴胡芍药汤”之异名。见该条。

69527 柴胡龙骨牡蛎汤

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》“柴胡加龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

69528 柴胡瓜蒌干姜汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 甘草二钱 人参一钱 生姜三钱 大枣三枚 干姜三钱 瓜蒌三钱

【用法】水煎大半杯，热服。覆衣。

【主治】寒疟。

【加减】呕，加半夏。

69529 柴胡加山栀子汤

【方源】《伤寒广要》卷八。

【组成】小柴胡汤加山栀子 茵陈蒿

【主治】发黄，脉弦数，口苦胸满，心烦发热，或往来寒热，日晡小有潮热，或耳聋胁痛。

69530 柴胡芍药丹皮汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】黄芩三钱（酒炒） 柴胡一钱 白芍药三钱 甘草二钱 丹皮三钱

【用法】煎半杯，热服。

【主治】眼病疼痛。

69531 柴胡芍药茯苓汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】芍药三钱 柴胡二钱 茯苓三钱 半夏三钱 甘草二钱 桔梗三钱

【用法】煎半杯，热服。

【主治】耳内热肿疼痛。

【加减】热盛，加黄芩；脓成，加丹皮、桃仁。

69532 柴胡茵陈五苓散

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】五苓散一两 茵陈半两 车前子一钱 木通 柴胡各一钱半

【用法】上分二服。用水一钟半，灯草五十茎煎服，连进数服。小便清利而愈。

【主治】伤寒温湿热病，汗下太早，湿热未除，以致遍身发黄，小便赤黑，烦渴发热。

【加减】酒后，加干葛二钱。

69533 柴胡桂枝干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】柴胡桂姜汤（《金匱》卷上附方引《外台》）、姜桂汤（《全生指迷方》卷二）、桂姜汤（《三因》卷六）、姜桂饮子（《普济方》卷一九七）、柴胡姜桂汤（《玉机微义》卷九）、柴胡桂枝汤（《伤寒全生集》卷三）、柴桂干姜汤（《医原》卷下）。

【组成】柴胡半斤 桂枝三两（去皮） 干姜二两 栝楼根四两 黄芩三两 牡蛎二两（熬） 甘草二两（炙）

【用法】以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，每日三次。初服微烦，复服汗出便愈。

【功用】《经方研究》：和解少阳，兼化痰饮。

【主治】伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胸胁满微结，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，及牡疟、劳疟、疟久不愈者。现用于肝炎、窦性心动过速、冠心病心动过缓、月经不调、乳腺囊性增生。

①《伤寒论》：伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者。②《外台》：伤寒四五日，身热恶风颈项强，胁下满，手足温而渴者。③《金匱》附方引《外台》：疟寒多微有热，或但寒不热。④《三因》：牡疟。⑤《普济方》：劳疟，及疟久不愈者。⑥《家塾方与方极》：小柴胡汤证而不呕、不痞，上冲而渴，腹中有动者。

【宜忌】《外台》引《伤寒论》：忌生葱、海藻、菘菜。

【方论选录】①《伤寒明理论》：《内经》曰：热淫于内，以苦发之。柴胡、黄芩之苦，以解传里之邪；辛甘发散为阳，桂枝、甘草之辛甘，以散在表之邪；咸以软之，牡蛎之咸，以消胸胁之满；辛以润之，干姜之辛，以固阳虚之汗；津液不足而为渴，苦以坚之，栝楼之苦以生津液。②《古方选注》：以桂枝行太阳未罢之邪，重用柴胡、黄芩转少阳之枢，佐以干姜、甘草，开阳明之结，使以花粉，佐牡蛎深入少阴，引液上升，救三阳之热。不必治厥阴，而三阳结

邪，一一皆从本经而解矣。用柴胡和少阳之阳，即用黄芩和里；用桂枝和太阳之阳，即用牡蛎和里；用干姜和阳明之阳，即用天花粉和里；使以甘草，调和阴阳，其分两阳分独重柴胡者，以正疟不离手少阳也；阴药独重于花粉者，阴亏之疟，以救液为急务也。③《金鉴》：少阳表里未解，故以柴胡桂枝合剂而主之，即小柴胡汤之变法也。去人参者，因其正气不虚；减半夏者，以其不呕，恐助燥也。加栝楼根，以其能止渴兼生津液也；倍柴胡加桂枝，以主少阳之表；加牡蛎，以软少阳之结。干姜佐桂枝，以散往来之寒；黄芩佐柴胡，以除往来之热，且可制干姜不益心烦也。诸药寒温不一，必需甘草以和之。初服微烦，药力未及；复服汗出即愈者，可知此证非汗出不解也。④《寒温条辨》：柴胡除少阳之寒热，桂枝解太阳之余邪，花粉彻阳明之渴热，干姜去胸胁之烦满，甘草调汗下之误伤，此少阳阳明两解之治法也。⑤《金匱玉函经二注》：用柴胡为君，发其郁伏之阳；佐以桂枝、干姜，散其肌表之痹；栝楼根、牡蛎为臣，除留热、消瘀血；佐以黄芩助柴胡，治半表半里；甘草以和诸药、调阴阳也。得汗则痹邪散，血热行而病愈耳。⑥《中国医学大辞典》：柴胡、桂枝、黄芩，并转少阳之枢，而达太阳之气；牡蛎则启厥阴之气，以解胸胁之结；栝楼根引水液上升，而止烦渴；汗下后，中气必虚，故用甘草理中。

【临证举例】①郁冒 《成绩录》：一农夫，年三十余，去年起，郁冒时发，有时稍吐血，盗汗，往来寒热，微渴而脐旁动悸，予本方治之而愈。②肝炎 《刘渡舟医案》：刘某某，男，54岁。患肝炎而腹胀作泻，不欲饮食，胁痛及背。服药无数，效果不显。某君请余为治。脉弦而缓，舌淡苔白，此乃肝病及脾，脾阳先衰之象。为疏柴胡桂枝干姜汤：柴胡 12 克，黄芩 4.5 克，炙甘草 9 克，干姜 9 克，花粉 12 克，牡蛎 12 克。凡四服而腹胀与泻俱止，饮食较前为多，精神亦有好转。后以肝脾共调，佐以健脾利湿之品，肝功化验日趋正常而愈。③窦性心

动过速 《北京中医》(1988;3:19):康某,男,20岁。半年来胸闷心悸不止,形瘦颧红,左乳下其动应衣,每入夜则身冷寒战,至后半夜身热汗出而解,昼日无寒热,脘痞纳呆,口干唇燥,舌质红,舌体略胖,苔薄白,脉弦细疾数。心电图示:窦性心动过速,心率110次/分。予柴胡桂枝干姜汤加龙骨30克,五味子10克。服药三剂后心悸大减,寒热止,纳增,脉转和缓(90次/分)。上方剂量减半,再予三剂而愈。④冠心病心动过缓 《北京中医》(1988;3:19):赵某,女,60岁。三年前确诊为冠心病,现心中空虚怔忡,稍动作即心中惶惶大动,不能下地行走,已1月有余,曾服消心痛、活心丹等中西药不效。心电图:心率50次/分,ST段Ⅱ、V₃下移0.05。伴头昏身热,微恶寒,时自汗出,口干苦不欲饮,纳食尚好,神情郁闷,大便时溏时结。体丰,舌略红略胖,苔薄白微黄,脉迟缓。投柴胡桂姜汤加五味子6克,3剂,水煎服。药尽诸症均减,已下地活动,脉和缓(60~70次/分)。上方去五味子,加川贝10克,炒麦芽15克,继服3剂,追访至今未再发。⑤月经不调 《古方便览》:一妇人,平素月经不调,其气上冲,两胁急缩,腰痛不可忍,经行之时,脐下疼痛,下如豆汁,一日或半日即止,已十余年。诊之,胸胁苦满,脐上动悸甚,予本方,服之数月,前证得愈。⑥乳腺囊性增生症 《新医药学杂志》(1979;1:33):王某,女,39岁。左乳房外上方有一肿块,如核桃大,肿块近处,有黄豆大数粒小肿块,右乳房中上方稍偏外侧,有一肿块如大枣状,触之有痛感,质坚硬,推之可移,边界不清,而两腋下淋巴结不肿大,诊断为乳癖(乳腺囊性增生症),给以本方,服二十剂后,两侧乳房肿块全消,自觉症状消失而痊愈。三年后随访,未见复发。

【现代研究】①对内分泌腺的影响 《药理学杂志》(1980;6:602、607):实验研究证实,本方及单味柴胡可使肾上腺与胸腺等脏器发生重量变化,特别是柴胡的有效成分柴胡皂甙

可使肾上腺肥大,造成胸腺萎缩,柴胡皂甙d的作用最显著。②保肝作用 《药理学杂志》(1984;7:798):实验性肝损害证实,当腹腔注射D-半乳糖胺后,分别给与本方和小柴胡汤等柴胡方剂,能抑制血清转氨酶(GPT、GOT)上升(抑制率60%)。③抗癫痫作用 《生药理学杂志》(1978;4:273):本方加芍药的溶液对软体动物(蜗牛)的神经节细胞有抑制作用,实验表明有抗戊四氮(PTZ)作用,方中芍药、生姜、桂枝有与本方加芍药相同的抗PTZ作用。对小鼠听源性惊厥呈有意义的抑制,证实了在临床上抗癫痫的疗效。

【备考】本方方名,《外台》引作“小柴胡汤”、“小柴胡桂姜汤”。

69534 柴胡桂枝干姜汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】柴胡 桂枝 黄芩 广皮 甘草 人参 芍药 干姜 半夏

【主治】太阳中风,兼少阳寒热;少阳症兼见太阳,小便不利。

69535 柴胡桂枝干姜汤

【方源】《四圣心源》卷七。

【组成】柴胡三钱 甘草二钱 人参一钱 茯苓三钱 桂枝三钱 干姜三钱

【用法】煎大半杯,热服,覆衣。

【主治】牡疟。寒多热少,或但寒不热。

69536 柴胡桂枝鳖甲汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】柴胡三钱 鳖甲三钱(醋炙) 甘草二钱 桂枝三钱 半夏三钱 芍药三钱 茯苓三钱

【用法】煎大半杯,温服。

【主治】胃胆上逆,痛在心胸。

【加减】胃寒,加干姜、川椒、附子。

69537 柴胡桂姜半夏汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 干姜三钱 桂枝二钱 甘草二钱 牡蛎二钱 瓜蒌三钱 半夏三钱 生姜三钱

【用法】流水煎大半杯，温服。

【主治】寒疫。少阳经传太阴脏，胸胁痞满，呕吐。

69538 柴胡加龙骨牡蛎汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】柴胡龙骨牡蛎汤(《伤寒总病论》卷三)。

【组成】柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜(切) 铅丹 人参 桂枝(去皮) 茯苓各一两半 半夏二合半(洗) 大黄二两 牡蛎一两半(熬) 大枣六枚(擘)

【用法】以水八升，煮取四升，纳大黄，切如棋子，更煮一两沸，去滓，温服一升。

【功用】①《杂病广要》：下肝胆之惊痰。②《经方研究》：疏解泄热，重镇安神。

【主治】①《伤寒论》：伤寒八九日，下之，胸满，烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者。②《杂病广要》：癫痫。

【方论选录】①《内台方义》：用柴胡为君，以通表里之邪而除胸满，以人参、半夏为臣辅之，加生姜、大枣而通其津液；加龙骨、牡蛎、铅丹，收敛神气而镇惊为佐，加茯苓以利小便而行津液；加大黄以逐胃热、止谵语；加桂枝以行阳气而解身重错杂之邪，共为使。以此十一味之剂，共救伤寒坏逆之法也。②《伤寒来苏集》：取柴胡之半，以除胸满心烦之半里；加铅丹、龙、牡，以镇心惊，茯苓以利小便，大黄以止谵语；桂枝者，甘草之误也，身无热无表证，不得用桂枝，去甘草则不成和剂矣；心烦谵语而不去人参者，以惊故也。③《医方集解》：柴胡汤以除烦满，加茯苓、龙骨、牡蛎、铅丹，收敛神气而镇惊；而茯苓、牡蛎又能行津液、利小便，加大黄以逐胃热、止谵语；加桂枝以行阳气，合柴胡以散表邪而解身重，因满故去甘草。④《古方选注》：柴胡引阳药升阳，大黄就阴药就阴，人参、炙草助阳明之神明，即所以益心虚也；茯苓、半夏、生姜启少阳三焦之枢机，即所以通心机也；龙骨、牡蛎入阴摄神，镇东方甲木之魂，即所以镇心惊也；龙、牡

顽钝之质，佐桂枝即灵；邪入烦惊，痰气固结于阴分，用铅丹即坠。至于心经浮越之邪，借少阳枢转出于太阳，即从兹收安内攘外之功矣。

【临证举例】①癫痫 《刘渡舟医案》：尹某，男，34岁。胸胁发满，夜睡呓语不休，且乱梦纷纭，时发惊怖，精神不安，自汗出，大便不爽。既往有癫痫史，此病得之于惊吓之余。视其人神情呆滞，面色发青，舌红而苔白黄相兼，脉来沉弦。辨为肝胆气郁，兼阳明腑热，而心神被扰，不得潜敛之证。治宜疏肝泻胃，镇惊安神。予本方一剂，大便通畅，胸胁满与呓语皆除，精神安定，不复梦扰，唯欲吐不吐，胃中似嘈不适，上方加竹茹、陈皮，服之而愈。②恚怒卒倒 《生生堂治验》：一妇岁五十余，恚怒即少腹有物上冲，心绝倒，牙关紧闭，半许时自省，月一发，或二发，先生诊之，胸腹动悸，与柴胡加龙骨牡蛎汤数旬愈。③痰饮 《王旭高医案》：心境沉闷，意愿不遂，近因患疟，多饮烧酒，酒酣之后，如醉如狂，语言妄乱，及今二日。诊脉小弦滑沉，舌苔薄白，小水短赤，大便不通，渴欲饮冷，昏昏默默，不知病之所在，因思疟必有痰，酒能助火，痰火内扰，神明不安，此少阳阳明同病而连及厥阴也。少阳为进出之枢，阳明为藏邪之藪。今邪并阳明，弥漫心包，故发狂而昏昏默默也。仿仲景柴胡加龙牡汤主之：柴胡、黄芩、半夏、茯苓、龙骨、甘草、牡蛎、铅丹、菖蒲、大黄、竹沥、姜汁。④神经官能症 《陕西中医》(1984;12:41)：梁某，女，32岁。2年多来，自觉头晕乏力，夜寐不安，心悸怔忡，胸脘痞闷，胃纳不佳，有时腕痛，大便不实，月经不调，白带多。上述症状每因情志不畅而加重，自疑癌症。查无阳性体征，服中西药不效，苔薄，诊断为肝郁型神经官能症，予本方6剂后，症状明显好转；继服10余剂，除腕部略有不适，余症消失。⑤帕金森氏综合征 《上海中医药杂志》(1986;4:25)：潘某，女，59岁。高血压、动脉硬化史10年。两年前两手颤抖，走路不稳，西

医诊断为帕金森氏综合征。给安坦、莨菪浸膏片、安定等治疗,病情好转。4个月前因精神刺激颤抖加重,继用上药无效。现患者两手呈有节律之细震颤,走路呈慌张病态,头部前倾,摇摆不止。胸部闷胀,烦躁口苦,小便黄赤。舌微红,苔边白中黄,脉弦劲。证属阴虚阳亢,郁怒化火,火盛生风,风火相煽,元神失主,筋脉失约所致。治宜调肝清热,潜阳熄风,镇惊安神。予本方加蜈蚣2条,水煎服。上方服12剂后颤抖明显减轻,继服24剂后颤抖消失,追访两年未复发。⑥舞蹈病 《北京中医学院学报》(1983;4:30):张某,女,12岁。手足乱动、行走不稳、挤眉弄眼等5个多月,伴烦躁易怒,时时叹气,脉弦而细。某医院诊断为舞蹈病。证属邪入少阳,痰湿内郁,风邪外客。拟本方去铅丹、大黄,加白芍6克,生甘草6克,煎服3剂后诸症好转,继服30剂而愈。

【现代研究】①对小鼠自发运动量(SMA)的影响 《湖北中医杂志》(1986;6:48):通过对SMA的观察,能了解对中枢神经系统有作用的药物对行为方面的影响。实验表明,本方对正常状态的小鼠的SMA没有影响,但呈现在兴奋时起抑制作用,在抑制时则起促进性的作用,这一效果具有重要意义,它为本方在临床的辨证应用提供了一个有力的依据。②对儿茶酚胺心血管损伤的保护作用 《广东中医》(1959;12:510):实验表明,本方可有效地保护机体抵抗儿茶酚胺(CA)的心血管损伤作用。③对血小板凝集功能的影响 《黑龙江中医药》(1984;6:30):实验表明,本方对血小板没有直接的凝集作用,但能增强肾上腺素对血小板的凝集作用;这种增强凝集的作用,可被育享宾(α_2 受体拮抗剂)阻断,而不被哌唑嗪(α_1 受体拮抗剂)和乙基马来酰胺阻断。因此,其作用机理之一,可能是对 α_2 -肾上腺素能受体具有激动作用。④对肥大细胞颗粒及组胺释放的作用 《广西中医药》(1985;1:14):shizuo Toda报道,本方

对48/80复合物引起的小鼠腹腔肥大细胞颗粒及组织胺释放作用基本上无抑制作用,这可能是因为本方中龙骨、牡蛎所含有钙盐的关系。

69539 柴胡去半夏加栝楼汤

《金匱》卷上附方。即《外台》卷五引《伤寒论》“小柴胡去半夏加栝楼汤”。见该条。

69540 柴胡加大黄芒消桑螵蛸汤

【方源】《千金翼》卷九。

【组成】柴胡二两十六钱 黄芩 人参 甘草(炙) 生姜各一两(切) 半夏一合(洗) 大枣四枚(擘) 芒消二两

【用法】前七味,以水七升,下芒消三合,大黄四分,桑螵蛸五枚,煮取一升半,去滓,温服五合,微下即愈。

【主治】伤寒不解,胸胁满而呕,日晡所发潮热而微利,服柴胡加芒消汤不解者。

【方论选录】《古方选注》:用柴胡汤,其邪必从少阳而来,热及于阳明者,加芒消;热实于阳明者,加大黄。其邪入阳明,而后可以议下。然里虚之应下者,加芒消当佐人参以安中,若加大黄,当佐桑螵蛸固阴续绝以安下,此少阳而有阳明症者,下之之方也。

紧

69541 紧皮丸

《得效》卷六。为原书同卷“九圣丸”之异名。见该条。

69542 紧皮丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】草澄茄三钱 干漆二钱 枳壳四两 苍术 乌药 香附 三棱 莪术 木香 砂仁 红豆蔻 草果 茯苓各一两

【用法】上为末,醋糊为丸。肿消后即服或千金养脾丸、枳术丸。

【主治】热肿。

69543 紧皮丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】生地黄(炒松)一两 姜半夏一两 车前子一两 台党参三两 姜厚朴一两半

当归身(酒洗)二两 赤茯苓(去皮,忌铁)一两 苍术(米泔浸,炒)二两 神曲(炒)一两 木通一两 猪苓(去皮,忌铁)一两 泽泻一两 青皮(醋炒)一两 破故纸(盐水炒)二两 陈皮一两半 麦芽(炒)一两半 莪术(醋炒)八分

【用法】上为细末,面曲糊为丸,如梧桐子大。每日早服四十丸,午服三十丸,晚服二十丸,白汤送下。

【主治】臌胀。

69544 紧皮散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】白术(炮) 赤茯苓 木香 泽兰 厚朴(姜制) 续断 肉桂 槟榔 陈皮(去白) 麦芽(炒) 神曲 青皮 椒目 木通 扁豆

【用法】上咬咀。每服加生姜、枣子、苏叶同煎,空心温服。

【主治】一切肿,经取已消,脾胃虚弱。

69545 紧皮膏

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】石燕一对(煨末) 石榴皮 五倍子各三钱 黄连 明矾各一钱 刮铜绿五分 真阿胶 鱼胶 水胶各三钱

【用法】上除胶,六味为末,用水三五碗,入大铜杓内文火煎熬,以槐、柳枝不住手搅为浓糊,将成膏,方入冰、麝各三分,研细搅匀,用瓷器内收贮。将新笔涂上下眼皮,每日三五次,干而复涂。毛自出矣,凉天可行此法,三日见效,轻者三十日全出,重者五十日向外矣。

【主治】倒睫拳毛症。

党

69546 党参片

【方源】《中医外科学》。

【组成】党参

【用法】上为末,加适量赋形剂轧片,每片含生药 0.3 克。每次 5 片,每日二至三次。

【功用】补气。

69547 党参膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】党参(去芦)四百八十两 黄耆三百二十两 升麻四十两 桂圆肉八十两 生地一百六十两 熟地一百六十两 当归一百六十两 紫河车十具

【用法】上药酌予切碎,水煎三次,分次过滤,去滓,滤液合并,用文火煎熬,浓缩至膏状,以不渗纸为度,每一两膏汁兑炼蜜一两成膏,装瓶,重二两。每服三至五钱,开水冲服,每日二次。

【功用】大补气血,健脾养胃。

【主治】气血亏虚,脾胃虚弱,肢体痿软,精神疲倦。

69548 党参膏

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】党参九百六十两

【用法】将党参煎汁三次榨净,将各次所煎药汁澄清过滤,蒸发成浓汁,加冰糖二十斤收膏。每次一羹匙,开水化服。

【主治】体倦气怯,食少便溏。

道

69549 道生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】苏梗 枳壳 广皮 砂仁 入参 白术 当归 白芍 甘草 滑石 香附各一钱 葱白五个 黄杨脑七个

【功用】孕妇八、九月服之易产。

69550 逍遥丸

【方源】《幼幼新书》卷十七引《保生信效方》。

【组成】半夏(汤浸,洗七遍,焙)二两 枳实(去瓢,麸炒) 槟榔(锉) 赤茯苓(去粗皮)各一两

【用法】上为细末,生姜自然汁煮面糊为丸,如绿豆大。每服二三十丸,荆芥汤送下;别作小丸与小儿。

【主治】小儿膈实气痞，痰盛喘促。

69551 逍遥丸

《全国中药成药处方集》(北京方)。即《女科切要》卷一“逍遥散”改为丸剂。见该条。

69552 逍遥丸

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】当归二两 赤芍一两六钱 醋柴胡一两六钱 云苓一两 焦术一两二钱 香附五钱 甘草六钱 丹皮一两一钱 山梔一两一钱 薄荷八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，二钱重。每服二钱，白水送下，每日二次。

【功用】调经舒气，强心清热。

【主治】头晕目眩，肢体痠痛，胸腹气滞，两胁疼痛；血虚疲倦，五心烦热，口燥舌干，发热盗汗；月水不匀，脐腹疼痛；室女阴虚骨蒸劳热。

【宜忌】忌食辛辣。身体衰弱者不宜服。

【备考】原书(昆明方)将本方改为散剂，名“逍遥散”。

69553 逍遥丸

《中国药典》。即《局方》卷九“逍遥散”改为丸剂。见该条。

69554 逍遥汤

《圣济总录》卷一六三。为《局方》卷九“逍遥散”之异名。见该条。

69555 逍遥汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】人参三钱 知母二钱 竹青三钱 滑石三钱 生地黄四钱 柴胡八分 犀角五分

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎，临服人烧棍档末一钱半调服。有汗出为效；汗不出再服，以小水利、阴头肿即愈。

【主治】男女劳复阴阳易，伤寒愈后发大热，昏沉错语失神，小腹绞痛，头不能举，足不能移，眼中生花，百节解散，热气冲胸，男子则阴肿入腹刺痛，妇人则里急腰膝重，引腹内痛。

【加减】卵缩腹痛，加黄连一钱、甘草一钱。

69556 逍遥饮

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】柴胡(去苗) 白茯苓(去黑皮) 赤芍药 白术(锉，麸炒) 当归(切，焙) 各二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜一枣大，甘草一寸，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血风血气，烦躁口干，咳嗽，四肢无力，多卧少起，肌骨蒸热，百节疼痛，心热，恍惚忧惧，头目昏重，夜多虚汗。

【备考】本方方名，《普济方》引作“逍遥散”。

69557 逍遥饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二三钱 芍药一钱半 熟地三五钱 枣仁二钱(炒) 茯神一钱半 远志(制)三五分 陈皮八分 炙甘草一钱

【用法】水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】①《景岳全书》：妇人忧思过度，致伤心脾，冲任之源血气日枯，渐至经脉不调。②《叶氏女科》：妇人心脾气虚，胎虚不安。

【加减】气虚，加人参一二钱；经水过期，兼痛滞，加酒炒香附一二钱。

69558 逍遥饮

《竹林女科》卷一。为《女科秘要》卷三“逍遥散”之异名。见该条。

69559 逍遥散

【方源】《准绳·女科》卷二引《神巧万全方》。

【组成】人参 白茯苓(去皮) 柴胡(去苗) 白术(炒) 黄耆各等分

【用法】上为散。每服三钱，加甘草一寸，同煎六分，温服。

【主治】妇人血风劳，五心烦躁，心多怔忡，恍惚忧惧，头目昏重，夜多盗汗。

69560 逍遥散

【方源】《局方》卷九。

【异名】逍遥汤(《圣济总录》卷一六三)。

【组成】甘草(微炙赤)半两 当归(去苗，

铍，微炒） 茯苓（去皮，白者） 芍药（白） 白术 柴胡（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一大盏，加烧生姜一块（切破）、薄荷少许，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【功用】疏肝解郁，养血健脾。

①《内经拾遗》：调荣益卫，止嗽消痰。②《金鉴》：调肝理脾。③《医林纂要》：降火滋阴。④《方剂学》：疏肝解郁，健脾养血。

【主治】肝郁血虚，两胁疼痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，往来寒热；妇人月水不调。

①《局方》：血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧；血热相搏，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟；及室女血弱阴虚，荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。②《圣济总录》：产后亡阴血虚，心烦自汗，精神昏冒，头痛。③《得效》：产后血虚发热，感冒热潮。④《口齿类要》：血虚有热，口舌生疮。⑤《女科撮要》：或因劳疫所伤，或食煎炒，血得热而流于腠中，小便带血。⑥《保婴撮要》：乳母肝脾有热，致小儿痘疮欲靨不靨，欲落不落。⑦《杏苑》：女子月经来少色淡，或闭不行。⑧《疡科选粹》：怒火而致翻花疮。⑨《医宗必读》：血虚小便不禁。⑩《医家心法》：肝胆二经郁火，以致胁痛、头眩，或胃脘当心而痛，或肩背疼痛，或时眼赤痛，连及太阳；六经伤寒阳证；或妇人郁怒伤肝，致血妄行，赤白淫，砂淋、崩浊。⑪《医林纂要》：心肝郁而致肝病，左胁痛，手不可按，左肋见紫色而舌青。⑫《兰台轨范》：肝家血虚火旺，头痛目眩，口苦，倦怠烦渴，抑郁不乐，两肋作痛，小腹重坠。⑬《会约》：伤寒火郁于中，干咳连声而痰不来，或全无痰。⑭《方剂学》：肝郁血虚所致的神疲食少，乳房作胀，舌淡红，脉弦而虚者。

【方论选录】①《医方集解》：肝虚则血病，当归、芍药养血而敛阴；木盛则土衰，甘草、白术和中而补土；柴胡升阳散热，合芍药以平

肝，而使木得条达；茯苓清热利湿，助甘、术以益土，而令心气安宁；生姜暖胃祛痰，调中解郁；薄荷搜肝泻肺，理血消风，疏逆和中，诸证自己，所以有逍遥之名。②《古方选注》：治以柴胡，肝欲散也；佐以甘草、肝苦急也；当归以辛补之；白芍以酸泻之；治以白术、茯苓，脾苦湿也；佐以甘草、脾欲缓，用苦泻之，甘补之也；治以白芍，心苦缓，以酸收之；佐以甘草，心欲软，以甘泻之也；加薄荷、生姜，入煎即滤，统取辛香散郁也。③《医林纂要》：因肝木受郁不得解，以至于生热，而血液枯竭，肝木亦未尝不虚，故既以归、姜补肝，又以术、苓厚培其根，以柴胡、薄荷条达其枝，所谓雷以动之，风以散之；然后泻之以酸，缓之以甘，畅遂肝气之方，莫此为最。④《成方便读》：此方以当归、白芍之养血，以涵其肝；苓、术、甘草之补土，以培其本；柴胡、薄荷、煨生姜俱系辛散气升之物，以顺肝之性，而使之不郁。⑤《方剂学》：方用柴胡疏肝解郁，当归、白芍养血补肝，三药配合，补肝体而助肝用为主；配伍入脾之茯苓、白术为辅，以达补中理脾之用；加入少许薄荷、生姜为佐，助本方之疏散条达；炙甘草为使者，助健脾并调和诸药。诸药合用，使肝郁得解，血虚得养，脾虚得补，则诸症自愈。

【临证举例】①伤寒 《马元仪医案》：恶寒发热，倦怠懒言，神气怯弱，两脉虚弦，此甲木内郁，生气不荣，阳明受病也。是皆木郁土衰之故，木气既郁，惟和风可以达之，阴雨可以滋之，逍遥散。②肝郁内热 《南雅堂医案》：肝郁木不条达，致成内热，拟用逍遥散加减法：柴胡一钱五分，当归身二钱，炒白芍二钱，白茯苓三钱，广郁金一钱，甘草七分，薄荷五分，生姜一片。③呕吐 《南雅堂医案》：呕吐时作时止，每吐必尽倾而出，症系肝郁所致，法宜开郁平肝，庶木气条达，则其患自平。仿逍遥散法：柴胡一钱，白芍药三钱，白术三钱，当归身二钱，白茯苓三钱，陈皮八分，甘草五分，生姜两片。④月经不调 《南雅堂医案》：

经水不调,咳嗽,潮热往来,骨蒸劳热,口干,大小便不爽,血虚肝燥使然,拟用逍遥散。⑤血风疮 《外科发挥》:一妇人患此作痒,五心烦热,以逍遥散数剂而止。⑥牙痛 《校注妇人良方》:一妇人发热齿痛,日晡益甚,月水不调,此脾经血虚,用逍遥散加升麻寻愈。后因怒复痛,仍以前药加川芎而痊。

【现代研究】①对中枢神经系统的影响 The KAMPO, (1983; 2: 13): 实验表明,逍遥散能增强硫酸妥钠、戊巴比妥钠等对小鼠的麻醉作用,延长其麻醉时间,增强麻醉效果,具有显著的镇静作用;对戊四氮所致小鼠惊厥有明显保护作用,能降低死亡率,减轻惊厥程度,具有一定的抗惊作用。醋酸扭体法实验表明,本方能显著减少小鼠扭体次数,具有明显的镇痛作用。②对性腺功能的影响 The KAMPO, (1983; 12: 13): 实验表明,本方具有温和的雌激素样活性,此作用是通过卵巢实现的。③保护肝脏作用 《山西医药杂志》, (1976; 2: 71): 实验表明,本方能使血清谷丙转氨酶活力下降,肝细胞变性坏死减轻,并可使肝细胞内糖元与核糖核酸含量趋于正常,方中以茯苓、当归的作用最为显著。

【备考】将本方改为丸剂,名“逍遥丸”(见《中国药典》)。

69561 逍遥散

【方源】《女科万金方》。

【组成】麦门冬二钱五分 当归四钱 白芍四钱 柴胡四钱 黄芩 川芎 熟地各三钱 半夏二钱五分 甘草一钱五分

【用法】分四帖。每帖加生姜三片,水二钟,煎八分,空心服。

【功用】补血,扶脾胃,调经水。

【主治】室女十七八岁时脾胃虚弱,误食生冷,经脉不通,或阻百日,或半年,颜色有异,饮食少进,寒热往来,四肢困倦,头疼目眩,腹疼恶心,烦热呕吐,腹胀。

【加减】呕吐,加白术、砂仁、香附各三钱;

咳嗽气急,加五味子、苏叶、桔梗各二钱。

69562 逍遥散

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 白芍 干葛各二钱 生地 川芎 黄芩各一钱五分 人参 麦冬各九分 柴胡一钱 乌梅肉三个

【用法】分二帖。水煎服。

【主治】妇人胎产因食姜、蒜、胡椒热物过多,血热积于脾胃,气攻上焦,产后发汗,口干作渴,唇裂生疮。

69563 逍遥散

【方源】《女科万金方》。

【组成】白芍 白术 白茯苓 归身 甘草 薄荷

【用法】加煨姜二片,水煎服。

【主治】妇人血少,月水不调,腹痛潮热。

69564 逍遥散

《普济方》卷三一七。即《圣济总录》卷一五〇“逍遥饮”。见该条。

69565 逍遥散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】人参 知母 竹青 黄连 甘草 滑石 生地黄 韭根 柴胡 犀角

【用法】水二钟,加大枣二枚、生姜三片,水煎服;捶法临服入烧裯裆末一钱半调服。有粘汗出为效;不粘汗出再服,以小水利、阴头肿即愈。

【主治】伤寒愈后劳复,阴阳易。

【加减】卵缩腹痛,倍加黄连。

【备考】《伤寒六书纂要辨疑》本方用量:人参、知母、地黄、柴胡各一钱,甘草、韭根各三分,黄连五分,活石一钱五分;犀角、竹青用量原缺。

69566 逍遥散

【方源】《医统》卷八十四。

【异名】柴胡四物汤。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 人参 半夏(制) 柴胡 黄芩 陈皮 麦门冬 甘草各等分

【用法】水二盏,加生姜三片,煎八分,空

心服。

【主治】脾胃虚弱，经脉不通，或寒或热，不喜饮食，饱胀呕吐，烦躁。

【加减】呕吐，不能食，加砂仁、白术；少睡，加酸枣仁；咳嗽，加杏仁、五味子；腹痛，加玄胡索。

69567 逍遥散

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】地骨皮 甘草 黄芩 川芎各三钱 北柴胡五钱 香附三钱

【用法】加竹叶十片，水煎，空心服。

【主治】日夜虚热，脉微细。

69568 逍遥散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）一钱五分 白芍（酒炒）一钱 柴胡一钱 黄芩一钱 川芎七分 熟地黄七分 半夏（姜炒）七分 人参五分 麦门冬（去心）五分 甘草四分

【用法】上锉散。加生姜三片，水煎，热服。

【功用】和气血，扶脾胃。

【主治】室女十七八岁，脾胃受伤，气血俱弱，误食生冷，经脉不通，或百日或半年，颜色青黄，饮食少进，寒热往来，四肢困倦，头疼目眩，肚疼结块，五心烦热，呕吐膨胀。

【加减】少睡，加酸枣仁（炒）以敛心血。

【备考】原书治上症，先用本方，次服加味八物汤，后服调经丸。

69569 逍遥散

【方源】《医贯》卷六。

【组成】柴胡一钱 芍药一钱 陈皮一钱 牡丹皮一钱 茯苓一钱 当归一钱 白术一钱 贝母一钱 薄荷七分 黄连五分（每一两用吴茱萸二钱，水拌炒焦色，合用）

【主治】郁症。

69570 逍遥散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】当归 白芍 茯苓 白术 柴胡各一钱 香附八分 丹皮七分 甘草六分 薄荷 黄芩（有热加）各五分

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【功用】①《金鉴》：和气血，开郁行滞，散结。②《许订外科正宗》：疏肝。

【主治】①《外科正宗》：妇人血虚，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忡颊赤，口燥咽干，发热盗汗，食少嗜卧；血热相搏，月水不调，脐腹作痛，寒热如疟；及室女血弱，荣卫不调，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。②《金鉴》：气郁痰热凝结而成上搭手。

【加减】有寒，加生姜三片、大枣二枚。

【备考】方中丹皮，《金鉴》作“陈皮”。

69571 逍遥散

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术二钱 白芍五钱 当归三钱 柴胡二钱 陈皮一钱 半夏一钱 鳖甲三钱 甘草五分 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【功用】开郁平肝。

【主治】正值饮食之时，忽遇可惊之事，惊气未收，遂停滞不化，久成癥瘕。

69572 逍遥散

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】软柴胡五分 白芍药一钱半（酒炒） 冬白术一钱半（炒） 当归身二钱 白茯苓二钱（去木） 粉甘草五分 钩藤钩五钱 忍冬藤三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】肝脾两虚，寒熟食少，营气虚而癥瘕；女子经闭潮热，男子阴虚木旺，脉弦虚数。

【加减】阴虚血少，加生地；血虚火旺，加梔、丹。

【方论选录】归、芍敛阴养血，苓、术健脾生血，甘草缓中和胃，柴胡解郁升清，二藤舒筋以和络脉也，血旺筋舒，则寒热自解，而癥瘕无不痊，何食少之有哉！

69573 逍遥散

【方源】《种痘新书》卷十。

【组成】白术 茯苓 当归 白芍 生地

甘草 柴胡

【功用】养心补血，调理脾胃。

【主治】女子一向闭经，血海已涸，适逢出痘，毒气郁于冲任之间，二阳并发，热甚。

【加减】加梔仁、丹皮，名“加味逍遥散”。

69574 逍遥散

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】当归 白芍 茯苓 白术 甘草 柴胡 薄荷 丹皮 山梔

【功用】解郁调经，和气血。

【主治】肝郁血虚，妇人经闭及月经不调。

①《女科切要》：妇人胃气不调，貌本壮实，饮食渐减，经水不通。②《笔花医镜》：肝经血虚木郁。③《全国中药成药处方集》（北京方）：月经不调，脐腹胀痛，午后烦热，精神疲倦。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（北京方）：忌气恼劳碌。孕妇忌服。

【备考】本方改为丸剂，名“逍遥丸”（见《全国中药成药处方集》北京方）。

69575 逍遥散

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】白术 白芍 当归 柴胡 茯苓 丹皮 薄荷 麦冬 山梔 牛膝 甘草

【主治】干咳。

【加减】痰郁火邪在中，加桔梗。

69576 逍遥散

【方源】《女科秘要》卷三。

【异名】逍遥饮（《竹林女科》卷一）。

【组成】白术 川归 白芍 花粉 玄胡 各八分 地骨皮 石莲子各一钱 黄芩 薄荷各四分 龙胆草五分（一方无黄芩）

【用法】上为散服，或水煎服。

【功用】《竹林女科》：退寒热。

【主治】①《女科秘要》：妇人血虚，性急，或当行经时房事触伤，腹中结块如鸡子大，左右而动，月水不行，变作五心烦热，头昏目眩。②《竹林女科》：妇人行经时及产后过食生冷之物，血见水即滞，闭而发热，初起一二月生寒发热，五心烦躁，口苦舌干，面色青黄。

【备考】方中玄胡，《竹林女科》作“柴胡”。

69577 逍遥散

《全国中药成药处方集》（昆明方）。即原书（抚顺方）“逍遥丸”改为散剂。见该条。

69578 逍遥散

【方源】《韦文贵眼科临床经验选》。

【组成】归身 9 克 焦白术 6 克 甘草 3 克 柴胡 6 克 丹皮 6 克 茯苓 12 克 焦山梔 6 克 白菊 6 克 白芍 9 克 杞子 9 克 石菖蒲 10 克

【功用】舒肝解郁，清热养血，平补肝肾。

【主治】七情内伤所致肝郁气滞型，或温热病后，玄府郁闭而致双眼失明，如球后视神经炎、视神经萎缩、皮质盲（近似中医青盲），或突然失明，如急性球后视神经炎、视网膜中央动脉阻塞（一天内）、视网膜中央静脉血栓形成、视网膜静脉周围炎所致玻璃体出血（近似中医暴盲）。

【加减】表邪已解，亦无低烧，可去薄荷；药后大便溏稀，可去梔子、菊花，加党参益气健脾而扶正。

【方论选录】柴胡疏肝解郁；归身、白芍养血柔肝而和脾；茯苓、白术、甘草健脾燥湿和中；丹皮、梔子清热、凉血而泻郁火；菊花平肝明目；杞子清肝、益肾明目；石菖蒲芳香开窍明目。本方用于眼科上述疾患，不但有舒肝行气解郁之功，且有平肝、益肾明目之效。“木郁达之”，玄府通利，则目得濡养而神光充沛。

69579 逍遥八物汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】人参二钱 柴胡一钱 白芍三钱 归身三钱 海螵蛸三钱 山药三钱 茯苓三钱 甘草一钱 肉桂（随宜加用）

【用法】水煎服。

【主治】妇人阴蚀。

69580 逍遥五黄汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归（酒洗）半钱 白芍（酒洗）

一钱 白术(土炒)一钱 白茯苓(去皮)一钱 柴胡(酒炒)八分 薄荷二分 生地(姜炒)一钱 黄芩(酒炒)一钱 黄连(姜炒)一钱 黄柏(酒炒)一钱 知母(生)一钱半 黄耆(盐水炒)一钱 神曲(炒)八分 甘草(炙)四分 香附(便制)一钱 地骨皮(酒炒)一钱

【用法】上锉一剂。加煨姜三片、乌梅半个，水煎，温服。

【主治】妇人午后发热，汗出后热退。

69581 逍遥调经汤

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】当归 生地 白芍 陈皮 丹皮 川芎 熟地 香附 甘草 泽兰 乌药 青皮 玄胡索 黄芩 枳壳 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】女子十五六岁，气体虚弱，经脉将行，或一月二次，或过月不行，致生奶痈。

69582 逍遥萎贝散

【方源】《中医外科学》。

【组成】柴胡 当归 白芍 茯苓 白术 瓜蒌 贝母 半夏 南星 生牡蛎 山慈菇

【用法】水煎服。

【功用】疏肝理气，化痰散结。

【主治】乳癖、瘰癧、乳癌初起。

哮

69583 哮喘丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】杏仁三钱 马兜铃三钱 蝉衣二钱 桑皮二钱五分 白果肉二钱五分 白矾五钱 白信三分

【用法】上为末，红枣肉为丸，如绿豆大。每服男七丸，女六丸，食后以冷茶送下。

【主治】哮喘。

69584 哮喘积丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】鸡子。

【用法】略敲不损膜，浸尿缸内四五日夜，

吃之。

【功用】去风痰。

【主治】哮喘。

69585 哮喘病丸

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】生南星 生半夏 生川乌(上三味水漂七日，晒干) 生甘草各四两

【用法】上为细末，生姜汁泛丸。每服一至二钱，小儿减半，用淡姜汤或开水送下。

【主治】风痰水饮，冷哮诸病，时而气喘，时而痰壅，咳嗽痰喘，一切哮喘之症。

69586 哮喘金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】松花粉五钱 川贝四钱 橘红五钱 瓜蒌八钱 炙麻黄三钱 京知母 海石 杏仁 米壳各五钱 寸冬八钱 白果仁一两 五味子三钱 生石膏五钱 槟榔 乌梅肉各四钱 枳壳八钱 竹茹五钱 苏叶三钱 诃子肉五钱 前胡四钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，开水送下。

【主治】各种哮喘，老人久嗽，喘卧不宁，痰中带血，肺痈肺痿。

【宜忌】禁辛辣之物。

69587 哮喘灵秘丹

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】胆南星二两 大半夏二两(用白矾五钱、牙皂五钱同煨一夜，不见白星) 赤茯苓(去皮)二两 苦葶苈二两 大贝母二两 沉香一两 青礞石(消煨)五钱 天竺黄二钱 珍珠三钱(豆腐煮) 羚羊角一支(锉末) 乌犀角三钱 白矾一两 硼砂一两 风化消五钱 花蕊石(火煨)五钱 孩儿茶五钱 款冬花一两 铅白霜五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，临卧以姜汤送下；外制六味地黄丸空心服。

【主治】哮喘。

69588 哮喘万灵膏

【方源】《外科十三方考》。

【组成】川乌六钱 草乌六钱 连翘八钱 当归六钱 白芷八钱 木鳖八钱 白及六钱 官桂八钱 茯苓六钱 白薇八钱 牙皂五钱 乌药六钱 桑枝 枣枝 桃枝 柳枝 槐枝 各五钱

【用法】上药同麻油三斤先浸一宿,然后熬焦去滓,入飞黄丹一斤再熬至如漆色时,急以桃、柳棍二根搅至滴水成珠时,入乳香四钱,没药四钱,收膏备用。用时以布或绫摊,贴肺俞穴(第三胸椎之下,旁开一寸五分),于初伏之日贴起,贴满三伏;再于冬至之日贴起,贴至九九。

【主治】多年咳嗽气喘。

69589 哮喘滚痰丸

【方源】《外科十三方考》。

【组成】朱砂四钱 枯矾一两

【用法】上为细末,捣饭为丸,如梧桐子大。每服七丸至十二丸,每日一次。

【主治】多年哮喘,痰多咳嗽;伤风咳嗽,痰喘气急。

【备考】合丸时务须多捣。

哽

69590 哽生散

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】丁香五钱 木香二钱五分 官桂心二分半 人参 神曲各二分半 川芎七钱五分 诃子七个(去核) 巴豆十四粒(水浸一宿如泥) 草果仁二个 广术七分半

【用法】上除巴豆外,并生用,为极细末,入巴豆泥和匀,瓷器内盛贮,密封之。每服用一铜钱半子,令病人男左女右置药,米汤调成稀糊,以舌舐之,卧少时后,用细米粥汤压之,病人多年可服二服,病浅一服。

【主治】反胃吐食。

【宜忌】忌生冷、硬物、油腻、湿面、盐醋等物,只服白粥百日。孕妇不可服。

【备考】此药过腊月半辰时不见火方合药,

于来年夏至后方可用。

哈

69591 哈化丸

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】石膏 寒水石 蜜各八钱

【用法】水同煎成膏,为丸。含化。

【主治】上焦热,头昏,口干。

69592 哈化丹

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】胆矾 硼砂 明矾 牙皂 雄黄

【用法】枣肉为丸,如芡实大。含化,温黄酒一杯过口,内服苏子降气汤。

【主治】喉中梅核气。

唤

69593 唤肠散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】草乌(生)一个 白姜一指大 白矾一钱(飞)

【用法】上为末,加乳香一钱研匀。每用半钱,葱涎调,涂于肛门内。不久,其痔自脱落。

【主治】诸痔。

【宜忌】外痔不用。

69594 唤痔散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】翻肛散(《外科十三方考》)。

【组成】草乌(生用)一钱 刺猬皮一钱(烧存性) 枯矾五钱 食盐(炒)三钱 麝香五分 冰片二分

【用法】上为细末。先用温汤洗净肛门,随用津唾调药三钱,填入肛门,片时痔即当出,去药,上护痔膏。

【主治】内痔不得出。

69595 唤痔散

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】生胡椒一钱

【用法】上为极细末。空心用生酒一瓶随量大小送下。待半上午,其痔即翻出,以便外

用枯痔药。

【主治】痔疮。

69596 喉痔散

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】灵磁石一两 枯矾五钱 干姜（治，另研）三分 草乌尖（生）五分

【用法】上为末。姜汁调，敷痔上。

【主治】痔疮。

眩

69597 眩晕汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】生地二钱 当归一钱 川芎八分 藁本六分 丹参一钱 麦冬六分 陈皮八分 升麻三分

【用法】水煎服。

【主治】血虚眩晕。

69598 眩晕汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆二钱 玉竹三钱 白术一钱 香附一钱 川芎八分 半夏八分 山药一钱 吴萸八分

【用法】水煎服。

【主治】气虚眩晕。

眠

69599 眠膏

《普济方》卷三八四。即《小儿药证直诀》卷一“镇心丸”，用薄荷汤化下。见该条。

鸭

69600 鸭粥

《药粥疗法》。为方出《证类本草》卷十九引《食医心镜》，名见《医统》卷八十七“鹭粥”之异名。见该条。

69601 鸭子煎

【方源】方出《续本事》卷六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷十。

【异名】鸭蛋汤（《济阴纲目》卷九）。

【组成】生姜年少者百钱重，年老者二百钱

重（取自然汁） 鸭子一只（打碎，入姜汁内搅匀）

【用法】上用水同煎至八分，入蒲黄三钱，重煎五七沸，温汤空心服。

【主治】妇人胎前产后赤白痢。

69602 鸭头丸

【方源】《医方类聚》卷一二八引《济生》。

【组成】甜葶苈（略炒） 猪苓（去皮） 汉防己各一两

【用法】上为细末，绿头鸭血为丸，如梧桐子大。每服七十丸，用木通汤送下。

【主治】水肿。面赤烦渴，面目肢体悉肿，腹胀喘急，小便涩少。

69603 鸭血酒

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】白鸭一只

【用法】用铜刀取血。调热陈老酒服。

【功用】开胃。

【主治】妇人经来胃气不开，潮热，旬日不思饮食。

69604 鸭肫散

【方源】《仙拈集》卷一引《全生》。

【组成】鸭肫胗数十个（晒干，微炒）

【用法】上为末。每服六分，每早以烧酒送下，频服。

【主治】噎膈反胃，食不能下。

69605 鸭脂膏

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】鸭脂三两 胡粉二两 巴豆（去壳，细研去油尽）半两

【用法】上三味，先熔脂，入二味末调如膏。每日三五度涂疮上。

【主治】蚯蚓瘰。

69606 鸭通汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】白鸭通五升（沸汤二斗半淋之，澄清，取二斗汁） 麻黄八两 豉三升 冷石二两 甘草五两 石膏三两 梔子仁二十枚

【用法】上咬咀。以鸭通汁煮六升，去滓，纳豉三沸，分服五合。若觉身体冷，小便快

阔，其间若热犹盛，小便赤促，服之不限五合。

【功用】解散除热。

【主治】《圣惠》：五石发动。

【宜忌】宜小劳之，渐进食，不可令食少，但勿便多。

【方论选录】《千金方衍义》：鸭通利水，取白以通金水二脏，为解石毒之专药；佐以冷石、石膏清解里热；麻黄开泄表气；梔子、豉、甘解毒除烦，兼通表里恶毒异气。

69607 鸭通汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】白鸭通（新者） 大黄二两 石膏（碎） 知母各一两 豉一升 麻黄三两（去节） 葱白二七茎 梔子仁二七枚 黄芩一两半 甘草三分（炙）

【用法】上咬咀。以汤一斗二升淋鸭通，乃以汁煮药，取三升半，去滓，然后纳豉更煮三沸，去豉，未食前服一升。

【主治】散发。热攻胸背，呕逆烦闷，卧辄大睡，乘热觉四肢不快，寒热往来，大小便难。

【备考】方中白鸭通用量原缺。

69608 鸭蛋汤

《济阴纲目》卷九。为方出《续本事》卷六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷十“鸭子煎”之异名。见该条。

69609 鸭掌散

《本草纲目》卷三十。即《摄生众妙方》卷六“压掌散”。见该条。

蚌

69610 蚌壳散

【方源】方出《便易经验集》，名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】蚌壳（煨）五钱 轻粉五分 冰片一分

【用法】上为末。用银花汤调，搽两三次，结痂收功。

【主治】火毒疮。男女乳上湿疮，脓血淋漓成片，飞红无靥，痛痒不休。

69611 蚌津散

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】水中大蚌

【用法】置大碗中，任其口开，用冰片二三分、当门麝二三分为末，挑入蚌口内，即浆水流入碗内，再加冰片、麝香少许。用鸡翎扫伤处，先外而内遍扫，随干随扫。凉入心脾，便不痛而愈。

【主治】汤泡火烧。

【备考】如所扫之处，不肯干，必溃烂，将蚌壳烧灰存性为末，入冰、麝少许掺之妙。

69612 蚌霜散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】蚌粉 百草霜各等分

【用法】上为末。每服一二钱，糯米饮调服；侧柏枝研汁尤效；如鼻衄、舌衄及灸疮出血，干掺。

【主治】伤损大吐血；或因酒食饱，低头掬损，吐血过多；并血妄行，口鼻俱出，舌衄，灸疮出血，但声未失者。

蚬

69613 蚬子水

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】蚬子汤（《种痘新书》卷十二）。

【组成】蚬子不拘多少（活者）

【用法】以水养五七日，旋取其水洗之。

【主治】小儿痘后发癰。

69614 蚬子汤

《种痘新书》卷十二。为《准绳·幼科》卷六“蚬子水”之异名。见该条。

69615 蚬壳膏

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】蝼蛄一个（去头翅足） 麝香 轻粉各黄米许

【用法】上为极细末。以新水少许就之，用蚬壳灌之。

【主治】小儿阴病，慢惊癰疽。

蚣

69616 蚣蝎散

【方源】《集验背疽方》。

【组成】赤足蜈蚣一条(去头足,生用) 全蝎三个(去丁爪,要有尾者,生用) 木香一钱

【用法】上为细末。每用时先以猪蹄汤洗疽了,以此药一字许掺于膏药钱上,近疮口处贴。

【主治】风毒所胜,痈疽疮口小而硬。

【宜忌】若疮口阔大及不硬则不必用此。

【备考】每用神异膏合,先量疽大小,涂在纸花上了,却以此药掺于膏药上,要使先到疮口故也。

69617 蚣蝎散

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】赤足蜈蚣一条(去头足) 全蝎三个(去足,生用)

【用法】上为末。用猪蹄汤净洗,用此散掺疮口,以神异膏贴之。

【主治】因风毒所胜,疽口紧小而硬。

蚊

69618 蚊蛤散

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】五倍子(炒焦)一钱 铜绿五分 蚕退纸一钱(烧灰)

【用法】上为细末。先将米泔水洗过后,搽牙。

【主治】小儿痘疮收靥之后,齿生走马牙疳。

蚓

69619 蚓泥散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】韭菜地蚯蚓粪(烧通赤)一两 膩粉一分 麝香半钱

【用法】上各为散,再同和匀。每用先煎葱

汤洗了,将药干敷。

【主治】下注疮。风湿毒气,下注于脚膝胫间,致令皮肤肿硬,结核成疮,脓水不绝,绵历岁年,愈而复发者。

罢

69620 罢惊丸

《御药院方》卷十一。为《局方》卷十“大惊丸”之异名。见该条。

69621 罢搐丸

【方源】《幼幼新书》卷九引陶善化方。

【组成】黑附子 白茯苓 蝎 白附子 僵蚕 天南星各一两 人参二钱 花蛇一钱 天麻七钱 乌蛇四钱 朱砂六钱 青黛四两 脑麝各少许 水银(与黑铅各等分,一处火上熔结成砂子)一分

【用法】上用石脑油为丸,如鸡头子大。每用一丸,急惊风,金银薄荷汤送下;慢惊风,烧青竹沥油化下。

【主治】小儿急慢惊风,天钩。

【加减】慢惊,去水银砂子、龙脑。

69622 罢搐丸

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】水银二钱 黑铅二钱(同水银结砂子) 天麻半两(去苗) 花蛇肉(酒浸,炙,取肉)半两 人参(去芦)半两 天南星半两(炮) 白附子半两 干蝎半两(去毒) 朱砂半两(水飞) 青黛一分 脑子 麝香各少许

【用法】上为细末,石脑油为丸,如小麻子大。每服一丸,薄荷汤化下,不拘时候。

【主治】小儿急慢惊发搐,牙关噤,身反张。

69623 罢搐散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】蜈蚣一个(全用) 蝎七个(头尾全者) 朱砂 麝香 雄黄各半钱

【用法】上为细末。每服一字,油酒调下。

【主治】风搐。

69624 罢搐煎

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】丹砂（研） 水银 天南星（炮）
臙粉（研） 薄荷 白附子（炮） 干蝎
（全者，炒）各一分

【用法】上为细末，用石脑油和成煎。每服一大豆许，薄荷汤化下。

【主治】慢惊。

恩

69625 恩袍散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】秋莲散（《普济方》卷一九〇）。

【组成】生蒲黄 干荷叶各等分

【用法】上为末。每服三钱，食后浓煎桑白皮汤放温调下。

【主治】咯血、吐血、唾血及烦躁。

69626 恩袍散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】生蒲黄 干荷叶 茅根各等分

【用法】上为末。每服三钱，浓煎桑白皮汤，食后温服。

【主治】咯血、吐血、唾血及烦躁咳嗽。

哭

69627 哭风散

【方源】方出《医方大成》卷十，名见《普济方》卷三六〇。

【组成】赤脚金头蜈蚣一枚 蝎梢四尾 僵蚕七个 罂麦半钱

【用法】上为末。先用鹅毛管吹药入鼻内使喷嚏啼叫为可医，后用薄荷汤调服。

【主治】小儿断脐为风湿所伤，或尿在抱裙之内，遂成脐风撮口，面赤喘急，啼声不出。

【备考】《普济方》有半夏末半钱。

69628 哭来笑去散

【方源】《仙拈集》卷二引《集验方》。

【组成】樟脑 川椒（去目）各五钱

【用法】粗碗一只，椒铺底，脑盖面，覆碗一只于上，盐泥封固，火升二炷香，取药为细末。每用一二厘擦牙。

【主治】牙痛。

69629 哭来笑去散

【方源】《古今医鉴》卷九引齐双泉方。

【组成】雄黄 乳香 胡椒 麝香 荜茇 良姜 细辛各等分

【用法】上为末。每用少许，吹男左女右鼻中；如牙痛脸肿，用纸捲药末在内作条，蘸香油点着，燎牙痛处，火灭再燃再燎，条烧尽则止。

【主治】牙齿痛，脸肿。

圖

69630 圖参散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】人参（去芦）二两 白术一两 白扁豆（炒）一两 罂粟米四两（别研） 山药三两 陈粟米三两（用生姜自然汁浸三宿，取出晒干） 白茯苓一两（去皮） 木香三分 川芎一两半 乌药一两半（锉碎） 甘草三两（炙） 厚朴（去粗皮，生姜制）二两 白芷一两

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，加生姜三片，大枣一枚（去核），同煎至半盏，空心、食前温服。

【主治】小儿脾胃虚弱，气不调顺，伤于风冷，一切吐泻，手足厥冷。

圓

69631 圓红散

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】二十号损象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）、丝四（《痧症全书》卷下）。

【组成】没药（置簪内，放瓦上，炭火炙去油，为末）三钱 细辛四钱 桃仁（去皮尖） 玄胡索各一两 降香三钱 白蒺藜（捣去刺）一两

【用法】上为末。每服一钱，紫荆皮汤温服。

【主治】血郁不散致痧。

【备考】方中桃仁、玄胡索用量原缺，据

《痧症汇要》补。

69632 圆灵丸

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【异名】圆灵丹（原书卷一〇七）。

【组成】苍术四两 甘草一两 荆芥穗二两 牵牛子（用四两捣取末）一两 黄柏（去粗皮）一两

【用法】上为末，用蒸饼去皮，以蜜水蘸令干湿得所为丸，如弹子大。每服一丸，食后以荆芥茶嚼下，每日三次。

【主治】目风肿攀睛，肤翳，赤脉肿焮，目昏痒，碧晕，赤筋，瘀肉，风赤，暴赤，胎赤。

69633 圆灵丹

《圣济总录》卷一〇七。为原书卷一〇六“圆灵丸”之异名。见该条。

69634 圆明膏

【方源】《东垣试效方》卷五。

【组成】柴胡五钱 麻黄（微捣）五钱（去节） 当归身三钱 生地黄半两 黄连五钱 甘草二钱 诃子皮二钱（湿纸裹，煨）

【用法】先以水二碗，熬麻黄至一碗，掠去沫，外六味各咬咀，如豆大，筛去末，称毕，入在内同熬，滴入水中不散，入去沫，蜜少许再熬动。如常点之。

【主治】劳心过度、饮食失节而致内障生翳，及瞳子散大。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。柴胡、麻黄发散表邪，当归、生地和肝养血，黄连清肝火，甘草和中州，瞳子散大，故加诃子以收之也。②《医林纂要》：障翳自内，火妄血枯，内枯而瞳散，外浊而翳生。故君生地而协以归、连、甘草，以治内也；翳成于外矣，散以柴胡、麻黄，自内而拔之于外；目阴欲尽，诃子皮以敛之。

69635 圆榭酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】桑榭（晒干） 圆眼肉各四两

【用法】烧酒十斤晒十日，坛口封固。开坛

饮之。

【功用】大补诸虚。

69636 圆通大圣散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】木香（方圆）二寸（不见火） 黄连半两（去须）

【用法】水半升同煮干，去黄连，只取木香切，焙为细末，分作三服。第一服用陈米汤调下，第二服陈米饮调下，第三服甘草汤调下。

【主治】赤白痢。

69637 圆翳防风散

《金鉴》卷七十七。为《眼科龙木论》卷一“防风散”之异名。见该条。

69638 圆翳羚羊饮

《金鉴》卷七十七。为《圣济总录》卷一一二“羚羊角饮”之异名。见该条。

69639 圆明拨云锭子

【方源】《冯氏锦囊》卷六。

【组成】炉甘石一斤（煨过，用黄连半斤，水二碗煎五七沸，淬七次，只取净末二两） 硼砂一两 片脑一钱 麝香二分 海螵蛸二钱 珍珠一钱 血竭三钱 乳香 没药各一钱

【用法】上为极细末，以黄连膏子和剂，捏成锭子，净水磨化点。

【主治】远年近日一切眼疾。

【备考】和剂黄连膏子：黄连半斤，当归、龙胆草、芍药、大黄、黄柏、黄芩、川芎、生地黄、白芷、防风、木贼、羌活、红花、薄荷叶、菊花各等分，用水七八碗浸药三日，煎成膏子。

69640 圆明内障升麻汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】冲和养胃汤（原书同卷）、内障升麻汤（《杏苑》卷六）。

【组成】干姜一钱 五味子二钱 白茯苓三钱 防风五钱 白芍药六钱 柴胡七钱 人参 炙甘草 当归身（酒洗） 白术 升麻 葛根各一两 黄耆 羌活各一两五钱

【用法】上咬咀。每服五七钱，水三大盏，煎至二大盏，入黄芩、黄连二钱，同煎数沸，去滓，煎至一盏，食远热服。

【主治】①《兰室秘藏》：脾胃元气衰弱，心火与三焦俱盛，饮食不节，形体劳役，心不得休息，而致内障。②《准绳·类方》：内障初起，视觉微昏，空中有黑花，神水变淡绿色，次则视物成二，神水变淡白色；久则不睹，神水变纯白色。

【方论选录】《准绳·类方》：因肝木不平，内挟心火，故以柴胡平肝、人参开心、黄连泻心火为君；酒制当归荣百脉，五味敛百脉之沸，心包络主血，白芍药顺血脉，散恶血，为臣；白茯苓泻膀胱之湿，羌活清利小肠之邪，甘草补三焦，防风升胆之降，为佐；阴阳皆总于脾胃，黄耆补脾胃，白术健脾胃，升麻、葛根行脾胃之经；黄芩退壮火，干生姜入壮火为导为使。

特

69641 特异万灵散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】软石膏（烧通红，碗覆在泥地上一宿） 大白南星 赤小豆 草乌（连皮尖）各半两 乳香（别研）二钱

【用法】上为细末。蜜水调膏，从外抹收入，留最高处如钱勿敷。

【功用】敛毒排脓。

【主治】痈疽发背，肿毒。

【宜忌】如已破，切忌药入疮口，恐痛。

钱

69642 钱汤丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】猪牙皂角灰一钱 朱砂一钱 天南星末半钱 滑石末一钱 轻粉一钱（好者） 巴豆二十四粒（去皮尖）

【用法】上为极细末，以寒食面为糊和丸，如绿豆大。每服一岁二岁二丸，三岁三丸，临

卧煎钱汤送下。

【主治】小儿惊积壮热。

69643 钱脂膏

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】大钱四文

【用法】于石上磨。以腊月猪脂磨取汁涂之。不过数遍愈。

【主治】唇黑肿，疼痛不可忍。

69644 钱氏白术散

《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。即《小儿药证直诀》卷下“白术散”。见该条。

钻

69645 钻胃丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】大黑附子一枚（去心，以刀子剝开成瓮子，入硃砂半钱、焰消半钱，以蒸饼剂生裹附子，慢火煨面焦熟，剥去面不用，只留附子用之） 橘皮一两（须是好红色者，汤浸，去白瓢，每以一片子裹巴豆一粒，同米半升入铫内，慢火炒令熟，巴豆不用，只留橘皮用之） 半夏曲 青皮各一两 丁香一百二十粒 天南星一两 胡椒一百二十粒 藿香 草茛 蛮姜 柿蒂 白术各一两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，生姜一大块，纳药一丸在生姜内，湿纸裹煨熟，和生姜嚼吃，空心米饮送下。

【功用】和暖脾胃，消进饮食。

【主治】一切膈气，及一切气疾。

69646 钻胃丸

《东医宝鉴·杂病篇》卷四。为《本事》卷二“二神丸”之异名。见该条。

铁

69647 铁酒

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】铁液酒（《普济方》卷三六四）。

【组成】铁五两 酒一升

【用法】烧铁令赤，投酒中，去铁饮之；仍

以磁石塞耳中。

【主治】①《圣济总录》：耳聋。②《普济方》：大人及小儿十岁以上耳聋、脓耳及耳后生疳疮。

69648 铁门闭

【方源】《春脚集》卷二。

【组成】玄胡 莪术 良姜 五灵脂 当归各等分

【用法】每服一钱至三钱，用好陈醋温热一杯调服。

【主治】胃气疼。

69649 铁门栓

【方源】《回春》卷七。

【组成】文蛤（炒黄色）一两 白矾（半生半煨）三钱 黄丹二钱

【用法】上为细末，黄蜡一两熔化为丸，如绿豆大。每服大人十五丸，小儿五七丸，加茶一钱、生姜二钱，煎汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：固肠止泻。

【主治】①《回春》：赤白痢疾，五种泄泻。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：小儿疳疾，面黄肌瘦，肠滑脱肛，神疲气促。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食生冷粘硬之物。

69650 铁井栏

《医统》卷九十三。为《本草纲目》卷三十六引《简便方》“铁井阑”之异名。见该条。

69651 铁井阑

【方源】《本草纲目》卷三十六引《简便方》。

【异名】铁井槛（《普济方》卷二七八）、铁井栏（《医统》卷九十三）。

【组成】芙蓉叶（重阳前取，研末） 苍耳（端午前取，烧存性，研末）各等分

【用法】蜜水调，涂四围。

【主治】痈疽肿毒。

69652 铁井阑

《理渝》。为原书“铁箍散”之异名。见该条。

69653 铁井阑

【方源】《疡科纲要》引朱圃仙方。

【组成】大五倍子（去蛀屑，微炒成团，候冷研细）三两 杜蟾酥（干，研细）五钱 藤黄三两（先以好醋入铜杓上微火化烊，绢漉去滓听用） 明矾一两（研） 胆矾八钱（研） 大黄 皂角 白及 山慈菇各二两 天南星一两

【用法】先以后五物用陈米好醋二大碗文火熬浓，绞去滓，乃和入醋煮之，藤黄同熬成膏，俟极浓，乃和入五倍、蟾酥、二矾细末调匀，离火，再入麝香细末三钱杵匀，制成锭子，阴干收藏。临用时以醋磨浓，涂疮根四围，干则润之以醋，一日洗去，再涂；欲移毒使偏，则如上法涂其一偏，而涂药处自能退肿，其毒聚于未涂药之一偏，可保骨节不致损害。

【功用】退肿移毒，收束疮根。

【主治】痈疽大毒漫肿无垠，根脚四散，其毒不聚；疮发于骨节转侧之间，酿脓化毒。

69654 铁井槛

《普济方》卷二七八。为《本草纲目》卷三十六引《简便方》“铁井阑”之异名。见该条。

69655 铁臼散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】羌独活 木瓜 五加皮 白芷 草乌 明雄 川乌 白附子 官桂 木香 炙乳没 甲片 细辛 血竭 胡椒 荆防风 红花 当归 樟脑各三钱 丁香一钱五分 银消 硫黄各二钱 全蝎十四个

【用法】上为细末，瓶贮听用。膏药上贴之。

【主治】风寒湿痹，及一切流痰疽毒皮色不变者。

69656 铁甲散

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】蜣螂（即推粪虫，又名屎壳郎）四两（炙脆） 南山楂四两（焦黑） 炒槟榔二两 广木香一两（煨）

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮，勿走药性。大人每服二钱，小儿五分，红痢，川连三分煎水调服；白痢，红糖五钱、老姜二钱煎汤

调服。

【主治】大人、小儿红白新久诸痢及噤口痢。

69657 铁头散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】赤石脂五钱 轻粉 麝香各五分 乳香 白丁香各三钱 生砒 黄丹各一钱 蜈蚣一条（炙干）

【用法】上为末。搽瘀肉上，其肉自化；若疮口小，或痔疮，用糯米糊和作细条，阴干经入，外以膏药贴之，内服托里之药。

【功用】蚀腐。

【主治】一切顽疮，内有脓管瘀肉；或瘰癧结核不化，疮口不合。

69658 铁扫帚

【方源】《古今医鉴》卷十五引徐鲤川方。

【组成】硫黄不拘多少 人言少许

【用法】上为末，入白萝卜内，火烧存性，取出为细末听用；另用香油四两，入鸡子三个煎熟，去鸡子不用；再用花椒四两，油内煎至焦黑，去椒不用。用香油调药搽患处。

【主治】疥癣血风，诸疮痒痒难当。

69659 铁朱散

【方源】《名家方选》。

【组成】铁粉五钱 灵粉二钱 蜡四钱 鸚鵡菜 桐木（烧为霜） 硫黄各四钱 巴豆二钱

【用法】炼蜜为丸。每服一钱，白汤送下。服后必下利，下利已，则有又发者，仍前法用二三，则拔病根；始用三黄泻心汤数十帖，以冷水灌顶，而与此药则能应。

【主治】大人、小儿癫痫。

【备考】本方方名，据剂型，当作“铁朱丸”。

69660 铁杉散

【方源】《青囊秘传》。

【异名】化腐散。

【组成】赤石脂五钱 寸香五分 轻粉五分 乳香 白丁香各三钱 生砒 黄丹各一

钱 蜈蚣（炙）一条

【用法】上为末。每用少许，搽腐肉上。

【功用】化腐肉。

69661 铁围散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】乳香 没药半两 大黄 黄柏 黄连 南星 半夏 防风 皂角刺 木鳖子 瓜蒌 甘草节 草乌 阿胶

【用法】上为末，醋调成膏，砂石器内熬黑色。鹅翎敷之。

【主治】痈疽肿毒。

【备考】方中除没药外，余药用量原缺。

69662 铁柱杖

《丹溪心法附余》卷十六。为《烟霞圣效方》引临清张先生（见《医方类聚》卷二三八）“铁柱杖丸”之异名。见该条。

69663 铁刷丸

【方源】《普济方》卷一六五引《卫生家宝》。

【组成】圆净半夏四两（汤浸，洗七次，焙干称） 紧实槟榔四颗

【用法】上为细末，生姜自然汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，小儿七丸，或别小丸亦得，食后临卧淡姜汤送下。

【功用】化痰实，宽利胸膈；清头目，降气止嗽，去停饮。

【主治】一切痰饮。

69664 铁刷丸

【方源】《本草纲目》卷七引《江方》。

【组成】百草霜三钱 金墨一钱 半夏七分 巴豆（煮）十四粒（研匀）

【用法】黄蜡三钱同香油化开为丸。量大小，每服三五丸，或四五十丸，姜汤送下。

【功用】《串雅内编选注》：下滞止痢。

【主治】一切痢下初起。

【宜忌】《串雅内编选注》：热性下痢、孕妇皆禁用。

【方论选录】《串雅内编选注》：方中百草霜、金墨收敛止血，去湿止泻；半夏、巴豆霜散

结消痞，导下阻结于肠间的沉寒积冷；香油润下缓痛；黄蜡具有固膜护肠之功，与巴豆同用，可避免刺激胃壁，而使其在肠部逐渐溶解，发挥荡滞之效。

69665 铁刷汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】附子五枚（炮令微裂，地上以盏子覆冷，取去皮脐）半夏（汤洗七遍去滑，切，麸炒）一两 木香半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，以水一盞，加生姜一枣大（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】风痰，胃中有寒，呕吐痰涎，胸满气逆。

69666 铁刷汤

【方源】《普济方》卷一六七引《卫生家宝》。

【组成】半夏四钱（洗）草豆蔻 丁香 干姜（炮） 诃子皮各三分 生姜一两

【用法】上咬咀。用水五盞，煎至二盞半，去滓，分三服，相继不拘时候。

【主治】积寒痰饮，呕吐不止，胸膈不快，不下饮食。

【加减】大吐不止，加附子三钱、生姜半两。

69667 铁刷汤

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【异名】铁刷散（《景岳全书》卷五十八）。

【组成】良姜（油炒）六两 茴香（炒）二两 甘草（炙）八两半 苍术（米泔浸一宿）八两

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜三片，盐一捻，水一盞，煎至七分，温服，或热酒调下亦得；如脾寒，用酒一盞煎，临发时连进三服；四方之人不伏水土，小儿脏寒脱肛，并加生姜三片，大枣一枚，水煎服；冒暑伏热，擦生姜冷水调下；行路早起，大枣一枚（去核），包药少许，同生姜三片嚼下。

【主治】①《局方》（宝庆新增方）：男子脾积心气痛，妇人血气刺痛，中酒恶心，一切疟痢

气疾，肠风下血脏毒，滑肠泄泻，四方之人不伏水土；小儿脏寒脱肛，冒暑伏热，四时非节疫疠，痧瘴。②《普济方》：黄疸，面目遍身如金色。

69668 铁刷汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子（炮，去皮脐） 天南星（炮） 半夏（汤泡七次）各半两 木香二钱半（生）（一方无半夏、木香，有丁香一钱）

【用法】上咬咀。每服三钱，水二盞，加生姜十大片，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】痰饮。

69669 铁刷汤

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】香附子六两 桔梗一斤半 甘草一斤 干姜半斤 肉桂（去粗皮）四两 茴香半斤 良姜 陈皮各十二两

【用法】除肉桂外，同炒，为细末。每服一钱，入盐少许，沸汤点下，不拘时候。

【功用】快气。

【主治】胃气不和，心腹疼痛；饮酒过度，呕哕恶心，脾痛翻胃；内感风冷，肠鸣泄泻；妇人血气刺痛。

69670 铁刷汤

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】紫梢花（成块带蒂者佳） 肉桂 大丁香 蛇床子 吴茱萸各一两 山茱萸（去核） 天仙子 萝卜子 川椒 细辛 狗脊 地豆（大者，白眉者佳） 芎藭 甘松 各半两 天雄一个 白檀 槐角子 白芷 沉香 芸苔子 葶苈子 香附子 羌活 巴戟 肉苁蓉 木香各二钱

【用法】上为粗末。用酸浆水一大碗，药末五钱、盐少许，同煎三五沸，倾在盆内熏之，渐通手洗浴如火热，妇人每日熏浴之。使败精秽血如黑汁下。

【主治】男子、妇人一切阴寒失精色败，腰膝疼痛，阴汗不止，肠风下血，痔漏；及妇

人赤白带下，产后血晕气虚。

69671 铁刷汤

【方源】《普济方》卷二〇四。

【组成】半夏四两 生姜四两(与半夏同捣饼) 诃子(炮，去核取肉)半两 草豆蔻(去皮取仁)半两 甘草半两

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，加生姜二片，盐一捻，煎至七分，去滓热服。

【功用】益脾胃，化痰涎。

【主治】胸膈滞气，咽喉不利，不能下食。

69672 铁刷散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《吉氏家传》。

【组成】麻黄(去根节)一两 甘草(炙)半两 细辛半两 石膏 葶苈 青皮各一分 杏仁十二个

【用法】上为末。夹惊伤寒，先下异功散二服，紫苏、木瓜汤煎，后以此药半钱，水一盞，加生姜三片，煎至四分，温服。头面微有汗解。

【主治】小儿夹惊伤寒。伤寒三二日，面黄白色，壮热微渴，三五日内心脏热，面赤唇红，多躁壮热，热极生涎，即为惊。

69673 铁刷散

【方源】《幼幼新书》卷九引相濡方。

【组成】好黄丹末不以多少

【用法】用花叶纸三重包，以线系，又用生绢两重裹了，紧扎定，长江水浸七日，一日一换，数足漉控，稍干，于重五日用炭火三斤一煅，药上有珠子为度，去火，吹去灰，研为末。每服一字或半钱，浓煎薄荷汤化下。

【主治】小儿急慢惊风，潮搐上视，不省人事。

【备考】其药须是频用手指研，灌方得。

69674 铁刷散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】白术皮(不犯铁器)

【用法】上药去粗皮，为末。每服一大钱匕，空心米饮调下，不拘时候，服至三服；气虚者，食后服。

【功用】下痰化痰。

【主治】痰。

69675 铁刷散

《景岳全书》卷五十八。为《局方》卷三(宝庆新增方)“铁刷汤”之异名。见该条。

69676 铁砂丸

【方源】《普济方》卷一九五引《鲍氏方》。

【组成】铁砂(水淘净，晒干，醋炒透)八两 蓬术 三棱(醋煮) 厚朴 陈皮 吴茱萸(泡)各二两

【用法】上为细末，神曲醋煮作糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。

【主治】黄肿。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒物。

69677 铁砂丸

【方源】《古今医鉴》卷六引思恒方。

【组成】苍术三两(米泔制，炒) 香附三两(醋炒) 白术一两 猪苓一两 泽泻一两 茯苓一两 茵陈一两五钱 牛膝一两 槟榔一两 木瓜一两 草果一两 砂仁一两 枳壳一两五钱(麸炒) 青皮一两 陈皮一两五钱 三棱一两(醋炒) 莪术一两(醋炒) 当归一两 神曲二两 青矾三两(麸炒黑)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服九十丸，温酒送下；醋汤亦可。

【主治】黄疸，腹内有块。

69678 铁砂散

【方源】《名家方选》。

【组成】铁砂五钱 荞麦十钱

【用法】上为散。每服五钱，白汤送下，每日三次。

【主治】黄胖病气上冲胸，短息，小便不利。

69679 铁砂散

【方源】《家塾方》。

【组成】铁砂 荞麦粉各十二钱 大黄六两

【用法】上为末，和荞麦粉，以水泛为丸，如绿豆大。每服一钱，以清酒送下，每日三次。

【主治】黄胖病。

【备考】本方方名，据剂型，当作“铁砂丸”。

69680 铁骨丹

【方源】《直指》卷三。

【组成】川乌头 草乌头（各炮，去皮脐尖） 川芎 当归（酒浸，晒） 辣桂 川续断（洗，晒） 华阴细辛 补骨脂（炒） 乌蛇（洗，酒浸，取肉，晒干）七钱半 直僵蚕（炒，去丝） 木鳖子（去壳，炒熟） 天麻（酒浸，晒） 巴戟（酒浸，去心，晒） 防风 滴乳香 没药 麻黄（去节） 羌活 独活 坚白南星（炮熟） 白蒺藜（炒，捣去刺） 薏苡仁 苍术（炒）各半两 草薢（盐水煮干） 杜仲（去粗皮，锉，姜汁制，炒焦） 牛膝（酒浸，晒）各一两 虎胥骨（洗，酒浸，炙焦） 自然铜（烧红，醋淬七次）各三两 白附子（炮） 川五灵脂各四钱 秦艽 全蝎（去毒，微炒）各二钱半 麝香半钱

【用法】上为细末，乳香、没药、麝香别研，渐入拌和，以浸药酒调飞面煮糊为丸，如弹子大。每服一九，温酒磨下，或宣木瓜煎汤送下、黑豆淋酒送下，不拘时候。仍间用高良姜（碎）一升煎汤围熏，汤浴最妙。未服药前，须以斑螫二十一个（去翅足），用黑豆一建盏，慢火同炒焦，只用七个，并豆入全蝎十四枚（微炒），五灵脂二钱半，为末，糕糊为丸，如麻子大，每服二十一九，老酒送下，先去其风根。

【主治】诸风瘫痪拳挛，半身不遂。

【备考】方中川乌头至补骨脂等八味用量原缺。

69681 铁胆饮

【方源】《治疫全书》卷五。

【组成】铁粉一两 胆草五钱

【用法】上为末。每服二钱，小儿五分，磨刀水调服。

【主治】阳毒在脏，谵妄狂走。

69682 铁涎膏

【方源】《幼幼新书》卷十九引汉东王先生方。

【组成】铁焰粉 白附子 辰砂各一钱 丁头代赭半两（生） 脑麝各一字

【用法】除脑、麝别研，余为细末，蒸枣子（去核），烂杵为膏。婴孩每服半皂子大，三二岁一皂子大，金银薄荷汤化下。

【主治】婴孩小儿诸惊夜啼，手足微动，及潮热盛者。

69683 铁勇丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】獭胆七枚（如无，只用赤鲤鱼胆十四枚） 磁石（四边紧者） 血竭（别研） 泽泻 赤小豆 紫葛根 苍耳子 赤芍药各半两 樟柳根三两（以上并生用，焙干）

【用法】上为细末，酒煮赤小豆面糊，入胆汁同和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，浓煎赤小豆、樟柳根汤并酒各半盏送下，不拘时候，每日三次。

【主治】金簇箭头入腹内。

69684 铁勇丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】硃研（别研） 砒（别研） 巴豆霜 斑猫各一字 蛭螂十枚 蜈蚣七枚 蛭螬七枚

【用法】上为细末，入前铁勇丹二十丸，一处再研，用石脑油为丸，如绿豆大。每用一九，纸疮口内，上用云母膏盖口，日一换药。不过三五日，其箭即出。

【主治】金簇箭头在身体诸处禁穴；或着骨、断折不能取者。

69685 铁笔圈

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】胆矾六钱（江米同炒黄，不用米） 雄黄二钱（为末） 硼砂四钱二分

【用法】先将矾、砂入铁锅内熔化，次入雄黄末，拿下冷定，为细末，入麝香一分，瓷罐秘收。用时烧酒调，笔蘸药圈疮四围肿处，

一日一围，疮随药收；待疮熟时，用针刺开出脓而愈。

【主治】肿毒。

69686 铁笔圈

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】芙蓉叶一两（霜后取） 文蛤（炒焦） 小粉各八钱 生南星 生半夏 生甘草

【用法】上为末。醋调敷，留头出毒。

【功用】圈毒免走。

69687 铁烙饮

【方源】《医级》卷八。

【异名】烧锤饮、淬铁饮。

【组成】铁秤锤一个（三四两者）

【用法】洗净，以此煎汤煎药。

【功用】重镇。

【主治】肝经相火之逆，为痛为厥。

69688 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】铁粉半两（细研） 牛黄半两（细研） 金箔三七片（细研） 银箔三七片（细研） 麝香一分（细研） 远志半两（去心） 马牙消三分（细研） 白僵蚕一分（微炒） 丹参半两 茯神半两 川升麻半两 白附子一分（炮裂）

【用法】上为散，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】热病，心神恍惚，悲喜不恒，发狂欲走。

69689 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】铁粉一两（细研） 茯神一两 远志半两（去心） 人参一两（去芦头） 防风三分（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 羚羊角屑三分 桑螵蛸三分（微炒） 龙齿一两 熟干地黄一两 朱砂一两（细研，水飞过）

【用法】上为末，入研了药，都研令匀，炼

蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】风邪经五脏，恍惚，坐卧不安。

【宜忌】忌生血。

69690 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】铁粉一两 獭肝一具（微炙） 安息香三分 鬼督邮一两 白术三分 木香三分 柴胡一两（去苗） 胡黄连三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以粥饮送下。

【主治】骨蒸劳，体瘦寒热。

69691 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】铁粉二两 獭肝二具（微炙） 安息香二两（入胡桃仁捣熟） 鬼督邮一两半 苦参一两 木香一两 柴胡一两半（去苗） 桃仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麝香半两（研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】传尸劳羸瘦，心神烦热，四肢疼痛。

69692 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】铁粉二两（细研） 鸡臛胫一两（微炙） 栝楼根三分 土瓜根一两 苦参三分（锉） 黄连三分（去须） 麦门冬一两（去心，焙） 牡蛎三分（烧为粉） 桑螵蛸三分（微炒） 金箔五十片（细研） 银箔五十片（细研）

【用法】上为末，入研了药更研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴，不问年月深浅困篤者。

69693 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】铁粉一两（细研） 生干地黄三两 鸡臛胫二两（微炙） 牡蛎二两（烧为粉） 黄

连一两(去须)

【用法】上为末,入研了药,令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】消肾。心肺热极,羸瘦乏力,口干心烦,小便如脂。

69694 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】铁粉一两(细研) 黄连二两(去须) 苦参一两(锉) 麦门冬二两(去心,焙) 土瓜根一两 牡蛎粉一两 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研) 栝楼根二两

【用法】上为末,入研了药,都研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以清粥饮送下,不拘时候。

【功用】镇心止渴。

【主治】消渴饮水过度,渴尚不止,口舌干燥,心神烦乱,坐卧不安。

69695 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】铁粉二分(细研) 蛇蛻皮半两(烧灰) 鬼督邮三分 龙齿半两 寒水石二两 败天公一两(烧灰) 防风一两(去芦头) 沙参半两(去芦头) 羚羊角屑一两半 龙胆二两(去芦头) 乌犀角屑二两 蚱蜢一两(微炙) 地骨皮二两 商陆一两 牛黄一分(细研) 石膏二两(细研,水飞过) 黄连半两(去须)

【用法】上为末,入研了药,同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,煎地骨皮汤送下,不拘时候。

【主治】妇人风邪癫狂,每发狂乱妄语,倒错不识人。

69696 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】铁粉一两 天竺黄半两 真珠末半两 蛇黄半两 牛黄一分 朱砂一分 麝香一分 琥珀半两 金箔三十片 银箔三十片

【用法】上为末,粟米饭为丸,如梧桐子大。每服五丸,以竹叶汤送下,不拘时候。

【主治】产后体虚,血邪攻心,狂语,或见鬼神。

69697 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铁粉一两 猪粪一两(烧灰) 朱砂半两(细研,水飞过) 麝香一两(细研) 蛇黄一两(以火煨后,甘草水浸三五遍,捣研作末) 端午日犬胆(一作大蟾)一枚(生姜汁浸,炙令黄焦,为末)

【用法】上为末,糯米饭为丸,如麻子大。一二岁儿每服三丸,三四岁儿每服五丸,用金银汤送下,人参汤送下亦得,每日三四次。

【主治】小儿惊热。

69698 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铁粉半两(细研) 牛黄一分(细研) 朱砂一分(细研) 黄芩一分 犀角屑一分 川大黄一分(锉碎,微炒) 人参一分(去芦头) 甘草一分(炙微赤,锉) 金箔三十片(细研) 银箔三十片(细研)

【用法】上为末,都研令匀,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三丸,以薄荷汤研破送服,不拘时候。

【功用】化涎,除烦渴。

【主治】小儿惊热。

69699 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铁粉三分 朱砂半两(细研,水飞过) 青黛三分(细研) 茯神三分 羚羊角屑三分 蛇蛻皮一条 麝香半分(细研)

【用法】上为散,粟米饭为丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】小儿惊热,心神烦闷,多啼。

69700 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铁粉一两(细研) 铅霜一分(细研) 天麻三分 水银半两 龙齿一两(细

研) 天南星一分 朱砂半两 (细研, 水飞过) 麝香一分 (细研) 黑铅半两 (与水银结为砂子, 细研)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服五丸, 以竹沥研化服。

【主治】小儿心脏积热, 时发癫痫, 吐涎沫, 作惊迷闷。

69701 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】铁粉三分 (细研) 麝香一钱 (细研) 朱砂 (细研) 天竹黄 (细研) 青黛 (细研) 蛇黄 (细研) 使君子 (为末) 黄连 (去须, 为末) 熊胆 (细研) 各一分

【用法】上为末, 粟米饭为丸, 如麻子大。一二岁每服三丸, 三四岁每服五丸, 用粥饮送下, 每日二三次。

【主治】小儿惊瘖壮热, 及睡中多汗, 心神烦躁多惊。

69702 铁粉丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《万全方》。

【组成】铁粉 (研) 三分 麝香一钱 (研) 牛黄半分 (研入) 朱砂 天竺黄 青黛 蛇黄 熊胆 (各研) 人参 茯苓 使君子 黄连 (并为末) 各一分

【用法】上为末, 粟米饭为丸, 如麻子大。一二岁每服三丸, 三四岁每服五丸, 以粥饮送下, 每日二次。

【主治】小儿心瘖肚热, 及睡中多汗, 神思烦躁多惊。

69703 铁粉丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】铁粉二两 蛇蛻五尺 (炒焦) 黄连 (去须) 泽泻 犀角 (镑) 各三分 龙齿 远志 (去心) 各半两 麦门冬 (去心, 焙) 人参 白茯苓 (去黑皮) 各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 熟水送下, 每日三次。

【主治】心虚烦热, 怔忡, 头目昏眩, 夜卧

不宁。

69704 铁粉丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】铁粉 (研, 水飞过, 干称) 三两 (再研) 鸡臛脰 (阴干) 五枚 (炙熟) 黄连 (去须) 三两 牡蛎 (炒, 研如面) 二两

【用法】上四味, 先捣二味为细末, 再与铁粉、牡蛎研匀, 炼蜜和剂, 以酥涂杵熟捣为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 渐加至四十丸, 食前煎粟米饮送下。

【主治】消渴。脏腑枯燥, 口干引饮, 小便如脂。

69705 铁粉丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】铁粉二两 朱砂一两 (研) 牛黄 (研) 天竺黄 (研) 铅霜 (研) 各半两 天南星

【用法】上为末, 姜汁煮糊为丸, 如梧桐子大。每服五丸, 生姜汤送下。

【主治】脾郁子心, 忽然瘖疾, 瞋目不能语, 喉中有声, 大便不通, 胸满欲呕, 或恶人声, 闻人声则惕然而惊, 或时叫, 有热则脉洪数。

【备考】方中天南星用量原缺。

69706 铁粉丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】太乙丹 (《普济方》卷三七四)。

【组成】水银砂子二分 朱砂 铁粉各一分 轻粉二分 天南星 (炮制, 去皮脐, 取末) 一分

【用法】上同研水银星尽为度, 姜汁面糊为丸, 如粟米大。每服十丸至十五丸, 二三十丸, 煎生姜汤送下, 不拘时候。

【功用】《御药院方》: 坠风涎。

【主治】小儿涎盛潮搐吐逆。

69707 铁粉丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引洪州张道人方。

【组成】铁粉 (此是熬盐橄榄子将烧红, 或醋泼外, 其盐霜色起, 刮) 朱砂各二钱 木

香 桔梗各半两 胡黄连 一钱 青州蝎五个

【用法】上为末，白米饭为丸，如麻子大。每服三五丸，米饮送下。

【主治】小儿食疳。夜间壮热，或时憎寒，手足或冷，兼生阴汗，渐加消瘦，多饶虚肿，下痢。

69708 铁粉丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】铁粉 木香各等分

【用法】上为末，烧米饭为丸，如绿豆大。每岁儿二丸，以粥饮送下。

【主治】小儿惊疳壮热，及睡多汗，心神烦躁多惊。

69709 铁粉丸

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】龙齿 轻粉 天麻 南星 没药 牛黄 麝香

【主治】癫发无时，吐沫心闷。

【备考】《诚书》本方用法：腊月日或端午日上为末，水为丸，荆芥汤送下。

69710 铁粉丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】铁粉 银屑 黄连 苦参 石蜜 龙胆草 龙齿 牛黄 秦艽 丹皮 白鲜皮 地骨皮 雷丸 犀角

【主治】心痿（脉痿）。三阴在下之脉虚，四肢关节如枢纽之折而不能提挈，胫缓纵而不任地。

69711 铁粉丹

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】铁粉一两（研） 朱砂半两（研，飞） 牛黄一分（研） 干蟾一只（生姜自然汁浸一时，炙焦，为末） 蝎梢七个

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如黍米大。每服三五丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】小儿诸痫搐搦，包络有涎，胸膈不利。

69712 铁粉炼

【方源】《经验良方》。

【组成】铁粉

【用法】上药用麻油炼和。每服肉豆蔻大，每日数次。

【主治】胃痛，留饮呕吐。

69713 铁粉散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】铁粉一两（细研） 金箔五十片（细研） 人参半两（去芦头） 龙齿一两（细研） 琥珀一两（细研如粉） 犀角屑一两 赤茯苓一两 子芩一两 防风半两（去芦头） 葳蕤半两 石膏一两 玄参半两 露蜂房一两（微炙） 牛黄二分（细研） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】心脏风热，头痛，面赤心烦，时多惊恐，精神错乱。

69714 铁粉散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】铁粉一两 光明砂一两 天竹黄一两 铅霜一两

【用法】上为细末。每服半钱，以竹沥汤调下，不拘时候。

【主治】风惊，心神不安。

69715 铁粉散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】铁粉一两 马牙消一两 光明砂一两 铅霜半两 金箔五十片

【用法】上为细散。每服一钱，以生地黄自然汁调下，不拘时候。

【主治】风癫，心神不定，狂走无时。

【宜忌】忌生血物。

69716 铁粉散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七六。

【组成】铁粉一两（细研） 麦门冬二两（去心，焙） 牡蛎一两（烧为粉） 知母一两 黄连二两（去须） 苦参一两（锉） 栝楼根二两 金箔一百片（细研） 银屑五十片（细研）

【用法】上为细散，入铁粉等同研令匀。每服一钱，以清粥饮调下，不拘时候。

【主治】消渴不止，心神烦乱。

69717 铁粉散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】铁粉（研）四两 天麻 白僵蚕（直者，炒）各一两 蝎梢（炒）一分 白附子（炮）半两 乌头（炮裂，去脐皮） 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）各三分 桂（去粗皮）半两 麝香 龙脑各一分 丹砂一两（三味同细研）

【用法】上十一味，以前八味为末，同后三味合研令匀。每服一钱匕，薄荷汁和酒调下，腊茶清亦得；如病势危急，研龙脑、腻粉、薄荷水调服；小儿惊风，服半钱匕。

【主治】中风涎潮搐搦，口眼喎斜，手足垂痹；破伤风、沐浴伤风、产后中风，及小儿惊风。

69718 铁粉散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】铁粉 朴消各一两 天竺黄半两 龙脑一分

【用法】上为细末。每服二钱匕，鸡子清和水调下，不拘时候。

【主治】阳毒伤寒，发狂妄走。

69719 铁粉散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】铁粉 肉苁蓉（酒浸，去粗皮，炙） 桂（去粗皮） 细辛（去苗叶） 芎藭 人参 防风（去叉） 干姜（炮裂） 黄芩（去黑心） 芍药（锉，炒） 当归（焙令香，锉） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，每日三次，早晨、午时、至夜各一次。服药十日后，有血出多勿怪，是恶物除也。

【功用】排脓。

【主治】乳痈焮肿疼痛。

69720 铁粉散

【方源】《幼幼新书》卷八引张涣方。

【组成】铁粉半两（研） 郁金（研） 牛黄（研） 真珠末（别研） 胡黄连（取末）各一分

【用法】上为细末。每服一字，温蜜汤调下。

【主治】胎惊惊风，面赤口干，大便不利。

69721 铁粉散

【方源】《幼幼新书》卷九引《胡氏家传》。

【组成】铁粉二钱 荆芥穗 薄荷 天南星（常法制） 全蝎各一钱 脑子 麝香各半钱

【用法】上为细末。每服一字，用鹅梨汁调下。

【主治】小儿急慢惊风，搐搦，目视上，不省人事，大小肠不通利。

69722 铁粉散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】铁华粉一分 硼砂一分 白矾半两（生）

【用法】上为末。每服半钱，冷水调下，连二三服。

【主治】小儿喉痹肿闷。

69723 铁粉散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】铁粉

【用法】上为细末。每用少许掺之，按令入。

【主治】脱肛历年不愈。

69724 铁粉散

【方源】《直指》卷十四。

【组成】铁粉（研细） 白薇末

【用法】上夹和敷之，即按入。

【主治】大肠本虚，风毒客热乘之，脱肛红肿。

69725 铁粉散

【方源】《得效》卷八。

【组成】颗块大朱砂一两（另研） 红明琥珀一两（另研） 天南星二两 圆白半夏二两 白矾（煨）五钱 真铁粉 白附子各二两 大川乌（生，去皮脐）一两半 羌活二两半 全蝎五十个 真金箔三十片 僵蚕一两（去丝嘴）

【用法】上为末。每服四钱，生姜四两净洗，取自然汁，温暖调服；如不任辣味，加温水少许服。

【主治】癫狂谵语，乱说视祟，不避亲疏，登高履险，或歌或笑，裸体，不饮食，数日昏不知人；及风证狂怒，或如醉如痴。

69726 铁粉散

【方源】《医方类聚》卷一五三引《烟霞圣效方》。

【组成】蛤粉一钱 铁粉二钱

【用法】上为末。每服半钱至一钱，蜜水调下，水不欲多。

【主治】热劳，胸膈如火，及一切隔热。

69727 铁粉散

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】多年生铁三两（炒） 黄丹半两 麝少许 轻粉少许 松脂一钱 道人头（微炒存性）一两 硃砂三钱半 雄黄三钱 蟾酥不以多少

【用法】将疮四围刺破，以小油调药末，置于疮内，绛帛封之，数日疔自出；如疮入腹呕逆者，煎道人头浓汁饮之。

【主治】冷疔疮，经年不效。

69728 铁粉散

【方源】《普济方》卷三二六。

【组成】当归 磁石（酒浸） 铁粉各等分

【用法】上为末。米饮调下，隔夜用角药，次日服此。

【主治】痼疾。子宫不收，或痛不可忍。

【备考】角药：用铁屑、螺青为末，磨刀水调，敷玉门上。

69729 铁粉散

《普济方》卷三八七。为《杨氏家藏方》卷十九“铁液散”之异名。见该条。

69730 铁粉散

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】广丹（炒黑）二钱 轻粉一钱五分 元寸二分

【用法】上为细末，用香麻油四两熬成膏，入白蜡五钱、松香二钱收锅。贴之。

【主治】足冷疔腐肉不尽，肌肉难生。

【备考】本方名“铁粉散”，但方中无铁粉，疑脱。

69731 铁粉煎

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】铁粉一两 牛黄一分（细研） 菖蒲三分 酥三两 犀角屑 人参（去芦头） 茯神 百合 防风（去芦头） 川大黄（锉碎） 青黛（细研） 细辛 远志（去心） 芎蒭 麻黄（去根节） 薯蓣 甘草（炙微赤，锉） 各半两 蜜半斤

【用法】上为粗末，用水三升，入银锅中煎至半升，以新棉滤去滓，却入银锅内入研了药及酥、蜜，以慢火熬，不住手以柳篦搅如稠汤，收入瓷盒中。每服二大豆许，以温水调下，每日三四次。

【主治】小儿心热，多惊悸，昼愈夜甚，象鬼神所著。

69732 铁粉煎

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】铁粉（研） 丹砂（研） 水银砂子 马牙消（研） 龙脑（研） 各一钱 天竺黄（研） 寒食面各一分 轻粉（研） 半钱 真珠末二钱 槟榔二枚（为末） 麝香（研） 丁香末各一钱 恶实一分（微炒，为末）

【用法】上为末，以生蜜少许调如膏。每服一小皂子大，用金银薄荷汤化下。

【功用】利膈镇心。

【主治】小儿惊热，心神躁闷，胸膈不利，痰涎呕逆。

69733 铁浆酒

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣惠》卷三十六。

【组成】故铁二十斤（烧赤，水五斗浸三宿，去铁澄清） 柘根三十斤（水一石煮取五斗，去滓澄清） 菖蒲（切）五斗（水一石煮取五斗，去滓澄清）

【用法】上药用米二石，并曲二斗，酿如常

法，候酒熟即开，用磁石（吸铁者）三斤为末，纳酒中浸三宿。日夜饮之，常取小小醉而眠，取闻人语乃止药。

【主治】肾寒耳聾鸣，汁出，或一二十年不愈。

【备考】本方方名，《普济方》引作“柘根酒”。

69734 铁扇子

【方源】《普济方》卷八十三。

【组成】桑叶（十二月桑树上粘带不落自干者）

【用法】煎汤洗之。数日渐觉见物，半年如旧。

【主治】青盲及迎风冷泪。

【临证举例】双目失明 昔有一妇，因丧二子，啼哀不已，偶然双目不见，如青盲之状，忽遇授此方，用至半年，其目如故。

69735 铁扇散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】老材香（即山、陕等省，年久朽棺内松香、黄蜡，谓之老材香；如无，以陈年石灰代之） 寸柏香（即里松香） 松香各一两（与寸柏香同熔化，搅匀，倾入冷水，取出晾干） 象皮五钱（切薄片，焙黄色，以干为度，勿令焦） 龙骨五钱（上白者，生研） 枯矾一钱

【用法】上为细末，贮瓷瓶内。遇有刀石伤破，用药敷伤口，以扇向伤处搽之；如伤处发肿，煎黄连水，用翎毛蘸涂。

【主治】刀石伤破，伤处发肿。

【宜忌】忌卧热处。

69736 铁扇散

【方源】《实用正骨学》。

【组成】煅龙骨 象皮 陈石灰 老松香 降香末 血竭 儿茶 白及末各等分

【用法】上为极细末。敷伤口。

【功用】止血。

69737 铁扇散

《北京市中药成方选集》。为《经验广集》卷

四“金疮铁扇散”之异名。见该条。

69738 铁屑丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】针砂一两（醋淬七次，去砂存醋） 黑枣五两（饭锅蒸二次，连皮去核捣若干，另加醋） 茵陈蒿酌加分量（梗叶连用） 皂矾（净）七钱（铜锅煅透）

【用法】后二味为细末，以黑枣肉打烂，针砂醋和入为丸。服至一料，小便多，为得力，四五料绝根。

【主治】黄疸，皮水，水肿。

【宜忌】忌腥、盐、濡润助水之品。

69739 铁屑散

【方源】《外台》卷二十四引《范汪方》。

【组成】当归 人参 细辛 甘草（炙） 苁蓉 黄耆 桂心 防风 黄芩 铁屑 芎藭 芍药各等分

【用法】上为散。每服方寸匕。

【功用】排脓内补。

【主治】痈，发背。

【宜忌】忌海藻、菰菜。

69740 铁屑散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】生铁屑二钱 母猪粪（烧灰）二钱

【用法】和蜡水调涂。

【主治】水激丹。初生于两胁，虚肿红热，乃是少阳胆经风火也。

69741 铁屑膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】煅落铁屑半两 狗头连齿骨（炙黄）一两 鹿角（烧灰）一两 真轻粉一钱

【用法】上为细末。用猪脂调敷。

【主治】漏疮，露干者。

69742 铁埤丸

【方源】《疡科纲要》引朱闾仙方。

【组成】莎根香附子 生玄胡索（勿炒）各一两五钱 草乌 广木香 桃仁各一两 川厚朴 陈皮 青皮各八钱 乳香 没药（去油净）各六钱 原麝香三钱

【用法】上药各为细末，煎糯米浓浆为丸，

每丸重一钱许，每料作一百大丸，辰砂为衣。每服一二丸，临服打碎为小块，温陈酒吞服，勿嚼细；不能饮者，砂仁汤送下。

【功用】①《疡科纲要》引朱闾仙方：消肿止痛。②《古今名方》：活血行气散结。

【主治】腕痛腹痛，痞结坚块，将为肚痛、肠痛。

【宜忌】妊者忌服。

69743 铁桶膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引泽川西府方。

【组成】荞麦杆灰（淋汁）二碗（熬至一碗）血竭 乳香 没药各三分（为末）

入汁内，再熬，去半碗，取下待冷，入：黄丹八分 雄黄八分 朱砂八分 好石灰八钱

【用法】上为极细末，共一处放药汁内搅匀成膏，瓷器收贮。用三棱针刺破，将药入内，直送深入到底。三四次痊愈。

【主治】痈疽，发背，疔疮，瘰癧，痔疮，粉瘤。

69744 铁桶膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】铁箍散（《外科传薪集》）。

【组成】铜绿五钱 明矾四钱 胆矾三钱 五倍子（微炒）一两 白及五钱 轻粉 郁金各二钱 麝香三分

【用法】上为极细末，用陈米醋一碗，杓内慢火熬至一小杯，候起金色黄泡为度，待温，用上药一钱搅入膏内。每用炖温，用新笔将膏涂疮根上，以绵纸盖其疮根。自生皱纹，渐收渐紧，再不开大为效。

【功用】《青囊秘传》：拔毒消肿。

【主治】发背将溃已溃时，根脚走散不收束。

69745 铁掬散

【方源】《幼幼新书》卷三十一引茅先生方。

【组成】天南星 铁焰粉 甘菊 草乌各二钱

【用法】上为末。每服二大钱，用葱涎调，

涂阴上，以纸贴之；小儿疝气，贴脐。

【主治】小儿疝气，吊起外肾。

69746 铁圈散

【方源】《丹溪治法心要》卷六。

【组成】乳香 没药各半两 大黄 黄连 黄柏 南星 半夏 防风 羌活 皂角 甘草节 草乌 阿胶（另入）各一两

【用法】上为末。醋调成膏，沙石器火熬黑色，鹅翎敷患处，寒者热用，热者寒用。

【主治】痈疽肿毒。

69747 铁笛丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归（酒洗）一两 怀熟地黄一两 怀生地黄一两 天门冬（去心，盐炒）五钱 黄柏（蜜炒）一两 知母五钱 麦门冬（去心，盐炒）五钱 玄参三钱 白茯苓（去皮）一两 诃子五钱 阿胶（炒）五钱 人乳一碗 牛乳一碗 乌梅肉十五个 甜梨汁一碗

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黄豆大。每服八九十丸，诃子汤送下；萝卜汤亦可。

【主治】声嘶失音。

69748 铁笛丸

《景岳全书》卷六十。即《医统》卷四十六引《医林》“向胜破笛丸”。见该条。

69749 铁笛丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】诃子肉十两 茯苓十两 桔梗二十两 青果四两 麦冬十两 贝母二十两 凤凰衣一两 瓜蒌皮十两 甘草二十两 玄参（去芦）十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱。每服二丸，温开水送下；或噙化，每日三次。

【功用】润肺利咽。

【主治】肺热咽干，失音声哑。

【宜忌】忌辛辣食物。

69750 铁脚丸

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《普济方》卷三十九。

【异名】皂荚饮（《普济方》卷三十九）。

【组成】无蛀皂荚(烧灰)

【用法】上为细末。每服三钱，以粥饮调下。

【主治】大小便关格不通，经三五日。

【备考】本方方名，据剂型，当作“铁脚散”。

69751 铁脚丸

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】皂角(炙，去皮子)不拘多少

【用法】上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒送下。

【功用】《医方考》：化下焦之气，通膀胱之滞。

【主治】①《宣明论》：大小便不通。②《医方考》：少腹急，小便不通，气不化者。

【方论选录】《医方考》：皂角之气，能通关开窍。皂角之味，能去垢涤污。

69752 铁脚丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】铁脚威灵仙(用醋煮数沸，焙) 黑牵牛(半生半炒) 金铃子(去外皮并核，只取肉，入粟米炒令黄色，去粟米不用) 草乌头(去皮尖，用粟米炒令黄色，去粟米不用) 陈橘皮(去白) 各等分

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心用白汤送下，以少点心压之。

【主治】久新脚气，膝胫肿痛，脚心隐痛，行步艰难；或攻冲作疮，脓血不止。

【宜忌】忌温面并茶。

69753 铁液酒

《普济方》卷三六四。为《圣济总录》卷一一四“铁酒”之异名。见该条。

69754 铁液散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【异名】铁粉散(《普济方》卷三八七)。

【组成】铁粉三钱 马牙消四钱 蛤粉一两

【用法】上为细末。每服一字，乳食后、临

卧以温荠汁调下。

【主治】小儿肺经积热，涎盛咳嗽，睡卧不安。

69755 铁弹丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【异名】铁弹子丸(《普济方》卷一一四)。

【组成】乌头(炮裂，去皮脐) 五灵脂 附子(炮裂，去皮脐) 各四两 狼毒半两 防风(去叉) 地龙(炒) 各二两 桂(去粗皮) 一两半 虎骨(烧存性) 一两 自然铜(煅，醋淬七遍) 三两 乳香(研) 半两 没药(研) 三两半 麝香(研) 三钱 龙脑(研) 二钱 发灰半两 当归(切，焙) 芎藭各一两 干蝎(去土沙) 半两 海桐皮(锉) 二两 天麻一两 白花蛇(酒浸，去皮骨，炙) 半两

【用法】除研者外，上为末，生姜自然汁为丸，如樱桃大。每一丸分作四服，早、晚食后服；癰缓风，生姜热酒化下；痛麻，薄荷酒送下；皮肤风毒，结聚肿痛，温酒送下；偏头痛，夹脑风，腊茶清送下；妇人血风攻注，四肢或痒或痛，心腹刺痛，当归酒送下。

【主治】一切风。癰缓卒中，痛麻；皮肤风毒，结聚肿痛；偏头痛，夹脑风；妇人血风攻注，四肢或痒或痛，心腹刺痛。

69756 铁弹丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【异名】乌龙丸(《施圆端效方》引张君玉方(见《医方类聚》卷二十四))。

【组成】五灵脂 乌头(去皮脐并尖，并生用，各取净末) 各等分

【用法】上为末，新水为丸，如弹子大，生绢袋子内盛之，悬透风处。每丸分四服，烂嚼温酒送下；吃十服后，一丸分二服；更十日后，一丸分四服。一月内必愈；如不吃酒，薄荷茶下亦得，然不如酒服。

【主治】①《圣济总录》：偏风，卒中风。②《施圆端效方》引张君玉方(见《医方类聚》)：中风肢体痹，顽疼少力。

69757 铁弹丸

【方源】《局方》卷一(绍兴续添方)。

【组成】乳香(别研) 没药(别研) 各一两 川乌头(炮, 去皮尖脐, 为末) 一两半 麝香(细研) 一钱 五灵脂(酒浸, 淘去沙石, 晒干) 四两(为末)

【用法】先将乳香、没药于阴凉处为细末, 次入麝香, 次入药末再研, 水为丸, 如弹子大。每服一丸, 食后、临卧以薄荷酒磨化下。

【功用】通经络, 活血脉。

【主治】卒暴中风, 神志昏愤, 牙关紧急, 目睛直视, 手足瘈瘲, 口面喎斜, 涎潮语塞, 筋挛骨痛, 瘫痪偏枯, 或麻木不仁, 或瘙痒无常; 及打扑伤损, 肢节疼痛。

【方论选录】《本事方释义》: 乳香气味辛微温, 人手足少阴, 没药气味苦平, 入足阳明, 皆能通瘀血, 伸缩经络; 五灵脂味甘温, 能通瘀行血, 入足厥阴, 川乌气味辛热, 入足太阳少阴, 风邪入骨者, 非此不能达; 再佐以麝香之走窜入窍, 盖瘫痪之症, 五脏无病, 病在脉络, 四肢麻痹不仁, 表里之药俱不能却, 非有毒通瘀辛香入络之品, 不能直入病处。峻利之药而用丸剂者, 亦缓攻之意也。

69758 铁弹丸

【方源】《三因》卷二。

【组成】白附子 没药(别研) 虎胫骨(酒浸一宿, 炙干) 全蝎 乌头(炮, 去皮尖) 麻黄(不去节) 自然铜(烧存性, 醋浸一宿) 各一两 白花蛇(酒浸) 半两 辰砂(别研) 一分 五灵脂一分 木鳖子二十个(去皮, 别研, 不入罗) 脑 麝各一分(别研) 乳香(柳木捶研) 一分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。用无灰酒一升浸一丸, 分二十服; 伤风鼻塞, 分三十服, 空心、临卧各一服; 大风五丸可安。

【主治】男子、妇人一切风疾, 无问远近。瘫痪中风, 口眼喎斜, 言语蹇涩, 手足痹曳, 难以称举, 或发搐瘈, 或如虫行, 或失音不语, 牙关紧急, 脚不能行, 身体顽麻, 百节

疼痛, 精神不爽, 头虚烦闷, 夜卧不安, 多涎, 胸膈不利, 口干眼涩, 多困少力, 如破伤风, 身如角弓, 口噤不开, 作汗如油; 及洗头风, 脑重, 眉梁骨痛, 卒中不语迷闷; 白癞风, 遍身瘾疹, 鼻多清涕, 耳作蝉鸣; 小儿惊风, 天钩搐搦; 妇人血风, 手足烦热, 夜多虚汗, 头旋倒地。

69759 铁弹丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】地龙(去土) 防风 白胶香 没药 木鳖(去皮) 草乌头(水浸, 炮) 白芷 五灵脂 当归各一两 细墨三钱 麝香(另研) 乳香(另研) 升麻各二钱

【用法】上为末, 糯米粥为丸, 如弹子大。每服一丸, 生姜酒送下。

【主治】中风稍缓。

69760 铁弹丸

【方源】《普济方》卷一一五。

【组成】乳香 没药 木鳖子(取肉) 白附子 虎骨各二两 麝香二钱 全蝎三两 麻黄(去根节) 三两 草乌三两 自然铜一两三钱

【用法】上为细末, 用墨一铤磨汁为丸, 一两作十丸。用酒化开服。

【主治】风湿筋骨软弱瘫痪, 一切风疾。

69761 铁弹丸

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】五灵脂四两 川乌豆二两(去皮) 生乌犀 乳香 没药一两 牛黄 麝香一钱

【用法】上为末, 腊月、重午日并花水为丸, 如弹子大。每服一丸, 用牙咬破, 荆芥汤送下。

【主治】一切惊痫。

【备考】方中生乌犀、乳香、牛黄用量原缺。

69762 铁落饮

《圣济总录》卷六十七。为《素问》卷十三“生铁落饮”之异名。见该条。

69763 铁锁匙

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】牙皂角一条 精巴豆仁二三粒

麝香少许

【用法】牙皂角入精巴豆仁，黄泥封固，煨存性，入麝香，为末。薄荷汤送下。

【主治】噤喉风。

69764 铁槌丸

【方源】《霉疔新书》。

【组成】丁子 大黄 巴豆 霜各等分

【用法】上为细末，米糊为丸，如麻子大。先服飞龙丸三日，再服此丸，每服十二丸，间三日旦暮以白汤送下；若病重者，渐加至二十丸，间四五日用之。

【主治】霉疮下疳，玉茎腐烂，筋骨疼痛。

69765 铁罩散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】香附子（炒，去毛令净）

【用法】上为细末。每服一钱，浓煎紫苏汤调下。

【功用】安胎。

69766 铁罩散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】缩砂一斤（和壳炒六七分焦，去壳用仁） 香附子二两（炒）

【用法】上为细末。食后以白汤点服；如胎动出血，用阿胶艾叶汤调服。

【功用】安胎孕。

【主治】胎动出血。

69767 铁箝散

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】树上百足虫

【用法】用新瓦焙，煨成灰，为末。调油敷。

【主治】诸疔毒。

69768 铁箍丹

【方源】《疡医大全》卷八引何龙泉方。

【组成】五倍子（炒枯黑）四两 陈小粉（炒黄） 赤小豆（炒）各二两 乳香五钱

【用法】上为细末。醋调，敷四围。

【主治】一切肿毒。

69769 铁箍散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《新效方》。

【组成】大黄 南星各一两 雄黄 草乌

各三钱 川乌 白及 防风 赤薮各半两 霜梅肉 苍耳根各一两

【用法】前八味为末，留霜梅肉、苍耳根杵烂和诸药末，再杵得所，干则入醋，成膏。敷疮四畔，过赤晕尽处，留肿高处泄毒，干则醋润之，每日易一两次。

【主治】诸恶疮红肿突起，势欲走注滋蔓。

69770 铁箍散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】芙蓉花、叶（晒干）

【用法】上为细末。以好醋调，敷贴患处；如杖疮赤肿，用鸡蛋清调贴；冷水亦可。加皂角少许尤妙。

【主治】诸疮发背，疮疖肿毒，杖疮赤肿。

69771 铁箍散

【方源】《保婴撮要》卷十一。

【组成】芙蓉叶 黄柏 大黄 五倍子 白及

【用法】上为末。用水调，搽四围。

【主治】一切疮疖痈疽。

69772 铁箍散

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】霜后芙蓉叶 苍耳草 山慈菇 白芷梢 川大黄 川黄柏（醋炙） 白及面各等分

【用法】上药用水调，敷四围，中留一孔；如干，以水润之。

【主治】疔疽肿毒。

69773 铁箍散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】多年陈小粉（炒黑）四两 五倍子末一两 龟版一两（火煨存性）

【用法】上为细末。醋、蜜调敷颈项，常用余醋润之，以助药力。

【主治】弄舌喉风。

69774 铁箍散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】乳香 没药 大黄 黄柏 黄连 南星 半夏 防风 羌活 皂刺 木鳖子 瓜蒌根 阿胶 甘草节 草乌各等分

【用法】上为末。醋调成膏，砂锅内火熬黑色，敷之，寒者热用，热者寒用。

【主治】痈疽肿痛，赤晕散漫，及诸般疮疖。

69775 铁箍散

【方源】《本草纲目》卷十三。

【组成】金丝草灰二两（醋拌，晒干） 贝母五两（去心） 白芷二两（一方加龙骨少许）

【用法】上为末。以凉水调，贴疮上；香油亦可。

【主治】痈疽疔肿。

69776 铁箍散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】凤凰蛻

【用法】烧灰。醋调，围痈疽四畔，留头出毒气。

【主治】痘后痈毒。

69777 铁箍散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】广胶四两 大黄五钱 乳香一钱 没药一钱 白蔹五钱 半夏五钱 南星五钱 黄丹四钱

【用法】上为末，用好醋半碗煎化胶，调前药末为丸，如弹子大，须留药末拌收。用时以醋煎滚化开，以新笔涂之，中留一孔。

【主治】小儿痘痈。

【临证举例】痘痈 一儿患痘毒流注，两肩痘疮如麸，薄而少神，粘着不脱，气血不足故也。以十宣托理散服之，又玉龙膏涂腿、两曲池，又铁箍散围肩毒，留孔成脓，以针刺穿，以吸筒吸出脓血，调理而愈。

69778 铁箍散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】南星 草乌 白及 白蔹 白薇 黄柏 天花粉 吴茱萸 白芷各一两 芙蓉叶二两

【用法】上为末。用鸡清调敷。

【主治】一切肿痛。

69779 铁箍散

【方源】《虺后方》。

【组成】大黄末 芙蓉叶

【用法】上为末。用鸡蛋清调敷。未成头者即消，已成者即穿。

【主治】便毒。

69780 铁箍散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】芙蓉叶（阴干）五钱 姜黄五钱 白及五钱 五倍子（炒，去虫）五钱 白蔹五钱 生大黄一两 蟹壳五个 陈小粉一两（炒）

【用法】上为末。米醋热调稀糊围之，只留中间一孔。

【主治】一切肿毒初起。

69781 铁箍散

【方源】《疡医大全》卷八引《青囊》。

【组成】芙蓉叶 生大黄 牛蒡子 白及 雄黄各等分

【用法】上为细末。看疮势大小，用三钱或五钱，以鸡翎搅入鸡蛋清内，调敷四围。

【功用】束毒。

【主治】痈疽。

69782 铁箍散

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】木芙蓉（花叶根皮皆可用） 生赤小豆（研末）

【用法】上为末。蜜或醋调，围之，中间留头，干则易之。初起可消，已成可溃，已溃可敛。

【主治】一切痈疽肿毒。

【宜忌】阳毒宜之，阴毒则必内托出阳分后方可用。

【方论选录】方中木芙蓉性辛咸平，质涎滑，清肺凉血，散热消肿，止痛排脓；赤小豆解毒行水。

69783 铁箍散

【方源】《疡医大全》卷八引吴丹垣方。

【组成】五倍子一两（微炒） 生大黄四钱 秋芙蓉叶六钱（一方有寒食面五钱）

【用法】醋一钟，入杓内熬滚，投药末搅匀，

敷患上，留顶，以纸盖之；干则以醋扫之。

【主治】阳疮肿疡，根脚散漫。

【宜忌】阴疽以及皮色不变、漫肿无头者不可敷。

【备考】《疡科遗编》有陈小粉。

69784 铁箍散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】草乌 知母 天花粉 半夏 天南星 五倍子（炒） 芙蓉叶各等分

【用法】上为末。蜜醋顿热，调敷四围，中留一孔透气。

【主治】诸般肿毒。

69785 铁箍散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】雄黄 熊胆 朱砂各二钱 京墨五钱 麝香三分

【用法】上为细末。醋调敷；已成，只用京墨磨汁调敷四围。

【主治】痈疽发背，疔毒初起或已成。

69786 铁箍散

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】大黄三两 白芷二两 川乌 草乌 南星 半夏 黄柏 白及 白蔹各一两 五倍子一两五钱 小粉四两（酸臭者，醋炒）

【用法】上为细末。米醋调匀，周围箍转，留出头。

【主治】诸肿毒。

69787 铁箍散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二引《石氏治疹经验良方》。

【组成】白及 白蔹各一两 黄柏二两 山豆根 连翘 黄芩 乳香 没药各五钱 川乌六钱 地骨皮七钱 射干三钱

【用法】上为末。茶酒调敷。

【主治】疹后余毒，流注肌肉之间，结成痈疽，肿痛。

69788 铁箍散

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】五倍子（炒）二斤 陈小粉（炒）

五斤 大黄一斤 花粉一斤

【用法】上为末。醋调敷。

【主治】一切无名肿毒。

69789 铁箍散

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】赤芍 白芷 姜黄 花粉各等分

【用法】上为末。汤火伤，麻油调敷；刀伤经络，出血不止，冷水调敷；刀伤手腕，敷于手肘之上，后用明矾、松香细末按刀口上；鼻血不止，以冷水调敷项上；无名肿毒、阳毒，醋调；阴毒，水、酒调敷。

【主治】汤火伤，刀伤，鼻衄，无名肿毒。

【宜忌】刀伤手腕，不可敷于刀伤破穿之处。

69790 铁箍散

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】花粉一两 川柏八钱 大黄六钱 半夏三钱 杜酥三分 官桂三钱 木鳖三钱 南星三钱 文蛤三钱五分

【用法】上为细末。葱蜜调敷。

【主治】痈疡阴阳症，根脚不收散漫。

69791 铁箍散

【方源】《易简方便医书》卷四。

【组成】白及 白芷 白蔹 青黛 五倍子各等分

【用法】用醋一碗，熬至半碗，调药末，以笔蘸药，从未肿处圈起，至患处之当中，空一小孔，俟干再圈，连圈数次。肿即消。亦或肉腐已成，亦只出脓一点，就此即不致溃烂难收。

【主治】一切恶疮初起，暴胀不知重轻何名。

69792 铁箍散

【方源】《理渝》。

【异名】金箍散、铁井阑。

【组成】苍耳草灰 芙蓉叶 赤小豆末

【用法】醋围。

【主治】痈毒，疔。

69793 铁箍散

《外科传薪集》。为《外科正宗》卷一“铁桶

膏”之异名。见该条。

69794 铁箍散

【方源】《外科传薪集》引倪氏方。

【组成】三年陈小粉四两（炒黑至烟出）

【用法】上为细末。用好醋调如薄浆样敷之。无脓即散，有脓即溃。

【主治】一切红白肿毒。

69795 铁箍散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】鲜鸭蛋十个（用黄，煎油） 虾蟆头三个（炭火烧存性） 银珠三钱

【用法】同蛋油搅匀，入瓷瓶内封口，勿令泄气。用鹅毛将油扫疮边周围，留顶以出毒气。

【功用】束疮根。

【主治】痈疽发背，诸般肿毒，对口诸毒痛不可忍。

69796 铁箍散

【方源】《眼科菁华录》卷上。

【组成】经霜芙蓉叶 赤小豆 生石膏各四钱

【用法】抽出硬梗，为极细末。白蜜调敷；绍酒或银花露亦可。

【主治】偷针胞肿，诸般无名目肿。

69797 铁箍散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生川乌一两 生草乌一两 生半夏一两 白及一两 赤小豆一两 芙蓉叶一两 五倍子一两

【用法】上为细末。用醋调敷四围。

【功用】消肿解毒，化坚硬。

【主治】无名肿毒初起，坚硬无头，久不消溃。

69798 铁精丸

【方源】方出《肘后方》卷七，名见《圣济总录》卷一四七。

【组成】铁精

【用法】上为细末，乌鸡肝为丸，如梧桐子大。每服三丸。甚者不过十日，微者即愈。

【主治】饮中毒，腹内坚痛，面目青黄，

淋露骨立，病变无常。

69799 铁精丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】铁精一两（细研如粉） 人参三分（去芦头） 白茯苓三分 远志三分（去心） 龙齿一两（细研如粉） 甘草三分（炙微赤，锉） 白薇三分 朱砂一两（细研，水飞过） 熟干地黄一两 茯神三分 麦门冬三分（去心，焙） 防风三分（去芦头） 独活三分 赤石脂三分 白术三分

【用法】上为末，入研了药都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】心脏风虚惊悸，恍惚悲愁，妄语失志。

69800 铁精丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】铁精一两 龙齿一两 犀角屑一两 人参一两（去芦头） 石菖蒲三分 远志三分（去心） 茯神一两 防风一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 生干地黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】风惊，狂言妄语，不得睡卧。

69801 铁精丸

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】铁精一两（细研） 龙齿一两（细研） 犀角屑一两 茯神一两 天竹黄三分 人参三分（去芦头） 远志三分 防风三分（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 菖蒲三分 白鲜皮三分 龙脑半两（研入） 生干地黄一两 金箔二十一片（研入） 银箔二十一片（研入）

【用法】上为细散，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以竹叶汤放冷送下，不拘时候。

【主治】妊娠中风，心神恍惚，狂言妄语，惊悸烦乱，不得睡卧。

69802 铁精丸

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】铁精 黄芩 芍药 芫花(炒) 人参 甘遂(炙) 茯神各三分 消石 牛黄各三分 蛇蛻皮二寸 甘草一分(炙)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服三丸,每日二次。不止加之,取微利为度。

【功用】安五脏,定心气。

【主治】少小心气虚,或可以发痫及未发。

69803 铁精丸

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】铁精一两(研) 石膏 甘草(炙)各二分 当归二分 麝香半分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服二丸,每日三次。先服铅丹丸,后服此方。

【主治】初得痫,时时发。

69804 铁精汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】黄铁三十斤(以流水八斗扬之三千遍,以炭五十斤,烧铁令赤,投冷水,复烧,如此七遍,澄清取汁二斗煮药) 半夏 麦门冬各一升 白薇 黄芩 甘草 芍药各四两 人参三两 大枣二十枚 石膏五两 生姜二两

【用法】上咬咀。纳前汁中煮取六升,每服一升,每日三次,两日令尽。

【主治】风痹。三阴三阳厥逆,寒食胸胁支满,病不能言,气满,胸中急,肩息,四肢时寒热不随,喘悸烦乱,吸吸少气,言辄飞随,虚损。

【方论选录】《千金方衍义》:方中铁精镇摄虚阳,且经烧煅,从治阴火最捷;石膏性虽大寒而无郁遏邪热之患,以味辛淡殊非苦寒之比;半夏性虽辛燥,力通阴阳;麦门冬治心腹结气;甘草治五脏六腑寒热邪气;人参补五脏,安精神,除邪气;黄芩治诸热;芍药治血痹;生姜通神明;大枣养脾气;白薇治暴中风身热,脉满,忽忽不知人,狂惑,邪气寒热,一皆本经主治,白薇一味可抵竹叶石膏汤中竹

叶,柴胡汤中柴胡,柴胡桂枝汤中桂枝之用;尤赖铁精一味,不使虚阳上扰,则方中诸病瓦解冰释。

69805 铁精散

【方源】《外台》卷十五引《范汪方》。

【组成】铁精一合(研) 芎藭 防风各一两 蛇床子五合

【用法】上为末。每服一钱匕,酒送下,每日三次。

【主治】五癰。

69806 铁精散

【方源】《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】铁精 茯苓 芎藭 桂心 猬皮(炙)各三两

【用法】上为末。每服一钱五匕,以酒送服,每日三次。不知,稍增至一钱以上,知之为度。

【主治】惊恐妄言,或见邪魅,恍惚不自觉,发作有时,或如中风。

【宜忌】忌酢物、生葱。

69807 铁精散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】铁精一两 生干地黄一两 远志一两(去心) 桂心三分 黄耆一两(锉) 紫石英一两(细研) 防风三分(去芦头) 当归三分(锉,微炒) 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 甘草半两(炙微赤,锉) 白术半两 羌活半两 茯神一两 麦门冬三分(去心)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血风,心气虚,惊悸喜忘,不能进食。

69808 铁精散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】铁精末(研) 磁石(研) 滑石(研)各等分

【用法】上为极细末。粉肠上,后以温酒调

下一钱匕，空腹、日午、夜卧各一次，夜半再一次。

【主治】金疮肠出。

69809 铁鞋散

【方源】《包氏喉证家宝》。

【组成】黑枣一枚（去核）

【用法】入雄黄末填满，用盐搓麻线扎紧，外用湿纸包，煨存性，为末。搽之。

【主治】走马牙疳。

69810 铁镞散

【方源】《医方类聚》卷一八五引《烟霞圣效方》。

【组成】龙骨（紧者妙） 赤石脂（紧者妙）各半两

【用法】上为细末。每用时覷疮口大小贴之。

【主治】一切刀斧所伤。

69811 铁魔丹

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】大枫子一斤（用麻黄、闹杨花各四两，酒煮一昼夜） 苦参皮（酒拌，九蒸晒）一斤 荆芥穗（净末）一斤 白蒺藜（微炒）一斤 狗虱胡麻（微炒，净末）一斤

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，温酒送下，每日三次。

【主治】诸般风症。

【加减】春，加柴胡、草麻、升麻、川芎、藁本各四两；夏，加桔梗、黄芩、半夏、银柴胡各四两；秋，加石膏、甘草、玄参、当归各四两；冬，加知母、生地、五加皮各四两；心经，加茯苓、朱砂、远志、山萸、蒲黄、当归各四两；肝经，加荆芥、白芷、风藤、羌活、白芍、甘草、地黄各四两；脾经，加荆芥、白术、陈皮、苍术、独活、乳香、没药、血竭各四两；肺经，加天麻、桔梗、半夏、贝母、柴胡、沙参、巴戟、胡麻各四两；肾经，加黄柏、知母、茯苓、当归、升麻、草乌、甘草各四两；胃经，加枳壳、藿香、苍术、半夏、厚朴、柴胡、益智、草果、白豆

蔻各四两。

69812 铁罐膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】桑柴炭 荞麦秸灰 石灰各一碗 芦灰少许

【用法】用瓦罐一个，旁钻一孔塞住，前口倾灰填罐内，用水注满，著厚纸封固一复时，用芦筒插在旁孔内，细淋之，尽其水，去灰，将水于小锅内慢火熬，用铁片搅不休，看稀稠滴水内不散为度，用铁罐子盛，封定口。量疮大小贴用。

【功用】止痛追毒，去死肉。

【主治】一切恶疮内毒，肠风痔瘻。

【备考】方中芦灰，《准绳·疡医》作“炭灰”。

69813 铁布衫丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】自然铜（煅红，醋浸七次） 当归（酒洗，捣膏） 无名异（洗去浮土） 木鳖子（香油搽壳上，灰焙，用肉） 乳香 没药 地龙（去土，晒干） 苏木各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服三丸，用白汤送下，受刑前预服之。

【功用】令受刑不痛。

69814 铁布衫丸

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】归尾 地龙（制末） 川芎 无名异 儿茶各一两五钱 乳香（制） 制没药各五钱 血竭一两 麝香一钱 木鳖仁（制末）一两五钱

【用法】上为末，醋糊为丸，如圆眼大。每服一丸，以酒送下；不杖，以葱汁解。

【功用】令受刑不痛。

69815 铁柱杖丸

【方源】《烟霞圣效方》引临清张先生方（见《医方类聚》卷二三八）。

【异名】铁柱杖（《丹溪心法附余》卷十六）。

【组成】草乌头一两（生，为细末）

【用法】用葱白二根烧熟，去粗皮，将药末

同漉得所,于臼内捣极烂为丸,如梧桐子大。每服七丸,食前以温酒送下;妇人产后,用温醋汤送下,每日二次。

【主治】①《烟霞圣效方》引临清张先生方(见《医方类聚》):妇人产后血风,腰腿疼痛。②《丹溪心法附余》:疔疮发背,头风。

【备考】《丹溪心法附余》本方用法:用葱白去须叶捣烂为丸,如豌豆大,以雄黄为衣。每服一丸,先将葱细嚼热酒送下,或有恶心吐三四口,用冷水一口止之,即卧以被厚盖,汗出为度。

69816 铁弹子丸

《普济方》卷一一四。为《圣济总录》卷七“铁弹丸”之异名。见该条。

69817 铁爪长匙散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】木工用旧铁钻头上锈(须乘转动极热时刮下,否则不灵)一厘 药珠二厘 壮男指甲炭三厘 郁金二分 雄黄二分 硼砂三厘

【用法】前三味同研,后三味同研,临用时拌匀,为极细末。吹之。

【主治】白喉肿闭极危者。

69818 铁砂三黄汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】铁砂 大黄 黄连 黄芩

【用法】水一盞半,煮取一盞,温服。

【主治】妇人肝郁盛怒,气逆躁扰;或不省人事。

69819 铁砂牡蛎汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】铁砂 柴胡 大黄 牡蛎 茯苓 桂枝 甘草

【用法】水煎,温服。

【主治】妇人由郁怒而心神不宁,言语错乱,似有鬼祟者。

69820 铁粉牛黄丸

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】铁粉(再研,水飞过,焙干)二两 辰砂(别研,水飞极细,焙干)一两 天竺

黄一分(别研极细) 牛黄半两(细研,加至一两) 铅白霜一分(别细研)

【用法】煎糯米粥饭为丸,如绿豆大。每服十五丸,人参汤送下;糯米饮送下亦佳;辰砂丸同服更佳,每日二次。

【功用】化风痰,止心忪悸。

【主治】心经留热,中风太过,虽不涎潮厥倒,渐觉四肢不举,语涩面青,精神昏浊,形似醉人,目深瞳拽。

69821 铁粉乌鸦散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】乌鸦一只(去肠肚及嘴足) 铅丹 黑铅 铁粉(研)各二两 丹砂一两(研)

先将铁粉并铅丹入铁器内熟炒,次入黑铅一处结成砂子,入在乌鸦腹内缝合,以罐子盛,用物盖定,盐泥固济,放干,用熟火一秤煅令通赤,取出为细末,次入丹砂更研如粉,入后七味:

天麻 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 防风(去叉) 芎藭 干蝎(去土,炒) 天南星各二两

【用法】上为细散,入麝香少许再研令匀。每服半钱匕,临卧以冷酒调下。

【主治】积年痼病。

69822 铁锈鸡纳丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】铁锈 没药(忌火)各一钱 金鸡纳霜 花椒各五分

【用法】上为细末,炼蜜为丸六十丸。每服三丸至五丸。

【主治】妇女经血不调,身体羸弱,咳喘,或时作寒热。

【方论选录】铁锈荣养血分,流通经脉,更有以铁补铁之妙;金鸡纳霜善治贫血,且又能入手足少阳之经以调和寒热也;又佐以花椒者,恐金鸡纳霜之性偏于寒凉,而以辛热济之,使归于和平也。

69823 铁筒拔毒膏

【方源】《急救仙方》卷一。

【组成】好石灰(烧皂角熏,不过大) 糯米(南星、当归、赤芍同炒) 砂牯牛 斑蝥

上为细末,用后灰煎水调用。

真石灰 桑柴灰 脂麻灰 皂角三四皮 柳柴皮

【用法】共煎浓汤,再入锅内慢火熬之,待汤面上有白霜起方住火,以器贮之,用调前药,小小点之三五次。皮破毒出,疮便可散。

【主治】疮疖初发。

【加减】去疔头,加硃砂。

69824 铁筒拔毒膏

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】荞麦稽灰 桑柴灰 矿石灰各三碗 真炭火一盞

【用法】将四灰和匀,用酒漏一个,将棕帕塞住窍,用水三十碗熬滚,淋灰汁,将汁复熬滚,复淋过,取净药力,慢火入瓷罐煎熬,以纸数重固口,熬至一碗为度,乘滚入矿石灰末搅匀如糊之样,入黄丹取如微红之色,密封固罐口,候冷,次日将厚实瓷罐收贮,密塞其口。每用少许涂毒顶之上,即时咬破,不黑又点,以黑为度;如药干,以唾调涂;如要急用,只将烧大柴灰九碗,石灰三碗,淋灰汁,熬浓汁如前制用。

【功用】消毒。

【主治】痈疽,疔毒,癰痂,六瘤,疔疮,顽癣,痔漏,痣赘,恶疮,肿疡,一切恶肉恶核等毒已成者。

69825 铁罐点毒膏

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】矾子石灰(用皂角同在火内炮烟尽为度)二两 糯米(南星、当归、赤芍同炒熟)二合 砂牯牛(即旱螺)七个(去壳) 斑猫七个(炒,同米熟去足翅)

上共捣罗细末,用铁罐子收贮听用。

桑柴灰 芝麻稽灰 皂角灰 荞麦稽灰 密脑各一斤(同一处淋灰汁约三斗)

【用法】入大锅内,慢火熬之,待十去其七,

汁面上有霜白起,以瓷器贮之。如遇疮毒,用此汁调前药,小小点之。三五次自然疮破毒散,初起时点之即破,无脓即散,有脓即出。

【主治】诸痈疽、疔毒、疔肿、便毒等疮。

【宜忌】如疮出水时则不可点破。

69826 铁瓮申先生交感丹

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】茯神四两 香附子一斤(去毛,用新水浸一夕,炒令黄色)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,侵晨以降气汤嚼下。

【主治】心血少而火不能下降于肾,肾气急而水不能上升至心,中焦隔绝,荣卫不和,上则心多惊悸,中则寒痞,饮食减少,下则虚冷遗泄,甚至于阳痿不兴,脏气滑泄。

铃

69827 铃石散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】铃石一分 石决明一分 甘菊花一分 井泉石一分 夜明沙一分(微炒) 黄连一分(去须)

【用法】上为细散。每服二钱,以米泔同煮猪子肝一具,烂熟服之。

【主治】小儿眼疳,生翳膜,遮睛欲失明。

铅

69828 铅丹

【方源】《三因》卷十七。

【异名】催生铅丹(《济生》)。

【组成】水银二钱 黑铅一钱(铤内熔,投水银结成砂子)

【用法】用熟绢巾纽出水银,细研,以汗衫角纽做丸,如绿豆大。每服一二丸,临坐草时以香水吞下。

【功用】催生。

【主治】难产横逆。

69829 铅酒

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】黑铅一斤 甘草(炙, 锉)三两

【用法】用酒一斗, 置一空瓶在旁, 先以甘草入酒中, 然后熔铅投之, 却滤出酒在空瓶内, 取铅依前熔投; 如此九度, 并甘草去之, 留酒。恣饮。醉寝。

【主治】发背。

69830 铅酒

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】铅五两 酒一斗(无灰者)

【用法】将铅熔成汁投入酒中, 又取铅熔, 再投酒中, 如此十度, 然后净滤澄清。时饮三合至五合。

【主治】热毒肿, 或身生痂浆。

【宜忌】不可过醉, 醉甚则吐, 损正气。

69831 铅丹丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】铅丹一两 栝楼根一两 虎掌半两(汤洗七遍, 生姜汁拌, 炒令黄) 乌头半两(炮裂, 去皮脐) 白术半两 铁粉二两(细研) 鸱枭头一枚(烧为灰) 甜葶一两(隔纸炒令紫色) 茺苢一两 川椒半两(去目及闭口者, 微炒去汗) 大戟半两(锉, 微炒) 天雄半两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以温酒送下, 不拘时候。

【主治】风癫。发时吐涎, 起卧不定, 及大小便不能知觉。

69832 铅丹丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】铅丹一分(炒令紫色) 人参一两(去芦头) 天雄一分(去皮脐, 生用)

【用法】上为末, 入铅丹研令匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三丸, 以粥饮送下, 于发前后各一服。当四肢淫淫为效。

【主治】一切疰。

69833 铅丹丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铅丹半两 朱砂半两(细研, 水飞

过) 铁粉半两 细辛一分 独活一分 牛黄一分(细研) 雄黄一分(细研) 蛭螂五枚(微炙) 露蜂房一分(炙黄) 人参一分(去芦头) 汉防己一分 蛇蛻皮五寸(炙黄) 桂心二分 甘草一分(炙微赤, 锉) 鸡头一枚(去毛, 炙令黄) 赤茯苓一两 川椒一分(去目及闭口者, 微炒去汗用)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服五丸, 以粥饮送下。

【主治】小儿惊痫复发, 眩闷倒蹶。

69834 铅丹丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】铅丹一分 铅霜一分 黄连末半两 石膏末半两

【用法】上为末, 糯米饭为丸, 如绿豆大。每服五丸, 用新汲水淘米泔研下, 每日三四次。

【主治】小儿疳, 大渴不止。

69835 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】黑铅(铅汁入纸灰, 以柳木椎同研成粉, 罗过)一两

【用法】上为极细末, 用米醋一升同入砂石器内熬为膏, 人干煎饼少许捣令熟为丸, 如赤小豆大。每服十丸, 生姜汤或米饮送下, 不拘时候。

【主治】胃反, 呕吐哕逆。

69836 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】铅丹 半夏(汤洗去滑七遍)各一两 山芋 人参各三分 干姜(炮) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙)各半两 甘草(炙)一分

【用法】上为末, 汤浸煎饼为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 煎人参汤送下。

【主治】久积痰壅, 胃反, 呕逆不下食。

69837 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】铅丹 白矾各一两

【用法】上为末，纳瓶中，瓦盖头，火煅通赤，取出，饭为丸，如绿豆大。每服十丸，细嚼，心痛，生姜汤送下；腹痛，醋汤送下。

【主治】心痛及腹痛。

69838 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】铅丹半钱 丹砂（研）二钱 巴豆七枚（去皮心，出油尽） 杏仁七枚（汤退去皮尖双仁，研） 乳香（研）一钱 砒霜半钱

【用法】上为细末，熔黄蜡为丸，如黄米大。每服三丸至五丸，食前、临卧煎干姜、甘草汤送下。

【主治】赤白痢腹痛不止。

【加减】秋后，去砒霜，加砒黄末半钱。

69839 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】铅丹（炒）三两 安息香一两（入胡桃仁相和，研） 白术 鬼督邮各一两半 木香 柴胡（去苗） 獭肝（炙干）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】鬼注，传尸，骨蒸。

69840 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】铅丹半两 黄芩（去黑心）一两 蛤粉一两半

【用法】上为细末，别熔黄蜡一两，入药内同研匀，更入薄面糊为丸，如弹子大。批猪肝作薄片裹药，米泔煮肝熟为度，空心、食前烂嚼，用煮米泔汤送下，临卧再服。

【主治】雀目年深不愈。

69841 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】铅丹一两 蜀椒（去目并闭口者，炒）一分 莽草半两 附子（半生半熟）一枚

【用法】上为末，面糊为丸，如芥子大。用

绵裹一丸，纳虫孔中。

【主治】牙齿疼痛。

69842 铅丹丸

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】铅丹一两（再研）

【用法】用白沙蜜调如稀糊，同入银器内搅匀，炒，候铅丹紫色，可丸即丸，如皂子大。每用一丸，沸汤化，乘热淋洗。

【主治】小儿目暴赤痛。

69843 铅丹散

【方源】方出《肘后方》卷六，名见《千金》卷六。

【组成】女菀三分 铅丹一分

【用法】上为末。每服一刀圭，以醋浆送下，每日三次。服十日，大便黑；十八、十九日，如漆；二十一日，全白便止，过此太白。

【功用】令人面白。

【主治】《千金》：面黑。

【宜忌】年过三十难复疗，服药忌五辛。

【方论选录】《千金方衍义》：面黑属肾，故用铅丹专祛肾气发外之滞；女菀专泄肺气。

69844 铅丹散

【方源】《千金》卷二十一注文引《古今录验》。

【异名】胡粉散（《儒门事亲》卷十三）。

【组成】铅丹 胡粉各二分 栝楼根 甘草各十分 泽泻 石膏 赤石脂 白石脂各五分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，水送下，每日三次；壮人一匕半。渴甚者，夜二服，腹痛者减之。丸服亦佳，每服十丸。服此药了，经三两日，宜烂煮羊肝空腹服之；或作羹亦得，宜汤淡食之。候小便得咸，更即宜服茯苓丸兼煮散将息。

【主治】①《千金》（注文）引《古今录验》：消渴，小便数，兼消中。②《普济方》：消中，心神烦闷，头痛。

【宜忌】《千金》（注文）引《备急方》：不宜酒下，用麦汁下之。

【方论选录】《千金方衍义》：栝楼治肺胃燥渴；甘草解毒安中；石膏清胃止渴，兼解石药之悍；铅丹、胡粉、赤白石脂镇摄痰涎，分走血气。石膏解石药毒，甘草解草药毒，栝楼专主消渴，泽泻兼治水逆，总解热而化下毒。

69845 铅丹煎

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】铅丹二两 栝楼八两 茯苓 甘草（炙）各一两半 麦门冬八两（去心）

【用法】上为散。每服方寸匕，旦以浆水送下，每日二次。

【主治】消渴。

69846 铅丹散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】黄连散（原书卷五十九）。

【组成】铅丹（研）一两 栝楼根三两 黄连（去须） 白石脂各一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，食后以浆水调下。

【主治】消渴羸瘦，小便不禁，久内燥引饮不已。

69847 铅丹散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】铅丹不拘多少

【用法】上为细末。每服二钱匕，发时以新汲水调下。

【主治】鼻久衄。

69848 铅丹散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】铅丹 蛤粉各等分

【用法】上药同炒令变色。掺疮上。水即出。

【主治】破伤水入，肿溃不愈。

69849 铅丹散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】铅丹（炒，研） 定粉（炒，研）各一两 蛇蛻（炙焦）二条 夜明砂（炒） 芦荟（研，临时入）各一分

【用法】上五味，以前四味为散，用醋拌和为饼，就热铤上煨熟，为细散，后入芦荟和匀。每服一字匕，早晨、日午以米饮调服。

【主治】小儿疳痢。

69850 铅丹煎

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】铅丹半两 密陀僧半两 白蜜四两

【用法】先以蜜于铤子内煎令沸，下铅丹，同煎令紫色，次下密陀僧搅令匀成煎，于瓷合盛。每用小豆大，咽津。

【主治】小儿口疮。

69851 铅丹膏

【方源】方出《圣惠》卷三十三，名见《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄丹半两 鲤鱼胆五枚（取汁）

【用法】使药相和如膏。每日三五度，以铜箸取少许，点眦中。

【主治】眼卒生珠管。

69852 铅丹膏

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】铅丹一分 铅霜三分 蛤粉半两 晚蚕蛾半分（微炒） 麝香一分

【用法】上为极细末，用蜜二两熬成膏。每上取膏半钱，涂在口中。

【主治】小儿口疮。

69853 铅丹膏

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】铅丹半两 蜡 松脂 乳香各一两（研） 麝香（研）一分

【用法】除松脂、蜡外，上药各为末，在瓷器内先炼松脂，次下蜡及铅丹、乳香等，慢火煎少时，候冷，摊于绢上。以贴肿处。

【主治】伤寒后毒气攻，手足虚肿，及一切肿毒。

69854 铅丹膏

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】铅丹四两 杏仁二七枚（汤浸，去皮尖） 白蜜四两

【用法】先将杏仁研如膏，次入铅丹及蜜，更研令极细，用绢袋盛，入瓷瓶子内盛，坐在汤中煮，如入行五里许为度，去滓。临点时，以少许并花水于碗中，铜箸蘸少许，点

在目眦头。

【主治】胎赤不计久近。

69855 铅丹膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】铅丹（以绢罗过） 黄连（去须，为末） 蕤仁（去皮，研）各半两 盐花一分

【用法】以蜜三两，用文武火先煎蕤仁、盐，待匀沸，即下铅丹、黄连，煎如膏，瓷盒盛。每次用半小豆大，以新汲水调化，箸点，每日三次。

【主治】暴赤眼疼痛。

69856 铅丹膏

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】生地黄汁三合 蜜三合 铅丹一两半 杏仁（去皮尖双仁，别研如面）七十枚

【用法】上药合和一处调匀，银器内煮，用槐枝搅，不得住手，看色紫即成。每次取少许，口内含化，吐津。

【主治】舌上生疮。

69857 铅丹膏

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】铅丹十两 风化石灰 猪脂各一斤

【用法】上三味，二味为细末，以猪脂搜作饼，火烧通赤，如此五度，药成为末。湿疮干贴；如干疮，即作膏，用猪脂调纸上贴。

【主治】小儿恶疮。

69858 铅回散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】铅（半斤，铜杓内化开，倾入水内，将铅取起，再化再倾，如此百遍，铅尽为度，候半日，待水澄清倾去，用钵底内沉下铅灰，倾在三重纸上，下用灰收干水气，取起晒干） 硫黄各等分

【用法】上为细末，罐收。每服一钱，温酒调服。至重者不过三次即效。

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛，朝轻夜重，

喜热手按揉者。

69859 铅红散

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】舶上硫黄 白矾灰各半两

【用法】上为末，入黄丹少许，染与病入面色同。每上半钱，津液涂之，洗漱罢及临卧再上。服防风通圣散速效。

【主治】风热上攻阳明经络而致肺风，面鼻紫赤刺癰疹。

【备考】方中舶上硫黄用量原缺，据《丹溪心法》补。

69860 铅汞丸

《医便》卷一。为原书同卷“苍术丸”之异名。见该条。

69861 铅汞丹

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】铅（一两，用黑狗头一个，将铅入脑内，盐泥重包，炭火烧红取出）一钱 粉霜二分 月石一分半

【用法】上为极细末，贮瓷器听用。如舌断，先将米泔水入带须葱头煎汤待温，令漱净，以绵胭脂拭干，敷药口内，一时即长，长至原旧光景，即以水洗去药，恐过长也；阳腐去者，以葱汤熏洗，敷之亦如上法。

【主治】杨梅疮后舌断及阴阳烂去者。

69862 铅汞膏

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】苏木十斤

上研碎，以水三四桶煎，试滴水不散，去滓加：

紫草二斤 当归 红花各一斤

上锉，入内再炼，去滓再加：

乳香 没药 血竭 沉香 檀香 香蛇 人参 麝香各等分

【用法】上为末，白蜜二斤同煎炼成膏，收贮。任服。

【主治】风癰血枯，手足僵挛，身内干焦，骨瘦如柴。

69863 铅金丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】铅霜半两(研) 金箔十片(研入药) 半夏三分(汤洗净,生用) 天南星(生用) 雄黄(研)各二两 白矾(生用) 防风(去叉)各半两 白茯苓(去黑皮)一两半

【用法】上为末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后、临卧以生姜薄荷汤送下。

【功用】镇惊,利头目,化痰壅。

【主治】心受风邪。

【宜忌】药丸了,不可见日。

69864 铅参散

【方源】《普济方》卷一七七。

【组成】黄丹(煅,研,别入)一两 蚌粉(炒,研,别入)一两 人参三分(去芦) 天花粉三分

【用法】上为细末。每服一大钱,空心、食前浓煎麦门冬汤调下。

【主治】消渴。

69865 铅壶酒

【方源】《外科学讲义》。

【组成】黑铅六斤(打成壶内盛) 好烧酒十五斤 土茯苓半斤 乳香三钱

【用法】封固,隔水煮一日一夜,埋土中七日出火毒。早、晚随量饮之。用瓦盆接小便看,有如粉出者为验,服至筋骨不痛乃止。

【主治】误服轻粉、甘汞等劫药治杨梅疮,其毒入经络骨骱,或口齿破烂,或筋骨酸痛挛缩,久易溃烂,经年累月,甚至终身不愈,致成残废。

69866 铅粉散

《普济方》卷三〇九。为《理伤续断方》“接骨散”之异名。见该条。

69867 铅粉散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】黑铅(四两,铁杓化开,倾入水中,取起再化,如此百遍,以铅尽为度,去水澄下者)三钱 松脂一钱 黄丹(飞,炒)五分 轻粉五分 麝香一分

【用法】上为末。先用葱汤洗净,麻油调,涂疮口,油纸盖外。

【功用】回阳。

【主治】冷疔生于脚上,初起紫白泡,疼痛彻骨,渐至腐烂,深孔紫黑,血水气秽,经久不愈。

69868 铅粉膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】铅粉(煅黄)9克 松香9克 黄丹3克 香油60毫升

【用法】常法熬膏。外用。

【主治】疖。

69869 铅梳子

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】铅十两 锡三两(二味同销为汁,去滓令净) 没石子二枚 诃黎勒皮二枚 婆罗得四枚 硫黄一分(细研) 酸石榴皮半两 磁石一分 绿矾一分 针砂半两(醋炒) 熟干地黄半两(烧令黑) 乌麻油一合(炒焦) 茜草根一两(锉) 胡桃瓢半两

【用法】上为末,先销铅、锡为汁,取诸药末一半入铅锡中,以柳木篦搅令匀,便倾入梳模子中,俟冷取出,开齿,修事如法,将余药于铛中以水煮梳子三日三夜,若水耗,常以热水添之,日满取出,净洗拭干,以故帛数重裹三五日。以熟皮子衬手,梳之一百下,如乌色。每梳先用皂荚水洗净候干,即梳之。

【功用】黑髭鬓。

69870 铅黄丸

《圣济总录》卷五十八。为《圣惠》卷五十三“枯楼根丸”之异名。见该条。

69871 铅黄散

【方源】方出《圣惠》卷五十三,名见《圣济总录》卷五十八。

【组成】铅一斤 水银二两(先熔铅,旋投入水银,候铅面上有花晕上,便以铁匙掠取,于乳钵内研细) 皂荚一挺(不蛀者,涂酥炙令黄,去皮子,入麝香一钱,同研为末)

【用法】上为散。每抄皂荚末一钱匕，以水一中盏，煎至六分，去滓放温，食后调下铅黄末半钱匕。

【主治】消渴。饮水过多，不知足限。

69872 铅糖水

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】铅糖一分 净水八钱

【用法】上搅匀。点眼目，每日三次。

【主治】两险粘睛及膜证。

69873 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】铅霜一两（研入） 犀角屑半两 桑螵蛸半两（微炒） 赤箭一两 白花蛇二两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 白僵蚕一两（微炒） 白附子半两（炮裂） 干蝎半两（微炒） 天南星半两（炮裂） 附子一两（炮裂，去皮脐） 半夏半两（汤浸七遍去滑） 羌活二分 乌头半两（炮裂，去皮脐） 羚羊角屑三分 防风半两（去芦头） 麝香一分（研入）

【用法】上为末，人研了药令匀，水煮槐胶为丸，如绿豆大。每服十丸，以温酒研下，不拘时候。

【主治】急风，身强口噤，手足拘急。

【备考】本方原名铅霜散，与剂型不符，据《普济方》改。

69874 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】铅霜二两（细研） 金箔一百片（细研） 银箔一百片（细研） 人参一两（去芦头） 茯神一两 远志一两（去心） 细辛一两 菖蒲一两 苦参一两（锉） 黄芩一两 栀子仁一两 犀角屑一两 龙齿二两（细研） 朱砂一两（细研，水飞过）

【用法】上为末，入研了药更研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】风痫久不愈，发时吐涎沫，作恶声音，不识人。

69875 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】铅霜三分（细研） 栝楼根一两半 甘草半两（炙微赤，锉） 石膏三分（细研） 知母三分 子芩三分 铁粉半两（细研） 黄连半两（去须） 朱砂半两（细研）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以清粥饮送下。

【主治】消中。渴，饮水不多，心中烦乱，四肢燥热，卧不安席。

69876 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】铅霜（细研） 天麻 牛黄（细研） 天竹黄（细研） 甘草 麝香（细研） 各一钱 茯神二钱 龙脑一分（细研） 朱砂半两（细研，水飞过） 人参二钱

【用法】上为末，入研了药都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，以薄荷汤研下，不拘时候。

【功用】镇心安神化涎。

【主治】小儿风热。

69877 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铅霜半分 滑石一分 膩粉一分 真珠末一分 巴豆霜半分 麝香一分 光明砂一分

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如粟米大。一岁每服一丸，以薄荷汤送下。

【主治】小儿惊热，心神忪悸，痰涎壅滞。

69878 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铅霜半两（细研） 人参半两（去芦头） 茯神半两 麝香一分（细研） 朱砂半两（细研，水飞过）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【功用】镇心神。

【主治】小儿惊热。

69879 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铅霜半两（细研） 铁粉一两（细研） 朱砂一两（细研，水飞过） 麝香半分（细研） 马牙消半两 人参三分（去芦头） 羌活一分 芎藭一分 白茯苓一分 牛黄一分（细研） 干蝎一分（微炒） 龙胆一分（去芦头） 川大黄三分（锉碎，微炒）。

【用法】上为末，人研了药同研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以荆芥、薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】小儿惊痫发热，搐搦不定。

69880 铅霜丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】铅霜一分 膩粉一分 巴豆五粒（去皮心，研，纸裹压去油）

【用法】上为末，糯米饭为丸，如粟米大。每服一丸；三岁以上加丸，以通草、薄荷汤送下。

【主治】小儿食痢，乳食不消，心腹结实，壮热烦闷，摇头反目，口吐涎沫。

69881 铅霜丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】铅白霜丸。

【组成】铅霜半两 青黛 栝楼根末各一两 龙脑少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后微嚼，煎竹叶汤送下；新汲水下亦得，每日三次。

【主治】消渴，口干烦躁，饮水无度。

69882 铅霜丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】铅白霜 铅丹 定粉 铁粉 龙骨 蛤粉 马牙消各等分

【用法】上为细末，人麝香少许，蜗牛肉为丸，如梧桐子大。每服一丸，倒流水化下。

【主治】小儿疳渴。

69883 铅霜散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】铅霜（细研） 马牙消 人参（去芦头） 郁金 茯神各半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，煎麦门冬温水调下，不拘时候。

【主治】伤寒得汗后，心狂谵语欲走。

69884 铅霜散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】铅霜一分（细研） 牛黄一分（细研） 麦门冬一两（去心，焙） 白菊花半两 黄连三分（去须） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，入牛黄、铅霜同研令匀。每服二钱，以淡竹沥二合调下；如无竹沥，磨犀角温水调下亦得，不拘时候。

【主治】伤寒，心脾壅热，舌肿，多吐痰涎。

69885 铅霜散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】铅霜一分（研） 川升麻半两 黄药半两 硼砂一分（研） 地龙半两（微炒） 马牙消一分（研） 寒水石半两（研） 蛇蛻皮半两（烧为灰） 牛黄半两（研） 太阴玄精半两（研） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】热病，咽喉肿痛不利。

69886 铅霜散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】铅霜一分（细研） 磁药一两（细研） 马牙消一两（细研） 龙脑一分（细研） 羚羊角屑二分 黄耆一两（锉） 黄芩二两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以冷水调下，不拘时候。

【主治】风热上攻胸膈，咽喉肿痛，心神烦热。

69887 铅霜散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】铅霜一分 甘草一分（半生半熟，捣罗为末）

【用法】上为散。每服半钱，以绵裹含，咽津。

【主治】悬壅肿胀疼痛。

69888 铅霜散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】铅霜一分 龙脑半钱 滑石一分

【用法】上为细散。每用少许贴疮上。有涎即吐却。

【主治】口舌疮。

69889 铅霜散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】铅霜三分（细研） 金箔一百片（细研） 银箔二百片（细研） 麦门冬一两半（去心，焙） 黄连半两（去须） 子芩半两 犀角屑半两 人参半两（去芦头） 鸡臙脰一两半（微炙） 知母半两 土瓜根半两 苦参半两（锉）

【用法】上为细散，入前三味同研令匀。每服一钱，以清粥饮调下，不拘时候。

【主治】消中久不愈，干瘦少力，心神烦乱，眠卧不安。

69890 铅霜散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】铅霜一分 膩粉一分 柳絮矾一分 川朴消一分

【用法】上为细散。每服半钱，以冷水调下，每日夜四五次。

【主治】渴利烦热，皆生痈疽，赤焮疼痛，心烦不得眠卧。

69891 铅霜散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】铅霜（细研） 牛黄（细研） 半夏（汤浸七遍去滑） 龙脑（细研） 各半两 白附子（炮裂） 马牙消 防风（去芦头） 朱砂（细研） 天竹黄（细研） 犀角屑 细

辛 黄芩 甘草（炙微赤，锉） 各一分

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一字，用姜蜜温水调下，不拘时候。

【主治】小儿脾风多涎，心胸壅闷，不下乳食，昏昏多睡。

69892 铅霜散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】铅霜半两 绿豆粉半两

【用法】上为细散。以芸苔菜汁调，涂之。

【主治】小儿浑身赤，或瘀肿，或如火丹，烦渴，壮热。

69893 铅霜散

【方源】《普济方》卷二九九引《圣惠》。

【组成】铅白霜（研细） 不拘多少（炙，炒）

【用法】取少许，敷痛处。一两度即愈。

【主治】大人、小儿卒患口疮。

69894 铅霜散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】铅霜一分 马牙消一两 龙脑一分 朱砂半两 铁粉一两

【用法】上为细末。每服一钱，竹叶汤放温调下，不拘时候。

【主治】伤寒、时气，心热，狂言恍惚，卧不安席。

69895 铅霜散

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】铅白霜一分 马牙消一两

【用法】上为末。每服半钱匕，小儿一字匕，生姜蜜水调下。

【主治】伤寒三日后，心烦躁热狂言。

69896 铅霜散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】铅白霜半两

【用法】上为细散。每服一钱匕，温地黄汁一合调下；如无地黄汁，用生干地黄煎汤送下。

【主治】室女月水滞涩，心烦恍惚。

69897 铅霜散

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】铅霜(研) 白矾(烧灰) 黄柏(去粗皮,蜜炙)各一两 麝香(研)一钱

【用法】上为散。每用半钱匕,掺疮上。有涎即吐之。

【主治】乳石发动,口舌生疮。

69898 铅霜散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】南硼砂 柿霜 糖霜 铅白霜各等分

【用法】上为细末。每服半钱,食后逐旋掺咽下。

【功用】清凉咽膈。

【主治】咽喉肿痛。

69899 铅霜散

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】铅白霜 粉霜 马牙消 朱砂各二钱

【用法】上为末。每服少许,罨于口内。

【主治】上焦热,口生白疮,膈中痞气。

69900 铅白霜丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】铅白霜半两 朱砂 马牙消 人参 天竺黄各半两 山梔子一两 甘草半两(炙)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一丸,冷熟蜜汤化下。

【主治】小儿惊风,伤寒四五日未得汗,摇头扑手,上窜,多啼叫,不睡,吃水无休。

69901 铅白霜丸

《圣济总录》卷五十八。为原书同卷“铅霜丸”之异名。见该条。

69902 铅白霜丸

《普济方》卷三七四。即《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》“白霜丸”。见该条。

69903 铅白霜散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】铅白霜二钱 铜绿二钱 白矾一块大许

【用法】上为末。以翎羽扫上疮,以温浆水

漱之。

【主治】大小人口疮,牙齿腐蚀,气臭出血。

69904 铅白霜散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】铅白霜 干胭脂 寒水石各等分 脑子 轻粉各少许

【用法】上为末。掺之。

【主治】①《儒门事亲》:大人、小儿口疮唇紧。②《普济方》:刀箭所伤。

【备考】《普济方》有白敛少许。

69905 铅砂蒸剂

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】铅白砂四钱 玫瑰露十二钱 烧酒六钱

【用法】上药煎沸,乘温熏蒸眼目。

【主治】险浮肿。

秫

69906 秫米汤

《普济方》卷一九八。即《千金》卷十“恒山汤”。见该条。

69907 秫米散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】秫米 竹筴各等分

【用法】上烧灰,为细散。以田中禾下水调涂之。

【主治】小儿王烂疮及恶疮。

69908 秫米半夏汤

《景岳全书》卷五十四。即《灵枢》卷十“半夏汤”。见该条。

69909 秫米常山甘草汤

《痲症论疏》。为《千金》卷十“恒山汤”之异名。见该条。

秤

69910 秤金丹

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】一秤金(《东医宝鉴·外形篇》卷四)。

【组成】熟地二两 枸杞 莲蕊 槐角(俱

用酒浸，春、秋三，夏一，冬六日，晒干）薄荷各三两 没石子一两 人参 木香各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，空心噙化，每日三次。

【功用】黑须发。

69911 秤锤酒

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】铁秤锤一枚（斧头铁杵亦得）酒一升

【用法】烧秤锤令赤，投酒中，良久去锤，量力服。

【主治】产后血瘕，儿枕痛。

积

69912 积串

【方源】《串雅补》卷下。

【组成】黑丑（头末）生大黄 槟榔 生甘草各春用八分，夏用九分，秋七分，冬一钱

【用法】上为细末。五更用井花水冷调下，后服乌药顺气汤；至重者服末药五钱。

【主治】酒癖，酒积。

69913 积气丸

【方源】《普济方》卷一七三引《博济》。

【组成】木香半两 干姜（炮）一两 硃砂半两（以醋半盏化）巴豆半两（去皮，不出油）川大黄一两 附子一两（去皮脐）官桂半两 筒子漆一两 荆三棱一两 蓬莪茂一两 芫花半两（醋炒令黑）青橘皮（去白）半两 细墨半两 槟榔半两 大戟半两 肉豆蔻五个（去壳）

【用法】先将荆三棱、大黄二味为末，研巴豆令细，入醋一升半，煎此三味至半碗许，入硃砂，又同熬入醋面一匙成膏，入诸末，合和得所，再入醋为丸，如绿豆大。每服五丸，如食瘕气，用生姜、橘皮汤送下；本脏气，茴香汤送下；赤白痢，二宜汤送下；妇人血气，当归酒送下；常服任下。

【功用】消酒食，利噎塞。

【主治】积年食气瘕块。

69914 积气丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】巴豆一百个（去皮心膜，出油，取霜三钱）桃仁（去皮尖，麸炒，别研）一两半 附子（炮，去皮脐）四两 米醋五升（以硃砂、大黄同用慢火熬成膏）大黄（面裹，煨，去面，为末）干漆（炒焦）木香 鳖甲（醋炙黄）各一两 三棱（煨，乘热捣碎）肉桂（去粗皮）硃砂（研）各二两 朱砂（研，飞）麝香（别研）各二钱半

【用法】上为细末，人研药匀，醋膏为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后、临卧炒生姜汤温下，或木香汤亦得。

【主治】阴阳不和，脏腑虚弱，寒冷之气留滞于内，使气积不散，胸胁支满，食即气噎，心腹膨胀，气刺气急，宿食不化，心腹引痛，噎气吞酸，停饮浸渍，恶心呕逆，瘕块疼痛，脏腑不调，饮食不进，往来寒热，渐觉羸瘦，以致着床，面黄肌热，精神困顿。

【宜忌】忌生冷，硬物。

69915 积气丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】代赭石（煨，醋淬，研）礞石（研）各一两 桂（去粗皮）硃砂（研）赤茯苓（去黑皮）青橘皮（去白，焙）各半两 胡椒四十九粒 巴豆（去皮心膜，研）四钱

【用法】上八味，四味为末，与四味研者和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一丸至三丸，食后以木香汤送下。

【主治】一切积滞，痰逆恶心，霍乱吐泻，膈气痞满，肋肋积块，胸膈膨闷，呕啰心疼，泄利不止。

69916 积气丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】大戟 龙胆 木香各半两 杏仁

(去皮尖双仁, 炒, 研) 代赭 (煨, 醋淬) 赤石脂 (水飞, 研) 各一两 巴豆 (去皮心膜, 研, 出油) 一钱一字

【用法】上为末, 合为极细末, 面糊为丸, 如梧桐子大, 阴干, 经十日方可服。每服三丸至五丸, 木香汤送下; 温汤热水亦得。

【主治】一切积滞, 痰逆恶心, 吐泻霍乱, 膈气痞满, 胁肋积块, 胸膈膨闷, 呕啰心疼, 泄泻下痢。

69917 积气丸

【方源】《圣济总录》卷七十二

【组成】桂 (去粗皮) 二两 附子 (炮裂, 去皮脐) 半两 丹砂 (研) 四两 桃仁 (汤浸, 去皮尖双仁, 研) 一两半 巴豆 (去皮心膜, 压出油) 一百枚 京三棱 (煨, 锉) 干漆 (炒烟出) 鳖甲 (去裙襕, 醋炙) 各一两 硃砂 (研) 二两 大黄 (生用) 一两 麝香 (研) 一两 木香一两

【用法】上为末, 先以好醋一升, 熬成膏, 和前药为丸, 如绿豆大。每服三丸五丸, 食后煎木香汤送下。

【主治】积聚, 心腹胀满, 宿食不消, 疝刺疼痛, 恶心呕吐, 不思饮食。

69918 积气丹

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】槟榔二个 芫花一两 硃砂二钱 巴豆二钱半 (生) 青皮 (去白) 陈皮各三钱 蓬莪术 鸡爪黄连 京三棱 章柳根 牛膝各一两 肉豆蔻三个 大戟 川大黄 甘遂 白牵牛 干姜 青礞石 干漆各半两 木香二钱半 石菖蒲三钱

【用法】上为末, 醋面糊为丸, 如梧桐子大。每服一丸, 临卧烧枣汤送下, 每夜一丸或二丸。候肚内作声, 病退为度。

【主治】一切新久沉积气块, 面黄黑瘦, 诸气无力, 癥瘕积聚, 口吐酸水。

69919 积气散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】粉霜 (研) 一钱半 京三棱 (为

末) 七钱 诃黎勒皮 (为末) 四钱 硫黄 (研) 一钱半 密陀僧 (研) 五钱 白丁香 (研) 二钱

【用法】上为散, 再同研匀。每服一钱匕, 用生姜浆水调下后, 于五更服青灵丸。

【主治】小儿乳癖。

69920 积块丸

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】京三棱 莪术 (各用醋煨) 自然铜 蛇含石 (各烧红, 醋淬七次) 二钱 雄黄 蜈蚣 (全用, 焙燥) 各一钱二分 辰砂八分 木香一钱半 铁华粉 (用糯米、醋炒) 一钱 芦荟 天竺黄 阿魏 全蝎 (洗, 全用, 焙干) 各四钱 沉香八分 冰片五分

【用法】上为极细末, 用雄猪胆汁炼为丸 (黑狗胆汁尤妙), 如梧桐子大。或服七八分, 重者一钱, 五更以酒送下。块消即止, 不必尽剂。

【主治】癥瘕积聚癖块, 一应难消难化, 腹中饱胀, 或虫积疼痛。

【临证举例】臌胀 《孙氏医案》: 汪氏妇, 年仅三八, 经不行半载, 腹大如斗, 坚如石, 时或作痛, 里医尽技以治, 月余弗瘳。予诊其脉, 两关洪滑鼓指, 按之不下, 乃有余之候也。询其致病之源, 因魃食冷物, 积而渐成臌胀。前任事者, 误作气虚中满治之, 胀而欲裂。乃用积块丸三下之, 而胀消积去。后以丹溪保和丸调养一月而愈。

69921 积肥丸

《摄生众妙方》卷五。为《御药院方》卷六“猪肚丸”之异名。见该条。

69922 积疝丸

《医统》卷六十。即《丹溪心法》卷四“积疝方”。见该条。

69923 积疝方

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】山楂 (炒) 一两 茴香 (炒) 柴胡 (炒) 三钱 牡丹皮一钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，盐汤送下。

【主治】疝痛。

【备考】本方方名，《医统》引作“积疝丸”。

69924 积聚汤

【方源】《普济方》卷一六八。

【组成】三棱 莪术 青皮（去白） 陈皮（去白） 桂心（不见火） 藿香叶 桔梗（去芦，锉，炒） 益智仁 香附子各一两半 甘草三钱（炙）

【用法】上咬咀。每服六七钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】惊忧思怒，或冒寒热，留而不去，为伏郁之气；因气流行，随经上下，相搏而致积气，或一边，或左右，或不循行上下，或肌肉之间，如鸡刀所铎，其气不得见，令人腹中满痛；久令人痞闷。胃之聚气，状如癥瘕，攻刺腰肋，上气滞塞，小腹膜胀，大小便不利，或泄泻、淋沥无度。

69925 积气养荣汤

【方源】《高崖尊生》卷十四。

【组成】川芎二钱 当归四钱 炙草四分 人参二钱 炮姜四分 黄耆 白术各一钱 陈皮四分

【主治】产后血崩，血亡气脱，言语不接续，似喘非喘，无血块者。

【加减】手足冷，加熟附五分，麦冬一钱，五味子十粒；伤食，加神曲、麦芽；伤肉，加山楂、砂仁各五分。

称

69926 称金丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】熟地二两 枸杞 莲蕊 槐角（俱用酒浸，春秋三、夏一、冬六日，晒干） 薄荷各三两 没石子一两 人参 木香各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，空心嚼化，一日三次。

【功用】乌须发。

69927 称病散

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】川牛膝（去芦，酒浸） 当归（去尾，酒浸） 官桂（不见火） 白术 黄耆（去芦） 独活 生姜 白僵蚕 甘草 寄生

【用法】上为细末。每服四钱，热水调服。

【主治】因产走动，血气升降，失其常度，流滞关节，筋脉引急，而致产后遍身疼痛，甚则腰背强硬，不能俯仰，手足擎物未能屈伸，或身热头痛。

秘

69928 秘丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】川芎 梔子（炒） 苍术 香附 石碱 干姜（炒）

【主治】心痛。久则成郁，郁久必生火原。

69929 秘丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】承气汤加梔子 韭汁 桔梗 麻黄

【主治】死血留于胃口作痛。

69930 秘丹

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】黄连 花粉 人乳 地黄汁 藕汁

【用法】上药蜜为膏。徐徐留舌上，以白汤送下。

【主治】①《脉因证治》：三消。②《回春》：吐血。

69931 秘元丸

《医统》卷八十三。为《得效》卷七“秘元丹”之异名。见该条。

69932 秘元丹

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】半夏一斤（浆水浸七日，切作半破） 斑蝥四十九枚（去翅足） 薜荔叶二两 糯米一分

【用法】上同于铤内炒，候半夏赤黄色，先以纸铺地，急倾药于纸上，瓦盆盖之一宿，去

三味，只取半夏为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下。

【功用】固守三田，接养真气。

69933 秘元丹

《御药院方》卷六。为《圣济总录》卷九十二“秘真丸”之异名。见该条

69934 秘元丹

【方源】《得效》卷七。

【异名】秘元丸（《医统》卷八十三）。

【组成】白龙骨三两 诃子十个（去核）缩砂一两（去皮）

【用法】上为末，糯米粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以盐酒送下。

【主治】①《得效》：内虚里寒，自汗时出，小便不禁。②《校注妇人良方》：阳气虚，夜多小便频数。

69935 秘元汤

【方源】《会约》卷十三。

【组成】志肉八分（炒） 山药二钱（炒） 芡实二钱（炒） 枣仁（炒，捣碎）一钱半 白术（土炒） 茯苓各一钱半 甘草（炙）一钱 五味子十四粒（微炒，捣）

【用法】水煎。食远服。

【功用】培补心脾，固肾。

【主治】思虑劳倦而遗。久遗无火，不痛而遗滑者。

【加减】有火觉热，加苦参一二钱；气大虚，加黄耆（蜜炙）一二三钱。

69936 秘元煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】远志八分（炒） 山药二钱（炒） 芡实二钱（炒） 枣仁（炒，捣碎）二钱 白术（炒） 茯苓各一钱半 炙甘草一钱 人参一二钱 五味子十四粒（畏酸者去之） 金樱子（去核）二钱

【用法】水二钟，煎七分，食远服。

【主治】肝肾亏虚，脾虚气陷，遗精滑精，小便频数，带浊漏下。

①《景岳全书》：遗精带浊、久遗无火，不痛

而滑者。②《证治宝鉴》：肝肾虚而精滑者。③《会约》：脾土虚陷，不能统摄荣血，而为漏为数。

【加减】有火觉热者，加苦参一二钱；气大虚者，加黄耆一二三钱。

69937 秘叶散

【方源】《痘疹仁端录》卷十五。

【组成】水龙骨 白薇 蚯蚓泥 白及 芙蓉叶 皂角 山慈菇 葱头 生姜 蓖麻乳香 没药 黄豆末 黑豆末 绿豆末

【用法】上为末。温汤炖热，涂围，中留一孔。

【主治】痘毒流注。

69938 秘红丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】川大黄细末一钱 油肉桂细末一钱 生赭石细末六钱

【用法】将大黄、肉桂末和匀，用赭石末煎汤送下。

【主治】肝郁多怒，胃郁气逆，致吐血、衄血，及吐衄之证屡服他药不效者；无论因凉因热，服之皆有捷效。

【加减】身体壮实而暴得吐血者，大黄、肉桂细末各一钱半，将生赭石末六钱与之和匀，分三次服，白开水送下，约一点半钟服一次。

【方论选录】平肝之药，以桂为最要，而单用之则失于热；降胃止血之药，以大黄为最要，胃气不上逆，血即不逆行也，而单用之又失于寒；若二药并用，则寒热相济，性归和平，降胃平肝，兼顾无遗。况俗传方，原有用此二药为散，治吐血者，用于此证当有捷效。而再以重坠之药辅之，则力专下行，其效当更捷也。

【临证举例】吐血 一妇人，年近三旬，咳嗽痰中带血，剧时更大吐血，常觉心中发热。其脉一分钟九十至，按之不实。投以滋阴宁嗽降火之药数剂无效。自言夜间睡时，常作生气恼怒之梦，怒极或梦中哭泣，醒后必然吐血。遂用本方，吐血顿愈，恼怒之梦，亦

以此不作。后又遇吐血者数人，投以此方，皆随手奏效。

69939 秘灵丹

【方源】《玉案》卷六。

【组成】血竭 乳香 没药 全蝎（去头足） 僵蚕 蝉蜕各三钱 大黄（酒蒸） 当归 象牙（锉末）各八分 穿山甲（酥炙） 头发（煨） 珍珠各四钱 川连 槐花 琥珀各五钱 青黛 刺猬皮（醋浸，去刺，炙）各二钱五分

【用法】上为末，以黄蜡八两溶化，入蜜一两，同前末搅匀，众手为丸。每服二钱，空心以清茶送下。

【主治】一切远年近日痔漏。

69940 秘金丹

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《吴氏集验方》。

【组成】生地黄半斤（洗净，薄切，日晒干，入新砂盆内，慢火炒黄黑色） 官桂半两（去皮） 蒲黄三钱（以纸衬砂盆内，炒赤黄色） 白芍药半两 川芎三钱（炒） 鸡头粉半两 莲花蕊二钱（焙） 白龙骨三钱 熟地黄一两 肉苁蓉三钱（酒浸一宿，焙干） 北五味三钱 菟丝子三钱 远志三钱（去心） 鹿茸半两（酥炙） 川当归半两（去芦） 木香三钱 丁香三钱 天雄一对（去皮，炮，切）

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心以酒醋汤送下。

【功用】暖子宫，滋气血。

【主治】带下。

69941 秘金散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】黄连（去须） 沙参 太阴玄精石（研） 决明子各一两

【用法】上为散。每服半钱匕，用羊肝子一具，竹刀切作缝子，掺药末在内，以线系，入瓶中，用米泔煮熟，分作三服，淡吃。

【主治】自幼久患疳风，攻眼生翳，久疗不

愈，翳膜遮障，但睛不损者。

69942 秘药方

【方源】《青囊秘传》。

【异名】秘药饼。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子 黄耆 薄荷 防风 荆芥 连翘 细辛 白芷 玄参 川芎 羌活 独活 山奈 檳榔 厚朴 苦参 甘草 木通 半夏 川乌 草乌 苍术 麻黄 赤芍 升麻 大黄 僵蚕 川牛膝 桔梗 射干 干葛 皂刺 车前 桑皮 五加皮 牛蒡子 麦冬 杏仁 地骨皮 山豆根 生地 归尾 花粉 生南星 银花 参三七 川槿皮各一两 鲜车前草 骨牌草 金星草 五爪龙草 土牛膝草 紫背天葵草 地丁草各四两

【用法】用新缸一只，清水浸之，日晒夜露四十九日，如遇风雨阴晦之日，用盖盖之，晒露须补足日期。取起滤去滓，铜锅煎之，槐柳枝搅之，煎稠如糊，再加下药：明雄黄五钱，青礞石（童便煨七次）、乳香（去油）、没药（炙）、熊胆（焙）、龙骨（煨）、玄明粉、血竭、石燕（醋煨七次）、海螵蛸（纸包，焙）、炉甘石（童便煨七次）、青黛各五分，枯矾、儿茶各一钱，轻粉、黄丹（水飞）各三分，月石七分，桑枝炭三钱。

上为细末，入前膏内和匀，做成小饼，如指头大，晒露七日夜，放地上，以瓦盆盖之，一日翻一次，七日取起，置透风处阴干，收藏瓦罐内，三个月方可用之。用时为极细末，每饼二分，加后七味：冰片、珍珠、珊瑚（水飞）各四分，麝香二分，牛黄二分，轻粉一厘，月石二分，为细末，和匀，密收小瓶，封口勿令泄气。每以铜吹筒取药少许，吹患上。预为修合，陈者愈佳。

【主治】咽喉诸症。

69943 秘药饼

《青囊秘传》。为原书“秘药方”之异名。见该条。

69944 秘真丸

【方源】《普济方》卷二一七引《孟氏说洗方》。

【组成】白龙骨一两 绵黄耆(生,切,焙干) 白茯苓 大朱砂(另研) 桑螵蛸(炒)一两 白霜梅肉五钱 家韭子三两(陈酒浸一宿,捣碎,焙干)。

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心以盐汤送下。

【主治】梦遗白浊,真气不固。

69945 秘真丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【异名】秘精丸(《百一》卷十五)、秘元丹(《御药院方》卷六)、秘精丹(《普济方》卷二一七)、秘真丹(《证治汇补》卷八)。

【组成】龙骨(研)一两 诃梨勒(炮,取皮)五枚 缩砂仁(去皮)半两 丹砂(研)一两(留一分为衣)

【用法】上为末,煮糯米粥为丸,如绿豆大,以丹砂为衣。每日空心热酒送下一丸,夜卧冷水送下三丸;或太秘欲通,用葱汤点茶服之。

【功用】温中助阳,固精止尿。

①《御药院方》:助阳消阴,正气温中。②《明医指掌》:固精止尿。③《医宗必读》:固精安肾。④《医略六书》:镇坠固涩。

【主治】心肾两虚,阳气衰微,精气不固,白淫不止,梦遗,小便不禁及有余沥,脉短涩。

①《圣济总录》:小便白淫不止。②《宣明论》:白淫,小便不止,精气不固,及有余沥,或梦寐阴人通泄。③《御药院方》:内虚里寒,冷气攻心,胁肋胀满,脐腹刺痛,呕逆泄泻,自汗时出,小便不禁,阳气衰微手足厥,久虚下冷,真气不足。④《医统》:精不禁,危急者。⑤《医略六书》:心肾两虚,遗溺,脉短涩。

【宜忌】不可多服。

【方论选录】《医略六书》:龙骨固涩肾气,收束浮弱之脉;灵砂镇坠心神,降抑虚浮之气;砂仁炒黑归肾,调其蓄泄之权;诃子炒黄

收脱,兜其遗失之溺也。覆盆膏丸,人参汤下,使真气布护,则心肾相交,而腠气自固,安有遗尿之患乎。此镇坠固涩之剂,为心肾虚浮遗溺之专方。

【备考】《医略六书》本方用法:覆盆膏为丸。每服三钱,参汤送下。

69946 秘真丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】莲花蕊一两 白茯苓(去皮) 缩砂仁半两 益智仁一两 黄柏二两 甘草(炙)二两 半夏 木猪苓(去皮)二钱半

【用法】上为细末,水浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,空心以温酒送下。

【功用】秘固真元,降心火,益肾水。

【主治】肾水真阴本虚,心火狂阳过甚,心有所欲,速于感动,应之于肾,疾于施泄。

69947 秘真丸

【方源】《普济方》卷二一七。

【异名】秘真丹(《奇效良方》卷三十四)。

【组成】羊胛骨(烧红,窖杀)三两 朱砂一两 厚朴三两(姜汁炒)

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心以温酒送下。

【主治】思想无穷,所愿不协,意淫于内,在外作劳,筋绝,发为筋痿,及为白淫,遗洩而下,故为劳弱。

69948 秘真丸

《不居集》上集卷十九。为《医学正传》卷六“秘真丹”之异名。见该条。

69949 秘真丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】五倍子一两(去净虫粪) 粉甘草八钱

【用法】上为细末。每服一钱,竹叶煎汤送下,日再服。

【主治】诸淋证已愈,因淋久气化不固,遗精白浊。

69950 秘真丹

【方源】《三因》卷十三。

【组成】草乌头(或用川乌) 牡蛎粉(炒乌头一两,令裂,去皮脐,牡蛎不用) 五倍子半两

【用法】上为末,糯米糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空腹以盐汤送下。

【主治】房室过度,或用意思维,精泄自出,腰背酸弱,不能屈伸,食不生肌,两脚痠痛,不能步履。

69951 秘真丹

《奇效良方》卷三十四。为《普济方》卷二一七“秘真丸”之异名。见该条。

69952 秘真丹

【方源】《医学正传》卷六。

【异名】秘真丸(《不居集》上集卷十九)。

【组成】菟丝子(酒浸,炒) 韭子(炒) 柏子仁各一两 龙骨(煨) 牡蛎(煨,醋淬) 山茱萸(去核取肉) 赤石脂(煨) 各五钱 补骨脂一两(炒) 远志(去心) 巴戟天(去心) 覆盆子 枸杞子 黄柏(盐酒炒黑色) 山药各七钱五分 芡实(去壳) 杜仲(姜汁炒丝断) 各一两 金樱子(半青黄者,去刺核取肉,焙干) 二两 干姜(炒黑色) 一两 鹿角胶一两五钱(炒成珠)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心姜盐汤送下。

【主治】好色肾虚,遗精梦泄,白淫白浊。

【备考】本方方名,《医统》引作“经验秘真丹”。

69953 秘真丹

《证治汇补》卷八。为《圣济总录》卷九十二“秘真丸”之异名。见该条。

69954 秘效丸

《普济方》卷一八四。即《圣济总录》卷六十七“歎气秘效丸”。见该条。

69955 秘效丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】橘红 青皮(醋炒) 砂仁(炒) 枳壳(麸炒) 桑白皮 草果仁(炒) 槟榔各一两 芫花 大腹皮 茯苓皮 厚朴

丁皮(炒) 肉桂(炒) 南木香 苍术(米泔浸,炒) 益智仁各八钱

【用法】上为末,醋打面糊为丸。体厚者五钱,体弱者三钱,第一服消上部,以葱汤送下;第二服消中部,以陈皮汤送下;第三服消下部,以桑皮汤送下,俱要五更时服,服后如未消,仍前汤引服之。重者六服收功,轻者不三服而愈。

【主治】肚腹胀大,小便短涩,脐凸气喘,夜不得卧。

69956 秘痰丸

【方源】《经验方》卷二。

【组成】人参 木香 白术(煨) 茯苓 青皮 陈皮(去白) 各一两 槐角子 半夏各七钱半 天麻一两 猪牙皂角(去皮弦,酥炙) 五钱

【用法】上为末,生姜自然汁糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,食后、临卧以温酒送下;姜汤亦可。

【主治】风痰喘嗽。

69957 秘纂丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归 白芍 苍术 肉桂 良姜

【主治】胃痛。

69958 秘精丸

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【组成】大附子(炮裂,去皮脐) 龙骨(煨通赤) 牛膝(酒浸一宿,焙) 肉苁蓉(酒浸一宿,焙) 巴戟(去心) 菟丝子(酒浸三宿) 各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心以温酒或盐汤送下;甚者日再服。

【功用】补益。

【主治】①《洪氏集验方》:漏精,小便如米泔。②《续易简》:元气不固,遗精梦泄。

69959 秘精丸

《百一》卷十五。为《圣济总录》卷九十二“秘真丸”之异名。见该条。

69960 秘精丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】固精丸(《得效》卷七)、固本丸(《嵩崖尊生》卷十四)、固髓丹(《一见和医》卷四)。

【组成】牡蛎(煅) 菟丝子(酒浸,蒸,焙,别研) 龙骨(生用) 五味子 韭子(炒) 桑螵蛸(酒炙) 白茯苓(去皮) 白石脂(煅) 各等分

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心以盐酒、盐汤任下。

【主治】①《济生》:下虚胞寒,小便白浊或如米泔,或若凝脂,腰重少力。②《校注妇人良方》:小便无度。

69961 秘精丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】五花龙骨一两 远志(去心) 一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大,辰砂三钱为衣。每服七十丸,早晨以莲子汤送下。

【主治】用心过度而致梦泄。

69962 秘精丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】白术 山药 茯苓 茯神 莲子肉(去心,蒸) 各二两 芡实四两 莲花须 牡蛎各一两五钱 黄柏五钱 车前子三两

【用法】上为末,金樱膏为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,开水送下。

【功用】①《医学心悟》:理脾导湿。②《笔花医镜》:固精。

【主治】相火湿热,梦遗精滑,尿浊。

【加减】气虚,加人参一两。

69963 秘精丹

《普济方》卷二一七。为《圣济总录》卷九十二“秘真丸”之异名。见该条。

69964 秘藏丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《吴氏集验方》。

【组成】巴豆十四粒(灯上烧存性) 肉豆蔻一个(半炮半生) 黄丹少许

【用法】上为末,蒸饼为丸,如绿豆大。每服二丸,水泻,以冷水送下;赤痢,以甘草汤送下;白痢,以干姜汤送下。

【主治】泻痢。

69965 秘传肉丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】伏火朱砂四两(研如粉) 代赭石四两(火煅,水飞过) 鹿角胶七两(蛤粉炒) 鹿角霜二两 鹿茸七两(酒浸,炙) 白龙骨三两(生用,水飞) 虎胫骨四两(酥炙) 天雄二两(炮) 桑螵蛸四两(炒) 磁石四两(醋淬,水飞) 牡蛎粉四两(韭菜叶和泥煅,水飞) 附子一两(炮) 钟乳粉二两 阳起石二两(煅,水飞) 乳香一两 没药一两 沉香一两 (一方用灵砂不使朱砂)

【用法】上以糯米粉用酒和成饼煮熟为丸,如梧桐子大。每服三十丸,加至五十丸,空心以盐汤送下。

【功用】养心肾,生精血,补虚损,壮筋骨,固下元。

【备考】本方方名,《普济方》引作“朱赭妙丸”。

69966 秘传疳丹

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】甘草(生用) 信石(真者,生用) 少许 寒水石(如琉璃亮者是)

【用法】上为细末,面糊为丸,如绿豆大,朱砂为衣。每服大人五丸,小儿二丸,早晨用冷水吞下。如不丸者,用末子以冷水调,大人每服只用一字钱,小儿服半字钱,临发日服之。真实药料不过五六服自然而愈,后服:草果、半夏(汤泡七次)、制厚朴、青皮、良姜(壁土炒)、甘草各等分,咬咀,每服三钱,水一盏乌梅煎,空心服。

【主治】疳疾。

【宜忌】莫吃热食,只用温汤淘饭止饥,粥食一例放冷,恐热触犯药性。

69967 秘传药酒

【方源】《医统》卷十一。

【组成】麻黄 白芷 桔梗 芍药 当归 川芎 肉桂 半夏 防己 甘草各一两 陈皮 厚朴 枳壳 乌药各二两 苍术 槟榔一两半 川牛膝二两 川木瓜 独活各一两半 杜仲(制)二两

【用法】上为粗末，以绢袋盛之，用无灰酒三斗浸于坛内，密封坛口，锅内重汤煮一时，然后取出，过三日开，取酒饮之，量饮，一日三次。滓晒干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以酒送下。

【主治】风湿相搏，腰膝痛，或因坐卧湿地，雨露所袭，遍身骨节痛，风湿脚气。

69968 秘传药酒

【方源】《回春》卷二。

【组成】当归 白芍(炒) 生地黄 牛膝 秦艽 木瓜 黄柏(盐炒) 杜仲(姜炒) 防风 陈皮各一两 南芎 羌活 独活各八钱 白芷七钱 槟榔五钱 甘草节(蜜炙) 肉桂各三钱 油松节五钱

【用法】上锉。入绢袋内，入南酒或无灰酒重汤煮一炷香为度，早晚随量饮之。

【主治】瘫痪腿疼，手足麻痺，不能动移。

【加减】久痛，加虎胥骨(酥炙)八钱，苍术一两(炒)。

69969 秘传膏药

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】真绿豆二两半(用铜铤子炒黄，色枯了为妙) 檀香半两(焙干用) 香竭(香节亦可) 胆矾半两(真者，取毒生肌，后不用此味) 乳香 没药各半两(痛者用) 轻粉(匣子亦好)少用 南蛇胆(无亦可) 麝香(破者可用，初炙不用)

【用法】上为细末，诸药半两，可用豆粉五两，米醋调成膏，摊开油纸上。贴之。

【主治】瘰癧。

69970 秘传膏药

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】赤石脂 舶上硫黄 天门冬(去

心) 麦门冬(去心) 熟地黄(酒浸) 菟丝子(酒浸) 木香(酥炙)各二钱 肉苁蓉(酒浸) 没药(另研) 紫霄花 杏仁(去皮尖，另研) 鹿茸 虎骨(生用) 牛膝(酒浸) 阳起石 远志(去心) 川续断 蛇床子 谷精草 龙骨(煅)各二钱 附子一个(炮，去皮脐) 乳香五钱(另研) 麝香(另研) 麝香(另研)各一钱 雄黄四钱(另研) 生地黄 沉香 母丁香各二钱 官桂三钱(另研) 甘草三钱 松香(明净)三两(另研) 木鳖子一两(去壳，碾)

【用法】上为末，除甘草、杏仁、木鳖子、官桂四味，用水六斤四两于砂锅内用桑柴火熬至一碗，去滓净，将松香末，小油二两，白及末一两，下砂锅内化开数沸，却下其余药末，以槐、柳、桑条不住手搅成膏药，稠粘为度。用时以绯绢裁帛，逐渐厚摊如小碗大，贴脐上、腰上。

【功用】补益。

【主治】阳衰。

69971 秘制饭灰

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】制川朴 炮姜炭 地骨皮各八两 焦苍术 半夏 青皮 藿香 桂枝 防风 葛根 荆芥 枳实(炒) 槟榔 薄荷 砂仁 炙草 使君子(炒) 白芍(炒)各六两 公丁香(忌火) 瓜蒌霜 木香(忌火) 升麻(炙) 抚芎 羌活 秦艽 草果(煨)各四两 紫苏 桔梗(炒)各五两 茯苓 米仁(炒)各十二两 陈皮(炒) 六神曲(炒) 焦楂肉 麦芽(炒)各十六两 鸡内金(不落水)一百个 陈廩米一百六十两(炒焦，另磨)

【用法】上为细末，与炒米粉拌和。每服三钱至五钱，煎服；或开水调服亦可。

【主治】风寒食积，头痛发热，二便皆秘，脘痞饱胀，噎腐吞酸，不思饮食，水泻痢疾，腹胀痞瘦，虫积。

69972 秘方十补丸

【方源】《普济方》卷三二二。

【异名】十补丸 (《济阴纲目》卷四)。

【组成】熟干地黄 (净洗, 酒浸, 蒸过, 焙干) 四两 肉苁蓉 (酒浸, 焙干) 人参 绵黄耆 (去芦, 蜜使) 川芎 当归 (去芦, 酒浸, 焙) 白芍药 (浸) 白茯苓 白术 (去芦, 洗净, 炒) 各二两 甘草 (炙) 半两 肉桂一两 (去皮)

【用法】上为细末, 用好酒调山药末打糊为丸, 如梧桐子大。每服六七十丸, 食前以米汤或温酒送下。

【主治】妇人诸虚百损, 荣卫不调, 形体羸瘦, 面黄背倦, 口苦舌干, 心忪多汗、血衰气盛, 寒热往来, 一切血崩带下, 堕胎落孕。

69973 秘方万应丸

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【异名】万应丸 (《证治宝鉴》卷四)。

【组成】三棱 莪术 (各醋炒) 陈皮 (麸炒) 橘红 使君子肉 麦蘖曲 (炒) 神曲 (炒) 雷丸 干漆 (炒烟尽) 各五钱 槟榔一两 芫荇二钱半 鹤虱 (略炒) 胡黄连 (炒) 甘草 (炙) 各三钱 木香 良姜 (陈壁土炒) 砂仁各二钱

【用法】上为末, 醋米糊为丸, 如绿豆大。每服三五十丸, 空心以淡姜汤送下。

【主治】腹内有虫, 及积气块痛; 小儿疳病。

69974 秘方化滞丸

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【异名】化滞丸 (《医统》卷二十三)。

【组成】南木香 (坚实者, 不见火) 丁香 (去苞, 不见火) 青皮 (四花者, 去瓢) 红橘皮 (水温去白) 黄连 (大者) 各二钱半 京三棱 (慢火煨) 莪术 (慢火煨) 各四钱 八分 半夏曲 (拣白净半夏为末, 生姜自然汁和为饼, 晒干) 二钱五分 (前八味晒干, 和研为细末) 巴豆 (去壳, 滚汤泡, 逐一研开, 去心膜, 以瓦器盛, 用好醋浸过一宿, 慢火熬至醋干, 称六钱, 重为细末, 将前药末

和再研令匀, 入后乌梅肉膏) 四钱五分 乌梅 (用肉厚者, 打碎对核, 细锉, 火焙干, 为细末, 称五钱重, 用米醋调略清, 慢火熬成膏, 和入前药)

【用法】上药统和匀了, 用白面八钱, 重水调得所, 慢火调糊为丸, 如粟米大。每服五七丸, 人盛者十丸, 五更空心用橘皮汤送下; 不欲通泄, 津液咽下; 停食饱闷, 枳壳汤送下; 但有所积物, 取本汁冷下; 因食吐不止, 津液咽下即止; 食泄不休及霍乱、呕吐, 俱用冷水送下; 赤痢, 冷甘草汤送下; 白痢, 冷干姜汤送下; 心动, 石菖蒲汤送下; 赤白痢, 冷甘草干姜汤送下; 诸气痛, 生姜橘皮汤送下; 小肠气痛, 茴香酒送下; 妇人血气, 当归汤送下; 若欲宣积, 滚姜汤送下; 疳积常服, 米饮送下, 不拘时候。利多饮冷水一口补住, 此药得热则行, 得冷则止。小儿量岁数加減丸服。

【功用】磨滞, 理气, 化积, 通塞, 调阴阳。

【主治】①《丹溪心法附余》: 停食饱闷, 食泻, 霍乱, 呕吐, 痢疾, 气痛, 小儿疳积。②《金鉴》: 一切气滞积痛。

【宜忌】孕妇勿服。

69975 秘方乌金散

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】锦纹大黄四两半 广木香四两半

【用法】上去粗皮, 炭火烧红, 黄土内埋, 取出和木香一处为细末。每服三钱, 临卧调服, 两服后食白粥补之。

【功用】去脏腑积疾。

【主治】男子妇人脐腹痛。

【宜忌】忌生冷、油腻、难化硬物。

69976 秘方匀气散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】香附子 (炒) 甘草 苍术 茴香 各一两

【用法】上为细末。每服三钱, 盐汤调下。

【主治】目不疼不痒而赤昏。

69977 秘方水澄膏

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【异名】水澄膏（《准绳·疡医》卷一）。

【组成】郁金（无条子，用黄代） 白及 白蔹 五倍 乳香 雄黄各半两

【用法】上为细末。水调敷；如热极者，用蜡水尤妙，纳黄柏、南星。

【主治】肿毒。

69978 秘方平肺汤

【方源】《医方大成》卷二引《简易》。

【组成】陈皮一两 半夏（洗七次） 桔梗（炒） 薄荷各七钱半 紫苏 乌梅（去核） 紫菀 知母 桑白皮（蜜炒） 杏仁（炒） 五味子 罂粟壳（蜜炒）各七钱半 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，生姜三片，煎六分，食后温服。

【主治】肺气上壅，喘嗽痰实，寒热往来，咽干口燥。

【备考】本方方名，《普济方》引作“平肺汤”；《丹溪心法附余》引作“平肺散”

69979 秘方石韦散

【方源】《风痹腋膈》。

【组成】石韦（醋炒）二钱 杨树窠（炒）七钱 郁金二钱 木香三钱 蜗牛（烧灰）五分 麝香五厘（一方用石韦、木香二味）

【用法】上为末。每服一钱二分，以白汤调下。

【功用】利小便。

【主治】水肿，臃胀。

69980 秘方龙骨丸

【方源】《得效》卷十五。

【组成】白牡蛎 北赤石脂 大赭石（以上并煨） 白龙骨 伏龙肝 海螵蛸 五灵脂 侧柏叶各等分 棕榈不拘多少（烧灰） 真蒲黄多加入

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十五丸，以十全大补汤三钱，加嫩鹿茸（去毛，酒炙）、阿胶（蚌粉炒）各一钱半，

生姜三片，大枣二枚，乌梅二个，煎，吞服。

【主治】半产后及下虚，数月崩漏不止。

69981 秘方四神饮

【方源】《医统》卷三十七。

【组成】常山二钱 槟榔 柴胡 贝母各一钱

【用法】上咬咀。水二盞，加黑豆二七粒煎，临发前二时空腹服。

【功用】截疟。

69982 秘方白梅散

【方源】《医方类聚》卷一七四引《简易》。

【组成】盐白梅（火烧存性，研为细末） 轻粉少许（不可多，无亦得）

【用法】上为细末。用真香油浓调，翎毛蘸抹；如成脓未溃，中心留些休抹通气，抹至脓尽不妨，频抹为妙。

【功用】排脓止痛，去旧生新。

【主治】一切无名已成未成、已溃未溃痈疔，脑痈乳痈，背痈腿痈，小儿软疔。

69983 秘方立效散

【方源】《医方大成》卷三。

【组成】春茶

【用法】上为末，调成膏，置瓦盏内覆转，以巴豆四十粒作二次烧烟熏之，晒干，用乳钵研烂为末。每服一字，别入好茶末，食后点服。

【主治】气虚头痛。

69984 秘方半夏丸

【方源】《准绳·类方》卷五引《集验》。

【组成】半夏一两（用生姜汁煮三五十沸，取出切作块，更煮令熟，焙干，为细末） 麝香一钱（研） 水银半两 生薄荷一大握（和水银研如泥）

【用法】上药入薄荷泥内更研千百下为丸，如芥子大。每服十五丸，临卧以金银汤送下，三日再服。

【主治】心风狂。

69985 秘方夺命散

《袖珍》卷三。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

69986 秘方托里散

【方源】《痈疽神秘验方》。

【组成】瓜蒌大者一个(杵) 当归(酒拌) 黄耆(盐水拌,炒) 甘草 白芍药各一两半 皂角刺(炒)一两 金银花一两 天花粉一两 熟地黄(生者)一两(酒拌,铜器蒸半日)

【用法】用无灰酒五茶钟和药五两,入瓷器内厚纸封口,再用油纸重封,置汤锅内煮,用盖覆之,煮至药香取出,分温服,直至痊愈。

【主治】疮毒。

69987 秘方防风散

【方源】《普济方》卷六十四。

【组成】防风(去芦)一两 白药三两(黑牵牛半两同炒,香熟为度,去牵牛一半)

【用法】上为细末。每服一钱匕,食后以茶酒任下。

【主治】风热上壅,咽喉不利。

69988 秘方苍术汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】苍术 玄参 甘草 远志 羌蔚子各等分

【用法】上咬咀。每服五钱,入秦皮一片,水一钟半,煎至一钟,食后温服,滓再煎。

【主治】视物不明。

69989 秘方芦荟丸

【方源】《续本事》卷十。

【组成】芦荟 荆芥 黑牵牛 青皮各等分

【用法】上为末,面糊为丸,如粟米大。一岁以下一丸或二丸。

【主治】小儿疳积。

69990 秘方连翘散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】连翘 梔子 甘草 朴消 黄芩 薄荷各等分

【用法】上为末。每服三钱,茶清调下;无根水亦可。

【主治】白膜遮睛。

69991 秘方拔毒散

《准绳·疡医》卷一。为《痈疽神秘验方》卷一“拔毒散”之异名。见该条。

69992 秘方肥儿丸

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】黄连五钱 木香一钱 神曲 麦蘖各一两(并炒) 使君肉(煨) 肉豆蔻(面裹煨)各五钱 槟榔一枚 虾蟆一个 白术一两

【用法】上为末,面糊为丸,如粟米大。空心以米饮送下。

【功用】消痞进食。

69993 秘方净肌散

【方源】《普济方》卷二七二引《简易》。

【组成】雄黄 北芩 大黄 海螵蛸 生硫黄 黄柏 翦草 黄连 蛇床子 五倍子各半两

【用法】上为细末。用真香油调抹疮上。

【主治】一切疮痒。

69994 秘方定心丸

【方源】《赤水玄珠》卷十四引《统旨》。

【异名】定振丸(《济阳纲目》卷四十五)、秘方定振丸(《医学六要·治法汇》卷五)。

【组成】天麻(蒸熟) 秦艽(去芦) 全蝎(去头尾) 细辛各一两 熟地 生地 川归 川芎 芍药各二两 防风 荆芥各七钱 白术 黄耆各半两 威灵仙(酒洗)五钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,食远以白汤或酒送下。

【主治】老人因风气及血虚战动而振。

69995 秘方定振丸

《医学六要·治法汇》卷五。为《赤水玄珠》卷十四引《统旨》“秘方定心丸”之异名。见该条。

69996 秘方参附丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】大附子(童便制) 人参 白芍(酒炒)各一两 肉桂(炒)七钱 当归二两 甘草八钱 真沉香一两五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服二钱五分，空心以白滚汤送下。

【主治】气血虚极，寒邪凝结脏腑，终日腹疼。

69997 秘方枳壳汤

【方源】《医学正传》卷五引《局方》。

【异名】枳壳汤（《杏苑》卷五）、枳壳川连汤（《症因脉治》卷四）。

【组成】枳壳一两（麸炒黄色） 黄连二两（以槐花四两同炒，去槐花不用）

【用法】量水煎浓汁，食前温服。

【主治】①《医学正传》引《局方》：大便肠风下血。②《症因脉治》：膏粱厚味，致热积腹痛。

69998 秘方柏叶散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】扁柏叶（晒干为末） 糯米（炒黄，为末）各等分

【用法】每服五钱，空心以白汤调下。

【主治】便血。

【加减】如未止，再加炒黑木耳末一钱。

69999 秘方茶调散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【异名】川芎茶调散（《证治汇补》卷二）。

【组成】片芩二两（酒拌炒三次，不可令焦）小川芎一两 细芽茶三钱 白芷五钱 薄荷三钱 荆芥穗四钱

【用法】上为细末。每服二三钱，用茶清调下。

【主治】风热上攻，头目昏痛，及头风热痛不可忍。

【加减】头巅及脑痛，加细辛、藁本、蔓荆子各三钱。

70000 秘方种子丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】熟地 淡苁蓉 陈萸肉 童木通各二两四钱 飞龙骨 煅牡蛎 威灵仙 菟丝子 全当归 大茴香 巴戟肉 远志肉 革澄茄 母丁香 干漆 车前子各二两 茯

苓 广木香 桑螵蛸 蛇床子各一两四钱 全蝎（去尾） 灯心各五钱 革薺四钱 贡沉香三钱 马蔺花八分 蜘蛛十四个

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三四钱，开水送下。

【功用】补气益血，添精壮阳。

【主治】命门火弱，阳痿不兴，下元虚寒，精冷无子。

70001 秘方香连丸

《医方类聚》卷一四一引《经验良方》。为《证类本草》卷七引《兵部手集》“香连丸”之异名。见该条。

70002 秘方重明丸

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】白羚羊角（镑） 生犀角 生地（酒炒） 熟地（砂仁炒） 肉苁蓉（酒浸） 枸杞子 草决明 当归身（酒洗） 防风 楮实子 龙胆草 川芎 羌活 木贼各一两 白羚羊肝四两（煮熟焙干）

【用法】上为细末，加花猪苦胆和炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐汤送下，临卧茶汤送下。

【主治】肝肾虚，眼及内外障翳。

70003 秘方顺肝散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】生地黄 当归 大黄 瓜蒌仁各等分

【用法】上为末。每服一钱，水一钟调下；或用新汲水半钟调下。

【主治】目赤而不痛。

70004 秘方洗心散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】荆芥 甘草 菊花 大黄 当归 芍药各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，加生姜、薄荷少许，水一钟半，煎至一钟，去滓，食后温服。

【主治】①《葆光道人眼科龙木集》：目痛而身热。②《济阳纲目》：风邪客于腠理，湿气相

争,停于两脸,目时赤痛。

70005 秘方洗肝散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】熟地黄 大黄 梔子 当归 甘草 干葛各五钱 赤芍药 甘松 黄芩各三两

【用法】上为细末。每服三钱,米泔调下。

【主治】青膜遮睛。

70006 秘方养脏汤

【方源】《得效》卷六。

【组成】陈皮(去白) 枳壳(去瓤) 黄连(去须) 南木香 乌梅(去核)各五钱 罂粟壳(去蒂膜,蜜炒)一两半 厚朴(去粗皮,姜汁炒) 杏仁(去皮尖) 甘草各五钱

【用法】上为散。五色痢,黑豆、枣子煎;红痢,生地黄、春茶、甘草节煎服。

【主治】五色痢。

【加减】五色痢久不效,加龙骨、赤石脂、人参、芍药各一两,为末,蜜丸,乌梅甘草汤下,粟米饮亦可。

70007 秘方换腿丸

【方源】《局方》卷一(续添诸局经验秘方)。

【异名】换腿丸(《普济方》卷二十九)、换脚丸(《古今医鉴》卷十)。

【组成】蕤苾仁 石南叶 天南星(洗,姜制,炒) 川牛膝(酒浸,焙) 肉桂(去粗皮) 当归(去芦) 天麻(去苗) 附子(炮,去皮脐) 羌活 防风(去叉) 石斛(去根) 草薢(微炙) 黄耆(蜜炙) 续断各一两 苍术(米泔浸)一两半 槟榔半两 干木瓜四两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,空心以温酒或木瓜汤吞下,一日二三次。

【功用】舒筋轻足。

【主治】肾经虚弱,下注腰膝,或当风取凉,冷气所乘,沉重少力,移步迟缓,筋脉挛痛,

不能屈伸,脚心隐痛,有妨履地;干湿脚气,赤肿痛楚,发作无时,呻吟难忍,气满喘促,举动艰难,面色黧黑,传送秘涩。

70008 秘方柴胡汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】柴胡 胡黄连 黄连 厚朴 半夏各等分

【用法】上为末。每服二钱,水一钟半,煎至一钟,食后服。

【主治】阳毒病后目微昏。

70009 秘方润肠膏

《保命歌括》卷二十八。为《医学正传》卷三“润肠膏”之异名。见该条。

70010 秘方益母丸

《玉机微义》卷四十九。为《本草纲目》卷十五引《产宝》“济阴返魂丹”之异名。见该条。

70011 秘方菊花散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】菊花 甘草 防风 荆芥 蝉退 大黄 石决明(煨)各等分

【用法】上为细末。每服三钱,食后卧时以水一钟调服;茶亦可。

【主治】目痛而身热。

70012 秘方黄丸子

【方源】《普济方》卷一六三引《简易》。

【组成】雄黄(研) 雌黄各二钱 杏仁七枚(去皮) 绿豆四十九粒 信砒少许

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。每服二丸,临卧时以生薄荷清茶送下。

【功用】消痰定喘。

【主治】喘。

70013 秘方硃砂膏

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】麻油十斤 槐 杏 桑 桃 柳嫩枝各三十寸(浸三日后再入后药) 沉香(入怀中,用身上热气温燥之,不宜见火)二两 孩儿茶二两 真血竭三两 冰片五钱 象皮二两(切片,砂炒,研末) 真硃砂四两 射干五钱 真琥珀一两

【用法】上为细末，候药微温，搅入极匀，临用时隔水炖化。

【主治】无名肿毒，有名火毒，不论已成未成，已溃未溃。

【宜忌】唯疔不可贴，恐散黄；忌火，因硝砂见火即走。

70014 秘方猪苓汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】猪苓 木通 梔子 大黄 金毛狗脊 篇蓄各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水一钟半，煎至一钟，去滓温服，不拘时候。

【主治】眼常见黑花如绳牵，时复落落蝇羽。

70015 秘方清脾丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】姜黄三钱 白术一两半 人参 槟榔 草果 莪术(醋炒) 厚朴各半两 黄芩 半夏 青皮各一两 甘草三钱

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食远以白汤送下，一日二次。

【主治】疟，三日一发或十日一发。

70016 秘方琥珀膏

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【异名】立退丸、定志丸。

【组成】人参二钱 石菖蒲(炮) 天门冬(去心) 远志(去心) 预知子各一两 白茯苓 麦门冬(去心) 各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服十丸，茶清或水送下。

【主治】旋螺突睛。

70017 秘方揩牙散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】良姜 细辛 大椒 草乌尖

【用法】上为末。以指蘸少许揩牙上，噙少时，开口流去涎。

【主治】牙疼，遇吃冷热独甚。

【备考】《普济方》本方用量：良姜、细辛、大椒、草乌尖各等分。

70018 秘方紫金膏

【方源】《普济方》卷八十六引《海上方》。

【组成】黄连十两(净，捶碎) 黄柏皮十两(去皮外，洗，锉) (上以腊水于净锅煎取一升，滤滓，再用水二斗，煎取一升，复以重绢绵滤) 杏仁三十粒(去皮尖，研极细，作膏) 芫荽半两(去皮，研细) (上以前药水同于银石器熬成膏) 黄丹五两(先用细绢罗了，再研极细) 铜青(净) 轻粉各四分

【用法】上同入前膏子内，不住手搅匀，再用艾叶二十片重捣，烧烟熏药膏子了，然后为丸，如皂子大，阴干，密器收藏，用脑麝养，久留为妙。每用一丸，井水磨点。

【主治】一切眼疾。

70019 秘方蝉花散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】蝉花一两 菊花四两 白蒺藜二两

【用法】上为末。每服三钱，清水调下。

【主治】白膜遮睛。

70020 秘方噙化丸

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】熟地 阿胶(蛤粉炒成珠) 五味子 贝母(去心) 杏仁(炒) 款冬花(去梗) 炙草 人参各等分

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。噙化。

【主治】久嗽不止。

70021 秘方擦牙散

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】生南星(去皮脐)二钱 龙脑少许

【用法】上为极细末，用指蘸合生姜汁放大牙根擦之；如不开者，将应用之药调和稀糊，含在不病人口内，以笔管插入病入之鼻孔，用气将药极力吹入。

【主治】小儿噤口。

70022 秘方蟹黄散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】黄连 黄芩 蒲黄 郁金 梔子 秦皮 当归 滑石 白僵蚕 五倍子 薄荷

白杏仁各五钱 铜绿一钱 杏仁七枚(洗,去皮尖,别研)

【用法】上咬咀。每服三钱,水一钟半,煎至一钟,频频暖洗,不拘时候,如冷再暖。

【主治】目痛而憎寒者。

70023 秘本黄连汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 麦冬 生地 黄 当归 生黄耆

【用法】水煎,加入烧蒲扇灰调服。

【主治】麻疹隐暗不透而用升发之剂取其大汗,使毒从汗解而致汗多亡阳者。

70024 秘传一擦光

【方源】《医学正传》卷六。

【异名】一擦光(《串雅内编》卷二)。

【组成】蛇床子 苦参 芫荽各一两 雄黄五钱 枯矾一两二钱 硫黄五钱 轻粉二钱 樟脑二钱 大风子五钱(取肉) 川椒五钱

【用法】上为细末。生猪油调敷。

【主治】疥疮,及妇人阴蚀疮、漆疮、天火丹,诸般恶疮。

70025 秘传二仙糕

【方源】《扶寿精方》。

【异名】秘传三仙糕(《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》)、八仙糕(《外科正宗》卷一)。

【组成】人参 山药 白茯苓 芡实仁 莲肉(去皮心)各半斤 糯米一升半 粳米三升半 蜜半斤 白糖十斤

【用法】上为细末,合匀,将蜜糖溶化,和末掺授得宜,小木笼炊蒸之,上以米一撮成饭,则药成矣,取起尽作棋子块,慢火上烘干作点心,或为末,贮瓷器。每早一大匙,白汤调下。百日内见效。

【功用】①《扶寿精方》:固齿黑发,壮阴阳,益肾水,养脾胃。②《外科正宗》:轻身耐老,壮助元阳。

【主治】①《东医宝鉴·杂病篇》引《集略》:

内伤脾胃虚弱,饮食不进者。②《外科正宗》:痼疽脾胃虚弱,精神短少,饮食无味,食不作肌,及平常无病,久病但脾虚食少,呕泄者。

70026 秘传二奇汤

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】升麻 乌药

【用法】煎汤,食前服。

【主治】便浊疼痛,兼治偏坠。

【加减】若小便前痛者,以乌药三钱,升麻减半,加小茴香五分,黄柏五分,木通五分,龙胆草五分,汉防己三分;若小便后痛者,升麻三钱,乌药减半,仍加黄柏五分,柴胡五分。

70027 秘传十子丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】覆盆子 枸杞子 槐角子(和何首乌蒸七次) 桑椹子 冬青子(共蒸)各八两 没石子 蛇床子 菟丝子(酒蒸,捣烂) 五味子(炒干) 柏子仁(捣烂)各四两

【用法】上为末,为丸。每服五六十丸,空心以淡盐汤送下。以干物压之。

【功用】添精补髓,调和阴阳。

【主治】男子肾精不坚,女子肝血不足,及五劳七伤,心神恍惚,梦遗鬼交,五痔七疝,诸般损疾。

70028 秘传刀伤药

【方源】《增广大生要旨》。

【组成】桂圆核三钱(研细末) 石榴皮七钱 梅片三分

【用法】敷折骨伤处。

【功用】止血。

【主治】折骨伤。

【备考】愈后无疤。

70029 秘传三仙丹

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】柏枝 槐角子 生矾

【用法】面糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,临卧以冷茶送下。

【主治】咳嗽。

70030 秘传三仙糕

《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》。为《扶寿精方》“秘传二仙糕”之异名。见该条。

70031 秘传三圣散

【方源】《育婴家秘》卷二。

【异名】三圣散（《医部全录》卷四〇九）。

【组成】白滑石（水飞）一两半 甘草二钱半

【用法】和匀，作三份：一用青黛一钱和匀，名安魂散，早以淡竹叶汤下；一用朱砂（水飞）一钱和匀，名镇心散，午用灯心汤送下；一用苦梗细末和匀，名定魄散，晚用苏叶汤送下。

【主治】小儿胎痫。

70032 秘传三意酒

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】枸杞子 生地黄各半斤 火麻子半升（蒸）

【用法】上切细，用无灰好酒一大坛，以生绢盛药入不津坛内，春、秋浸十日，夏浸七日，冬浸半月。

【主治】虚损。

70033 秘传千捶膏

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】蓖麻子（去壳）一两 松香（嫩者）五钱 乳香一钱

【用法】上用铁锤于石上捣千下成膏。敷毒上，外用纸盖之。

【主治】疮疡疔毒。

70034 秘传千捶膏

《全国中药成药处方集》（杭州方）。为原书“千捶膏”之异名。见该条。

70035 秘传飞步丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术八两 草乌（不去皮尖）四两 川芎 白芷各二两 葱白（连根） 生姜各四两

【用法】上切细，作一处入罐内，封固罐口，倒覆阴土地上，在春停五日，夏三日，秋七

日，冬十日，取出前剂晒干为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心茶、酒任下。

【主治】诸风湿，瘫痪，痛风。

【宜忌】忌热物，宜避风，孕妇勿服。

70036 秘传木香散

【方源】方出《直指》卷二十二，名见《医统》卷六十七。

【组成】干猪脬七个（用灯盏火烘过，干，为末） 海螵蛸 木香 青木香 孩儿茶各五钱 雄黄 神曲 麦芽 辰砂各一钱

【用法】上为细末。食后临睡时以酒送下。

【主治】①《直指》：一切癰瘤。②《简明医彙》：结核。

【宜忌】服后即睡，再不可言语，戒恼怒房室。

70037 秘传木通汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】冬葵子半两 山梔仁半两（炒，研） 木通三钱 滑石半两（研）

【用法】上切细，作一服。用水一盞半，煎八分温服。外以冬葵子、滑石、梔子为末，田螺肉和捣成膏，或用生葱汁，调贴脐中。

【主治】孕妇转胞，及男子小便不通。

70038 秘传五疳散

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】白术（蜜水炒）一两五钱 白茯苓（去皮）七钱五分 甘草一钱五分 麦门冬（去心）一两 使君子肉（切碎，略炒）七钱五分 山楂肉三钱 麦芽（炒）五钱 金樱子肉（略炒）五钱 芡实二钱五分 莲肉心（隔纸炒）五钱 青皮（去瓢，面炒）二钱 橘红五钱

【用法】上为极细末，和匀，重七两，每次用药末一两，用炼蜜半斤或四两，调成膏。每日中晌、晚间各服一二茶匙，温水漱口。途中无蜜，滚白水调服亦可。

【主治】小儿五疳潮热，面黄肌瘦，烦渴吐泻，肚大青筋，手足如柴，精神憊倦。

【加减】身热咳嗽，加地骨皮、百部各五分；肚腹饱胀，大便稀水，肠鸣作漉或虫出不和，加槟榔二钱五分，木香一钱；禀受气弱，加人参二钱五分。

70039 秘传牙痛方

【方源】《人己良方》。

【异名】千金一笑散。

【组成】巴豆一粒（去壳，取仁）

【用法】以龙眼肉包好含患处一炷香久取出。其涎水随药而出，吐清涎水便愈。

【主治】牙痛。

【宜忌】切勿咽下，令作呕泄，慎之。

70040 秘传牛黄丸

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】牛黄二钱 羚羊角 龙骨（煨）茯神 半夏各一两 石菖蒲 朱砂 雄黄珍珠 枣仁各五钱

【用法】上为末听用。南星六个，切下蒂挖空，将前末填满，原蒂盖上，用鲜麦门冬叶包席草扎紧，猪心二个，同人锅内，蒸半香取出，换叶、草、猪心，依前法制，取露星月夜，再换叶、草、猪心，如前九遍为度，完日去星，用内药晒干，为细末，猪心血和蜜为丸，金箔为衣。每服六十丸，以人参汤送下。

【主治】痫证。

70041 秘传反魂丹

【方源】《续名家方选》。

【组成】鹤虱 莪术 三棱 陈皮 黄连 大黄 胡黄连各三钱七分五厘 雄黄 枳壳 青皮 黄芩各三钱五分 乳香 丁香各一钱五厘 甘草减半 牵牛 知母 熊胆（渍水去腥气）各三钱七分 麝香一钱二分五厘 白丁香（少炒赤小豆）一百五十粒

【用法】先十七味为末，后纳麝香、熊胆和匀，荞麦面为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。凡癫痫新发者，服此丸三十丸；或虽经年不愈者，一日一发、二日一发者，服之可至百日。与之后不出五日而一发者，数十日不再发者，

愈之兆也。小儿五岁以上三丸，十岁以上七丸，十五岁以上十五丸。

【主治】一切癫痫，小儿内证诸疾，或疟疾久不愈而为疟母，及惊风癖疾，疳虫。

70042 秘传乌鸡丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】熟地 白术 川芎 白芍 厚朴 香附 甘草各三两 人参 砂仁各二两 海金沙四两

【用法】上药合一处和匀，用乌骨公鸡一只约二三斤，不落水，去净毛，并去肚杂及头翅足，将前药取一分置于鸡腹内，及外余药一并置入铜罐内，用好酒五碗，水二钟，文武火煮至干，取出去骨，用净肉同药晒干，为末，酒糊梗米为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，每晨以米饮或酒送下。

【主治】妇人二十五六岁，血海虚冷，气血俱虚，经脉不调，或时腹痛，或下白带如脑髓流，或如米泔，不分信期，每来淋漓不止，面色痿黄，四肢无力，头晕目眩眼花。

70043 秘传六和丸

【方源】《寿亲养老》卷二。

【组成】熟地黄十两 破故纸 菟丝子 白茯苓（去黑皮，晒） 山药各十两（晒干） 胡桃五十颗（须用赣州信封产者佳）

【用法】先将熟地黄、破故纸、菟丝子三味酒浸一宿；次早饭甑上蒸，日中晒干，九浸九蒸九晒，候十分干；次和白茯苓、山药二味为极细末；次用胡桃研烂，和五味令匀，用酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒盐汤送下。

【功用】益老扶羸，助脾活血，进美饮食。

【宜忌】忌犯铁器。

70044 秘传六神丸

【方源】《医便》卷一。

【组成】生芡实（大者）五十个（去壳） 龙骨（煨）五钱 莲蕊须（未开者佳，渐采渐晒，勿令器净）四两 山茱萸（鲜红者，去核，净肉）三两 覆盆子（净）二两 沙苑

蒺藜(炒)四两(要真者)

【用法】上先将蒺藜捣碎,水熬膏,滤去滓,其滓仍晒干,和众药为末,炼蜜和蒺藜膏为丸,如梧桐子大。每服九十丸,空心煨盐汤送下。

【功用】固真育子。

70045 秘传斗门方

《景岳全书》卷五十四。为《局方》卷六(续添诸局经验秘方)“秘传斗门散”之异名。见该条。

70046 秘传斗门散

【方源】《局方》卷六(续添诸局经验秘方)。

【异名】秘传斗门方(《景岳全书》卷五十四)。

【组成】黑豆(炒,去皮)十二两 干姜(炮)四两 罂粟壳(蜜炒)半斤 地榆(炒) 甘草(炙)各六两 白芍药三两

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,煎七分,温服。

【主治】八种毒痢,脏腑撮痛,脓血赤白,或下瘀血,或成片子,或五色相杂,日夜频并,兼治禁口恶痢,里急后重,久渴不止,全不进食,他药不能治者。

70047 秘传水银膏

《景岳全书》卷五十一。为《痘疹传心录》卷十五“水银膏”之异名。见该条。

70048 秘传平疟饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】槟榔 枳壳 陈皮 甘草(炙) 常山 桔梗 地骨皮 五加皮 赤芍药 白茯苓各等分(一方无茯苓,有草果)

【用法】上切细,用瓷碗盛之。酒浸露一宿,临发日去滓,空心热服;滓仍用酒一盞半,煎八分服。

【主治】疟。

【加减】多寒,倍加槟榔、枳壳;热多,倍加陈皮、甘草。

70049 秘传平毒散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】天门冬(新掘)三五两

【用法】上洗净,入砂盆内为细末,以好酒投之,去滓顿服,未效再投。

【主治】痈肿初起。

70050 秘传平秽散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】瓦垞子(火煨) 五倍子(炒) 孩儿茶各一钱 片脑二分

【用法】上为细末。先以防风、荆芥、乌药、地榆、苦参各等分,用水五升煎,入小瓶内,将玉茎纳入熏洗。后敷药疮上。

【主治】下疳疮。

【宜忌】禁房室。

70051 秘传正胃丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】吴茱萸 黄连各一两

【用法】黄连切细,吴茱萸以井花水浸七日,去黄连将吴茱萸焙干。每日清晨服四十九丸,米饮汤送下。

【主治】吞酸。

70052 秘传正骨丹

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】降真香 乳香 没药 苏木 松节 自然铜(醋煨七次) 川乌(炮) 真血竭各一两 地龙(去土,酒浸,烘干) 生龙骨各一钱 土狗十个(浸油内死,烘干)

【用法】上为末。每服五钱,随病上下酒调服。觉药自顶门而至遍身,搜至病所,则飒飒有声而筋骨渐愈,病人自知之。服药后仍服人参、白术、黄耆、当归、川芎、肉桂、甘草、白芷、厚朴以调补元气。

【功用】续筋骨。

【主治】跌打损伤,骨折血瘀。

70053 秘传玉锁丹

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)。

【异名】玉锁丹(《普济方》卷二十九引《仁存方》)。

【组成】茯苓(去皮)四两 龙骨二两 五

倍子六两

【用法】上为末，水为丸。每服四十丸，空心以盐汤送下，一日三次。

【主治】心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，漩有遗沥，小便白浊如膏，梦寐频泄，甚则身体拘倦，骨节痠疼，饮食不进，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口干燥，虚烦盗汗，举动力乏。

【备考】本方改为散剂，名“玉锁散”（见《不知医必要》）。

70054 秘传归参汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 人参 川芎 白术 生地 黄 陈皮 白茯苓 甘草（炙）

【用法】上切细。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎，去滓，温服。

【功用】产后大补气血。

【加减】腹胀痛，发寒热者，是恶露未尽，去人参，加桃仁、红花、干姜、肉桂、五灵脂（半生半炒）；甚不已者，加熟附子一片。

70055 秘传生肌散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】孩儿茶 赤石脂 黄连 黄柏 松香

【用法】上为细末。先将疮口洗净，干掺疮上。

【主治】疮疡。

70056 秘传白玉膏

《仙拈集》卷四。为《奇方类编》卷下“白玉膏”之异名。见该条。

70057 秘传白犀丹

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白犀角 麻黄（去节） 山慈菇 玄明粉 血竭 甘草各一钱 雄黄八分

【用法】上为末，用老姜汁为丸，如枣核大；外以红枣去核，将药填入枣内，用薄纸裹十五层，入砂锅内炒令烟尽为度，取出，去枣肉，每药一钱，入冰片一分，麝香半分研极

细，瓷罐收贮。用时以角簪蘸麻油粘药点眼大角，轻者，只点眼角，重者仍用些须吹鼻，男先左女先右，吹点皆同；如病甚者，先吹鼻，后点眼，点后蹠脚坐起，用被齐项暖盖半炷香时，自当汗出邪解，如汗不得出，或汗不下达至腰者不治。

【功用】发散外感瘟疫痼毒。

【主治】伤寒瘟疫，及小儿痘毒壅闭，痼毒吼喘，及阴毒冷气攻心，或妇人吹乳，或眼目肿痛，鼻塞闭塞。

【宜忌】忌生冷、面食、鱼腥、七情。

【备考】又一制法：将药用姜汁拌作二丸，以乌金纸两层包定，外捣红枣肉如泥，包药外，约半指厚，晒干，入砂锅内，再覆以砂盆，用盐泥固缝，但留一小孔以候烟色，乃上下加炭火，先文后武，待五色烟尽，取出，去枣肉，每煨过药一钱，只加冰片二分，不用麝香。

70058 秘传白膏药

【方源】《直指·附遗》卷二十二。

【异名】白膏药（《医学入门》卷八）。

【组成】官白粉一两半 赤石脂（煨）一两 章脑五钱 轻粉二钱五分

【用法】上为细末。以生猪油（去膜）捣烂，和前药调匀，先将生肌散掺上，后贴之。

【主治】痈疽。

70059 秘传宁口散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】青黛二钱 硼砂一钱 孩儿茶 薄荷叶各五分 片脑二分（一方有蒲黄、朴消、生甘草）

【用法】上为细末。以笔尖蘸药，点患处；咽疼用芦管吹入。

【主治】牙痛牙疳，口舌生疮，咽喉肿痛。

70060 秘传宁口散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】蒲黄 竹沥

【用法】上调匀。敷舌下。

【主治】小儿重舌马牙，口舌生疮，咽喉不

利。

70061 秘传宁痒散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】川槿皮一两 红娘子 青娘子各七个 斑蝥三个（去翅） 贝母五钱 槟榔二个

【用法】上切细。用水浸露三日夜，搗碎，先以川山甲刮破，用鹅翎搽之。

【主治】风虫顽癣。

70062 秘传发灰丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】头发不拘多少（烧存性，用壮年无病者佳）

【用法】上为细末，别用新采侧柏叶捣汁，调糯米粉打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白滚汤送下；或煎四物汤送下。

【主治】尿血。

70063 秘传地仙丹

《良朋汇集》卷三。为《本草纲目》卷三十六引《保寿堂方》“地仙丹”之异名。见该条。

70064 秘传地黄膏

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】生地黄二斤 麦门冬半斤 败龟版半斤（酥炙，另研为末）

【用法】上切细，用水一斗，煎至五升，滤去滓，再煎如稠饴，下龟版末顺搅煎，滴水中不散为度，以瓷罐盛贮，埋地下三日，出火毒取出。以白汤或酒调服，不拘时候。

【主治】嘴腮肿毒，或疮疖，或好食煎煨之物生肿毒。

70065 秘传夺命丹

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】枯矾 直僵蚕（炒，去丝） 硼砂 皂角末各等分

【用法】上为细末。每用少许，吹入喉中，有痰吐出。

【主治】急喉风，痰涎壅塞。

70066 秘传百解散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参七钱 甘草（炙）三钱五分

白术 白茯苓各六钱 黄耆（炒） 陈皮（去白） 糯米（炒）各五钱 升麻（炒）二钱 川芎 白芷各三钱 天麻二钱五分 僵蚕（炒）一钱五分 南星（姜制）五分

【用法】上为细末。每服三分，伤风用生姜汤或葱汤，欲出麻疹用生姜汤，热甚用薄荷汤调服。

【主治】小儿感冒风寒，身热咳嗽，欲出瘾疹，并痘后欲出麻疹。

70067 秘传夹纸膏

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】老松香 樟脑 虢丹（炒） 水龙骨（即旧船底内油石灰）

【用法】上为细末，溶化松香，以小青油为之，以油纸随疮大小作夹膏。洗净疮后贴之，二三日一换；若不效，加白芷、川芎、蜈蚣于前膏内，若不加入，以此三味煎汤洗之亦效。

【主治】瘰疬久不愈。

70068 秘传当归膏

【方源】《直指》卷九。

【异名】当归膏（《医学入门》卷七）。

【组成】当归（酒洗）一斤六两 生地黄一斤（酒洗） 熟地黄三两（酒洗） 薏苡仁八两（米粉同炒） 白芍药一斤（粉炒） 白茯苓十二两 白术一斤 莲子四两（去心） 山药五两 人参四两（加洗用） 甘草三两 枸杞子一斤四两（甘州者佳） 贝母三两（去心） 地骨皮四两 麦门冬五两（去心） 天门冬二两（去心） 五味子一两 琥珀一钱二分

【用法】上各锉细，和足，以水十斤，微火煎之，再加水十斤，如此四次，滤其滓，取汁，文武火煎之，如法为度，每斤加炼熟净蜜四两，春五两，夏六两，共熬成膏。

【功用】养血和中，滋荣筋骨，养阴抑阳。

【主治】五劳七伤，诸虚劳极，脾胃虚弱。

【加减】吐血，加牡丹皮二两；骨蒸，加青蒿汁二碗，童便二碗；劳痰，加钟乳粉一

两。

70069 秘传团鱼羹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】团鱼（大者）一个

【用法】水煮，去肠甲，加生姜七片，砂糖一小块，不用盐酱，少入米粉，作羹吃一二碗。

【主治】痢疾。

70070 秘传先天丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】干先天一两（即女子首经）紫河车四具（即头生男胞衣，用米泔水洗净，新瓦上焙干，为末）甘州枸杞子四两野枸杞叶一斤（洗净，晒干）熟地黄四两（酒拌，蒸）生地黄四两（先酒洗，后用稠豆汁一大碗浸，干为度）金雀花四两赤石脂一两红花二两白茯苓（旱莲蓬汁浸，晒干，又以人乳汁浸，晒干，九次为度）真乳香一两仙鹤骨一付（酥炙）辰砂一两（透明如榴子者，另研极细）绿毛龟九个（釜底用活鲤鱼同水以筛子瞒住，上放龟蒸熟，取肉晒干，甲酥炙）川牛膝四两（酒浸，去芦）嫩鹿茸二两（酥炙）石菖蒲二两（寸生九节者佳）真秋石二两干乳（三伏时用大瓷盘一个，将乳汁倾于内，以纱筛盖之，晒干，再倾再晒，如此则干）四两

【用法】上俱各净制，为细末，用白蜜一斤四两，好酒一斤和匀，炼过，将药末入内和匀，为丸，如豌豆大。每服五六十丸，空心以淡盐汤或温酒任下。

【功用】补养。

【宜忌】忌萝卜、诸血。

70071 秘传延寿丹

【方源】《良方集腋》卷上。

【异名】延寿丹（《世补斋医书·文集》卷八）、首乌延寿丹（《中药成方配本》）。

【组成】何首乌（取赤白两种，黑豆汁浸一宿，竹刀刮皮，切薄片晒干，又用黑豆汁浸一宿，次早柳木甑桑柴火蒸三炷香，如是九

次，晒干）共七十二两菟丝子（先淘去浮空者，再用清水淘，挤去沙泥，五六次，取沉者晒干，逐粒拣去杂子，取坚实腰样有丝者，用无灰酒浸七日方入甑，蒸七炷香，晒干，再另酒浸一宿，入甑蒸六炷香，晒干，如是九次，晒干磨细末）一斤稀荳蔻（五六月采叶，长流水洗净，晒干，蜂蜜同无灰酒和匀拌潮一宿，次早蒸三炷香，如是九次，晒干为细末）一斤桑叶（四月采取嫩叶，长流水洗净，晒干，照制稀荳蔻法九制，取细末）八两女贞实（冬至日摘腰子样黑色者，剥去粗皮，酒浸一宿，蒸三炷香，晒干，为细末）八两忍冬花（一名金银花，摘取阴干，照稀荳蔻法九制，晒干，细末）四两川杜仲（厚者是，去粗皮，青盐同姜汁拌潮，炒断丝）八两雄牛膝（怀庆府产者佳，去根芦净，肉屈而不断，粗而肥大为雄，酒拌，晒干）八两怀庆生地（取钉头鼠尾或原枝末，入水曲成大枝者有效，掐如米粒者，晒干，为细末）四两

【用法】用四膏子（旱莲草熬膏一斤，金樱子熬膏一斤，黑芝麻熬膏二斤，桑椹子熬膏一斤）同前药末为丸，如膏不足，白蜂蜜增补，捣润方足。

【功用】乌须黑发，却病延年。

【主治】阴虚，脾虚，麻木，头晕，目昏，肥人痰湿多。

【加减】阴虚，加熟地黄一斤；阳虚，加附子四两；脾虚，加入参、黄耆各四两，去地黄；下元虚，加虎骨一斤；麻木，加明天麻、当归各八两；头晕，加玄参、明天麻各八两；目昏，加黄甘菊、枸杞子各四两；肥人痰湿多，加半夏、陈皮各八两。

70072 秘传安神汤

《松崖医径》卷下。即《保婴金镜》引《秘旨》“安神丸”改为汤剂。见该条。

70073 秘传羊肝丸

《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。为《本草图经》引《传信方》（见《证类本草》卷七）“羊肝

丸”之异名。见该条。

70074 秘传杖疮膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】香油四两（真者佳，将穿山甲、柏枝先入油中煎数沸，去二件滓，乘热将薄棉滤净油，复入锅中煎沸，以次下药。冬月用油五两）穿山甲一片 柏枝一根（以上二件取油煎汁，不用滓，取法见前）槐枝一茎（须另报开小条，不用大树上者，入药油用此频搅）府丹（即飞丹，净水飞去漂脚，取细末）一两（作二次入油）水花珠（净水飞去漂脚，晒干，取细末）二钱 血竭 没药 乳香 孩儿茶各三钱（捶碎和匀，共入铜锅，炭火上炒沸过，为细末）新珍珠 新红象牙（各面包，烧存性，取细末，油旧者不用）面粉（炭火上烧黄）各一钱 人指甲（炒黄）三七（晒干，取细末）石乳（铜锅内炒过，取细末）黄连（细末）黄芩（细末）各三分 海螵蛸五分（细末）半夏（大者）十枚（为细末。以上俱用极细筛筛过，和匀分作五分，留起一分，看膏药老嫩加减，只用四分作四次下，下法如下）樟冰（细末）四钱 黄蜡二钱 冰片一分 麝香三分 阿魏（成块者）五分（以上四件待诸药俱下尽，临起锅时方下，搅极匀取出阿魏滓）

【用法】先将细末药分五分，其四分以次下锅如下，其一分留看药厚薄以为增减，如四分已下尽药尚薄，亦将此分渐下，如正好，留此一分，待点膏药时掺在患处尤妙。煎法用上好香油四两，入铜锅中炭火煎沸，沸时入柏枝一茎，穿山甲一片在内，煎数沸去二药滓，将薄棉纸乘热滤净油，揩净锅，复入油于锅中煎沸，下府丹五钱，用槐条急搅不住手，至成膏方止，候六七煎后，用清水漱净口喷清水少许于锅中即取锅。一起锅时于前四分中细末入药将一分渐渐逐一挑下，急搅如前，此分药尽约匀和了，将槐条蘸药滴水且未要成珠，复置锅火上急搅，候沸起锅。二

起锅复将前末药一分渐下锅中急搅如前，约匀和滴水要成珠，复置锅炭火上急搅，候沸起锅。三起锅渐下药搅如前，约匀和，将药滴水虽成珠尚要粘手，复置锅火上如前。四起锅渐下药如前急搅，约匀和将药滴成珠，珠要将至不粘手了，复置锅炭火上，候沸起锅。五起锅即下黄蜡二钱，府丹五钱急搅如前，将药滴水成珠，要须不粘手，又不可太老了，如尚粘手，将前留下一分末药渐下以不粘手为度，如不粘手了，即下水花珠二钱，次下樟冰末四钱，急搅不住手，量药已均和了，擦阿魏滓去之，以药入瓷器内，浸冷水中片时，候凝，将药寻露天阳净地，掘坎将瓷器倒覆于坎中，仍以土覆好，候七日后方起。藏法用油纸及箬包好瓶口以防泄气。摊膏药时用汤中煎过净油单纸摊上药，不用火烘，只用热汤入器中，将油纸放器上，以药放上摊开，又不用太厚，须于纸上照得见为妙，如以绢摊，用汤炖烊药摊上。贴时先将菜蔬汁、桑叶煎汤，露中露过一宿，用以洗患处，方用贴之。既贴后每日洗一遍，不要换膏药，至二三日后血散风去，方换收口黑膏药（即万应膏）。

【主治】打伤，金疮及无名肿毒、疔疮。

【宜忌】跌伤及别样疮忌贴。

70075 秘传豆黄丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】黑豆一斗

【用法】上浸透，甑上蒸熟，铺席上，用荷叶或蒿覆如造酱法，七日黄透取出晒干，去黄为末，入炼猪油为丸，或加蜜少许。每服一百丸。

【功用】壮气力，润肌肤，填骨髓，补虚损，开胃进食，令人肥健。

【主治】湿痹膝痛，五脏不足，脾胃气结积滞。

70076 秘传芦荟丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】胡黄连 芦荟 黄连(炒) 使君子(去壳)各五钱 神曲(炒)一两 阿魏 青黛(另研)各二钱 麝香(另研)少许

【用法】上为细末，稀糊为丸，如黍米大。每服三十丸，白术汤或米饮送下。

【主治】小儿疳积腹大。

70077 秘传赤龙丹

【方源】《痘科辨要》。

【组成】人参 葛根 桔梗 茯苓 辰砂各一两 龙脑一钱五分 菊铭石(酢浸，烧末) 犀角 木香各二钱二分 玳瑁 丹砂 麝香各一钱二分 金箔 银箔各十二枚 牛黄二钱五分 香附子一钱二分

【用法】上为细末，以白蜜炼合，或以姜汁和匀用之。

【主治】痘前后惊搐不醒。

70078 秘传连翘汤

【方源】《外科精要》卷中。

【异名】连翘汤(《济阴纲目》卷十四)。

【组成】连翘 升麻 朴消各一两 玄参 芍药 白薇 防风 射干各八分 大黄一两二钱 甘草(炙)五钱 杏仁八十个(去皮尖，同面炒黄，另研)

【用法】每服四钱，水煎服。下恶物后，服内托散之类。

【主治】产后妬乳并痢。

70079 秘传返魂汤

《松崖医径》卷下。为《医学入门》卷八“返魂汤”之异名。见该条。

70080 秘传羌活散

【方源】《普济方》卷一一四。

【组成】甘草 黄芩(鼠尾者) 生地黄(肥者) 连翘 山梔子 蔓荆子 当归 滑石(桂府者) 香白芷(汤洗) 荆芥(陈者) 石膏(明者用) 薄荷(吉州) 羌活 台芎(水洗) 赤芍药 独活 麻黄 陈皮 桔梗 防风各等分

【用法】上咬咀。每服一两二钱。初服药之时，必加大黄、朴消，动脏腑数行，用温粥

补之，量病虚实加减。春、冬多利数行，夏微动一二行便补，自后每日一贴，不加大黄、朴消，用水煎至分数。煎药当用文武火，于砂石器内煎，存下药滓晒干，多加朴消在内，煎汤洗浴。

【主治】一切风证。

【加减】病人血色如黑，多加当归、生地黄；病人麻木处或刺痛甚，多加羌活、白芷、麻黄、赤芍药。无当归，以苏木代。

70081 秘传补阴汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黄柏 知母 当归 熟地黄 人参 白术 白芍药 山梔仁 黄耆 莲肉 陈皮 白茯苓

【用法】上切细。用水二盏，加生姜一片，大枣二枚，煎一盏，去滓服；若作丸剂，加糯米白皮为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】便浊遗精及女人白带。

70082 秘传补脾汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】补脾汤(《古今医鉴》卷十三)。

【组成】白术一钱二分 黄耆(蜜炙) 当归(酒洗) 川芎 人参 陈皮 肉豆蔻(煨) 神曲(炒) 干葛各五分 白芍药一钱(酒炒) 白茯苓 半夏各七分 黄连(炒) 甘草(炙)各四分

【用法】上切细。用水一盏半，加生姜三片，煎服。

【功用】补脾胃。

【主治】小儿脾经不足，土败木来侮，目睛微动摇，微惊搐；或潮热往来，脾胃有伤，饮食少进；或泄漏呕吐，面色黄，脉无力。

70083 秘传妙济饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】一枝箭(水洗去土用)

【用法】生白酒煎服。得微汗为佳。将滓罨疮上。

【功用】消肿。

【主治】便毒，小疮疖。

70084 秘传枣矾丸

【方源】《医便》卷二。

【组成】红枣一斤（去核） 鸡肫皮四个（焙干为末） 皂矾一两 醋醋一碗

【用法】上为末，醋煮飞罗面为丸，如绿豆大。每服五十丸，食远酒送下。

【主治】黄肿病。

70085 秘传郁金散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】郁金 大黄 朴消各等分

【用法】上为末，用桃条、生地黄自然汁调服，点瞳仁。

【主治】血侵睛（赤眼）。

70086 秘传拔毒丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】白矾三钱 雄黄 硼砂 辰砂各三分 雌黄 血竭 硃砂各五分 牛黄 乳香 没药各二分 砒霜一分（炼） 斑蝥三个（去翅足） 巴豆三粒（去油）

【用法】除白矾，上各为细末，先将白矾用铁铤熔化后，将前药末掺矾上，候烟尽取起，置土地上出火毒，再为极细末，入麝香五厘，蟾酥一分，轻粉五分，再共研和匀，用竹筒收贮。每用旋取小许，以糯米饭捣成药钱如粗布针大，焙干，如脓已成者，无眼用三棱针刺破，将药线徐徐纳入，深至痛止，外用乌金纸剪如钱大，津粘毒上封住，其脓自化；如已溃烂臭腐眼大者，只以末药津调敷疮内外，亦用乌金纸粘封。

【主治】疮疡。

【宜忌】每用此法，须用围药护卫好肉。

70087 秘传抱龙丸

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】赤芍一钱 川贝母一钱七分 防风五钱 桔梗三钱 明天麻一钱七分 钩藤三钱三分 枳壳三钱 薄荷叶三钱 胆星七钱 陈皮三钱 天竺黄三钱 茯神二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，

朱砂为衣。每服一丸，以滚汤送下；有外邪者，姜汤送下。

【主治】小儿着惊，唇青四肢摇动，起卧不安。

70088 秘传抱龙丸

【方源】《寿世新编》。

【组成】白附子二两（炮） 胆星一两（姜炒） 羌活一两 僵蚕一两（炒，去嘴） 前胡一两 橘红一两五钱 天竺黄二两 天麻一两（纸包，煨） 青皮一两（醋炒） 全蝎一两（米炒） 黄芩（生）八钱 花粉二两 生黄连五钱 南薄荷一两 真琥珀三钱 盔沉香一钱 抱茯神一两 双钩藤一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，朱砂为衣。每服一丸，重则二二丸，开水化下。

【主治】小儿惊风发搐，咳嗽痰喘，舌赤唇干，口渴便短，手足抽掣，痰涎壅盛，一切惊痫风热。

【宜忌】面青，唇舌淡白，小便清利者不可服。

70089 秘传败毒散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】穿山甲（火煨存性，或炒）一两 白芷五钱（一半生，一半炒） 川大黄五钱（一半生，一半煨） （一方有酒炙败龟版一两）

【用法】上为细末。每服三钱，酒调下；重者，煎真人活命汤调下。觉腹中作疼，则脓毒从大便出矣。

【主治】发背，痈疽，疔肿，瘰癧，便毒。

70090 秘传固本丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参 生地 熟地 麦冬（去心） 菟丝子（酒制） 枸杞子 覆盆子 小茴（盐炒） 五味子 肉苁蓉 巴戟 山药 山茱萸（去核） 牛膝（酒制） 杜仲（姜炒丝尽） 当归（酒制） 茯苓（去皮） 川椒（去目合口，炒） 木通 黄耆（蜜炙）各

二两 木通一两 官桂五钱 黄柏四两 (酒炒) 知母 (去毛, 酒炒) 四两 破故纸 (炒) 一两 虎胥骨 (酥炙) 一两

【用法】上各制净, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服七八十丸, 空心以盐汤或盐酒送下。

【功用】生精血, 补五脏, 除百病, 美容颜, 平补气血, 补下元诸虚。

【主治】诸虚百损, 腿膝无力。

70091 秘传和中饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】白术 陈皮 (去白) 白茯苓 白芍药各一钱 草果 (去皮) 七分 甘草 (炙) 三分 陈仓米二钱 砂糖二钱 乌梅一个 罂粟壳 (醋炙) 一钱五分

【用法】上切细。用水二盏, 加生姜三片, 大枣一枚, 煎至一盏, 去滓温服。

【主治】痢, 不分赤白新久。

【宜忌】若发热噤口不食者, 慎勿服。

70092 秘传刮金丹

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】丁香 木香 藿香 当归 人参 (去芦) 白茯苓 (去皮) 官桂 (去皮) 大黄 白术 干姜 (炮) 桔梗 苁蓉 (酒浸) 柴胡 (去芦) 槟榔 黄连 (去芦) 防风 (去芦) 陈皮 车前子 吴茱萸 皂角 (去皮弦, 醋炙) 天门冬 川乌 (炮) 砂仁 肉豆蔻 (炮) 黄耆 防己 鳖甲 (醋炙) 羌活 紫苑 川椒 (去目) 巴豆 (去皮心, 炒) 蓬莪术 熟地黄 厚朴 (姜制) 川芎 香附子 石菖蒲 (酒浸) 麝香少许 小茴香各等分 甘草少许

【用法】上为细末, 炼蜜和匀, 捣千余下, 油纸裹之, 用则旋丸, 如梧桐子大。每服五丸, 伤寒汗后恶寒, 以陈皮汤送下, 不止, 当归汤下; 汗后有热, 以杏仁汤送下; 热多寒少, 以艾汤送下, 不止, 以甘草汤送下; 干呕, 干吃三丸; 不得汗, 以姜汤送下, 又不汗, 以好酒送下; 大小便不通, 以竹叶汤送下, 不止, 以灯心汤送下; 头痛, 以川芎汤

送下; 腹胀, 以陈皮汤送下; 战汗不止, 以木香汤送下; 破伤风, 角弓反张, 先用生姜汤送下, 后以木香汤送下; 如疼, 以乳香没药汤送下; 伤寒结胸, 先用生姜汤送下, 不止, 以酒送下, 再不止, 以小柴胡加枳实生姜汤送下; 盗汗, 用陈麸麦汤送下; 左瘫右痪, 用木香汤送下; 骨节疼痛, 膏药贴; 寒湿脚气, 用木香汤送下, 膏药贴; 肋下刺痛, 以姜汤送下, 后二日用膏药贴; 酒积, 以好酒送下; 气积, 以甘草汤送下, 不止, 以陈皮汤送下; 饮食无味, 以桂皮汤送下; 面上风疮, 以生姜汤送下; 胀腮, 用好醋墨收, 然后用生姜汤送下; 反食病, 先用生姜汤进二服, 后用粥一碗, 生姜七两, 花椒一合, 同煮干, 组生姜汁同服; 风癖, 以小茴香汤送下; 瘤子, 以好酒送下; 汤烫, 用鸡蛋白涂银钗同调膏药摊贴疮上, 用药三丸, 以薄荷汤送下; 眼痛, 以黄连汤送下, 不止, 以薄荷汤送下; 癣疥瘙痒, 以生姜汤送下, 连进三服; 跌伤血攻心, 以童便送下; 火烧伤, 与汤烫伤同治; 小肠气, 以木香汤送下, 常服; 心疼, 以生姜汤送下; 口眼歪斜, 先用当归汤送下, 后用木香汤送下; 眼有冷泪, 以黄连汤送下, 常服; 冷气攻心, 以热酒送下; 酒食所伤, 以热酒送下; 里急后重, 先用姜汤送下, 后用诃子汤送下, 不止, 以甘草汤送下; 阴症, 用黑豆炒糊淋酒热服; 血劳口吐血, 先用猪胆后用羊胆, 温水调服; 黄病, 先用川芎汤送下, 后用芍药汤送下; 癖症, 先用姜汤送下, 后用膏药贴; 便毒, 用黑姜、猪胆调膏药贴, 姜汤送下三五丸; 疯狗咬, 以葵菜汤送下; 狗咬, 用米泔水洗, 以芍药汤送下; 呕吐, 以乳香汤送下, 干嚼三五丸亦可; 伤力口吐血, 先用猪胆, 后用羊胆, 温水调服; 气喘, 以木香汤送下; 癆嗽, 以杏仁汤送下, 不止, 以丁香汤送下; 痰饮, 以生姜汤送下, 不止, 用膏药贴心头; 身腿浮肿, 先用生姜汤, 后用盐汤送下; 痔漏, 先用姜汤送下, 后用醋煮香附子汤送下, 常服,

不好，用当归汤送下；年老脐下疼，以人参汤送下，常服；脱肛，以好酒送下，常服；牙疳，以葱白汤送下；摇头风，以川芎汤送下，后用人参汤送下；心风发狂，以辰砂汤送下，后用姜汤送下；邪热，以雄黄汤送下；赤痢，以生姜汤送下，不止，以诃子汤送下；白痢，以甘草汤送下；后以葱白汤送下；脓痢，以米泔水送下，不止，以诃子汤送下；口舌生疮，先用生姜汤送下，后用芍药汤送下，次用膏药贴患处。

【主治】伤寒恶寒发热，头痛，腹胀，伤寒结胸，破伤风，瘫痪，眼歪斜，寒湿脚气，喘嗽，水肿，痔漏脱肛，痢疾。

【备考】用法中所云膏药方如下，与上方兼用：木香、苍术（米泔水浸）、蛇床子、甘草、马蔺花、茺萸、大附子一个（盐水浸，炮）、官桂、车前子各一两。为细末，每用药一匙，面一匙，生姜汁调煮成糊，调摊纸上，热贴患处即愈。

70093 秘传肥儿丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【异名】肥儿丸（《良方合璧》）。

【组成】白术 莲肉 山楂各一两五钱 白芍 神曲 五谷虫各五钱 芡实 茯苓各一两 泽泻四钱 陈皮四钱 甘草二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服二钱，空心以米饮送下，少加白糖亦可；若是腹痛，不用蜜丸，可作散，瓷器收贮。

【主治】小儿肚大青筋，骨瘦毛焦，泻痢疳热。

【加减】瘦成疳，加芦荟；腹中泄泻，加肉果；内热口干，大便燥结，加黄连；潮热，加银柴胡；有虫，加使君子肉三钱；肚腹膨胀，大便稀水，肠鸣作声，加槟榔、木香各一钱。

70094 秘传泻肝汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】川芎 白芍药（炒） 半夏（汤泡） 白茯苓各八分 当归（酒洗） 柴胡

橘红 枳壳（炒） 天麻各六分 黄连（酒炒） 甘草（生）各四分 薄荷三分

【用法】上切细。用水一盞，加生姜三片，煎服。

【主治】小儿肝经火旺有余，目睛动摇，痰气上升，或壮热惊搐，面色红，脉有力，脾胃无伤者。

70095 秘传治疳汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】山楂肉 白芍药（炒） 白茯苓 黄连（姜汁炒） 白术 泽泻各一钱 青皮四分 生甘草三分

【用法】上切细。用水一盞，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿疳病，大便色泔白，小便昏浊，或澄之如米泔。

70096 秘传降气汤

【方源】《普济方》卷三二五引《卫生家宝》。

【组成】真降香一钱 没药一钱 麒麟竭一钱

【用法】上为末。每服一钱，磨真降香温酒调下。

【主治】血气攻刺，如钻针所刺，痛不可忍，及一切败血成积。

70097 秘传降气汤

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】桑白皮（炒）二两 骨碎补（去毛，炒） 草果仁（去皮，煨） 五加皮（酒浸半日，炒黄） 半夏（生，为末，生姜自然汁为饼，再碎炒） 桔梗 诃子（炮，去核）各半两 甘草（炒） 枳壳（去瓢，麸炒） 陈皮（去白，炒黄） 柴胡（去芦） 地骨皮（炒黄）各一两

【用法】上为粗末，和匀，再就煮一伏时，晒干。每服二钱，紫苏三叶，姜钱三片，水一盞，同煎至七分，食后通口服。后以所主药治之。

【功用】调顺荣卫，通利三焦，开膈化痰，和五脏。

【主治】①《局方》(宝庆新增方):男子妇人上热下虚之疾,凡饮食过度,致伤脾胃,酒色无节,耗损肾元,水土交攻,阴阳关隔,遂使气不升降,上热则头目昏眩,痰实呕逆,胸膈不快,咽喉干燥,饮食无味;下弱则腰脚无力,大便秘涩,里急后重,脐腹冷痛;治以凉则脾气怯弱,肠鸣下利;治以温则上焦壅热,口舌生疮。及脚气上攻,与久痢不愈。②《普济方》:气壅耳聋,发热咽疼。

【加减】痰嗽,加半夏曲;心肺虚,加人参、茯苓;上膈热,加北黄芩;下部大段虚,加少许炮附子,如使附子多,加生姜;妇人血虚,加当归。

【备考】本方方名,《普济方》卷一八一引作“降气汤”。

70098 秘传珍珠膏

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】苍术三两 谷精草 甘草 木贼 川芎 荆芥 草决明 楮实子 羌活各等分 蝉退一个

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,茶清送下。

【主治】目患左右相传。

70099 秘传茵陈散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】大田螺一个(连壳) 山栀子七个(研) 韭菜根七个 茵陈(真者)一大撮

【用法】上共捣烂,以滚白酒大盏投之。搅匀,去滓顿服。

【功用】退黄。

70100 秘传茴香汤

【方源】《普济方》卷二四九引《德生堂方》。

【组成】苍术一斤半 甘草(炙)十二两 茴香(炒)一斤半 干姜十二两 盐七两(后和药再碾)

【用法】上为末。每服一匙,沸汤调服,不拘时候,早晨常服。

【主治】男子小肠心腹痛,下元久冷;妇人血气刺痛;小儿脾疳泄泻。

70101 秘传枳壳丸

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】枳实十八片(去瓢) 巴豆 丁香各二十七粒

【用法】将枳实两片合作一个,入巴豆、丁香各三粒,线缚定,用黄子醋一碗,煮令干,去巴豆,留小盏醋糊为丸,如绿豆大。每服三四十丸,以姜盐汤送下。

【主治】积气痛不可忍者。

70102 秘传秋石丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】雪梨二十个 甘松半斤

【用法】用童便一大缸,以新水一半搅和,候澄清,辟去清者,留浊脚,又入新水同搅,候澄去清者,再入捣碎雪梨二十个,又入甘松半斤,熬水一小桶,同搅,以白绵布一方,滤去滓,候澄清,辟去清者,留浊脚,晒干为细末。罗净,每服一小匙,烧酒送下。用瓷罐封固,勿令泄气。

【主治】劳怯及火证。

70103 秘传复生散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】珍珠一钱 琥珀一钱 雄黄一钱 穿山甲一钱 朱砂一钱 两头尖一钱 香附子一钱 真蟾酥五分

【用法】先将蟾酥切片,以人乳汁浸少时,入众药搓匀。一岁儿服八厘,三二岁儿服一分二厘,用熟蜜水调下。

【主治】痘疮黑陷不起发。

70104 秘传香连丸

【方源】《医方类聚》卷一三九引《济生续方》。

【组成】木香(切片)二两 黄连(去须)四两 生姜(切片)四两

【用法】先铺生姜在锅底,次铺黄连于姜上,次又铺木香于黄连上,用新汲井水三碗煎干,不要搅动,候煎干,取出三味焙干,碾为细末,以醋调陈仓米粉打糊为丸,如小梧桐子大。每服七十丸,空心、食前米饮汤送

下。

【主治】赤痢。

70105 秘传香连丸

【方源】《直指附遗》卷十四。

【组成】川黄连(酒润,炒)五两 木香 白蔻各一两半 乳香 没药各五钱

【用法】上为细末,面糊为丸,如弹子大。每服一丸,赤者以甘草汤磨下,白者以生姜汤磨下。

【主治】诸般痢疾作痛,并久痢虚脱,脓血不止者。

【宜忌】如初痢一二日之间,不可服,恐拦住积滞热毒,他证愈剧。

70106 秘传香连丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黄连二两(以一两同吴萸炒,以一两同砂仁炒,凡同炒者不用) 木香一钱 肉豆蔻(面炮) 诃子(面炮,去核)各二钱

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心服,若红痢,以甘草汤送下;若白痢,以干姜汤送下;若红白相杂,以清米汤送下。

【主治】一切痢疾。

70107 秘传保安丸

【方源】《医学入门》卷六。

【异名】秘传保和丸(《育婴家秘》卷一)。

【组成】白术(土炒)三两 神曲 木香 槟榔 茯苓 三棱 使君子 厚朴 葶苈 甘草各一钱 苍术二两 陈皮 枳实 人参 莪术各一两半 黄连(猪胆汁浸) 砂仁 麦芽 益智仁 肉豆蔻 藿香 白豆蔻各五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如龙眼大。每服一丸,米饮化下;呕吐,以姜汤化下。

【主治】小儿五疳八痢,吐泻,肚大青筋,面黄肌瘦,疳积。

【加减】肉积,加山楂;喘,加莱菔子;泻,加泽泻、猪苓各一两。

【备考】方中葶苈,《育婴家秘》作“青皮”。

70108 秘传保和丸

《育婴家秘》卷一。为《医学入门》卷六“秘传保安丸”之异名。见该条。

70109 秘传保和丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】山楂四两 陈皮(去白) 白茯苓(去皮) 半夏曲各五钱 萝卜子二钱五分 白术 使君子(去壳) 神曲(炒) 麦蘖(炒)各一两 木香二两二钱四分 砂仁四两四钱 黄连四两五分

【用法】上为细末,水为丸,如萝卜子大。每服一钱,以米饮汤送下。

【主治】小儿脾胃虚弱,饮食不能克化,日久羸瘦。

70110 秘传保婴丹

《准绳·幼科》卷四。为《痘疹金镜录》卷下“稀痘保婴丹”之异名。见该条。

70111 秘传顺气散

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】青皮 陈皮 枳壳 桔梗 乌药 人参(去芦) 白术 茯苓 半夏(制) 川芎 白芷 细辛 麻黄(去节) 防风(去芦) 干姜 僵蚕(炒) 甘草 秦艽(去芦) 羌活 独活各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片,水二钟,煎至八分,空心温服。先服三五剂,后进祛风药酒。

【主治】诸风口眼喎斜,半身不遂,左瘫右痪。

70112 秘传独圣散

【方源】《直指》卷三。

【异名】独蝉散(《疡科选粹》卷五)。

【组成】蝉退(去头足土,净)五钱

【用法】上为末。用好酒一碗煎滚服之。

【主治】破伤风。五七日未愈,已至角弓反张,牙关紧急。

70113 秘传洞关散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】珍珠五分 牛黄 片脑 麝香各三分 朱砂一钱

【用法】上为细末。用少许,吹入喉中。

【主治】喉痹。

70114 秘传祛风散

【方源】《直指附遗》卷三。

【组成】羌活 独活 山梔 半夏 苍术 苍耳子 甘草 茯苓 陈皮 当归 生地黄 防风 荆芥 汉防己 白芍药 牙皂 威灵仙各等分

【用法】上咬咀。每服以水二盏，加生姜三片，煎至一盏服，不拘时候。

【主治】中风。

70115 秘传神应散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】蛤蟆一只（小者，背绿眼光者是用） 明矾二钱 小红枣二枚（去核）

【用法】上共捣成膏，作一丸，火煨存性，为细末。笔尖蘸药点患处。

【主治】牙疳。

70116 秘传神应膏

【方源】《回春》卷四。

【组成】片脑 熊胆 血竭 牛黄 乳香 没药各五分

【用法】上为细末，用蜗牛取肉，捣成稀膏。每夜洗净拭干，将此膏搽上患处，数遍即愈；若蜗牛无鲜者，用干的放水碗内泡一宿，去壳，内自然成肉，将前六味药要极细末，以蜗牛肉共捣，不要干了，要稀稠得所，用瓷罐收贮固封，勿使风尘在内，否则不效。

【主治】痔漏。

70117 秘传神效散

【方源】《本草纲目》卷七引邵以正方。

【异名】秘授神效散（《冯氏锦囊·杂症》卷十九）。

【组成】久碎瓦片（用路上墙脚下往来人便尿处）一块

【用法】上洗净，火煨，米醋淬五次，黄色为度，刀刮细末。每服三钱，好酒调下。在上食前服，在下食后服。

【功用】理伤续断。

【主治】跌扑损伤，骨折骨碎，筋断痛不可

忍。

70118 秘传除厉散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈老龟甲（火煨）一钱 轻粉二钱 杏仁三十个（去皮尖）

【用法】上为细末。用猪胆汁调敷。

【主治】杨梅疮。

70119 秘传桃花散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】川归 赤石脂 血竭 乳香 没药 滑石 炉甘石（煨）各等分（一方有何首乌）

【用法】上为细末。掺伤处。

【功用】止血生肌。

【主治】刀刃伤破及竹木刺皮出血。

【加减】初伤，加龙骨少许；久伤，加樟脑少许。

70120 秘传起痿丹

【方源】《医方大成》卷四。

【异名】起痿丹（《普济方》卷二二六引《永类铃方》）

【组成】附子（炮，去皮尖） 枸杞子（拣去枝梗） 肉苁蓉（酒浸，焙干） 沉香（不见火） 官桂（去粗皮） 朱砂（别研） 熟地黄（酒洗，蒸） 母丁香 木香（不见火） 阳起石（火煨） 天雄（炮，去皮脐，或用鹿茸亦可） 硫黄 麝香（别研）各一两 膩粉半两 白丁香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，以姜汁火上入药溶化，却用手点药于腰眼上磨擦至药尽，用至二十丸。

【主治】肾经虚败，遂成骨痿，腰脚难举，日加困乏。

【加减】若有他处瘫痪风疾，加皂角一片（去筋捶烂，姜汁浸一宿，瓦上焙干为末）。

70121 秘传捉虎丹

《松崖医径》卷下。为《宣明论》卷十三“一粒金丹”之异名。见该条。

70122 秘传铁箍散

【方源】《直指附遗》卷二十二。

【组成】霜后芙蓉叶二两 海金沙五钱 草乌 金钱重楼 天南星(生者佳)各五钱

【用法】上为细末,用好米醋调药成膏。围敷患处。

【主治】痈疽。

【加减】发背,加木鳖子五钱。

70123 秘传息搔散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】生白矾一两 硫黄五钱 槟榔一个

【用法】上为细末。取羊蹄根捣真汁,和生蜜少许,调如粥厚,先以川山甲抓破患处,敷之。如疮过一晕立效。

【主治】虫癣。

70124 秘传消痞丸

【方源】《保命歌括》卷二十三。

【组成】三棱 莪术(各用醋浸,煨软,切) 陈皮 青皮(去瓢) 当归(酒洗) 半夏曲各一两 川芎 厚朴(姜汁炒) 黄连各一两 九肋鳖甲(醋炙)二两 黄芩 干姜(炒) 柴胡 官桂 昆布各一两

【用法】上为细末,酒煮神曲为丸,如梧桐子大。每服五十丸,以白汤送下。

【主治】小儿癖为寒热。

70125 秘传涤风散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】川乌 草乌(并火炮,去皮尖) 苍术(米泔浸)各四两 人参 白茯苓各二钱 两头尖二钱 僵蚕七钱(用纸隔炒) 甘草(炙)三两 白花蛇(酒浸三日,弃酒,火炙,去皮骨) 石斛(酒浸)各一两 川芎 白芷 细辛 当归(酒洗) 防风 麻黄 荆芥 全蝎(新瓦上焙干) 何首乌(米泔水浸,忌铁) 天麻 藁本各五钱

【用法】上为细末。每服三分或五分,临卧酒调服下;若不用酒者,茶清调服。

【主治】痔漏及一切疯证。

【宜忌】忌多饮酒并一切热物。

70126 秘传涌泉散

《济阴纲目》卷十四。为《寿世保元》卷七“涌泉散”之异名。见该条。

70127 秘传通气散

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【异名】通气汤(《杏苑》卷六)、通气散(《金鉴》卷四十三)。

【组成】舶上茴香(微炒) 川山甲(锉,蛤粉炒,去粉)各一两 陈皮 白牵牛(微炒,取末) 延胡索(擦去皮)各半两 甘草一两半 南木香七钱半 黑牵牛(微炒)一两

【用法】上为细末。每服一两,隔夜用好无灰酒调,露一宿,次早鸡鸣时冷服。服药后当取下痰积自大便中出。此药打头先服一股,得利去痰积后,便用后方顺气散吞下白丸子,过五七日,又进一服。

【主治】诸气壅滞,荣卫不通,筋脉缓弱,手足躄曳,行步艰辛。

70128 秘传通塞散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】石韦(去毛) 滑石 瞿麦 萹蓄 冬葵子 木通 王不留行 地肤草各等分

【用法】上为细末。每服三钱,滚白汤调送下。

【主治】小便淋闭,茎中作痛。

70129 秘传黄耆丸

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】黄耆(蜜炙) 防风 茴香(炒) 白蒺藜(炒) 牡丹皮各等分

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后以盐汤送下,或酒亦可;妇人用艾醋汤送下。

【主治】目赤肿。

【加减】去黄耆,加当归,名“当归丸”。

70130 秘传梨汁饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】好消梨

【用法】杵汁,频频饮之;若患者能自嚼咽下亦可,多食妙。

【功用】大解热毒。

【主治】喉痹及喉中热痛，口舌生疮，痈疽发背。

【宜忌】金疮、产妇及诸脱血症勿食。

70131 秘传敛瘤膏

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】血竭 轻粉 龙骨 海螵蛸 象皮 乳香各一钱 鸡蛋十五枚(煮熟用黄，熬油一小钟)

【用法】上各为细末，共再研，和入鸡蛋油内捣匀。每日早、晚甘草汤洗净患上，鸡翎蘸涂，膏药盖贴。

【功用】生肌完口。

【主治】瘰疬用枯药枯落后。

70132 秘传清咽散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】荆芥 薄荷 防风 桔梗 山梔 连翘 玄参 大力子 片苓 生甘草

【用法】上切细。用水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】咽疮并口舌生疮。

【加减】热甚，加僵蚕，犀角。

70133 秘传清燥汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】猪膏三两 羊膏三两 白蜜六两 竹沥一碗(以上合煎成膏，须滴水成珠) 麦冬二两 茯神三两 竹茹一两 净枣仁(炒香)三两(各为末)

【用法】和入搅匀为丸。用大枣、浮麦、灯心煎汤送下。

【主治】妇人脏躁。

70134 秘传紫金丹

【方源】《卫生鸿宝》卷六。

【组成】乳香 没药(二味灯心同炒，研，去油净) 硃砂(纸裹，水打湿煨，净) 天竺黄(揭起成片者真，令入多烧诸骨及蛤粉杂之) 土鳖虫(即廑虫，无甲有鳞，八足圆如棋子，雄者刀切断，碗覆之，其虫能自接上，否则是雌，不用，生米酒栈中，烧酒

浸炒) 各一钱 牛膝一钱半 无名异(即小黑石子，出桂林，去铜净，煨，酒淬三次) 骨碎补(酒炒) 自然铜(煨，醋淬七次) 血竭(敲断有镜面，磨甲间透红者真) 各二钱

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮(勿泄气)。每服七厘，以酒送下。

【主治】跌扑血瘀，筋断骨折，昏迷晕倒。

70135 秘传黑虎丹

【方源】《证治汇补》卷二。

【异名】黑虎丹(《医级》卷八)。

【组成】真牛黄一钱 真阿魏一钱 南木香五钱 真雷丸五钱 鸡肫皮(用线鸡肫皮，洗净，焙干)二钱

【用法】上为细末，用使君子(去壳)研末二两，加前药七钱，将飞罗白面打糊为丸，如梧桐子大。

【主治】诸般癆虫。

【方论选录】《医略六书》：牛黄清心醒脾，阿魏消积杀虫，木香调气醒脾胃，雷丸杀虫化积热，鸡肫皮舒脾结以化气化滞，使君肉健脾气以化积下虫。丸以飞面，取其粘，入肠中，虫药对垒逐出速化，不使稍存也。

70136 秘传遗粮汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】山黄牛三两二钱 五加皮 白鲜皮 防风 木瓜 荆芥穗 白芷 当归(酒洗) 各一钱五分 白芍药(炒) 生地黄(酒洗) 地骨皮 川牛膝 黄连 甘草 槐花(炒) 川芎 威灵仙 寻风藤 白茯苓 各一钱 杜仲二钱(姜汁炒断丝) 皂角子三粒(捣碎) 白丑三粒(捣碎)

【用法】上切细，作一服。用水一钟半，酒半钟，煎至一钟，察病患上下饥饱服，滓再煎服，一日一剂。服至三五剂，其疮愈肿，勿惧畏，以托出毒气故也。若轻者服十剂而愈，重者服二十剂全愈。每剂服过，滓晒干煎水，常时浴洗患处。

【主治】杨梅疮，风漏筋骨疼痛。

【宜忌】忌房事、生冷、茶清、煎炒、母鸡、

鹅、羊、猪首蹄肉、鱼虾动风之物。

70137 秘传循经丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】南星三两（炮） 地龙三两（去土） 川当归三两（酒浸） 川乌三两（炮，去皮脐） 草乌一两（炮，去皮脐） 豆饼二两（用黑豆不以多少，去皮，好酒煮烂，候酒干，搗碎，捏作饼子，晒干） 乳香 没药各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用温酒吞下，不拘时候。

【主治】诸经络风邪寒湿，气血留滞，流注作痛，筋脉挛拳。

70138 秘传隔纸膏

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】老松香 樟脑 谷丹（炒） 水龙骨（即旧船石灰） 轻粉（不愈加） 白芷 川芎 蜈蚣

【用法】上为细末，溶化松香，少加清油加之，以油纸随疮大小糊袋盛药夹之。用水洗疮，缚在疮口上，二日定，四日一换。

【主治】赚疮，年月深久不愈者。

70139 秘传蒲黄散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】蒲黄（真者）

【用法】罗净。频刷舌上。

【主治】舌肿大塞口，不通饮食者。

70140 秘传愈刚散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】白芷 光乌 威灵仙 真川椒各等分

【用法】上为细末。擦患处。须先用防风、荆芥、羌活、苍耳子、白蒺藜、真川椒、小麦各等分，水二盏煎，去滓，含漱患处，再擦尤捷。

【主治】风虫牙痛。

70141 秘传愈疥散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】牛皮岸（即熏牛皮烟岸。如无，以香炉岸代） 蛇床子 硫黄 黄柏 黄丹各

一两 雄黄 大枫子（去壳） 川椒各半两 枯矾二两 轻粉二钱

【用法】上各为细末。以生猪油调匀敷之。

【主治】疥疮及小儿癞头。

70142 秘传愈疯丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】愈风丹（《丹溪心法·附录》卷一）。

【组成】防风（去芦） 连翘 麻黄（去节） 黄连（酒炒） 黄柏（酒炒） 各五钱 川芎 川归（酒洗） 赤芍药（酒浸） 薄荷叶 石膏 桔梗 何首乌 熟地黄（酒洗） 羌活 细辛（减半） 甘菊花 天麻 各一两 黄芩一两五钱 白术 荆芥穗各二钱五分 山梔仁七钱五分 滑石五两（另研） 甘草（炙）二两 僵蚕（炒）五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，以朱砂、金箔为衣。每服一丸，细嚼，用茶清或酒送下。

【主治】一切风疾，偏正头风，半身不遂；及诸恶疮毒，赤白痢疾，痛风。

【加减】热甚，加大黄、朴消各一两。

70143 秘传解毒丸

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】贯众 山豆根 黄药子 牙消 寒水石 龙胆草 干葛 雄大豆 百药煎 紫河车 甘草节 薄荷 梔子 大黄 豆粉 各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，秤一两作十丸，银箔为衣。每服一丸，以温米饮送下，每日三次，不拘时候。

【主治】上盛下虚，水火不能升降，大便秘涩，小便不通，赤眼口疮，便红泻血，吐血泄痢不止；及诸积气块，小儿脾病，妇人经脉不通，男子打扑伤损，一切诸毒疮痍，咽喉肿痛。

【加减】加山慈菇二两大妙。

70144 秘传靖肤散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】大枫子四十九枚 枯白矾 真川

椒 蛇床子 水银各三钱 樟脑五钱

【用法】上各为细末，入水银，共再研匀。用柏油调敷。

【主治】疥疮。

70145 秘传碧云膏

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】真麻油四两 黄蜡三两半 铜青三钱 轻粉三分 古铜钱三文 鲜桃柳枝各七枝

【用法】于五月五日制，先以香油煎三五沸，入蜡并钱煎，至滓落，入铜青以桃柳枝不住手搅，煎至滴水成珠，入轻粉再煎一沸，以纸滤去滓，用瓷碗盛贮，待冻，扫净土地，覆地上一宿出火毒。每用量疮大小，捏作薄饼，摊置毡上，贴患处，外以绢帛系定，过三日，打开转贴毡一面，再贴三日，换药后，贴如前。

【主治】臁疮。

70146 秘传槟榔丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】槟榔一两 三棱（煨，去毛，醋炒） 莪术（醋炒） 青皮（去瓢，麦麸炒） 陈皮（去白） 雷丸（去壳） 干漆（炒无烟） 使君子肉 山楂肉 麦蘖面（炒） 神曲（炒黄）各半两 芫荽（水洗净）二钱五分 鹤虱（略炒）木香（不见火） 胡黄连 甘草（炙）各三钱 良姜二钱（陈壁土炒） 砂仁一钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服三五十丸，空心以淡姜汤送下。

【主治】小儿疳病，积气成块，腹大有虫。

70147 秘传熏洗方

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】熏洗方（《回春》卷四）。

【组成】皂矾（用新瓦一片，两头用泥作一坝，再用香油，瓦上焙，再着皂矾，瓦上微火煨枯，去砂为末）二把 知母四两（焙干为末）一两 贝母一两 葱七茎

【用法】上先将葱用水煎三四沸，倾入瓶

内，再入前药。令患者坐于瓶口熏之，待水温，倾一半洗疮，留一半，候再灸复热熏洗，以愈为度。

【主治】痔漏。

70148 秘传熏洗方

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黄连 黄柏 苍术 荆芥 枳壳 防风 苦参 玄明粉各等分

【用法】上切细，加过冬藤一握，水四五碗煎，倒桶中，先熏后洗。

【主治】痔漏。

70149 秘传熏洗方

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】防风 荆芥 川芎 白芷 连翘 苍术 黄芩 艾叶 何首乌 皂角刺 白鲜皮 地榆 威灵仙 金银花 苍耳草各等分

【用法】上切细。用水五升煎，乘热先熏后洗。

【主治】杨梅疮。

70150 秘传膈噎膏

【方源】《种福堂方》卷二引缪仲淳方。

【组成】人乳 牛乳 蔗浆 梨汁 芦根汁 龙眼 肉浓汁各等分 姜汁少许 人参浓汁

【用法】隔汤熬成膏子，下炼蜜。徐徐频服。

【主治】膈噎。

【宜忌】安心平气，勿求速效。

70151 秘传赛宝丹

【方源】《直指附遗》卷五。

【组成】黑丑十两（取头末四两，分二处）木香（末）半两 锡灰（醋炒，末）一两 槟榔（取净末）二两（分二处） 雷丸（取净末）二两（分二处） 陈皮（取末）半两 青皮（取末）半两 三棱（醋炒） 莪术（醋炒）各一两

【用法】上为细末，再用使君子二两，鹤虱、皂角各一两，三味用水二碗，煎至一盞，用粟米一合，布包在药内煮，将熟起手，用黑丑末二两法起，次用槟榔末一两，再用雷丸

末一两尽，再用木香、锡灰、三棱、莪术、陈皮、青皮等末尽后，再一用雷丸，二用槟榔，三用丑末盖在外，阴干。每服三钱，四更时候用冷茶吞下，复睡至天明，不可洗手、洗面、吃汤物，待取下或虫或积，恶毒滞气，并原药下尽，方可用冷水洗面。其药未下，宁耐片时，见其药下，再用药食补之。

【功能】追虫，取积。

70152 秘传褪金丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术（米泔水浸） 白术各二两半 甘草（炙）半两 厚朴（姜汁炒）一两 陈皮（去白） 神曲（炒黄色） 麦蘖曲（炒）各一两半 针砂（醋炒红色） 香附（童便浸）各六两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，以生姜盐汤送下。

【主治】黄肿。

【宜忌】忌鱼腥、湿面、生冷水果。

【加减】有块，加三棱（醋煮）、莪术（醋煮）各一两半。

70153 秘传蝌蚪散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】蝌蚪（阴干） 黄柏 苍术各二两 矾三钱

【用法】獭猪肝四两，竹刀披开，掺药三钱，猪肝同煮，吃肝。

【主治】小儿疳疾。

70154 秘传镇惊丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】天竺黄（另研） 人参 茯神 南星（姜制）各半两 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心） 归身（酒洗） 生地黄（酒洗） 赤芍药（煨）各三钱 薄荷 木通（去皮） 黄连（姜汁炒） 山梔仁（炒） 辰砂（另研，水飞） 牛黄（另研） 龙骨（火煨）各二钱 青黛（另研）一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，淡姜汤送下。

【功用】安心神，养气血。惊退后和平预防之剂。

70155 秘传擦牙散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】蒲公英三两（连根花，四月间采，阴干） 青盐一两 牛膝三钱

【用法】用千年瓦二个，将前药放在内，用蚯蚓粪固济，掘一地炉，用黑片粪烧，稍存性为度，取出为细末。早晚擦牙，咽之。

【功用】固牙，乌须发，壮筋骨。

70156 秘传豁痰丸

【方源】《直指附遗》卷七。

【组成】陈皮（去白）四两 山楂 神曲各二两 当归 黄芩 白术各四两 半夏（姜汁浸七日） 黄连 白茯苓 甘草各一两五钱 枳实二两五钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧或食后淡姜汤送下。

【主治】①《直指附遗》：食积痰热。②《保命歌括》：小儿心下痞。

70157 秘传豁痰汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】栝楼仁一钱半 柴胡一钱二分 羌活 独活 枳壳（麸炒） 半夏（汤泡七次） 乌药各一钱 橘红 青皮 当归 川芎 黄芩 黄连各七分 南星（矾皂角煮过者）一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，临服入姜汁一茶匙，竹沥一酒杯，日进一服。十日后渐安。

【主治】痰厥中风，口眼歪斜，手足不随，不省人事。

【宜忌】不可性急，不可轻服续命汤、活络丹、天麻丸、清心丸、苏合香丸、辛香热药。

70158 秘旨安神丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】云苓 麦冬各一两五钱 杏仁二两 川贝 川芎 白术 远志各一两 归身

桔梗 甘草各五钱

【用法】炼蜜为丸，朱砂为衣。每服随时酌用。

【主治】心血虚而睡多惊悸，受惊吓而神魂不安。

70159 秘制太和丸

【方源】《萧山竹林寺妇科秘方考》。

【组成】制香附 制苍术 广藿香 净防风 嫩前胡 紫苏叶 薄荷叶 川厚朴 草果仁 姜半夏 台乌药 广陈皮 焦麦芽 春砂壳 炒枳壳 焦山楂各四两 白薏米 广木香 茯苓 川芎 羌活 白芷 粉甘草各三两

【用法】上为末，面糊为丸，如弹子大。每服一丸，温开水化服，每日二三次。

【功用】健脾消积，化痰行气。

【主治】妇女信水不准，经行腹痛，腰痠带下，骨节疼痛，胸闷食少，停经化胀，脾虚泄泻，气血两亏，积年不孕。

70160 秘制白龙丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】真川贝母一斤

【用法】蜜水为丸服。

【主治】肺癰。

70161 秘制白带丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】海淡菜 豆腐滞 红枣 糯米 白米各等分

【用法】将红枣煮，合为末，水为丸。

【功用】养血调经，敛带保神。

【主治】妇女月水不调，赤白带下，诸虚百损，面黄肌瘦。

70162 秘制白浊丸

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】海金沙 飞滑石 生甘草 生大黄 车前子 黄柏各一两 琥珀一钱 牛膝梢五钱

【用法】上为末，鸡蛋清五枚为丸。

【主治】赤、白二浊，久患不愈；或成淋症，

为气淋、血淋、劳淋、石淋、热淋五淋；或有湿毒热毒积滞膀胱，以及小便不通，积患而成；及因花柳传染致病者，小便短少，尿管红肿，痛如针刺，膀胱疝气，白浊浊流不止，疳疔初发。

70163 秘制朱砂膏

【方源】《膏药方集》引《伤科方书》。

【组成】松香一斤 葱水煮麝香五分（如嫌麝香贵，可另改加入八将散） 冰片五分 制乳香五钱 制没药五钱 樟脑三两五钱 银朱一两 漂朱砂二钱 研漂蓖麻子肉五两 杏仁一百五十粒（去皮尖） 明雄黄二钱 全蝎二钱五分（葱水洗）

【用法】上各为细末，打数千捶为膏，瓷罐收贮。临用时隔水炖软，摊平常油纸上贴之，当看疮形大小，酌量用之。

【主治】疔疮，痈疽，发背，颈项一切无名恶毒。

70164 秘制肠风散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】蒲公英（连根打烂，青盐醃一宿，晒干收尽汁） 槐角子（炒） 柿饼（炙存性） 木耳（煨存性）

【用法】神曲为丸。每服二钱，以白汤送下。

【主治】肠风痔漏，不拘久近。

70165 秘制抱龙丸

【方源】《华氏医方汇编》卷三。

【组成】犀黄三钱 腰黄（飞） 僵蚕（炒） 蝉衣（去头足） 白附子（姜汁炮，炒） 天麻（粗纸湿包，煨） 防风 枳壳（面炒） 茯神 陈胆星 劈砂（研，飞）各一两 全蝎（去头足，泡盐，晒）五十二只 薄荷（晒干）三钱 甘草五钱 当门子一钱

【用法】上各为细末，以甘草、陈皮五钱煎汤化胆星为丸，如芡实大，先以雄黄为衣，晒干，再上朱砂为衣，香气不泄。

【主治】小儿惊风噤口，痰喘咳嗽。

70166 秘制兔血丸

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】藿香二两 乳香一两半 沉香一两半 木香一两 母丁香四两 麝香四钱

【用法】上为细末，于腊八日用活兔血，以手就荞麦面再沾老酒为丸，重五分。每服一丸或二三丸，以无灰老酒送下。

【主治】吐血，及男妇一切咳血、嗽血、便血、尿血，崩漏带下，产后恶露不行，或行血不止，或老妇倒开花症。

【宜忌】忌房欲、腥辣、生冷。

70167 秘制珍珠丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】珍珠 竺黄各五钱 琥珀 银胡犀黄 木香 雷丸各五分 南星四钱 胡连一钱五分 槟榔七钱 鸡内金一两 金箔五十叶

【用法】炼蜜为丸，辰砂为衣。七岁以下每岁一丸，惊风加倍，男妇大人量症轻重，至三十丸为则，每日三次。

【主治】小儿急慢惊风，痰迷心窍，夜卧惊悸，烦躁不安。

【宜忌】忌食生冷、鱼腥、油面、诸蛋。孕妇忌服。

70168 秘制清宁丸

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为《续名医类案》“青麟丸”之异名。见该条。

70169 秘宝万灵丹

【方源】《玉案》卷六。

【组成】牛黄 朱砂 礞石(消煨) 蛇含石各五钱(煨，醋淬) 僵蚕 全蝎 胆星 半夏(姜制) 茯神各一两 麝香三钱 金箔 银箔各八十片 皂角 麦门冬各一两五钱(煎膏)

【用法】上为末，以皂角、麦冬膏为丸，如樱桃大，金银箔为衣。每服一丸，以姜汤化下。

【主治】急慢惊风，慢脾风，垂危者。

70170 秘验血崩丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】真阿胶二两(炒成珠) 慎火草二

两(炙焦，碾) 棕毛(烧存性) 龙骨(煨) 牡蛎(煨，醋淬) 真蒲黄(炒黑色) 乌梅肉各一两(焙焦碾末)

【用法】以酒半盏，将阿胶化开，和前末药为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心以酒送下。

【主治】妇人血崩不止。

70171 秘验带下丸

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】芡实粉二两 白茯苓 赤石脂(煨) 牡蛎(煨，酒淬) 禹余粮(煨) 各一两 石灰(风化)八钱(好醋一盞，拌和前末，干，再捣筛过)

【用法】上药用糯米煮粥，和捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至六七十丸，空心以米汤送下。

【主治】①《医林绳墨大全》：带下。②《集验良方》：妇人带下虚脱症。

70172 秘验桃花散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】石灰一升 大黄五两(切片，同炒红色，筛去大黄)

【用法】炒过石灰，以水牛胆汁拌匀，复装入胆内阴干，为末。搽患处。

【主治】刀刃所伤，出血不止。

70173 秘验清胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十七。

【组成】石膏 梔子 黄连 黄芩 当归 生地 白芍 苍术各一钱 青皮八分 细辛 藿香 荆芥穗各六分 升麻五分 丹皮 甘草各四分

【用法】水二钟，煎八分，食后缓缓含饮之。

【主治】一切风热湿痰，牙痛床肿，血出动摇。

70174 秘授九灵丹

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】真西牛黄五钱 真狗宝五钱(雪白而细纹旋透者佳) 赤石脂二两五钱(醋煨九次) 上好沉香一两五钱 真琥珀二两五

钱(同灯草研) 麝香五钱(真当门子) 新珍珠百粒(重五钱者。嵌豆腐内煮数滚取出,同灯草研) 劈朱砂一两五钱(一半为衣) 金箔一千张

【用法】上药各择好者,分两配足,为细末,用红枣煮热去皮核,取净肉十两,捣烂为丸,如小绿豆大,烈日晒干,瓷罐收贮,勿令走气。每服七丸,约重一分,用梨汁半茶钟,顿热送下,即煮粥汤进饮。

【主治】膈噎至重者。

【宜忌】忌生冷、面食、椒辣、发气之物,俟全愈后方可吃饭,并食物均匀,调理谨慎,切戒气恼动怒,勿以事物操心,静养开怀。

70175 秘授甘露饮

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】童便

【用法】取童便半酒坛,要坛口大者,先用铁丝作四股络子,悬饭碗一个于坛内,约离童便三寸许,再用铅打成帽笠式,倒置坛口上,四围用盐泥封固,外加皮纸数层糊密,勿令泄气,再用砖搭成炉式,将坛放上,用桑柴文武火炼烧一炷香,去火候温,再将铅笠轻轻取起,勿令泥灰落下,则坛中所悬碗内自有清香童便露一碗。取出另倾茶碗内,与病者服下,每日早、晚共服二钟。取童便,须择无病无疮疖者五六人,每早烹好松萝茶一大壶,令各童饮下,俟便出时,去头去尾不用,取中间者,以坛盛之。

【功用】《喉证指南》:降阴火。

【主治】真阴亏竭,火炎灼肺,虚损失血,内热发为咽疮,喉痹。

70176 秘授济阴丹

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】香附子二两五钱 艾叶(酒醋煮)一斤 熟地八两(和艾捣切片,晒研) 苍术 当归八两

【用法】醋糊为丸。每服百丸,以淡醋汤送下。

【主治】妇人怀孕常至三月即堕者,带下无

子,胸满倦怠。

【备考】方中苍术用量原缺。

70177 秘授神效散

《冯氏锦囊·杂症》卷十九。为《本草纲目》卷七引邵以正方“秘传神效散”之异名。见该条。

70178 秘授蜡矾丸

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】黄蜡 白矾各胡桃大一块(研) 银朱一钱 蛇蛻一条(阴阳瓦焙,研)

【用法】先将蜡熔化,入蜂蜜少许,再下生矾、蛇蛻、银朱,研末搅匀,将铜勺放滚水内,急手丸,如梧桐子大。如遇患者,先令洗浴,饮热酒数杯,初服二十一丸,尽量饮醉,被盖取汗,初起即消;已成疼痛不可忍者,服之可止;一半已溃,服之必出;稠厚黄脓,看人虚实与服,头一日服二十一丸,第二日只服十九丸,逐日递减两丸,服至一丸为止。

【功用】定痛,厚膜,生肌化脓,解毒去秽。

70179 秘精菟丝丸

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】怀山药七分(打烂) 白茯苓 石莲肉各二两 菟丝子(煮饼)五两

【用法】山药糊加蜜为丸。每服三钱,空心、临卧俱用盐汤送下。

【主治】内障昏花翳障,肾气虚损,目眩耳鸣,四肢倦怠,夜梦遗精。

70180 秘方三棱煎丸

【方源】《普济方》卷一六八。

【组成】三棱 陈皮 五灵脂各三两 萝卜子 白芍药 槟榔 香附子 草豆 黑牵牛各二两 糖球四两 木香 枳壳 枳实 缩砂 干漆 神曲 麦蘖 革澄茄 白术片姜 益智 硃砂 草果 延胡索 菖蒲 干姜 乌药 红豆各一两 蓬莪术二两(醋炙) 白豆仁五钱(炒) 官桂一两

【用法】上为细末,粉糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心以温姜汤送下。

【主治】积聚。

70181 秘方仙遗粮汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【异名】仙遗粮汤（《会约》卷七）。

【组成】土茯苓（即名仙遗根，用鲜者）二两（洗净，以木石柏捶碎，用水三碗，煎二碗，去滓，入后药煎服） 当归 生地 防风 木通 薏仁各八分 金银花 黄连 连翘各一钱 白术 白鲜皮各七分 皂刺六分 甘草四分

【用法】加灯心二十根，用遗粮汤二碗，煎一碗，食远服。

【主治】一切杨梅疮，不拘始终虚实。

70182 秘方茶酒调散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】石膏（另为细末） 菊花 细辛（去苗） 香附子（去须，炒）各等分

【用法】上为末。每服二钱，食后以温茶酒调下，一日三次。

【功用】清爽神志，通和开窍。

【主治】诸风痰壅，目涩，昏眩头疼，心愤烦热，皮肤痛痒，风毒壅滞，及恶汗。

70183 秘方消疮膏药

【方源】《玉案》卷四。

【组成】红花 蓬术 三棱 当归各四两 两头尖 五灵脂 穿山甲 川乌 生地 丹皮 巴豆肉 木鳖子各二两

前药为咀片，以麻油一斤半浸五日，熬枯去滓，再用文武火煎至滴水成珠，再入后药：

阿魏 沉香（锉末） 乳香（研）各一两 苏合油 麝香（研细）五钱 广木香（锉末） 子丁香（研细） 檀香（锉）各一两五钱

【用法】前八味，俟药油熬至滴水成珠，缓缓加入，即成膏。内服丸子，外以膏药贴在块上。

【主治】痞块。

70184 秘传大补元丸

【方源】《直指附遗》卷九。

【组成】黄柏（蜜炒褐色） 知母（乳汁浸，炒） 龟版（酥炙）各三两 淮熟地黄（酒洗）五两 牛膝（酒洗） 麦门冬（去心） 肉苁蓉（酒洗） 虎胥骨（好酒炙） 淮山药 茯神（去心） 黄耆（蜜炙）各一两半 杜仲（去粗皮，好酒炒断丝） 枸杞子（甘州者佳） 何首乌（篾刮去皮） 人参（去芦）各二两 当归身（酒洗） 天门冬（去心） 五味子（去枝核） 淮地黄（酒洗）各一两 白芍药（酒炒）二两（冬月只用一两） 紫河车一具（一名混沌皮，即今之胞衣，取初产者为佳。如无初产者，或壮盛妇人胎者亦可。取一具，用线吊于急流水中漂一昼夜，去其污浊血丝，取起，再用净米泔水一碗许，于小罐内微火煮一沸，取出勿令泄气，再用小篮一个，四周用纸密糊，将河车安于篮内，用慢火烘干，为末）。

【用法】上为极细末，入猪脊髓三条，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心以淡盐汤送下；寒月用温酒送下。

【主治】男妇诸虚百损，五劳七伤，形体羸乏，腰背疼痛，遗精带浊。

【加减】梦遗白浊，加牡蛎一两，白术，山茱萸各一两五钱，茯苓二两；冬加干姜五钱（炒黑色）。

70185 秘传大透肌散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】人参 芍药 川芎 甘草 茯苓 白术 木通 陈皮 黄耆 糯米各等分

【用法】上为粗散。每服四钱，水煎服。

【主治】痘疮。

70186 秘传马蔺花丸

《松崖医径》卷下。为《医学正传》卷四“马蔺花丸”之异名。见该条。

70187 秘传玉液还丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】枸杞子 五味子 覆盆子 菟丝子（酒浸） 巨胜子（炒，去皮） 生地黄（酒洗） 熟地黄（酒洗） 天门冬（去心）

麦门冬(去心) 人参 钟乳粉 鹿茸(酥炙) 甘菊花(酒洗) 肉苁蓉 山药(炒) 各等分 沉香(另研为衣)

【用法】上为细末，候采降雪丹(即室女初行天癸)为丸，如梧桐子大，沉香为衣。每服五十丸，空心三意酒送下；若无降雪丹，炼蜜为丸亦可。

【功用】延年益寿。

【主治】老人虚入，真阴虚损。

70188 秘传仙遗粮散

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】仙遗粮(即土茯苓)二斤(忌铁) 荆芥一两五钱 防风一两五钱 五加皮一两五钱 白鲜皮一两五钱 威灵仙一两五钱 木瓜一两五钱 生地(酒洗)一两 当归一两(酒洗) 白芍一两(炒) 白茯苓一两 川芎一两 牛膝一两(酒洗) 杜仲(炒去丝)一两 白芷一两 地骨皮一两 青风藤一两 槐花一两 黄连一两

【用法】上咬咀，作十帖。每一帖用水一钟，米白酒一钟，煎熟，疮在上，食后服；疮在下，食远服；滓再煎，每一日服一帖，煎二次合为一处，使浓淡得均，分作二次温服。其药滓逐日晒干，至三帖，共煎汤洗浴。初服五帖之内疮势觉甚，乃毒气攻外，勿惧，轻者至十日内可见效；重者虽服二三十帖无妨。

【功用】补元气。

【主治】远年杨梅风漏，筋骨疼痛；轻粉毒。

【宜忌】切忌房事、茶、生冷、煎炒、鸡、鹅、羊、牛血，虾，猪蹄首各发物、动风之物。只用雄猪肉。

70189 秘传竹叶灰丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】竹叶不拘多少(烧存性)

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心以清米饮汤送下。

【主治】下血。

70190 秘传神应眼药

【方源】《直指附遗》卷二十。

【组成】制炉甘石十两 黄连 黄柏 薄荷各三两 甘草一两 朴消二两

上五味咬咀，用水数碗煎熟，滤去滓，用钵头盛之，将炉甘石研细，入银窝内，火煨深红，倾入药水内就研，飞过，净末听用。水银一两 黑铅一钱(上二味配作一块) 白硼砂一钱 硃砂五分 食盐一两(用白水煮，炒干) 枯白矾一两 皂矾二钱 火消(萝卜汁提过)七钱五分

上八味同一处，入阳城罐内，用盐泥固济干密，升打一炷官香，候冷取出听用。

【用法】将前制炉甘石研细，再入五两在阳城罐底，次将前灵气七钱五分亦研细，上又安甘石五两，盖定，亦严封固，打一炷官香，冷定，出火毒，研极细，罗过。如点翳膜，加白硼砂五钱，硃一钱五分，火硝一钱五分，照前制过，名曰卷帘散。如点昏朦，加冰片，名曰光明散。

【主治】眼目翳膜，昏朦。

70191 秘传雄鼠骨散

【方源】《纲目拾遗》卷六。

【组成】雄鼠骨一具 香附 白芷 川芎 桑叶(晒干) 地骨皮 川椒 蒲公英 青盐 川槿皮 旱莲草

【用法】生打活雄鼠一个，剥去皮杂，用盐水浸一时，炭火上炙，肉自脱落，取骨炙燥，入众药内，为末，擦牙，百日复出。

【功用】固齿。

【主治】牙落。

70192 秘传掌中金丸

【方源】《普济方》卷一六八。

【组成】陈皮一斤(去白，湿秤，生姜净洗，与陈皮对下切片，如伏中，二味晒，炒) 甘草二两 半夏(汤洗七次)三两(姜汁和饼，伏中晒，炒) 神曲 麦蘖各二两 砂仁 白豆蔻各一两

【用法】上为末，姜糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，姜汤送下。

【功用】消化酒食，消痰饮，宽中利膈，调和气。

【主治】真气衰弱，饮酒多伤，停于胸膈。

【加减】加槟榔、木香各一两，名槟榔丸。

70193 秘传酸枣仁汤

【方源】《永类铃方》卷十三。

【异名】酸枣仁汤（《准绳·类方》卷一）。

【组成】酸枣仁（泡，去皮，炒）一两 净远志肉 黄耆 莲肉（去心） 罗参 当归（酒浸，焙） 白茯苓 茯神各一两 净陈皮 粉草（炙）各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，大枣一个，瓦器煎七分，临卧一服。每日三次。

【主治】心肾水火不交，精血虚耗，痰饮内蓄，怔忡恍惚，夜卧不安。

70194 秘传膈噎仙方

【方源】《医林绳墨大全》卷三。

【异名】开关膏（《卫生鸿宝》卷一）。

【组成】白硼砂一钱五分 真青黛一钱 乌角沉香二钱（共为细末） 白马尿一斤 白萝卜一斤（取汁） 鲜生姜半斤（取汁）

【用法】后三味于铜锅内熬成膏，每服用膏三茶匙，加前末药七厘，以好白酒调送下，每日三次。

【功用】通关进食。

【主治】噎膈。

【加减】翻胃，去白马尿，加黑驴尿。

【宜忌】忌煎炒大荤滞气生痰之物，并戒恼怒。

70195 秘旨乌骨鸡丸

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】丝毛乌骨鸡一只（男用雌，女用雄，溺倒，泡去毛，竹刀剖肋，出肫肝内金，去肠秽，仍入腹内） 熟地四两 北五味（碎）一两（二味入鸡腹内，陈酒、童便各二碗，砂锅内水煮，旋添至磨烂汁尽） 绵耆（去皮，蜜水拌，炙） 于术（饭上蒸九次）各三两 白茯苓（去皮） 归身（酒洗） 白

芍（酒炒）各二两

五味为粗末，同鸡肉捣烂焙干，骨用酥炙，为粗末，入下项药：

人参三两（无力者，党参代） 川芎一两（童便浸，晒） 丹参二两（酒浸，晒）

三味研末入前药中。

【用法】用干山药末六两糊为丸，大便实者，蜜丸亦可，晒干瓶贮。清晨沸汤送下三钱，卧时醇酒送下二钱。

【主治】妇人郁结不舒，蒸热咳嗽，月事不调，或久闭，或倒经，产后蓐劳，及崩淋不止，赤白带下，白淫；男子斫丧太早，劳嗽吐血而致虚损。

【加减】骨蒸寒热，加炙七肋鳖甲三两，银柴胡、地骨皮各一两半；经闭，加肉桂一两，崩漏下血，倍熟地，加阿胶二两；倒经血溢，加麦冬二两；郁结痞闷，加童便制香附末一两，沉香五钱；赤白带下，加萆薢、四制香附各二两，蕲艾一两；白淫，倍参、耆、苓、术；血热，加生地二两；虚甚，倍加人参。

70196 秘授乌鸡煎丸

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】乌骨雄鸡（闷死，去毛肠，用童便三十斤，煮烂，入诸药捣，骨另炙） 香附子一斤（四制） 青蒿子四两 熟地四两 蕲艾（去筋梗，加熟地捣，切薄片，晒干） 五味子三两 黄耆（炙） 白芍药（酒炒） 川芎 丹皮 生地 当归（酒洗）二两 人参三两

【用法】酒煮陈米为丸，每服一百丸，百沸汤送下。

【功用】种子。

【主治】妇人诸虚百损，五劳七伤，经水不调，久无子嗣。

【备考】方中川芎、丹皮、生地用量原缺。

70197 秘授术宝真丹

【方源】《玉案》卷三。

【组成】云苓（去皮） 白术（土炒） 人

参 黄耆 阿胶 (蛤粉炒) 各四两 当归 (酒浸) 生地 丹皮各五两 (炒) 紫河车二具 海狗肾一对 (酥炙) 甘草一两 (炙) 杜仲 (盐水炒) 山茱萸 骨碎补各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五钱，空心盐汤送下。

【主治】一切内伤虚损。

70198 秘方千金种子丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】秘传千金种子方 (《便览》卷三)、种子丹 (《叶氏女科》卷四)。

【组成】沙苑蒺藜四两 (净末，如蚕种，同州者佳，再以重罗罗，二两极细末，二两粗末，用水一大碗，熬膏) 莲须 (极细末) 四两 (金色者固精，红色者败精) 山茱萸 (极细末) 三两 (须得一斤，用鲜红有肉者佳，去核取肉，为细末) 覆盆子 (南者佳，去核，取极细末) 二两 鸡头实五百个 (去核，如大小不一等，取极细末四两) 龙骨五钱 (五色者佳，火煅。煅法，以小砂锅将龙骨入锅内，以火连砂锅煅红，去火毒)

【用法】上用伏蜜一斤炼，以纸粘去浮沫数次，无沫，滴水中成珠者伺候。只用四两，将前六味重罗过，先以蒺藜膏和作一块，炼蜜四两为丸，如黄豆大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】延年益寿，令人多子。

【主治】虚损，梦遗，白浊。

【宜忌】忌欲事二十日。

70199 秘本加味清胃散

《麻科活人》卷四。为《校注妇人良方》卷二十四“加味清胃散”之异名。见该条。

70200 秘传一味千金散

【方源】《秘传外科方》。

【异名】一味千金散 (《明医指掌》卷八)。

【组成】黑蜘蛛一个 (过江者为妙)

【用法】入在碗中研烂，镬热南酒于碗中搅匀。通口服之，随病左右侧卧；如不退，再

加一个即效。

【主治】下疳疮。

70201 秘传一醉不老丹

《松崖医径》卷下。为《扶寿精方》“一醉不老丹”之异名。见该条。

70202 秘传八味二花散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】桃花蕊五钱 梅花蕊 (二味不拘多少，阴干) 共一两六钱二分 穿山甲 (取四足者，酒炒) 一两 朱砂 (水飞过) 一两 紫河车 (水洗，去红筋，焙干为末) 一具 天灵盖一具 (以皂角煎汤洗净，酥制为末) 四方共一钱七分 鹿茸 (去毛，酥制) 三方共一两二钱 人参 (官拣者) 一两

【用法】上各为末。痘疹未出之先，以朱砂一两为君，梅花二钱，桃花三钱共一处和匀，每服五分或三分或二分半，用雄鸡与酒二杯灌之与食，倒悬，刺血入杯中，以热酒调前药同服；初发不起，以梅花一两为君，加桃花一钱，天灵盖五分；气血虚，灰白色，用紫河车一两为君，加天灵盖一钱，鹿茸一钱五分，梅花一钱，桃花一钱或八分；黑陷不起，以穿山甲一两为君，加桃花一钱，梅花八分，天灵盖七分，麝香五分；气血虚不能灌浆，以鹿茸一两为君，加紫河车二钱，桃花一钱，梅花八分，天灵盖七分，麝香五分，人参一钱；气血虚不能收靥，以鹿茸一两为君，天灵盖五分，桃花七分，梅花九分；落靥之后，癍色白，气血虚，以人参一两为君，加紫河车二钱，鹿茸一钱，梅花一钱五分，以上咸照首条服法。

【主治】痘疹。

70203 秘传人参鳖甲饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 鳖甲 苍术 白术 半夏 厚朴 川芎 当归 槟榔 青皮 甘草 (炙) 生姜

【用法】上细切。若日间发者属阳，用酒、水各一盏，黑豆一撮，桃枝头七个，乌梅一

个，同煎至七分，露一宿，未发之先，去滓，空心服。

【主治】内伤外感疟疾者，痰邪而致，脉弦数迟。

【加减】夜间发者，加升麻、桔梗；寒多，加桂枝，酒多水少；热多，加柴胡、茯苓，水多酒少；元气不足，加升麻；渴甚，加天花粉、知母；久不愈，加常山、草果。

70204 秘传万金内托散

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】白茯苓 银花 赤葛根 天冬 桑白皮 赤小豆 熟地 白芷梢 桔梗 半夏 杏仁 乳香 没药 羌活 连翘 黄芩 麻黄 白术 川芎 厚朴 陈皮 防风 柴胡 苍术 黄耆 苍耳子 荆芥 当归 枳实 芍药 甘草 连根葱 姜 枣

【用法】水煎，倾出，加好酒一杯调服。

【主治】诸般背发恶疮。

70205 秘传万病遇仙丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黑丑一斤（取头末五两，半生半炒）莪术（生用）茵陈（生用）槟榔（生用）三棱（醋浸，煮）猪牙皂角（醋浸，去皮核，为末）各五钱

【用法】上为细末，将皂角末用水打面糊为丸，如梧桐子大。男妇每服三钱，小儿每服一钱五分，五更初用冷茶送下。痢五六次，见秽积乃除根。

【主治】一切痢疾，积聚癥瘕，男子、女人、小儿一切腹痛。

【宜忌】忌油腻、湿面，生冷之物。孕妇不宜服。

70206 秘传千金种子方

《便览》卷三。为《扶寿精方》“秘方千金种子丹”之异名。见该条。

70207 秘传开明银海丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】白炉甘石一两（以炭火煨三炷香候，先以黄连半两煎浓汁，滤去滓，淬七次，

细研）辰砂一钱 硼砂二钱 轻粉五分 片脑三分（多则五分）麝香一分

【用法】上各为极细末，一处和匀，再研一二日无声，银瓶盛贮，蜜蜡封口，勿令泄气。点眼。

【主治】一切风热上壅，两目赤肿涩痛，风弦烂眼，及内外翳障等诸般眼疾。

【加减】赤眼肿痛，加乳香、没药各五分；内外翳障，加珍珠五分，鸭嘴胆矾、熊胆各二分；烂弦风眼，加铜青、飞丹各五分。

70208 秘传木香化气汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 厚朴 枳壳 陈皮 青皮 大腹皮 木香 砂仁 黄芩 紫苏子 香附子

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，煎一盞，去滓服。

【主治】七情触发怒气，伤于肝经而致气实证。

【加减】胁痛，加柴胡、青皮；小腹痛，加青皮。

70209 秘传太乙万灵膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】羌活 蓖麻仁 蝉蜕 大蜂房 蜈蚣 败龟版 苦参 猪皂角 玄参 槐角子 青蒿 过山龙 甘草 半枝莲 荆芥 蕲艾叶 黄芩 仙人掌 川椒 蒲公英 白薇 龙胆草 防风 忍冬藤 白及 生附子 大黄 石菖蒲 栀子 赤芍药 独活 何首乌 黄耆 蛇床子 桔梗 黑牵牛 漏芦 木鳖子（去壳）肉桂 大风子 巴豆（去壳）地骨皮 昆布 苍耳子 黄柏 青木香 连翘 鼠粘子 桃仁 白僵蚕 血余 穿山甲 黄连 当归 牛膝 苍术 升麻 蛇蜕 槟榔 槐枝 柳枝 桃枝各一两

上咬咀。用真麻油十斤浸，春五、夏三、秋四、冬十日，入大铁锅内，熬至烟尽为度，先去粗滓冷定，用大皮纸以针戳眼，滤去细滓，复入净锅内，熬至黑色，滴水成珠不散。每

油一斤,入淘过黄丹炒紫色者八两(如无黄丹,用水飞细密陀僧末八两代之),下丹之时,以柳棍不住手搅匀,离火再下:

白芷 天南星 草乌 北细辛 半夏 高良姜 川乌各一两

上七味俱生,为细末,入膏内搅匀,冷定。再下后开乳极细末:

海螵蛸一两 乳香(去油) 百草霜 没药(去油) 鸡肫皮 血竭 象牙末 雄黄 寒水石 儿茶 白石脂 朱砂 赤石脂 轻粉各五钱 青鱼胆 熊胆各三钱 甘松 三奈 潮脑 冰片 麝香 琥珀 珍珠 龙骨 水银各二钱。

【用法】上为细末,搅匀,倾入冷水内扯拔,换水浸二日,拔去火毒,然后装瓷钵内。临用摊贴。

【主治】一切痈疽发背,七十二般疮疖,三十六种疔毒,无名肿毒,痰核瘰癧,内损骨节,外伤皮肉,手足麻木不仁,流注疼痛,膈前背后吊起刺痛。

70210 秘传牛黄清心丸

【方源】《医便》卷四。

【组成】天麻四两 防风二两(去芦) 牛胆南星二两半 僵蚕(炒) 全蝎各二两半 白附子(生用) 干天罗(即丝瓜)五钱 川乌五钱 远志(去心)二两 川山甲(蛤粉炒)三两 蝉退二两(去土) 蒿虫(不拘多少) 辰砂(天葵煮)一两 雄黄一两(二味另研) 犀角(镑细)五钱 蜈蚣三钱 蟾酥五分(另研) 沉香三钱 细辛五钱 龙齿五钱 琥珀二钱(另研) 珍珠三钱(另研) 天竺黄三钱 蛤蚧一对 金银箔各十帖

【用法】上药各制净,为末;外用荆芥一斤,麻黄一斤,木通一斤,皂角半斤,甘草四两,苍耳子四两,六味熬膏,入真酥合油,炼蜜为丸,如芡实大,金银箔为衣,蜡封。随症调引用。

【主治】小儿惊风,大人中风、中痰、中气,

一切风痰。

70211 秘传乌药顺气散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】乌药 川芎 熟地黄(酒洗) 防风 枳壳(去瓢,麦麸炒) 桔梗 白芷 僵蚕(汤洗净,姜汁炒) 羌活 当归(酒洗) 白芍药 木瓜 槟榔 南木香 秦艽各一两 川独活 甘草各五钱

【用法】上细切,以生绢袋盛药,同无灰好酒二十五斤,入不津坛内,春、冬浸一月,秋二十日,夏十日,紧封坛口,浸满日。取酒吞捉虎丹,随量饮之。如饮过一半,再添酒连绢袋煮熟饮之。

【主治】痛风。

【宜忌】忌食猪肉。妊娠妇不宜服捉虎丹。

70212 秘传乌须万应散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】没石子四钱 破故纸 细辛 熟地黄(酒洗)各一两半 青盐 地骨皮二两

【用法】上为末。每用一钱,空心擦牙,咽下。

【功用】固齿,乌须。

70213 秘传去翳圣金膏

【方源】《普济方》卷七十八引《海上方》。

【组成】炉甘石五两(童便煨浸三十次,却研极细,用黄连、龙胆草各一两,当归三钱煎水两碗,飞过讫,重汤蒸干,再研约百次,要如面极细,其石须拣色白面极细微者,黄色只好合粉) 乌贼鱼骨半两(研细入煎) 黄连五两(用水洗净,晒干,却将一两切碎,煎水四两,研为细末,重罗过,再研极细,用水飞过,却于砂钵内煮此药,最难细,冬月用雪水洗净,晒干再研方细) 乳香三钱(要通明滴乳,用黄连水飞过) 密陀僧半两(火煨醋淬,研细,水飞过) 轻粉一钱(研细入药) 没药三钱(用黄连等水飞过) 南硼砂一钱(研细入煎) 白丁香一钱(水飞过,重汤煮干,再研入药煎) 黄丹一两

(用铁铤火煨过, 研细末, 水飞过, 重汤蒸干, 再研多时, 须极细, 入煎) 硃砂半钱 (净水洗去泥, 以水入铁铤煮干, 如盐样白方好, 再研细入药煎) 龙胆草一两 (截碎, 水煎) 蜜四两 (用水一盞于铜铤内煎, 用葱白二茎搅蜜, 候煎了放于地上, 用纸一片蘸取去面上蜡) 当归半两 (净, 以一半焙干, 研细末, 再用些水研入药, 一半煎水用) 麝香一钱 (以水一碗飞过, 用研丁香、没药用水淘飞过, 合研入煎, 须多淘, 净称)

上先将当归、黄连、龙胆草三味, 截碎, 用铤子煎二大碗水。用此水研乳香、没药飞过, 再用此水飞过麝香、白丁香, 独将黄连四两, 洗净令干, 碾为细末重罗过, 又碾飞过, 或别作法研磨, 但要极细, 于砂铤内, 和净蜜四两同煮。却旋入诸药, 煎成膏, 可丸即止, 惟独后入下二味:

麝香半钱 (重研细, 罗过) 脑子半钱 (重研细罗过, 候前药成膏, 却入此二味)

【用法】随病轻重, 以为大小丸与之。每以净汤一大鸡子壳化开, 日温洗五七次; 或如麦粒大, 点眼尤妙。

【主治】眼内外障, 远年眼疾。

70214 秘传龙骨锁精丹

【方源】《直指附遗》卷十。

【组成】白龙骨 (煨) 二两半 牡蛎 (煨) 二两 知母五钱 黄柏六钱 猪苓五钱 人参 (去芦) 一两 远志 (甘草汤煮, 去心) 一两半

【用法】上为细末, 酒糊为丸, 如梧桐子大。每服四五十丸, 空心以盐酒或盐汤送下。

【主治】梦遗滑精。

70215 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 白术 甘草

【用法】上细切。用水二盞, 加生姜三片, 大枣二枚, 煎一盞, 去滓, 再入姜汁服。

【主治】呕吐恶心。

【加减】气虚, 加入参、黄耆; 血虚, 加当

归; 痰火, 加姜汁炒黄连、黄芩、山梔; 胃口有痰火, 加姜汁炒黄连、炒干姜; 挟食停寒, 加砂仁、枳实、山梔、姜汁; 恶心, 加黄连、炒干姜、生姜汁; 脾胃弱, 加砂仁、藿香。

70216 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 枳实 厚朴 黄连 黄芩 山梔

【用法】上细切。用水二盞, 加生姜三片, 煎一盞服。

【主治】湿热所蒸, 吞酸, 饮食入胃不化。

70217 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄连 黄芩 山梔 桔梗 (各以生姜汁炒)

【用法】上细切。用水二盞, 加生姜三片, 大枣一枚, 煎服。

【功用】消痰。

【主治】噎气。

70218 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩 枳壳 苏子 桔梗 厚朴 肉桂少许

【用法】上细切。用水二盞, 加生姜三片, 大枣一枚, 煎, 临服以姜汁磨木香服之。

【主治】痰热过甚而致梅核气, 咯之不出, 咽之不下。

70219 秘传加味二妙丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 (米泔水浸) 四两 黄柏 (酒浸, 炒) 二两 川牛膝 (去芦) 当归尾 (酒洗) 川草薢 汉防己 龟版 (酥炙) 各一两 虎骨 (酥炙) 一两

【用法】上为细末, 酒糊为丸, 如梧桐子大。每服一百丸, 空心以姜汤送下。

【主治】湿邪为病, 两足湿痹疼痛, 或如火燎, 从足跗热起, 渐至腰胯, 麻痹痿软。

70220 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 川芎 熟地黄 白芍药 人参 白茯苓 黄连 山梔仁 半夏 甘草 (炙)

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎服。

【功用】补血。

【主治】心血虚少，痰火所扰，嘈杂，似饥不饥，似痛不痛，懊恼不自宁，暖气，痞满，恶心，渐至胃脘作痛。

【加减】嘈杂心痛，加茯神、生地黄。

70221 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 川芎 熟地黄 生地黄 白芍药 人参 白术 黄耆 黄柏 知母

【用法】上细切，加浮小麦一撮，大枣一枚，水二盏，煎一盞，去滓服。

【主治】盗汗。

70222 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 川芎 熟地黄 远志 白芍药 人参 甘草 茯神 山梔

【用法】上细切。用水二盏，煎一盞，去滓服。

【主治】心跳。

70223 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 川芎 熟地黄 白芍药 白术 人参 甘草 猪苓 泽泻

【用法】上细切。用水二盏，煎一盞，去滓服。

【主治】心惊。

70224 秘传加味枳术丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】加味枳术丸 (《医学正传》卷四)。

【组成】白术三两 枳实 (麦麸炒) 苍术 (米泔水浸二宿) 猪苓 (去皮) 麦蘖面 (炒) 神曲 (炒) 半夏 (汤泡透) 各一两 泽泻 (去毛) 赤茯苓 (去皮) 川芎 黄

连 (陈壁土炒，去土) 白螺蛳壳 (煨) 各七分 草豆蔻 砂仁 (炒) 黄芩 (陈壁土炒，去土) 青皮 (去白) 萝卜子 (炒) 干生姜各五钱 陈皮 (去白) 香附子 (童便浸) 瓜蒌仁 厚朴 (姜汁制，炒) 槟榔 各三钱 木香 甘草各二钱

【用法】上为细末，用青荷叶泡汤浸晚粳米捣粉作糊为丸，如梧桐子大。每服七十至一百丸，清米饮汤送下。

【主治】清痰、食积、酒积、茶积、肉积在胃脘，当心而痛，及痞满恶心，嘈杂呕吐。

【加减】久病挟虚，加人参、白扁豆、石莲肉各五钱；吞酸，加吴茱萸汤泡，寒月五钱，热月二钱五分；时常口吐清水，加炒滑石一两，牡蛎粉五钱。

70225 秘传加味醉仙散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】胡麻子 牛蒡子 蔓荆子 枸杞子 (各炒紫色) 白蒺藜 苦参 瓜蒌根 防风 当归 川芎 芍药 羌活 何首乌 白芷 僵蚕 (炒) 荆芥 连翘 黄芩 山梔 皂角刺 玄参 甘草 芙蓉叶 威灵仙各一两

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，茶清送下。

【主治】杨梅疮。

【加减】实热疮盛，加轻粉二钱。

70226 秘传加味八味汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 生地黄 赤芍药 阿胶珠 牡丹皮 黄连 黄芩 山梔 人参 甘草 犀角 京墨

【用法】上细切。用水二盏，茅根一握捣烂，加大枣二枚，煎，去滓，磨京墨、犀角调服。

【主治】衄、唾、呕、吐血。

【加减】痰中带血，加知母；血疙瘩，加红花、桃仁、炒干姜。

70227 秘传加味八珍汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 当归 地黄 白芍药 酒黄柏 酒知母 橘红 桔梗

【用法】上细切。用水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】气体虚弱，劳伤心肾，或外感六淫之气，失于祛散，乘虚入里，阴虚内热，而致劳怯。

【加减】咳嗽，去人参，加沙参、五味子、麦门冬；久嗽，去人参，加杏仁、罂粟壳；喘，去人参，加桑白皮、瓜蒌仁；胸中满闷，加制枳实；有痰，加贝母、半夏曲；痰中带血，加紫苑、黄芩、山梔；吐血、咳血，加山梔、阿胶、胡黄连；遗精，加牡蛎粉；盗汗，加黄耆、半夏曲、浮小麦；日晡及半夜热，加地骨皮；骨蒸劳热，加秦艽；寒热往来，加柴胡；心下惊悸，去茯苓，加茯神、远志；声嘶及咽痛生疮，加青黛、犀角、桔梗；渴甚，去芍药，加天花粉；元气不足，大便溏，加升麻、炒白术；作丸剂，加酥炙龟版；遗精，加槲根白皮，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心盐汤、温酒任下。

70228 秘传加减平胃散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术(米泔水浸，去皮) 白术 白茯苓 甘草(炙) 陈皮(去白) 砂仁 猪苓 泽泻

【用法】上细切。用水二盏，加生姜、大枣、灯心，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】脾胃虚弱，饮食所伤，及风寒暑湿之气所袭而致泄泻。

【加减】泻如清水，脉来无力，加炮干姜、肉桂，甚不止，加制附子；泻如痢，黄赤稠粘，或乍泻口渴，脉来无力，加黄连、黄芩、炒干姜少许；泻而腹痛，右关脉来有力，加草果、枳实、山楂；泻，腹痛或呕吐，加木香磨姜汁服；泻，小便短赤，脉沉，加滑石、灯心；泻，腹如雷鸣，加煨生姜五大片；久不止，脉来无力，加人参、黄耆，甚不止者，

加升麻、炒白术、苍术。

70229 秘传加减省风汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 羌活 防风 黄芩 白芷 白术 红花(有死血者加之)

【用法】上细切，作一服。用水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，再用木香磨姜汁、竹沥入药内，搅匀服。

【主治】中风。

【加减】血虚，加当归、生地黄、熟地黄，去红花；气虚，加人参、黄耆，去白芷；痰盛，加瓜蒌仁、枳实；大便燥闭，脉实，加大黄。

70230 秘传加减香薷饮

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】香薷 白扁豆 黄连 甘草 麦门冬 五味子 知母 陈皮 茯苓 厚朴

【用法】上细切。用水二盏，加生姜、大枣、灯心，煎至一盏，去滓冷服，不拘时候。

【主治】中暑，脉虚身热，自汗，背恶寒，毛耸，齿燥。

【加减】身热，加柴胡；呕，加半夏、姜汁；渴，加天花粉；元气虚，加人参、黄耆；小便短赤或涩，加山梔仁、泽泻；自汗或水泻，加炒白术、升麻；头痛，加石膏、川芎。

70231 秘传加减调中汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 枳实 枳梗 白茯苓 草豆蔻(建宁者佳)

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，煎一盏，去滓，再入木香磨姜汁服。

【主治】忧郁内伤，邪气外感，结聚痰饮，停于脾胃，溢于包络所致心痛(即胃脘痛)。

【加减】寒痛，脉无力，加干姜、肉桂；热痛，脉有力，加生姜汁炒黄连、黄芩、山梔；食积痛，加炒砂仁、草果、山梔；痰饮作痛，加半夏曲、瓜蒌仁；日轻夜重，加当归尾、桃

仁、红花、玄胡索。

70232 秘传加减调中汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 半夏 白茯苓 木香 砂仁 枳壳各等分

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，煎，再入木香磨姜汁调服。

【主治】腹痛。

【加减】寒痛，加干姜、肉桂，甚不已，加制附子；热痛，加生姜汁炒黄连、黄芩，去木香；食积痛，去枳壳，加枳实、草果、大黄下之；痛甚不已，加柴胡、大黄；湿痰痛，倍加苍术、半夏、砂仁；死血痛，去苍术、半夏、砂仁，加当归、桃仁、红花，重者，再加大黄；小腹痛，加青皮。

【宜忌】凡诸腹痛，勿用参、耆、术，盖补其气，气旺不通而痛愈甚。

70233 秘传加减理中汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 白术 干姜 甘草 干葛 肉桂 陈皮 半夏 茯苓 细辛

【用法】上细切，作一服。用水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓温服。

【主治】中寒，手足厥冷，或腹痛呕吐，甚则晕倒，昏迷不省人事，脉沉迟无力者。

【加减】中寒重，六脉全无，或腹痛泻痢不止，加附子；身甚恶寒，加麻黄、煨生姜，水煎，临服时，再加姜汁半盏服。

70234 秘传加减渗湿汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 茯苓 半夏 黄连 灯心

【用法】上细切。作一服，用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎一盏，去滓，纳盐二字服。

【主治】内伤饮食生冷，外受山岚露雨，水土之气，而致中湿，脉沉细。

【加减】内湿，食下呕吐，腹中胀满，小便短赤，加山楂、枳实、黄连、炒萝卜子；外

湿，身体肿痛，寒热往来，小便短赤，加羌活、木通、黄芩；小便不利，加猪苓，泽泻；湿热发黄，如熏曲相似，加茵陈、滑石、木通、猪苓、泽泻、山栀、黄柏。

70235 秘传当归地黄汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归 生地黄 川芎 赤芍药 甘菊花 龙胆草 防风 黄连 知母 柴胡 陈皮 甘草

【用法】上细切。用水二盏，芽茶一撮，灯心二茎，煎一盏，去滓，食后服。

【功用】清热养血。

【主治】目疾。

70236 秘传远志养心丹

【方源】《直指附遗》卷九。

【异名】经验远志养心丹(《保命歌括》卷十二)。

【组成】生地黄(酒洗) 远志(甘草汤煮，去心) 当归(酒洗) 甘草(炙) 各一两五钱 柏子仁 酸枣仁各三两 川芎 人参(去芦) 各一两 茯神(去木) 七钱 半夏(姜汁泡) 七次 南星(炮) 朱砂(研末，为衣) 各五钱 麝香一钱 石菖蒲六钱 琥珀三钱 真金箔二十片

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服四五十丸，津唾咽下；有痰者，用姜汤送下。

【主治】心虚手振。

70237 秘传走马通圣散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】麻黄 炙甘草各一两 雄黄二钱(或加川芎二钱)

【用法】上为细末。每服一钱，热酒下。即汗。

【主治】伤寒阴邪初感，质强而寒甚者。

【宜忌】宜用于仓卒之时。

70238 秘传助脾渗湿汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】苍术 白术 人参 枳壳 枳实

黄连 山梔 厚朴 大腹皮 萝藦子(炒)
猪苓 泽泻

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，灯心一握煎，再用生姜汁磨木香同服。

【主治】水肿，鼓胀。

【加减】大便燥结，加大黄；小便不利，加滑石。

70239 秘传围药解和散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】芙蓉叶 野菊根 蒲黄 黄连 黄芩 黄柏 连翘 白及 白薇 白芷 乳香 没药 雄黄 孩儿茶 甘草 蛇含石(煨，醋淬) 赤石脂 大黄

【用法】上为细末。用鸡子清调敷其疮四围肿处；如干，以鸡子清常润。

【主治】肿毒初起。

【加减】肿毒重大，加草薢、木槿叶。

70240 秘传羌活保生汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】羌活 独活 防风 荆芥 连翘 黄连 白芷 柴胡 木通 陈皮 桔梗 甘草

【用法】上细切。用水酒各一盏，煎至一盏，去滓，察病上下服。

【主治】发背、痈疽、疔肿、瘰癧、便毒等疮初起十日内，焮赤肿痛。

70241 秘传补中参术汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 白术 甘草 当归 白茯苓 苍术 厚朴 陈皮 枳壳少许

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣二枚，煎一盏，去滓服。

【主治】七情，触发怒气，伤于肝经，而致气虚证。

【加减】妇人，加香附、木香，磨水调服。

70242 秘传灵脂遇痛汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归(酒洗) 赤芍药 五灵脂(醋炒) 香附子(醋炒) 木香 艾叶(醋

炒) 陈皮(去白) 半夏(香油炒) 枳壳 厚朴 苏梗 木通

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓服。

【主治】妇人血刺痛。

70243 秘传阿魏万灵膏

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】防风 荆芥 白芷 当归 黄连 黄柏 连翘 蛇蛻 蜂房 白薇 苍耳草 接骨草 羌活 山梔 大风子 金银花 甘草 细辛 紫河车 何首乌 黑丑 桔梗 牡丹皮 车前子 苦参 白及 蓖麻子 大黄各二两 川山甲四十片 江子肉八钱 望见消二钱 木鳖子四十个 虾蟆 柴胡 全蝎 半夏 升麻 南星 玄参 天花粉 川乌 牛膝 黄耆 两头尖 独活 斑蝥 地榆 五灵脂 槐角 苍术 藁本 赤茯苓 桃仁 三棱 莪术 小茴香 青木香 嫩松节各一两 威灵仙 天麻 藕节 薄荷 贝母 丹参 生地黄 乌药各一两半 血余三钱(后入) 八角风 叶下红各四两 槐枝六两 柳枝六两 黄丹八两(水飞过，炒紫色)

【用法】上细切，用水八碗，浸一日，煎稍干，下真麻油十六斤，同煎至川山甲等药如炭黑，滤去滓；入血余煎无形影，滴水中不散，再入黄丹，徐徐顺搅，煎至滴水成珠，再入后项药：蜈蚣二条，乌蛇肉四两，川乌、草乌、附子、白附子各一两，五加皮，紫荆皮各二两。上为细末，入膏药内，频频顺搅匀，退火入后项药：沉香、雄黄各一两，南木香、血竭、轻粉、赤石脂、龙骨各二两，乳香、没药各四两，麝香五钱阿魏一两(用水另溶化，再入膏药内)。上为细末，入膏药内，顺搅匀，出火毒。瓷器收贮。每用油纸摊贴，留顶以出其毒。

【主治】发背，瘰癧，疔肿，一切恶疮，瘫痪，痛风，脚气。

70244 秘传明目补下丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参三钱五分 川楝子(酒煮,去核) 远志(去心)各一两半 川巴戟(去心) 菟丝子(酒浸) 麦门冬各一两 白术 白茯苓(去皮) 赤芍药(酒浸) 青盐 破故纸(炒) 小茴香 葫芦巴 肉苁蓉(酒洗) 黄耆 甘草(炙) 枸杞子 砂仁(炒) 黄柏(盐酒炒) 山药(炒) 知母(去毛皮,盐酒炒) 熟地黄(酒洗,怀庆) 五味子 莲肉(去心)各五钱 车前子二钱五分

【用法】上为细末,酒煮糯米糊为丸,如梧桐子大。每服八九十丸,空心用盐汤送下。

【主治】目病。

70245 秘传固本牛胆丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参(去芦) 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 生地黄(酒洗) 熟地黄(酒洗) 当归(酒洗) 莲花蕊 何首乌(赤白相半) 槐角(三月上已采者佳)各等分

【用法】上为细末,用腊月黑犍牛胆一个,将前药末纳入胆内,悬于风凉阴处四十九日取出。每服二钱,空心白酒调下;若畏苦,就以牛胆汁为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心白酒送下。

【功用】固本,乌须发。

【宜忌】勿犯铁器;切忌房事、萝卜、辛辣之物。

70246 秘传金锁思仙丹

【方源】《直指附遗》卷十。

【异名】金锁思仙丹(《医统》卷七十引万氏方)。

【组成】莲花蕊十两(忌硫黄、蒜) 石莲子十两(取净粉用) 鸡头实十两(取其实并中,捣烂晒干,再捣筛,取净粉)

【用法】上以金樱子三斤,取霜后半黄者,木臼中转杵,却刺勿损,擘为两片,去水淘净,烂捣,入大锅,以水煎,不绝火,约水耗半取出,滤过重煎,如稀汤;市肆干者焙之,用水浸转,去子,煎令如法,入前药末

为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以盐汤送下。

【主治】男子嗜欲过多,精气不固。

70247 秘传金箔镇心丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】川归身(酒洗) 生地黄(酒洗) 远志(去心) 茯神各五钱 石菖蒲(九节者用) 黄连各二钱五分 牛黄一钱(另研) 辰砂二钱(另研) 金箔十五片

【用法】前六味为细末,入牛黄、辰砂二味末,猪心血为丸,如黍米大,金箔为衣。每服五十丸,煎猪心汤送下。

【主治】忧愁思虑伤心,惕然心跳动,惊悸不安。

70248 秘传疝气如神汤

【方源】《幼科指南》卷下引《包氏家传》。

【组成】山梔五分 黄柏(盐水炒)八分 山楂肉八分 木通五分 橘核 玄胡各五分 苍术(盐水炒)五分 枳实(炒)七分 香附(盐水炒)一钱 小茴(炒)五分 甘草三分 吴茱萸(炒)七分 草豆蔻七分 川楝肉(炒)八分 益智仁(盐水炒)八分

【用法】水煎,空心服。

【主治】小儿疝气。

70249 秘传定痛生肌散

【方源】《直指附遗》卷二十二。

【组成】龙骨(煅) 白芷各三钱 黄丹(水飞)五钱 软石膏(煅,去火毒)一两 没药 乳香各三钱 血竭二钱 黄连四钱 轻粉 朱砂各五钱

【用法】上为极细末。掺于疮口上,再用白膏药贴之。

【功用】止痛生肌。

【主治】痈疽。

70250 秘传枳术二陈汤

【方源】《直指附遗》卷七。

【异名】枳术二陈汤(《医统》卷二十七)。

【组成】白术(泔洗,锉,土炒)一钱 黑枳实(麸炒) 陈皮(去白)各八分 茯苓

(去粗皮) 香附子(童便浸,炒) 半夏(汤泡七次)各一钱 黄连(姜汁炒) 槟榔(鸡心者) 白豆寇各五分 青皮(麸炒) 吴茱萸 生甘草各三分

【用法】上咬咀。用水一钟,加生姜三片,大枣一枚,煎八分,食远服。

【主治】痰气食膈,呕吐痰涎,翻胃嘈杂。

【加减】气虚,加人参、黄耆;血虚,加当归、地黄;郁,加神曲、抚芎。

70251 秘传茱萸内消丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】吴茱萸(半酒半醋浸一宿,焙干) 山茱萸(蒸,去核) 马兰花(醋浸,焙) 川楝子(蒸,去皮核) 官桂 黑牵牛(炒,取末) 舶上茴香(用盐炒) 延胡索(略炒) 橘皮 青皮(去白) 海藻(浸,洗去咸,焙)各一两 桃仁(浸,去皮,炒) 白蒺藜(炒,杵去刺) 木香各半两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大,每服四十丸,食前温酒、盐汤任下。

【主治】肾虚为邪所袭,留伏作痛,阴癰偏大,或生疮出黄水。

70252 秘传点眼光明丹

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黄连半斤(煎汁滤净) 炉甘石一斤(用紫罐盛,煨三炷香时,入黄连汁内,七浸七晒,随时听用) 炉甘石(制过)一两 麝香 硼砂各一分 片脑二分 枯白矾五厘

【用法】上为极细末。用骨簪沾水蘸药,点眼内,闭目。

【主治】一切风热上壅,两目赤肿涩痛,风弦烂眼,及内外翳障。

【加减】风眼,加五倍子(火煨存性)一分。

70253 秘传神仙延寿丹

【方源】《医统》卷九十三。

【异名】延龄至骨丹。

【组成】真红铅一两 人中灵 琥珀各二钱 天门冬 麦门冬 菟丝子(酒浸一昼夜,九蒸九晒过,另捣) 秋石 五味子 晚蚕

砂(炒黄) 锁阳(酥炙) 远志(酒浸,去心) 当归(酒浸) 川巴戟(酒浸,去心) 肉苁蓉 白蒺藜 羌活各四两 柏子仁 玄明粉 鹿角霜 山茱萸(酒浸取肉) 川骨脂 鸡头实 生地黄(酒浸,摘碎) 熟地黄(同上制) 革薢 川牛膝 枸杞子(甘州者)各五两 杜仲(酒浸,炒,去丝) 川芎(雀脑者)各三两 鸦片五钱 干山药 何首乌(泔水浸,黑豆蒸,甑下煮,以羊肉蒸熟为度) 虎胫骨(酥炙,四肢痛加) 莲蓬子(去皮心)各六两 茯神 干茄根各八两(切寸长,饭上蒸熟,晒)

【用法】上为末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,空心无灰好酒送下。

【功用】滋补驻颜,固元阳,返老还童。

70254 秘传神仙拔云散

【方源】《直指附遗》卷二十。

【组成】真珠 硼砂 石燕子(炒过)各一分 冰片三厘 硃砂(升过) 牙消(炒过) 石蟹 牛黄各半分

【用法】上为极细末。点眼。再用后方末药点之。

【主治】翳膜。

【备考】末药:乳香(制过)、没药(制)各五分,轻粉五厘,石燕子一个(醋浸九次),青盐(湿纸包,烧)一分,珍珠(湿纸包,烧过)、琥珀(放豆腐内煮五次用)、血竭各三分,雄黄、雄胆(用箬焙干)、朱砂各二分,枯矾、胆矾各五厘,海螵蛸三厘,白丁香三粒(水洗过),炉甘石(火煨,童便渍七次)一钱。上研极细末,加冰片少许,点之。

70255 秘传神仙消痞丸

【方源】《局方》卷十(续添诸局经验秘方)。

【组成】斑蝥二十个(去头足翼,用糯米半升同炒,候米焦黄色为度,去米不用) 巴豆(去皮取霜)二十粒

【用法】先将斑蝥碾为细末,却入巴豆霜同研令匀,米糊为丸,如小绿豆大。小儿三岁以下,每服三丸,五更初茶清下。

【主治】小儿寒温不调，乳哺失节，或啖生冷、果子、粘食等物，脾胃微弱，不能消化，五脏不利，三焦壅滞而致病疾，结块腹内，坚硬如石，或发作寒热，有如疟证，不能饮食，渐致羸瘦。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神仙消痞丸”。

70256 秘传神效红丸子

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】巴豆四十九粒（去壳心膜及油，存性，炒热，于银石器内，慢火熬令黄色，乳细，以纸包压去尽油，细研，冬月少去油）杏仁十五粒（须是真者，去皮尖，蒸，纸裹，去油，和巴豆同再研）木香三钱半（慢晒，勿见火）沉香一钱半 滴乳香三钱（为细末）槐花一钱半（为细末）

【用法】上相和，于乳钵内乳令匀细；用真黄蜡一两一钱，于银石器内，慢火化开，将好绵滤净，再将蜡溶开，却投前药于内，将竹篦不住手搅令匀；次下真杭州黄丹五钱，再搅，令极匀为度，倾出，碗内自凝，捏成块，如硬，入蜜少许，如不红，加黄丹；如用旋丸，如绿豆大，用油纸密包。每服十丸，加至十五丸，白汤、姜汤任下；米饮亦可；如常饮食停滞膨胀，热汤下；温酒亦可。

【主治】肠胃虚弱，内受风寒，或饮食生冷，伤于脾胃，呕吐泄泻，脐腹疼痛，胁肋胀满，肠内虚鸣，积痢赤白，并酒积痢。

【宜忌】小儿泄泻不可服。

70257 秘传神效活命饮

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】金银花一两 皂刺八分 山甲八片（炙黄色） 陈皮 贝母 花粉各六分 归尾 乳香 大黄 没药 木鳖子（去壳） 甘草 赤芍 防风各五分 白芷八分

【用法】水、酒各一钟，煎八分服。

【主治】肿毒。

【加减】老入体虚，加生黄耆二钱。

70258 秘传真人活命汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归尾二钱 穿山甲（炒） 金银花 皂角刺 陈皮各二钱五分 防风 贝母 白芷各一钱五分 乳香五分（另研） 没药一钱（另研） 甘草五分

【用法】上细切。用水、酒各一盞，煎去滓，入乳香、没药和服。得微汗良。

【主治】发背、痈疽、疔肿、瘰癧，便毒等疮日久将脓者。

70259 秘传海上香连丸

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】真川连（净）八两 木香二两（不见火） 川当归一钱 白芍一钱（炒） 川芎一钱五分 车前子一钱 生地黄二钱 厚朴二钱（炒） 白茯苓一钱五分 木通八分 枳壳一钱（炒） 陈皮二钱（炒） 苍术一钱（炒） 吴茱萸二钱（炒）

【用法】上药除黄连、木香，用水七碗，煎至五碗，去滓，用汁煮黄连，以干为度，取起晒干，用木香为细末，用老米粉、好醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白痢姜汤送下，红痢茶汤送下，泄泻百沸汤送下。

【主治】赤白痢疾，泄泻。

70260 秘传诸蛊保命丹

【方源】《保命歌括》卷二十五。

【组成】皂矾一斤 肉苁蓉三两（二味入罐内，火煨尽烟） 香附子一斤 大麦蘖一斤半（炒） 红枣一斤（煮熟去核，捣膏为丸）

【用法】前四味为细末，枣膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸，好酒送下，一日三次。

【主治】诸蛊。

70261 秘传黄连地黄汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】黄连地黄汤（《回春》卷五）。

【组成】黄连 生地黄 天花粉 五味子 川归 人参 干葛 白茯苓 麦门冬 甘草

【用法】上细切。加生姜一片，大枣二枚，

竹叶十片，用水二盏煎，去滓温服。

【功用】泻火润燥，清心滋肾。

【主治】消渴，心脉多浮，肾脉多弱。

【加减】上焦渴，加桔梗、山梔；中焦渴，加黄芩；头眩，渴不止，加石膏；下焦渴，加黄柏、知母。

【备考】若作丸剂，加薄荷，炼蜜为丸，如弹子大。噙化咽下。

70262 秘传蛊胀槟榔丸

【方源】《医钞类编》卷九。

【组成】贯众一两 鹤虱一两 芫荇一两 雷丸五钱 槟榔二两 香附一两 川楝肉一两 三棱(醋炒) 莪术(醋炒)各七钱 胡连五钱 白芷梢八钱 乌梅肉五钱 熟大黄一两 芒消八钱 毕澄茄一两 法半夏一两

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【主治】蛊胀。

【备考】吞丸作吐者，先用煎鸡子一块先食，随用花椒一钱为末，开水服后，用此丸吞下，即不吐。

70263 秘传痔漏内消丸

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】棕榈灰一两 发余二两 枯矾一两 刺猬皮一个(醋炙) 牛角觶一个(烧存性) 防风五钱 槐角五钱 黄连(炒)一两二钱 白术(炒)一两 黄芩(炒)五钱 地榆(炒黄)五钱 川山甲尾八钱(土炒成珠) 苦参皮一两 石菖蒲一两 猪蹄壳二十个(烧灰) 雷丸一两 胡麻仁一两 漏芦一两 芫荇一两 青姜香五钱 象牙末五钱 乳没各三钱

【用法】上为末，加麝五分，用黄蜡四两，加麻油一两，和药为丸，如梧桐子大。每服一钱，每日二三次。

【功用】干脓止痛，退管生肌。

【主治】痔漏。

70264 秘传煮酒应效方

【方源】《直指附遗》卷四。

【组成】当归 人参 茯苓 乌药 砂仁

杏仁 川乌 草乌 何首乌 五加皮 枸杞子 川椒各二钱半 木香 牛膝 枳壳 干姜 虎骨 香附子 白芷 厚朴 麦门冬(去心) 陈皮(去白) 白术 川芎 麻黄 独活 羌活 半夏 肉桂 白芍药 生地黄 熟地黄 防风 天门冬 五味子 小茴香 细辛各一钱半 苍术 破故纸 甘草各五钱 核桃肉 红豆 酥油各五钱五分 蜜八两 沉香一钱五分 葡萄二钱 荆芥 地骨皮 山茱萸 巴戟 知母各一钱五分

【用法】上为细末，分作两袋，用罐盛酒，袋悬于罐内，封罐口，安锅内煮熟，过五七日方用。每服随量饮，病在上食后服，病在下食前服。

【主治】诸风气、历节、插腿风。

70265 秘传紫府青津丸

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】女贞实四两(用芩、连水浸一夜，次日蒸晒，如法三遍) 白石膏四两(煨过，研细，用嫩桑叶四五斤煎汁，取净汁一碗煮干，再用紫苏四两，荆芥一两，煎清汁，再待干听用) 知母四两(净咀片，分四处：人乳、童便、青盐拌润过一宿，生用一分；俱微火炒) 黄柏四两(净，照前四制如法) 白芍药一两(用桑皮煎水煮干) 贝母二两(姜矾水煮干) 杏仁二两(去皮尖，青盐水煮干) 天门冬二两(去心，切细，微火炒干) 麦门冬二两(去心，微火焙干) 人参一两(切大片，用好酒拌润一宿，取白酒、曲末炒热，下人参微炒干，去曲) 茯神二两(去皮心，人乳拌润一夜，次日火焙干) 黄耆一两(切片，蜜水拌润一宿，炒干) 糖球肉五钱 当归一两(酒洗晒干，切片，酒拌润一宿，炒) 陈皮一两(去白，炒) 百合二两(姜汤泡过，焙干)

【用法】上药各制精微分两，和一处，再焙大燥，为极细末，取梨汁半斤，炼蜜一斤，为丸如梧桐子大。每服三钱，早、晚白滚汤送下。

【功用】制伏相火，滋养真阴，津润肺腑，上降心火，下生肾水，清热化痰。

【主治】虚实痰火。

70266 秘传解肌理中汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】白术 山楂肉 白芍药(炒)各一钱 黄连(炒) 枳实(麸炒) 川芎 香附子(炒) 升麻各七分 干葛一钱二分 生甘草 炙甘草各三分

【用法】上细切。用水一盞半，加生姜三片煎，去滓服。

【功用】理中，清阳明之热。

【主治】小儿食积郁热，发于肌表，潮热往来。

【加减】积去后，潮热未除，减山楂、枳实、香附、川芎，加人参、黄耆、陈皮、石膏各五分，薄荷二分，白术三分；有痰，加半夏六分。

70267 秘传解瘟散毒汤

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】川芎 白芷 羌活 葛根各一钱 柴胡一钱五分 生草四分 赤芍 连翘 黄芩 花粉 桔梗 玄参 淡竹叶各一钱

【用法】加灯心二十根，水煎服；若作丸，每丸重三钱。

【功用】清解内热。

【主治】天行瘟疫，口渴咽肿，发热无汗。

70268 秘传漆黄蟾酥丹

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】鲜螃蟹四斤 真生漆一斤 真蟾酥二两 真雄黄二两

【用法】先将瓷罐装蟹，次入漆，封口，埋在土内二七日足，方取开看，二物俱化成水，去滓净，将水入锅慢慢火煮干，焙为细末，方入雄黄、蟾酥二味末搅匀，瓷罐收之。每服一二钱，空心、临卧各一服，好酒送下。不过一月，其疾全好除根。

【主治】大麻风。

70269 秘传增补香芷丸

【方源】《点点经》卷四。

【组成】香白芷四两(焙干)

【用法】上为细末，用牙猪脑髓四个，银簪拨去血筋，入瓷碗盛之，放在饭甑内蒸七日，露七夜，令脑髓蒸熟，同上药为丸，如梧桐子大。每服五钱，煮葱白十七根汤送下，一日三次。

【主治】头被火久注，脑髓受伤，作痛不休，服药不退，鼻流臭水不堪闻，恐成脑崩。

【宜忌】忌房事。

70270 秘治跌打损伤膏

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】全当归 川乌 白及 防风 木鳖子 生地黄 连翘 草乌 官桂 乌药 白芷 角刺 大黄 赤芍药 头发 白薇各一两 没药(去油)五钱 槐 柳 桑 枣桃枝各十寸

【用法】上药入麻油二斤浸透，桑柴火熬枯去滓，复入净锅内，微火熬至滴水成珠，始下飞丹十二两足，务使老嫩合宜，将凝，投去油乳香五钱化尽，倾入水盆内揉扯，以拔火毒，收用摊贴。临贴时加麝香半分，每张重五钱。病重者一张全愈，轻者一张可贴三四天。

【主治】跌打损伤；兼治痲痛闪挫，凝血闷气。

【宜忌】此方不可加减，致取不效。

70271 秘方乌梅五味子汤

《医方大成》卷七。为《普济方》卷一七六引《圣惠》“乌梅五味汤”之异名。见该条。

70272 秘传十六味流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】人参 当归 官桂五分 川芎 防风 白芷 桔梗 黄耆 炙草 厚朴 木香 白芍药 大腹皮 乌药 枳壳 苏叶各一钱

【用法】上为末。每服六钱，以酒调下，服药后饮酒以助药力。不饮酒者，木香汤代之。

米饮亦可。

【功用】发散风毒，调理气血，排脓止痛，长肉生肌。

【主治】痈疽。

【加减】不退热，加茯苓、白术、地黄；不进饮食，加香附、砂仁；疼痛，加乳香、没药；水不干，加知母、贝母；疮不穿，加皂角刺；大便闭，加大黄、枳壳；咳嗽，加陈皮、枳壳、半夏、杏仁、生姜；小便闭，加麦门冬、车前子、木通、滑石、灯草；瘰癧，加羌活、夏枯草、连翘、青皮、柴胡、黄芩。

【备考】方中人参、当归用量原缺。

70273 秘传加味四君子汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 川归 生地黄 黄柏 黄连 黄芩 桂枝少许 大枣一枚

【用法】上细切。用浮小麦一撮，水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】自汗。

70274 秘传治肠风下血丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】干柿饼（烧存性） 酒瓶箬（包酒过二三年者，烧存性） 乌梅肉（烧存性）各二两（净） 百药煎一两（如无，以五倍子炙焦黄色代之） 槐花（炒焦黑） 枳壳（麸炒黄色） 槟榔各半两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，以醋汤送下。

【主治】肠风下血。

70275 秘制金毛狮子疮药

【方源】《疡医大全》卷三十五引刘氏方。

【组成】黄芩 荆芥穗 黄连 五倍子 茜草 槐枝头 芒消 黄柏各二两（上为粗末，再炒老黄色） 土硫黄（醋煮） 枯矾各二两（上为细末） 巴豆肉三钱 蓖麻仁五钱 大风子（净肉）二两（上药捣如泥，同前药和研匀细） 水银 黑铅各一两（同

研） 雄黄 潮脑各五钱（共与前药研和一处）

【用法】每用一钱，以前制疮药油调搽。凡脚上患血风疮多年不愈，先以药水洗净拭干，再以研细轻粉薄薄扫上，再搽疮药。凡搽疮药先一日用油调鹿角霜细末，厚敷疮上过夜，次日再搽疮药更妙。

【主治】一切血风疥疮，手足诸疮。

【备考】制疮药油法：雄猪油一斤，槟榔、大黄、黄柏、麻黄各一两，水三碗，同药入锅内熬至水干油出，滤去滓，冷定收贮，调一切疮癣擦药。

70276 秘授仙方万应膏药

【方源】《直指附遗》卷二十二。

【组成】羌活一两 巴豆二两 木鳖子二两 川乌 皂角刺 穿山甲 白芷 蝉退 杜当 赤芍药 金线重楼 五倍子 独脚莲 雷藤 连翘 血余 白及 降香 白薇 紫荆皮 藁本 黄连 石羊角 广藤 川芎 僵蚕各一两 蓖麻子二两五钱 防风二两 蜈蚣七条 草乌二两 当归一两五钱 蛇退 叶下红 三白草 八角风 苦参 孩思母 何首乌 大风藤 小风藤 海风藤 寻风藤 七叶黄荆 松节 金银花 车前草 槐角 丹参 斑蝥 青木香 玄参 牛膝 地榆 威灵仙 生地黄 薄荷 苍术 五灵脂 天花粉 南星（生者）一个（佳） 细辛 虾蟆一只 桔梗 山梔 荆芥 黑丑 花蛇 大风子 乌药 小茴 节骨草 两头尖 黄柏 乌梢蛇 槐嫩枝 桃嫩枝 柳嫩枝 榆嫩枝 椿嫩枝各五两

【用法】上咬咀，用真香油十斤和药，浸七日，下锅熬，待药滓成炭、血余无形方可滤去药滓，再熬，滴水成珠，再将黄丹徐徐入内收为膏，再入后项药：乳香、血竭、阿魏、龙骨、胆矾、雄黄、轻粉、没药、孩儿茶各五钱，樟脑四钱，赤石脂七钱，沉香、木香各三钱，麝香一钱，冰片三分。上为极细末，入膏内搅匀，用瓷钵收贮，出火毒。油纸摊

贴。

【功用】消肿毒，去腐生肌。

【主治】一切肿毒及杨梅痈漏，恶疮，风气骨节疼痛，痞气积块，坐闪腰痛。

70277 秘传止血定痛生肌散

【方源】《直指附遗》卷三。

【异名】止血定痛生肌散（《寿世保元》卷九）、生肌散（《蠢子医》卷四）。

【组成】真龙骨（煅）三钱 白芷二钱五分 黄丹（飞过）五钱 软石膏（煅，去火毒）一两 血竭二钱 乳香三钱 没药三钱 潮脑少许

【用法】上为细末，瓷罐贮。搽患处；如若肿毒顽疮收口，先用此药搽疮口，再用白膏药贴之。

【功用】止血定痛，生肌收口。

【主治】跌打损伤，牙咬刀伤出血，诸般肿毒出脓后，肌肉不生，痛不止者。

70278 秘传加减川芎茶调散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】片黄芩二两（酒拌炒，再拌再炒，如此三次，不可令焦） 小川芎一两 白芷五钱 芽茶三钱 荆芥四钱 薄荷叶二钱五分

【用法】上为细末。每服二钱，茶清或滚白汤调送下。

【主治】头风热痛不可忍者。

70279 秘传加减芩连四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】黄芩 黄连 当归 生地黄 白芍药 山梔 陈皮 白术 人参 甘草

【用法】上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎一盏，去滓温服。

【主治】大小便血。

【加减】尿血，加黄柏、知母、滑石；下血及肠风脏毒，加黄柏、子芩、槐角、阿胶、防风、荆芥。

70280 秘授儿科万病回春丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】犀黄 麝香 冰片各三钱 雄黄 白附子 天麻 全蝎 天虫 羌活 防风 辰砂各一两二钱 蛇含石三两 胆星 钩藤各八两 川贝 竺黄 甘草各四两

【用法】炼蜜为丸，金箔为衣，每蜡丸内五粒。数月小儿至一二岁每服一粒，三四岁每服三粒，十岁以五粒为度，急慢惊风，发搐癰疽，伤寒邪热，痰疹烦躁，痰喘气急，五疳痰厥，痰涎壅滞，钩藤薄荷汤送下；夜啼，吐乳腹痛，开水送下，饮乳小儿即化搽乳上，令其吮服，更便；新久疟疾，寒热往来，临夜发热，用河井水各半，煎柴胡、黄芩汤送下；赤痢，山楂、地榆汤送下；白痢，陈皮、山楂汤送下。水泻，茯苓、山楂汤送下；此丹功同造化，凡遇小儿，稍不自在，即掐碎一粒，安放脐内，再将万应如意膏盖之，轻病若失矣。治大人痰涎壅聚，每服十粒，姜汤送下。

【主治】小儿急慢惊风，发搐癰疽；伤寒邪热，痰疹烦躁，痰喘气急，五疳痰厥，痰涎壅滞；夜啼，吐乳腹痛；新久疟疾，寒热往来，临夜发热；赤痢、白痢，水泻。

70281 秘授万灵一粒九转还丹

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】真鸦片三两（冬研夏炖） 犀牛黄 真麝香各一钱二分（去毛） 百草霜九钱

【用法】上为细末，然后将白米饭二两四钱，研如糊，再下前四味，再研匀和丸，每丸重三厘，朱砂为衣，入大封筒内封固，放在翻转脚炉盖内，将包扎好草纸盖好，微微炭火烘三炷香，每炷香摇动炉盖三次，三三见九，名曰九转还丹，香完移过炉盖，待冷拆封，入瓷瓶内听用。大人每服一丸，小儿八九岁一丸作二次服，四五六七岁一丸作三次服，三岁未周一丸作四次服。

【主治】伤寒头痛发热，阴症身冷自汗，中风口眼歪斜，小儿急慢惊风，产后瘀血作痛，妇女经水不调，赤带，霍乱吐泻，痰结头痛，痢疾，蛊胀，久嗽，各种疼痛，痈疽，疔

疮。

【宜忌】孕妇忌服。

【备考】无论大人小儿，倘误多服，以浓茶饮之即解。本方方名，《中国医学大辞典》引作“万灵一粒九转还丹”。

敌

70282 敌金丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】京三棱（煨） 蓬莪术 木猪苓 白附子 萝卜子 赤芍药 黑牵牛 川楝子 山茵陈 青木香 陈橘皮 五灵脂 姜黄 茴香各一两 南木香半两 丁香一分 泽泻一两半（以上并生用） 海藻（酒浸一宿，焙干） 海浮石（米醋浸，火煨红，淬醋，又煨淬，如此七次，黑为度） 穿山甲（热灰煨焦）各一两 青皮（去白）二两（一两生用；一两截碎，以斑蝥五十个，去头足翅，同炒黄色，去斑蝥不用） 香附（杵，净）二两（一两生用；一两以巴豆五十粒，去壳，同炒色焦，去巴豆不用）

【用法】上截碎，夹和微炒，并为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下。

【主治】疝气。外肾肿胀极大，或生疮，出黄水，其痛绕腹，寒热往来。

70283 敌痰丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二引完颜府判方。

【组成】黑牵牛三两 皂角二两（去皮弦，火中微烧） 白矾（枯）一两 半夏曲（炒）一两 陈皮（去白）一两

【用法】上为细末，煮萝卜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧淡姜汤送下。

【功用】宽胸膈，快气。

【主治】痰盛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“涤痰丸”。

舐

70284 舐掌散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】海藻一两 黄柏二两

【用法】上为末。每用少许置掌中，时时舐之，津液送下。如消三分之二即止。

【功用】开结。

【主治】瘰癧。

笔

70285 笔头灰散

【方源】《普济方》卷二一四引《肘后方》。

【组成】故笔头五十枝（兔毫笔头尤佳）

【用法】烧灰为细末。每服二钱，温水调下，不拘时候。

【主治】热淋，小便赤涩热痛；中恶；脱肛。

笑

70286 笑逢散

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】山梔仁 蝉蜕各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

笋

70287 笋粉散

【方源】方出《肘后方》卷五，名见《普济方》卷二九九。

【组成】笋壳

【用法】取笋汁自澡洗，以笋壳作散，敷之。

【主治】①《肘后方》：小儿身中恶疮。②《普济方》：头上疮。

氤

70288 氤氤汤

【方源】《谦斋医学讲稿》。

【组成】豆卷 藿香 佩兰 焦梔皮 连翘 滑石 通草 郁金 菖蒲

【功用】清化透泄。

【主治】湿温气分证而见白痞。

【加减】与红疹同见，加丹皮、赤芍、紫草根。

造

70289 造草酥

【方源】《千金翼》卷十二。

【组成】杏仁一斗（去皮尖两仁者，以水一斗研，绞取汁）粗肥地黄十斤（熟捣，绞取汁一斗）麻子一斗（末之，以水一斗研，绞取汁）

【用法】上三味汁凡三斗，著曲一斤，米三斗，酿如常酒味是正熟，出以瓮盛之，即酥凝在上。每服取热酒和之，令酥消尽。

【功用】延年强身。

70290 造化争雄膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【异名】五养保真膏。

【组成】炼松香（用小竹甑一个，用粗麻布一层，用明肥松香放其上，安水锅上蒸之，俟松香溶化，淋下清淨者，初倾入冷水中，又以别水煮二三滚，又倾入水中，如此数次后，复用酒如前煮之，俟其不苦不涩为度；二次炼，不用铁锅尤妙）飞黄丹（用好酒，入水中淘去底下砂石，取淨，候干，炒之）真麻油三斤 粉甘草四两（先熬数沸，后下药）官桂（去粗皮）远志（油浸一宿，去心，焙干，为末）六钱 菟丝子（淘去沙，酒煮极烂，捣成饼，为末）六钱 川牛膝（去芦，酒浸一宿，晒干，为末）鹿茸（去毛，酥炙黄）虎骨（酥炙黄）蛇床子（拣淨，酒浸一宿，焙干）锁阳（酥炙）厚朴（去皮）淮生地（酒浸一宿，焙干）淮熟地（酒浸一宿，焙干）玄参（去芦头）天门冬（去心）麦门冬（去心）防风（去芦）茅香（拣淨）赤芍药（酒浸洗）白

赤芍（酒浸洗）当归（酒洗）白芷 北五味子 谷精草 杜仲（去皮，锉，盐酒炒去丝）芫荽 南木香 车前子 紫梢花 川续断 良姜各六钱 黄蜂 穿山甲（锉，以灶灰炒，为末）二钱 地龙（去土，炙）四钱 骨碎补二钱 蓖麻子 杏仁（去皮尖）四钱 大附子二个（重二两，面裹火煨，去皮脐）木鳖子（去壳）四十个（研，纸裹压去油）肉苁蓉（红色者，酒浸，去甲，焙）七钱 桑、槐、桃、李嫩枝各七寸（一方有红蜻蜓十只）

【用法】上药各依法制度完备，锉，入油内，用铜锅桑柴火慢煎候枯黑，取起，滤以生绢，去滓，锅亦拭淨，其药油亦须滴水成珠为度，每药油一斤，用飞过黄丹八两，徐徐加入，慢火煎熬，用桑、槐、柳枝不住手搅，勿使沉底，候青烟起，膏已成，看老嫩得中住火，入炼过松香半斤，黄蜡六两，此亦以一斤油为率，搅匀放冷，膏凝结后，连锅覆泥土三日，取起，用别锅烧滚水，顿药锅在上，隔汤泡融，以桑、槐、柳枝不住手搅三五百遍，去火毒，入后药：麝香、蟾酥、霞片（疑鴉片）、阳起石（云头者）、白占各六钱，丁香、乳香、广木香、雄黄、龙骨、沉香、晚蚕蛾、倭硫黄、赤石脂、桑螵蛸、血竭、没药各四钱，黄耆（去皮头，蜜炙；为末）三钱。上件须选真正道地者，各制度过，为极细末，起手先熬药油，以上药渐投入药面中搅极匀和，即投膏入冷水中，捏成五钱一饼。如遇用时，入热水泡软，以手掌大纹系一方，摊药在上，不用火烘。贴之。

【功用】养精神，益气血，存真固精，龟健不困，肾海常盈，返老还童。

【主治】咳嗽吐痰，色欲过度，腰膝疼痛，两腿酸辛，行步艰难，下元不固，胞冷精寒，小便频数，遗精白浊，吐血鼻衄；妇人下寒，赤白带下，子宫冷痛，久不胎孕；恶毒痈疽顽疮，一切无名疔肿。

70291 造化调经散

【方源】《温氏经验方》。

【组成】没药（另研） 琥珀（另研） 桂心 赤芍 当归各二钱 细辛一钱 麝香一钱（另研）

【用法】上为细末。每服五分，生姜汁、黄酒各少许，调匀服之。

【主治】产后败血乘虚停积五脏，循经流入四肢，留淫日深，不得还复，腐坏如水，致四肢浮肿。

透

70292 透天丸

【方源】《济阳纲目》卷一〇四。

【组成】雄黄 龙脑叶 石菖蒲各二两片脑二钱

【用法】上药为细末，入片脑同研，炼蜜为丸，如鸡头子大。绢帛包裹，系作纽子，入鼻孔即效。

【主治】鼻孔壅塞，不闻香臭，久不愈者。

70293 透天水

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】黄连 薄荷叶 槟榔 蒲黄 荆芥穗 甘草 黄柏（各为末）各五分 冰片三分 柿霜五钱（无，用白糖）

【用法】炼蜜为丸。噙化，不拘时候。

【主治】一切风热喉痹，口舌生疮，头目不清，痰涎壅盛。

70294 透气丹

《百一》卷二。为原书同卷引张承祖方“大思食丸”之异名。见该条。

70295 透水丹

《幼幼新书》卷十三。即《博济》卷四“透冰丹”。见该条。

70296 透水散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】蓬麦一两 石韦三两（去毛） 木通三分（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 川消一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 牵牛子半两（微炒） 槟榔一两 滑石半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】小便不通，肠腹急满。

70297 透耳筒

【方源】《奇效良方》卷五十八。

【组成】椒目 巴豆 菖蒲 松脂各一钱（一方无松脂）

【用法】上为末，摊令薄，卷作筒子。塞耳内，一日一易。

【主治】肾虚耳聋，耳中如风水声，或如钟鼓声。

70298 透邪煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二三钱 芍药（酒炒）一二钱 防风七八分 荆芥一钱 炙甘草七分 升麻三分

【用法】水一钟半，煎服。

【功用】疏表达邪。

【主治】①《景岳全书》：麻疹初热，未出之时；痘疹初热未出者。②《专治麻疹初编》：体质单弱，痧疹不能透达。

【加减】热甚，脉洪滑，加柴胡一钱。

70299 透肌丸

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】硃砂（研） 斑蝥（去翅足，米炒） 乌头尖各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如小豆大。捻令扁，贴在疮上，却用膏药花子盖。以透为度；如恶物出尽，次用后方生肌散合疮口。

【主治】痈疽肿，未有头，疼痛不可忍。

70300 透肌汤

【方源】《医学纲目》卷三十七引《得效》。

【组成】紫草 白芍药 升麻 秫米粉（炒）各半两

【主治】痘不透。

70301 透肌散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】山慈菇（冬用根，夏用苗，焙） 白矾（生） 地茄儿（开紫花，结子，下垂一、

三瓣，如御米相似，于春月寒食前后采，焙）白及各一两

【用法】上为细末，入飞罗面拌匀。每用少许，冷水调稀稠得所，贴患处；痈疽发背肿满，以药敷疮周围，留病处头脑，次用纸盖贴之。

【主治】痔疾，痈疽发背肿满。

70302 透肌散

【方源】《医学正传》卷八。

【组成】紫草茸 绿升麻 粉甘草各一钱

【用法】上切细，水煎服。或与消毒饮同煎服尤妙。

【主治】外实之入，皮膏厚，肉腠密，毒气难以发泄，痘疹因出不快。

70303 透肌散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】紫草二钱 木通一钱半 白芍药（酒炒） 人参 蝉退 升麻 甘草各五分

【主治】气弱，痘出不尽者。

【方论选录】人参，甘草能益气而补中；紫草、木通能透肌而起痘；升麻、蝉退能退热而消风；乃芍药者，所以调阴气而和营卫也。

70304 透肌散

《张氏医通》卷十五。为《明医杂著》卷六“入参透肌饮”之异名。见该条。

70305 透肌散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】炒牛蒡二钱半 葛根二钱 荆芥一钱二分 蝉退三十个

【用法】酒一小杯，水一大杯半，煎六分，温服。

【主治】瘾疹初出，隐隐淹在肌肉内，已出即没者。

【加减】一次，加羌汤五分；二次，加紫苏、枳壳六分；三次，加牛膝五分。

70306 透肌散

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】升麻 紫草茸 甘草 僵蚕 鼠粘（俱炒） 紫苏 薄荷各等分

【用法】每服四钱，水煎，温服。

【主治】黑痘如黑痣，皮肤发青紫纹。

70307 透冰丹

【方源】《博济》卷四。

【组成】川大黄 益智子（去皮） 茯苓 茯神（去皮木） 蔓荆子（去花叶） 威灵仙（去土） 天麻 仙灵脾（去梗） 吴白芷 山梔子（七棱，小者为上，去皮）各一两 麝香一分（另研） 细墨一分 川乌头四两（生用，去皮脐）

【用法】上并生为末，入麝香、墨拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，薄荷汁、温酒送下；如卒中，研四丸，用皂角、白矾温水送下；瘫痪风，每日服三五丸；常服一丸，茶、酒任下；小儿惊风，入腻粉少许，薄荷汁化半丸灌之；瘰癧，葱茶清送下一丸。

【功用】疏痰利膈。

【主治】一切风毒上攻，心胸不利，口舌干涩，风虚痰壅，不思饮食；及风毒下注，腰脚疼痛，脾虚体黄，肾败骨弱瘫痪等一切风疾；小儿惊风。

【宜忌】忌动风毒物。

【备考】本方方名，《幼幼新书》引作“透水丹”。

70308 透冰散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】朴消 龙粉 甘草各一钱

【用法】上为末。干掺入口内。

【主治】胸膈热，口内生疮。

70309 透关丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】乳香（研）一两 麝香（研）半两 天麻半两 没药一两（研） 地榆一两 玄参一两 乌头（生、去皮脐）一两 甜瓜子一两 麻黄（去根节）二两

【用法】上为末，以酒一升，慢火熬为膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】中急风，荣卫痹滞，头目昏运，额角偏痛，手足无力，举动战掉，言语謇涩，心神不宁。

70310 透关丸

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《聚宝方》。

【组成】续随子半两 大黄三钱（末） 长槟榔一枚 木通半钱（末） 甘遂 大戟各一钱 腻粉一钱匕

【用法】上除粉外，将诸药末与续随子同捣，用马尾罗隔去续随子皮不用，便与童子、室女小便拌匀，入粉如硬糊，日晒稍干，水、蜜为丸，如绿豆大。每服二十丸，煎灯心、竹叶汤送下。一时辰间，以小便色异为效。小儿五岁以下七丸，十岁以下十丸。

【功用】行心经。

【主治】小儿哽气。

70311 透关丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】大蒜（端午日取，去皮膜，净用）一百瓣（细切，捣烂） 朱砂一分（细研，水飞） 蝎梢三十五枚（去毒，微炒，为末） 细松烟墨一两（火煨过，研为末） 巴豆一百粒（去壳，不出油，研）

【用法】上同入瓷罐子内，密封挂通风处，百日取出，为丸如黍米大。每服二丸至五丸，新汲水送下，不拘时候。

【主治】小儿脾胃挟伤，中满哽气；及伏热生涎，霍乱呕吐；或作食痢，手足搐搦，不省人事。

70312 透关散

【方源】《普济方》卷一一二引《圣惠》。

【组成】麻黄根五两 天南星半两（炮） 威灵仙（去土）半两 草薢 当归（切，焙） 人参 天麻各一两 赤小豆（水浸，去皮，焙）半升

【用法】上为末。每服半钱匕或一钱匕，食前后、临卧温酒调下。

【主治】历节风，四肢挛急，疼痛难忍，短气汗出。

70313 透关散

【方源】《幼幼新书》卷十引《灵苑方》。

【组成】朱砂 水银（同朱砂研如铁色，无星为度） 龙脑 腻粉各一钱 牛黄少许

【用法】上为细末。分作三服，用煎薄荷汤调下，取出恶物，五七日后更一服，一月更一服；小儿每服一字，薄荷汤调下；口噤者，拗开灌下。

【主治】卒中，感厥，诸痛，小儿惊风，涎满口噤。

70314 透关散

《幼幼新书》（人卫本）卷十五引《家宝》。即原书（古籍本）“通经透关散”。见该条。

70315 透关散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】搐鼻透关散（《金匱翼》卷五）。

【组成】雄黄（研） 猪牙皂荚（蜜炙，去皮） 藜芦各一分

【用法】上为细散。每用一字，分弹入两鼻中。关透涎出，愈。

【主治】男子、妇人喉痹口噤，牙关紧。

70316 透关散

《杨氏家藏方》卷四。为《圣惠》卷五十八“大黄散”之异名。见该条。

70317 透关散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】蜈蚣头 蝎梢（去毒） 草乌头尖（如麦粒大） 川乌头底（如钱薄）各七枚 胡椒七粒 雄黄七粒（如麦粒大，别研）

【用法】上为细末。用纸捻子蘸醋点药少许，于火上炙干，塞两耳内，闭口少时。

【主治】牙疼。

70318 透关散

《活幼口议》卷二十。为原书同卷“神效通关散”之异名。见该条。

70319 透关散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白豆蔻 子丁香 沉香各四钱 青皮（醋炒） 香附（醋炒） 橘红 枳实

各五钱 青礞石(煨过)三钱

【用法】上为末。每服二钱，空心煮酒送下。

【主治】噎膈不通，痞满气结，饮食难下。

70320 透红丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】缩砂仁一百粒 杏仁一百粒(去皮尖) 巴豆五十粒(去皮膜，取霜) 坯子胭脂一钱(别研) 川芎一两(锉碎)

【用法】上为细末，次入杏仁、巴豆、胭脂研匀，汤泡雪糕糊为丸，如梧桐子大；小儿为丸如黍米大。大人每服两丸，小儿每服三丸；脾疼，石菖蒲汤送下；妇人血气刺痛，醋汤送下；翻胃膈气，丁香汤送下；水泻，倒流水送下；赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，甘草、干姜汤送下。空心、食前服用。

【主治】脾疼翻胃，膈气，水泻积痢；及妇人血气刺痛。

70321 透红丹

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】江子(去壳油) 杏仁四十九粒 黄丹一两 信一钱半 黄蜡一两

【用法】上为末，黄蜡溶为丸，如梧桐子大。每服五丸，红者，甘草汤送下；白者，干姜汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下；五色痢，楮叶、艾叶、丁香煎汤送下。

【主治】赤白痢疾，诸般泄泻。

70322 透顶香

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】片脑一钱 麝香五分 硼砂三钱 薄荷二钱

【用法】上为极细末，熬甘草膏为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每用一丸，噙化。

【主治】口臭。

70323 透顶散

【方源】《本事》卷一。

【组成】胆矾一两(细研)

【用法】前胡饼剂子一个，按平，一指厚，以篦子勒成骰子大块，勿界断，于瓦上焙干。每服一骰子，为末，灯心、竹茹汤调下。

【主治】女人头运，天地转动，名曰心眩。

70324 透顶散

【方源】《续本事》卷二。

【组成】细辛(长白者)三茎 瓜蒂七个 丁香三粒 糯米七粒 脑子一豆大 麝香一黑豆大

【用法】先将脑、麝为极细末，却将前四味为末，入乳钵内荡起脑、麝令匀，用瓦罐子盛之，坚闭罐口。患人随左右搐之一大豆许。良久，出冷涎一升许，即安。

【主治】偏正头风，夹脑风，并一切头风，不问年深日近。

70325 透顶散

《杨氏家藏方》卷二。为《圣济总录》卷十六“至灵散”之异名。见该条。

70326 透顶散

【方源】《冯氏锦囊秘录·杂症》卷三。

【组成】川芎末 薄荷末 朴消各等分

【用法】上为末，研匀。每用少许，吹鼻中。

【主治】小儿脑热，脑枕骨痛，闭目不开，或太阳穴寒痛，攒眉啼哭，两目赤肿。

70327 透顶散

《医级》卷八。为原书同卷“通顶散”之异名。见该条。

70328 透明丸

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】苦参四两 黄柏二两(去粗皮) 寒水石二两 芎须一两(洗) 升麻一两 山梔仁一两

【用法】上为末，面糊为丸，青黛为衣。食后麦门冬汤送下。

【主治】外障热肿，脏腑实热不通。

70329 透罗丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】水银(用炼净者，黑锡一分结为沙子) 粉霜 干蝎(全者，炒)各一分 天南星半分(生用) 膩粉一钱 龙脑 麝香各半钱

【用法】上先杵天南星、干蝎细罗了，同前

五味入乳钵细研，石脑油为丸，如梧桐子大。每服三丸，温薄荷水化下，大段即加二丸；小儿十岁以上，两丸或一丸，临时相度虚实与吃。

【主治】卒中风，忽然仆倒闷乱，言语謇涩，痰涎壅塞；小儿风病，身热痙痲，强直反张。

70330 透罗丹

【方源】《普济方》卷二五六引《博济》。

【组成】粉霜二钱半（别研） 铅白霜一钱（别研） 轻粉二钱（留一半以下为衣） 生龙脑一钱 金箔十片 水银两用半钱 伏谷信砒半钱（别研，每煨砒一两，用消石二钱半，滚研入盒内，固济候干，用灰盖熟火三斤，拨飞火去皮二分，住火放冷，然后取出）

【用法】除水银外，上为末，枣肉为丸，如鸡头子大，以箸割眼子，入水银在内，却和丸，用留下粉中滚为衣。枣肉不得肥，水银不研细，恐难丸。结胸伤寒，四肢逆冷，心腹结硬，热燥闷乱，时气伤寒，得汗后发狂，狂言乱道，不认亲疏，每服二丸甘草汤送下；产后血气上攻，及上喘不止，心腹胀满，因伤寒时疾，汗后余热不退，发狂妄走不止，每服二丸，用甘草汤送下；潮热伤寒，夜发昼止，有似疟疾，每服二丸，温浆米水送下；风痙邪气，及心风，妇人血气邪冷，每服二丸，甘草汤送下；产前要疏动不损胎气，去却水银，每服二丸，温浆水送下，如不行再服；久患脏毒泻血，及赤白痢，昼夜五七十行，每服一丸，温浆水送下，一日两次。

【功用】下虚积。

【主治】结胸伤寒，四肢逆冷，心腹结硬，热燥闷乱；时气伤寒，得汗后发狂，狂言乱道，不认亲疏；产后血气上攻，上喘不止，心腹胀满，因伤寒时疾，汗后余热不退，发狂妄走不止；潮热伤寒，夜发昼止，有似疟疾；风痙邪气；心风；妇人血气邪冷；久患脏毒泻血，及赤白痢。

70331 透罗丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十二引王子礼方。

【组成】皂角（酥炙，去皮弦） 黑牵牛（炒） 半夏 大黄（湿纸包，煨，焙） 杏仁（去皮尖，麸炒） 各一两 巴豆一钱（去油，另研）

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以姜汤送下。咳嗽甚者，三四服必效。

【功用】下痰。

【主治】痰实咳嗽，胸肺不利。

70332 透空丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】香附子 藁本 藿香叶 地龙（去土） 川芎 白僵蚕（炒） 干姜（炮） 甘草（炙） 干蝎 天麻（去苗） 天南星（生姜制） 各一两 白芷七分 神曲（碎炒） 茴香（炒） 麦蘖（净，炒） 各二两半 胡椒一两 川乌头（炮制） 一两二分

【用法】上为细末，每药末三两，白面六两，水为丸，如小弹子大。每服一丸，细嚼，食前茶、酒任下。

【主治】男子、妇人一切诸风顽麻疼痛，上攻头目，下注腰脚，手背颤动。

70333 透经丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】天麻（酒浸一宿，焙干） 白附子（炮） 牛膝（酒浸一宿） 木鳖子（去壳，别研） 当归（酒浸一宿，焙干） 羌活（去芦头） 各半两 地龙（去土） 一分（微炒） 乳香二钱（别研） 朱砂一钱（别研） 没药二钱（别研）

【用法】上为细末，次入木鳖子、乳香、朱砂、没药研匀，炼蜜为丸，每一两作四十丸。每服一丸，煎薄荷汤化开，入温酒少许，乳食空同调下。

【功用】透经络，活血脉。

【主治】小儿筋脉拘挛，不得舒畅，手足软弱，虚羸无力，惊搐之后，偏废不举，及行步迟晚者。

70334 透经丸

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】大黄二两 黑牵牛二两五钱(半生半熟)

【用法】上为细末,用皂角十枚揉碎,水煮至熟,去滓用汁为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐次虚实,加至四十丸,用温水送下。

【主治】热毒疮痍。

70335 透经汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】五积散半两加生附子二钱

【用法】水二盏,加生姜七片,大枣二枚,煎至八分,去滓,入麝少许,再煎三四沸,通口服,不拘时候。

【主治】妇人身体疼痛。

70336 透经散

【方源】《百一》卷十五。

【组成】川楝子二两(锉,炒,入巴豆二十粒,吴茱萸一两,同炒焦赤色,去巴豆、茱萸)茴香(微炒) 沉香 胡椒 全蝎(微炒)各半两 缩砂二两(连皮炒燥,去皮用) 木香一两(不见火) 玄胡索二两(新瓦上炒)

【用法】上为细末。每服二钱,食前酒调服。

【主治】下部诸疾。

70337 透毒散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】乌犀角 净芦根 金银花各一两 滑石粉三钱 甘草粉五钱 赤芍药 前胡 牛蒡子各五钱

【用法】上为极细末。小儿一岁以上每服一分,二岁以上每服二分,三岁以上随症酌加,开水送下。

【功用】清热解毒,透疹。

【主治】小儿痧疹初起,寒热往来,咳嗽呕恶,鼻塞流涕,目涩多泪,咽喉肿痛,呼吸气促,壮热口渴,神昏妄言,头痛肢搐,见点即回,或疹含不透,朝出夕退,退后复发,出没无定,痛痒难堪。

【宜忌】忌腥辣及燥性食物。

70338 透骨丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】附子一枚(重七钱者,面裹炮裂,去皮脐) 麒麟竭 白僵蚕(炮) 地龙(白项者,炒) 干蝎(全者)各三十枚(炒) 草乌头(去皮)二两半 五灵脂 骨碎补(干者,去毛) 麻黄(去根节)各一两(以上九味同为末) 龙脑半钱 麝香半钱 丹砂 水银 消石 甜消 朴硝各一分 马牙消 乳香 没药各一分(以上十味同研细)

【用法】上拌和令匀,又用飞罗面二两,无灰酒二两,煮糊为丸,每一丸重一钱三字,以布袋盛,挂当风处,年深不妨。若脚手麻软,每服半丸,滴酒研烂,用生姜汁一茶脚,麝香少许,好酒一盏相和温过,早、晚各一眼。五日见效。若卒中暗风,取两丸研入生姜汁半盏,麝香半字,好酒四盏,分温四服。初服如一食久,下第二服;渐见手开,即下第三服;见通身汗出,即下第四服。若口开不能合,不可治。

【用法】风脚软,不能行步。

【备考】方中麒麟竭用量原缺。

70339 透骨丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】乳香(别研) 没药(别研) 川乌头(生,去皮脐) 破故纸(瓦上炒香) 晚蚕沙 川芎 荆芥穗 海桐皮 自然铜(火煅,醋淬)各一两 草乌头(生,去皮脐)二两 赤小豆一两半

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,食后煎苏木、当归酒送下。

【主治】折扑伤损,闪肭筋骨,手足无力,四肢沉重。

70340 透骨丸

【方源】《普济方》卷一五四。

【组成】针砂一两 礞砂半两

【用法】上先将硃砂为细末，次后共针砂相和一处。用冷水拌匀，候少痛时，用好夹绵纸重包前药，如热透，于痛冷处熨之，用罢就摊药干。

【主治】男女腰痛脚冷，妇人胎冷，小肠疼痛不止。

70341 透骨丸

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】苍术五钱 川乌 草乌 远志各四钱 川椒 当归 人参各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。早、中、晚各服五六十丸，以好酒送下。

【主治】浑身疼痛透骨。

70342 透骨丹

【方源】《普济方》卷一一六引《卫生家宝》。

【组成】草乌一两（用盐一两和炒焦） 甘草半两 黑牵牛一两（炒焦）

【用法】上为末，入麝香一钱和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】诸风疼痛。

70343 透骨丹

【方源】《普济方》卷二四〇引《医方集成》。

【组成】川乌一两（煨） 羌活二两 白茯苓二两 乳香（别研）一两 槟榔 木香各一两半 川芎 木瓜 沉香各一两（一方无川芎）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食前姜汤送下。

【主治】脚气。

70344 透骨丹

【方源】《丹溪心法附余》卷四。

【组成】天麻 全蝎各四两 地黄 木瓜各二两 没药 乳香 穿山甲各一钱 川芎

【主治】风湿腰腿节骨疼痛。

【备考】方中川芎用量原缺。

70345 透骨丹

【方源】《准绳·类方》卷四引《集验方》。

【组成】地骨皮 甜瓜子（炒） 芸苔子（葱

捣为饼）各三两 乳香（另研） 没药（另研） 草乌头各一两（锉，炒） 苍术 牛膝（酒浸） 赤芍药 当归（去芦） 川乌头（炮，去皮脐） 自然铜（醋煅） 五灵脂各二两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至十五丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】男妇一切走注疼痛不可忍。

【备考】先用甜瓜子一两炒香，研烂，酒煎数沸，量虚实调黑牵牛末五钱服之，以利为度，然后服此方。

70346 透骨丹

【方源】《纲目拾遗》卷三引《药鉴》。

【组成】闹羊花子一两（火酒浸、炒三次，童便浸二次，焙干） 乳香 没药（不去油） 血竭各三钱

【用法】上为末，再加麝香一分同研，瓷瓶收贮封固。每服三分，壮者五六分，不必吃夜饭，酒可尽量下，有微汗出为要；弱者，间五日一服；壮者，间三日一服。

【主治】跌扑损伤，深入骨髓，或隐隐疼痛，或天阴则痛，或年远四肢无力。

【宜忌】睡好方服；服后避风；忌房事、酸寒、茶、醋。

70347 透骨丹

《景岳全书》卷六十四。为《普济方》卷二七三“透骨散”之异名。见该条。

70348 透骨丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】青盐 大黄 轻粉 儿茶 胆矾 铜绿 雄黄 枯矾 皂矾各五分 杏仁七个 麝香一分 冰片五厘

【用法】上为细末。先以酴皮汤煎汤洗，俟皮肉和软，用苏合油调匀，擦患处，以炭火烘之，以透为度。五七次愈。

【主治】鹅掌风，多年顽癣。

70349 透骨丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】胡椒（炒黄）（一方有胆矾煅红，

分量为胡椒的二分之一)

【用法】上为末。小膏药贴之。胃寒腹痛，研贴中脘。

【主治】发背溃脓，及胃寒腹痛。

70350 透骨汤

【方源】《经目屡验良方》。

【组成】五加皮 自然铜 青皮 紫荆皮 杜仲 红花 川山甲 白蒺藜 归尾 乳香 没药各一钱 活土鳖三个（捣碎，冲）

【用法】水煎服。

【主治】跌打损伤，满身青紫，危重者。

【加减】外加透骨草，更神；伤骨，加寻骨风；心慌，加朱砂。

70351 透骨散

【方源】《普济方》卷二七三。

【异名】透骨丹（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】蟾酥半钱 八角儿五个（去壳） 硃砂 轻粉 麝香少许 巴豆一钱（去皮）

【用法】先将巴豆研如泥，次下余药，同为极细末。以油纸裹定，如有疮并诸般恶疮，用针微拨破，贴药少许，其疮自消散；如不散者，亦迫疮毒，即得溃塌；如成脓无头痈疽肿，微拨破，用药二次，便得自破。

【主治】一切疗肿恶疮。

70352 透骨散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】当归 细辛 川芎 陈皮 甘草 各一钱 猪胰子三块 红枣十枚

【用法】上用好酒一碗，煎六分，食后服；滓用酒再煎服。

【主治】久嗽或癆不止。

70353 透骨散

【方源】《疡科捷径》卷下。

【组成】透骨草 生芝麻 羌活 独活 紫葡萄 冰糖 六安茶 槐花米 黑豆 核桃肉 生姜 大枣

【主治】梅毒疮，彻疼筋骨。

70354 透骨膏

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】生熟地黄 马鞭草各半斤 吴茱萸 白面各三两 骨碎补 败姜屑各四两（即干生姜） 鳖甲三斤（炙） 蒲黄二两

【用法】上为细末，用米醋调作膏子。于火上温热，于避风处涂于痛处，用纸裹着，候药冷再用热涂，如此七次。

【主治】一切风湿走注疼痛。

70355 透骨膏

【方源】《本草纲目》卷四十一。

【组成】八角儿（杨柳上者。阴干，去壳）四个（如冬月无此，用其窠代之） 蟾酥半钱 巴豆仁一个 粉霜 雄黄 麝香各少许

【用法】先以八角儿研如泥，入熔化黄蜡少许，同众药末熬成膏于，密收。每以针刺疮头破出血，用榆条送膏子麦粒大入疮中，以雀粪二个放疮口。疮回即止，不必再用也。如针破无血，系是着骨疗，即将男左女右中指甲末刺出血糊药；又无血，即刺足大拇血糊药。如都无血，必难医也。

【主治】疗肿恶毒。

【宜忌】忌冷水。

70356 透香丸

【方源】方出《圣惠》卷四十，名见《普济方》卷一五六。

【组成】麝香一分（细研） 沉香一分 白檀香一分 龙脑一分（细研） 煎香半两 鸡舌香半两 丁香半两 黄熟香半两 鸡骨香半两 甘松香半两 川升麻三分 郁金香三分

【用法】上为末，入麝香、龙脑和拌令匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服三丸，空心以盐汤嚼下；留一半散不和，每日揩齿了，以散子重揩咽津，不过半日，香汗通透也。

【功用】令人通身俱香。

70357 透泉散

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】滑石末一两 甜消（研） 甘草末各半两 琥珀（研）一分

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心、食

前煎灯心汤调下。

【功用】通利小肠。

【主治】小便赤涩。

70358 透泉散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】猪悬蹄甲 穿山甲 漏芦各半两

【用法】上将猪悬蹄甲、穿山甲炒焦色，同漏芦一处为末。每服二钱，食后以温酒调下。

【功用】下奶。

70359 透涎丹

【方源】《小儿诸热辨》。

【组成】橘红 半夏 防风 僵蚕 天麻 胆星 石菖蒲各等分

【用法】上为末，或少加牛黄、辰砂、竹沥，姜汁为丸。以淡姜汤送服。

【主治】百日乳儿初受惊风，痰涎入于心胞。

70360 透格散

《朱氏集验方》卷七。为《医学纲目》卷十四引《灵苑》“透膈散”之异名。见该条。

70361 透脓汤

《名家方选》。为《外科正宗》卷一“透脓散”之异名。见该条。

70362 透脓汤

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】山甲三钱（炒） 皂刺三钱 当归三钱 生黄耆四钱 川芎二钱 陈皮一钱半 乳香一钱半（制） 浙贝母一钱半 白芷三钱 甘草一钱半

【用法】葱白三寸为引，水煎服。

【主治】疮成脓而未破。

70363 透脓散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【异名】替针散（《普济方》卷二七二）、替针透脓散（《疮疡经验全书》卷四）、代针散（《外科启玄》卷十一）、射脓散（《外科启玄》卷十一）、代针透脓散（《青囊秘传》）。

【组成】蛾口茧（用出了蛾儿茧）一个

【用法】烧灰。用酒调服即透。

【主治】诸痈疮及贴骨痈不破者。

【宜忌】切不可多，若服一个，只一个疮口；若服两个三个，即两个三个疮口，切勿轻忽。

70364 透脓散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】透脓汤（《名家方选》）。

【组成】黄耆四钱 山甲（炒，末）一钱 川芎三钱 当归二钱 皂角针一钱五分

【用法】水二钟，煎一半，随病前后服，临服入酒一杯亦好。

【主治】痈疽诸毒，内脓已成不穿破者。

70365 透脓散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】黄耆四钱 皂刺 白芷 川芎 牛蒡子 穿山甲（炒，研）各一钱 金银花 当归各五分

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】痈毒内已成脓，不穿破者。

【方论选录】《成方便读》：方中黄耆大补元气，芎、归润养阴血，而以白芷、牛蒡宣之于皮毛肌肉之间，使之补而不滞；甲片、角刺为精锐之品，能直达病所，以成速溃之功；金银花以化其余毒；酒则行其药势耳。

70366 透窍丹

【方源】《春脚集》卷二。

【组成】龙骨 真麝香 冰片

【用法】上为极细末，用雄鼠胆汁一枚，合作三丸。用绵裹塞耳内，不可取出，一夜即能通音。

【主治】聋。

70367 透葱散

【方源】《医方类聚》卷七十八引《澹寮》。

【组成】全蝎一枚（去嘴毒，用生薄荷叶裹，火上炙，为细末）（一方有地龙，如此制用）

【用法】上以药末入在畦间葱叶内，及以线缚其上葱叶口，候一宿，摘葱叶归，擘破，溜其汁，入所聋耳中。

【主治】耳聋。

70368 透脾膏

【方源】《普济方》卷一七〇。

【组成】甘遂 红花 硼砂 木鳖 皂荚 (火炮) 穿山甲 (火炮) 杏仁 商陆各等分 葱白七根

【用法】上药不用炉火,不煎熬,并沙蜜一处捣成膏。贴在脾上连磨转。

【主治】脾痞块积。

70369 透睛膏

【方源】《永乐大典》卷一一四·二引《经验普济加减方》。

【组成】南硼砂 川朴消各三钱 轻粉一钱半 青盐一钱 硃砂半钱 龙脑一字 麝香一字

【用法】上为细末,入生姜汁或白沙蜜和膏。每点少许。不过三点自明矣。

【功用】消瘀肉,解肿痒,收冷泪。

【主治】眼内翳膜昏赤,睛痛隐涩。

70370 透膜丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】消石 礞石各一分 (二味同研令匀,细筛作汁,用皂子三枚旋旋入,烟绝为度,放冷研,每料用末三钱) 硃砂 乳香粉霜 硫黄 膩粉 白丁香 密陀僧 京三棱末各一钱 巴豆二十一粒 (去皮心膜,醋煮紫色,研)

【用法】上为末,枣肉为丸,如绿豆大。每服七丸至十丸,煎生姜橘皮汤送下;小儿皂子汤送下。

【主治】积聚。

70371 透膈丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】高良姜 (炒) 天南星 (汤泡七次) 缩砂仁 陈皮 (去白) 拣丁香 (不见火) 青木香 肉桂 (去粗皮,不见火) 各等分

【用法】上为细末,生姜自然汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸至七十丸,食前生姜汤送下。

【主治】五饮。

70372 透膈汤

【方源】《袖珍》卷二。

【组成】木香 白豆蔻 缩砂仁 槟榔 枳壳 厚朴 半夏 青皮 陈皮 甘草 大黄 朴消各等分

【用法】每服一两,水二盏,加生姜三片,枣子一枚,煎至一盏,去滓,通口食后服。

【主治】脾胃不和,中脘气滞,胸膈满闷,噎塞不通,噎气吞酸,胁肋刺胀,呕逆痰涎,饮食不下。

70373 透膈散

【方源】《医学纲目》卷十四引《灵苑》。

【异名】透格散 (《朱氏集验方》卷七)、消石散 (《普济方》卷二一四)。

【组成】消石一两 (不夹泥土,雪白者)

【用法】上为末。每服二钱,诸淋各依汤为使。如劳倦虚损,小便不出,小腹急痛,葵子煎汤调下,通后更须服补虚丸散;血淋,小便不出,时下血疼痛,并用冷水调下;气淋,小腹满急,尿后常有余沥,木通煎汤调下;石淋,茎内痛,尿不能出,内引小腹,膨胀急痛,尿下砂石,令人闷绝,将药末先入铤子内,隔纸炒至纸焦为度,再研令细,用温水调下;小便不通,小麦汤调下;卒患诸淋,并以冷水调下。并空心,先调,使药消散如水,即服之,更以汤使送下。

【主治】五种淋疾,气淋、热淋、劳淋、石淋,及小便不通至甚者。

70374 透膈散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】橘红一钱 茯苓八分 半夏八分 桔梗八分 黄芩四分 木香四分 甘草 (炙)三分 瓜蒌仁七分 杏仁六分 砂仁七枚 枳实五分 生姜五分

【用法】上咬咀。水煎熟服,不拘时候。

【主治】被物噎塞,致喉间如碍,水饮难下,痰涎壅上。

70375 透漏丹

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】象牙末五钱 黄蜂窝一个 僵蚕（炒，去丝） 虫退（去头足，洗） 广木香 乳香 没药 血竭各三钱

【用法】上为末，次用黄蜡八两，铜铤熔化，熬白色，离火，入前药末，搅匀，成汁，倾入水中，取起为丸，此一料药分作百丸。临睡时服一丸，早晨空心一丸，俱白汤送下。

【主治】漏。

70376 透风气散

【方源】《普济方》卷一〇三引《护命》。

【组成】细辛 藿香 干蝎 羌活 白花蛇（酒浸一昼夜，非时用酒慢火上炙黄熟，去骨不用，只用肉） 独活 附子（炮，去皮） 天麻 牛膝 海桐皮 官桂（去皮） 豆蔻各一分 半夏四铢 麝香一铢 麻黄（去节）半两 僵蚕三铢（去丝）

【用法】上为细末，入麝香同研令匀。每服四钱，空心浓煎姜汤调下，盖衣被，汗出为妙；若无汗，只闻得病处如虫行亦佳；若常服，每服一钱，薄姜汤调下，候风气已退，觉上焦有热，即宜吃调顺正气方。

【主治】寒风所中，闷倒不知人事；中风时，涎少或无涎。

【备考】寒风所中，闷倒不知人事，先吃分涎散取涎了，却非时进此方。中风时涎少或无涎，只进此方亦得。

70377 透肉锭子

《玉机微义》卷十五。为原书同卷“提丁锭子”之异名。见该条。

70378 透体香丸

【方源】《便览》卷四。

【组成】丁香一两半 藿香 零零香 甘松各二两 白芷 香附 当归 桂心 槟榔 益智各一两 麝香五钱 白豆蔻二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，噙化。二十日后异香。

【主治】通身炽热、恶气及口齿气。

70379 透天一块冰

【方源】《医统》卷六十五引《医林方》。

【组成】黄连一钱 冰片 硼砂 薄荷叶 槟榔 蒲黄 甘草各四钱 荆芥穗 黄柏各五分 白沙糖半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，噙化。

【主治】一切风热喉痹，口舌生疮，头目不清，痰涎壅盛。

70380 透红匀气散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 细辛 白芷 没药 泽兰 甘草 茴香 天仙藤 厚朴 乳香 肉桂 黑牵牛 生地黄 羌活各一两

【用法】上为末。每服三钱，热酒调下。

【主治】患眼不痒不赤而痛者。

70381 透体气口丸

《寿世保元》卷五。为《鲁府禁方》卷四“透体异香丸”之异名。见该条。

70382 透体异香丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【异名】透体气口丸（《寿世保元》卷五）。

【组成】沉香 木香 丁香 藿香 没药 陵零香 甘松 缩砂 丁皮 官桂 白芷 细茶 香附 儿茶 白蔻 槟榔 人参各一两 乳香 檀香 三奈 细辛 益智 当归 川芎 乌药各五钱 麝香 朝脑各二钱 薄荷一两

【用法】先将大粉草半片锉片，水煮汁，去滓，将汁熬成膏，将前药为末，炼蜜共膏，为丸，如芡实大。每服一丸，清晨噙化，用黄酒送下。

【功效】壮阳滋肾，补益丹田。

【主治】五膈、五噎痞塞，诸虚百损，五劳七伤，体气，口气。

【宜忌】忌生冷，毒物。

70383 透顶神功散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】茄鹿茸（蜜炙）一钱 川贝母四钱 知母四钱 白芷四钱 穿山甲（炒成珠）一钱 姜蚕三钱（炒，去嘴） 麝香（研末，并

下二味,临吃入药) 乳香(去油)一钱 没药(去油)一钱

【用法】先用锦纹川大黄五钱,同前六味煎熟,再加五钱,滚三滚,共用酒二大碗,煎一碗,去滓,露一宿后,入乳香、没药、麝香三味搅匀,温服。行二三次即愈。

【主治】①《奇方类编》:初起杨梅疮。②《疡医大全》:鱼口疮,恶疮。

70384 透顶清神散

【方源】《敖氏伤寒金镜录》。

【组成】猪牙皂角 细辛 白芷 当归各等分

【用法】上为细末。令病人先嚙水一口,以药少许,吹鼻内,吐出水,取嚏为度;如未嚏,仍用此药吹人。

【功用】开窍苏神。

【主治】伤寒热蓄于内,舌见红色,不问何经;瘟疫之家,不拘已未患者;神识昏愦,人事不知。

【方论选录】此方取细辛、皂角,善能刺激神经以开窍;配以白芷之芳香上达,当归之通脉舒筋,仿通关散之意以吹鼻取嚏。

70385 透顶清凉散

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】白芷 细辛 当归 明雄 牙皂各等分

【用法】上为细末,瓷瓶贮勿泄气。用时令病者嚙水口内,将药搐鼻,吐水取嚏;不嚏,再吹。或嗅鼻。

【功用】预防瘟疫。

70386 透明雄黄散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】透明雄黄一钱 透明滴乳一钱 去节麻黄半两 紧细香白芷一字

【用法】上药各为细末。用纸紧卷作捻儿,约三寸长,捻一头尖,用津液蘸药在纸尖头上,入耳内。即愈。

【主治】牙疼。

70387 透经解挛汤

【方源】《痲疡机要》卷下。

【组成】川山甲三钱(炮) 荆芥 红花 苏木 羌活 当归 防风 蝉壳(去土) 天麻 甘草各七分 白芷一钱 连翘 川芎各五分

【用法】水、酒各半煎服。

【主治】痲风,风热筋挛骨痛。

70388 透骨搜风丹

《全国中药成药处方集》(天津方)。为《北京市中药成方选集》“透骨镇风丹”之异名。见该条。

70389 透骨搜风散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】透骨草(白花者,阴干更佳) 羌活 独活 牛膝 紫葡萄 胡桃肉 生芝麻 六安茶 小黑豆 白糖各一钱五分 红枣三枚 天茄二分 (一方有槐子一钱 生姜一钱)

【用法】水三钟,煎一钟,露一宿,空心热服,出汗。

【功用】散肌肤之邪。

【主治】因野合传染便毒、杨梅疮,筋骨疼痛。

【宜忌】避风。

70390 透骨解毒汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫草 甘草 当归 防风 陈皮 赤芍各等分

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疹,寒战咬牙。

70391 透骨镇风丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】透骨搜风丹(《全国中药成药处方集》天津方)。

【组成】菟丝子十五两 续断十五两 杜仲(炒)十五两 甘松十五两 杏仁(去皮,炒)十五两 木通十五两 五加皮十五两 丹皮十五两 虎骨(炙)十五两 没药(炙)十五两 当归十五两 川芎十五两 橘皮十五两 厚朴(炙)十五两 枳壳(炒)十

五两 白芷十五两 荆芥十五两 羌活十五两 法半夏十五两 南星(炙)十五两 天麻十五两 干姜十五两 藿香十五两 桔梗十五两 连翘十五两 巴戟(炙)十五两 芦巴(炒)十五两 青皮(炒)十五两 益智仁十五两 大茴香七两五钱 滑石十五两 草乌(炙)七两五钱 清风藤十五两 白豆蔻七两五钱 米壳十五两 远志(炙)十五两 白芍十五两 柏子仁十五两 乌药十五两 莪术(炙)十五两 麻黄十五两 石南藤十五两 独活十五两 黄耆十五两 僵蚕(炒)十五两 龟版(炙)十五两 赤芍十五两 防风十五两 香附(炒)十五两 地骨皮十五两 吴茱萸(炙)十五两 海桐皮十五两 牛膝十五两 苍术十五两 全蝎十五两 熟地十五两 肉苁蓉(炙)十五两 枳实(炒)十五两 砂仁十五两 木瓜十五两 红豆蔻十五两 肉桂(去粗皮)十五两 茯苓十五两 川楝子七两五钱 川乌(炙)七两五钱 韭菜子七两五钱 丁香七两五钱 五味子(炙)七两五钱 补骨脂(炒)七两五钱 木贼草七两五钱 山奈七两五钱 细辛七两五钱 小茴香(炒)七两五钱 青盐七两五钱 白附子(炙)七两五钱 木香七两五钱 肉果(煨)七两五钱 鹿茸(去毛)七两五钱 乳香(炙)七两五钱 良姜七两五钱 草果仁七两五钱 甘草七两五钱 三棱(炒)七两五钱 龙骨(煨)七两五钱 自然铜(煨)七两五钱 血竭七两五钱 白术(炒)七两五钱 人参(去芦)七两五钱

【用法】每细粉七十三两，兑麝香二钱五分，朱砂粉五钱，为细末，炼蜜为丸，重三钱五分，蜡皮封固。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】镇风止痛，强筋壮骨。

【主治】①《北京市中药成方选集》：风湿痿痹，四肢麻木，腰痠腿软，跌打损伤，虚寒腹胀。②《全国中药成药处方集》(大同方)：筋骨麻木，转筋抽搐。

70392 透骨镇风丹

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】人参 羌活 没药 凤仙草 五加皮 乌药 丹皮 首乌 生地 麻黄 白芍 紫荆皮 黄芩 独活 青皮 防风 川军 赤芍 玄参 灵仙 申姜 茯苓 香附 朱砂各一两 草乌 川乌 木香 沉香 红花 牛膝 甘草 小茴香 蔻仁 川连 白芷 全蝎各五钱 细辛二钱 木瓜 天麻 僵蚕 当归各一两五分 丁香二钱 官桂三钱 秦艽八钱 鲜皮一两 炙虎胫一双

【用法】上为细末，炼蜜为丸。

【主治】风痰，筋骨麻木，转筋抽搐。

70393 透骨镇风丹

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】人参五钱 凤仙花 当归 白芍各三钱 丹皮 紫荆皮各二钱 五加皮三钱 川芎 羌活各二钱 乌药三钱 首乌五钱 乳香 没药 黄芩各三钱 熟军 青皮各二钱 香附五钱 防风三钱 独活二钱 朱砂三钱 赤芍二钱 申姜 白术各三钱 茯苓五钱 玄参三钱 鲜皮 草蔻 白蔻 全蝎 红花 甘草节各二钱 茴香三钱 牛膝 大黄 细辛各二钱 木瓜五钱 僵蚕三钱 秦艽二钱 天麻 白芷各三钱 生地五钱 麻黄三钱 虎胫骨 沉香 丁香 官桂各二钱 祁蛇 菊花各三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱，朱砂为衣。

【主治】风痰，筋骨麻木，转筋抽搐。

70394 透疹四紫汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】紫浮萍 1.5 克 紫花地丁 6 克 紫草 6 克 紫菀 3 克 桑叶 4.5 克 苇根 6 克 蝉蜕 3 克 连翘 4.5 克 淡豆豉 4.5 克 山梔衣 4.5 克 (以上为三岁儿童用量)

【功用】透疹解毒。

【主治】麻疹出疹期，麻疹开始透标或尚未

出齐时,发热,躁烦,咳嗽。

70395 透斑和中汤

【方源】《麻疹全书》卷三。

【组成】葛根 猪苓 泽泻 茯苓 川芎 升麻各七分 前胡 桔梗各一钱 柴胡五分 陈皮 半夏各七分 甘草三分

【用法】生姜三片为引,水煎,分作数次服。

【主治】疹疮二三日,泄泻。

70396 透斑解毒汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】连翘 薄荷 炒牛蒡各二钱 蝉衣一钱 淡豆豉二钱 鲜葱白二枚(切) 大青叶 鲜桑叶脑头各四钱

【用法】先用野菇根二两,鲜西河柳三钱,煎汤代水,煎汤服。

【功用】窜经透络提斑。

【主治】时毒疫症,斑痧尚未尽透。

70397 透膈宽肠散

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】白牵牛一两 芒消三两 川大黄二两 甘遂半两

【用法】上为细末。每服一钱,食后温蜜水调下,疏动止。

【主治】肠间壅实,膈热难行者。

70398 透骨金丝万应膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】牛膝一两(研) 木鳖子一两(研) 当归半两(锉) 金刚骨九钱(切) 自然铜半两 蓖麻子二两(切破) 川乌头二枚(切破) 紫花地丁半两(切) 白龙骨半两

【用法】为细末,用小油一斤浸一宿,慢火煎,后入桃枝、槐枝同熬药焦,绵滤去滓,入黄丹六两,熬二沸,次入白胶半两,乳香一钱(研),白丁香一钱,雄黄一钱,没药一钱,密陀僧一钱,上为细末,同熬匀,再用绵滤过,看硬软取之收贮。随疮大小,纸上摊贴。

【主治】疮肿。

70399 透骨通气骗马丹

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】附子一个 广木香一钱 川乌五钱 虎骨五钱 草乌五钱 细辛五钱 乳香五钱 当归一两 没药五钱 川山甲五钱 两头尖五钱 赤芍药一两 五灵脂五钱

【用法】上为细末,酒糊为丸,如豌豆大。每服三五丸,加至十五丸,空心温酒一盏送下。

【主治】风湿痹。

70400 透膈清凉羊肝散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】白术 苍术 莪术 水红花子 头发(烧灰)各等分

【用法】上为细末。用羊肝一具,以竹刀割去筋膜,切片,勿断,将药末掺匀在内,合定,饭锅上蒸熟,与儿食之。

【主治】小儿痞疾。

乘

70401 乘山丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】大嘴鸟(去嘴爪黑霜) 苦参 藜芦 木香 马钱 杨梅皮 黄柏(霜)各等分

【用法】上为细末,面糊为丸,如麻子大。听用。

【主治】五疳。

借

70402 借气散

《圣济总录》卷七十六。为《博济》卷三“神圣香姜散”之异名。见该条。

70403 借性丸

《观聚方要补》卷五引《示儿仙方》。为方出《证类本草》卷十四引《经验方》,名见《医学纲目》卷十四“金楝散”为丸剂。见该条。

倚

70404 倚金丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】丹砂三两 水银三两 黄丹一斤

【用法】上药同研令水银星尽，入瓷瓶中，盖口，如法固济，初以文火养，候热彻，即加火十斤已来，断令通赤，半日久药成，候冷开取，面上白色，内如紫金色，光明甚好，便为细末，以纸铺地，摊药在上，以盆盖之，出火毒一日后，粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以温水送下。

【功用】解百毒，安心神。

【主治】风邪癩痢，鬼疰心痛，恶疮，丹石发动，消渴阴黄，惊悸，头面风，赤白带下。

【宜忌】忌羊血。

倒

70405 倒行油

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】汞一两 水蛭七枚（为末）

【用法】取银三两，作小盒子，盛汞一两，以干水蛭七枚为末，同入盒内，用蚯蚓泥固济，约半指厚，深埋在马粪中四十九日，取出，已化为黑油。用鱼胞裹指头点药捻之。

【主治】须发黄白。

70406 倒阳方

《解围元藪》卷四。为原书同卷“石蚕散”之异名。见该条。

70407 倒阳汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】元参三两 肉桂三分 麦冬三两

【用法】水煎服。

【主治】虚火炎上，肺金之气不能下行，以致强阳不倒。

【方论】此方妙在元参以泻肾中浮游之火，尤妙肉桂引其入宅面招散其沸越之火，同气相求，火自回舍；况麦冬又助肺金之气清肃下行，以生肾水，水足火自息矣。

70408 倒换散

【方源】《宣明论》卷十五。

【异名】荆黄汤（《内经拾遗》卷二）。

【组成】大黄（小便不通减半） 荆芥穗（大便不通减半）各等分

【用法】上药各为末。每服一二钱，温水调下。

【主治】久新癰闭不通，小腹急痛，肛门肿痛。

【方论选录】《医方考》：用荆芥之轻清者，以升其阳；用大黄之重浊者，以降其阴，清阳既出上窍，则浊阴自归下窍，面小便随泄矣。方名倒换者，小便不通，倍用荆芥；大便不通，倍用大黄，颠倒面用，故曰倒换。

70409 倒换散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】大黄 杏仁（大便不通，大黄一两，杏仁三钱；小便不通，大黄三钱，杏仁一两）

【用法】水煎服。

【主治】大小便不通。

70410 倒痰汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】参芦一两 瓜蒂七枚 白芍一两 白芥子一两 竹沥二合

【用法】水煎服。一剂必大吐，尽去其痰，其痛如失，然后用二陈汤调理，不再痛。

【主治】性喜食酸，因多食青梅，得痰饮之病，痰饮随气升降而作痛，日间胸膈中如刀之刺，至晚而胸膈痛止，膝膈大痛。

【方论选录】用参芦以扶胃土，用白芍以平肝木，用白芥子、竹沥共入于瓜蒂之中，吐痰即用消痰之药，使余痰尽化，旧痰去而新痰不生，得治痰之益，又绝其伤气之忧也。

70411 倒流油乌髭三圣膏

【方源】《御药院方》卷十。

【异名】三青膏（《瑞竹堂方》卷十）。

【组成】酸石榴（皮子皆用） 新胡桃（连青皮用） 新柿子（青者连蒂用）各等分

【用法】用铁杵臼内捣烂如泥，用一小口新瓷罐于内，好黑锡三斤，拍作小钱大叶子，生牛乳同拌前药令匀，罐口上用木拍子油绢密

封，上用石灰磨捣泥之，日内晒令极干，于马粪内培一月，取出看药颜色，若深黑色即成；如未黑，再封于粪内培之。如用时，先以温浆水洗净，以胆皮盛，临卧指蘸药捻之；如捻时自下捻之，其黑自下至髭根。

【功用】乌髭。

【宜忌】忌生葱、生萝卜、大蒜。

倍

70412 倍力丸

【方源】《普济方》卷二二一引《圣惠》。

【组成】补骨脂二两（炒） 桂心二两 缩砂一两（去皮） 附子二两（炮裂，去皮脐） 木香二两 安息香二两（以酒熬成膏） 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为末，炼蜜并安息香膏相和为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心以温酒送下。

【主治】元气虚损，腰膝筋骨疼痛。

70413 倍力丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】牛膝（去芦，酒浸） 羌活（生） 巴戟（去心） 官桂（去粗皮，怀干） 天麻（酒浸） 狗脊（生，去毛） 草薢（生） 杜仲（去皮，姜汁制，炒去丝） 茴香（淘去沙，炒） 桐皮 附子（炮，去皮脐） 川乌头（炮，去皮脐） 青盐各一两（别研） 没药（制研） 木香（湿纸裹煨） 防风（去芦，洗）各半两

【用法】上为细末，用黑牵牛四两，微炒取粉，和面同煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前盐汤送下。

【主治】腰痛。

70414 倍子散

【方源】《普济方》卷三八一引《余居士选方》。

【异名】麝香散。

【组成】倍子（全者）不拘多少

【用法】炭灰烧，候烟欲尽，取出，放地上，

盆覆之，存性去灰，碾为细末，入麝香少许。如牙药敷患处，虽咽津亦无碍，先以盐汤漱口，一敷即愈。

【主治】走马疳。

70415 倍子散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】五倍子不拘多少

【用法】打碎，炒黑为末，醋调敷，或井水调敷亦可。

【主治】一切肿毒，并乳痈初起。

70416 倍子散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】川倍子一两 人参一钱 冰片一钱 乳香三钱（制） 川贝二钱 真血竭五钱 三七一两 儿茶一两 藤黄三钱 轻粉一钱

【用法】上为极细末，收贮备用。用刀去疮边腐肉，先上此药，再贴阴阳起死膏。

【主治】十大恶疮。

70417 倍术丸

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】白术一斤 桂心 干姜各半斤

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以饮送下，稍加之；取下，先食服之，每日二次。

【主治】①《外台》引《深师方》：五饮酒癖。②《幼幼新书》引《王氏手集》：小儿脾胃受湿，心下停饮，烦渴呕吐，肠间沥沥有声，胸膈痞满，短气，腹胁胀痛，小便不利，身面虚浮，全不思食。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、生葱。

70418 倍术散

【方源】《百一》卷五。

【组成】白术二两 附子（炮，去皮脐）一两

【用法】上咬咀。分作三服，水一大杯，加生姜十片，煎至七分，去滓，空心服，脏腑微动即安。

【主治】酒癖痰饮。

70419 倍灵丸

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【异名】倍槐丸（《魏氏家藏方》卷七）。

【组成】槐花六两 五倍子三两 五灵脂三两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】肠风下血。

70420 倍陈汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】陈皮四钱 人参二钱 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】胃虚呃逆。

70421 倍苓丸

【方源】方出《医宗必读》卷九，名见《会约》卷十三。

【组成】五倍子二两 茯苓四两

【用法】为丸服。

【主治】肾虚不固之遗精。

【方论选录】《会约》：凡用秘涩药能通面后能秘，此方茯苓倍子五倍，能泻能收，是以尽其妙也。

70422 倍矾散

【方源】《济阳纲目》卷九十六。

【组成】五倍子三钱 白矾一块

【用法】以水二碗，煎五倍子减半，入白矾，安小桶内洗之。

【主治】脱肛。

70423 倍金散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】恶实子（炒）二两 神曲（炒）半两 虎杖花 山果子（和核）各一两

【用法】上为粗末。每服一钱，水八分，入荆芥七穗，紫草十根，煎至四分，去滓，温服。

【主治】小儿疮疹倒靥黑色。

70424 倍轻散

【方源】《普济方》卷三六一引《经验良方》。

【组成】猪腰子一个 五倍子（末） 轻粉

【用法】上用猪腰子一个，开作二片，去膜心，将五倍子末用轻粉纳入腰子内，同沙糖和面固济腰子缝，炭火上炙焦为末。清油调涂。

【主治】小儿胎风疮。

70425 倍香膏

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】五倍子（烧存性） 乳香少许 降真香少许

【用法】上为末。用津液调少许，搽痔上。

【主治】痔疾。

70426 倍姜丸

【方源】《医方类聚》卷一一九引《居家必用》。

【组成】生明矾 生半夏（去脐） 生南星（去脐） 白茯苓各一两 干姜二两

【用法】上为细末，姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食后、临卧生姜汤送下。

【主治】远年近日咳嗽，声声不绝；痰嗽。

70427 倍黄散

【方源】《医方类聚》卷一八五引《吴氏集验方》。

【组成】五倍子一两 白芷半两 石灰三两 堇泥一分

【用法】上为末。滴水为丸，作饼，晾干，刮下，搽。

【功用】止血，生肉，排脓。

【主治】刀斧伤，恶疮。

70428 倍槐丸

《魏氏家藏方》卷七。为《洪氏集验方》卷四“倍灵丸”之异名。见该条。

70429 倍榆散

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】五倍子 地榆各等分

【用法】上为末。每服五分或一钱，米饮调下。

【主治】小儿脱肛。

70430 倍术二陈汤

【方源】《医统》卷三十五引《辨疑》。

【组成】白术加倍 陈皮 半夏(制) 白茯苓各等分 甘草减半

【用法】上咬咀。加生姜三片,水一盞半,煎服。

【主治】湿痰泻泄。

70431 倍参生化汤

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】川芎三钱 当归四钱 荆芥四分 桃仁十粒 人参三钱 肉桂五分(二帖后去之) 炙甘草五分 枣二枚

【用法】水煎,热服。

【主治】产后血崩,形脱汗多,气促。

【加减】汗多,加黄耆、人参各三钱;渴,加麦冬、五味;泻,加茯苓、莲子。

70432 倍姜半夏丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】干姜二两(泡,洗) 白矾(枯) 半夏(汤泡七次) 天南星(汤泡七次) 橘红各一两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,生姜汤送下,不拘时候。

【主治】痰饮。

健

70433 健中丸

【方源】《普济方》卷二十五。

【组成】白术 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 各二两 木香 诃黎勒(去核) 肉豆蔻(去皮) 芎藭各一两

【用法】上为末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】脾胃不和,不能饮食。

70434 健中丸

《普济方》卷二十五。即《杨氏家藏方》卷六“建中丸”。见该条。

70435 健中汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】甘草(炙)七分 大枣三枚 黄耆

三钱 干姜二钱 肉桂一钱 川芎二钱 白芍七分

【用法】上咬咀。水煎熟,温服。

【功用】补中益气,散寒痞。

【主治】汗多亡阳,中气亏败,致成痞满。

70436 健中汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 苡仁 扁豆(炒) 陈皮 白茯苓 柴胡 神曲(炒)

【用法】水煎服。兼服肥儿丸。

【主治】小儿脾虚作肿。

70437 健中散

【方源】《普济方》卷二十五。

【组成】白术 枳实(麸炒) 人参 白芍药 干姜(炮) 桂(去粗皮) 高良姜(锉) 丹参 大腹皮 槟榔(锉) 吴茱萸(汤浸,焙干,炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 桔梗(锉,炒) 干木瓜 艾枝(炙) 草豆蔻(去皮) 各等分

【用法】上为末。每服三钱匕,温酒调下。

【主治】脾胃气虚弱,呕吐不下食,脐腹胀满,积聚不消。

70438 健民丹

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】粉甘草一两 西滑石一两 朱砂一钱 紫蔻仁三钱 丁香一钱五分 薄荷冰二分

【用法】上为细末,水为丸,滑石、朱砂为衣,如菜菔子大。每服十五丸或二十丸,白开水送下,一岁服三丸,大者酌加。

【主治】中暑吐泻,晕车晕船,呕吐恶心,胃口不开,饮酒过度,小儿风热,夏令暑热。

【宜忌】寒症忌用。

70439 健母丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】麦冬 天冬各一两 生甘草 黄芩各一钱 茯苓 青蒿 白芍 桔梗 丹参各三两 陈皮三分 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】肾火乘肺，肺火与肾水相合而致病目，数日即生翳，由下而上，其翳色作淡绿状，瞳子痛不可当。

70440 健阳丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】胡椒十五粒 母丁香十粒 黄丹一钱 生矾三分

【用法】醋调。涂脐。被盖出汗。

【主治】色欲后受寒，手足冷，脐腹痛者。

70441 健阳丹

【方源】《理瀹》。

【异名】回春丹。

【组成】胡椒 枯矾 火消 黄丹各一钱 丁香五分

【用法】醋为团。握掌心。被盖取汗。

【主治】伤寒阴症。

70442 健阳酒

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】当归 枸杞子 破故纸各三钱

【用法】共入好烧酒二斤内，隔汤煮一炷香，取起宿一夜；无灰好酒浸蒸亦可。次日尽量饮。

【功用】壮阳助神，暖精髓，健筋骨。

70443 健运丸

《衷中参西》上册。即原书同册“健运汤”减麦冬、知母三分之一，改为丸剂。见该条。

70444 健运汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆六钱 野台参三钱 当归三钱 寸麦冬（带心）三钱 知母三钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 莪术一钱 三棱一钱

【主治】气虚腿疼、臂疼；腰疼。

【备考】减麦冬、知母三分之一，改为丸剂，名“健运丸”。

70445 健志丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】天门冬（去心） 远志（去心） 白

茯苓（去皮） 熟地黄各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心米饮送下，一日二次。

【功用】久服令人不忘，耳目聪明，身体轻健。

70446 健步丸

《普济方》卷二四一引《海上方》。为原书同卷引《海上方》“破故纸丸”之异名。见该条。

70447 健步丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】石南叶 天南星（炮裂） 羌活（去芦头） 天麻（去苗） 薏苡仁 防风（去芦头） 续断 草薢 黄耆（去芦头） 当归（去芦头，洗、焙）各一两 石斛（去苗） 牛膝（切碎，酒浸一宿，焙干）各二两 干木瓜四两 威灵仙一两 自然铜一两（烧红醋淬，碎研）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或木瓜汤送下。

【主治】干湿脚气，腿膝麻痹、冷疼，足下隐痛，行步艰难，下注生疮。

70448 健步丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】防己（酒洗）一两 羌活 柴胡 滑石（炒） 炙甘草 瓜蒌根（酒洗）各五钱 泽泻 防风各三钱 苦参（酒洗） 川乌各一钱 肉桂五分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心煎愈风汤送下。

【主治】膝中无力，伸而不得屈，屈而不能伸，腰背腿膝沉重，行步艰难。

【备考】本方改为膏剂，名“健步膏”（见《理瀹》）。

70449 健步丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】生地半两 归尾 芍药 陈皮 苍术各一两 吴茱萸 条芩各半两 牛膝一两 桂枝二钱 大腹子三个

【用法】上为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。

每服一百丸，空心煎白术木通汤送下。

【主治】脚气。

70450 健步丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】苍术 白术 茯苓 白芍 广皮 各一两 当归 杞子 川柏各二两 怀膝三两 防己 泽泻各五钱 川断 木瓜各七钱 五加皮八钱 炙草三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。

【主治】饮酒过度，有伤脾肺，膝中无力，行步艰难。

70451 健步丸

【方源】《中国药典》。

【组成】黄柏（盐炒）40克 知母（盐炒）20克 熟地黄20克 当归10克 白芍（酒炒）15克 牛膝35克 豹骨（制）10克 龟版（制）40克 陈皮（盐炒）7.5克 干姜5克 锁阳10克 羊肉320克

【用法】将羊肉洗净，剔去筋膜、油，加黄酒40克煮烂，与黄柏等十一味为细末，过筛，混匀，每100克粉末用糯米粉5~10克，调稀糊为丸，干燥，即得。口服，一次9克，一日二次。

【功用】补肝肾，强筋骨。

【主治】肝肾不足，腰膝酸软，下肢痿弱，步履艰难。

70452 健步膏

《理瀹》。即《兰室秘藏》卷下“健步丸”改为膏剂。见该条。

70453 健忘丹

【方源】《便览》卷三。

【组成】远志（去心）一两 石菖蒲（去毛）一两 黄连（姜炒）五钱 归身（酒洗）二两 枸杞（甘州者）二两 酸枣仁（炒）一两 麦冬（去心）一两 甘菊花五钱 生地黄五钱 人参五钱

【用法】炼蜜为丸，朱砂三钱为衣。每服五十丸，茶送下。

【主治】心虚损，遇事多惊，作事健忘，读诵诗书健忘。

70454 健肾汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地 茯苓各二两 麦冬 莲子（连心用）各五钱 芡实 山药各一两

【用法】水煎服。

【主治】肾水之衰，手足尽胀，腹肿如臌，面目亦浮，皮肤流水，手按之不如泥，但陷下成孔，手起而胀满如故，饮食知味，大便不溏泻，小便闭涩，气喘不能卧倒。

70455 健固汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参五钱 茯苓三钱 白术一两 巴戟五钱 薏仁三钱

【用法】水煎服。

【功用】补脾气以固脾血。

【主治】妇人脾气之虚，行经前先泻三日，而后行经。

70456 健肺丸

【方源】《古今名方》第十一章。

【组成】百部 白及 黄精 玉竹各125克 穿心莲200克 葶草500克

【用法】炼蜜530克，为小丸。每服3克（约30丸），一日三次。

【功用】化痰止咳，生津止血。

【主治】各型肺结核。

70457 健胃丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】香附三两 良姜一两 百合三两 香橼一两 木香二两 贡桂一两 白豆蔻 广砂仁各二两 黄连一两 内金炭三两 莱菔炭二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，开水送下。

【功用】健胃消食，理气除寒。

【主治】胸膈胀满，两胁刺痛，胃脘剧痛，呕哕吞酸，消化不良，腹痛肢痠，中气不足，二便不调，泻痢后重，神疲气短。

【宜忌】禁忌辣腥、生冷、硬物。

70458 健胃丹

《卫生总微》卷十一。为《幼幼新书》卷二十九引张涣方“建胃丹”之异名。见该条。

70459 健胃丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】豆蔻二钱 陈皮三钱 砂仁 香附 厚朴各二钱 公丁香一钱 白术 白芍 龙胆草各三钱 黄芩二钱 茯苓三钱 三仙一两 当归三钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，食后一时许开水送下。

【功用】健胃消食，调气止痛。

【主治】胃脘胀痛，消化不良，呕吐吞酸，嘈杂胁痛。

【宜忌】禁忌鱼肉、生冷物品。

70460 健胃散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】人参 油朴各三钱 茯苓 砂仁 各四钱 苍术六钱 麦芽四钱 清夏三钱 草果二钱 藿香 石榴皮 紫蔻各三钱 血琥珀 川芎各二钱 朱砂 白术 甘草各三钱

【用法】上为极细末。小儿六个月内服半分，周岁内一分，二岁二分，三岁三分，大一年加量一分。

【功用】健胃整肠，止泻利湿。

【主治】腹痛泻泄，呕吐反胃，消化不良，食欲减退，久泻便溏，慢性痢疾。

【宜忌】禁忌肉类、油腻、冷食。

70461 健骨散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】白僵蚕

【用法】上为末，三岁儿每服半钱，薄荷酒调下。后用生筋散贴。

【主治】小儿五软，久患痢疾，体虚不食，及诸病后天柱骨倒。

70462 健捷散

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】香白芷 干姜 桂枝 云母各等分

【用法】上为细末。每服二三钱，海萝汤搅和匀，顿服。

【主治】妇人难产经日，及胞衣不下；寻常经闭，儿枕痛。

70463 健猪肚

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】猪肚一具(洗净)

【用法】人黄连一钱，煮极烂，食。

【主治】消渴。

70464 健猪肺

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】健猪肺

【用法】照常洗净，少放汤，煨极烂极稠，少放些酱油、醋，盖好，次日五更，病人不曾说话时，着人用开水顿热吃下，再睡一觉。次日又复如此。一肺可分两三服，重者不过三四肺。

【主治】久嗽劳病。

70465 健脚煎

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】鹿茸(酒洗，炒) 续断 当归(酒洗) 芎藭 芍药 熟地黄 牛膝(酒洗) 杜仲(炒去丝) 各等分

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后痿痹。

70466 健脾丸

【方源】《普济方》卷二十二引《(经效济世方)》。

【组成】厚朴一斤(去皮，切) 枣二升(去核，切) 生姜一斤(去皮，切)

【用法】上药先入锅内，猛火炒匀，搅候紫焦倾出，为粗末；每末一斤，入良姜四两，干姜四两(炮裂)，神曲四两，附子二两(炮，去皮脐)，同为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心米饮送下。

【功用】暖胃温脾，增进饮食。

70467 健脾丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《(必用全书)》。

【组成】白术五两 白茯苓 白芍药 半

夏(姜制)各三两 陈皮 神曲 山楂肉 当归(酒洗) 川芎各二两

【用法】上为末,煮荷叶汤,作米糊为丸,如梧桐子大。每服百丸,白汤送下。

【功用】健脾胃,进饮食,消化水谷。

【主治】《证治宝鉴》:暖气。

70468 健脾丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】白术(微炒)五两 陈皮(洗净,存白) 半夏(泡七次,姜汁拌炒)各三两 神曲(炒) 山楂(去子,蒸,晒) 归身(酒洗) 白芍药(炒) 白茯苓(去皮)各二两 川芎(小者佳) 黄连(姜汁炒)各一两半 香附(童便浸) 枳实(面炒) 炙甘草各一两

【用法】上为末,荷叶包老米饭,慢火上蒸饭为丸,如小赤豆大。每服八九十丸,食后滚白水送下。

【主治】脾胃病。

70469 健脾丸

【方源】《育婴家秘》卷三。

【组成】胃苓丸加山药 莲肉各二钱 木香 砂仁各八分 白术一钱半 当归 麦芽(炒) 神曲(炒)各一钱

【用法】枣肉为丸。米饮送下。

【功用】养脾进食,调理胃气,和养荣卫。

70470 健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】人参 白术各四两 枳实三两 山楂一两五钱 麦芽一两 陈皮一两

【用法】神曲糊为丸服。

【主治】食后不便转化,因而食少。

70471 健脾丸

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】枳实一两(麸炒) 白术三两(麸炒) 陈皮二两 神曲一两(炒) 木香五钱 半夏(姜制) 黄连(炒) 黄芩(炒) 厚朴(姜制) 当归(酒洗) 香附子(去毛) 大麦芽(炒) 白芍(酒炒) 白

茯苓(去皮)各一两 川芎五钱

【用法】上为细末,用荷叶煮糯米糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,食后白米汤送下。

【主治】伤食。

70472 健脾丸

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】人参二两 白术四两 茯苓 山药 扁豆 苍术 芍药 陈皮各二两 甘草 砂仁 木香各五钱 黄连一两 楂肉二两

【用法】上为末。沙糖汤调米汤化下。

【主治】小儿脾虚身热。

【备考】本方方名,据剂型,当作“健脾散”。

70473 健脾丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【异名】大健脾丸(《不居集》下集卷九)。

【组成】白术(白者)二两半(炒) 木香(另研) 黄连(酒炒) 甘草各七钱半 白茯苓(去皮)二两 人参一两五钱 神曲(炒) 陈皮 砂仁 麦芽(炒,取面) 山楂(取肉) 山药 肉豆蔻(面裹煨熟,纸包捶去油)各一两

【用法】上为细末,蒸饼为丸,如绿豆大。每服五十丸,空心、下午各服一次,陈米汤送下。

【主治】①《准绳·类方》:脾胃不和,饮食劳倦。②《不居集》:食积。

70474 健脾丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】白术四两(土炒) 山楂肉二两 麦芽粉一两 砂仁一两 白芍二两(酒炒) 黄连七钱(酒炒黄色) 陈皮一两 莲肉二两(去心) 甘草三钱 枳实一两(麦麸炒) 山药二两 木香二钱 薏苡二两(炒)

【用法】上为末,老米糊为丸服。

【功用】健脾。

70475 健脾丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】半夏曲一两(炒) 白术二两(土炒) 枳实一两(麦麸炒) 陈皮八钱 神曲七钱(炒) 麦芽粉七钱(炒) 卜子七钱(炒) 砂仁三钱 白茯苓八钱 厚朴七钱(姜汁炒) 木香三钱 白扁豆八钱(炒) 白芍八钱(酒炒) 山药一两(炒) 甘草五钱 黄连七钱(姜汁炒) 人参五钱 香附七钱(醋炒) 山楂七钱 藿香七钱 滑石一两五钱(如不善飞,六一散代之)

【用法】上为末,炼蜜为丸如龙眼大。每服一二丸,不拘时候。

【功用】饮食多进,生肌长肉。

【主治】小儿粪后红。

70476 健脾丸

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】白术一两(土炒) 茯苓一两 人参三钱 木香三钱 神曲五钱 山药五钱 米仁五钱 楂肉一两 广皮五钱 扁豆五钱

【用法】上为末。黄米汤冲服。

【主治】小儿脾疳。

【备考】本方方名,据剂型,当作“健脾散”。

70477 健脾丸

【方源】《慈幼新书》卷十。

【组成】白术(土炒) 扁豆(炒) 莲肉(去心) 茯苓 薏苡仁(炒) 麦芽 山药各四两 五谷虫 白芍(酒炒) 远志(去心) 山楂 神曲 陈皮 泽泻各二两 甘草一两六钱 砂仁六钱 桔梗一两二钱

【用法】荷叶煎水,老米糊为丸,如绿豆大。每服一钱或二钱,食远白汤服。

【主治】小儿食积。

【加减】有积,加鸡肫皮。

70478 健脾丸

【方源】《医方集解》。

【组成】人参 白术(土炒)二两 陈皮 麦芽(炒)二两 山楂(去核)一两半 枳实三两

【用法】神曲糊为丸。米饮送下。

【功用】《全国中药成药处方集》(禹县方):开胃健脾。

【主治】①《医方集解》:脾虚气弱,饮食不消。②《全国中药成药处方集》(禹县方):脾胃虚弱引起的食欲不振,胸腹胀满,大便溏泻。

【方论选录】参、术补气,陈皮利气,气运则脾健而胃强矣;山楂消肉食,麦芽消谷食,戊己不足,胃为戊土,脾为己土,故以二药助之使化;枳实力猛,能消积化痞,佐以参、术,则为功更捷,而又不致伤气也。夫脾胃受伤,则须补益;饮食难化,则宜消导。合斯二者,所以健脾也。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(禹县方):忌食生冷、油腻。

70479 健脾丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】白术 建莲肉 山药 白茯苓 山楂肉 麦芽 白芡实 神曲各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每服三钱,白滚水送下。

【功用】健脾。

70480 健脾丸

【方源】《会约》卷二十。

【组成】人参(少者,以山药二两炒黄代之) 黄耆(蜜炒) 白术 当归 茯苓各一两 神曲(炒) 山楂肉 白芍(酒炒) 地骨皮各五钱 白扁豆(炒,去皮)一两 橘红 陈皮各五钱 川黄连(炒)四钱 百合八钱

【用法】上为细末。每用二钱,少加白糖,开水调服。

【主治】麻后失调,体瘦气虚,或成疳疾,或生泄泻。

【加减】肚硬有积,加谷虫三钱。

【备考】本方方名,据剂型,当作“健脾散”。

70481 健脾丸

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】人参二钱(烘) 甜白术一两(土炒) 云苓一两 五谷虫五钱(炒) 鸡肫皮五钱(炒黄) 陈皮三钱(炒) 须黄连二钱(酒炒) 炙甘草二钱 炒麦芽五钱 焦山楂五钱 神曲五钱(炒黑) 虾蟆皮三张(炙)

【用法】上药各为末,炼蜜为丸,如桂圆大;贫人无力用参,以党参八两熬膏为丸。每服一丸,或早或晚开水化服。

【功用】健脾长肌,调补精神。

【主治】小儿脾虚腹大,四肢消瘦,一切伤脾痞证。

70482 健脾丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】橘皮四十八两 山药四十八两 白术(炒)七十二两 黄耆二十四两 厚朴(炙)二十四两 甘草二十四两 苍术(炒)二十四两 泽泻二十四两 猪苓二十四两 扁豆(炒)二十四两 桔梗二十四两 白芍二十四两 芡实(炒)二十四两 茯苓二十四两 苡米(炒)二十四两 莲子肉二十四两

【用法】上为细末,过罗,冷开水为小丸。每服二钱,温开水送下,每日二次。

【功用】理气健脾,和胃祛湿。

【主治】饮食不节,停食伤脾,食物不化,体倦神疲。

70483 健脾汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【异名】乌头建脾散(《鸡峰》卷十二)、建脾散(《鸡峰》卷十四)。

【组成】乌头(炮裂,去皮脐)三分 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 甘草(炙,锉) 干姜(炮)各一分

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜二片,煎至七分,去滓热服,并二服止。

【主治】胃虚泄泻,老人冷泻。

70484 健脾汤

《普济方》卷二十三引《十便良方》。为《鸡

峰》卷十二“建脾汤”之异名。见该条。

70485 健脾汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】条参 北耆 焦术 茯苓 枣仁 砂仁 白蔻 桂圆 煨姜

【主治】脾虚噎膈。

70486 健脾汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参 白术 当归各三钱 白茯苓 白芍 神曲 吴萸各一钱 大腹皮 陈皮各四分 砂仁 麦芽各五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人伤食,误服消导药成胀,或胁下积块。

70487 健脾汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参 白术 当归 茯苓 白芍 神曲各一钱 川芎七分 陈皮 炙甘草 砂仁各五分 腹皮五分

【主治】妇人产后臌胀,误用消导药。

【加减】伤食,加麦芽五分;伤冷物腹大痛,加吴茱萸一钱。

70488 健脾汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】广藿香 白芍(炒) 白术(炒) 白茯苓 苡仁 陈皮 甘草 车前子

【用法】水煎服。

【主治】小儿病后失调,元气有亏,脾虚作肿。

70489 健脾汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】人参 茯神 龙眼肉 黄耆 枣仁(炒,研) 白术各二钱五分 木香 炙甘草各五分

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【主治】健忘。

70490 健脾汤

【方源】《老中医临床经验选编》。

【组成】党参 白术 茯苓 半夏各9克

陈皮 6 克 黄连 吴茱萸各 3 克 白芍 15 克 甘草 3 克 瓦楞子 12 克

【功用】健脾和胃，缓急止痛，降逆止呕。

【主治】脾胃虚弱，中脘疼痛，呕恶泛酸，精神疲乏，纳食减少，脉濡细或虚而无力；胃和十二指肠溃疡病，慢性胃炎等偏于脾胃虚寒者。

【加减】脾虚不能运化，加炒麦芽、炒谷芽各 12 克，肉桂 1.5~3 克；脾虚湿盛，加苍术、厚朴各 9 克；脾虚不能统血，加当归、黄耆、阿胶、仙鹤草；肝胃不和，胃气上逆，加旋覆花、代赭石。

70491 健脾饮

【方源】《活幼新书》卷下。

【组成】厚朴（去粗皮，锉碎，每一斤用生姜一斤，切薄片，烂杵，拌匀，酿一宿，慢火炒干，再炒热，用醇醋淬透，仍以慢火炒干） 人参（去芦）各一两 白茯苓（去皮） 肉豆蔻 半夏（制） 益智仁 净香附各二钱半 良姜（锉片，东壁土炒） 诃子肉各二钱 甘草（炙）五钱

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，加生姜二片，大枣一枚，煎七分，空心温服，不拘时候。

【功用】健脾养胃。

【主治】小儿泻利，呕吐，及诸病后气血虚弱，有痰恶心，腹中微痛，饮食减，精神慢。

70492 健脾饮

【方源】《点点经》卷二。

【组成】羊藿 白茯苓 陈皮 当归 苍术 厚朴 泽泻各一钱半 白术 青皮各一钱 人参五分 甘草四分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】酒伤脾肾，牙缝流血。

70493 健脾饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白术 薏苡各五钱 茯苓 山茱萸 白芍各三钱 人参二钱 甘草五分 当归 牛膝 麦冬各三钱 北五味三分 肉桂

一钱

【用法】水煎服。

【主治】脾气困乏，三伏之时，悠悠忽忽，懒用饮饌，气力全无，少贪美味，腹中闷胀，少遇风凉，大便作泻。

70494 健脾粉

【方源】《全国中药成药处方集》（武汉方）。

【组成】党参一两半 陈曲 砂仁 陈皮 麦芽各一两 炒白术二两半 木香（研） 黄连（酒炒） 甘草各七钱半 白茯苓二两 山楂 山药 肉豆蔻（面裹煨，去油）各一两

【用法】混合碾细，成净粉 85~90% 即得。每服三钱，空服时米汤调下。

【主治】脾虚不食，面黄肌瘦，积滞胀满，腹泻腹痛。

70495 健脾散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】诃黎勒皮一两 白术一两 人参一两（去芦头） 麦藷一两（炒令微黄） 神曲半两（炒令微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 大腹皮半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 干姜三分（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后脾胃虚弱，不欲饮食，纵食，不能消化。

70496 健脾散

【方源】《苏沈良方》卷四。

【异名】建脾散（《三因》卷十一）、养婆汤（《普济方》卷二〇八）。

【组成】乌头（炮）三分 厚朴（姜炙） 甘草（炙） 干姜（炮）各一分

【用法】每服一钱，水三合，加生姜二片，煎至二合，热服，并二服止。

【主治】①《苏沈良方》：胃虚泄泻，脾泄，老人脏泄。②《三因》：五泄，或青白五色杂下，陈作无时。

70497 健脾散

【方源】《普济方》卷二十五引《澹寮》。

【组成】生姜一斤（切片，盐三两淹半日，焙干，取四两） 神曲（炒） 麦蘖（洗，炒） 陈皮（去白） 草果仁 甘草各二两（或减甘草）

【用法】上为末。点、煎任意。

【功用】消食化气。

【主治】饮食不快。

70498 健脾散

【方源】《普济方》卷十五。

【组成】黄橘皮 人参各半两 独活 枇杷叶（拭去毛） 甘草 鳖甲（醋炙）各一两

【用法】上为细末。每服二钱半，以水一盞三分，更用仓米四十九粒先煮令熟，约余水九分以来，即下末药，更煎二沸泻出，和滓空心服。

【主治】肝受劳气，吃肝药了，恐肝之病气相移于脾。

70499 健脾散

【方源】《普济方》卷二十三。

【组成】人参 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉） 麦蘖（炒黄）各一两 甘草（炙，锉） 面曲（炒令黄）各半两

【用法】上为末。每服二钱匕，入盐沸汤点服，不拘时候。

【主治】脾胃虚冷，水谷迟化，不能饮食。

70500 健脾散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】莲肉 砂仁各四钱 香附 藿香 茯苓各三钱 陈皮 山药 苍术各三钱 木香一钱 炙草二钱 生姜 枣子（去核）

【用法】上锉。分作六服服之。

【主治】疮疡溃后，痞满不食。

70501 健脾散

【方源】《医统》卷二十三。

【组成】人参 白术（炒） 藿香 丁香 砂仁（炒） 肉果（煨） 神曲（炒） 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，橘皮汤调下，不拘时候。

【功用】通中健胃，消食快气。

70502 健脾散

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】白茯苓（去皮） 人参各一两 厚朴三两（用姜汁炙） 苍术（米泔浸一宿）四两 陈橘皮（去白）五两 甘草二两（半生半熟） 草果子（去皮）二两

【用法】上为末。每服一钱，加生姜、大枣，同煎服。

【主治】小儿胃气。

70503 健脾散

【方源】《医方易简》卷六。

【组成】建莲一两六钱（去心） 淮山一两 南豆一两 白术五钱 芡实六钱 薏米二两 川贝母三钱（去心） 饭党五钱

【用法】共用笊箕饭面蒸熟，晒干，为末。每服五钱，早晨桂圆肉煎水开调服；或炖饭食，候饭起虾眼，入散五钱于上，饭熟透，连饭食，亦可。

【功用】健脾。

【主治】痼症。

70504 健脾膏

【方源】《理渝》。

【组成】白术四两 茯苓 白芍 六神曲 麦芽 香附 当归 枳实 半夏各二两 陈皮 黄连 吴萸 山楂 白蔻仁 益智 黄耆 山药 甘草七钱 党参 广木香各五钱

【用法】麻油熬，黄丹收；贴心口、脐上。

【功用】健脾。

【备考】原书注：加苍术、大黄各二两，黄芩、厚朴、槟榔各一两，以雄猪肚（石上擦净）装药熬，尤良。

70505 健脾膏

【方源】《理渝》。

【组成】牛精肉一斤 牛肚四两（用小磨麻油三斤浸熬，听用） 苍术四两 白术 川乌各三两 益智仁 姜半夏 南星 当归

厚朴 陈皮 乌药 姜黄 甘草(半生半炙) 枳实各二两 黄耆 党参 川乌 白芍 赤芍 羌活 香白芷 细辛 防风 香附 灵脂 苏梗 苏子 延胡索 山楂 麦芽 神曲 木瓜 青皮 槟榔 枳壳 桔梗 灵仙 腹皮 醋三棱 醋莪术 杏仁 柴胡 升麻 远志肉 吴萸 五味 草薢仁 肉薢仁 巴戟天 补骨脂 良姜 草薢 大茴 红花 黄连 黄芩 大黄 甘遂 苦葶苈 红芽大戟 巴仁 黑丑头 茵陈 木通 泽泻 车前子 皂角 木鳖仁 草麻仁 全蝎 炮山甲 白附子 附子各一两 滑石四两 生姜 薤白 韭白 葱白 大蒜各四两 鲜槐枝 柳枝 桑枝各八两 莱菔子 干姜 川椒各二两 石菖蒲 艾 白芥子 胡椒 佛手干各一两 凤仙草(全株) 枣七枚

【用法】用油二十二斤,分熬丹收,再入官桂、木香、丁香、砂仁、檀香各一两,牛胶四两(酒蒸化),俟丹收后,搅至温温,以一滴试之,不爆,方下,再搅千余遍,全匀,愈多愈妙,勿炒珠,炒珠无力,且不粘也。贴胸脐。

【主治】脾阳不运,饮食不化,或噎塞饱满,或泄痢腹痛,或为湿痰,水肿,黄疸,臌胀,积聚,小儿慢脾风。

70506 健脾膏

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】党参三两 淮山药 芡实 云苓 扁豆 莲子各六两 广陈皮一两五钱 使君子六两 糯米三升 粳米七升 苡米六两 白术二两

【用法】各药微炒香,为细末,另将糯米、粳米各蒸熟晒干后炒爆,磨成细粉,与各药和匀,加白糖十五斤(如嫌糖量重,可酌减,以适量为准),用模印成块,烘干。小儿视年龄适量服之;营养不良者,可常服。

【主治】胃胸虚弱,消化不良,食少体倦,发育不良,易患吐泻。

70507 健脾膏

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】土粉沙参八两 冬瓜仁十六两 芡实十二两 橘皮 莲米 榧子肉 云茯苓 山楂各四两 雷丸二两 百合四两 山药八两 苡仁四两 建神曲 麦芽 谷芽 鸡内金各一两

【用法】上为细末,每净药粉三斤,另加糯米粉十五斤,白糖二十三斤,开水少许打成块。每服三四片,小孩一二片。

【功用】健脾开胃,进食生肌,调气养血,润颜壮神。

70508 健腰丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】熟地半两 山茱萸四钱 北五味一钱 麦冬二钱 白术半两 杜仲五钱

【用法】酒煎服。

【主治】肾虚腰痛。

70509 健土开涎散

《辨证录》卷九。为《慈幼新书》卷九“健胃开涎散”之异名。见该条。

70510 健土杀虫汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参一两 茯苓一两 白芍一两 炒栀子三钱 白薇三钱

【用法】水煎半碗,加入黑驴溺半碗,和匀。饥服。一剂而吐止,不必再剂,虫尽死矣。

【主治】虫作祟,胃中嘈杂,腹内微疼,痰涎上涌而吐呕,日以为常。

70511 健土杀虫汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术五钱 人参二钱 白薇二钱 万年青一片 熟地一两 麦冬一两 山茱萸三钱 生枣仁三钱 车前子二钱 贝母一钱

【用法】水煎服。

【主治】心痹而传之肺,咳嗽吐痰,气逆作喘,卧倒更甚,鼻口干燥,不闻香臭,时偶有闻,即芬郁之味,尽是朽腐之气,恶心欲吐,肌肤枯燥,时作疼痛,肺管之内,恍似虫行,干皮细起,状如麸片。

70512 健民薄荷油

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】薄荷油一两 樟脑二两 香油三两 薄荷冰五钱 黄蜡六钱

【用法】先将油蜡化开,再加上药即成。以上均抹患处;眼疾,抹眼外皮。

【主治】蝎蜇蜂刺,汤泼火烧,风火牙疼,聤耳流脓,眼痒眼疼,目干模糊,暴发赤肿。

【宜忌】眼内忌用。

70513 健母固脱丸

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】当归一两 杭芍 寸冬 玄参各五钱 五味 甘草各二钱 仲炭 寄生 川断 薏仁 山药 胶珠 枳壳 广皮 元芩 远志 京母 川贝 均青 柴胡 艾炭 焦术各三钱

【用法】炼蜜为大丸,每丸三钱重。每日早、晚各服一丸。

【主治】妇人流产。

70514 健步四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗) 川芎 白芍(酒炒) 熟地黄各一钱五分 牛膝(去芦,酒洗) 木瓜 川续断各一钱

【用法】上锉。水煎,空心服。

【主治】血虚不荣于下部而令足痿弱,不能行步。

70515 健步虎潜丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄耆(盐水炒) 当归(酒洗) 枸杞子(酒洗) 龟版(酥炙)一两 知母(人乳汁、盐、酒炒) 牛膝(去芦,酒洗) 白术(去芦) 白芍(盐、酒炒) 生地黄 熟地黄 虎胫骨(酥炙) 杜仲(姜、酒炒) 人参(去芦)各二两 破故纸(盐、酒炒)一两 麦门冬(水泡,去心)一两 白茯苓(去皮木) 木瓜 石菖蒲(去毛) 酸枣仁 远志(甘草水泡,去心) 薏苡仁(炒) 羌活(酒洗) 独活(酒洗) 防风(酒洗)各一两 黄柏(人乳汁、盐、酒炒)

二两 五味子 沉香 大附子(童便浸透,面裹煨,去皮脐,切四片,又将童便浸,煮干)各五钱

【用法】上为末,炼蜜和猪脊髓五条为丸,如梧桐子大。每服一百丸,温汤或酒送下。

【功用】①《鳞爪集》:祛风活血,壮阳益精。②《全国中药成药处方集》(沈阳方):强筋骨,补肾填精,燥湿利下。

【主治】肝肾不足,中风瘫痪,舌强言謇;筋骨痿弱,腰腿痠痛,四肢无力。

①《回春》:中风瘫痪,手足不能动,舌强謇于言。②《鳞爪集》:老年衰迈或壮年病后,筋骨无力,步行艰难,腿膝疼痛麻。③《全国中药成药处方集》(沈阳方):筋骨痿弱,腰腿痠痛,四肢无力,阴虚盗汗,遗精白浊,肾虚脚气,一切肝肾不足。

70516 健步虎潜丸

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】龟胶(蛤粉炒成珠) 鹿角胶(制同上) 虎胫骨(酥油炙) 何首乌(黑豆拌,蒸、晒各九次) 川牛膝(酒洗,晒干) 杜仲(姜汁炒断丝) 锁阳 威灵仙(酒洗) 当归各二两(酒洗,晒干) 黄柏(酒洗,晒干,盐水少许、酒炒) 人参(去芦) 羌活 白芍(微炒) 云白术各二两(土炒) 熟地二两 大川附子一两五钱(童便、盐水各一碗,生姜一两切片,同煮一日,令极熟,水干再添盐水,煮毕取出剥皮,切片,又换净水,入川黄连五钱,甘草五钱,同煮长香三炷,取出晒干,如琥珀色明亮可用)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,空心淡盐汤送下;冬日,淡黄酒送下。

【功用】舒筋止痛,活血补气,健旺精神。

【主治】跌打损伤,血虚气弱,下部腰膝腿疼痛,筋骨痿软无力,步履艰难。

70517 健步虎潜丸

《饲鹤亭集方》。为《丹溪心法》卷三“虎潜丸”之异名。见该条。

70518 健步虎潜丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归四十两 知母四十两 黄柏四十两 秦艽四十两 独活四十两 熟地四十两 龟版(炙)四十两 白术(炒)四十两 白芍四十两 黄耆四十两 补骨脂(炒)四十两 杜仲(炒)四十两 羌活四十两 锁阳四十两 茯苓四十两 防风四十两 菟丝子四十两 木瓜八十两 续断八十两 枸杞子八十两 牛膝八十两 川附片十两 人参(去芦)十两 虎骨(炙)六十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，淡盐汤送或温开水送下，一日二次。

【功用】滋养气血，散风通络。

【主治】下元虚损，筋骨痿软，足膝无力，步履艰难。

70519 健步虎潜丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】人参(去芦)十两 生黄耆二斤八两 故纸(盐炒)二斤八两 枸杞子五斤 生白芍 龟版(醋制)各二斤八两 怀牛膝五斤 熟地 独活各二斤八两 制附子十两 秦艽二斤八两 木瓜五斤 黄柏 知母 当归各二斤八两 炒枣仁二斤 菖蒲二斤 制虎骨三斤十二两 菟丝子 茯苓(去皮) 防风 锁阳各二斤八两 续断五斤 杜仲炭(盐炒) 羌活 远志肉(甘草水制)各二斤八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】去风湿，散寒通络，强壮筋骨。

【主治】四肢疼痛，筋骨痿软，腰痠腿疼，肾囊寒湿。

【宜忌】孕妇忌服。

70520 健步虎潜丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】虎骨 黄耆(炙) 茯神 当归 木瓜 川羌活 独活 防风 石菖蒲 知母

(炒) 薏苡仁(炒) 生地 熟地 白术(土炒) 枸杞 白芍(炒) 怀牛膝 盐黄柏 补骨脂(炒) 杜仲(炒黑) 麦冬 远志各二两(炒) 五味子 沉香 附子(制)各半两 龟版一两半(炙) 人参二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，温开水送下。

【主治】筋骨无力，行步艰难，下部虚损，腿痠腰软，四肢无力，阳事痿弱，阴囊湿汗。

70521 健步虎潜丸

《中药制剂手册》。为《丹溪心法》卷三“虎潜丸”之异名。见该条。

70522 健忘预知散

【方源】《医方易简》卷六。

【组成】虎骨(酥炙) 白龙骨 远志肉各等分

【用法】上为末。生姜汤调服，一日三次。

【功效】久服令人聪慧，凡事不忘。

【主治】健忘。

70523 健胃丁香散

【方源】《普济方》卷三十六引《德生堂方》。

【异名】健脾丁香散(《奇效良方》卷十八)。

【组成】广木香 净全丁香各一两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，煎一盞，先用好黄土和泥，做成碗样一个，却以药滤去滓，盛于土碗内，食前服；越数时再煎服。

【主治】反食，呕吐气噎，关格不通。

70524 健胃开涎散

【方源】《慈幼新书》卷九。

【异名】健土开涎散(《辨证录》卷九)。

【组成】茯苓三钱 白术 苡仁各二钱 人参 花粉各五分 陈皮 干姜各二分 砂仁一粒。

【主治】小儿气逆痰壅，经脉闭塞，手足厥冷，如慢惊者。

70525 健胃止呕散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】枳壳二钱 厚朴一钱 山楂炭五钱 竹茹 半夏 大黄各一钱 广皮 鸡内金各二钱 焦槟榔一钱半 薏仁一钱 砂仁八分 黄连 龙胆草各一钱 犀角一钱半

【用法】上为极细末。满二岁小孩，每服二分，余者酌量增减；成人每服一钱，开水送下。

【功用】健胃清热，止呕镇吐。

【主治】食火胃热，消化不良，肚腹胀满，不思饮食，呕吐恶心，嘈杂吞酸，身体倦怠。

【宜忌】忌食有刺激性及硬性食物。

70526 健胃驱风散

【方源】《经验良方》。

【组成】良姜 小茴香 桂各四钱 芦荟二钱 胡椒一钱

【用法】上合末。日服二钱。

【主治】胃虚腹痛，心下痞硬，便秘。

70527 健胃保和丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》。

【组成】白术二两 枳实 山楂肉 橘红 麦芽各一两 神曲 白豆蔻 木香各五钱

【用法】上为末，粳米饭为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。

【功用】消导饮食。

70528 健胃散湿丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】白术五钱 薏仁九钱 芡实五钱 山药三钱 人参三钱 甘草一钱 陈皮一钱 车前子一钱 白芍三钱 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【功用】去湿。

【主治】风湿入于皮肉之内，致患风懿，奄息不知人，不疼不痛，手足不为用。

70529 健胃温降汤

《衷中参西》中册。为原书上册“温降汤”之异名。见该条。

70530 健效化毒散

《普济方》卷四〇三。即《御药院方》卷十一“无价散”加麝香少许。见该条。

70531 健脾丁香散

《奇效良方》卷十八。为《普济方》卷三十六引《德生堂方》“健胃丁香散”之异名。见该条。

70532 健脾人参丸

【方源】《普济方》卷二十二引《十便良方》。

【组成】钟乳粉二两 人参 石斛各三分 大麦蘖 干生姜 陈橘皮各五钱

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。

【主治】脾胃久虚，饮食全减。

70533 健脾止汗汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】炙耆五钱 潞党参三钱 白术二钱（土炒） 茯神二钱 枣仁三钱（炒） 龙骨二钱（煨） 五味子五分（炒） 归身一钱半（土炒） 白芍一钱半（炒） 元肉一钱半

【用法】大枣三枚，浮麦一撮为引，水煎服。

【主治】妇人脾肺两虚，时常盗汗，精神短少，心跳不安。

70534 健脾止泻汤

【方源】《麻疹集成》卷四。

【组成】茯苓 芡实 建曲 楂肉 扁豆 泽泻 谷芽 甘草

【主治】脾胃虚弱泄泻。

【加减】气滞，加槟榔、枳壳。

70535 健脾化气饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参 白术 当归各二钱 川芎一钱 姜炭 炙甘各四分

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后忿怒。

70536 健脾化痰丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】半夏 南星各二两半（切作十字块，以长皂角肉一两半，明矾一两半，煮汁二十碗，浸二味，经宿取出，次日文武火煮透，劈开南星、半夏内无白点为度，去皂角

不用,将二味切作薄片,晒干,称足四两) 瓜蒌仁(去壳,另研) 黄连(姜汁炒)各一两 陈皮(去白)一两 白茯苓(去皮)一两 枳实(面炒)一两 山楂子肉(去子,蒸)一两 萝卜子一两(炒) 生甘草七钱半(去皮) 白术二两(炒) 紫苏子七钱 香附子一两(童便浸一宿) 黄芩一两(酒炒) 干姜五钱(新瓦上焙黑)

【用法】上为细末,姜汁煮薄糊为丸,如绿豆大。每服八九丸,食后、临卧白汤送下。

【主治】湿热气熏蒸而成郁结五色有形之痰。

70537 健脾化痰丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生白术二两 生鸡内金(去净瓦石糟粕)二两

【用法】上药各为细末,各自用慢火焙熟(不可焙过),炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,开水送下。

【主治】脾胃虚弱,不能运化饮食,以至生痰,糜子饮食,腹中一切积聚。

【方论选录】白术纯禀土德,为健补脾胃之主药;然土性壅滞,故白术多服久服,亦有壅滞之弊,有鸡内金之善消瘀积者以佐之,则补益与宣通并用。俾中焦气化,壮旺流通,精液四布,清升浊降,痰之根底竭除矣。

70538 健脾化痰汤

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】白术 陈皮 柴胡 当归 鳖甲 茯苓 人参 贝母 知母 黄耆 半夏(制) 黄芩 甘草 白芍

【功用】健脾化痰。

【主治】疟疾。

70539 健脾分水汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 茯苓三钱 薏仁九钱 山药五钱 芡实九钱 陈皮五分 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【主治】臌胀,用泻水药泻极后。

【宜忌】忌盐一月。

【备考】泻水方:甘遂三钱,牵牛三钱,水三碗,煎半碗服之,则泻水一桶。泻极后用本方。

70540 健脾生化汤

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】川芎一钱 当归 人参各三钱 白术一钱半 甘草五分

【主治】妇女产后块不痛。

70541 健脾生化汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】白术一钱 茯苓一钱 熟地三钱 北五味五分 麦冬一钱 当归一钱 白芍二钱 陈皮三分 山楂三粒 枳壳二分 人参五分

【用法】水煎服。

【主治】小儿夏月尽意饱啖瓜果凉热之物,久则脾胃虚弱,肾水耗去,则三伏之时,全无气力,悠悠忽忽,惟思睡眠,懒于言语;或梦遗不已,或夜热不休。

70542 健脾异功丸

【方源】《疡医大全》卷二十六。

【组成】人参(去芦)一两 子白术(东壁土炒)三两 白茯苓(饭上蒸)二两 粉甘草(蜜炙)五钱 广陈皮(饭上蒸)二两 制半夏(姜汁炒)二两 六神曲(炒)一两五钱 薏苡仁(炒)二两 陈枳壳(麸炒)一两五钱 泽泻(盐水炒)一两 五谷虫(新瓦焙)二两 怀山药(炒黄)二两 谷芽(炒香)一两 菟丝饼(命火衰微始用) 鸡肫皮(新瓦焙)二两

【用法】上为细末,水为丸,如绿豆大。每服二钱,每晚白汤送下。

【主治】妇女脾胃失调,饮食不进,面目痿黄,肌肤消瘦。

70543 健脾阳和膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参二两 子术一两(炒) 茯苓

二两(研) 枇杷叶二两(制,去毛) 枳壳一两五钱(炒) 桔梗一两(苦) 木香一两(研) 草豆蔻一两二钱(研) 三仙四钱(炒黄) 辛夷一两 陈皮一两五钱 紫苏叶一两五钱 羌活一两五钱

【用法】共以水熬透,去滓,再熬浓,炼蜜为膏。每用四钱,白水冲服。

【功用】温运脾阳。

【主治】脾胃病。

70544 健脾豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】白豆蔻仁二分 枳壳(去瓤,麸炒) 陈皮(汤浸,去白,焙)各二两 诃黎勒(煨,取皮)一两 桂(去粗皮)一两 当归(切,焙)三分 干姜(炮制)半两 丹砂(细研)一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心、食前煎生姜、橘皮汤送下。

【主治】上气,脾胃虚弱,心腹疼痛,胁肋胀满,或时便泄。

【备考】本方方名,《普济方》引作“豆蔻丸”。

70545 健脾利水汤

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】白术 茯苓 泽泻 肉果 陈皮 甘草 川芎 当归

【主治】产后泻。

【加减】寒痛泻水,加砂仁、炙姜;热痛泻,加黄连;泻久脱肛,加升麻;水泻,完谷不化,加砂仁、麦芽;积食而泻,加山楂、砂仁、麦芽。

70546 健脾利水汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 茯苓各一钱(一方用皮) 白术(土炒) 当归(酒洗)各二钱 川芎 大腹皮(黑豆水制,净) 紫苏 陈皮各八分 炙草三分

【用法】加生姜皮一片,水煎服。

【主治】孕妇脾胃气虚或久泻所致面目虚浮。

70547 健脾补肾汤

【方源】《古今名方》引关幼波方。

【组成】党参 川续断各15克 白术 茯苓 白芍 当归 五味子 菟丝子各12克 川厚朴 香附各9克

【功用】健脾补肾。

【主治】慢性、迁延性肝炎,早期肝硬化,肝功能长期不正常,证属脾肾两虚者。症见午后腹胀,食欲不振,下肢轻度浮肿,腰腿痠痛,足跟痛,体倦无力,大便溏泻,小便多,舌苔薄白或无苔,或舌体胖边有齿痕,脉沉细滑。

【加减】腹泻,加苍术、芡实、诃子肉各9克;腰腿痛,足跟痛,加牛膝、生薏苡仁、仙灵脾各12克;夜尿多,加鹿角霜、女贞子各12克;腹胀甚,加冬瓜皮12克,木香4.5克;肝区隐痛,加桑寄生15克,木瓜12克。

70548 健脾补胃丸

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】山楂三两(去核,微炒) 白芍药一两七钱(冬月酒润,炒;余月酒润,晒干) 白术四两(去须土) 广陈皮一两七钱(去白) 贝母一两(去心)

【用法】上为极细末,以神曲水调,熬作糊为丸,如绿豆大,晒干。每服三四十丸,食远滚水下,或清米饮送下。

【功用】健脾补胃。

70549 健脾和胃汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】条参一钱 白术 茯苓 六曲 砂仁 陈皮 怀药 枣皮 芡实 车前各一钱半 青皮一钱 建泻一钱 甘草三分

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【主治】酒伤瘦弱,饮食减少,四肢麻木。

70550 健脾肥儿丸

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】人参 白术 茯苓 山药 芡实 莲肉 扁豆 山楂 麦芽 神曲 黄连 连翘 泽泻各一两 甘草 砂仁各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。清米汤化下。

【功用】健脾。

70551 健脾肥儿丸

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】人参五钱 黄耆（蜜水炒）一两 神曲（炒） 山楂肉各二两 白扁豆（炒） 白术（米泔水浸，炒） 白茯苓 山药各一两 甘草 白芍（酒炒） 地骨皮各六钱 川黄连三钱 当归 百合各八钱 橘红 陈皮各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后开水化服。

【主治】小儿疳后失调，体瘦气虚，或成疳疾，或泄泻。

70552 健脾肥儿丸

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】人参二两 于术一两五钱 云苓一两 炙草五钱 广皮一两 薏仁二两 建莲五钱 扁豆一两 山药一两五钱 山楂十两 神曲 麦芽各二两 泽泻三钱 芡实一两 藿香三钱 桔梗三钱 炮姜二钱 糯米四两 白糖十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，早、晚开水送下。

【主治】消化不良，脾胃虚弱。

70553 健脾肥儿丸

《全国中药成药处方集》（昆明方）。为原书“肥儿丸”之异名。见该条。

70554 健脾胜湿汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱 黄耆八钱 地肤子三钱（炒） 茵陈三钱 黄柏三钱 蒺藜三钱（炒） 荆子三钱 防风二钱 生石膏六钱 大贝三钱 苍术三钱（炒） 白芷二钱 五加皮三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】倒睫拳毛症（眼睑内翻倒睫）。两眼赤酸，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫拳毛刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

【临证举例】倒睫拳毛 余江尹某某，女，素患目疾，不避风沙，不忌酸辣，久则酸涩流泪，睫毛即倒，一九五八年来我院就诊。按其脉，他脉皆平，惟太阴细数。此是脾蕴湿热，上冲于脑，以致倒睫，刺激目珠，而生翳膜。先将攒竹、鱼腰略刺，内服健脾胜湿汤，七剂而轻；又加细辛二钱，川芎三钱，连服十余剂而痊愈。

70555 健脾养胃丸

【方源】《摄生秘剖》卷二。

【组成】人参五钱 白术（土炒） 白茯苓 广陈皮 当归（酒洗） 白芍药（炒） 麦芽（炒）各一两 木香五钱 半夏曲一两 山药二两 枳实五钱

【用法】上为末，陈米糊为丸，如椒目大。每服三钱，食后白汤送下。

【主治】脾胃虚弱。

【方论选录】人参、白术以益其气，当归、白芍以滋其血，木香、陈皮以利其滞，麦芽、枳实以消其积，半、苓、山药以燥其湿。湿者燥之，积者消之，滞者利之，血主濡之，气主呵之，则不刚不柔，无过不及之患。脾胃既得其养，又安有不强健者哉。

70556 健脾养胃汤

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】大参 白术 黄耆 归身 白芍 陈皮 小茴 山药 云苓 泽泻

【用法】河水煎服。

【功用】调理脾胃。

70557 健脾祛风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】苍术9克 陈皮6克 茯苓9克 泽泻9克 荆芥9克 防风9克 羌活9克 木香3克 乌药9克 生姜3片 大枣5枚

【功用】健脾理气，祛风散寒。

【主治】肠胃型荨麻疹。

70558 健脾除湿汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生薏米五钱至一两 生扁豆五钱至一两 山药五钱至一两 芡实三至五钱 枳壳三至五钱 萆薢三至五钱 黄柏三至五钱 白术三至五钱 茯苓三至五钱 大豆黄卷三至五钱

【功用】健脾除湿利水。

【主治】慢性湿疹，渗出较多；慢性下肢溃疡（湿赚疮），慢性足癣（脚气）渗出液较多者；下肢浮肿，盘状湿疹（病疮）。

70559 健脾除湿汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】茯苓皮 白术 黄芩 山梔 泽泻 茵陈 枳壳 生地 竹叶 灯心 甘草

【功用】健脾除湿。

【主治】脾虚湿盛而致掌跖发疱；脾虚湿恋而致皮肤皲裂。

70560 健脾消食汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎二钱 当归五钱 神曲 麦芽各六分 炮姜 炙草各四分 桃仁十个 山楂 砂仁各五分

【主治】伤食痛。

【加减】伤寒物，加吴萸一钱，肉桂五分；虚人，加人参。

70561 健脾消食汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参二钱 当归三钱（酒洗） 川芎 神曲（炒）各一钱 白术一钱五分（土炒） 山楂 砂仁各六分 麦芽 炙草各五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后块痛已除，停食痞塞。

70562 健脾润肤汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】党参 茯苓 苍白术 当归 丹参 鸡血藤 赤白芍 陈皮

【功用】健脾燥湿，养血润肤。

【主治】脾虚血燥皮肤肥厚。

70563 健脾资生丸

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】潞党参三两 炒白扁豆一两五钱 豆蔻仁八钱 川黄连（姜汁炒）四钱 炒冬术三两 莲子肉 六神曲 白茯苓 广橘红各二两 山楂肉（蒸） 炙甘草 芡实各一两五钱 广藿香一两 炒麦芽 怀山药各二两 春砂仁一两五钱 桔梗一两 炒薏仁米一两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，或水为丸。每服二至三钱，米饮汤或开水送下；妇人淡姜汤送下。

【功用】健脾开胃，消食止泻，调和脏腑，滋养营卫。

【主治】胃脾虚弱，食不运化，胸脘饱满，面黄肌瘦，大便溏泄，以及妇人妊娠呕吐，小儿疳积，神疲便溏。

70564 健脾理中汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】人参 白术 白苓 白芍（酒炒） 陈皮 苍术 炮姜 升麻 甘草 肉蔻（煨） 诃子（煨，去核）

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】脏寒泄泻，完谷不化。

70565 健脾渗湿汤

【方源】方出《邹云翔医案选》，名见《古今名方》。

【组成】生黄耆 30 克 青防风 9 克 防己 9 克 白术 15 克 茯苓皮 30 克 大腹皮 12 克 陈广皮 9 克 生姜皮 9 克 炙桂枝 5 克 淡附片 15 克

【功用】补气行水，健脾渗利，温阳化气。

【主治】水湿泛滥（慢性肾炎）。

【临床举例】水湿泛滥（慢性肾炎） 戈某，男，30 岁，1943 年夏季初诊。患者于 1942 年坐卧湿地达数月之久，又曾冒雨长途跋涉，致体惫劳倦，常觉乏力。至冬春之交，先感

手部发紧，两腿重胀，眼皮下垂，继则出现浮肿，其势日甚，体力遂虚，当时曾至某医院诊治，诊断为肾炎。延至1943年夏季，周身浮肿，病情危重，遂入某疗养院治疗。尿检蛋白(卅)至(卅)。给利尿剂，并严格控制饮水，但瘦量仍极少，肿势不减，两手肿如馒头，小脚按之凹陷不起，气急腹膨，翻身时自觉胸腹有水液振移感，检查胸、腹腔有积液。治疗无效。诊时患者头面胸腹四肢皆肿，尿量每日100毫升左右，病势危急。切其脉沉细，但尺脉有根。拟健脾渗湿汤，药服一剂后，尿量增至每日约400毫升；2剂后，尿量增至每日近1000毫升；8天后，胸、腹水基本消失；20剂后，浮肿明显消退，于2个月后消尽。后以济生肾气丸服用数月，并嘱进低盐、高蛋白饮食调理。随访35年，未曾反复。

70566 健脾渗湿饮

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【组成】人参 白术 苍术 防己(酒拌) 黄柏(炒) 川芎 陈皮 当归 茯苓各五分 木瓜(不犯铁器) 柴胡梢 甘草各三分

【用法】加生姜，水煎服；如三五剂不退，加桂少许，酒煎亦可。

【主治】小儿疮疡初起，焮肿作痛，或湿毒下注，或环跳穴痛。

【加减】小便涩，加牛膝；身痛，加羌活。

70567 健脾温中丸

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参二两 白术一两(土炒) 云苓一两 炮姜五钱 附子五钱 橘红五钱 杏仁一两(炒) 法夏一两 归身一两 川芎五钱(炒) 炙草五钱 紫菀八钱(炙) 上元桂五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，每天早、晚开水送下。

【功用】温补。

【主治】年老天凉咳嗽，或久病气虚咳嗽，

属脾胃虚寒者。

70568 健脾解毒汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】白术 苡仁 扁豆(炒) 银花 连翘 丹皮 当归 陈皮 川贝母 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘症阴症，结痂收靥后。

70569 健脾解毒汤

【方源】《痧疹辑要》卷二。

【组成】炒黄连七分 泽泻八分 山药八分 甘草五分 炒扁豆一钱五分 白芍(酒炒)六分 茯苓八分 木香一分 山楂肉一钱 丹皮七分 白术七分(炒) 陈皮五分

【主治】痧后肺经余毒流注大肠，或饮食失调所致之痢疾下红白。

【加减】无黄连，加蜜水炒黄柏；身体虚弱，面青唇白，加沙参三分，晚米二钱。

70570 健脾增力丹

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】陈皮 厚朴 苍术 神曲 麦芽 山楂各一斤 甘草 黑豆各半斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱。

【功用】健脾开胃，利湿和中。

70571 健脾固本药酒

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【异名】福寿药酒。

【组成】当归二斤 川芎八两 白芍四两 酒地四两 党参六两 白术四两 广皮八两 佛手一斤 红花八两 桃仁四两 玄胡四两 吴萸四两 丁香二两 紫蔻二两 良姜四两 檀香二两 香附八两 小茴香四两 川牛膝八两 杜仲四两 续断四两 秦艽四两 独活四两 北细辛二两 麻黄六两 寄生四两 虎骨四两 枸杞四两 大云四两 玉竹八两 远志四两 枣仁四两 天冬四两 麦冬四两 杏仁四两 五味子四两 广木香二两 藿香四两 台乌四两 白芷四两 乳香四两 没药四两 川朴八两 加皮八两 官桂四两 花椒二两 甘草四两 砂仁四两 木瓜四两

【用法】上为粗末，用白烧酒一百零四斤，蜂蜜八十斤，开水五十六斤，熬药，每料分作八料，药二斤，烧酒十三斤，蜂蜜十斤，开水七斤。成人每服五钱，每日早、晚温服。

【主治】男妇痰喘，咳嗽气急，两肋膨胀，心口、腰腿痛，女人经水不调，肚腹胀满，肚腹寒冷。

【宜忌】孕妇忌服，忌食生冷。

70572 健脾化食散气汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】白术二钱 当归二钱 川芎一钱 黑姜四分 人参二钱 陈皮三钱

【功用】补气血，调肝顺气，健脾消导。

【主治】妇人受气伤食，无块痛者。

【加减】伤面食，加神曲、麦芽；伤肉食，加山楂、砂仁；伤寒冷之物，加吴萸、肉桂；产母虚甚，加人参、白术。

70573 健脾利水生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 茯苓一钱半 归身二钱 黑姜四分 陈皮五分 炙草五分 人参三钱 肉果一个(制) 白术一钱(土炒) 泽泻八分

【主治】妇人产后块已除，患泻症。

【加减】寒泻，加干姜八分；寒痛，加砂仁、炮姜各八分；热泻，加炒黄连八分；泻水腹痛，米饮不化，加砂仁八分，麦芽、山楂各一钱；泻有酸暖臭气，加神曲、砂仁各八分；泻水者，加苍术一钱。

70574 健脾利水生化汤

【方源】《胎产新书》。

【组成】川芎 茯苓各二钱 当归四钱 姜炭 炙甘草各五分 桃仁十粒 莲子八粒

【主治】妇人产后血块已消，患泻。

70575 健脾利水补中汤

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】人参 白术 茯苓 白芍 陈皮 木瓜 紫苏 苍术 厚朴 大腹皮

【主治】产后水肿。

70576 健脾消食生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎一钱 人参 当归各二钱 白术一钱半 炙草五分

【主治】妇人产后伤食，血块已除。

70577 健脾化痰开郁行气丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】南星(姜煮) 大半夏(姜矾煮) 各四两 陈皮四两 苍术(泔浸，炒) 白术(炒) 芍药(炒) 各四两 香附米(童便浸，炒) 梔子(炒) 桔梗仁(炒) 茯苓 贝母(去心) 各三两 枳实 神曲(炒) 山楂(去核) 地黄(酒) 归身(酒洗) 川芎 黄连(炒) 甘草(炒) 黄芩(炒) 各二两

【用法】蒸饼为丸。温水送下。

【功用】健脾化痰，开郁行气。

衄

70578 衄血丸

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】牡丹皮 白芍(酒炒) 黄芩(酒炒) 蒲黄(炒) 侧柏叶

【用法】上为末，糯米糊为丸。每服一百丸，空心白汤送下。

【主治】妇人妊娠过食辛热之物，血热妄行冲伤胞络，衄血，常从口鼻中出。

射

70579 射干丸

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】射干二两 豉三合 芎藭 杏仁(去尖皮) 各一两 犀角一两(屑) 升麻二两 甘草一两(炙)

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸。含之，稍稍咽津，每日五六次。

【主治】喉痹塞。

【宜忌】忌海藻、菰菜。

70580 射干丸

【方源】《外台》卷十八引《广济方》。

【组成】射干六分 昆布八分(洗) 通草四分 犀角六分(屑) 杏仁一分(去皮尖,熬) 汉防己八分 茯苓六分 青木香八分 旋覆花四分 白头翁四分 独活六分 葶苈子八分(熬)

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,以酒送下,一日二次;不利,空腹服;煮槟榔桑根皮送下。

【主治】肾虚风,脚气冲心,疝气下坠,小便数,膝冷腰疼,时时心闷,气急欲绝,四肢无力。

【宜忌】忌生菜、热面、荞麦、蒜、炙肉、粘腻、醋物。

70581 射干丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】射干一两 川升麻一两 礞砂半两(研) 甘草半两(炙微赤,锉) 豉心二合(微炒) 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,细研)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如小弹子大。每服含一丸,咽津。

【主治】热病,脾肺壅热,咽喉肿塞,连舌根痛。

70582 射干丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】射干半两 山柑皮半两 山豆根二分 黄药一分 川升麻半两 消石一分 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼饴为丸,如樱桃大。绵裹一丸,含化咽津,不拘时候。

【主治】咽喉生谷贼肿痛。

70583 射干丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】射干一两 半夏(汤洗十遍,晒干)一两一分 干姜(炮裂) 款冬花(去萼,焙干) 皂荚(去皮子,炙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两 百部(焙干) 五味子(拣净)各一两一分 细辛(去苗叶) 贝

母(去心,炒令微黄) 白茯苓(去黑皮) 郁李仁(汤退,去皮尖双仁,研如脂)各一两

【用法】前十一味为末,与郁李仁同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七丸,稍加至十五丸,空腹饮下,一日二次。

【主治】久患呬嗽,喉中作声,发即偃卧不得。

70584 射干丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】射干 昆布(洗去咸) 海藻(洗去咸)各二两 木香 黄芩(去黑心) 犀角(屑)各三分 芍药 连翘 白薇各半两大黄(锉,炒) 乌蛇(酒浸,去皮骨)各二两 玄参一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后温酒送下,日三夜一。

【主治】风热毒瘰癧,久不愈,恶寒壮热,劳动转甚,渐成瘰者。

70585 射干丸

【方源】《普济方》卷六十二引《济生》。

【组成】射干(麸炒黄) 杏仁(麸炒黄) 玄参(一方作人参) 附子(炮,去皮脐) 桂心(不见火)各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头大。每服一丸,以新绵裹,噙咽。

【主治】肿塞咽门不能咽。

70586 射干丸

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【组成】射干 甘草(炙) 杏仁(汤浸,去皮尖及双仁,麸炒微黄)各半两 木鳖子 川升麻 川大黄(微炒)各一分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如小弹子大。常含一丸,咽津。

【主治】悬痈肿痛,咽喉不利。

70587 射干汤

【方源】《普济方》卷六十一引《肘后方》。

【组成】射干(锉细)

【用法】每服五钱匕,以水一盏半,煎至八分,去滓,入蜜少许,旋旋服。

【主治】喉痹。

70588 射干汤

【方源】《外台》卷二引《小品》。

【组成】射干二两 半夏五两(洗) 杏仁二两(去皮尖两仁) 干姜二两(炮) 甘草二两(炙) 紫菀二两 肉桂二两 吴茱萸二两 当归二两 橘皮二两 麻黄二两(去节) 独活二两

【用法】上切,以水一斗,煮取三升,去滓,温分三服,始病一二日者,可服此汤,汗后重服,勿汗也;病久者,初服可用大黄二两。

【主治】春冬伤寒,秋夏中冷咳嗽,曲拘不得气息,喉鸣哑失声,干嗽无唾,喉中如哽者。

【加减】初秋夏月暴雨冷,及天行暴寒,热伏于内,去茱萸、干姜,加生姜四两,枳实二两(炙)。

【宜忌】忌羊肉、海藻、菰菜、饧、生葱。

70589 射干汤

【方源】《外台》卷二十三引《经心录》。

【组成】射干 桂心各二两 麻黄(去节) 生姜 甘草(炙)各四两 杏仁四十个(去皮尖)

【用法】上切,以水四升,煮取三升,去滓,分三服。

【主治】恶毒,身强痛,瘰癧。

【宜忌】忌生冷、菰菜、海藻、猪肉、冷水、生菜、五辛。

70590 射干汤

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】当归二两 升麻一两 白芷三两 射干 甘草(炙) 犀角(屑) 杏仁(去皮尖)各一两

【用法】上切,以水八升,煮取一升半,分服。

【主治】①《外台》引《古今录验》:喉痹,闭不通利而痛,不得饮食者。②《医林绳墨大全》:呕吐咯伤,或因食恶物及谷芒刺涩,风热与气血相搏,而致咽喉肿痛者。

【宜忌】忌海藻、菰菜。

70591 射干汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】射干一两 半夏五枚 桂心五寸 麻黄 紫菀 甘草 生姜各一两 大枣二十枚

【用法】上咬咀,以水七升,煮取一升五合,去滓,纳蜜五合,煎一沸,分温服二合,每日三次。

【主治】小儿咳逆,喘息如水鸡声。

【方论选录】《千金方衍义》:此于《金匱》射干麻黄汤中除去细辛、款冬、五味,易入桂心、甘草、蜂蜜。虽主治与《金匱》无异,而桂心和荣,较细辛搜肺之力稍缓;甘草和胃,较五味收津之味稍平;蜂蜜润燥,较款冬散结之性稍和。

70592 射干汤

《外台》卷十六。即《千金》卷十五“射干煎”。见该条。

70593 射干汤

【方源】《普济方》卷十六〇引《指南方》。

【组成】射干 麻黄(去节)各半两 五味子一两 半夏(泡)一两 款冬花二两 甘草半两

【用法】上为散。每服五钱,水二盏,加生姜五片,煎至一盏,去滓,食后服。

【主治】肝咳。咳则两胁痛,甚则不可转侧,转侧则两肋下痞满,恶风脉浮。

70594 射干汤

【方源】《普济方》卷四十一引《护命》。

【组成】射干 黄芩(去黑心) 麦门冬(去心,焙) 大黄(锉,焙) 知母 木通(锉)各等分

【用法】上为散。每服三钱匕,水一盏,入葱白五寸(切碎),同煎至八分,去滓,食后温服,以利为度。若三服以上未通,急煎芎藭汤一盏,投之即下,自早至夜可两服。

【主治】小肠实热,小便赤涩,疼痛不可胜忍。

【宜忌】不可常吃。

70595 射干汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】射干 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两 半夏（汤洗，去滑，炒） 甘草（炙，锉） 桔梗（炒）各三分 桑根白皮 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙）各一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 紫菀（去苗土）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分（拍碎），大枣三枚（擘破），同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】春、冬伤寒，秋、夏中冷，咳嗽喉鸣，声嘎干涩，喉中不利。

70596 射干汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】射干 木通（锉） 升麻各一两 桔梗 玄参 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒咽喉闭塞，痛，咳嗽多腥气。

70597 射干汤

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】射干八两 大青三两 石膏（碎）十两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，入蜜一匙头，水一盞半，同煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾实，咽干口燥，舌本肿强，腹胁满胀，大便涩难。

70598 射干汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】射干 升麻 枳壳（去瓤，麸炒） 大黄（制，炒）各一两 羚羊角（镑） 柴胡（去苗） 木通（锉） 玄参 甘草（炙）各半两 龙胆 马牙消各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入竹叶二七片，同煎至七分，去滓，放温食

后服。

【主治】中焦热结，唇肿口生疮，咽喉壅塞，舌本强硬，烦躁昏倦。

70599 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】射干 木通（锉） 大黄（锉，炒） 马蔺子各一两半 漏芦（去芦头） 升麻 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，分温服，日三夜二。

【主治】木舌肿强，及天行病，丹石发动，一切热毒。

70600 射干汤

《圣济总录》卷一二二。为《圣惠》卷四十二“麻黄散”之异名。见该条。

70601 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】射干 升麻各三分 桔梗（锉，炒）一两 玄参 木通（锉）各三分 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】咽喉生谷疔，咽物妨闷。

【加减】如要通利，加大黄一两，以利为度。

70602 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】射干半两 升麻 大黄（锉，生用） 恶实（生用）各一两 马蔺子（炒）半两 木通（锉）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，竹叶七片，煎至七分，去滓，下马牙消半钱匕，搅令匀，细细温服，不拘时候。

【主治】喉痛，咽嗑肿塞，及心肺热极，吐纳不利。

70603 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】射干 升麻 紫菀（去苗土） 百合各半两 木通（锉）一两 桔梗（炒） 赤

茯苓(去黑皮)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】咽喉中如有物，噎塞不下。

【加减】如要通利，每服加朴消末一钱匕，去滓后，搅匀服之。

70604 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【异名】大射干汤(《疡医大全》卷二十一)。

【组成】射干(去毛) 梔子仁 赤茯苓(去黑皮) 升麻各一两 赤芍药 白术各一两半

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入生地黄汁一合，蜜半合，再煎三沸，温服，每日二次，不拘时候。

【主治】荣卫不流，热聚胃口，血肉腐坏，胃脘成痈。

70605 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】射干 犀角(镑) 升麻 玄参 黄芩(去黑心) 麦门冬(去心，焙) 大黄(锉，炒)各一两 山梔子仁半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加淡竹叶二七片，煎至八分，入芒消末一钱匕，去滓，空心温服。快利三两行为度；未利再服。

【主治】①《圣济总录》：初发背上，似琴弦抽痛，有头。②《外科大成》：痈疮肿痛，脉洪实数者。

70606 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】射干(去须) 玄参(坚者)各二两 连翘 犀角(镑) 紫檀香 沉香(锉) 升麻各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入芒消末半钱匕，更煎沸，食后、夜卧温服；若利即减。

【主治】诸风肿欲成脓。

70607 射干汤

《圣济总录》卷一七四。为《圣惠》卷八十四“射干散”之异名。见该条。

70608 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】射干 半夏(汤浸洗七遍，焙)各一两 桂(去粗皮)一两半

【用法】上为粗末。五六岁儿，每服一钱匕，水一盞，加生姜少许，煎至四分，去滓温服。

【主治】小儿上气喘息，如水鸡声。

70609 射干汤

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】射干 升麻 百合 木通(锉) 桔梗(炒) 甘草(炙)各一分

【用法】上为粗末。每用一钱匕，以水七分，煎至四分，去滓，下马牙消末半钱匕，搅匀，食后细细温呷。

【主治】小儿喉痹，咽喉旁肿如痈子，身体壮热。

70610 射干汤

【方源】《幼幼新书》卷三十四引张涣方。

【组成】射干 川升麻各一两 马牙消 马勃各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，煎至五分，去滓放温，食后带热服。

【主治】小儿风热上搏于咽喉之间，血气相搏而结肿，乳食不下。

70611 射干汤

《得效》卷十一。为《小儿痘疹方论》“射干鼠粘子汤”之异名。见该条。

70612 射干汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【组成】射干二钱半 芍药二钱半 薏苡仁三钱 桂心半钱 牡蛎二钱 石膏二钱

【用法】上作一服，水二钟，煎至一钟服，不拘时候。

【主治】肝经受病，多汗恶风，善悲嗔干，善怒时憎。

70613 射干汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】射干 豆根 玄参 犀角 银花
(或加甘草、桔梗)

【主治】内火喉痹，赤肿成痈。

70614 射干汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】射干一钱 防风 荆芥 桔梗
薄荷各一钱 大力子一钱半(焙，研) 广
皮八分 甘草三分

【用法】加灯心一握，生姜一片，水煎服。

【主治】喉痹。

【加减】火甚，加玄参、天花粉；肺虚，加
川贝母、茯苓。

70615 射干汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】射干 豆根 连翘 大力 玄参
荆芥 防风 桔梗 甘草 竹心

【主治】喉症实证，痛而不肿。

70616 射干饮

【方源】方出《肘后方》卷七，名见《圣济总
录》卷一四九。

【异名】射干散(《普济方》卷三〇八)、和气
散(《普济方》卷三〇八)。

【组成】升麻 乌翼各二两

【用法】水三升，煮取一升，尽服之；滓敷
疮上。不愈更作。

【主治】卒中射工水弩毒。

70617 射干饮

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】射干 木香 赤茯苓(去黑皮)
人参各一两半 陈橘皮(汤浸，去白)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，
加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前温服，如
人行五里再服。

【主治】脚气，咽塞胸满，不下食，呕哕。

70618 射干饮

《圣济总录》卷一三五。为《圣惠》卷六十四
“射干散”之异名。见该条。

70619 射干散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】射干一两 石膏一两 大青三分
葳蕤二分 赤茯苓二分 川升麻三分 黄芩
三分 独活半两 甘草半两(炙微赤，锉)
络石三分 杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸
炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，
入竹叶二七片，生地黄一分，生姜半分，煎
至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾实热，咽干头痛，心神烦渴。

【宜忌】忌炙爆、热面。

70620 射干散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】射干 枳壳(麸炒微黄，去瓤) 川
升麻 马牙消 木通(锉) 川大黄(锉碎，
微炒) 玄参各一两 犀角屑三分 甘草半
两(生用)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，
煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒毒气攻咽喉痛，心烦燥热，胸
膈滞闷，大小便难。

70621 射干散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】射干一两 杏仁五分(汤浸，去皮
尖双仁，麸炒微黄) 麻黄一两(去根节) 麦
门冬一两(去心) 贝母三分(煨令微黄) 百
合三分 甘草半两(炙微赤，锉) 赤茯苓
一两 枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，
加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时
候。

【主治】伤寒咳嗽，气促喉鸣，干咳无唾，
喉中如哽者。

70622 射干散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】射干 川升麻 麦门冬(去心)
甘草(炙微赤，锉) 犀角屑各三分 马蔺
根半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气热毒上攻，咽喉疼痛。

70623 射干散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】射干一两 川升麻一两 络石叶一两 前胡一两（去芦头） 百合一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 黄药一两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，胸中烦闷，咽喉肿痛，噎塞不通。

70624 射干散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】射干一两 赤芍药一两 川升麻二两 杏仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 牛蒡子一两 枫香一两 葛根二两（锉） 麻黄一两（去根节） 甘草二两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风毒攻咽喉，肿痛，水浆不下。

70625 射干散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】射干二两 川升麻一两 羚羊角屑半两 木香半两（锉） 赤芍药半两 络石一两 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生地黄一分，煎至六分，去滓温服，如人行五七里，再服，以利为度。

【主治】脾肺壅热，咽喉疼痛，胸膈壅滞，心烦躁赤，四肢不利。

70626 射干散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】射干一两 桂心一两 枳实三分 半夏三分（汤洗七遍，去滑） 诃梨勒皮二两 川升麻一两半 木通一两（锉） 前胡

三分（去芦头） 大腹皮三分（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉中如有物噎塞。

70627 射干散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】射干三分 漏芦三分 川升麻三分 当归半两 桂心半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 木通三分（锉） 马蔺子三分（微炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒攻心脾，致生木舌，肿痛，兼咽喉不利。

70628 射干散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】射干一两 犀角屑一两 玄参一两 川升麻一两 黄芩一两 甘草半两（生用） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 川芒消一两 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入蜜半分，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】乳石发热，上攻头面，及咽喉肿塞，四肢烦热，不下饮食。

70629 射干散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】射干一两 半夏一两（汤洗七遍，去滑） 赤茯苓一两 桔梗一两（去芦头） 青橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 桂心三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 甘草三分（炙微赤，锉） 大腹皮三分（锉） 前胡三分（去芦头） 桑根白皮三分（锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹痰壅，噎塞不下食。

70630 射干散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】射干一两 前胡半两(去芦头) 桔梗半两(去芦头) 款冬花半两 人参半两(去芦头) 赤茯苓半两 半夏半两(汤洗七遍,去滑) 黄芩半两 甘草半两(炙微赤,锉) 玄参半两 麦门冬半两(去心)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,食后温服。

【主治】上焦虚热,膈上有痰,气壅似噎。

70631 射干散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】射干一两 半夏三分(汤洗七遍,去滑) 甘草半两(炙微赤,锉) 诃黎勒皮三分 木通三分(锉) 枳实三分(麸炒微黄) 桂心三分 鸡舌香三分 紫苏子三分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服之,不拘时候。

【主治】膈气,咽喉噎塞,全不下食。

70632 射干散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】射干一两 川升麻一两 犀角屑一两 蓝叶一两 黄芩一两 栝楼根三两 沉香一两 地榆一两(锉) 川大黄二两(锉碎,微炒) 川朴消二两

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】渴利热盛,背生痈疽,烦热,肢节疼痛。

70633 射干散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】射干一两 川升麻一两 枳实一两(麸炒微黄) 川大黄一两(锉碎,微炒) 麝香一分(细研) 前胡一两半(去芦头) 犀角屑三分 羚羊角屑三分 甘草一两半(锉)

【用法】上为粗散,入麝香令匀。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】瘰疽。皮肉中忽生点子如麻豆,或大如桃李,肿痛不可忍。

70634 射干散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【异名】射干饮(《圣济总录》卷一三五)。

【组成】射干二两 商陆一两 附子一两(炮裂,去皮脐。以上三味捣罗为末) 赤小豆三合 麻子二合(研)

【用法】上药以水五大盏,先煮小豆、麻子令熟,去滓,取汁一小盏,每服调下前药二钱,一日三次,小便当利,即肿气渐消。

【主治】毒肿,发无定处,或恶气入腹,刺痛,烦闷不已。

70635 射干散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】射干半两 川升麻三分 人参三分(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮二分(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后伤寒,经数日后,胸中妨闷,咽喉噎塞,不能饮食。

70636 射干散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】射干一分 木通三分(锉) 麻黄一分(去根节) 桂心半分 川大黄一分(锉,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,分为二服,不拘时候。

【主治】小儿咳逆上气,大小便滞涩。

70637 射干散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】射干 麻黄(去根节) 紫菀(洗去苗土) 桂心各半两 半夏半分(汤洗七遍,去滑) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,加生姜少许,煎至五分,去滓,入蜜半茶匙,搅令匀,温服,不拘时候。

【主治】小儿咳嗽,心胸痰壅,攻咽喉作呀呷声。

70638 射干散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】射干汤 (《圣济总录》卷一七四)。

【组成】射干半两 麻黄三分 (去根节) 桂心一分 甘草半两 (炙微赤, 铍) 杏仁半两 (汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 川升麻半两 赤芍药半两 石膏半两

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿四五岁伤寒, 壮热头痛。

70639 射干散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】射干 川升麻 百合 木通 (铍) 桔梗 (去芦头) 甘草 (炙微赤, 铍) 各一分 马牙消半两

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿脾肺壅热, 咽喉肿痛痹。

70640 射干散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】射干半两 川升麻半两 麦门冬半两 (去心, 焙) 黄连 (去须) 犀角屑 子芩 甘草 (炙微赤, 铍) 各一分 柴胡半两 (去苗)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿肺心壅热, 鼻干无涕, 咽喉不利, 少欲乳食。

70641 射干散

【方源】《普济方》卷二十八引《护命》。

【组成】射干 杏仁 (去皮尖双仁, 炒) 麻黄 (去根节, 煮, 去浮沫) 紫苏子 (炒) 羌活 (去芦头) 甘草 桔梗 牡丹皮 柴胡 (去苗) 枇杷叶 (去毛) 各等分

【用法】上为粗末。每服二钱, 水一盏, 加生姜二片, 同煎取八分, 食后、临卧服。

【主治】肺脏积热, 才食辛酸热毒之物, 即咽中痰壅。

70642 射干散

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】射干 桂 (去粗皮) 牛膝 (酒浸,

切, 焙) 牡丹皮 鳖甲 (醋炙, 去裙襕) 牵牛子 (炒) 大黄 (铍, 炒) 各半两 荆芥穗 细辛 (去苗叶) 各一分 半夏 (为末, 用生姜汁和成饼) 狼毒 芫花 (与狼毒同用醋炒焦色) 各一钱

【用法】上为细散。每服一钱匕, 食后煎葱汤调下。一二服内如毒已下, 即不用服。

【主治】肝脏积热, 气滞血涩, 或因食酸物过多, 肝中血积不散, 气血俱病, 两胁下非时气动, 每动左胁下有声, 右胁相应, 日渐胃脘结块, 使人心腹满闷, 上冲咽喉, 头目不利, 睡不安, 如虫所啮, 服泻肝汤数日后, 病势不减者。

70643 射干散

《御药院方》卷九。为《圣惠》卷三十五“犀角散”之异名。见该条。

70644 射干散

《普济方》卷三〇八。为方出《肘后》卷七, 名见《圣济总录》卷一四九“射干饮”之异名。见该条。

70645 射干散

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【组成】射干 天竺黄 (研) 马牙消 (研) 各一两 犀角屑 玄参 川升麻 白矾 白药 黄药 甘草 (炙) 各半两

【用法】上为细末, 研匀, 炼蜜为丸, 如小弹子大。以绵裹一丸, 含咽津, 不拘时候。

【主治】悬痈肿痛, 咽喉不利, 胸中烦热。

70646 射干散

【方源】《寿世保元》卷六引吴绍源方。

【组成】升麻 桔梗 射干 昆布 连翘 甘草

【用法】上铍。水煎, 热服。汗出立愈。

【主治】耳肿作痛, 牙关紧急, 乍寒乍热, 饮食不下; 面肿牙痛, 咽喉痛。

70647 射干散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】射干 玄参各一钱半 牛蒡子一钱 升麻八分 桔梗 甘草各一钱

【用法】水煎服。

【主治】咽喉肿痛。

70648 射干煎

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】射干八两 紫菀半两 胶饴五两 细辛半两 干姜五两(末) 生竹沥一升 芫花根半两 桑根白皮 款冬花各八两 附子半两(炮) 甘草半两(炙) 白蜜一升半

【用法】上先切射干,合蜜、竹沥汁,煎五六沸,绞去滓,咬咀诸药,以水一升四合,渍一宿,煎之,七上七下,去滓,乃合饴、姜末煎,令如饴。每服酸枣一丸许,日三夜一,不知,稍增之。

【主治】咳嗽上气。

【宜忌】忌海藻、菰菜、猪肉、冷水、生菜。

【方论选录】《千金方衍义》:用附子摄肾归源,细辛下通肾气,射干上散肺结,款冬花、紫菀滋燥润肺,姜汁开发桑皮、竹沥之性,流动胶饴、白蜜之滞也。

70649 射干煎

【方源】《千金》卷十五。

【组成】射干八两 大青三两 石膏十两(一作一升) 赤蜜一升

【用法】上咬咀。以水五升,煮取一升五合,去滓,下蜜,煎取二升,分三服。

【主治】①《千金》:舌本强直,或梦歌乐而体重不能行。②《圣济总录》:脾实,咽干口燥,舌本肿强,腹胁满胀,大便涩难。

【方论选录】《千金方衍义》:射干苦寒有毒而能解毒,为喉痹咽痛专药,舌本强直,亦宜用之,以其能破宿血散结气也;大青解心下热毒,泻肝胆实火,正所以祛心胃之邪热;石膏治心下逆气,舌焦不能息,腹中坚痛,肢体沉重;赤蜜主心腹邪气,止痛解毒,且能安五脏,和百药。

【备考】本方方名,《外台》引作“射干汤”。

70650 射干煎

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】射干一两 川升麻一两 犀角屑

一两 当归一两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末。以猪脂半斤,微火煎三上三下,去滓,入白蜜四两,搅令匀,以瓷盒盛,每取杏子大,绵裹含咽津。以利为度。

【主治】咽喉风热不利,疼痛,咽干舌涩。

70651 射干煎

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】生射干 猪脂各半斤

【用法】合煎令射干色微焦,去滓。取一枣大,绵裹,含,稍稍咽之。

【主治】伤寒喉中痛,闭塞不通。

70652 射干膏

《圣济总录》卷一二二。为《千金》卷六“乌蜜膏”之异名。见该条。

70653 射干膏

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】射干 升麻 梔子仁 玄参 小豆卷各一两半 黄柏(去粗皮)二两 赤蜜地黄汁各三合 大枣(去核)十枚

【用法】除蜜并地黄汁外,上锉细,如麻豆大,以水五升,煎至一升半,去滓,下蜜与地黄汁,慢火煎成膏。细细含化咽津。

【主治】咽干,口疮,牙痛,心肺热盛。

70654 射老丸

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】蝉壳 当归 柴胡 荆芥各二两五钱 苦参三两 防风三两 全蝎四两 川芎一两五钱 独活一两六钱 羌活二两

【用法】上晒,研为末,每药末一两,加大枫子肉一两六钱,为末,赤米糊为丸,如梧桐子大,西洋珠为衣。每服八九丸,白汤送下,每日三次。三日后,其腿下黑紫块上污皮渐好;十日后,即服利药(江霜一钱,牙皂末三钱。饭为丸,如萝卜子大。每服二丸,白汤送下)一次,每月利三次。

【主治】癩风。变形败体,一切恶症。

70655 射罔散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】射罔不拘多少

【用法】上为末。以唾调敷肿上。血出即愈。

【功用】去毒。

【主治】蛇咬出血。

70656 射脓丸

《外科精义》卷下。为《圣济总录》卷一三八“射疮坏脓丸”之异名。见该条。

70657 射脓散

《外科启玄》卷十一。为《瑞竹堂方》卷五“透脓散”之异名。见该条。

70658 射影丸

【方源】《医略十三篇》卷十二。

【组成】香白芷一两 大贝母一两 生甘草五钱 大蒜头一两 青黛一两 明雄黄五钱 犀角五钱 山慈姑一两 苍耳子一两 厚朴一两 紫背萍一两 射干一两 白知母一两 枯矾末五钱 朱砂五钱 紫菀茸一两 槟榔一两 雷丸一两 琥珀五钱 龙齿五钱 鬼箭羽一两 羚羊角五钱 草果仁五钱 麝香五钱

【用法】上为细末，水为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】射干沙虱毒，但手足逆冷，甚至手足麻木不仁，冷过肘膝。

70659 射干牛蒡汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十。

【异名】射干鼠粘子汤(《麻科活人》卷四)。

【组成】射干 山豆根各一钱二分 牛蒡 紫草 紫菀各一钱 桔梗 木通 石膏各八分 升麻 蝉退各九分 甘草五分

【主治】痘后声哑。

70660 射干连翘汤

《圣济总录》卷一二六。为《圣惠》卷六十六“连翘散”之异名。见该条。

70661 射干连翘散

《外科发挥》卷五。为《圣惠》卷六十六“连翘散”之异名。见该条。

70662 射干兜铃汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】鞠八(《痧症全书》卷下)、四十号蛊象方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】射干 桑皮 兜铃 桔梗 薄荷 玄参 花粉 贝母 枳壳 甘菊 金银花各等分

【用法】水二钟，煎七分，稍冷服；嗽甚，加童便饮。

【主治】痧似伤风咳嗽。

70663 射干消毒饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】射干 黑参 连翘 荆芥 鼠粘子各等分 甘草减半

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹咳嗽声痞，咽喉肿痛。

70664 射干麻黄丸

《全国中药成药处方集》(南昌方)。即《金匱》卷上“射干麻黄汤”改为丸剂。见该条。

70665 射干麻黄汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】紫菀散(《普济方》卷三八七)、麻黄射干汤(《不居集》上集卷十五)。

【组成】射干十三枚(一法三两) 麻黄四两 生姜四两 细辛 紫菀 款冬花各三两 五味子半升 大枣七枚 半夏(大者，洗)八枚(一法半斤)

【用法】以水一斗二升，先煎麻黄二沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】咳而上气，喉中水鸡声。

【方论选录】①《千金方衍义》：上气而作水鸡声，乃是痰碍其气，气触其痰，风寒入肺之一验。故子小青龙方中，除桂心之热，芍药之收，甘草之缓，而加射干、紫菀、款冬、大枣。专以麻黄、细辛发表，射干、五味下气，款冬、紫菀润燥，半夏、生姜开痰，四法萃于一方，分解其邪，大枣运行脾津以和药性也。②《金匱要略心典》：射干、紫菀、款冬降逆气；麻黄、细辛、生姜发邪气；半夏消饮气。而以大枣安中，五味敛肺，恐劫散之药并伤及其正气也。

【临证举例】①哮喘 《浙江中医杂志》

(1980;3:123);用射干麻黄汤加减治疗哮喘 12 例,均属寒饮为患。治疗后,5 例 3 年随访未见复发;3 例 2 年随访也得到控制;另 4 例治疗后复诊 1 次,复发轻微,续服原方 3 剂而愈。②小儿外感咳嗽 《成都中医学院学报》(1982;2:53);用射干麻黄汤治疗小儿外感咳嗽 71 例,均获痊愈,其中服药 2~3 剂者 50 例,3~4 剂者 14 例,5~6 剂者 7 例。典型病例:刘某,男,3 岁半。发烧 2 天,无汗,流清涕,咳嗽气紧,喉中痰鸣,有时咳吐清痰,口不干,舌微红,苔白薄,脉浮紧。处方:麻黄 6 克,射干、紫菀、冬花各 9 克,法夏 5 克,细辛 1 克,五味子、甘草各 3 克,生姜 1 片,大枣 1 枚,石膏 20 克。二剂后复诊:母述子回家当天,共服药 6 次,半夜汗出,烧退,次日咳嗽气紧明显减轻,喉中痰鸣较发时少大半,其舌质稍红,苔微黄。上方去生姜、大枣,加鱼腥草 30 克。后随访痊愈。

【备考】本方改为丸剂,名“射干麻黄丸”(见《全国中药成药处方集》南昌方)。

70666 射干鼠粘汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十。

【组成】生地 白芍 玄参 牛蒡 射干 山豆根

【主治】痘后咽痛。

70667 射疮环脓丸

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【异名】射脓丸(《外科精义》卷下)。

【组成】砒霜半钱 白矾 铅丹各一字

【用法】上为细末,面糊为丸,如麻子大。先于毒处安药一丸,外以膏药花子掩定,微觉痒痛即脓出。

【主治】痈疽疮疖未有头。

70668 射干鼠粘子汤

【方源】《小儿痘疹方论》。

【异名】射干汤(《得效》卷十一)、射干鼠粘子散(《袖珍小儿》卷八)。

【组成】鼠粘子四两(炒,杵) 甘草(炙) 升麻 射干各一两

【用法】上为粗散。每服三钱,水一大盏,煎至六分,去滓,徐徐温服。

【主治】小儿痘疮余毒所致壮热,大便坚实,或口舌生疮,咽喉肿痛。

70669 射干鼠粘子汤

【方源】《片玉痘疹》卷十三。

【组成】射干 牛蒡子 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿疹见形,咽喉肿痛者。

70670 射干鼠粘子汤

《麻科活人》卷四。为《痘疹仁端录》卷九“射干牛蒡汤”之异名。见该条。

70671 射干鼠粘子汤

【方源】《痘麻绀珠》卷十六。

【组成】鼠粘子四钱 荆芥一钱 防风五分 甘草一钱 射干一钱

【用法】水煎服。

【主治】痘疹疮毒未尽,身壮热,大便坚实,或口舌生疮,咽喉肿痛。

70672 射干鼠粘子散

《袖珍小儿》卷八。为《小儿痘疹方论》“射干鼠粘子汤”之异名。见该条。

臭

70673 臭灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】硫黄末一两 油核桃一两 水银一钱 生猪脂油一两

【用法】捣匀任用;如脓疥,挑破搽之,微痛,三次愈。

【功用】《金鉴》:润燥杀虫。

【主治】疥疮,酒皴,顽癣,溃疡。

①《外科大成》:干疥。②《金鉴》:湿疥。③《中医皮肤病学简编》:酒皴,顽癣,溃疡。

70674 臭灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大蒜一升(捣) 黄酒四升

【用法】煮一升,服之。须臾汗出立止。

【主治】破伤风,及金疮、跌打。

70675 臭灵丹

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】人参三钱四分 麝香六钱四分 梅片六钱七分 朱砂三钱四分 蟾酥七分 京墨七分 明雄六钱 鸭蛋一个(晒臭)

【用法】上为细末,再加上糯米,打糊为锭,大者七分重,小者三分五厘重,赤金为衣包装,瓷坛存贮。每服一锭,黄酒送下。

【功用】祛瘟疫,散热解毒。

【主治】霍乱时疫。

【宜忌】孕妇忌服。

70676 臭科散

【方源】《伤科汇纂》卷七引王寅东方。

【组成】臭科子(一名锁地风草。用条上嫩皮,焙干)

【用法】上为细末。每服二钱,空心酒调下。

【功用】接骨。

70677 臭黄膏

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】臭黄半两(研) 乱发半两(烧灰) 茺萸半两 硫黄一分(细研) 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,研) 吴茺萸半两 粉脚半两(细研)

【用法】上为细散。以生麻油调,涂于两手心,合手于股内,夹药一宿;如未痊者,次夜更涂,兼吃蜜酒使醉。

【主治】风疮疥癣,久不愈。

70678 臭黄膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】臭黄二分 硫黄一分 葱白一茎(细切)

【用法】上为细末,用青油一两,入锅子内,熬令熟,下小件蜡及葱白,次下硫黄、臭黄搅令匀,膏成,以瓷盒中盛。旋旋涂之。

【主治】小儿胎中受风,长后或身体生疥,瘙痒不止。

70679 臭橙饮

【方源】《续名家方选》。

【组成】臭橙皮 芍药各二钱 茴香 吴

茺萸 附子 桂枝各一钱 甘草 大枣各五分

【用法】水煎服。

【主治】疝瘕偏坠,腰肋挛急。

70680 臭橘散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】臭橘不拘多少

【用法】上药用瓷瓶子一枚,纸数重,砖一片压口,次用炭火笼作火炉烧臭橘,候烟去九分存性,只置瓶内,急以纸并砖子压口,候冷,为细散。每服二钱匕,麝香温酒或陈米饮调下。

【主治】痔疾。

70681 臭橘散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】臭橘 皂荚子各不拘多少

【用法】每一臭橘,扎眼子七个,每眼子内,安皂子一枚,放在藏瓶内,烧存性取出,于土内培,出火毒一宿,为细末,入麝香少许。每服一钱匕,食前米饮调下。

【主治】痔疾。

70682 臭椿皮散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】臭椿树白皮二两(微炙,锉) 干姜三分(炮裂,锉) 甘草三分(炙微赤,锉) 鸡冠花一两(炙微黄) 附子一两(炮裂,去皮脐) 槐棘一两(炙令黄)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以枳壳汤调下。

【主治】积年肠风泻血,谷食不消,肌体黄瘦。

70683 臭椿皮散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】臭椿皮一两(微炙,锉) 酸石榴皮一两 地榆一两(锉) 黄连一两(去须) 艾叶三分(微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮调下。

【主治】痔瘕,下脓血不止。

70684 臭梧桐洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】臭梧桐 31 克 野菊花 31 克 地肤子 31 克 明矾 10 克

【用法】水煎。熏洗。

【主治】慢性湿疹。

息

70685 息争汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 神曲各二钱 甘草一钱 炒栀子 天花粉各三钱 茯苓五钱 生地一两

【用法】水煎服。

【主治】阴阳相并之厥，日间发厥，而夜间又厥，夜间既厥，而日间又复再厥，身热如火，痰涎作声。

70686 息氛汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡二钱 当归三钱 白芍三钱 天花粉二钱 白茯苓三钱 蔓荆子一钱 甘菊花三钱 草决明一钱 炒栀子三钱 白茯苓三钱

【用法】水煎服。

【功用】泻肝木之风火，调脾胃之气。

【主治】肝木风火作祟，脾胃之气不能升腾，目痛如刺触，两角多眵，羞明畏日，两胞浮肿，泪湿不已。

70687 息乳丸

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】香附 陈皮 砂仁 神曲 麦芽 姜汁

【功用】温化缓下。

【主治】小儿饮乳无度，凝滞胃脘而吐，才乳即吐，或少停即吐。

70688 息炎汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】黄连 甘草 黄芩各一钱 麦冬五钱 天冬 生地 玄参各三钱 紫菀 天

花粉 石膏各二钱 竹叶三十片 陈皮三分

【用法】水煎服。

【主治】生长膏粱，素耽饮酒，劳心过度，心火太盛，移热于肺，致咽喉臭痛。

70689 息沸饮

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬二钱 款冬花一钱 茯神二钱 甘草一钱 桔梗三钱 黄芩二钱 天花粉二钱 竹叶三十片

【用法】水煎服。

【主治】肺气热所致口吐涎沫，渴欲饮水，然饮水又不能多，仍化为痰而吐出。

70690 息贲丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】厚朴（姜制）八钱 黄连（去头，炒）一两三钱 干姜（炮）一钱半 桂（去皮）一钱 巴豆霜四分 白茯苓（去皮）一钱半（另末） 川乌头（炮制，去皮）一钱 人参（去芦）二钱 川椒（炒，去汗）一钱半 桔梗一钱 紫菀（去苗）一钱半 白豆蔻一钱 陈皮一钱 青皮半钱 京三棱（炮）一钱 天门冬一钱

【用法】除茯苓、巴豆霜旋入外，上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，渐加至大便溏，再从二丸加服，食远煎淡生姜汤送下，周而复始，积减大半止服。

【主治】肺之积，右胁下覆大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘咳，发肺壅。

70691 息贲丸

《简明医彙》卷三。即《三因》卷八“息贲汤”改为丸剂。见该条。

70692 息贲汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】半夏（汤七次） 吴茱萸（汤洗） 桂心各二两半 人参 甘草（炙） 桑白皮（炙） 葶苈（炒）各二两半

【用法】上锉散。每服四钱，水一盂半，加生姜七片，大枣两枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】肺之积，在右肋下，大如覆杯，久久不愈，病洒洒寒热，气逆，喘咳，发为肺癰，其脉浮而毛。

【备考】本方改为丸剂，名“息贲丸”（见《简明医彙》）。

70693 息怒汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】白芍三两 柴胡二钱 丹皮五钱 炒栀子三钱 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【主治】大怒之后火热之病，周身百节俱疼，胸腹且胀，两目紧闭，逆冷，手指甲青黑色。

70694 息涕汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 麦冬五钱 北五味十粒 菖蒲一钱 远志五分 丹参三钱

【用法】水煎服。

【主治】肾水之耗，耳中如针之触而生痛者，并无水生，只有声沸。

70695 息怒养妊汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】白芍二两 茯苓五钱 人参三钱 陈皮五分 甘草一钱 熟地一两 生地五钱 白术五钱 神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人怀妊之后，未至成形，或已成形，其胎必堕，而性又甚急，时多怒气，肝火之盛，常动而不静。

70696 息焚安胎汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】生地一两（酒炒） 青蒿五钱 白术五钱（土炒） 茯苓三钱 人参三钱 知母二钱 花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人怀妊，胃火炎炽，熬煎胞胎之水，以致胞胎之水涸，胎失所养，而见口渴汗出，大饮冷水，烦躁发狂，腰腹疼痛，胎欲堕

者。

70697 息焚救液汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】犀角 羚羊 生地 玄参 银花 紫草 菖蒲 丹皮 连翘 薄荷 石斛 麦冬 金汁

【用法】水煎服。

【主治】湿温、温热、风温，咽喉肿腐，壮热烦渴，脉洪数，舌焦红，斑疹隐于肌肤，肉陷不达，胸痞自利，神昏痉厥，热邪流注表里三焦。

徒

70698 徒都子补气丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】海蛤 牵牛子 赤茯苓（去黑皮） 防己 犀角（镑） 河黎勒（去核） 苦葶劳（纸上炒） 芎劳 木通（锉） 大戟（炒） 防风（去叉） 木香各一两 大黄（炒）二两半 生干地黄（焙）一两半 桑根白皮（炙，锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 郁李仁（去皮，细研）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以米饮送下；觉壅不快，加至十五丸；觉通利，即减三五丸；大小便不通，每服三十丸。

【主治】三焦病久，欲成水，腹胀不消，小水不利。

徐

70699 徐豉酒

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《医心方》卷八。

【组成】好豉一升

【用法】三蒸三晒干，以好酒三斗渍之三宿。随人多少饮；欲预防，不必待时，便与酒煮豉服之；脚弱小愈，更营诸方服之，并灸之。

【功用】《医心方》：利腰脚。

【主治】风毒脚弱，痹满上气。

70700 徐王煮散

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】防己 羌活 人参 丹参 牛膝 牛角觮 升麻 防风 秦艽 谷皮 紫菀 杏仁 生姜屑 附子 石斛各三两 橘皮一两 桑白皮六两 白术 泽泻 茯苓 猪苓 黄连 郁李仁各一两

【用法】上为粗散。以水一升五合煮三寸匕，取一升，顿服，每日二次；不能者，每日一次，二三月以前可服。

【功用】《普济方》：利小便。

【主治】水肿，利多而小便涩者。

【备考】本方方名，《普济方》引作“徐王煮散”。

70701 徐玉煮散

《普济方》卷一九一。即《千金》卷二十一“徐王煮散”。见该条。

70702 徐长卿汤

【方源】《本草纲目》卷十三引《圣惠》。

【组成】徐长卿（炙）半两 茅根三分 木通 冬葵子一两 滑石二两 槟榔一分 瞿麦穗半两

【用法】每服五钱，入朴消一钱，水煎，温服，每日二次。

【主治】气壅，关格不通，小便淋结，脐下妨闷。

【备考】方中木通用量原缺。

70703 徐长卿散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】徐长卿 苦参 附子（生，去皮脐） 吴茱萸（洗，焙干，炒） 旱莲子 细辛（去苗叶） 石硫黄 菖蒲 半夏（生用）各等分

【用法】上为细散。先以油煎葱白色黄，将油和药末涂，仍先以汤浴了手腿，并用被覆，更将火桶子安被内，盖令热。两上愈。

【主治】诸疥癣，久不愈者。

70704 徐长卿洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】徐长卿 31 克

【用法】水煎。内服或外洗。

【主治】牛皮癣，带状疱疹。

70705 徐氏硫苓丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】矾制硫黄一两 白茯苓二两 知母 黄柏（各童便浸）各五钱

【用法】上为末，黄蜡一两半溶化为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以盐汤送下。

【主治】上热下冷，梦遗。

70706 徐国公仙酒

【方源】《回春》卷四引龚豫源方。

【组成】头酏好烧酒一坛 龙眼（去壳）二三斤

【用法】龙眼入酒内浸之，日久则颜色娇红，滋味香美。早、晚各随量饮数杯。

【功用】补气血，壮元阳，悦颜色，助精神。

【主治】怔忡，惊悸，不寐。

70707 徐神翁神效地仙丹

《普济方》卷一四一。为《瑞竹堂方》卷二“徐神翁神效地仙方”之异名。见该条。

70708 徐神翁神效地仙方

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【异名】徐神翁神效地仙丹（《普济方》卷一四一）。

【组成】川乌一个（去尖） 草乌五个（去尖） 荆芥（去枝）半两 苍术一两（浸一宿，炒） 自然铜一字（研） 白芷 地龙 没药各半两（研） 乳香半钱（研） 莒菖种 黄瓜种 木鳖子各一钱 半两钱二文 稍瓜种一钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后以温酒送下。

【功用】除寒湿，进饮食。

【主治】筋骨疼痛，打扑损伤。

欽

70709 欽蛇电酒

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】饮蛇龟一枚 糯米五斤(蒸,作酿饭) 好酒二斗

【用法】上细锉龟,酿饭,同入酒瓮中,牢封一七日后,每次暖一中盏服,每日三五次。

【主治】伤折疼痛不可忍。

豹

70710 豹骨木瓜丸

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】豹骨四两 木瓜六两 黄耆八两 白芍八两 黄柏八两 当归八两 山药四两 锁阳四两 枸杞子四两 龟版四两 菟丝子四两 破故纸六两 杜仲六两 五味子六两 川牛膝一斤 熟地二斤

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每服二钱,空心以白开水送下。

【主治】腰膝腿疼,脚膝拘挛,筋骨无力;肝肾双亏,两腿麻木。

【宜忌】热症忌服。小儿不用。

釜

70711 釜墨膏

《青囊秘传》。为《华氏医方汇编》卷二“消疔丸”之异名。见该条。

70712 釜底抽薪散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】吴茱萸 15 克 胡黄连 9 克 大黄 9 克 生南星 15 克

【用法】上为极细末。外用,一岁以下每次 3 克,一岁以上每次 6 克,用醋调,涂两足心。

【主治】口炎,虚火者。口色淡红,满口白斑微点,轻度溃烂,显露裂纹,夜间潮热,不渴,便溏尿数,舌质红无苔,脉虚。

脊

70713 脊肉粥

【方源】《药粥疗法》引《养生食鉴》。

【组成】猪脊肉 2 两 粳米 3 两 食盐 香油 川椒粉各少许

【用法】先将猪脊瘦肉洗净,切成小块,用香油烹炒一下,然后加入粳米煮粥,待粥将成时,加入调味品、细盐、川椒,再煮一二沸即可。可作早晚餐随意服食。

【功用】补中益气,滋养脏腑,滑润肌肤。

【主治】体质虚弱,羸瘦,营养不良,脾胃虚寒等气血不足之证。

【宜忌】肥肉不宜选用。

70714 脊背续骨汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】杜仲 乳香 没药 当归 赤芍 生地 补骨脂 地鳖虫 地龙 川断 远志 骨碎补

【用法】煎汤内服。

【主治】胸、腰椎骨折,背部严重挫伤。

饿

70715 饿虎散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】人参一钱 豆蔻一个 僵蚕七个 良姜 甘草(炙)各二钱

【用法】上为末。每服一钱,木瓜汤送下;或粟米汤送下。

【主治】伤寒后不思饮食。

狸

70716 狸头散

【方源】方出《千金翼》卷二十四,名见《普济方》卷二九二。

【组成】连翘 黄连 苦参 栝楼 土瓜根 芍药 常山各一两 龙胆二两 狸头骨一枚(炙)

【用法】上为散。每服五分匕,以酒送下,每日三次。

【主治】寒热瘰癧。

【宜忌】《普济方》:忌猪肉、冷水。

70717 狸鸠丸

【方源】《苏沈良方》卷七。

【组成】花鸠一只(去毛肠嘴足,炙熟) 羊

肝一具(炒) 细辛 防风 肉桂 黄连 牡蛎 甘菊花 白蒺藜各五两 白茯苓 瞿麦各四两 羌活三两 蔓菁子二升(蒸三炊) 蕤仁半升 决明二合

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，空心、日午、临卧以茶酒送下。

【主治】内障，青盲，翳晕，及时昏暗，一切眼疾。

【宜忌】忌房事、五辛、蒜、鸡、鱼、猪。

【临证举例】目盲 楚医陈中立，双盲数年，服此视物依旧。

70718 狸骨丸

【方源】《外台》卷十三引《范汪方》。

【组成】狸骨 连翘各五分 土瓜 山茱萸 玄参 胡燕屎 黄芩 丹砂 马目毒公 鸢尾各二分 黄连 芍药 雄黄 青箱子 龙胆 栝楼各三分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前服，一日三次；不知，稍稍增之，以知为度。

【主治】①《外台》引《范汪方》：骨热。②《圣惠》：虚劳，骨热体痛，心神恍惚，夜卧不安，小便赤黄，口干眼涩。

【宜忌】禁食生鱼菜、猪肉、黄黍米、生血物。

70719 狸骨散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】狸骨(酒炙)一两一分 踯躅(炒) 龙骨 王不留行 当归(切焙) 土瓜根 鼠姑各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后温酒调下，日晚再服。

【主治】鼠瘻，瘰癧，寒热。

70720 狸骨散

《不居集》上集卷十八。为方出《千金》卷二十三，名见《普济方》卷二九三“狸骨知母散”之异名。见该条。

70721 狸豆根汤

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】狸豆根半两 车前草半两 葵子半两 桑根白皮(锉)半合 赤小豆半合

【用法】上锉细。每取一分，以水一小盏，煎至五分，分为二服，每日三四次。

【主治】小儿水气肿满，小便涩。

70722 狸骨知母散

【方源】方出《千金》卷二十三，名见《普济方》卷二九三。

【异名】狸骨散(《不居集》上集卷十八)。

【组成】狸骨 鲛鲤甲 知母 山龟壳 甘草 桂心 雄黄 干姜各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以饮送下。一日三次；仍以蜜和纳疮中；先灸作疮，后以药敷之，已作疮，不用灸。

【主治】鼠漏；始发于颈，无头尾，如鼯鼠，寒热脱肉。此得于鼠毒，其根在胃。

【方论选录】《千金方衍义》：狸专捕鼠，鼠漏用之每效，故用狸骨，佐以知母、龟壳、鲤甲、姜、桂、雄黄，都是肾家辟除邪毒之药，方下虽言其根在胃，恐是肾字之误。

狼

70723 狼牙丸

【方源】《医心方》卷七引《耆婆方》。

【组成】狼牙四分 芫荽四分 白薇四分 狗脊四分 干漆四分

【用法】上药治下筛，为丸如豌豆大。每服十丸。

【主治】寸白虫。

70724 狼牙汤

【方源】《金匱》卷下。

【组成】狼牙三两

【用法】以水四升，煮取半升，以绵缠箸如茧，浸汤沥阴中，每日四次。

【主治】①《金匱》：少阴脉滑而数，阴中蚀疮烂者。②《三因》：妇人阴中蚀疮烂溃，脓水淋漓臭秽。

【方论选录】①《金匱要略心典》：脉滑者，湿也；脉数者，热也。湿热相合，而系在少阴，

故阴中即生疮,甚则蚀烂不已。狼牙味酸苦,除邪热气、疥瘙恶疮,去白虫,故取治是病。②《金鉴》:阴中,即前阴也。生疮蚀烂,乃湿热不洁而生蠹也。用狼牙汤洗之,以除湿热杀蠹也。狼牙,非狼之牙,乃狼牙草也。如不得,以狼毒代之亦可。某疮深,洗不可及,则用后法也。③《高注金匱要略》:狼牙味苦性寒,以寒能胜热,苦能燥湿,而尤能杀虫,故主此以洗之耳。

70725 狼牙汤

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】狼牙五两 赤芍药五两 白芷五两 黄柏五两 丹参五两 川大黄三两(生用)

【用法】上锉细,分为六贴。每次一贴,以水四升,煎取二升半,去滓,看冷暖淋洗,一日三次。

【主治】热毒恶疮。

70726 狼牙浆

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】狼牙叶(冬用根)

【用法】上药捣,绞取汁半升,顿服。以滓敷所中处。

【主治】射工中人。

70727 狼牙散

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】狼牙一分 白菰一分 竹蛀屑一分

【用法】上为细末。每用少许,纳于耳中。

【主治】聃耳,有脓水塞耳。

70728 狼牙散

【方源】《圣惠》卷五十七。

【组成】狼牙一两 鹤虱一两(纸上微妙过) 贯众一两 芫荇仁一两

【用法】上为细散。每服一钱,以粥饮调下,良久再服。以虫出为度。

【功效】下虫。

【主治】九虫在肠胃,令人心烦,吐逆。

70729 狼牙散

【方源】《圣惠》卷五十七。

【组成】狼牙一两 芫荇仁二两

【用法】上为细散。每服二钱,空心先吃少淡羊肉干脯,以温酒调下。

【主治】蛔虫,或攻心,吐清水。

70730 狼牙散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】狼牙草二两 诃黎勒皮三分 白芍药三分 白术三两 黄耆二两(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人崩中,下血不止,心胸虚闷。

70731 狼牙膏

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】狼牙(捣) 雄黄(研) 丹砂(研) 硫黄(研) 雷丸(捣) 白矾(熬令汁枯,研) 藜芦(去芦头,捣) 各一分

【用法】上为细散,蜜调为膏。涂癣上,每日三次。

【主治】一切癣。

70732 狼毒丸

【方源】《外台》卷七引《肘后方》。

【组成】狼牙二两(炙) 附子半两(炮)

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。一日服一丸,二日二丸,三日三丸。自一至三,以为常服。

【主治】心腹相连常胀痛。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

70733 狼毒丸

【方源】方出《肘后方》卷五,名见《普济方》卷二四八。

【组成】狼毒四两 防风二两 附子三两(烧)

【用法】炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,日夜服三次。

【主治】阴疝。阴丸卒缩入腹,急痛欲死。

70734 狼毒丸

【方源】《千金》卷十一。

【异名】半夏丸(《圣惠》卷四十九)。

【组成】狼毒五两 半夏 杏仁各三两
桂心四两 附子 蜀椒 细辛各二两

【用法】上为末，别捣杏仁，炼蜜为丸，如大豆大。每服二丸，以饮送下。

【主治】①《千金》：坚癖。②《圣惠》：癖结，坚痼久不愈，食少。

【方论选录】《千金方衍义》：狼毒丸取半夏、杏仁佐狼毒以破结积之痰，桂心、细辛佐附子以散沉沍之积，蜀椒专治胸腹虫积之痛也。

70735 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】狼毒一分 天南星半两 附子半两

【用法】上并生用，临捣合时，以净布裹，捶碎，用木臼内为末，后以石锅内煎酢醋成膏和丸，如梧桐子大。每服一丸，以冷酒送下，不拘时候。如不饮酒，用冷水送下亦得。

【主治】风走注疼痛。

70736 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】狼毒二两半(醋浸，炙) 肉桂二两(去皱皮) 川乌头半两(去皮脐，醋拌炒) 京三棱一两(炮，锉) 紫菀三分(洗，去苗土) 附子一两(炮裂，去皮脐) 川大黄二两半(锉碎，微炒) 鳖甲二两(涂醋，炙微黄，去裙襴) 甜葶苈三分(隔纸炒令紫色) 槟榔二两 蛇甲一两(炙) 木香一两 桃仁二两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒) 皂荚三分(汤浸去皮，涂酥，炙黄焦，去子) 芫花半两(醋拌，炒令干)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温酒送下。

【主治】虚劳积聚，腹中坚硬，气胀喘息。

【宜忌】忌苋菜、湿面、生冷。

70737 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】狼毒(细锉，醋拌，炒令干) 芫花(醋拌，炒令干) 干漆(捣碎，炒令烟出) 雄雀粪(微炒) 五灵脂 鳖甲(涂醋，炙令黄，去裙襴) 硫黄(细研) 硼砂(不夹石者，细研) 各一两 膩粉半两(碎)

【用法】上为细末，入研了药令匀，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三丸至五丸，空心以醋汤送下。当利下恶物。

【主治】积聚。气结成块段，在腹胁下，久不散，发歇疼痛。

70738 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】狼毒四两(锉碎，醋拌炒干) 附子三两(炮裂，去皮脐) 防葵三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，食前以粥饮送下。以利为度。

【主治】①《圣惠》：积聚，心腹胀如鼓。②《圣济总录》：阴疝，肿缩疼痛。

70739 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】狼毒一两(微煨) 川乌头一两(炮裂，去皮脐) 槟榔一两 木香一两 干漆一两(捣碎，炒令烟出)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，渐加至十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】疝气，胁肋胀痛，腹内气结，不能下食，四肢少力。

70740 狼毒丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】川狼毒二两(细锉，炒熟) 附子一两(炮裂，去皮脐) 半夏一两(汤浸七遍，去滑) 芫花半两(醋拌，炒令干) 木香一两 槟榔一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服七丸，以生姜汤送下，每日二次。

【主治】痰冷不消，结成癖块，腹胁胀痛。

70741 狼毒丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】天南星 狼毒 海桐皮 黑附子(炮)各等分 (一方加牛膝焙,酒浸一宿)

【用法】上药各用童子小便浸,安著盏子四只内浸一宿,漉出控干,为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每日二十丸,空心以豕猪胆汁十余滴,炒葱一根煎,酒送下,只酒亦得。

【主治】妇人血风攻注,腰脚及背膊疼痛,四肢烦倦麻痹;丈夫元脏风攻,遍身痛,筋脉拘急,腰脚无力。

【宜忌】《普济方》:如有孕不可服之。

70742 狼毒丸

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《吉氏家传》。

【组成】狼毒(酒浸,焙) 白附子 大附子(炙) 天麻 防风 羌活各一分 朱砂地龙(去土)各一钱 麝香一分

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七丸至十五丸,用黑豆薄荷汤,入酒一滴吞下。

【主治】小儿胆热肝风,天柱倒折。

70743 狼毒丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】雄黄(生) 狼毒 肉桂(去粗皮,不见火)四钱 大附子(炮,去皮脐) 汉椒(去目,炒出汗) 干漆(炒烟绝) 甘遂(生用)各一两二钱 当归半两(去芦) 羌花(醋炒) 川大黄(生) 槟榔(生用)各一两半 大戟(生) 桃仁(连皮炒) 茺萸(生) 厚朴(去皮,姜制) 干姜(炮,洗) 枳壳(生,去瓢) 犀角(生用)各一两 鳖甲(炙) 银川柴胡(生用)各一两四钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,以温汤送下。

【主治】腹胀水肿。

【备考】方中雄黄、狼毒用量原缺。

70744 狼毒丸

【方源】《济生》卷三。

【组成】狼毒(锉,炒)一两 羌花(醋

炒) 川乌(炮,去皮尖)各一两 椒红(炒) 干漆(炒烟尽) 鳖甲(醋煮) 三棱 没药各半两 干姜(炮)半两 全蝎(去毒)九枚

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心以姜汤、温酒任下。

【主治】七疔,久而不愈,发作无时,脐腹坚硬疼痛。

70745 狼毒丸

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】狼毒三分 附子一个(炮) 川椒(出汗) 巴豆(去皮)各四分

【用法】上为末,以饴为丸,如茺萸大。每服一丸,茶饮送下,天明及日午再服一丸,每日三次。

【功用】消痞下食。

【主治】腹中有热胀满,不思饮食,大小便不利,及苦腹痛癖,便脓血下重,丁奚腹痛,脱肛,胁下有痞。

70746 狼毒散

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】狼毒 秦艽各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,以酒送下。每日三次。五十日愈。

【主治】恶疾。

【方论选录】《千金方衍义》:狼毒杀虫辟毒,秦艽逐湿开痹,允为痲风专药。

70747 狼毒散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】狼毒一两(锉碎,醋拌,炒黄) 鼠李根皮一两 昆布三分(洗去咸味) 连翘一两 沉香一两 熏陆香一两 鸡舌香一两 詹糖香一两 丁香一两 薇衔三分 斑蝥二十枚(以糯米拌,炒米黄为度,去头足翅) 玄参三分

【用法】上为细散。每服一钱,食前以荆芥汤调下。

【主治】痲痲久经年月,脓水不止,时发焮肿。

70748 狼毒散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】白附子 黄丹 蛇床子各五钱
羌活 独活 狼毒 白鲜皮 硫黄 枯白矾
轻粉各三钱五分

【用法】上为细末。干用香油调，湿用干搽。

【主治】小儿胎毒，月子内头上赤红痒极，头摇出血，痒后大哭不睡，遍身无皮，一片血肉，其痒非常。

70749 狼毒膏

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】狼毒 蓝根 龙胆各半两 定风
草一两 乳香一钱 水银粉一钱匕

【用法】上为末，蜜调成膏，摊帛上。贴疮。

【主治】发背。疮如葡萄，破后疮孔无数。

70750 狼毒膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】狼毒 槟榔 硫黄 五倍子 川
椒 风子肉 蛇床子各三钱

【用法】上为末，用香油一大杯煎滚，入皮消三钱，再煎滚，次下公猪胆汁一个，和匀。调前药搽患上。

【主治】肾囊风。湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼。

【备考】《金鉴》有枯白矾。

70751 狼脂膏

【方源】《霉疮证治》卷下。

【组成】大风子 番木鳖 蜀椒 枯矾
轻粉 白附子 雄黄各等分 麝香减半

【用法】上为细末，以狼脂为膏。

【主治】顽癣如牛皮，多生内股阴囊，搔痒最甚。

70752 狼牙草散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】狼牙草一分 使君子半两 鼠尾
草一分 棠梨根半两（锉） 酸石榴根半两
贯众根半两 槲树皮半两 钩藤半两 龙胆
半两（去芦头） 射干二分 栗刺半两 故
绵灰一两 乱发灰一两

【用法】上为细散。五六岁儿，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，空心、晚后各一服。

【主治】小儿蛔疳，干瘦发竖，或痢肚大。

70753 狼毒洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】狼毒 6 克 苦参 62 克

【用法】水煎洗。

【主治】慢性湿疹。

70754 狼毒浸剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄柏 500 克 龙骨 500 克 狼毒
500 克

【用法】上药浸于酒精 8000 毫升，历七天，取滤液 5000 毫升，加漆片、松香各 200 克，聚乙烯醇缩丁醛 250 克，搅拌均匀即成。外用涂成膜。

【主治】稻田皮炎。

胰

70755 胰子汤

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】黄连 胡黄连 川芎 牛膝 当
归各一钱五分 防风 金银花 米仁 木通
各一钱 甘草六分 肥皂子七粒（去黑皮，打
碎） 僵蚕七条（炒，研碎） 土茯苓二斤
（白米泔浸一二时，打豆大，勿把铁器，并花
木洗净）

【用法】陈酒、河水各二碗，煎二碗，入前药并胰子一只（去油净）在内，同煎一碗。空心服。

【功用】解毒托散。

【主治】杨梅疮发已久，血气已虚，毒犹未退，疮青人虚气弱，不敢汗下。

【加减】虚弱甚者，加人参。

70756 胰楞丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】瓦楞子 海石各一两（二味先浸
净，烘燥，同芒消五钱煮半日，醋煨） 红

曲 酒曲各七钱 半夏曲五钱 鸡内金十付
(洗, 炙) 延胡 猪胰三个 (蒸捣)

【用法】上为末, 熬糯米浓汁为丸, 如梧桐子大。每服一钱五分, 渐加至三钱, 空心米饮送下。

【主治】癥瘕痞积, 肠覃, 积之结于肠外募原者。

【加减】石瘕, 加斑蝥四个 (米炒) 服。

【宜忌】间服芎归六君子汤尤妙。

70757 胰腺清化汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】柴胡 黄芩 白芍各 15 克 厚朴 枳实 佩兰各 10 克 金银花 大青叶各 30 克 大黄 10 克 (后下) 芒消 6 克 (冲服)

【用法】水煎服, 每日一剂, 早、晚分服; 重症患者可每日服两剂, 分四次服, 每六小时一次。

【功用】理气解郁, 清热化湿。

【主治】急性胰腺炎及其并发症。

【加减】高热, 加生石膏 30 克, 知母 24 克, 连翘 12 克; 腹痛重, 加川楝子、玄胡各 10 克; 黄疸, 加茵陈 30 克; 呕吐, 加姜夏、竹茹各 10 克; 胸闷, 加全瓜蒌 30 克, 陈皮 10 克; 湿重, 加藿香、茯苓各 10 克; 腹中寒冷, 加干姜 6 克; 腹泻每日超过三四次, 去芒消; 胆道蛔虫引起的胰腺炎, 加苦楝皮根 15 克, 使君子 10 克; 麻痹性肠梗阻, 加重大黄、芒消、枳实、厚朴用量; 胰腺囊肿或假囊肿, 加栀子、黄连、红藤、地丁和三棱、莪术、山甲、皂刺等。

【方论选录】白芍、厚朴、枳实理气解郁; 柴胡、黄芩、金银花、大青叶、佩兰清热化湿, 大黄、芒消清热凉血, 泻热导滞。

脘

70758 脘黄散

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】鸡脘黄皮 (烧灰)

【用法】上为末。每服半钱, 以乳汁调下,

一日三次。

【主治】小儿燕口疮及鹅口。

咽

70759 胭脂散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】胭脂 白矾 (烧灰) 麻勃 竹蛭屑各一分 麝香一字

【用法】上为细末。每用少许, 絰在所患耳中。

【主治】聾耳。

70760 胭脂散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】胭脂一两 胡粉一两

【用法】上为细末。先以温浆水洗疮, 候干, 然后以药敷之。

【主治】反花疮。

70761 胭脂散

【方源】方出《百一》卷十五, 名见《普济方》卷三〇一。

【组成】坯子胭脂 真绿豆粉

【用法】上为末。敷之。

【主治】阴疮。

70762 胭脂散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】百药煎 坯子各等分

【用法】上为细末。擦牙, 津吐之。

【主治】牙疼。

70763 胭脂散

【方源】《医方类聚》卷七十八引《济生》。

【组成】胭脂 白矾 (火上熬干) 各等分

【用法】上为细末。每用少许, 以绵杖子蘸药, 絰在所患耳中。

【主治】聾耳。

70764 胭脂散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】胭脂 贝母 胡粉各一分 硼砂没药各半分

【用法】上为细末。先以温浆水洗, 拭后敷

药。

【主治】反花疮。

70765 胭脂膏

【方源】《医方类聚》卷七十引《吴氏集验方》。

【组成】上等好胭脂

【用法】上乳十分细，用新汲井水调成膏。银钗点上。疼甚不必疑。

【主治】目内睛上有障及白星。

【宜忌】忌发风之物。

70766 胭脂膏

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】胭脂 龙骨 白矾 白石脂各等分

【用法】上为末，枣肉为丸，如枣核大。以绵裹一丸，入耳，每日换三次。

【主治】小儿聾耳，常出脓水不止。

70767 胭脂膏

【方源】《丹溪心法附余》卷二十三。

【组成】干胭脂

【用法】上药用蜜调。涂儿两眼眶，则痘疮不入眼内。

【功用】预防痘疮入眼。

70768 胭脂膏

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】胭脂（生用，为主） 珍珠（生用，研末） 豌豆（烧存性，为末） 头发（烧存性，研末，或炒发出油，取用之）

【用法】上为末，调入胭脂拌匀，候用。以银簪刺破，口含清水，吸去秽血，用此膏填入疮内，则诸痘自皆红润；或用紫草油亦可。

【功用】除血热壅结。

【主治】贼痘，痘疔。凡报痘后将起胀时，诸痘未起，而有先起虚大如金黄者，名曰贼痘；有大而色黑者，名曰痘疔。

【方论选录】胭脂以色，豌豆以形，血余以血活血，珍珠以阴和阳，要以除其血热之壅结者而已。去败群之羊，而群羊和矣。

70769 胭脂膏

《医钞类编》卷十九。为《慈幼新书》卷六“胭脂涂法”之异名。见该条。

70770 胭脂膏

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】紫草五钱 香油四两 黄蜡二两 乳香（研细） 没药（研细）各五钱

【用法】紫草入香油内煎数滚，去滓，再入黄蜡化尽为度，再入乳香、没药收膏。用棉纸做如膏药状，贴患处。

【功用】杀虫止痒，生肌消肿。

【宜忌】忌辛辣、油腻等物。

70771 胭脂涂法

【方源】《慈幼新书》卷六。

【异名】胭脂膏（《医钞类编》卷十九）。

【组成】升麻一两 雄黄五分

【用法】上煎浓汁，将胭脂于汁内捻令红出。蘸汁拭疮上；若疮不起，须热拭之。

【功效】活血败毒。

【主治】①《慈幼新书》：痘疮溃烂。②《痘科类编》：痘疮四围沸起，中心落陷无水，犹是死肉，其形如钱。

脍

70772 脍毒散

【方源】《永乐大典》卷一一六二〇引《易简》。

【组成】附子七个（炮） 丁香 藿香叶 官桂 木香各三钱 人参半两

【用法】上为末。每服二大钱，以寻常辣糊蘸半盏热调服，用匙挑服之。

【主治】老人脾胃久弱，饮食全不能进。

脂

70773 脂膏

【方源】《奇效良方》卷五十九。

【组成】牛脂（或羊脂、雁鸭脂亦可）如指头大

【用法】上纳鼻中，以鼻吸取脂入。须臾脂消，则物随脂俱出。

【主治】卒食物从鼻中缩入脑中，介介痛不

出。

70774 脂连丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】胡黄连半两 香润五灵脂一两

【用法】上为末，獾猪胆汁为丸，如麻子大。每服十五丸，米饮送下。

【主治】小儿五疳潮热，腹胀发焦。

70775 脂附丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《王氏手集》。

【组成】大附子一枚

【用法】先用猪膏掬成油半盏许，蘸附子令裂，捞出放冷，削去皮脐，为细末，枣肉为丸，大人如梧桐子大，小儿如绿豆大。每服五七丸至十五、二十丸，空心、食前以米饮汤送下。

【主治】大人、小儿纯脓白痢。

70776 脂草饮

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】甘草 赤石脂各一钱 人参二钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒八九日，腹痛，下利便脓血，喉中作痛，心内时烦。

70777 脂调散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】蛇床子二两 茴茹 草乌 花椒 苦参 荆芥各一两 雄黄 硫黄 矾各半两

【用法】上为细末。猪脂调搽。

【主治】疥疮，脓窠疮。

70778 脂调散

【方源】《杂病治例》。

【组成】苦参 荆芥 雄黄 硫黄 矾末 各半两 蛇床二两 草乌尖一两

【用法】上为末。敷之。

【主治】湿热、湿毒疥疮。

70779 脂蜜酒

【方源】方出《外台》卷三十三引《张文仲方》，名见《产孕集》卷下。

【组成】猪膏一升（煎） 白蜜一升 淳酒

二升

【用法】上药合煎，取二升，分再服，不能随所能服之。

【主治】半生胎不下，或子死腹中，或半著脊；及在草不产，血气上烫心，母面无颜色，气欲绝。

70780 脂蜜膏

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】猪脂一斤

【用法】上入锅先炼成油，捞去滓，入白蜜一斤再炼一时，滤入瓷罐内收，冷定成膏封固。不时挑服一匙，滚水送下。

【功用】润肺肠，解燥结。

【主治】失音。

胸

70781 胸膜炎汤 1 号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】旋覆花（布包）6 克 代赭石（布包）12 克 广陈皮 9 克 枳壳 桔梗各 6 克 全瓜蒌 18 克 薤白头 9 克 郁金 青橘叶各 9 克 苇根 连翘各 15 克 杏仁 9 克

【用法】水煎服。

【功用】调气止痛。

【主治】干性胸膜炎。咳嗽，胸疼，呼吸浅表，发热，脉弦数，舌苔薄白。

【方论选录】方中旋覆花、代赭石降逆下气；广陈皮、枳壳、桔梗理气；全瓜蒌、薤白头通胸中之阳而止痛，为治胸膜炎特效药；青橘叶、郁金解郁止痛；苇根、连翘清热消炎；杏仁止咳平喘。各药协同作用，使胸中气机通畅，炎症得消，则疼痛可止。

70782 胸膜炎汤 2 号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】冬瓜子 30 克 葶苈子 9 克 薏苡仁 30 克 茯苓 12 克 旋覆花（布包）6 克 代赭石（布包）瓜蒌各 12 克 薤白 杏仁 广皮各 9 克 枳壳 桔梗各 6 克

【功用】泻肺利水，止咳。

【主治】渗出性胸膜炎，发热，咳嗽胸疼，胸膜积液，呼吸不畅，脉滑数，舌苔白。

【方论选录】方中冬瓜子、葶苈子、薏苡仁、茯苓利胸水；瓜蒌、薤白、广皮、枳壳、桔梗理气止痛；旋覆花、代赭石、杏仁降逆止咳。

脏

70783 脏头丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】猪脏丸（《杂病源流犀烛》卷二十八）。

【组成】槐子一两 牙皂七分 黄连四两 糯米一升

【用法】上为末，用雄猪大肠一条，去油洗净，将前药入内，两头扎住，砂锅内煮烂为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，米饮送下。

【主治】肠风下血，脱肛。

70784 脏连丸

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】大鹰爪 黄连半斤 槐花米二两 枳壳一两 防风 粉草 槐角 香附子 猪牙皂角 木香各五钱

【用法】上为细末，用猪脏约二尺长水洗净，陈熟仓米三合同香附一处为末装入，缚定口，量用水二大碗，砂锅炭火煮干，即添水，慢慢煮烂猪脏如泥，取起和药捣如糊，再入黄连等末为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心米饮送下。

【功用】①《饲鹤亭集方》：散火毒，驱湿热，止血消肿，生肌定痛。②《全国中药成药处方集》（禹县方）：定痛消毒，退管生肌。

【主治】①《医统》：远年近日肠风、脏毒下血。②《饲鹤亭集方》：诸痔肿痛，肠风下血，脱肛痛痒，肠痢、脏毒成漏。

【宜忌】①《医统》：忌面、蒜、生冷、煎炙之物。②《饲鹤亭集方》：忌房欲、恼怒、酸辣动火之物。③《全国中药成药处方集》（禹县方）：寒症忌用。

70785 脏连丸

《医学六要·治法汇》卷一。为《普济方》卷二一五“独连丸”之异名。见该条。

70786 脏连丸

【方源】《外科启玄》卷二十。

【组成】胡黄连 荆芥穗 地榆各一两 槐花一两五钱 槐树木耳一两五钱

【用法】上为细末，用活鲫鱼一尾，重十两，去肠刺，取肉，捣如泥，和作团，用健猪大肠头一尺五寸翻过，去油洗净，装前药扎定煮熟，空心食之，至重不过二次；如年久日远，以药末晒干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心以酒送下或以白汤送下。

【主治】多年痔漏。

70787 脏连丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄连（净末）八两

【用法】用公猪脏尽头一段长一尺二寸，温汤洗净，将连末灌入脏内，两头以线扎紧，用时酒二斤半，砂锅内煮酒将干为度；取起脏药，共捣如泥；如药烂，再晒一时许，复为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。久服除根。

【功用】《中药成方配本》：清泄肠热。

【主治】①《外科正宗》：新久痔，但举发便血作痛，肛门坠重。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：大肠湿热，大便下血，日久不止，多食易饥，肛门坠肿以及脏毒等症。

【宜忌】①《全国中药成药处方集》（杭州方）：若血色晦淡属虚寒者忌之。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌五辛发物、房室。

70788 脏连丸

【方源】《简明医彙》卷三。

【组成】黄连（川者，去须芦，研末）六两 槐角子末二两 猪大肠（去头梢）

【用法】上将连、槐末装入半空，勿胀肠破，砂锅水煮烂，待干，连脏捣；若湿，加炒黄米粉少许丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以白汤送下。

【主治】诸痔及肠风下血。

70789 脏连丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连一斤 槐花半斤

【用法】上为末。用雄猪肥壮大肠，以酒醋洗净，入药扎两头；次用韭菜五六斤，一半铺甑底，药肠盘于上，一半盖之，文火蒸之，以肠脂化尽、肠皮如油纸薄为度；去肠取药晒干，稀糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，以白滚汤送下，一日二次。

【主治】痔漏，肠风下血，及水泻痢疾。

70790 脏连丸

【方源】《纲目拾遗》卷五。

【组成】胡黄连（净末）八两 通血香一钱半 雄猪大肠（尽头一段）一尺二寸

【用法】雄猪大肠温汤洗净，将连末及通血香灌入肠内，两头以白丝线扎紧，煮酒二斤半，新砂锅内煮酒将干为度，取起肠药，各捣如泥，倘药烂，晒一时复为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以温酒送下。久服除根。

【功用】《鳞爪集》：败火毒，驱湿热，消肿痛，敛脓血。

【主治】①《纲目拾遗》：新久痔漏，但举发便下血作痛，肛门坠重，脓血不止，肿痛难坐，漏有孔者。②《鳞爪集》：湿热内蕴，肠胃气滞，浊气瘀血流注肛门，痛痒皆作。

70791 脏连丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄芩二百四十两 槐角（炒）一百六十两 生地一百二十两 赤芍八十两 槐花（炒）一百二十两 阿胶（炒珠）八十两 地榆炭一百二十两 当归八十两 芥穗八十两 黄连四十两

【用法】上用猪大肠一百四十尺，将群药串粗末装入大肠内，两头扎住，煮熟晒干，为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，温开水送下，每日二次。

【功用】润肠清热，止血通便。

【主治】①《北京市中药成方选集》：肠风便

血，痔疮漏疮，大便秘结，肛门肿痛。②《中药制剂手册》：肠胃风热，转于血分引起的脏毒下血，日久不止，肛门坠痛，痔疮焮肿。

70792 脏连丸

【方源】《全国中药成药处方集》（南京方）。

【异名】榆槐脏连丸。

【组成】槐米三两 地榆二两 川黄连三两 炒荆芥二两 黄柏三两 薄荷二两 淡黄芩三两 橡碗壳一两五钱 乌梅三两

【用法】上为细末，用猪大肠一具煮烂，炼蜜为丸，每钱做二十丸。每服三钱，开水吞服，一日一次。

【功用】清热润燥。

【主治】肠风下血，痔疮肿疼。

70793 脏连丸

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】黄连四两 生地六两 当归三两 川芎二两 白芍二两 赤芍三两 槐角二两（炒） 槐米二两（炒） 山甲二两（土炒）

【用法】上为粗末，黄酒拌匀，装入猪大肠内，两端扎紧，上锅蒸熟，再剖开晒干，同大肠共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，晨饭前空腹以白开水送下，一日一次。

【主治】痔疮便血。

【宜忌】忌烟酒辛辣刺激、腥膻等物；戒房劳；孕妇忌服。

70794 脏连丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参 当归 槐角 川连 茯苓 花粉 牙皂 丹皮 生地 泽泻 山萸 山药 知母 黄柏各等分

【用法】上为末，装入生猪大肠内，绳扎住两头，用米一升，将猪肠放在米上同蒸，俟猪肠紫色方为熟透，将肠取出，去米，将肠、药晒干，为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二钱，白开水送服。

【功用】清肠止血，益气养阴。

【主治】大便下血正赤，或伴肛门坠肿。

70795 脏连固本丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】怀生地六两 干山药四两 茯苓三两（去皮） 牡丹皮三两 泽泻二两 山茱萸四两（去核） 黄连四两 黄柏三两 知母（去毛）二两 人参二两 当归二两 皂角二两 槐角三两 天花粉二两

【用法】上为末，用豮猪大肠头一段去油，灌入药末，两头线扎住；用糯米一升煮饭，将半熟捞起入甑内，将药肠盘藏于饭之中如蒸饭之熟；待冷取出，去两头无药之肠，将药肠捣烂为丸，如硬，加饭为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以白汤送下。

【主治】膏粱富贵之人，饮食色欲，火酒犯房所致痔疾。

【宜忌】戒醇酒厚味。寡欲。

脐

70796 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】牙皂 淡全蝎各二两 大黄四两 当归六钱

【用法】上为细末，兑入：牛黄一钱，朱砂面十一两，净巴豆霜二钱，共为细末，每包二厘重，装袋。每次一包，乳汁化服。

【功用】消积化食；预防惊风、脐风（脐带风、四六风、撮口风）。

【主治】脐风、惊风，宿食停水，呕吐涎沫，腹胀腹痛。

70797 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】全蝎 僵蚕 胆星 明天麻 姜半夏 川芎 雄黄各五钱 朱砂 甘草 天竺黄各三钱

【用法】上为细末。

【主治】脐风，惊风。

70798 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】枯矾 硼砂各二钱 朱砂一钱 冰片 麝香各五厘 僵蚕一钱 钩藤一钱五

分

【用法】上为细末，每服五厘至一分，温开水或乳汁送下，每日一次至二次；外敷脐带亦可。

【功用】预防风症。

【主治】脐风风痙，积聚痞块，痰嗽。

70799 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。

【组成】全蝎一钱五分 南星 朱砂各一钱 珍珠五厘 巴豆霜二钱五分 半夏一钱 牙皂五分 川军一钱 台麝一分 雄黄五分 牛黄 梅片各五厘

【用法】上为细末，玻璃瓶存贮。每服二厘至三厘，姜汤送下。

【功用】泻热定风。

【主治】脐风。腹胀脐肿，日夜多啼，四肢拘急，项强反张，口噤喷嚏，吮乳口松。

【宜忌】大便泄泻者忌服。

70800 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（承德方）。

【组成】猪牙皂 大黄各四两 巴豆霜 硃砂各二钱 当归六钱 全蝎二两 朱砂十一两 金箔八十张 牛黄一钱

【用法】上为细末。小儿初生每包分三次服，一周岁分二次服，白开水送下。

【主治】脐风，惊痫，抽搐。

70801 脐风散

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】蛇衣 僵蚕 大黄 辰砂各二两 麝香一两

【用法】上为细末。每服二分。

【主治】脐风。

70802 脐压散

【方源】《古今名方》引河南省中医药研究所方。

【组成】吴茱萸 500 克（胆汁制） 龙胆草醇提取物 6 克 硫黄 50 克 白矾 100 克（醋

制) 朱砂 50 克 环戊甲噻嗪 175 毫克

【用法】上为极细末。用药前先将患者肚脐部用温水洗擦干净, 每次用药粉约 0.2 克, 倒入肚脐内, 敷盖棉球, 外用胶布固定。每周换一次。

【功用】壮肾阳, 降血压。

【主治】原发性高血压病。

胶

70803 胶酒

【方源】《医方类聚》卷二二九引《王岳产书》。

【组成】好胶二两(炙令得所) 酒一升半 白盐一钱匕

【用法】上以微火同酒炼胶令化, 后打鸡子一枚相和, 服一盞; 未产再服。

【主治】妇人难产, 经六七日, 母困甚。

70804 胶艾丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】香附 生地 枳壳 白芍 砂仁 艾叶 阿胶 山药

【用法】糊为丸。

【主治】妇人血虚有寒, 经水后期而行。

70805 胶艾汤

《金匱》卷下。为原书同卷“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

70806 胶艾汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品》。

【组成】阿胶二两(炙) 艾叶二两

【用法】以水五升, 煮取二升半, 分三服。

【功用】《医林纂要》: 安胎。

【主治】妊娠胎动不安, 腰腹疼痛, 下血甚多。

①《外台》引《小品》: 损动母, 去血腹痛。
②《妇人良方》: 妇人妊娠忽然下血, 腰痛不可忍。
③《普济方》: 妊娠漏胎下血过多; 漏胎不安。

【方论选录】《医林纂要》: 阿胶澄清下部秽浊而大滋血气, 不独能养阴而已; 艾叶大暖下

部而补虚去寒, 且能和血。

70807 胶艾汤

【方源】《千金翼》卷二十。

【异名】大胶艾汤(《普济方》卷三一二)。

【组成】阿胶(炙) 艾叶(熬) 芍药 干地黄各三两 当归 干姜 芎藭 甘草(炙) 各二两

【用法】上咬咀。以水八升, 煮取三升, 去滓, 纳胶令烊, 分再服; 羸人三服。

【主治】男子绝伤, 或从高堕下, 伤损五脏, 微者唾血, 甚者吐血及金疮伤经内绝; 妇人产后及崩中伤下血多, 虚喘欲死, 腹痛下血不止。

70808 胶艾汤

【方源】《胎产救急方》引《杨氏产乳方》(见《医方类聚》卷二二四)。

【异名】地黄汤(《圣济总录》卷一五八)、胶艾芎归汤(《济阴纲目》卷八)。

【组成】川当归 熟地黄 艾叶各二两 阿胶(炒) 川芎各三两 (一方无地黄有甘草; 一方加人参、白茯苓)

【用法】上锉。每服五钱, 水煎服。

【主治】妇人妊娠顿仆伤胎, 腰腹疼痛, 或胎上抢心, 或下血不止, 或短气欲死。

【加减】一方腹痛甚者, 加杜仲、地骨皮。

70809 胶艾汤

【方源】《理伤续断方》。

【组成】干地黄三钱 阿胶一钱 川芎 艾叶各一钱

【用法】上咬咀。每服二钱, 水一大盞, 酒半盞, 煎至八分, 不拘时候温服。后服鳖甲散。

【主治】妇人经脉不通。

70810 胶艾汤

【方源】《普济方》卷三三七引《指南方》。

【异名】胶艾芎归汤(《医学入门》卷八)、胶艾当归散(《医学正印》卷下)。

【组成】阿胶 川芎 甘草(炙) 各二两 艾叶 当归各三两

【用法】上为粗末。每服五钱, 水二盞, 煎

至一盞，去滓，溫服。

【主治】①《普濟方》引《指南方》：妊娠胞阻。②《東醫寶鑑·雜病篇》：胎動下血在八、九月內，及半產後因續下血不絕。

【加減】冷痛，加干姜二兩。

70811 膠艾湯

【方源】《三因》卷十七。

【組成】熟地黃一兩 艾葉（炒） 當歸 甘草（炙） 芍藥 川芎 阿膠（炙）各一兩 黃耆一兩

【用法】上銼散。每服四錢，水一盞半，煎七分，去滓，食前溫服。

【功用】安胎。

【主治】①《三因》：妊娠頓仆，胎動不安，腰腹痛，或有所下，或胎奔上刺心，短氣。②《大生要旨》：懷孕而陰虛不足以濟火，氣虛不足以固血，點滴下血。

【加減】胸中逆冷，加生薑五片，大棗三枚。

【方論選錄】《醫方考》：阿膠、熟地、當歸、川芎，益血藥也；黃耆、甘草、艾葉，固氣藥也。血以養之，氣以固之，止漏安胎之道畢矣。

70812 膠艾湯

【方源】《鄭氏家傳女科萬金方》卷一。

【組成】阿膠 艾絨 川芎 甘草 當歸 白芍 熟地 赤石脂 地榆 菖蒲（一用蒲黃） 小蓳（一用蘇木）

【用法】水一鐘，酒半鐘，煎服。

【主治】婦人沖任虛損，崩傷淋漓，赤白帶下。

70813 膠艾湯

【方源】《靈驗良方匯編》卷上。

【組成】當歸五錢 芍藥（炒） 地榆（炒）各一錢 熟地八錢 川芎二錢 阿膠（炒）三錢 艾葉五分 甘草四分

【主治】孕婦胎動不安兼漏血。

70814 膠艾湯

【方源】《竹林女科》卷一。

【組成】阿膠 白芍 熟地黃各一錢 艾葉三錢 川芎八分 大棗三枚

【用法】水煎，空心服一二劑，次服紫金丸。

【主治】婦人經來幾點而止，過五六日或十日又來幾點，一月之內常行二三次，面色青黃。

70815 膠艾飲

【方源】方出《得效》卷十四，名見《普濟方》卷三四四。

【組成】生艾汁二盞 阿膠 白蜜各二兩（一方有竹茹一大塊）

【用法】煎一盞半，稍熱服之。

【主治】漏胎下血，胎上沖，手足逆冷欲死。

【備考】無生艾，濃煎熟艾。

70816 膠艾散

【方源】方出《千金》卷十二，名見《普濟方》卷一九〇。

【組成】艾葉一升 阿膠如手掌大 竹茹一升 干姜二兩（一方無竹茹，加干姜成七兩）

【用法】上咬咀。以水三升，煮取一升，去滓，納馬通汁半升，煮取一升，頓服之。

【主治】上焦熱，膈傷，吐血、衄血或下血，連日不止。

【方論選錄】《千金方衍義》：吐衄日久，亡脫已多，非姜、艾、阿膠溫補之劑，不能助馬通搜逐之功；竹茹一味，專散膈上浮熱也。血虛發熱，而脈脫無陽，不但竹茹禁用，必加干姜方得固脫之力。

70817 膠地丸

【方源】《產科心法》卷上。

【組成】阿膠二兩（蛤粉炒，為末） 大生地二兩（酒蒸熟，杵膏）

【用法】上為丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以米飲送下；如急時，每樣二錢，水煎服。

【功用】補血。

【主治】孕婦血尿。

70818 膠紅飲

【方源】《良方集腋》卷下。

【組成】陳阿膠一兩（米粉拌炒成珠） 全當歸一兩 西紅花八錢 冬瓜子五錢

【用法】以天泉水煎服二次，然后去滓。

【主治】年迈妇人骤然血海大崩不止，亦名倒经。

【加减】身发热，即以六安茶叶三钱煎服。

【临证举例】崩漏 有少妇大崩不止，服大补剂不效，汤饮不下，昏晕几次，势在危笃，即此胶红饮减去红花一半，投之立效。

70819 胶连丸

《普济方》卷二一一。为原书卷二〇九“黄连丸”之异名。见该条。

70820 胶连饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】黄连 当归身 阿胶各二钱 赤芍 芡实 泽泻 车前子 牛膝 山药各七分 川芎 熟地各一钱

【用法】水煎，临服加入童便一小钟。

【主治】一切崩淋。

70821 胶饴丸

【方源】《鸡峰》卷三十。

【组成】干姜（炮裂，为细末）

【用法】以白饴铤如樱桃大，以新水过，入铁铤子，灰火中煨令溶，和姜末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以米饮送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少，易伤难化，无力肌瘦。

【备考】本方原名胶饴煎，与剂型不符，据《普济方》引《十便良方》改。

70822 胶饴汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】地黄一两 芍药二两 当归一两 干姜二两 黄橘皮 川椒各一两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加大枣一枚，胶饴如弹子大，煎至一盏，去滓温服。

【主治】肝气受邪，客乘子心，血涩而变，气不得速行而致肝心痛，腹痛而色苍苍如死灰，终日不得太息，心脉急甚。

70823 胶饴煎

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】胶饴五斤 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）二升 杏仁（去皮尖双仁，炒）一升（研成膏） 干姜（炮） 人参各一两 附子（炮裂，去皮脐）五枚 桂（去粗皮）一两半 天门冬（去心，焙）二两半

【用法】上八味，六味为细末，与杏仁膏同捣干杵，入胶饴和匀。每服半匙，含化，日三夜二。

【主治】咳嗽呕吐。

70824 胶胡散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】烟胶五钱 羊胡子一撮（烧灰） 轻粉一钱

【用法】上为末。湿则干搽，干则油调。

【主治】羊胡子疮。

【备考】本方方名，《疡医大全》引作“羊胡散”。

70825 胶香散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉一钱 白胶香二钱 大风子肉十五个 烟胶二钱

【用法】上为末。用煎鸡蛋黄调搽上。

【主治】胎毒疮。

【加减】搽上如痒，加枯矾五分。

70826 胶粉散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】烟胶一两 燕窝土三钱 轻粉一钱 枯矾五分

【用法】上为末。熟油调，搽患处。

【主治】燕窝疮。

70827 胶鼓汤

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 鼓一合 薤白十茎（切） 生姜一两（切）

【用法】以水二大盏，煎至一盏二分，去滓，食前分温三服。

【主治】产后虚冷下痢，及血液输泻腹痛。

70828 胶鼓汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】牛皮胶(黄明者,炙燥,为末)一钱匕 人参(为细末)二钱匕

【用法】用薄豉汁一盞,加葱白一寸,煎一二沸,去滓,常令温暖,遇嗽时,呷三五呷后,依前温之,候嗽时再服。

【主治】咳嗽经久不愈。

70829 胶黄散

【方源】《普济方》卷三八九引《全婴方》。

【组成】阿胶一两(炒) 蒲黄半两

【用法】上为末。每服半钱,生地黄汁微煎调下,随血左右,以帛急系两乳头,两窍俱出,并系两乳。

【主治】小儿大衄,口鼻耳出血不止。

70830 胶葵散

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】阿胶一两(蛤粉炒成珠) 黄蜀葵子一两

【用法】每服四钱,水煎服。

【主治】横逆难产。

70831 胶蜡汤

【方源】《外台》卷三十四引《深师方》。

【组成】粳米一合 蜡(如鸡子)一枚 阿胶 当归各六分 黄连十分

【用法】上切。以水六升半,先煮米令蟹目沸,去米纳药,煮取二升,入阿胶、蜡消烺,温分三两服。

【主治】产后下痢。

70832 胶蜡汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】阿胶一两 蜡(如博棋)三枚 当归一两半 黄连二两 黄柏一两 陈廩米一升

【用法】上咬咀。以水八升,煮米蟹目沸,去米纳药,煮取二升,去滓纳胶、蜡令烺,分四服。一日令尽。

【主治】①《外台》引《深师方》:产后下痢。②《千金》:产后三日内,下诸杂五色痢。

【方论选录】《千金方衍义》:峻投连、柏以坚肠胃之崩迫,归、胶以滋营气之虚躁,蜂蜡

以安脓血之绝伤,陈米以资胃气之敷化。此驻车丸之支派,于中除去干姜而加黄柏、米、蜡也。按驻车丸亦《千金》所立专调肾脾肺三车之气,以鹿车之力过疾,则以黄连驻之;牛车之力过缓,则以干姜御之;羊车之力过劳,则以阿胶滋之。而驾驭三车者,血与气耳,用当归者,藉以统摄伤残之余,不使更失常度而淪胥不止也。夫产后虚能受热,正宜温理中气,何反除去辛温而进苦寒?是必西北风气刚劲,资禀偏阳,难胜辛热,所以去彼取此。设当东南水土卑弱,躯体柔脆,又当悠赖干姜而远黄柏矣,孰谓异法方宜之可忽乎!

70833 胶蜜汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】连根葱白三片 透明阿胶(炒)二钱 蜜二匙

【用法】新水煎,去葱,入阿胶、蜜溶开,食前温服。

【主治】老人、虚人大便秘涩。

70834 胶髓膏

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉一钱 川椒末五分 烟胶一钱

【用法】上为末。将猪骨髓入铤内煎熟,调搽上。

【主治】恋眉疮。

70835 胶子蜜调药

《杂病源流犀烛》卷二十四。即《尤氏喉科秘书》“膏子药”。见该条。

70836 胶艾六合汤

《元戎》。为《妇人良方》卷二引陈氏方“六物汤”之异名。见该条。

70837 胶艾四物汤

《医学入门》卷八。为《金匱》卷下“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

70838 胶艾四物汤

【方源】《回春》卷六。

【异名】安胎饮。

【组成】当归 川芎 白芍(酒炒) 熟地

阿胶(炒) 条芩 白术(去芦) 砂仁 香附(炒) 艾叶(少许)

【用法】上锉。加糯米一撮,水煎,空心服。

【主治】胎漏下血,腹痛。

70839 胶艾四物汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】阿胶(蛤粉炒珠) 艾叶(醋炒) 当归 川芎 白芍 熟地 蒲黄(炒) 黄连 黄芩 生地 梔子 地榆 白术 甘草

【用法】上锉。水煎,空心服。

【主治】血崩。

70840 胶艾芎归汤

《医学入门》卷八。为《普济方》卷三三七引《指南方》“胶艾汤”之异名。见该条。

70841 胶艾芎归汤

《济阴纲目》卷八。为《胎产救急方》引《杨氏产乳方》(见《医方类聚》卷二二四)“胶艾汤”之异名。见该条。

70842 胶艾芎归汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】当归三钱 人参一钱半 艾叶一钱(醋炒) 茯苓一钱半 阿胶三钱(糯米炒) 川芎一钱 大枣三枚

【用法】水煎,去滓。温服。

【主治】孕妇小腹痛,脉弦细者。

【方论选录】妊娠劳伤冲任,阴血耗伤而经脉不足,络虚召寒,故小腹疼痛,胎因不安焉。人参扶元补气以充血脉,当归养血荣经以养经脉,阿胶补冲任之阴而络脉受荫,川芎行血中之气而经脉调和,茯苓清治节以通调,艾叶理血气以逐冷,大枣缓中益脾元。水煎温服,使血气内充,则经气布护而寒邪自散,何小腹疼痛之不已哉,胎孕有不安者乎?

70843 胶艾当归散

《医学正印》卷下。为《普济方》卷三三七引《指南方》“胶艾汤”之异名。见该条。

70844 胶艾安胎饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】阿胶 艾叶 黄耆 杜仲 川断

香附 人参 茯苓 熟地 川芎 当归 白芍 葱白

【主治】妊娠胎动而致妇人冲任二经血虚,胎门子户受胎不实;或饮酒过度,房事太多;或登高上厕,风入阴户,冲伤子室;或因击触;或暴怒伤肝;或用力过度伤筋胎动。

【加减】孕妇好饮酒,湿热伤胎,加黄芩、葛根;风伤胞门,加秦艽、防风;用力伤筋,倍加川断、杜仲。

【方论选录】四物佐以杜、续则补血固肾;参、苓佐以黄耆,则补气以健中;然必加胶、艾者,胶用井水煎炼而成,滋阴凉血,艾能调和经络。

70845 胶艾安胎饮

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】秦归二钱 阿胶 蕲艾叶 干地黄各三钱 杭芍一钱 桑寄生五钱 甘草一钱

【用法】水煎,温服。

【功用】补血安胎。

【主治】妇人血虚失养之妊娠腰腹痠胀,头晕心悸,自觉胎动不安或阴道出血,脉细滑。

70846 胶艾安胎散

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】人参 条芩 阿胶(蛤粉炒成珠)各一钱 土炒白术一钱半 酒洗当归 熟地各二钱 川芎 艾叶各八分 陈皮 紫苏炙草各四分

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【主治】孕妇顿仆跌挫,胎动下血不止。

70847 胶艾绛覆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】陈阿胶(烊冲)二钱 醋炒艾叶三分 墨鱼骨三钱 真新绛 旋覆花(包煎)各一钱半 青葱管三寸(冲)

【主治】虚体郁结伤中,脘肋串痛。

70848 胶艾霜归汤

【方源】方出《千金》卷十八,名见《张氏医通》卷十五。

【组成】阿胶 当归 青箱子各二两 艾叶一把

【用法】上咬咀。以水八升，煮取二升半，去滓，分三服。

【主治】蠃虫蚀下部痒，谷道中生疮。

【方论选录】《千金方衍义》：青箱治虫，艾叶导热，阿胶、当归以和其血。

70849 胶艾榴皮汤

【方源】方出《千金》卷二，名见《张氏医通》卷十五。

【组成】阿胶 艾叶 酸石榴皮各二两

【用法】上咬咀。以水七升，煮取二升，去滓，纳胶令烊，分三服。

【主治】妊娠注下不止。

【方论选录】《千金方衍义》：艾叶温血，阿胶佐之；榴皮固脱，艾叶辅之。允为安胎断痢之专药，不在药味之繁多也。

70850 胶艾漏胎方

【方源】《便览》卷四。

【组成】熟地 艾叶（炒） 白芍 川芎 黄耆 阿胶（炒） 归头 甘草 续断 白术

【用法】水煎，空心服。

【主治】胎漏。

【加减】有热，加条芩。

70851 胶归四逆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】当归四逆汤加陈阿胶一钱半

【用法】水、酒各半煎服。吞下乌梅丸十粒尤效。

【主治】肝脏虚寒，四肢厥逆，二旁季肋串痛。

【加减】冲脉虚寒，当脐左右而痛，加吴萸五分，蜜炙生姜一钱。

70852 胶地寄生汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】陈阿胶（烊冲）一钱半 细生地 桑寄生 黄草 川斛各三钱 甘杞子 浙茯苓各一钱半 九孔石决明（生打）一两

【主治】血虚络空，肝厥胃痛，痛引背肋，头晕嘈杂，两膝胫冷。

70853 胶苓四君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 甘草（炙） 阿胶（炒珠） 黄芩（酒炒）各一钱 生姜三片 大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】妇人胎动。

【备考】本方原名胶艾四君汤，与组成不符，据《竹林女科》改。

70854 胶姜理中汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】理中汤加黄耆 阿胶 艾 当归

【用法】水煎，食前服。

【主治】腹虚便血。

70855 胶菟清金汤

【方源】《理虚元鉴》。

【组成】紫菀 犀角 桔梗 生地 白芍 丹皮 麦冬 玄参 川贝 茯苓 阿胶 甘草

【主治】咳嗽痰中带血。

70856 胶菟犀角汤

【方源】《理虚元鉴》。

【组成】紫菀 犀角 地骨皮 百部 白芍 丹皮 麦冬 玄参 川贝 茯苓 阿胶 甘草

【主治】劳嗽吐血。

脑

70857 脑子散

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】大黄一分 郁金二钱

【用法】上先以猪牙皂角煮一复时，取切片子，焙干为末，次入粉霜、脑子各少许，再同研令匀。每服一字，以沙糖水调下。

【主治】小儿伤风咳嗽不住兼瘦呷。

70858 脑朱丹

【方源】《济阳纲目》卷一。

【组成】朱砂二两二钱半 龙脑一钱 白附子(炮,去皮脐) 石膏(煅红,令冷)各半斤

【用法】上为末,烧粟米饭为丸,如小豆大,朱砂为衣。每服三十丸,食后茶酒送下。

【主治】诸风痰盛,头痛目眩,气郁积滞,胸膈不利。

70859 脑泻散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】苦葫芦子一两

【用法】以童子小便一中盞浸之,夏一日,冬七日。取汁少许,滴入鼻中。

【主治】鼻塞眼昏,头疼胸闷。

70860 脑香散

【方源】《医方类聚》卷二四四引《经验良方》。

【组成】没药一钱 樟脑一字

【用法】上为末。每以药点其舌上。

【主治】小儿吐。

70861 脑疳丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】芦荟

【用法】上为末。每用少许,吹鼻中。

【功用】杀脑疳虫,止鼻中痒。

【主治】小儿脑疳。头皮光急,满头生疮,脑热如火,发结如穗,遍身多汗,腮肿凶高。

70862 脑漏散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】川芎 荆芥 防风 干姜 白芷 甘松各一两 羌活 甘草各半两

【用法】上为末。每服二钱,食后以茶清送下。

【主治】鼻流清浊涕,积年不愈。

70863 脑麝祛风丸

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】白花蛇头一个(带项三寸,酒浸,炙) 乌梢蛇尾二个(长七寸,酒浸,炙) 川乌头尖三个(去黑皮) 附子四个(去黑皮) 天南星(炮) 半夏(姜制) 白附

子 细辛(去叶) 防风(去芦) 天麻 全蝎(去毒,炒) 白僵蚕(去丝嘴,炒黄) 草乌头(炮) 各半两 脑 麝各一分(研)

【用法】上为细末,姜汁为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服五十丸,煎小续命汤送下,不拘时候。

【主治】左瘫右痪。

脓

70864 脓疱疥疮散

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】硫黄 川椒 白矾各一钱五分 朱砂 雄黄各一钱 血竭六分

【用法】上为末,用鸡蛋三个钻破一头,将箸调和,倒出拌药末,仍入蛋壳中,外用盐泥封固,炉中煅枯取出,加轻粉一钱,为末。和油调敷。

【主治】痘疮后生脓疮疥疮。

70865 脓溃生肌散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】生龙骨三钱 蜈蚣 熟石膏各二钱 干胭脂 陈石灰 象皮各一钱(煅) 浮干石六分 珍珠八分

【用法】上药各为末,研细如飞面。每用少许掺膏上。

【主治】痈疽脓毒溃尽,肌肉不生。

70866 脓窠疥疮药酒

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】生地 金银花 当归 苍术各二两 猪板油十两

【用法】上药入坛内,加酒十五斤,封口,隔水煮一炷香,退火气三日。任饮。

【主治】脓窠疥疮。

鸱

70867 鸱头丸

【方源】《千金》卷十四引《经心录》。

【组成】葶苈子 铅丹 栝楼根 虎掌乌头各三分 白术一分 蜀椒 大戟 甘遂

天雄各二分 鸱头一枚 铁精 茵茹各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，以汤酒送下。每日三次。

【主治】风癫。

【方论选录】《千金方衍义》：乌头、天雄、茵茹、蜀椒破结攻毒，虎掌、白术祛风涤痰。铅丹、铁精镇摄虚邪，葶苈、甘遂、大戟、桔楼下泄毒风，鸱头上追风毒，专取旋风健搏之义。

70868 鸱头丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】鸱头一枚（炙令黄） 茵茹一两 白术一两 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为末，炼蜜和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】风头旋，毒发眩冒。

70869 鸱头丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】鸱头一枚（臭者，炙令黄色） 蛭螂七枚（去翅足，微炙） 桂心半两 茯神半两 赤芍药半两 蚱蜢十枚（微黄） 蛇蜕皮五寸（炙黄） 露蜂房半两（炙黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 当归半两（锉，微炒） 芎藭半两 丹参半两 麝香一分（细研） 牛黄半两（细研） 莨菪子半两（炒令黑）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以温水送下。

【主治】小儿惊痫，发动经年，不断根源。

【备考】《圣济总录》有黄芩、大黄。

70870 鸱头丸

【方源】《普济方》卷一〇〇引《济生》。

【组成】飞鸱头一枚（烧灰） 虢丹五钱（细研） 皂角五铢（酥炙）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，加至二十丸，以粥饭送下，不拘时候。

【主治】①《普济方》引《济生》：风痫，不问长幼，发作渐频，呕吐涎沫。②《东医宝鉴·内景篇》：癫痫恶病。

70871 鸱头酒

【方源】《千金》卷十三。

【组成】飞鸱头五枚 防风 芎藭 薯蓣 茯神各四两 葛根 桂心 细辛 人参 天雄 干姜 枳实 贯众 蜀椒各二两 麦门冬（一作天门冬） 石南各五两（一作石膏） 山茱萸一升 独活二两（一方无茯神）

【用法】上咬咀。绢囊盛，清酒四升渍六宿，初服二合，日再服，稍加，以知为度。

【主治】风头眩转，面上游风。

70872 鸱头酒

【方源】《幼幼新书》卷十三引《婴童方》。

【组成】鸱头一个 秦艽 丹参 石南草 独活 防己 细辛各四分 芍药八分

【用法】上切。入绢袋，清酒五升浸，每服半合，随时日数服，一日三次。

【主治】少小风邪，言语错乱，不知人。

70873 鸱鸢膏

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】鸱鸢一个 穿山甲一两二钱（生） 桂枝五钱五分 白芷一钱五分 木贼草三钱五分 山萸肉一两 郁金 赤苓各五钱 赤芍六钱 当归一两 云苓 南红花各五钱 白芍六钱 全蝎十条 麻黄三钱五分 石斛三两

【用法】用香油三十八两，先将鸱鸢炸枯去骨，再入他药同炸，滤去滓，用章丹三两，官粉十四两收膏。将药膏摊于布上，贴患处。

【主治】筋骨疼痛，手足麻木，瘰癧结核，无名肿毒。

【宜忌】忌辛辣发物。

鸱

70874 鸱鸢散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】鸱鸢五只（治，洗令净，晒令干）

【用法】上为散。每服二方寸匕，空心以白粥饮服，每日二次；亦可任性炙食。

【主治】老人痔病下血不止，日加羸瘦无

力。

皱

70875 皱血丸

【方源】《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。

【组成】菊花(去梗) 茴香 香附(炒, 酒浸一宿, 焙) 熟干地黄 当归 肉桂(去粗皮) 牛膝 延胡索(炒) 芍药 蒲黄 蓬术各三两

【用法】上为末, 用乌豆一升醋煮, 候干, 焙为末, 再入醋二碗, 煮至一碗, 留为糊, 为丸。如梧桐子大。每服二十丸, 温酒或醋汤送下; 血气攻刺, 炒姜酒送下; 癥块绞痛, 当归酒送下。

【功用】①《局方》(续添诸局经验秘方): 暖子宫, 种子。②《三因》: 调补冲任, 温暖血海, 去风冷, 益血。

【主治】①《局方》(续添诸局经验秘方): 妇入血海虚冷, 气血不调, 时发寒热, 或下血过多, 或久闭不通, 崩中不止, 带下赤白, 癥瘕癖块, 攻刺疼痛, 小腹紧满, 胁肋胀痛, 腰重脚弱, 面黄体虚, 饮食减少, 渐成劳状, 及经脉不调, 胎气多损, 产前、产后一切病患。②《三因》: 胞络伤损, 宿瘀干血不散, 受孕不牢, 而致损堕。

【宜忌】忌鸭肉、羊血。

70876 皱肺丸

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】五灵脂(研)二两 柏子仁半两 胡桃八枚(去壳, 研)

【用法】上药研成膏, 水为丸, 如小豆大。每服十五丸, 煎木香、甘草汤送下。

【主治】肺胀。

70877 皱肺丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】贝母(炒) 知母 秦艽 阿胶(炒) 款冬花 紫菀茸 百部(去心) 糯米(炒)各一两 杏仁(去皮尖, 别研)四两

【用法】上为末。将羊肺一个, 先以水灌洗,

看容得水多少, 即以许水更添些, 煮杏仁令沸, 滤过, 灌入肺中, 系定, 以糯米泔煮熟, 研细成膏, 以前药末为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 食前以桑白皮汤送下。

【主治】喘咳。

70878 皱肺丸

【方源】《百一》卷五。

【组成】款冬花 人参 五味子 桂(去皮) 紫菀 白石英(微带青色者) 钟乳粉各等分

【用法】上为末, 用羯羊肺一具, 去皮尖杏仁半斤, 同用水煮肺烂为度, 去筋膜与杏仁同研极烂, 和众药为丸, 如梧桐子大, 阴干。每服五七十丸至一百丸, 食后临卧, 糯米饮送下。

【主治】久嗽。

留

70879 留齿散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】竹留齿

【用法】上为末。掺在内, 用干鳔以水蘸一处, 火炙之令粘, 即点刺头, 猛取之。

【主治】小儿服有刺。

70880 留线汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地五钱 款冬花一钱 山茱萸二钱 麦冬五钱 地骨皮五钱 贝母 苏子各一钱 山药 芡实各三钱 百部三分

【用法】水煎服。

【主治】肾水涸, 劳损弱怯, 喘嗽不宁, 渐渐瘖哑, 气息低沉。

逢

70881 逢原饮

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】天冬一钱五分 麦冬一钱五分 南沙参四钱 北沙参三钱 胡黄连五分 石斛三钱 玉竹三钱 蛤粉四钱 贝母二钱 茯苓三钱 广皮一钱 半夏一钱五分

【用法】加梨汁半杯冲服。

【功用】清润，渗湿化痰。

【主治】上消。肺气焦满，水源已竭，咽燥烦渴，引饮不休，肺火炽盛，阴液消亡，火盛则痰燥，其消烁之力，皆痰为之助虐。

效

70882 效妙散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】密陀僧 雄黄各三钱 白砒二钱 枯矾五钱 硫黄（火煅，入烧酒煮过，埋土中一宿）一两

【用法】上为细末。抓破患处，以煨熟生姜切开，蘸药擦上。

【主治】一切顽癣，杨梅癣。

70883 效验汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】陈皮 麦门冬 桔梗各一钱 玄明粉 木通 黄柏 山梔 连翘 生地各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】口糜。

高

70884 高丽丸

《全国中药成药处方集》（抚顺方）。为原书“高丽清心丸”之异名。见该条。

70885 高堂丸

【方源】《外台》卷二引《古今录验》。

【异名】黑奴丸、驻车丸。

【组成】大黄二分 消石三分（熬） 釜底墨一分 灶突中墨一分 黄芩一分 梁上尘一分 灶中黄土一分 麻黄二分（去节）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，著一盏水中，尽用服之。即自极饮水，汗出得热除矣。

【主治】伤寒苦渴，烦满欲死。

70886 高良姜丸

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】白术一两半 厚朴二两（去粗皮，

涂生姜汁，炙令香熟） 人参一两（去芦头） 高良姜一两（锉） 桂心一两 甘草半两（炙微赤，锉） 京三棱一两（微煨，锉） 红豆蔻半两（去皮） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以姜、枣汤送下。

【主治】伤寒后宿食不消，脾胃积冷，多吐酸水，不思饮食。

70887 高良姜丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】高良姜三分（锉） 桂心半两 当归三分（锉碎，微炒） 陈橘皮半两（汤浸去白瓤，焙） 威灵仙三分 槟榔三分 牵牛子二两（微炒） 羌活三分 萝卜子二两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。以利为度。

【主治】脚气，心腹胀满，两膝疼痛。

70888 高良姜丸

《圣济总录》卷六十四。为原书卷六十三“大腹丸”之异名。见该条。

70889 高良姜丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】高良姜二两 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 人参（去芦头） 白术 甘草（炒）各一两 丁香一分 茱萸一分 肉豆蔻七枚（面裹煨） 缩砂仁半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，食前以生姜汤化下。

【主治】脾胃虚弱，中脘停寒，心腹作痛，泄泻不止，不思饮食。

70890 高良姜丸

【方源】《本草纲目》卷十四。

【组成】高良姜四两（切片，分作四分：一两用陈廩米半合炒黄，去米；一两用陈壁土半两炒黄，去土；一两用巴豆三四个炒黄，去豆；一两用斑蝥三四个炒黄，去蝥） 吴茱萸一两（酒浸一宿，同姜再炒）

【用法】上为末，以浸茱酒打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以姜汤送下。

【主治】心脾冷痛。

70891 高良姜汤

【方源】《千金》卷十三。

【异名】高良姜散（《圣惠》卷四十三）。

【组成】高良姜五两 厚朴二两 当归桂心各三两

【用法】上咬咀。以水八升，煮取一升八合，分三服，每日二次；若一服痛止，便停，不须更服；若强人为二服，劣人分三服。

【主治】①《千金》：卒心腹绞痛如刺，两脇支满，烦闷不可忍。②《普济方》引《指南方》：劳风。

【方论选录】《千金方衍义》：心腹绞痛而见脇满如刺，明系木邪凌上之实证，故用良姜、厚朴温散滞气，当归、桂心温散结血，兼行心肝肺三经以破寒积也。

70892 高良姜汤

【方源】《外台》卷六引《广济》。

【组成】高良姜五两 木瓜一枚 杜梨枝叶三两

【用法】上切。以水六升，煮取二升，绞去滓，空腹温三服，服别如人行六七里。

【主治】霍乱，冷热不调，吐痢。

70893 高良姜汤

【方源】《外台》卷六引《广济》。

【组成】高良姜四两 桂心四两

【用法】上切。以水七升，煮取二升，去滓，分三服，如人行四五里一服。

【主治】霍乱吐痢，转筋欲入腹。

【宜忌】忌生冷，生葱。

70894 高良姜汤

【方源】《外台》卷七引《广济》。

【异名】高良姜散（《圣惠》卷四十三）。

【组成】高良姜十分 当归十分 橘皮八分 厚朴十分（炙） 桔梗八分 桃仁五十枚（去皮尖） 吴茱萸八分 生姜八分 诃黎勒五分

【用法】上切。以水八升，煮取二升八合，绞去滓，分温三服，服别相去如人行六七里，再服。

【主治】久心痛刺肋，冷气结痛不能食。

【宜忌】忌猪肉、生冷、油腻、粘食、小豆。

70895 高良姜汤

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】高良姜三两 木瓜二枚 杉木节五两 川椒一两（去目） 蒴藋 五两 蓼叶五两

【用法】上锉细。以水一斗五升，煎取八升，去滓，加醋半升，搅令匀；及热，纳于杉木桶中，淋蘸两脚，兼以绵搥药汁，裹转筋处。

【主治】肝虚冷，转筋不止。

70896 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】高良姜 甘草（炙，锉）各半两 桂（去粗皮） 半夏（汤洗七遍，炒黄）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，同煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒呕哕，心腹冷疼，痰逆不消；兼治一切冷气，心腹疼痛。

70897 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【异名】高良姜煮散。

【组成】高良姜 桂（去粗皮） 人参各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加大枣一枚（去核），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】冷热气不调，霍乱吐逆不定，腹脇胀满。

70898 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】高良姜（锉） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁三度，炙干） 陈橘皮（汤浸，去白，焙干） 白术 桑根白皮（锉，炒） 甘草（炙）各二两 人参一两 木瓜（去皮瓢并子，焙干）三两

五味子(拣)二两 桂(去粗皮) 槟榔(锉) 诃黎勒皮 木香 肉豆蔻仁各一两 盐三升(淘去泥滓,炼成盐花,研)

【用法】上十五味,先捣前十四味,为细末,与盐花末同研令匀。以水五升,下药末一时入锅中,和盐花同煎,不住手搅,候水干,出药于盆中,干即贮之。每服两钱匕,加生姜少许,煎汤点服。

【功用】破气消食。

【主治】霍乱,心腹胀满疼痛。

70899 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】高良姜二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜半分(拍碎),煎至七分,去滓温服,一日三次,不拘时候。

【主治】霍乱,饮食辄呕。

70900 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】高良姜 槟榔(锉) 木香 当归(切,焙)各一两半 吴茱萸(汤浸,焙干,炒)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓空腹温服。

【主治】厥逆,腹满妨痛,或上冲心;寒疝卒痛,积聚不散,上冲心腹,与阴相引,痛则汗出。

70901 高良姜汤

《圣济总录》卷五十七。为《圣惠》卷四十三“高良姜散”之异名。见该条。

70902 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】高良姜 木香 赤茯苓(去黑皮) 槟榔(锉) 人参各三分 肉豆蔻(去壳) 吴茱萸(汤浸,焙炒) 陈橘皮(汤浸,去白,炒) 缩砂蜜(去皮)各半两 干姜(炮)一分

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,一日三次,不拘时候。

【主治】肠胃受风,久为飧泄,下痢呕逆,

腹内疼痛。

70903 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】高良姜(锉)一分 苦楝根皮(干者,锉)二两 胡椒三十粒

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至六分,去滓,空心服。服讫卧少时,未得吃食,或吐或泻即愈。

【主治】蛔虫。

70904 高良姜汤

《圣济总录》卷一七五。为《圣惠》卷八十四“高良姜散”之异名。见该条。

70905 高良姜汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】高良姜(锉)半两 桂(去粗皮)一两 木瓜(干者,去瓤)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盞,煎取七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】乳石发,霍乱转筋及心腹痛。

70906 高良姜汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】高良姜 厚朴 官桂

【用法】作一服,水一钟半,煎一钟,去滓,稍温服。

【主治】因寒,心胀痛。

70907 高良姜汤

《明医指掌》卷九。为《圣惠》卷七十八“高良姜散”之异名。见该条。

70908 高良姜饮

《圣济总录》卷一八四。为《外台》卷六引《备急方》“高良姜酒”之异名。见该条。

70909 高良姜酒

【方源】《外台》卷六引《备急方》。

【异名】高良姜饮(《圣济总录》卷一八四)。

【组成】高良姜

【用法】火炙令焦香,每用五两打破,以酒一升,煮取三四沸,顿服。

【主治】①《外台》引《备急方》:霍乱吐痢,腹痛气恶。②《圣济总录》:乳石发,吐痢转筋

气急。

70910 高良姜散

【方源】《圣惠》卷三十九。

【组成】高良姜一两(锉) 人参一两(去芦头) 草豆蔻三分(去皮) 白术半两 沉香三分 干紫苏半两 陈橘皮半两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分。去滓温服,不拘时候。

【主治】饮酒后脾虚,心腹胀满,不能消化,头疼心闷。

70911 高良姜散

《圣惠》卷四十三。为《外台》卷七引《广济》“高良姜汤”之异名。见该条。

70912 高良姜散

《圣惠》卷四十三。为《千金》卷十三“高良姜汤”之异名。见该条。

70913 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】高良姜 白豆蔻 桂心各一两 芎藭半两 丁香半两 当归半两(锉,微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】冷气不和,心腹疼痛,或时呕逆,不纳饮食。

70914 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】高良姜汤(《圣济总录》卷五十七)。

【组成】高良姜半两(锉) 人参三分(去芦头) 草豆蔻一两(去皮) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 诃黎勒一两(煨,用皮) 丁香半两 厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 桂心三分 甘草一分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加大枣二枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】脾虚腹胀,肠鸣切痛,食少无力。

70915 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】高良姜一两(锉) 木瓜一两(干者) 香薷一两 梨枝叶一两半 人参三分(去芦头)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,温温频服。

【主治】霍乱。冷热不调,吐利不止。

70916 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】高良姜三分(锉) 桂心三分 木瓜二两(干者) 肉豆蔻一两(去壳) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】霍乱,吐利转筋,疼痛,欲入腹者。

70917 高良姜散

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷二〇三。

【组成】高良姜三分(锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 木瓜二两(干者) 人参一两(去芦头) 白术三分 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:霍乱转筋。②《普济方》:霍乱吐利,疼痛。

70918 高良姜散

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷二〇三。

【组成】高良姜半两(锉) 桂心一两 木瓜二两(干者)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】霍乱。吐利过多,遍身筋转,及心腹痛。

70919 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】高良姜一两(锉) 干木瓜半两

莲子心半两 菖蒲半两 丁香一分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】胃冷咳癥，气厥不通。

70920 高良姜散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】高良姜三分（锉） 肉桂三两（去皱皮） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 白术一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 木香三分 赤茯苓一两 诃黎勒皮二分 大腹皮三分（锉） 人参一两（去芦头） 草豆蔻半两（去皮） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】破冷气，化宿食。

【主治】痰饮。

70921 高良姜散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】高良姜三分（锉） 诃黎勒皮一两 白术三分 赤茯苓三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 细辛半两 桂心三分 桔梗半两（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃气虚冷，胸膈冷气，痰饮，口中清水自出，胁急胀痛，不欲饮食。

70922 高良姜散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】高良姜汤（《明医指掌》卷九）。

【组成】高良姜（锉） 当归（锉，微炒） 草豆蔻（去皮） 各一两

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】产后霍乱吐利，腹内疼痛。

70923 高良姜散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】高良姜汤（《圣济总录》卷一七五）。

【组成】高良姜一分（锉） 陈橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 人参半两（去芦头） 草豆蔻一分（去皮） 当归一分（锉碎，微炒） 桂心一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿冷伤，脾胃气不和，心腹痛，不欲饮食。

70924 高良姜散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】高良姜半两（锉） 人参半两（去芦头） 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿霍乱，心腹痛不止。

70925 高良姜散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】高良姜一两半 陈橘皮（去白，焙）二两 陈曲（炒）半两 肉豆蔻（去壳） 干姜（炮裂） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 五味子 甘草（炙，锉） 白术 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，陈米饮调下。

【主治】脾胃不和，饮食减少，腹中虚鸣。

70926 高良姜散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】高良姜 芍药各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】暴心痛。

70927 高良姜散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】高良姜三两

【用法】上酒浸，纸裹，入慢火内煨令熟，

为散。每服一钱匕，米饮调下。

【主治】胃气极冷，卒病心痛，吐逆寒痰，饮食不下。

70928 高良姜散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】高良姜 乌药 京三棱(并锉)各一两 吴茱萸(水浸一宿，晒干)二两(与上三味相和炒，待茱萸焦即住火，净，拣去茱萸不用，将三味与后药同捣) 丹参(锉，微炒) 沉香(锉) 莎草根(炒去毛) 当归(切，焙) 桂(去粗皮) 桃仁(汤浸去皮尖双仁，麸炒令黄，研) 槟榔(微煨)各半两 麝香一分(别研入)

【用法】上为散。每服三钱匕，煎茯苓汤调下；或炒桃仁酒调下亦得。

【主治】厥心痛。面色青黑，眼目直视，心腹连季肋引痛满胀。

70929 高良姜散

《普济方》卷二〇二。即《圣济总录》卷三十八“良姜散”。见该条。

70930 高良姜散

《普济方》卷二〇二。为《外台》卷六引《许仁则方》“高良姜三味饮子”之异名。见该条。

70931 高良姜粥

【方源】《医方类聚》卷九十四引《食医心鉴》。

【组成】高良姜六分(锉) 米三合

【用法】上以水二升，煎高良姜，取一升半，去滓，投米煮粥食之。

【主治】①《医方类聚》引《食医心鉴》：心腹冷结痛，或遇寒风及吃生冷即发动。②《圣惠》：霍乱，吐利腹痛。

70932 高良姜粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】高良姜半两(锉) 粳米二合 陈橘皮半分(汤浸，去白瓢，末)

【用法】以水三大盏，煎高良姜、陈橘皮，取汁一盏半，去滓，投米煮粥。空腹食之。

【主治】心腹冷气，往往结痛，或遇风寒及

吃生冷即痛发动。

70933 高良姜粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】高良姜三两(锉) 羊脊骨一具(捶碎)

【用法】以水一斗，煮二味，取五升，去骨等，每取汁二大盏半，用米二合，入葱、椒、盐作粥食之；或以面煮馄饨作羹并得。

【主治】脾胃冷气，虚劳羸瘦，不能下食。

70934 高良姜粥

【方源】《养老奉亲》。

【组成】高良姜二两(切，以水二升，煎取一升半汁) 青粱米四合(研淘)

【用法】上以姜汁煮粥，空心食之，日一服。

【主治】老人冷气，心痛郁结，两胁胀满。

70935 高丽清心丸

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【异名】高丽丸。

【组成】寒水石 生石膏 黄芩 甘草 知母 黄柏 滑石 大黄 山梔各一两 黄连 朱砂 雄黄各五钱 冰片 牛黄各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，一钱四分重，蜡皮封。大人每服一丸，水送下。

【功用】消炎缓泻。

【主治】头痛齿痛，齿龈肿痛，唇焦口臭，暴发火眼，结膜肿痛，吐血鼻衄，头热眩晕，便秘尿赤，鼻干耳鸣，以及小儿疹后毒热不净，牙疳。

【宜忌】孕妇忌服。忌食辛辣等物。

70936 高良姜煮散

《圣济总录》卷三十八。为原书“高良姜汤”之异名。见该条。

70937 高枕无忧散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】人参五钱 软石膏三钱 陈皮 半夏(姜汁浸，炒) 白茯苓 枳实 竹茹 麦门冬 龙眼肉 甘草各一钱半 酸枣仁(炒)一钱

【用法】上锉。水煎服。

【功用】《杏苑》：理痰气。

【主治】①《古今医鉴》：心胆虚怯，昼夜不睡，百方无效者。②《杏苑》：虚烦失志，心气不足。

70938 高良姜十味散

【方源】《外台》卷二十五引《许仁则方》。

【组成】高良姜 细辛 黄耆 白术 苦参各五两 丁香二两 人参 干姜各四两 豆蔻子三两 赤石脂六两

【用法】上为散。先服附子等六味汤以利之后，初服一方寸匕，以饮下之，稍稍加至二三匕，一日二次。

【主治】肠胃中冷热不调，病根痼结，诸痢暂愈还发。

70939 高良姜羊肉汤

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】高良姜一两（锉） 赤芍药一两（锉） 当归一两（锉，微炒） 羊肉一斤半（细切） 桂心一两

【用法】除羊肉外，上为末。以水五大盏，都煮取两盏半，去滓，稍热服一小盏，不拘时候。

【主治】寒疝心腹痛，及胁肋里急，不下饮食。

70940 高良姜理中丸

【方源】《医方类聚》卷一〇八引《御医撮要》。

【组成】高良姜二两 白术一两 官桂半两 甘草一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，煎生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】霍乱吐泻，心腹疼痛。

70941 高良姜三味饮子

【方源】《外台》卷六引《许仁则方》。

【异名】高良姜散（《普济方》卷二〇二）。

【组成】高良姜二两 豆蔻子十二枚 桂心二两（一方有干姜、人参）

【用法】上切。以水四升，煮取一升，去滓，细细啜之。

【主治】湿霍乱，吐痢无限。

【宜忌】忌生葱。

70942 高粘除秘授消散败毒万应灵膏

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】当归 生地 白芷 银花 川乌 草乌各二两 防风 荆芥 赤芍 羌活 独活 僵蚕 蝉蜕 刺蒺藜 灵仙 首乌 川牛膝 山甲 蛇蜕 鲜皮 甘草 黄柏 官桂各一两 乳香 没药各四钱 密陀僧（研，后入）八两 广丹（后入）一斤八两

【用法】上研细。用麻油六斤浸药，春五、夏三、秋七、冬十，日数足，入锅内慢火熬枯，去滓，净油入锅，熬至滴水成珠，下密陀僧末熬沸，离火置冷炉上片时，再投东丹，其丹不烘不炒，下为冷丹；或烘炒为熟丹。但下冷丹，极要仔细，熟丹好收，此丹投入，不住手搅，候冷，收成膏时，再下乳香、没药搅匀，即成膏矣。

【功用】消散败毒。

离

70943 离中丹

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生石膏二两（细末） 甘草六钱（细末） 朱砂末一钱半

【用法】上和匀。每服一钱，日再服，白水送；热甚者，一次可服一钱半。

【主治】肺病发热，咳吐脓血；暴发眼疾，红肿作痛，头痛齿痛，一切上焦实热之症。

【加减】咳嗽甚，加川贝五钱；咳血多，加三七四钱；大便不实，去石膏一两，加滑石一两，用生山药面五钱至一两熬粥，送服此丹；阴虚作喘，山药粥送服。

70944 离骨丹

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】刺猬皮一全张（连刺，按新瓦上焙老黄色）

【用法】上为细末。用白糖炒米粉拌食；或用米浆泛丸亦可，每服三钱，自然骨出管退。

轻则一张全愈，重则两张必愈矣。

【主治】骨槽风，各种多骨疽，顽骨不出，老脓成管。

70945 离骨丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】紫玉簪根一钱 白砒三分 白礞砂七分 月石二分 威灵仙三分 草乌一分 五厘

【用法】上为末。点牙。

【功用】取齿。

70946 离骨丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】急性子一钱 白砒一分

【用法】上为末。少许点之。

【功用】拔牙。

【宜忌】不可咽下。

70947 离骨散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】夜游将军 人言 窑老 丹各少许

【用法】上同研粉红色。搽之。

【功用】取牙。

70948 离骨散

【方源】《串雅补》卷四。

【组成】大活鲫鱼一个（去肠）

【用法】上人白玉簪花根三钱、皮消令满，缝好，大碗盖住，令出白霜，扫下收贮。点少许于牙根上，即落。

【功用】点牙。

【主治】患牙。

70949 离济膏

【方源】《理渝》。

【异名】扶阳益火膏、温肾固真膏（原书同页）。

【组成】生鹿角屑一斤（鹿茸更佳） 高丽参四两（用油三、四斤先熬枯去渣听用，或用黄丹收亦可。此即参茸膏影子）

生附子四两 川乌 天雄各三两 白附子 益智仁 茅山术 桂枝 生半夏 补骨脂

吴茱萸 巴戟天 胡芦巴 肉苁蓉各二两 党参 白术 黄耆 熟地 川芎 酒当归 酒白芍 山萸肉 淮山药 仙茅 蛇床子 菟丝饼 陈皮 南星 北细辛 覆盆子 羌活 独活 香白芷 防风 草乌 肉苁仁 草苁仁 远志肉 革澄茄 炙甘草 砂仁 厚朴（制） 杏仁 香附 乌药 良姜 黑丑（盐水炒黑） 杜仲（炒） 续断 牛膝（炒） 延胡索（炒） 灵脂（炒） 秦皮（炒） 五味子 五倍子 诃子肉 草果仁 大茴 红花 川草薢 车前子 金毛狗脊 金樱子 甘遂 黄连 黄芩 木鳖仁 蓖麻仁 龙骨 牡蛎 山甲各一两 炒蚕砂三两 发团一两六钱

生姜 大蒜头 川椒 韭子 葱子 棉花子 核桃仁（连皮） 干艾各四两 凤仙（全株） 干姜 炮姜 白芥子 胡椒 石菖蒲 木瓜 乌梅各一两 槐枝 柳枝 桑枝各八两 茴香二两

【用法】两共用油二十四斤，分熬，再合鹿角油并熬丹收。再入净松香、陀僧、赤脂各四两，阳起石（煨）二两，雄黄、枯矾、木香、檀香、丁香、官桂、乳香（制）、没药（制）各一两，牛胶四两酒蒸化，如清阳膏下法。（一加倭硫磺用浮萍煮过者）。贴心、脐、对脐、脐下。

【功用】扶阳益火，温肾固真。

【主治】元阳衰耗，火不生土，胃冷成膈；或脾寒便溏，泄泻浮肿作胀；或肾气虚寒，腰脊重痛，腹脐腿足常冷；或肾气衰败，茎痿精寒；或精滑，随触随泄；或夜多漩溺，甚则脬冷，遗尿不禁，或冷淋、或寒疝、或脱精脱神之症。妇人子宫冷，或大崩不止，身冷气微阳欲脱者；或冲任虚寒，带下纯白者；或久带下脐腹冷痛，腰以下如坐冰雪中，三阳真气俱衰者。小儿慢脾风。

70950 离珠丹

【方源】《医学发明》卷七。

【异名】神珠丹（原书同卷）、神珠丸（《赤

水玄珠》卷二)。

【组成】杜仲三两(去丝) 革薢二两 诃子五个 龙骨一两 破故纸(炒)三两 朱砂一钱半(研) 胡桃一百二十个(去隔皮) 缩砂仁半两 巴戟(酒浸,去心)二两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服二十丸,空心盐汤、温酒任下。

【主治】①《医学发明》:下焦阳虚,脐腹冷痛,足胫寒而逆。②《卫生宝鉴》:下焦元气虚弱,小腹疼痛,皮肤燥涩,小便自利。

70951 离照汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】琥珀一钱 丹参三钱 朱砂五分 茯神三钱 柏仁二钱 沉香五分 广皮一钱 青皮一钱 郁金二钱 灯心三尺 姜皮五分

【主治】心胀。烦心短气,卧不安。

70952 离宫錠子

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】血竭三钱 朱砂二钱 胆矾三钱 京墨一两 蟾酥三钱 麝香一钱五分

【用法】上为末,凉水调成錠。凉水磨浓涂之。

【功用】《北京市中药成方选集》:化坚祛毒,消肿止痛。

【主治】①《金鉴》:疔毒肿毒,一切皮肉不变,漫肿无头。②《北京市中药成方选集》:疔毒恶疮,初起坚硬,疼痛难忍。

袞

70953 袞金丸

【方源】《百一》卷五。

【组成】干姜(不炮) 真橘皮(不去白,洗) 天南星(生用) 半夏(不汤洗)各一两

【用法】先用生姜一两(不去皮)捣烂,制半夏、南星末作曲,却用余药一处为末,生姜自然汁为丸,如梧桐子大,雄黄少许为衣。每服三五十丸,姜汤送下,不拘时候,临卧服尤佳。

【主治】痰饮。

唐

70954 唐侍中散

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】槟榔七个 生姜二两 橘皮 吴茱萸 紫苏(茎叶) 木瓜各一两

【用法】上锉细。以水三升,煮取一升,分再服,不拘时候。

【功用】散肿下气。

【主治】脚气攻心。

70955 唐栖平痧丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】茅术三两 大黄六两 丁香六钱 麻黄三两六钱

【用法】上为末,蟾酥火酒化为丸,如梧桐子大,辰砂为衣。

【主治】一切痧胀,山岚,霍乱。

疔

70956 疔劳丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】茶毗处煤七钱 甘草三钱 麝香二分

【用法】上糊丸。十五岁以上,每服七分,空心以黄耆汤送下,日二夜一。

【主治】疔劳初发,咳嗽盗汗黄瘦。

70957 疔积丸

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】白芨黄 陈皮 缩砂 神曲(炒) 麦蘖 使君子各二钱半 甘草一钱半 蟾一个(炙黄) 陈米一勺(同巴豆七粒浸一宿,炒黄,只用米)

【用法】上为末,水为丸,如绿豆大。每服十丸,加至二十丸,空心饮送下。

【主治】疔积。

70958 疔积丸

《中国医学大辞典》。即《准绳·幼科》卷八

“疳积散”改为丸剂。见该条。

70959 疳积丸

《全国中药成药处方集》(上海方)。为《北京市中药成方选集》“肥儿丸”之异名。见该条。

70960 疳积饼

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】青皮(去瓢)五钱 陈皮五钱 山楂肉五钱 神曲(炒)五钱 麦芽(炒)五钱 砂仁(炒)四钱 白术(去芦)六钱 三棱(煨)五钱 莪术(煨)五钱 木香五钱 槟榔四钱 甘草(炙)四钱 小茴(炒)三钱 史君子(去壳)二两 川楝子(酒蒸去核)三钱 肉豆蔻(煨)四钱 诃子(去核)四钱 夜明砂(炒)三钱(另研) 干蟾蜍一大个 川黄连(去毛净)六钱(清水浸,取汁和药末)

【用法】上焙干,为细末,用好细白面六斤,微炒黄,以砂糖十两,水煮化,和前面药得所,印作饼子,每个重一钱。每服三五饼,任意嚼吃。

【主治】小儿五疳诸积,肚大青筋,面黄肌瘦,饮食少进,或泻、或痢、或腹痛。

70961 疳积散

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】百草霜(炒) 雷丸 茺萸各三钱 巴豆(去壳)一两(净,去心膜,不去油)

【用法】上为末,甑上饭为丸,如粟米大,黄丹为衣(一方青黛为衣)。每服一丸,空心米饮送下。

【主治】诸疳有虫。

70962 疳积散

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】厚朴(厚而紫色有油者佳,去粗皮,切片,生姜自然汁炒熟,为末,净)一两 广陈皮(去白,为末)八钱 粉甘草(去皮,净,为末) 真芦荟(净末)各七钱 茺萸(真孔林大而多白衣者佳,去白衣壳,净末)五钱 青黛(取颜料铺中浮碎如佛头青色者,研,净末)三钱 百草霜(山庄人家锅底墨,净末)二钱 旋覆花(净末)一钱半

【用法】上匀和成剂。每一岁用药一分,用灯心汤早上空腹时调服,服后病即愈。当再用肥儿丸调理;如脾气未实,用启脾丸或大健脾丸。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方);健脾消积,杀虫利气。

【主治】小儿乳乳、病乳、夹乳、夹食,大病之后,饮食失调,平居饮食过饱伤脾,致成疳积,面黄腹大,小便色如米泔,大便泻黄酸臭,头皮干枯,毛发焦穗,甚至目涩羞明,睛生云翳,形体骨立,夜热昼凉,丁奚哺露。

【加减】如疳气未尽,用陈皮一两,白术、木香三钱,白茯苓五钱,加好平胃散三钱,陈米粥汤调服。

【备考】本方改为丸剂,名“疳积丸。(见《中国医学大辞典》)。

70963 疳积散

【方源】《痘学真传》卷七引叶氏方。

【组成】红曲五两(炒) 石燕(醋煨) 朱砂各一两(水飞)

【用法】十岁者每服一钱,酒酿泡汤调服。

【主治】痘后饮食不禁,伤暑而成疳积。

【方论选录】红曲以消谷食油腻,石燕以磨坚积,朱砂以清郁热。

70964 疳积散

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】茯苓(去皮)二两 海螵蛸一两 槟榔 鹤虱 雷丸 三棱(醋制) 莪术(醋制)各五钱 红花三钱 炒鸡内金 使君子肉各五钱

【用法】上为细末,二钱重,装袋。五岁以上每服一袋,周岁每袋分五次,二三岁分三次,四五岁分二次,白开水送下。

【功用】杀虫消积。

【主治】食积、疳积,蛔虫、蛲虫、寸白虫、一切肠胃寄生虫,腹胀腹痛,面黄肌瘦,消化不良。

【宜忌】忌荤腥食物。

70965 疳积散

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【异名】痞药。

【组成】煅石燕子 煅石决明 白茯苓 使君子肉各二两 威灵仙 炙鸡内金 谷精草各一两

【用法】上药加冰糖或白糖一两，为细末，每三钱用纱布袋包装。每服一袋，以米汤一碗，于饭锅上蒸透，只吃米汤，不吃药末。

【功用】《中国药典》：消积治疳。

【主治】小儿疳积，面黄肌瘦，腹部膨胀，便多整谷；甚至毛发脱落，目翳雀盲。

70966 疳积膏

【方源】《卫生鸿宝》卷三。

【组成】白术(蜜炒) 麦冬(去心)各一两 茯苓七钱 使君子肉(炒)八钱 檀肉(炒焦) 麦芽(炒)各五钱 芡实 莲肉 橘红各四钱 青皮(麸炒)二钱

【用法】水熬膏。每服二匙，早、晚开水调服。

【主治】潮热，面黄肌瘦，烦渴吐泻，肚大青筋，手足如柴，精神惊悸。

【加减】身热咳嗽，加地骨皮、百部各三钱；肚腹饱胀，便泻肠鸣，虫出不和，加槟榔一钱半，木香五分。

70967 疳疾丸

【方源】《卫生鸿宝》卷三。

【组成】于术(土炒)三两 茯苓二两 山药 莲肉(炒) 芡实 白扁豆(炒) 麦冬(去心) 炙耆 陈皮 制半夏 枳壳 榧子各八钱 丹皮 槟榔各六钱 史君子肉(生熟)各一两 厚朴(制)五钱 川楝根(炒黄)四钱

【用法】上为细末，荷叶煮老米汤打糊为丸，每重一钱。白汤送下。

【主治】疳积。

70968 疳疾散

【方源】《沈绍九医话》。

【组成】白术 鸡内金各五钱 猪联贴一

两

【用法】猪联贴焙干，和上药共为细末。每饭后服五分至一钱，汤水送服。

【主治】小儿疳疾。

【备考】猪联贴，即猪脾脏。

70969 疳湿散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《得效》。

【组成】五月五日虾蟆 木香 硫黄 铁精各等分

【用法】上为末，入麝香少许。掺敷患处。

【主治】妇人阴蚀疮。

70970 疳湿散

《普济方》卷三二六。为《医学纲目》卷二十“甘湿散”之异名。见该条。

70971 疳积膏药

【方源】《卫生鸿宝》卷三。

【组成】葱白七寸 生栀子 苦杏仁 红枣各七个 皮消 灰罗白面各三钱 真头酒糟一两

【用法】石臼内捣如泥，白布(五寸宽)二块，摊膏二张。前贴肚脐，后贴背腰，布巾扎好。三日内见靛青即好；如未见，再换一次。

【主治】小儿二三岁，失乳后，服食米面，积块痞癖生疳，或泄泻面伤眼，或口渴而饮水，或贪食黄瘦，或爱睡而面向下。

70972 疳症仙丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄黄三钱 麝香五分 胆星二钱 全蝎(炙，炒，去足) 僵蚕(炒)各一钱 朱砂(水飞，为衣)二钱 巴豆(去油)五钱

【用法】上为末，神曲糊为丸，如菜子大。每服十丸，白汤送下。

【主治】小儿肚大，黄瘦，腹痛，虫积。

70973 疳眼兼药

【方源】《名家方选》。

【组成】合欢木 车前子各等分(存性，霜)

【用法】先取小鳊鲈鱼不满尺者烧之，鱼汁将出，取霜药粉于鱼上。饵之。

【主治】疳眼雀目，用午王丸不愈者。

70974 疳药麝香丸

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】芦荟 胡黄连 宣连一两 青皮 陈皮各一两半 木香 槟榔各五钱 使君子二两 麝香少许

【用法】上为末，水为丸，如黍米大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】疳。

70975 疳疮轻粉散

【方源】《医方大成》卷八引《经验方》。

【组成】抱鸡卵壳 鹰爪黄连 轻粉各等分

【用法】上为末。以煎过清油调涂。

【主治】外肾痈疮。

【备考】本方方名，《普济方》引作“黄连轻粉散”。

70976 疳热凉膈散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】大黄 黄连 黄芩 石膏 生地 方解石 玄参 连翘 牛蒡 枳壳 薄荷 荆芥穗

【主治】疹后牙疳甚烈者。

70977 疳积珍珠散

【方源】《梅氏验方新编》卷三。

【组成】肥厚左牡蛎五斤 好香醋七八斤

【用法】上药将牡蛎用醋煨，以酥为度，放于净凉地土上去火气，拣起净肉，为极细末，收贮听用。每岁一分，每服用弗落水鸡软肝一个，用银簪挑去筋膜，干布抹去血水，竹刀划开，将药掺上，放饭镬上蒸熟，不加盐，淡吃。轻者二三服，重者亦不过四五服。

【主治】小儿疳膨食积，面黄肌瘦，且生翳障。

【宜忌】挑鸡肝忌铁器。

疔

70978 疔腮汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】连翘三钱 大力 羌活 防风 柴胡各二钱 荆芥 薄荷 甘草各一钱 生姜

【主治】寒火冲耳而致疔腮。

痈

70979 痈肿膏

【方源】《外台》卷二十四引《广济方》。

【组成】松脂一斤（炼者） 豚脂三合（生） 椒叶一两 白蜡三两 蛇衔一两 黄耆一两 芎藭一两 白芷一两 当归一两 细辛一两 芍药一两

【用法】上切，以水先煎脂、蜡烊尽，纳诸药，三上三下，白芷色黄，膏成。用剪故帛，可疮大小涂膏贴上，日夜各一次。

【主治】痈肿肿溃。

疔

70980 疔疳丸

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】生地 熟地 当归 白芍 天冬 知母各等分 鳖甲（醋炙） 山楂减半

【用法】炼蜜为丸。大人每服一钱，小儿五分，早、晚灯心汤送下。

【主治】疹后发热成疔。

痂

70981 痂完余毒汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】黄连 黄芩 梔子（炒） 白芍 牛蒡子 北柴胡一钱 玄参 木通 连翘 薄荷 地皮 云茯苓 甘草

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘后热毒不除，口动如食物状。

〔备考〕方中除柴胡外，诸药用量原缺。

悻

70982 悻散汤

【方源】《千金翼》卷十二引张澹方。

【异名】牛乳方(《养老奉亲》)、革拔煎(《圣济总录》卷七十七)、牛乳汤(《直指》卷十四)、革拔乳(《袖珍》卷四引《仁存方》)、牛乳香(《普济方》卷二一〇)。

【组成】牛乳三升 革拔半两(末之,绵裹)

【用法】上二味,铜器中取三升水和乳合,煎取三升,空肚顿服之,每日一次。二七日除一切气。

【功用】补虚破气,除一切气。

【主治】《圣济总录》:气痢,久不愈,及诸痢困弱者。

【宜忌】慎面、猪、鱼、鸡、蒜、生冷。

悦

70983 悦脾汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】白术一钱 茅术一钱 茯苓二钱 附子八分 砂仁一钱 木香五分 乌药一钱 苡仁四钱 青皮一钱 神曲三钱(炒) 姜三片

【主治】脾湿胀痛。脾本湿土,寒邪乘之,寒与湿凝,是为重阴,脘下至当脐胀满作痛。

阎

70984 阎阎霜

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】青礞石(消煨) 石膏(煨) 硼砂 万年干各等分

【用法】上为细末。每用一匙,铁锁磨水灌下,存滓;再磨再灌,其痰即化。

【功用】化痰。

【主治】咽喉诸症,痰涎壅盛,已行探吐后;梅核气。

烧

70985 烧丹丸

【方源】《幼科类萃》卷十九。

【组成】玄精石(烧赤) 轻粉各一钱 粉霜 硼砂各半钱

【用法】上先将硼砂研细,入三味研匀,更入寒食面一钱研匀,滴水和成饼,再用面煨了,慢火内煨黄,取出去面,将药饼再研为细末,滴水和丸,如黄米大。一岁五丸,二岁十丸,夜卧以温浆水送下,至天明取下恶物是效,如不下,渐加丸数,如奶癖未消尽,隔三两日又服一服,癖消尽为度。

【主治】①《幼科类萃》:小儿食癖、乳癖,每日午后发寒热,咳嗽,胁下结硬。②《东医宝鉴·内景篇》:胎惊发痫。

【临证举例】痫 《东医宝鉴·内景篇》:一少女患痫,遇阴雨及惊则作声似羊鸣,口吐涎沫,知其胎受惊也,其病深痼难治,先予烧丹丸,继以四物汤入黄连,随时令加减,且令淡味以助药功,半年而愈。

70986 烧丹丸

【方源】《济阳纲目》卷四十六。

【异名】黄白丹。

【组成】虢丹 晋矾各一两

【用法】上用砖凿一窠,先安丹,次安矾,以炭五斤,煨令炭尽,取出细研,以不经水猪心血为丸,如绿豆大。每服十丸至二十丸,橘皮汤送下。

【主治】癫痫,无问阴阳冷热。

70987 烧丹散

【方源】《医方类聚》卷一八四引《吴氏集验方》。

【组成】橄榄核 黄丹

【用法】烧灰,入麝香少许为末。先葱椒盐汤洗,再将火点动掺之。

【主治】漏疮。

70988 烧白散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】大红枣 (去核) 人中白

【用法】将人中白填入枣内, 烧焦为末, 入麝香二厘。搽之。

【主治】牙疳。

70989 烧灰散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】大田螺 (并壳、肉, 烧存性, 研)

【用法】破者干贴, 未破者清油调敷。

【主治】瘰癧。

70990 烧伤散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】寒水石 156 克 炉甘石 156 克
赤石脂 156 克 生石膏 156 克 冰片 6 克

【用法】上为细末。用香油调, 外涂。

【主治】烫火伤。

70991 烧针丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】黄丹不拘多少 (研细)

【用法】用去皮小枣肉为丸, 如鸡头子大。每服一丸, 用针签于灯上烧灰为末, 乳汁送下。

【功用】清镇。

【主治】①《丹溪心法》: 吐逆。②《医学入门》: 小儿伤乳食, 吐逆及泻, 危甚者。

70992 烧针丸

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】黄丹 (水飞过) 朱砂 白矾 (火煨) 各等分

【用法】上为末, 枣肉为丸, 如黄豆大。每服三四丸, 戳针尖上, 于灯焰上烧存性, 研烂, 凉米泔水调服。泻者, 食前服; 吐者, 不拘时候; 外用绿豆粉, 以鸡子清和作膏, 涂两脚心; 如泻, 涂囟门。止则去之。

【功用】《北京市中药成方选集》: 和胃止泄。

【主治】小儿吐泻。

①《古今医鉴》: 小儿内伤乳食, 吐泻不止, 危甚者。②《保婴易知录》: 吐乳壅塞。③《卫生鸿宝》: 小儿吐泻, 烦躁作渴, 便黄腥臭, 属

热症者。④《北京市中药成方选集》: 脾胃虚弱, 呕吐恶心, 久泄不止, 精神疲倦。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(西安、吉林方): 忌生冷油腻, 不易消化物品, 热性病勿服。

70993 烧皂散

【方源】《医级》卷八。

【组成】牙皂 (烧尽烟存性)

【用法】上为末。每服一钱, 沸汤调下; 烧酒调下尤效。

【主治】胃脘痛剧, 诸药不效者。

70994 烧肝散

【方源】《博济》卷一。

【组成】茵陈 犀角 石斛 柴胡 (去苗) 白术 芍药各半两 干姜 防风 紫参 白芨 芫荽 桔梗 人参 胡椒 吴茱萸 官桂各一两

【用法】上为末。以羊肝一具 (如无, 即獾猪肝代之), 分作三份, 净洗去血脉脂膜, 细切, 用末五钱, 葱白一茎细切, 相和, 以湿纸三五重裹之, 后掘地坑, 内以火烧令香熟。每日空心以生姜汤调下。大段冷劳, 不过三服见效。

【主治】三十六种风, 二十四般冷, 五劳七伤, 一切痢疾, 脾胃久虚, 不思饮食, 四肢无力, 起止甚难, 小便赤涩, 累年口疮, 久医不愈。

【临证举例】泄痢 《苏沈良方》: 庐州刁参军, 病泄痢日久, 黑瘦如墨, 万法不愈, 服此一二服, 下墨汁遂安。

70995 烧肝散

【方源】《博济》卷一。

【组成】肉豆蔻三个 (和皮) 官桂三分 (去皮) 香白芷半两 当归 破故纸 人参 茯苓 桔梗各半两

【用法】上为末。每服四钱, 羊肝四两, 批作片子, 掺药在上, 令匀, 以刀背微捶, 以南粉涂湿纸裹, 文武火烧, 令香熟为度, 放冷, 用米饮嚼下。

【主治】丈夫、女人五劳七伤, 胸膈满闷,

饮食少味，脚膝无力，大肠虚滑，或即口内生疮，牙齿宣露，及妇人风血气块。

70996 烧肝散

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】山茵陈 石斛（去根） 当归（切，焙）各一两半 木香 桂（去粗皮） 人参 紫菀（去苗土） 桔梗（炒） 赤芍药 干姜（炮裂） 防风（去叉） 白芫荑 犀角（镑） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）各一两 白术一两一分

【用法】上为散。每用猪肝一具细切，入药末十五钱匕，葱白五茎（细切），入盐三钱匕，与肝拌和令匀，分作三服。每服用荷叶包，更以湿纸三五重裹，慢火烧肝令熟，空心、食前吃，用米饮下。如患冷劳，面色萎黄，不过吃十服愈。

【功用】补五脏，通气脉，和脾胃，止泄痢。

【主治】冷劳，面色萎黄，泄痢。

70997 烧肝散

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】附子四两（炮，去皮脐，切片子，以生姜汁半斤煮汁尽，焙干用） 缩砂一两 肉豆蔻 川椒各半两 茴香一分

【用法】上为细末。每服二钱，先以羊肝四两切作片子，去筋膜，然后入药并葱白、盐、醋各少许，同拌匀，以荷叶湿纸裹，于煨灰中烧令香熟，吃之了后用温酒压下。

【主治】筋脉疼痛，四肢倦怠。

70998 烧肝散

【方源】《普济方》卷十九引《家藏经验方》。

【组成】银州柴胡（去芦） 白术 红芍药 牡丹皮 人参（去芦） 苍术各一两 黑附子（炮，去皮脐） 石斛（去浮膜）各半两

【用法】上为末。用豕猪肝，薄批去血水，掺药在上，匀遍，以荷叶裹定，湿纸包之，慢火煨令过熟，空心、食前以米饮调下。

【主治】久年不愈心劳，口疮。

70999 烧肝散

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】黑附子一两 缩砂仁 川芎 青皮 陈皮 肉桂 益智 肉豆蔻 红豆 山茵陈 柴胡（去苗） 芍药 桔梗 白术 苍术（去皮，炒） 远志（去心） 干姜 白芷 良姜 细辛 蓬莪茂 芫荑 荜拨 大椒各半两

【用法】上为细末。每服五钱，猪羊肝四两批开，葱白二枚细切，掺药重重尽，纸裹三五重，文武火烧香熟。空心、食前吃，白面烧饼二个压，米饮送，次吃好酒三两盏。频频吃此药多验。

【主治】五劳七伤，三十六风，二十四冷，脐腹寒痛，四肢少力困倦，黄疮久患。

71000 烧肝散

【方源】《医方类聚》卷一五三引《施圆端效方》。

【组成】芍药 桔梗 缩砂仁 附子（炮，去皮） 茴香（炒） 干姜（炮） 苍术（炒） 良姜 桂各一两 红豆 川椒（炒） 白术 肉豆蔻 橘皮各半两 干山药四两

【用法】上为细末。每用三钱，猪肝三两，薄批作三片，掺药上，铺生姜、葱丝一重，卷定，麻扎了，湿纸数十重裹，慢火烧熟，分三四次细嚼，米饮下，每日一次。或细切肝，拌药末作馅，法面包作角子五六个，烧熟，每日一次亦佳。

【主治】脾虚劳损，年深泄泻，久作滑肠，瘦困减食，饮食虽多，不生肌肉，口疮燥渴，男子诸虚百损，妇人血气劳伤，少食而胀满，体无光泽，真气衰乏，少力好睡。

71001 烧肝散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】赤芍药 桔梗 红豆 白术 川椒（炒，去目） 胡椒 肉豆蔻 陈皮（去白）各半两 缩砂仁 南附子（炮） 茴香（炒） 良姜（炒） 干姜（炮） 苍术（炒） 官桂各一两 丁香二钱 干山药四两 木香二钱 吴茱萸三钱（炒）

【用法】上为末。每服三钱，用羊肝或猪肝三两，薄批开，掺药在上，铺生姜、葱丝一重卷定，麻札纸数重，水湿，慢火内烧熟，细嚼，食前米饮汤下，每日三次。

【主治】年深泄泻滑肠，一切痢。

71002 烧附散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】大附子一枚（半两者）

【用法】入急火烧，微存中心二三分取出，用瓷器合盖放冷为末，更入腊茶末一大钱，同研匀细。每服半钱，水一小盏，蜜少许，同煎半盏，去滓温服。服讫须臾，躁止得睡，汗出而解。

【主治】伤寒阴盛格阳，身冷厥逆，脉沉细，而烦躁体冷。

71003 烧青丸

【方源】《博济》卷四。

【异名】瑞白丸（《卫生总微》卷十一）、炼青丸（《圣济总录》卷一七六）。

【组成】轻粉二钱 玄精石一分 粉霜一钱 硃砂一钱 白面三两

【用法】上为细末，滴水为饼子，以文武火烧熟为度，再研，滴水为丸，如黄米大。每服七丸，浆水送下，三岁以下，服五丸。

【主治】小儿奶癖、食癖，每至午后时作寒热，微有咳嗽，肋肋癖硬。

【宜忌】《卫生总微》：忌一切生冷油腻毒物。

71004 烧青丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】轻粉 粉霜 硃砂各一钱 白面二钱 玄精石一分 白丁香一字 定粉一钱 龙脑半字

【用法】上为细末，滴水为一饼，以文武火烧熟勿焦，再为末，研如粉面，滴水为丸，如黄米大。每服七丸，浆水化下，三岁以下服五丸，量儿大小，加减服之。

【主治】乳癖。

71005 烧青丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《医林方》。

【组成】轻粉 硃砂 鹰条 白丁香 铅白霜各一钱 石燕子（烧，醋蘸） 海马各三个 海金砂 青黛各三钱 滑石半两

【用法】上为细末，米粥为丸，如梧桐子大，青黛为衣。先用龙脑擦牙里外。每服三丸，煎八宝散下之。

【主治】水气。

71006 烧茄散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】糟茄（切片）

【用法】新瓦上烘令干黑色，为末。敷之。

【主治】牙宣。

71007 烧枣丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】巴豆（去壳） 丁香 缩砂仁 杏仁（去皮尖） 白矾（如杏仁大）各一枚

【用法】用大肥枣子一枚（去核），包前五件在内，用粗纸三五重裹，水湿纸，放慢灰火中煨纸干，待矾消为度，杵极烂为丸，如梧桐子大。壮实人每服三丸，小弱人量减与服。

【主治】积滞，成白痢。

71008 烧枣丸

【方源】《回生集》卷上。

【组成】沉香 木香 公丁香 胡椒 官桂 干姜 砂仁 赤小豆各等分

【用法】上为末，煮红枣肉为丸，仍以枣肉包之，再以面裹煨熟，米汤送下。

【主治】泄泻不止，虽至面黑气息奄奄者。

71009 烧枣散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】大肥枣（去核，烧留性）

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调服，不拘时候。

【主治】妊娠冷气攻注，心脾刺痛。

71010 烧枣散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】干枣（连核烧存性） 川百药煎

(研细)各等分

【用法】上为末。每服一钱，米饮调下。

【主治】肠痛。

71011 烧枣散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】用大枣(去核，入信一粒合好，烧存性)

【用法】为细末。敷之。

【主治】走马牙疳。

71012 烧肾散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】磁石一两(烧，醋淬七遍，细研，水飞过) 附子一两(炮裂，去皮脐) 巴戟天一两 川椒一两(去目及闭口者，微炒出汗)

【用法】上为细散。用猪肾一具(去筋膜，细切)、葱白、薤白各一分(细切)，入散药一钱，盐花一字，和搅令匀，以十重湿纸裹，于煑灰火内烧熟，空腹细嚼，酒解薄粥下之。十日效。

【主治】①《圣惠》：耳聋。②《圣济总录》：肾脏虚风，上攻头面，耳内生疮，及腰脚重痛。

71013 烧胃丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】天雄二个 硫黄 附子 硃砂一两(别研) 官桂 木香各二两 干姜一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，以米饮送下；有痰，生姜汤送下。

【主治】脾胃虚困，有积冷及痰积，冷热不和，滑泄吐逆，盗汗，脐腹疼痛，肢满膨胀，刺痛，倦怠，全不思食。

71014 烧胃丸

【方源】《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》。

【组成】干姜 厚朴(二味同捣，炒) 附子(炮，去皮) 茯苓 甘草 陈皮 桂枝 诃子皮各等分

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】脾胃虚冷，疼痛泻痢。

71015 烧胃丸

《普济方》卷二十三。即《圣济总录》卷四十五“八味厚朴丸”以醋糊为丸。见该条。

71016 烧盐酒

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】白盐一合(新布数重包裹)

【用法】炭火烧存性，研细末。温酒调下。

【主治】血闭腹痛，产后瘀血腹痛。

【方论选录】新布即青麻也，能逐瘀血。

71017 烧盐散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】橡斗不拘多少

【用法】每用大者两个，入盐满壳，盖作一合，或五六个，或十数个，安在火内，和盐烧透，取出，地上以瓦碗盖定，存性候冷；入麝香少许，乳钵内极细杵匀，常收用小瓦盒盛贮，勿使纸裹。每以半钱，涂搽患处。

【主治】走马疳。牙根肉溃烂黑臭。

71018 烧盐散

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】烧盐 枯矾各等分

【用法】上为细末，和匀。以箸头点之。每日点三五次。

【主治】①《准绳·类方》：喉中悬痈垂长，咽中妨闷。②《金鉴》：心、肾经与三焦经积热而成悬痈，形若紫葡萄，舌难伸缩，口难开合，鼻中时出红涕，令人寒热大作，日久肿硬，下垂不溃。

71019 烧盐散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】食盐(烧研)

【用法】以箸蘸，频点硬处，再以盐汤漱口。

【主治】上腭肿硬。

71020 烧盐散

【方源】《医林纂要》卷六。

【组成】烧盐 热童便

【用法】三饮而三吐之。

【主治】干霍乱。

【方论选录】此为霍乱之不得吐泻者设，不得吐泻，其外有所遏，其内纠结坚也，凡上闭则下亦不通，越之以吐，而上下通矣。盐能使人涌吐，童便降泄三焦之火。

71021 烧梅饮

【方源】《医方类聚》卷一四〇引《吴氏集验方》。

【组成】乌梅一两

【用法】入火烧（去核），研为末。每服二钱，空心米饮调下。

【主治】便血。

71022 烧梅散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】大白梅 枳壳

【用法】上同烧存性，为末。米饮调下，不拘时候。

【主治】脏毒。

71023 烧裨散

【方源】《伤寒论》。

【组成】妇人中裨近隐处（烧作灰）

【用法】上一味，每服方寸匕，水调下，一日三次。小便即利，阴头微肿，此为愈也。妇人病，取男子裨烧服。

【主治】伤寒，阴阳易，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急。

【方论选录】①《医方考》：裨裆味咸而腐秽，故能入少阴；烧之则温，故足以化气；灰之则浊，故足以溺膀胱。《经》曰：浊阴归六腑，是也。药物虽陋，而用意至微，不因其陋而忽之，则升仲景之阶矣。②《古方选注》：裨裆穿之日久者良。阴阳易本无客邪，惟病人愈后，蕴蓄之热，乘虚袭人，溺逆三焦，仍取秽浊之物，导归阴窍，亦求之于其所属也。烧以洁其污，灰取其色黑下行。③《医宗金鉴》引方有执：裨裆近阴处，阴阳二气之所聚也。男女易用，物各归本也。

【临证举例】阴阳易 《陕西中医学院学报》(1983;1:36):患者张某,女,28岁。面色

苍白,恶寒汗出,盖被后又加盖皮大衣仍抖动不止,每间隔2~3分钟即发出恐惧凄惨的尖叫声。询言阴中拘引,有一股热气直冲心下,自感欲死而发叫,两腿酸困,项软头重不欲举,气短不续,双目紧闭,睁目则眩晕,小便三日未解,阴中流出霉腐样粘液。舌质淡,苔薄白,脉弦细稍数。因病情怪异,复询其夫,乃实告曰:三日前患感冒初愈,同房后即感身体不适,至天明病重不起,急送医院。经查体温、血压、血象未见异常,用西药对症治疗三日无效。此疾与阴阳易之病相合,令其夫如法烧服烧裨散,药后约三十分钟,阴中拘引感消失,心神渐安而入睡。三小时后,于病室畅尿一次,病症若失,惟感身体疲乏。患者执意去室外雪地排便,返回后病症复发如前。因忆烧裨散服法有小便利即效,予五苓散加木通,岂知服药后病情加剧。急令再调烧裨散后病症又消失。坚持服药三天,未再复发。以归脾汤、桂附地黄丸调理康复。

71024 烧绵丸

【方源】《普济方》卷二四七引《朱氏家藏方》。

【组成】川楝子（去核） 马蔺花 青橘皮 舶上茴香各一两

【用法】上为细末，用漆为丸，如鸡头子大，针穿三孔，阴干；用新绵半两，烧成灰，细研。以无灰酒调绵灰，稀稠得所，放温，下药一丸，正发未发时，皆可食之。药在腹中不坏，如要取药时，可饮葵汤即下，净洗留之，一丸药可治六七人。

【主治】疝气。

71025 烧脾散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】赤芍药 干姜（炮）各六两半 良姜（油炒）十两 甘草（炙）四两

【用法】上为末。每服二大钱，白汤点下，不拘时候。

【主治】脾胃虚弱，久寒积冷，心气脾痛，冷痰翻胃，脐腹刺痛，呕吐恶心，不思饮食；

及妇人血气攻刺，腹肋撮痛。

71026 烧脾散

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【组成】干姜（炮） 厚朴（姜炒） 草果仁 缩砂仁 神曲（炒） 麦芽（炒） 陈皮 高良姜 甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服三钱，热盐汤点服，不拘时候。

【主治】①《医方大成》引《济生》：饮啖生冷果菜，停留中焦，心脾冷痛。②《奇效良方》：老人霍乱吐泻。

71027 烧锤饮

《医级》卷八。为原书同卷“铁烙饮”之异名。见该条。

71028 烧腰散

《高崖尊生》卷十三。为《保命歌括》卷十三“煨肾散”之异名。见该条。

71029 烧腰散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】杜仲 故纸 青盐各等分

【用法】人猪腰或羊腰内烧食。

【主治】肾虚腰痛，脚膝酸软。

71030 烧弓弦散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】弓弦五寸（锉碎） 箭竿五寸（锉碎）

【用法】上同烧作灰，研为细散，作一股。以温酒调下，其子即出，未效再服。

【主治】难产。

71031 烧冬瓜方

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】冬瓜

【用法】上以黄土厚泥冬瓜，火烧令熟，去土食之。

【主治】卒肿满，身面皆洪大。

71032 烧羊肾散

【方源】方出《千金》卷十九，名见《张氏医通》卷十四。

【组成】甘遂 桂心（一作附子） 杜仲

人参各二两

【用法】上药治下筛。以方寸匕纳羊肾中炙之令熟，服之。

【主治】腰疼不得立。

【方论选录】《千金方衍义》：腰疼不得立，因虚而热结留着，非湿痰死血，则暴伤气逆，故于温理腰肾药中，必兼甘遂搜逐所伤，加人参以助迅扫之力；纳羊肾炙食，取以直达肾脏。乃峻攻之猛剂，不可以有人参之补而视等闲也。

71033 烧黄瓜丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】黄瓜（大者）一枚 黄连半两（去须） 胡黄连一两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 鳖甲一两（童便浸三宿，炙微黄，去裙襕） 柴胡一两（去苗）

【用法】上为散，以黄瓜切开头，去瓤，纳药末令满，以切下盖子盖之，用荞麦面和搜固济，可厚三分，于煏灰火内烧，令面焦黄为度，取出去面放冷，入麝香一钱，都研和丸，如绿豆大。每服七丸，食前以米饮送下。

【主治】小儿羸瘦，体热，乳食全少。

71034 烧猪肝方

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】猪肝四两 茺莢末一钱

【用法】上以猪肝薄切，掺茺莢末于猪肝中，五味调和，以湿纸裹，煏灰火煨熟，去纸食之。

【主治】妇人产后赤白痢，腰腹疔痛，不能下食。

71035 烧石子茴香散

【方源】《博济》卷二。

【异名】茴香子散（《圣济总录》卷九十）。

【组成】舶上茴香 川附子（炮，去皮脐） 官桂（去皮） 川椒（去目） 胡椒 陈橘（去白） 紫巴戟（去心） 干姜（炮）各半两 荆三棱一两（煨）

【用法】上为细末，每服用豮猪石子一对，切去筋膜，切作薄片，以末二钱，入葱丝少

许, 盐半钱, 湿纸裹, 煨熟。饵讫, 以酒或粥饭压之。须臾脐下暖甚妙。

【功用】①《博济》: 和元气, 进饮食。②《普济方》引《十便良方》: 和胃。

【主治】下焦虚冷, 脐腹撮痛, 心胸痞胀。

烟

71036 烟油膏

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】烟杆中烟油

【用法】厚敷四周, 留头不敷, 少刻疔破出水而愈。如有红丝者, 用烟油离丝三寸处敷之, 丝即不走。

【主治】疔。

71037 烟脂散

【方源】《医方类聚》卷七十八引《济生续方》。

【组成】烟脂 白矾(火上熬干)各等分

【用法】上为细末。每用少许, 以绵杖子蘸药, 絰在所患耳中。

【主治】聾耳。

71038 烟胶散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】烟胶 小槟榔各等分

【用法】上为细末。用柏油调搽。

【主治】燕窝疮生于项上; 牛皮癣, 四湾疮痛, 痒久不愈。

71039 烟筒方

【方源】《医统》卷四十四。

【组成】冬花蕊 鹅管石 雄黄 艾叶各等分

【用法】上为末, 纸捲筒内。用火点烟入口吞下, 即吞水一口塞烟气。

【主治】一切犯寒咳嗽, 遇冬便作。

71040 烟熏散

【方源】《外伤科学》。

【组成】苍术一两五钱 松香二两 大枫子五两 五倍子二两五钱 苦参 黄柏 防风各一两五钱 白鲜皮五钱 鹤虱二两

【用法】上为细末, 取草纸两张, 上置药物二钱, 卷成纸条, 点火将烟熏于患处, 每次10~15分钟, 用药量多少可依据皮损范围大小而定, 一般三至四钱(二钱约能燃10分钟), 每日二次。温度的标准, 可依据患者耐受程度而定。

【功用】杀虫止痒。

【主治】鹅掌风, 慢性湿疹等皮肤干燥瘙痒者。

71041 烟精膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】烟屎(将竹木杆烟袋多取)

【用法】频频按揉伤处, 蛇牙自出。

【主治】毒蛇咬伤。

71042 烟胶轻粉液

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】烟胶60克 轻粉3克

【用法】麻油调。外搽。

【主治】鹅掌风。

71043 烟筒喘嗽方

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】款冬花 佛耳草 凝水石 白芷 人参 金精石 银精石各等分 甘草少用

【用法】上为末, 不以多少, 用香炉烧烟, 芦筒吸入肺管, 用米饮汤咽下。

【主治】喘嗽。

烙

71044 烙药

《普济方》卷一五五。为《圣惠》卷四十四“燔药”之异名。见该条。

71045 烙脐丸

【方源】《圣惠》卷七十六。

【异名】烙脐饼子(《卫生总微》卷一)

【组成】豆豉一分 黄蜡一分 麝香少许

【用法】上同捣令烂, 熟捻作饼子, 断脐讫, 安脐上, 灸三壮, 艾炷切小麦大, 若不啼, 灸至五七壮, 灸了, 以封脐散封之。不得令湿著, 恐脐肿。

【主治】小儿断脐。

71046 烙脐饼子

《卫生总微》卷一。为《圣惠》卷七十六“烙脐丸”之异名。见该条。

凌

71047 凌花散

【方源】《医方大成》卷九引《澹寮》。

【异名】凌雪花散（《济阴纲目》卷二）。

【组成】当归（酒浸） 凌霄花 刘寄奴
红花（酒浸，候煎药一二沸即入） 官桂
（去皮） 牡丹皮（洗） 川白芷 赤芍药 延
胡索各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，酒半盞，煎八分，再入红花煎，热服。

【主治】①《医方大成》引《潜斋》：妇人月水不行，发热腹胀。②《普济方》：妇人腹满，身体疼痛，瘦悴食少，发热自汗。

【方论选录】《医略六书》：凌霄花破血降火；刘寄奴破血通经；当归养血，统营之运；赤芍破血，泻火之亢；延胡化血滞以通经脉，红花活血脉以浚血海；官桂温经通闭；丹皮凉血化血；白芷散阳明之邪以清冲任之脉也。为散以散之，温酒以行之，使瘀血顿化，则经气自调，而经血应时以下，何经闭发热之不瘳乎？

71048 凌霄散

【方源】《清古家珍》。

【异名】五九散(《儒门事亲》卷十五)、凌霄花散(《医学入门》卷八)。

【组成】蝉壳 地龙(炒) 白僵蚕 全蝎
各七个 凌霄花半两

【用法】上为极细末。每服二钱，酒调下，于浴室内常在汤中住一时许服药效。

【主治】 痹风。

【方论选录】《医方考》：痹风攻凿气血，木石不能获效者，非其类也，故用血气之属，能主风者以治之。蝉退主风热，地龙主风湿，僵蚕、全蝎主风毒，凌霄花主风坏之血，斯五物者，皆有微毒，用之以治痹风，所谓衰之以属

也。然必坐于浴室汤中服药者，所以开泄腠理，使邪气有所出尔！

71049 凌霄花丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】凌霄花半两 芫花二分（醋拌，炒令干） 京三棱半两（微煨，銓） 木香半两 姜黄半两 水蛭一分（炒令微黄） 硃砂半两 斑蝥十枚（糯米拌，炒令黄，去翅足） 雄雀粪一分（微炒）

【用法】上为末，糯米饭为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心以温酒送下。服药后觉寒热，小腹内及连腰疼痛，当下恶物即愈；如未应，次日再服。

【主治】妇人积年血块，兼月水不通。

71050 凌霄花丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】凌霄花三分 没药三分 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 水蛭三分（微炒） 滑石半两 硃砂半两 斑蝥一分（糯米拌，炒令黄，去翅足） 狗胆半两（干者）

【用法】上为末，软饭为丸，如梧桐子大。每服七丸，食前以温水送下。

【主治】室女月事过期不通。

71051 凌霄花丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】凌霄花 芫青(去翅足,微炒) 虻虫(同上法) 水蛭(微炒) 各一分 桃仁 大黄 没药各半两

【用法】上为细末，以狗胆三个，法酒一盞，先将没药末同熬成膏，和前药为丸，如绿豆大。每服七丸，煎红蓝花散送下，不拘时候。

【主治】妇人室女经脉不通，五心烦热，四肢疼痛。

71052 凌霄花汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】凌霄花（去萼，一名紫葳） 芫花（醋炒焦） 红蓝花各半两 没药一分（研）

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食前热服。

【主治】妇人血闭不行，脐下硬痛，及腰痛不可忍。

71053 凌霄花散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】凌霄花半两 当归一两（锉，微炒） 木香一两 没药一两 桂心半两 赤芍药

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】妇人久积风冷，气血不调，小腹疝刺疼痛。

【备考】方中赤芍药用量原缺。

71054 凌霄花散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】凌霄花一分 白矾一分（别研） 雄黄半钱（别研） 天南星半两 黄连（去须）二钱 羊蹄根（焙干）半两

【用法】上为细末。抓破，用生姜汁调药擦之；如癣不痒，只用油调擦。

【主治】风湿挟热，皮肤生癣，久不愈。

71055 凌霄花散

【方源】方出《百一》卷九，名见《普济方》卷五十七。

【组成】凌霄花 山梔子各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食后茶汤调下，每日二次。

【主治】酒皸鼻。

【临证举例】酒皸鼻 临川曾景仁尝苦此疾，一日得此方于都下一异人，不三次遂去根本。

71056 凌霄花散

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】凌霄花一分 牡丹皮 山梔子仁 赤芍药 紫河车 血竭 没药 硃砂 地骨皮 五加皮 甘草各二两 红娘子十一个 桃仁 红花 桂心 延胡索 当归各一两

【用法】上为细末。每服一钱，温酒调下。

【主治】妇人血瘕、血块及产后秽露不尽，儿枕急痛，积聚疼痛，渐成劳瘦。

71057 凌霄花散

《玉机微义》卷四十九。为《女科万金方》“红花当归饮”之异名。见该条。

71058 凌霄花散

《医学入门》卷八。为《洁古家珍》“凌霄散”之异名。见该条。

71059 凌霄花散

《济阴纲目》卷二。为《医方大成》卷九引《澹寮》“凌花散”之异名。见该条。

71060 凌霄花根丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】凌霄花根（去皮，洗，焙）三两 乌药（锉） 人参各半两 皂荚子五十枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸至十五丸，温水送下，每日二次。

【主治】大肠虚冷风秘。

71061 凌阳子木香丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】山茱萸一两（不去核） 莲花蕊一两 破故纸五两 白茯苓二两 木香二两 胡桃仁半斤（微去油，烂研） 菟丝子五两（酒浸三宿，焙干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以温酒送下，每日一次。

【功用】滋阴养正，补肾秘真，坚骨髓，调荣卫，悦颜色，墨髭鬓。

【主治】虚损。

准

71062 准提膏

【方源】《华氏医方汇编》卷二。

【组成】圆囷升麻二两 方八（即木鳖子）五钱 圆囷川芎五钱 全当归二两 白芷五钱 羌活五钱

【用法】上药用火麻油一斤煎至药枯，去滓再煎，至滴水成珠，以桑枝搅透，入茱丹（夏天加重）成膏，倾水内浸去火毒。用时加

肉桂细末五钱贴之。

【主治】外科一切阴毒，牙疼。

凉

71063 凉心丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】紫河车三分（蚤休是也） 人参 白茯苓（去黑皮）各半两 远志（去心）一分 麦门冬（去心，焙）半两 丹砂（别研）一两 龙脑（别研）半钱 金箔二十片（与丹砂、脑子同研）

【用法】除别研外，上为末，再同研匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，人参汤化下。

【主治】心热烦躁。

71064 凉心丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 茯苓 丹参各五钱 黄连 半夏各三钱 吴茱萸五分 菖蒲一钱 生姜五片 麦冬一两

【用法】水煎服。

【主治】猝然遇邪，一时卧倒，口吐痰涎，不能出声，发狂乱动，眼珠大红，面如火烧红色，发或上指。

71065 凉心散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】青黛 硼砂 黄连（人乳拌，晒）人中白各二钱（煨过） 风化消 黄柏各一钱 冰片二分

【用法】上为极细末。吹人舌上。

【主治】重舌、鹅口及口疳。

71066 凉水丹

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】陈石灰 白麦面各等分

【用法】蒸熟为丸。大人每服三钱，小儿一钱五分，凉水送下。

【主治】倒饱嘈杂，心胃疼痛，痰火症。

71067 凉血丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】枇杷叶 白芍 五味子 生地 青蒿 甘草 山萸 黄柏 川断 杜仲 阿胶

【用法】山药糊为丸服。

【主治】妇人血热，经期先行，腰腹发热者。

71068 凉血汤

【方源】《观聚方要补》卷五引《医经会解》。

【组成】梔子仁 黄芩 白茅 知母 桔梗 甘草 侧柏叶 赤芍

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】胃咳，呕血。

71069 凉血汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归 生地黄各一钱 黄连（姜制） 黄芩 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 防风 荆芥各八分 细辛 蔓荆子 羌活各六分 藁本四分 甘草 升麻各三分（炒）

【用法】水煎，食前服。

【主治】妇人肾虚崩漏。

71070 凉血饮

【方源】《普济方》卷三三二引《角氏方》。

【组成】赤芍药 黄芩 川芎 甘草 荆芥 生地黄（去土） 麦门冬（去心） 土瓜根各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，加灯心十茎，淡竹叶十片，煎，温服，不拘时候。

【主治】①《普济方》引《角氏方》：血热经水不调，心烦口干，烦躁，或遍体生疮。②《明医指掌》：产后血热，心烦口渴，烦躁。

【加减】有寒热，加秦艽、北柴胡。

【备考】方中土瓜根，《明医指掌》作“瓜蒌根”。

71071 凉血饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】花粉（酒炒） 麦冬（去心） 天冬（去心，酒蒸） 甘草 桔梗（酒洗） 当归各五分 白芍（酒炒） 黄芩（酒炒） 丹

皮(蜜炒) 知母各四两

【用法】加生姜一片,水煎,加发灰一钱调服。

【主治】鼻衄血。

71072 凉血饮

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】生地 麦门冬 连翘 天花粉 木通 赤芍 荆芥 车前子 瞿麦 白芷 甘草 薄荷 山梔各等分

【用法】灯心为引。

【主治】心痛。

【加减】潮热,加淡竹叶为引。

71073 凉血饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】人参 黄耆 黄连 生地 川芎 当归 槐角 黄芩 升麻 枳壳各一钱

【功用】凉血清热。

【主治】痔漏。

71074 凉血饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】生地 川连 力子 玄参 赤芍 红花 丹皮 黄芩 连翘 荆芥 木通

【用法】水煎,温服。

【主治】麻疹。火毒炽盛血热,紫赤而黯。

71075 凉血散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】蛤粉四两 朱砂一两

【用法】上为细末。每服一钱,新汲水调下。

【主治】上热吐血。

71076 凉血散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】犀角一钱 生地二钱 知母(酒炒)一钱五分 丹皮一钱 荆芥(炒黑)一钱 黄芩(酒炒)一钱五分 秦艽一钱 赤芍一钱五分 甘草八分 焦梔一钱五分 竹叶十片

【功用】清火。

【主治】妇人素有血虚内热,经行时风热外乘,血为热迫,错经妄行,或吐或衄。

【方论选录】是方犀角、生地凉血为君,黄芩、知母、梔子、丹皮、赤芍分泻三焦火为臣,荆芥、秦艽祛风热为佐,竹叶、甘草引热下行为使也。

71077 凉血散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄芩 当归 陈皮 甘草 地榆 白茯苓 柴胡 神曲 白芍(炒)

【用法】水煎服。

【主治】湿热伤脾,便血。

71078 凉血散

【方源】《青囊秘传》。

【异名】清凉散、桃花散。

【组成】熟石膏(尿浸更佳)一两 黄丹二钱

【用法】上为极细末。干掺,或麻油调。

【功用】生肌长肉。

71079 凉肌丸

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】龙胆草(去芦)二两 玄参(去芦)一两 当归(去芦,洗净)一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服二十丸,竹叶汤送下,儿大增之,不拘时候。

【主治】小儿温壮,身热脸赤,烦渴躁闷。

71080 凉肌粉

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】白芷 枫叶 藁本 苦参 黄连各等分

【用法】上为细末,每用三钱,以蛤粉二大块同为细末,入生绢袋子。每浴了,以扑身遍令匀。

【主治】小儿身热,夏月伏喝,遍身生赤痒子。

71081 凉肌散

【方源】《普济方》卷二七五引《卫生家宝》。

【组成】蜜陀僧

【用法】上为末,入轻粉和匀。干掺。

【主治】一切恶疮,脓水不干。

71082 凉肝丸

【方源】《幼幼新书》卷十八引《龙木论》。

【组成】防风二两 黄芩 羌藟子 黑参 大黄 知母各一两 人参 茯苓各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。先用秦皮汤洗之，然后每服十丸，空心以茶送下。

【主治】①《幼幼新书》引《龙木论》：小儿斑疮入眼外障。小儿患斑疮时，不忌口将息，热气在肝，上冲入眼，目痛泪出，赤涩、怕日难开，肝膈壅毒，致成障翳，肿便翳如银色。②《医学入门》：肝胆伏热而致五软，面红唇红，肌热。

71083 凉肝丸

《得效》卷十一。为《小儿药证直诀》卷下“泻青丸”之异名。见该条。

71084 凉肝散

【方源】《普济方》卷八十引《圣惠》。

【组成】大黄 赤芍药各一两 蝉退 当归 黄连各半两 甘草半钱

【用法】上为末。每服二三钱，食后以米泔水调服。

【主治】初发眼疼，才生翳膜，脏腑实者。

【加减】肝热，加淡竹叶；肺热，加大黄；脾热，加甘草。

71085 凉肝散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】芎藭 梔子仁 槐蛾（炒）各一两 荆芥穗二两 甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服一钱或二钱匕，食后以沙糖水调下。

【功用】退翳。

【主治】赤眼肿痛。

71086 凉肝散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】凉肝明目散（《痘疹全书》卷下）。

【组成】龙胆草（酒洗） 蜜蒙花 黄连（酒炒） 当归 防风 柴胡 川芎

【用法】用豕猪肝煮汁煎服。

【主治】痘后目不敢开，虽向暗处亦不敢开。

71087 凉肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】草决明 天花粉 甘草 赤芍药 绿豆皮 谷精草

【用法】上为末。每服六钱，蜜水调下。

【主治】小儿母胎中受其毒，疹痘出时五脏俱有热相攻，或肝脏受热甚，而致疹痘入眼。

71088 凉肝散

【方源】《眼科龙木论》卷三。

【组成】川大黄 桔梗各半两 黄芩 羚羊角 黑参 人参 茯苓各一两

【用法】上为末。每服一钱，以水一盞，煎至五分，先镰洗钩割，食后去滓温服。

【主治】毒风在肝脏，积血险眦之间，而致混睛外障，初患之时先疼后痒，碜涩泪出，怕日羞明，白睛先赤，发歇无定，渐渐眼内赤脉横立遮睛，如隔纱看物，难以辨明。

71089 凉肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归 赤芍 龙胆草 羌活 细辛 玄参 草决明 防风 荆芥 薄荷 川芎 青箱子 蒺藜 木贼

【用法】水煎，食后温服。

【主治】因呕吐而致冰翳，头痛，鼻颊骨疼，其翳如冰雪之状，阴看不大，阳看不小。

71090 凉肝散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】石膏（煨） 贝母 胆星 天麻 陈皮 甘草 枳壳 桔梗 红花 花粉

【用法】生姜皮为引。兼服牛黄丸。

【主治】小儿热盛，烦躁作渴，抽搐。

71091 凉补风

【方源】《普济方》卷十七引《卫生家宝》。

【组成】肉苁蓉（薄切，用酒浸一宿，火焙干） 泽泻（切，焙干） 石菖蒲 菟丝子（用酒浸一宿，研烂，焙干） 黄耆（炙，

细锉为末) 川楝子(细锉) 山茱萸各半两 熟干地黄一两(净洗, 焙干, 为末)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前空心以盐酒、盐汤任下; 如五淋病, 用豆淋酒送服。

【功用】凉心膈, 补元阳。

【主治】心经积热, 思虑过多, 一切漏精白浊, 久则饮食减少, 转成劳伤; 五淋病。

71092 凉顶散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施圆端效方》。

【组成】川芎 薄荷各一两 郁金一两 盆消一两半 乳香三钱 (或加龙脑尤佳)

【用法】上为细末。鼻内搐之。次用黄连为末, 煎浓汁, 热渫渍搭沤浸目上, 渗半钱汁。口中觉苦, 疼痛自消, 昏翳渐退。

【主治】赤眼疼痛肿, 刺着生翳。

71093 凉肾汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【组成】生地黄三钱 赤茯苓一钱 玄参一钱 远志一钱(去木) 知母八分(酒炒) 黄柏六分(酒炒)

【用法】水一钟半, 煎八分服。

【主治】①《医宗必读》: 肾劳实热, 腹胀耳聩。②《医钞类编》: 小便黄赤涩痛; 阴疮。

【备考】本方原名凉肾丸, 与剂型不符, 据《医钞类编》改。

71094 凉明饮

【方源】《续名家方选》。

【组成】黄连 柴胡 黄芩 防风 芍药 生地各一钱 当归 羌活 升麻 白芷 山梔子 川芎各五分 甘草二分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】风热上冲, 眼目赤肿, 多泪不止。

【加减】有赤脉, 加菊花、木贼; 白睛赤肿痛甚, 加桑白皮; 多泪不止, 加荆芥、薄荷、菊花。

71095 凉金丸

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【异名】凉水金丹。

【组成】沉香 皂角 豆霜 木香 丁香 三棱 莪朮 乳香 莪朮各六钱七分

【用法】上为细末, 枣肉为丸, 玻璃瓶贮。每服十五丸, 用白开水送下。

【功用】消积调胃, 止痛除湿。

【主治】心腹气痛, 胃口呆, 脾湿壅肿, 停食停水。

【宜忌】孕妇忌服。

71096 凉肺汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄芩 贝母 天花粉 枳壳各七分 橘红 山梔 桔梗 麦门冬 甘草各五分

【用法】加灯心三十茎, 水煎, 食远服。

【主治】肺热咳嗽, 痰盛音哑。

71097 凉肺汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【组成】知母(去毛, 炒) 贝母 天门冬(去心) 麦门冬各一钱半 黄芩 橘红各一钱 甘草五分 桑皮八分

【用法】水一钟半, 煎八分服。

【主治】肺劳实热, 咳嗽喘急。

71098 凉肺散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】桑白皮(去粗皮, 锉碎, 蜜水炒过)二两 桔梗(锉, 炒) 天花粉(净者) 干葛 麻黄(不去根节) 薄荷(和梗) 黄芩 杏仁(不去皮尖) 知母 贝母 木通(去节)各一两 款冬花(净者) 麦冬(去心)各七钱半 甘草(生用)一两八钱

【用法】上咬咀。每服二钱, 水一大盏, 加生姜三片, 葱一根, 煎八分, 温服, 不拘时候。

【主治】小儿大人一切实嗽。

【加减】如有热气促, 加大黄、制枳壳各一两。

71099 凉肢散

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】茯苓 薏仁 玄参各五钱 甘草升麻各一钱 炒荆芥一钱 甘菊三钱 麦冬三钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】肌肉热极生风，体上如鼠走，唇口反裂，久则缩入，遍身皮毛尽发红黑。

71100 凉荣汤

【方源】《观聚方要补》卷五引《诸证辨疑》。

【组成】生地黄 川归尾 扁柏叶 蒲黄白芍药 甘草 麦门冬 知母 黄柏各等分

【用法】水煎服。

【主治】吐衄诸血。

71101 凉胃汤

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】黄连一钱二分 生甘草四钱 陈皮二钱（去白） 茯苓四钱（去皮）

【用法】水二杯，煎一杯，食远服。

【主治】①《医宗必读》：脾胃有热，消谷善饥，溺色黄赤。②《杂病源流犀烛》：胃气盛，身以前皆热。

71102 凉胃汤

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】川黄连八分 甘草八分 藿香一钱 丹皮一钱 桔梗七分 升麻七分 连翘一钱 生地黄八分 石膏二匙 黑山栀一钱 白芍药七分 条芩一钱

【用法】水煎，食远服。

【主治】阳明火热上攻，牙龈肿痛，牙疼摇动，黑烂脱落。

71103 凉胃散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《玉诀》。

【组成】青黛 马牙消 大黄（蒸）各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为末。每服半字，蛤粉水送下。

【主治】小儿多汗。

71104 凉胆丸

【方源】《得效》卷十六。

【异名】凉膈丸（《银海精微》卷下）。

【组成】黄连（洗，不见火） 荆芥 黄芩 草龙胆各半两 芦荟 防风各一两 黄柏（去皮）一分 地肤子一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，薄荷汤送下。

【主治】胆受风寒而致黑花翳，其状青色，大小眦头涩痛，频频下泪，口苦，不喜饮食。

【备考】方中黄柏用量原缺，据《普济方》补。又《普济方》引本方有地骨皮、葫芦子各一分，无地肤子。

71105 凉胆丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】黄连 黄柏 地肤子 龙胆草 防风 荆芥 僵蚕

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服六十丸，薄荷汤送下。

【主治】眼昏花。

71106 凉胆丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】黄连三钱 僵蚕二钱 防风三钱 地黄 黄柏 荆芥各五钱 黄芩 龙胆 菊花 赤芍药各三钱 芦荟（炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，薄荷汤送下。

【主治】黑花内障。

【备考】方中芦荟用量原缺。

71107 凉胎饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 芍药各二钱 黄芩 当归各一二钱 甘草（生）七分 枳壳 石斛各一钱 茯苓一钱半

【用法】水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】胎气内热不安。

【加减】热甚，加黄柏一二钱。

71108 凉惊丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】草龙胆 防风 青黛各三钱 钩藤二钱 黄连五钱 牛黄 麝香 龙脑各一字

【用法】面糊为丸，如粟米大。每服三五丸，

金银花汤送下。

【主治】①《小儿药证直诀》：小儿惊疳。②《保婴撮要》：小儿热搐。心神惊悸，白睛赤色，牙关紧急，潮热流涎，手足动搐。

71109 凉惊丸

【方源】《小儿药证直诀·附方》。

【异名】梨汁饼子。

【组成】硼砂(研) 粉霜(研) 郁李仁(去皮，焙干，为末) 轻粉 铁粉(研) 白牵牛末各一钱 好腊茶三钱 (一本无白牵牛末)

【用法】上为细末，熬梨膏为丸，如绿豆大。每服一丸至三丸，食后以龙脑水化下。

【主治】小儿惊风，大人风涎。

71110 凉惊丸

【方源】《保婴集》。

【组成】大黄半两(煨) 黄连半两 龙胆防风 川芎 薄荷叶各二钱半

【用法】上为细末，面糊为丸，如粟米大，青黛为衣。每服三五丸，加至二十丸，温水送下。

【主治】小儿惊热，疳瘦，乳癖。

71111 凉惊丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【异名】金花丸。

【组成】黄柏 黄连 黄芩 山梔仁各等分 朱砂(水飞)减半 (一本有龙胆草)

【用法】上为细末，腊雪水为丸，如麻子大。薄荷汤送下。

【主治】小儿诸热惊风。

71112 凉惊丸

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】川黄连五钱 黄芩五钱 山梔五钱 黄柏二钱 郁金三钱 大黄二钱 胆草三钱 雄黄二钱 辰砂二钱

【用法】上为细末，米糊为丸，如黍米大。用竹叶、灯心汤送下；惊风，薄荷灯心汤送下；丹毒、麻疹，升麻汤送下；衄血，茅花汤送下；口疮，竹叶薄荷汤送下。

【功用】退五脏热，泻肝火，解胎毒。

【主治】小儿急惊，胎热，丹毒，斑疹，衄血，口疮，小便黄，大便秘。

71113 凉惊丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】川芎四钱 大黄五钱 羌活 防风 钩藤 薄荷各一钱 朱砂(为衣)

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十四丸，蜜汤送下。

【主治】小儿惊痫发搐。

71114 凉惊丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄柏一两 大黄一两 黄连一两 梔子(炒)一两 胆草一两 黄芩一两 生地一两 菊花一两 雄黄一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，周岁以下酌减。

【功用】清热镇惊，消痰化滞。

【主治】小儿急热惊风，咳嗽痰盛，停乳伤食，大便干燥。

71115 凉解汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】茯神三钱 麦冬五钱 玄参一两 柴胡一钱 甘草三分 炒枣仁二钱

【用法】水煎服。

【主治】心虚之人，冬月伤寒，身热五六日不解，谵语口渴，小便自利，欲卧。

71116 凉解汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】薄荷叶三钱 蝉退(去足土)二钱 生石膏(捣细)一两 甘草一钱五分

【功用】凉散。

【主治】温病表里俱觉发热，脉洪而兼浮者。

71117 凉膈丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】甘草二两

【用法】上药以猪胆汁浸五宿，漉出炙香，为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十五丸，食

后以薄荷汤送下。

【主治】热嗽。

71118 凉膈丸

《银海精微》卷下。为《得效》卷十六“凉胆丸”之异名。见该条。

71119 凉膈散

【方源】《局方》卷六。

【异名】连翘饮子(《宣明论》卷六)、连翘消毒散(《外科心法》卷七)。

【组成】川大黄 朴消 甘草(炙)各二十两 山栀子仁 薄荷叶(去梗) 黄芩各十两 连翘二斤半

【用法】上为粗末。每服二钱,小儿半钱,水一盏,加竹叶七片、蜜少许,煎至七分,去滓,食后温服。得利下住服。

【功用】养阴退阳,清热泻火,止渴除烦。

①《准绳·伤寒》:养阴退阳。②《北京市中药成方选集》:清热降火,除烦止渴。③《方剂学》:泻火通便,清上泄下。

【主治】上中二焦热邪炽盛,头昏目赤,烦躁口渴,胸膈烦热,口舌生疮,咽喉肿痛,睡卧不宁,谵语狂妄,便秘溲赤,以及小儿惊风、重舌、木舌、牙痛、翳障、疫喉属膈热火盛者。

①《局方》:大人小儿脏腑积热,烦躁多渴,面热头昏,唇焦咽燥,舌肿喉闭,目赤鼻衄,颌颊结硬,口舌生疮,痰实不利,涕唾稠粘,睡卧不宁,谵语狂妄,肠胃燥涩,便溺秘结,一切风壅。②《宣明论》:伤寒表不解,半入于里,下证未全;下后燥热怫结于内,烦心懊侬不得眠,疮癤发斑,惊风,热极黑陷将死。③《丹溪心法》:火气上蒸胃中之湿,亦能汗。④《准绳·伤寒》:心火上盛,膈热有余,吐血,咳嗽痰涎,淋闭不利,阴耗阳竭,小儿疮痘黑陷。⑤《寿世保元》:三焦实火,六经积热,酒毒,呕血,风眩,阳毒,结胸心下满,眼中翳障。⑥《痘科类编》:疹夹丹毒。⑦《证治宝鉴》:痰火上扰之口噤,重舌木舌,中消能食而大便秘。⑧《麻科活人》:瘟疫时行,表里实热。⑨《金鉴》:热极生风而致小儿急惊风,肺热喘急。⑩《疫喉浅

论》:疫喉上焦火盛,中焦燥实。⑪《北京市中药成方选集》:牙龈肿痛。

【宜忌】《北京市中药成方选集》:孕妇勿服。

【方论选录】①《医方考》:黄芩、栀子,味苦而无气,故泻火于中;连翘、薄荷,味薄而气薄,故清热于上;大黄、芒消,咸寒而味厚,故诸实皆泻;用甘草者,取其性缓而恋膈也;不作汤液而作散者,取其泥膈而成功于上也。②《医方集解》:此上中二焦泻火药也。热淫于内,治以咸寒,佐以苦甘,故以连翘、黄芩、竹叶、薄荷升散于上,而以大黄、芒消之猛利推荡其中,使上升下行,而膈自清矣;用甘草、生蜜者,病在膈,甘以缓之也。③《张氏医通》:消、黄得枳、朴之重著,则下热承之而顺下;得芩、栀、翘、薄之轻扬,则上热抑之而下清,此承气、凉膈之所攸分也;用甘草者,即调胃承气之义也;《局方》专主温热时行,故用竹叶。④《古方选注》:薄荷、黄芩,从肺散而凉之;甘草从肾清而凉之;连翘、山栀,从心之少阳苦而凉之;山栀、芒消,从三焦与心包络泻而凉之;甘草、大黄,从脾缓而凉之;薄荷、黄芩,从胆升降而凉之;大黄、芒消,从胃与大肠下而凉之。上则散之,中则苦之,下则行之,丝丝入扣,周遍诸经,庶几燎原之场,顷刻为清虚之腑。⑤《成方便读》:以大黄、芒消之荡涤下行者,去其结而逐其热,然恐结邪虽去,尚有浮游之火,散漫上中,故以黄芩、薄荷、竹叶清彻上中之火,连翘解散经络之余火,栀子自上而下,引火邪屈曲下行,如是则有形无形、上下表里诸邪,悉从解散。⑥《方剂学》:方中重用连翘清热解毒,配栀子、黄芩以清热泻火,又配薄荷、竹叶以清疏肺、胃、心胸之热;胃热伤津而腑实证尚未全具,不宜峻攻,方中芒消、大黄与甘草、白蜜同用,既能缓和消、黄之急下,更利于中焦热邪之清涤,又能解热毒、存胃津、润燥结,使火热之邪,假阳明为出路,体现了“以下为清”之法。

【临证举例】①热厥 《临证指南医案》:

某,先发水痘,已感冬温小愈,不忌荤腥,余邪复炽,热不可遏,入夜昏烦,辄云头痛,邪深走厥阴,所以发厥,诊脉两手俱细,是阳极似阴,鼻煤舌干,目眦黄,多属邪闭坏败,谅难挽回,用凉膈散。②时疫 《南雅堂医案》:时疫来势甚暴,目赤口渴,壮热无汗,斑疹隐隐未透,烦躁不已,脘腹按之作痛,大小便闭,热毒内炽,邪势不能外达,防有内陷昏喘之变。拟仿凉膈法,并加味酌治,俾热从外出,火从下泄,冀其邪去正复,得有转机。连翘三钱,大黄一钱五分(酒浸),芒消一钱五分,牛蒡子一钱五分,枳实一钱,梔子八分(炒黑),甘草一钱五分,淡黄芩八分,薄荷八分,竹叶一钱,生白蜜半盏。③疮疡 《外科发挥》:一妇入面患毒,焮痛发热作渴,脉数,按之则实,以凉膈散二剂少愈。④牙痛 《口齿类要》:表兄颜金宪牙痛,右寸后半指脉洪而有力,余曰:此大肠积热,当用寒凉之剂。自泥年高,服补阴之药,呻吟彻夜,余与同舟赴京,煎凉膈散加荆、防、石膏,与服一钟即愈。

71120 凉膈散

【方源】《症因脉治》卷四引《本事》。

【组成】芍药 连翘 薄荷 大黄 桔梗 山梔仁 葛根

【主治】燥火腹痛,大便结。

71121 凉膈散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】山梔子仁一两 连翘 黄芩各二两 大黄半两 薄荷一两半

【用法】上为粗末。每服一两,水二盏,同竹叶七片,煎至一盏,去滓,入蜜少许,食后服。

【主治】①《云岐子脉诀》:实脉关前胸热甚,主脉浮,客脉实,浮实相合,实在上焦,阳气有余,胸中热甚。②《松峰说疫》:赤膈伤寒。表症已退,大便燥实,胸膈肿痛者。

【备考】《松峰说疫》有甘草。治上症加萎仁、枳壳、桔梗、紫金皮、赤芍。

71122 凉膈散

【方源】《万氏女科》卷二引东垣方。

【组成】黄芩 黄连 梔仁(各酒炒) 连翘 桔梗 甘草各等分 薄荷叶半钱

【用法】上为散。水煎服。

【功用】清热。

【主治】①《万氏女科》引东垣方:妇人妊娠热病。②《保命歌括》引东垣方:瘟疫火热不解,伤寒余热不退,及六经火。

71123 凉膈散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】连翘 梔子各三钱 大黄四钱(酒蒸) 芒消一钱 黄芩三钱 薄荷八分 知母一钱五分 升麻四分 石膏三钱 黄连六分 甘草八分

【用法】上锉一剂。水煎,频服。

【主治】胃有实热,齿痛,或上牙痛尤甚者。

71124 凉膈散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 荆芥 桔梗 山梔 玄参 石膏 薄荷 黄连 天花粉 牛蒡子 贝母 大黄各等分

【用法】水二钟,前八分服,不拘时候。

【主治】咽喉肿痛,痰涎壅盛,膈间有火,大便秘涩。

71125 凉膈散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】当归 川芎 柴胡 黄连 龙胆草 防风 蝉蜕 蜜蒙花各六分

【用法】上为末。以獾猪肝一两切片,同煮服。

【主治】痘后羞明怕日,翳膜遮睛。

71126 凉膈散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】黄芩 山梔 桔梗 连翘 天花粉 黄连 薄荷

【主治】上焦热甚,表解里热,宜清未宜下之症。

71127 凉膈散

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】桔梗 天花粉 连翘 薄荷 黄芩 大黄 芒消 山梔

【功用】清上焦心肺之热。

【主治】心肺为邪热所冒，神识昏迷，狂言谵语。

71128 凉膈散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】芒消 大黄 车前子各一钱 黑参一钱半 黄芩 知母 梔子（炒） 芩蔚子各一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后温服。

【主治】膈中积热，肝经风毒上冲于目，而致睑硬睛疼，初患之时，时觉疼胀，久则胞肿硬，眼珠疼痛。

71129 凉膈散

【方源】《活人方》卷一。

【组成】连翘四两 生大黄二两 玄明粉二两 生山梔一两 薄荷一两 荆芥穗一两 甘草五钱 桔梗五钱

【用法】上为细末。每服二三钱，午后以白滚汤调下。

【功用】清散上焦有余之火。

【主治】心火刑金，或胃火壅逆，或表里郁滞之风热，头目不清，痰气不利，口舌生疮，牙疼目赤，周身斑疹，二便不调。

71130 凉膈散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十九。

【组成】连翘 山梔 白芍 黄芩 大黄 芒消各二钱 葱白一茎 炙草五分 大枣一枚

【主治】春温里热已甚，阳邪怫郁作战，而不能汗出，虽下，症未全除；恶热烦渴，腹满，舌黄燥或黑干，五六日不大便。

71131 凉膈散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】桔梗 黄芩 防风 荆芥 花粉 山楂 枳壳 赤芍 甘草

【用法】外以辛夷末入冰片、麝香少许，绵

裹塞之。

【主治】脾胃蕴热移于肺致鼻内生疮。

【加减】久而有根，略感风寒，鼻塞便发，加川芎、白芷、荆芥。

71132 凉膈散

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】连翘 生梔子 黄芩 薄荷 桔梗 甘草 生石膏 竹叶

【功用】泻火。

【主治】疫疹。心火上盛，中焦燥实，烦躁口渴，目赤头眩，口疮唇裂，吐血衄血，诸风痼疾，胃热发狂，惊急搐风。

【方论选录】热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘。故以连翘、黄芩、竹叶、薄荷升散于上；古方用大黄、芒消推荡其中，使上升下行而膈自清矣。予忆疫疹乃无形之毒，投以消、黄之猛烈，必致内溃，予以石膏易去消、黄；使热降清升而疹自透，亦上升下行之意也。

71133 凉膈散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】当归 川芎 赤芍 防风 荆芥 玄参 梔子（炒） 黄连 石膏 花粉 连翘 桔梗 薄荷各等分

【用法】水煎服。

【主治】①《喉科紫珍集》：咽喉肿痛，汤水难下，痰涎壅塞。②《焦氏喉科枕秘》：缠舌喉风，下颏俱肿，口噤，舌捲肿大，上有筋如蚯蚓之状，生黄刺白苔。

【加减】风甚，加银花、粘子；痰甚，加贝母、萎仁。

71134 凉膈散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】连翘 梔炭 苏荷 甘草 黄芩 竹叶 枳壳 力子

【主治】麻疹。火壅血燥，秘结甚，腹胀喘促，溺涩脐突，口疮唇裂；上中二焦火炽，胃热发斑。

【加减】便秘，加大黄、萎仁。

71135 凉膈丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】地骨皮一两 丹皮一两 麦冬五钱 金钗石斛三钱 牛膝二钱 茯苓二钱

【用法】水煎服。

【功用】补肾水。

【主治】肾水不能制火，每夜发热如火，至五更身凉，时而有汗，时而无汗，觉骨髓中内炎，饮食渐少，吐痰如白沫。

【方论选录】此方用地骨皮、丹皮，不特补肾中之水，且取其能凉骨中之髓与消骨外之血也。夫骨中髓热，必耗其骨外之血；骨外血热，必烁其骨中之髓，故兼用二味，则髓与血两治，无太过之虞，肾中宁独热哉？况石斛、牛膝，无非补肾阴之味，阴旺则阳平，水胜则火退，骨蒸不蒸，而癆瘵何能成哉？

71136 凉七味汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱 萸肉一钱半 泽泻八分 丹皮一钱半 茯神一钱半（去木） 山药三钱（炒） 知母一钱半（盐水炒）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】吐血，脉虚软尺躁。

【方论选录】生地滋阴血以壮肾水，知母润肾燥以退虚炎，丹皮凉血散血，萸肉秘气涩精，山药补脾益阴，茯神安神定志，泽泻泻浊阴以清血海也。水煎温服，使阴血内充，则虚火自降，而血不妄行，安有吐血之患乎？

71137 凉八味丸

《症因脉治》卷二。为《医方考》卷五“六味地黄丸加黄柏知母方”之异名。见该条。

71138 凉心煮散

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】连翘 防风（去叉） 甘草（炙，銍） 山梔子仁 鸡苏 恶实（炒）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盞，煎三五沸，量儿大小加减。

【主治】小儿风热。

71139 凉水金丹

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】沉香 公丁香 甜瓜子仁各五分 木香 儿茶各七分 京牛黄二分 巴豆霜（去油，净）三钱 乳香 天南星 没药 轻粉各一钱 冰片一分五厘 雄黄 血竭 朱砂各一钱五分 牙皂八分（炙黄色） 鸦片六分 白花蛇（炙黄色）二钱

【用法】上为细末，煮枣肉为丸，如黄豆大，金箔为衣。每服一丸，凉水送下。

【主治】四时不正之气，伤寒、伤暑、伤风、疟、痢，发热头痛。

【宜忌】孕妇、小儿痘疹勿服。

71140 凉水金丹

《松峰说疫》卷五。为《保命歌括》卷六“五瘟丹”之异名。见该条。

71141 凉水金丹

《全国中药成药处方集》（吉林方）。为原书“凉金丸”之异名。见该条。

71142 凉血饮子

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】生地黄一钱半 黄连五分 黄芩 荆芥 黑参各一钱 红花三分 赤芍 丹皮各八分 木通七分

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹火毒炽盛，紫赤而黯。

71143 凉药子丸

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】连翘一两半 牙消 甘草（生）各一两二钱 大黄一两 石膏半两 薄荷叶 梔子 绿豆粉各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服三丸，水化下，每日二次。

【主治】五脏伏热，痰涎壅塞，烦躁，口舌生疮，大便秘结，小便赤涩，及小儿惊热疳病。

71144 凉风化痰丸

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】半夏二两（泡） 南星二两（姜制） 白附子一两 明矾五钱

【用法】上为末，大米糊为丸，如黍米大，滑石或朱砂为衣。

【主治】小儿风痰咳嗽，惊热及喘。

71145 凉心利水汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬一两 茯神五钱 莲子心一钱 车前子三钱

【用法】水煎服。

【功用】泻心火，利膀胱。

【主治】心火亢极，小便不通，点滴不能出，急闷欲死，心烦意躁，口渴索饮，饮而愈急。

71146 凉心清肝汤

【方源】《疡医大全》卷十。

【组成】生地 当归 白芍 炒山栀 丹皮 丹参 扁柏叶 川连 生甘草

【用法】灯心十寸为引。

【主治】双目流血。

71147 凉血二黄汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地四钱 丹皮二钱 白芍三钱 桃仁 延胡 黄芩 栀子 姜黄 通草各二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清热凉血。

【主治】妇人痛经热甚，兼口苦心烦，脉弦数。

71148 凉血五花汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】红花三至五钱 鸡冠花三至五钱 凌霄花三至五钱 玫瑰花三至五钱 野菊花三至五钱

【功用】凉血活血，疏风解毒。

【主治】血热发斑，热毒阻络所致盘状红斑性狼疮初期，玫瑰糠疹（风癣）、多形性红斑（血风疮）及一切红斑性皮肤病初期，偏于上半身或全身散在分布者。

【方论选录】方中凌霄花凉血活血泻热为主，玫瑰花、红花理气活血化瘀，鸡冠花疏风活血，野菊花清热解毒。因为药味取花，花性轻扬，所以本方以治疗病变在上半身或全身散发者为宜。

71149 凉血五根汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白茅根一两至二两 瓜蒌根五钱至一两 茜草根三至五钱 紫草根三至五钱 板蓝根三至五钱

【功用】凉血活血，解毒化斑。

【主治】血热发斑，热毒阻络所引起的多形性红斑（血风疮）、丹毒初起，紫癜、结节性红斑（瓜蒌缠）及一切红斑类皮肤病的初期偏于下肢者。

【方论选录】本方以紫草根、茜草根、白茅根凉血活血为主，佐以瓜蒌根养阴生津，板蓝根清热解毒。因为根性下沉，所以本方以治疗病变在下肢者为宜。

71150 凉血止衄汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】龙胆草三钱 黄芩三钱 栀子三钱 丹皮三钱 生地五钱 藕节一两 白茅根一两 大黄五分 牛膝四钱

【功用】清热平肝，凉血降逆。

【主治】妇人肝热上逆、血随气上所引起的衄血、倒经。

【方论选录】本方取龙胆泻肝汤中的主药龙胆草、黄芩、栀子清上焦热，配合丹皮、生地清热凉血；藕节、白茅根清血热、止吐衄。独特之处在子使用大黄五分，药量不重，取其入血分行血破血，不但泻血热，而且大黄配牛膝又能引血下行，实有釜底抽薪之妙。

71151 凉血化毒汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【异名】凉血化毒饮（《痘疹仁端录》卷十三）。

【组成】归尾 赤芍药 生地黄 木通 连翘 牛蒡子 红花 紫草 桔梗 山豆根

【用法】水煎服；或加童便一小盏亦可。

【主治】痘疮初出，头焦黑。

71152 凉血化毒汤

《种痘新书》卷十二。为《赤水玄珠》卷二十八“凉血解毒汤”之异名。见该条。

71153 凉血化毒饮

《痘疹仁端录》卷十三。为《景岳全书》卷六十三“凉血化毒汤”之异名。见该条。

71154 凉血四物汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 黄连 山梔 香附 槐花 川芎各一钱 白芍 生地各二钱

【用法】加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】月信先期而来，及紫黑色。

71155 凉血四物汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 苏木 连翘 黄连 防风各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】血虚脓疥，寒热肿胀作痛。

71156 凉血四物汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】当归 生地 川芎 赤芍 黄芩（酒炒） 赤茯苓 陈皮 红花（酒洗） 甘草（生）各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，加酒一杯，调五灵脂末二钱热服。

【功用】化滞血。

【主治】酒渣鼻。胃火熏肺、风寒外束、血瘀凝结，鼻准头及鼻两边先红后紫，久变为黑。

【加减】气弱，加酒炒黄耆二钱。

71157 凉血四物汤

【方源】《痘科辨要》卷七。

【组成】白芍（桂炒） 当归梢 生地黄 升麻 条黄芩（酒炒） 酒红花 连翘 牛蒡子（炒） 甘草

【用法】水煎服。

【主治】女子非正经之期，毒火内甚，扰乱血海，迫血妄行，出痘发热之时经水适来。

71158 凉血四神煎

【方源】《外科医镜》。

【组成】槐花三钱 生地四钱 丹皮二钱 茯苓二钱

【用法】水煎服。

【主治】舌上出血，重舌。

71159 凉血生地饮

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】生地六钱 丹参四钱 侧柏 黄芩各三钱 阿胶二钱 甘草一钱 槐花三钱 百草霜二钱

【用法】水煎服。

【功用】凉血散瘀。

【主治】妇人血热夹瘀，月经过多，色红有块，其气腥臭，腹有痛感，舌绛苔黄，脉弦数。

【加减】经量不太多，而持续时间延长并时有腹痛者，加三七五分。

71160 凉血地黄丸

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】升麻 白芍药（桂炒） 生地黄 条黄芩（酒炒） 连翘 当归梢 牛蒡子（炒） 红花 甘草 通草 黄连（酒炒）

【主治】痘疮发热之时，经水适来。

71161 凉血地黄汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄柏（去皮，锉，炒） 知母（锉，炒）各一钱 青皮（不去皮，瓤） 槐子（炒） 熟地黄 当归各五分

【用法】上咬咀，作一服。用水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】时值长夏，湿热大盛，客气胜而主气弱，肠澼病甚。

【加减】小便涩，脐下闷，或大便则后重，调木香、槟榔细末各五分，空心或食前稍热服。

【方论选录】《脾胃论注释》：黄柏、知母燥湿清热为主，熟地黄、当归滋血和血为辅，青皮理气为助，槐实入肠凉血为引。

71162 凉血地黄汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】生地黄汤（《杏苑》卷八）、地黄汤（《女科秘要》卷四）。

【组成】黄芩 荆芥穗 蔓荆子各一分

黄柏 知母 蘼本 细辛 川芎各二分 黄连 羌活 柴胡 升麻 防风各三分 生地 黄 当归各五分 甘草一钱 红花少许

【用法】上咬咀，作一服。水三大盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

【主治】妇人肾水阴虚，不能镇守包络相火，而致血崩。

【方论选录】《济阴纲目》：血属阴，阴不自升，故诸经之血，必随诸经之气而后升；若气有所陷，则热迫血而内崩矣。故用黄柏以清下焦胞络之火；心者火之主也，故又以生地、黄连以治火之原；知母、黄芩滋水之母；归尾破瘀，红花生血，所谓去故生新也；川芎行血海之余，蔓荆凉诸经之血，而风药者，皆所以升诸经之气也，诸经之气升，则阴血不得不随之而起矣。

71163 凉血地黄汤

【方源】《袖珍》卷三引《经验方》。

【异名】凉血地黄散（《普济方》卷一八九）。

【组成】生地黄 赤芍药 当归 川芎各等分

【用法】上咬咀。水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】荣中有热及肺壅鼻衄生疮，一切丹毒。

【加减】鼻衄，加蒲黄、黄芩；丹毒，加防风。

71164 凉血地黄汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】黄连 生地 玄参 归尾 甘草 山梔仁

【主治】①《片玉痘疹》：痘收靥后毒入于里，迫血妄行，致衄血、吐血、便血、溺血。②《外科正宗》：血箭。血痣内热甚而迫血妄行，出血如飞者。

【加减】鼻血，加片芩、茅花；吐血，加知母、石膏、童便、香附；尿血，加木通、滑石；便血，加秦艽、槐子、荆芥穗；血不止，加炒蒲黄、藕节、侧柏叶。

【备考】《外科正宗》本方用黄连、当归梢、生地黄、山梔子、玄参、甘草各等分。水二钟，煎八分，量病上下服之。

71165 凉血地黄汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】犀角（乳汁磨，临服入药内；或锉末煎）四分 生地黄（酒洗）一钱 牡丹皮二钱 赤芍七分 黄连（酒炒）一钱 黄芩（酒炒）一钱 黄柏（酒炒）五分 知母一钱 玄参一钱 天门冬（去心）一钱 扁柏叶三钱 茅根二钱

【用法】上锉。水煎，入十汁饮同服。

【主治】虚火妄动，血热妄行，吐血、衄血、溺血、便血。

【加减】吐血成块，加大黄一钱，桃仁十个（去皮尖，研如泥）；衄血，加梔子、沙参、玄参；溺血，加木瓜、牛膝、条芩、荆穗、地榆，倍知、柏；便血，加黄连、槐花、地榆、荆穗、乌梅；善酒者，加葛根、天花粉。

71166 凉血地黄汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 白术 茯苓各一钱 黄连 地榆 人参 山梔 天花粉 甘草各五分

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】脏毒已成未成，或肿不肿，肛门疼痛，大便坠重，或泄或秘，常时便血，头晕眼花，腰膝无力。

71167 凉血地黄汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 白术 升麻 甘草 黄连 人参 山梔 玄参

【主治】室女痘，经水不止，热入血室。

71168 凉血地黄汤

《痘疹仁端录》卷十四。为《痘疹传心录》卷十五“凉血解毒汤”之异名。见该条。

71169 凉血地黄汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】归尾一钱五分 生地二钱 赤芍

一钱 黄连(炒)二钱 枳壳一钱 黄芩(炒黑)一钱 槐角(炒黑)三钱 地榆(炒黑)二钱 荆芥(炒黑)一钱 升麻五分 天花粉八分 甘草五分 生侧柏二钱

【用法】水两大钟,煎一钟,空心服。三四剂则痛止肿消,更外兼熏洗。

【主治】痔肿痛,出血。

71170 凉血地黄汤

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】犀角 赤芍 丹皮 玄参 扁柏叶 天门冬 黄连(酒炒) 黄芩(酒炒) 黄柏 知母 茅根各一钱

【主治】火盛血热妄行,吐血、衄血,倾盆盈碗。

【加减】成块吐者,加大黄、桃仁。

71171 凉血地黄汤

《胎产心法》卷上。为《嵩崖尊生》卷十四“地黄汤”之异名。见该条。

71172 凉血地黄汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】小生地黄五钱 牡丹一钱五分 生栀子一钱五分 黄芩一钱 归尾一钱五分 丹参二钱 槐花三钱 生地榆一钱 辛夷一钱

【用法】童便或白马尿兑服。

【主治】血分有热,鼻血不止,吐血,下血,腹痛。

71173 凉血地黄汤

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】生地四钱 白芍二钱 丹皮一钱 犀角一钱(要尖子佳) 黄芩二钱 甘草五分 栀子(炒)二钱 黄连一钱 川柏二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃火热盛吐血、衄血、嗽血、便血、蓄血如狂,漱水不欲咽及阳毒发斑。

71174 凉血地黄散

《普济方》卷一八九。为《袖珍》卷三引《经验方》“凉血地黄汤”之异名。见该条。

71175 凉血芍药汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】白芍(酒炒) 归梢 生地黄 酒红花 地骨皮

【用法】水煎服。

【主治】痘疮作痛。

71176 凉血当归饮

【方源】《济阳纲目》卷八十三。

【组成】当归一钱半 川芎 生地黄 芍药 黄芩 黄连 犀角(镑) 牡丹皮 防风 荆芥各一钱 甘草七分

【用法】上锉。水煎,食远服。

【主治】血热疔风。

71177 凉血攻毒饮

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】大黄二钱 荆芥穗五分 木通四分 牛蒡 丹皮 紫草各一钱 赤芍八分 葛根七分 蝉蜕四分 青皮七分 生地四钱 红花四分

【用法】加灯心一分。

【主治】①《救偏琐言》:痘毒火内伏,烦渴躁乱,身体反凉,痘色紫滞矾红,彻底无眠。②《金鉴》:痘已见形,内毒火盛,身热不退。

71178 凉血抑火汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】当归 赤芍各二钱 大黄三钱 黄芩 黄连 丹皮 生地 川芎各一钱五分

【用法】加灯心三十茎。临服加藕汁半杯。

【主治】吐血、衄血初起,气盛上逆,不能下降归经。

71179 凉血护肌膏

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】南星(生,末)八两 雄黄一两(别研) 白矾(生,末)四两

【用法】上为细末,用生地黄捣汁调涂四围。

【功用】《普济方》:活经络,生肌肉。

【主治】①《传信适用方》:痈疽疮疖。②《普济方》:发背。

71180 凉血快斑汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】连翘 生地 归梢 升麻 牛蒡子(炒) 甘草 酒红花

【用法】水煎服。

【主治】痘疹血热，红紫焮肿。

【加减】大便坚，加紫草；甚者，加大黄；小便秘者，加木通。

71181 凉血明目汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】熟地黄一钱五分 羌活 防风各六分 甘菊花 山梔子(炒) 谷精草 柴胡各五分 木贼四分 甘草三分 川芎 当归各一钱 白芍八分

【用法】上咬咀。水煎熟，食前温服。

【功用】凉血明目。

【主治】眼久昏疼，或视物不清，恶日羞明。

【加减】有泪，加川椒(炒)十粒；红热，加黄连(酒浸)五分，龙胆草(酒浸)三分。

71182 凉血固真汤

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】当归身七分 川芎五分 白芍药七分 生熟地黄各一钱 条实黄芩(生用，细切)一钱二分 香附子(童便浸透)七分 续断五分 柴胡八分 丹参五分 白术七分 荆芥穗五分 黄柏(微炒)五分

【用法】上锉一剂。用水一钟半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】血分有热，月水频并，劳倦腰疼，手足烦热，头目昏眩，渐成崩漏。

71183 凉血狗宝丹

【方源】《疯门全书》。

【组成】芭蕉头(去泥)四两 苦楝根皮(洗净)四两 新桑根皮四两 绿豆子四两 白云苓一两 猪后腿精肉半斤 小狗子一只(产下二十日止，满月者不用。以绳吊死，去毛，切作四块)

【用法】用酒三升入大铜勺内或砂罐，炭火细细煨之，煨至肉烂，约汤二三碗即住火，夜半饮之，勿使人知；次日将肉加酒再煎，半

夜再饮。服此汤后，只好吃绿豆白米粥，外用苦楝子皮(或叶亦可)捣烂，加生姜二片再捣，布包擦各患处。

【功用】凉血清热，除湿回痹，平肝。

【主治】积热与气血相搏，久成癰疔；妇人血盛红崩。

【宜忌】忌油腻。

71184 凉血洗心汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】当归 生地 知母 防风 小蓟 麦冬 黄柏 白术

【用法】水煎服。

【主治】心经痘，随热放梅，色见红赤。

71185 凉血活血汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】槐花 紫草根 赤芍 白茅根 生地 丹参 鸡血藤

【功用】清营凉血活血。

【主治】心肝二经蕴热郁于血分，蒸灼肌肤所致血热白疖，皮肤起红斑，基底红较明显，表面银白色鳞屑多，剥离后有出血点，发病迅速。

71186 凉血养营煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地黄 当归 芍药 生甘草 地骨皮 紫草 黄芩 红花

【用法】水一钟半煎服。

【主治】①《景岳全书》：痘疮血虚血热，地红热渴，或色燥不起；及阳盛阴虚，便结溺赤。②《痘麻绀珠》：痘疮内热毒邪未尽化，干靥太速，而致目疾或痈毒。

【方论选录】《成方便读》：方中取四物以益阴养血；去川芎之香窜，虑其辛散助火；加黄芩、地骨以清阴分之热；红花、紫草以行血分之瘀；生甘草解毒和中，且可缓寒药之性耳。

71187 凉血消风散

《外科大成》卷四。为《外科正宗》卷四“消风散”之异名。见该条。

71188 凉血消风散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克 当归 9 克 荆芥 9 克 蝉衣 6 克 苦参 9 克 白蒺藜 9 克 知母 9 克 生石膏 30 克 生甘草 6 克

【功用】消风清热。

【主治】血热生风、风燥所引起的脂溢性皮炎，人工荨麻疹，玫瑰糠疹，舌质红，脉弦滑数。

【加减】玫瑰糠疹，加紫草；人工荨麻疹，加紫草、桃仁。

71189 凉血润燥饮

【方源】方出《朱仁康临床经验集》，名见《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】生地 30 克 丹皮 9 克 紫草 15 克 茜草 12 克 黄芩 9 克 大青叶 15 克 玄参 9 克 麦冬 6 克 石斛 9 克 花粉 9 克 白蒺藜 9 克

【功用】凉血清热，滋阴润燥。

【主治】①《朱仁康临床经验集》：毛发红糠疹，头皮、颜面、双肘、膝部皮肤发红脱屑、瘙痒。②《中医症状鉴别诊断学》：青年素禀血热之体，心绪烦扰，五志化火，血热化燥生风，肌肤甲错，潮红瘙痒，破如刀铍。

【方论选录】生地、丹皮、紫草、茜草、黄芩、大青叶凉血清热，玄参、麦冬、石斛、花粉滋阴润燥，佐以白蒺藜消风止痒。

【临证举例】毛发红糠疹 张某某，男，13 岁，三周来脸面潮红脱屑，毛囊角化，尤以头部为明显，瘙痒甚剧，抓后出现痂皮，脉细滑，舌质红，苔光，乃血热生风，风胜则燥，治以凉血清热，滋阴润燥，先服凉血润燥饮三剂，接服加味苍术膏。一月后复诊，四肢皮肤损害明显消退，痒已不显。

71190 凉血益气汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】人参 黄耆各一钱 生地黄 川芎各八分 升麻 条黄芩 枳壳 槐角各五分 当归八分 黄连三分。

【用法】上咬咀。水煎熟，空心服。

【功用】凉血益气。

【主治】气血虚而痔疾疼痛。

71191 凉血宽肠汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】当归 生地黄 黄芩各一钱 黄柏七分 枳壳八分 荆芥 甘草各五分 防风六分 桃仁七枚 大黄五分（看虚实用）

【用法】上咬咀。水煎熟，空心温服。

【主治】痔肿疼痛，大便燥结。

71192 凉血调经丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】黄芩 黄柏 白芍 鳖甲 杞子 归身 樗皮

【主治】妇人血热经病及热甚经闭。

71193 凉血清肠散

【方源】《观聚方要补》卷六引《医学统旨》。

【组成】生地黄 当归 芍药各一钱五分 防风 升麻 荆芥各一钱 黄芩 黄连 香附 川芎各八分 甘草五分

·【用法】水煎服。

【主治】①《观聚方要补》引《医学统旨》：大肠热甚脱肛。②《何氏济生论》：肠风下血。

71194 凉血清肺饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克 丹皮 9 克 赤芍 9 克 黄芩 9 克 知母 9 克 生石膏 30 克 桑白皮 9 克 枇杷叶 9 克 生甘草 6 克

【功用】清肺胃经热。

【主治】肺胃积热上蒸于肺而成肺风粉刺、酒刺、痤疮、酒渣鼻。

【加减】大便秘结，加大黄、大青叶。

【方论选录】生地、丹皮、赤芍凉血清热，黄芩、枇杷叶、桑白皮清肺热，知母、生石膏清胃热，生甘草清热解毒。

71195 凉血清脾饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】生地 当归 黄芩 白芍 连翘 防风 薄荷 石膏 甘草

【主治】舌头不硬，惟肿痛流血者。

【加减】伤酒，加青黛；伤厚味，加大黄、枳壳、山楂；脾火，加姜黄连。

71196 凉血清燥汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】熟地 阿胶 白芍 川柏（炒） 当归 丹皮 茵陈 鹿衔草 元武版 女贞子

【主治】干脚气。

71197 凉血散火汤

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】生地二钱（切片） 丹皮八分 赤芍八分 黄芩八分 防风八分 荆芥八分 归尾八分 蝉蜕六分 柴胡八分 车前子一钱

【主治】火盛而致眼白珠尽红，肿痛生眵，流泪羞明。

【加减】头痛恶风或发热，加羌活八分；眼痛不可忍，口渴，加川连八分（酒炒）；肿不消，红不退，加红花四分。

71198 凉血獐皮丸

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】黄柏 枳壳 厚朴 川归 荆芥穗 槐角（炒）各二钱 槐花（炒） 木香 地榆（炒）各三钱 獐皮一个（烧灰） 黄连一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温水送下，每日二次。

【主治】痔漏下血，里急后重，痛不可忍。

71199 凉血解仓散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】解仓（一名余容，即芍药）赤白各一两 当归 甘草各二两

【用法】上为末。每以水二升，末四匕，煮取一升半，分温三服，不拘时候，小儿量岁增减。

【功用】凉血。

【加减】有热，加大黄（炮熟）二两。

【备考】但欲凉血，大黄只用半两，复加解仓成四两，当归成三两，甘草如旧。

71200 凉血解毒丸

【方源】《回春》卷八。

【组成】苦参八两 黄连四两 连翘 牛蒡子 生地黄 白芷各二两 防风 石膏各一两 大黄二两半

【用法】上为末，荆芥汤打糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，先服升麻葛根汤发其毒，毒出后，再服本丸，空心温水送下。

【主治】下疳。

71201 凉血解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷七。

【组成】赤芍 归尾 甘草 生地 木通 牛蒡子（炒） 连翘 紫草 桔梗 山豆根 酒红花

【用法】水煎，入烧过人尿一钱，同服。

【功用】凉血解毒。

【主治】痘疮初出，毒在血分，头焦带黑者。

71202 凉血解毒汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】凉血化毒汤（《种痘新书》卷十二）。

【组成】紫草一钱 生地 柴胡各八分 牡丹皮七分 赤芍 苏木 防风 荆芥 黄连 木通各三分 牛子四分 天麻 红花 甘草各二分

【用法】加生姜一片、灯心二十根、糯米一百粒，水煎服。

【主治】①《赤水玄珠》：痘出热不退，红不分地；或痘苗干枯黑陷。②《种痘新书》：痘红紫稠密，界地不清。

【备考】方中柴胡，《种痘新书》作“前胡”。

71203 凉血解毒汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【异名】凉血地黄汤（《痘疹仁端录》卷十四）。

【组成】当归 生地黄 牛蒡子 红花 木通 赤芍 牡丹皮 连翘 桔梗

【主治】痘疮血热毒盛。

71204 凉血解毒汤

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】当归 麦冬 白芷 紫草 升麻 生地 桔梗 人参 连翘 红花 甘草 牛蒡子

【用法】加灯心二十根。

【主治】妇人非经期出痘，发热时而血忽至。

71205 凉血解毒汤

【方源】《痘科金镜赋》卷六。

【组成】当归一钱一分 白芷五分 升麻四分 紫草一钱五分 红花一钱 赤芍一钱 桔梗八分 连翘一钱

【用法】加灯心二十根，水煎服。

【主治】女入非经期出痘发热时而血忽至。

【宜忌】《痘科辨要》：重身者禁之。

71206 凉血解毒汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】当归 生地黄 紫草 丹皮 红花 连翘（去心） 白芷 川黄连 甘草（生） 桔梗

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】痘至结痂之后，毒热郁于血分，当落不落，干燥不润，根色红艳，渴欲饮冷，烦急不宁。

71207 凉血解毒汤

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】广角粉 0.9 克（冲服） 生地 30 克 玄参 15 克 麦冬 9 克 丹皮 9 克 白芍 12 克 银花 30 克 黄芩 15 克 栀子 9 克 白鲜皮 30 克 土茯苓 30 克

【功用】凉血清热，解毒祛风。

【主治】急性进行性银屑病，剥脱性皮炎（急性期）、肢端红痛症、丹毒、蜂窝组织炎等见有营血毒热证候者。

【加减】口渴喜饮者，加生石膏、知母。

【方论选录】广角、生地、白芍、丹皮，乃是犀角地黄汤，用以清血热；麦冬、玄参可加强凉血之作用；银花、黄芩、栀子清热解毒；白鲜皮、土茯苓清热利湿。该方是凉血解毒之重剂，适应于血热炽盛者。

71208 凉肝八宝丹

【方源】《痲门全书》。

【组成】生犀角（锉末）一两 羚羊角（为末）一两 真阿胶（酒化）一两 好京墨一两 大生地（酒浸）二两 全当归（酒浸）四两 大川芎（酒洗）二两 杭白芍（酒炒）二两 威灵仙一两半

【用法】先将阿胶、京墨入铜勺内好酒溶化，入各药末捣匀，米糊为丸。每服一百丸，茶送下。

【主治】痲疯。

71209 凉肝导赤汤

【方源】《痲医大全》卷十。

【组成】生地 丹皮 泽泻 赤茯苓 炒山栀 人中黄 赤芍 木通

【用法】灯心七寸为引。

【主治】双目流血。

71210 凉肝明目散

《痘疹全书》卷下。为《万氏家抄方》卷六“凉肝散”之异名。见该条。

71211 凉肝明目散

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】草决明 菊花 生地 连翘 山栀 川芎 羚羊角 防风 白芍 当归 石膏 薄荷 黄连 白芷各等分

【用法】水煎服。

【主治】肝经有热，两目红肿疼痛。

71212 凉荣泻火汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 黄芩 黄连 山栀 木通 柴胡 茵陈 胆草 知母 麦门冬各一钱 甘草五分 大黄（酒炒）二钱

【用法】水二钟，煎八分，空心服。

【主治】妇人怀抱忧郁，致生内热，小水涩滞，大便秘结；及阴中火郁作痛，亦如涩淋。

【加减】便利，去大黄。

71213 凉结攻毒饮

【方源】《痘疹金镜录·图象》。

【异名】凉膈攻毒饮(《救偏琐言》卷十)。

【组成】大黄 黄连 石膏 荆芥 地丁 玄参 黑山栀 赤芍 生地 桔梗 木通 甘草 牛蒡 薄荷 枳壳。

【用法】加灯草一分,竹叶三十片。

【主治】痘。热毒壅于上焦,胸膈烦闷,壮热发渴,揭衣弃被,痘色紫艳深红。

71214 凉营清气汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】犀角尖五分(磨,冲) 鲜石斛八钱 黑山栀二钱 牡丹皮二钱 鲜生地八钱 薄荷叶八分 川雅连五分 京赤芍二钱 京玄参三钱 生石膏八钱 生甘草八分 连翘壳三钱 鲜竹叶三十片 茅芦根各一两 金汁一两(冲服)

【功用】《中医症状鉴别诊断学》:凉营透气,清热凉血。

【主治】①《喉痧症治概要》:痧麻虽布,壮热烦躁,渴欲冷饮,甚则谵语妄言,咽喉肿痛腐烂,脉洪数,舌红绛,或黑糙无津之重症。②《中医症状鉴别诊断学》:气热亢盛而汗出溱溱,营血热炽而丹痧密布。

【加减】痰多,加竹沥一两,冲服珠黄散,每日二分。

71215 凉膈甘露丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】蓬砂(研)半两 丹砂(研)一分 龙脑(研)一字 甘草(炙)一两半(为末) 百药煎(椎碎,焙干,研)一两

【用法】上为末,糯米粥清为丸,如梧桐子大。每服一丸,含化,不拘时候。

【主治】咽喉痛,多痰。

71216 凉膈白虎汤

【方源】《保命歌括》卷十七。

【组成】凉膈散合白虎汤

【主治】①《保命歌括》:上焦积热,肿胀而咳,胸高上气而渴。②《金鉴》:火热刑金作喘;胃热口干舌燥作渴,面赤唇红。

71217 凉膈攻毒饮

《救偏琐言》卷十。为《痘疹金镜录·图象》“凉结攻毒饮”之异名。见该条。

71218 凉膈攻毒散

【方源】《痘科辨要》卷十。

【组成】大黄 黄连 石膏 荆芥 地丁 玄参 当归 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘症热毒壅于上焦,胸膈烦闷,壮热。

71219 凉膈连翘散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】连翘 大黄 黄连各二两 薄荷 梔子 甘草 黄芩 朴消各一两

【用法】水煎服。

【主治】阴阳不和,五脏壅热,肝膈毒风上充,眼目热极,珠砂泪出,忽然肿痛难忍,五轮胀起。

71220 凉膈消毒饮

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】荆芥穗 防风 连翘(去心) 薄荷叶 黄芩 生梔子 生甘草 牛蒡子(炒,研) 芒消 大黄(生)

【用法】加灯心为引。水煎服。

【主治】疹毒里热壅盛,或疹已发于外,上攻咽喉,轻则肿痛,甚则汤水难下。

71221 凉膈清脾饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】防风 荆芥 黄芩 石膏 山栀 薄荷 赤芍 连翘 生地各一钱 甘草五分

【用法】先用软绵纸蘸水荫之眼胞上,少顷用左手大指甲佃于患眼,右手以披针尖头齐根切下,随用翠云靛磨浓涂之,后以水二钟,灯心二十根,煎八分,食后服。

【主治】①《外科正宗》:脾经蕴热凝结而成眼胞菌毒,头大蒂小,渐长垂出,甚则眼翻流泪,昏蒙。②《疡科心得集·方汇》:痈疡热甚。

【宜忌】忌海腥、煎炒、椒、姜、火酒。

71222 凉血省风药酒

【方源】《活人方》卷六。

【组成】生地二两 熟地二两 归身二两 川芎一两五钱 杜仲一两五钱 白蒺藜一两五钱 羌活一两 金银花一两五钱 苏叶五钱 荆芥五钱 防风五钱 白芷五钱 蝉壳五钱 陈皮五钱 枳壳五钱 蛇壳五钱 连翘五钱 川连五钱 黄芩五钱 黄柏五钱 粉甘草五钱 白菊花一两 白鲜皮五钱 制首乌一两

【用法】上锉，袋贮，滚酒冲入大坛，封固密窖泥地过，霉用。空心随量温服。

【主治】血虚内热，热极生风，或外感厉气，稽留经络，气实火旺，内则疼痛，外生疮癣，饮食如常，二便闭结。

71223 凉膈天门冬汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】天门冬汤（《普济方》卷七十六）。

【组成】天门冬（去心） 大黄（锉，炒）各一两 车前子 羌蔚子 黄芩（去黑心）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后临卧温服。

【主治】眼风牵，脸硬睛疼，视物不正。

71224 凉膈加羚羊汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】薄荷 连翘 生锦纹 焦山梔 青子芩 生甘草 羚羊角 玄明粉 淡竹叶 白蜜

【主治】积热发痧，便秘。

71225 凉血地黄加人参汤

【方源】《麻疹全书》卷下。

【组成】当归 川芎 白芍 生地黄 人参 升麻 白术 黄芩（酒炒） 甘草

【主治】妇人痘疮发热之时，热入血室，经水先期而来，至四日不止者。

71226 凉血去湿补阴益气丸

【方源】《广笔记》卷二。

【组成】真茅山苍术二斤 怀生地（酒洗）一斤 甘菊花一斤 车前子（米泔浸）八两人参八两 牛膝八两 白茯苓八两（人乳拌

积粉至一斤）

【用法】天门冬熬膏为丸服。

【主治】虚弱。

酒

71227 酒归饮

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】酒当归 白术各一钱半 酒芩 酒芍 川芎 陈皮各五分 酒天麻 苍术 苍耳各七分半 酒甘草 黄柏各四分 防风三分

【用法】水煎服。日四五服。服后蕴睡片时。

【主治】头疮。

71228 酒连丸

《三因》卷十五。为《活人书》卷十八“酒蒸黄连丸”之异名。见该条。

71229 酒连汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】黄连二钱

【用法】酒煎服。

【主治】暑病发热呕恶。

71230 酒肿丸

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】萝卜十枚 皂角五枚

【用法】上二味用水煮干，去皂角，将萝卜捣烂，蒸饼糊为丸，如芡实大。萝卜煎汤送下。

【主治】酒肿，及脾虚发肿。

71231 酒泻丸

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】嫩鹿茸（酥炙透）一两 肉苁蓉五钱 麝香五分

【用法】上为末，陈米饭为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，米汤送下。

【主治】饮酒过伤成病，骨立不能食，但饮酒即泻。

71232 酒积丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】神曲（炒） 麦蘖（炒）各一钱 硃砂一字（别研） 白面四两 巴豆六十粒

〔取霜〕 黄连一字

【用法】上为细末，沸汤和为丸，如梧桐子大。每服三丸，嚼，食后煨生姜温酒下。

【主治】酒癖不消，心腹胀闷，噫酢吞酸，哆逆不食，胁肋刺痛。

71233 酒积丸

【方源】方出《医学纲目》卷二十五，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷六。

【组成】乌梅肉一两 半夏曲七钱 青木香四钱 枳实半两 砂仁半两 杏仁三钱 巴霜一钱 黄连（酒浸一宿）一两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服八丸，白汤送下。

【主治】①《医学纲目》：酒积。②《杂病源流犀烛》：饮酒受伤成积，面黄黑，腹膨胀，时呕痰水。

71234 酒病丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《烟霞圣效》。

【组成】葛根不拘多少

【用法】上为细末，用猪腰子一个，劈破，用药三钱，烧熟服。

【主治】积聚。酒疸身黄，饮食减少。

71235 酒调散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《玉诀》。

【组成】牛蒡子五钱（炒） 紫草 麻黄（去节）各半钱 臭椿子（去皮，为末）一钱 当门子五粒（末一字）

【用法】每服一字、半钱，以温酒调下。

【主治】小儿疮疹不出。

71236 酒调散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】当归 甘草 大黄 赤芍药 菊花 桔梗 苍术 桑螵蛸 麻黄 羌活 茺蔚子 连翘各一两

【用法】上为末。每服三钱，酒调下。

【主治】飞尘入眼者。

71237 酒调散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】槐花 梔子 牛蒡子 防风 蛤粉

【用法】上为末。水煎，食后入酒少许调服。

【主治】眼睛白仁肿痛。

71238 酒调散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】当归 川芎 赤芍 黄芩 梔子 木通 防风 龙胆草 大黄

【用法】上为细末。老酒调下。

【主治】白陷鱼鳞外障。

71239 酒豉方

【方源】《千金翼》卷二十二。

【异名】豆豉酒（《圣济总录》卷一八四）。

【组成】清美酒一升 好豉五合（绵裹）

【用法】上二味，和煮三五沸，热饮一升使尽。大良。

【主治】乳石发动。

71240 酒煮矾

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白矾（明亮有墙壁者）五七两或十两

【用法】上为细末。砂石器内以无灰酒煮至紫黑色为度，入砂合内收，与面油膏相似。每用半匙许含化。候取出痰即消。此药煮时须慢火煎熬，热时须搅稀放冷，如稍健硬，即又添酒煮，直至紫色为度。

【主治】喉闭，咽喉肿痛。

71241 酒渣粉

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】京红粉 轻粉 元明粉各等分。

【用法】上为细末，用猪油调敷。

【功用】解毒消肿，杀菌止痒。

【主治】酒渣，痤疮，传染性湿疹样皮炎，脓疱疮。

71242 酒煎汤

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】甘草半两（炙）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎至半盞，去滓温服。

【主治】肠胃虚冷，泄泻不止，变成白利。

【加减】赤多者，加黑豆十粒同煎。

71243 酒煎汤

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】当归 生耆各二钱 柴胡一钱半 大力子 连翘 桂心各一钱 升麻 川柏 甘草各五分

【用法】酒为引，水煎服。

【主治】腿外侧生疽属胆经者。

71244 酒煎饮

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】常山一两 鳖甲（去裙襕，醋炙，令黄色）一两 知母三分 白头翁三分 桂（去粗皮）半两 青蒿一握 甘草（生）三分 桃李枝头心各七枚 葱白 薤白各七茎 柴胡（去苗）三分

【用法】上为细末，如麻豆大。每服五钱匕，以酒一盏半，浸一宿，平旦煎取一盏，去滓，空腹顿服，当吐痰出，再煎滓服。

【主治】足太阳疟，腰痛头重，寒热互作。

71245 酒煎饮

【方源】《六经方证中西通解》卷三。

【异名】三黄酒（《中国医学大辞典·补遗》）。

【组成】黄连 黄芩各三钱 大黄二钱

【用法】先用火酒炒大黄全焦，再入黄连，加酒炒至大黄色黑为度，即纳水煮一沸，取出频频细呷。

【主治】①《六经方证中西通解》：呕逆不进食者。②《中国医学大辞典》：下痢呕吐。

71246 酒煎散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】赤乌柏根 水柳根 水杨梅根 葱头根 红内消 香白芷各等分

【用法】上为散，酒煎，旋入通明雄黄研烂同服。

【主治】疔疮。

【备考】如泻时疮势略退时，只吃此药。若不泻，再服通利药。

71247 酒煎散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】防风 防己 甘草 荆芥 当归 赤芍药 牛蒡子各等分

【用法】上用好酒煎，食后温服。

【主治】眼有风热，赤涩疼痛。

71248 酒煎散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】当归 穿山甲（炮） 白芷 升麻 肉桂 木香 川芎 赤芍 甘草

【用法】酒煎服。或患处好肉四边红肿，其色如火，用瓷锋砭去恶血，即用鸡子清调乳香末敷之，时时用芭蕉根汁润之，以助药功。

【主治】发背因毒内攻，其毒与好肉一般平者，用手按之如牛颈之皮，上有黄泡出腥水。

71249 酒煎散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】汉防己（酒洗） 防风 甘草（炙） 荆芥穗 当归 赤芍药 牛蒡子 甘菊（去蒂）各等分

【用法】上为散。每服五六钱，酒煎，食后温服。

【主治】暴露赤眼生翳。

71250 酒蜡膏

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】醇酒一盏 蜜一合 蜡三钱 蜀漆一两

【用法】铜铫内慢火同熬，可丸即丸，如弹子大。每服一丸，温酒化开，拂晓服之，虫自下。

【功用】杀诸虫。

71251 酒磨丸

《苏沈良方》卷七。为《证类本草》卷二十二引《经验方》“摩丸”之异名。见该条。

71252 酒磨丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】白茯苓 木猪苓 蒲黄各半两 神曲 白丁香 大麦蘖 干葛 葛花各一两（生用）

【用法】上八味，以神曲末二两半，滴水调成糊，拌和前末为丸，如梧桐子大，放一宿，用陈粟米同炒药丸，每丸子有窍出，香熟为度。每服五七丸，酒送下，不拘时候。

【主治】酒癖引饮，唾涎，头痛背倦，小便赤数。

71253 酒癥丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】大药 小药 半夏各半两 巴豆二钱 大麦蘖半两 雄黄五铢

【用法】上为细末，却合作一处，再研匀细，蒸饼剂为丸，如梧桐子大，放半日之间，欲干不干，却于铍内用麸炒令香熟，勿令大焦，放水上药丸子浮为度。用温酒下一丸为候，若服二丸，微利，取下酒积食劳之病。

【主治】酒积，诸药不效者。

71254 酒癥丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】巴豆一百六十个（一百五十个去皮膜，纸上炒去油，十个不去皮生用） 半夏粉霜各一钱半 神曲半两 乳香一钱 面一斤 硃砂一钱半 轻粉一钱半

【用法】上将麦蘖末半两，用水半碗，熬麦蘖末至八分一盞，去滓，再入黄连三二钱熬成水黄，和硬软得所，少水只熬黄连，水添为丸，如小豆大，晒干，用陈粟米半升炒丸子如银褐色为度。每服一丸至二丸，食前开胃口，食后止痰涎嗽，生姜酒送下；消食，浓煎萝卜汤送下，中酒，嚼丁香，生姜酒送下三丸。

【功用】开胃取痰。

【主治】酒积。

71255 酒癥丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】雄黄（拣）六个（如皂荚子大） 巴豆（不去皮，不出油） 蝎梢各十五个

【用法】上为细末。入白面称五两半，滴水如碗豆大，候稍干，入麸内同炒香。将一粒放水中，如药粒浮于水上，即去麸不用。每服二粒，食后温酒送下。寻常伤酒，每服一

粒，茶、酒任下。

【主治】饮酒过度，头旋恶心，呕吐不止；及酒积停于胃间，遇饮即吐，久而成癖。

71256 酒癥丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】寒食面半斤 神曲三两 雄黄二钱 巴豆五十个（去皮心膜，不去油）

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大，阴干，用谷糠同药丸一处，炒令糠焦为度。每服二三丸，茶、酒任下，不拘时候。伤食后温水送下；心气痛，醋汤送下。若取转使物隐破两丸，临卧冷水送下。常服一丸，食后茶、酒任下。

【主治】男子妇人一切酒食所伤，日久成积，心腹胀满，不思饮食，四支无力，时发寒热，涎痰咳嗽，两肋刺痛及肚里疼。

【宜忌】孕妇人不可服。

71257 酒癥丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《烟霞圣效》。

【组成】川黄连一两 巴豆半两（和皮用）

【用法】上为细末。雄黄一分别研极细，与前二味同研匀，用寒食曲十两，如无，以白面代之，与前三味同研极匀，滴水为丸，如梧桐子大，用平底儿铛，于木炭火上，不住手搅之，直候水内浮为度。每服一丸。如是伤酒，每服二丸，烧生姜一块，细嚼，酒送下。

【主治】酒癥。

71258 酒癥丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《烟霞圣效》。

【组成】大麦蘖不拘多少（醋浸半日取出，炒，如芽子熟取出，揀子芽子在，炒干）

【用法】上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，热酒送下，不拘时候。

【主治】积聚。

71259 酒癥丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《医林方》。

【组成】甘草 半夏(生姜制) 白茯苓 神曲 麦蘖 大戟 葛根 雄黄各半两 巴豆二钱(去油)

【用法】上为细末,水浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服七丸,生姜汤送下。以利为效。

【功用】消酒积。

【主治】积聚。

71260 酒制大黄散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】大黄

【用法】酒浸纸裹煨,切细拌炒,为末,再以酒拌炒熟。用人参加煎调服一钱。两时刻再进一服,睡少顷,有汗觉来,病已去矣。

【主治】妇人七十,形实性急好酒,生脑疽五日,脉紧急而涩。

71261 酒制神芎丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】大黄(酒蒸) 黄芩(酒洗)二钱 黑丑(半生半熟,取头末) 滑石各四钱 黄连(酒洗) 薄荷 川芎各五钱

【用法】用无灰酒为丸,如黍米大。每服五丸、十五丸,温水送下。

【主治】小儿积热在里,熏蒸子上,囟门肿起,摸之其肿虚浮者。

71262 酒制通圣散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】防风通圣散

【用法】诸药俱用酒炒,倍入酒煨大黄,再用酒炒三次。水煎,食后服。

【主治】左右耳俱聋,属足阳明之炎。其原起于醇酒厚味。

71263 酒积乌梅丸

【方源】《赤水玄珠》卷十三引《济世方》。

【组成】乌梅一两 青木香四钱 砂仁五钱 巴豆霜一钱 半夏曲七钱 枳实五钱 杏仁三钱 黄连一两(酒浸一宿)

【用法】蒸饼糊为丸,如绿豆大。每服八丸,白汤送下。

【主治】伤酒。

71264 酒积麦芽丸

【方源】《医统》卷三十三。

【组成】神曲(炒) 麦芽(炒)各一两 黄连五钱(锉用巴豆五粒同炒)

【用法】上为末,沸汤搜和为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食远姜汤送下。

【主治】酒癖不消,心腹胀满,噤酸呕逆,胁肋痛。

71265 酒浸牛膝丸

【方源】《本事备录》卷四。

【异名】牛膝丸(《杂病源流犀烛》卷二十九)。

【组成】牛膝三两(炙黄) 川椒半两(去目并合口者) 附子一个(炮,去皮脐) 虎胫骨(真者)半两(醋炙黄)

【用法】上咬咀。用生绢袋入药扎口,用煮酒一斗,春、秋浸十日,夏浸七日,冬浸十四日。每空心饮一大盏,酒尽出药为末,醋糊为丸。每服二十丸,空心温酒,盐汤任下。

【主治】腰痠脚软,脚气寒痛。

①《本事备录》:腰脚筋骨痠无力。②《张氏医通》:脚气枯瘦,冷淡。③《杂病源流犀烛》:寒胜无汗,挛急掣痛。

【宜忌】忌食动风等物。

71266 酒浸芍药散

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】芍药五两 生地黄(切,焙)三两 虎骨(酒浸,炙)二两

【用法】上为粗散。以酒一升,浸一宿,焙干,再捣罗为散。每服三钱匕,空腹温酒调下。日午、夜卧再服。

【主治】骨极,骨髓中疼。

71267 酒浸药仙方

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】甘菊花 防风(去芦头) 羌活 杜仲 牡蛎 瓜蒌根 牡丹皮 紫菀 菖蒲 人参 白茯苓 牛蒡子 枸杞子各半两 白花蛇 桔梗 吴白术 山茱萸 白茯苓 晚蚕砂(炒) 黄桂 远志(去心) 牛膝各

二钱半 虎胥骨 牛蒡根 干姜 干地黄 柏子仁 狗脊(去毛,焙) 天雄(去皮,炮) 草薢 蛇床子 黑附子 肉苁蓉 菟丝子 续断 芍药(去皮) 石斛各三钱

【用法】上为粗末。用新绢袋盛药,用新小瓮儿一个,放药在内,以无灰酒二斗,将药浸之,密封其口,春、夏浸二七日,秋、冬浸三七日。开瓮,早晨、临午、晚三时,令病人自取冷酒三盏,依时服之。每服不过一盏,不多服,亦不可添减,乱开酒瓮。久病服者不过一月,近者十日,轻者五日见效。凡患中风疾,四肢不举,服之三日,举手梳头,七日渐舒,十日行步,半月遍身依旧,觉得轻健,眼目更明。

【主治】中风。骨节疼痛,四肢浮肿,眼目昏暗,半身不遂,语言蹇涩,口眼喎斜,中风失音。

71268 酒调洗肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黑参 大黄 桔梗 知母 朴消 梔子 黄芩

【用法】上为末。每服二三钱,温酒调下,一日二次。

【主治】①《银海精微》:眼热气上攻无时,黑睛痛者。②《眼科全书》:蟹睛疼痛外障。

【加减】热甚者,加生地、归尾。

【备考】《眼科全书》无黄芩。

71269 酒煮木瓜粥

【方源】方出《本草纲目》卷三十引《食疗本草》,名见《东医宝鉴·外形篇》卷三。

【组成】大木瓜

【用法】酒、水相和,煮令烂,研作膏,热裹痛处,冷即易,一宿三五次。

【主治】筋急。

71270 酒煮当归丸

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】茴香五钱 黑附子(炮制,去皮脐) 良姜各七钱 当归一两(上四味锉如麻豆大,以上等好酒一升半同煎至酒尽,焙

干) 炙甘草 苦楝(生用) 丁香各五钱 木香 升麻各一钱 柴胡二钱 炒黄盐 全蝎各三钱 延胡索四钱

【用法】上与前四味药同为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五、七十丸,空心淡醋汤送下。

【功用】《玉机微义》:升阳胜湿。

【主治】①《兰室秘藏》:癰疽,白带下注,脚气。腰以下如在冰雪中,以火焙炕,重重厚绵衣盖其上,犹寒冷不任,面白如枯鱼之象,肌肉如刀割削瘦。小便不止,与白带长流而不禁固,自不知不觉,面白目青,蓝如菜色,目眦无所见,身重如山,行步倚侧,不能安地,腿膝枯细,大便难秘,口不能言,无力之极,食不下,心下痞,烦心懊恼,不任其苦,面停垢,背恶寒,小便遗而不知,此上中下三阳真气俱虚竭。胃虚之极,哕呕不止,脉沉厥紧而涩,按之空虚。②《玉机微义》:小腹下痛。

71271 酒煮当归丸

《活法机要》。为《医学发明》卷一“丁香楝实丸”之异名。见该条。

71272 酒煮茵陈汤

【方源】《古今医鉴》卷六引蒋云山方。

【组成】茵陈一两

【用法】上用好陈酒一钟半,煎至八分,食远温服。

【主治】酒疸。遍身眼目发黄,如黄金色者。

71273 酒煮黄连丸

《鸡峰》卷五。为《活人书》卷十八“酒蒸黄连丸”之异名。见该条。

71274 酒煮黄连丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄连(去须)五两 厚朴(去粗皮)三两 肉豆蔻一两(面裹煨)

【用法】上锉。用无灰酒、米醋各一升,慢火熬尽,烈日晒干为末,再用酒醋打面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,米饮送下。

【功用】厚肠胃,止泄泻。

【主治】泻痢。

71275 酒煮解毒汤

【方源】《名家方选》。

【组成】穿山甲 白芷 防风 没药 甘草 芍药 贝母各五钱 金银花 陈皮各三钱 皂角刺一钱

【用法】上药加酒煎，初以酒三合，煮取二合，再入酒二合，煮取一合，若不嗜酒者，酒、水各半煎服，日服一剂，三日或七日服之。

【主治】诸疮毒，经年不愈；或骨节疼痛者。

71276 酒煮鳗鲡鱼

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】鳗鲡鱼二斤（铍作段子）

【用法】上入铛内。以酒三大盏，熟煮，入盐、醋食之。

【主治】骨蒸劳瘦，及肠风下虫。

71277 酒蒸黄连丸

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】酒煮黄连丸（《鸡峰》卷五）、酒连丸（《三因》卷十五）、黄龙丸（《局方》卷二吴直阁增诸家名方）、小黄龙丸（《得效》卷二）、独连丸（《普济方》卷一七七引《神效方》）。

【组成】黄连四两（以无灰好酒浸面上约一寸，以重汤熬干）

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，滚水送下。

【功用】①《直指》：治膈热，解酒毒。②《御药院方》：除热气，止烦渴，厚肠胃。

【主治】胃肠积热，泻痢，消渴，反胃呕吐。①《活人书》：暑毒伏深，及伏暑发渴者。②《三因》：酒痔下血。③《局方》（吴直阁增诸家名方）：呕吐恶心，伤酒过多，脏毒下血，大便泄泻。④《御药院方》：消瘴。⑤《丹溪心法》：伤于酒，每晨起必泻。⑥《普济方》：身热下痢鲜血，烦渴多渴，或伤热物过度。⑦《证治要诀类方》：三消。⑧《医统》：一切热泻。⑨《医灯续焰》：嘈杂吞酸，噎膈反胃，吐酸、干呕、胃痛、挟虫者。⑩《法律》：酒瘴。⑪《外科大成》：砂疥。

【方论选录】《医方考》：黄连，苦寒枯燥之

物也。苦寒，故能胜热；枯燥，故能胜湿。而必煮以酒者，非酒不能引之入血也。

71278 酒蒸黄连丸

【方源】《普济方》卷三十七引《德生堂方》。

【组成】黄连一斤（用好酒浸二日，入锅内蒸透为度，取出晒干，留酒和面糊） 干姜半斤 枳壳半斤 木香四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五、七十丸，饭饮送下，不拘时候。

【功用】解酒毒。

【主治】酒食过度，便血脏毒，诸种痔满，泻痢赤白，脏腑疼痛，胸膈痞闷，气不舒畅。

71279 酒蒸黄连丸

【方源】《普济方》卷二九六引《德生堂方》。

【组成】黄连一斤（酒浸蒸） 苦参二两

【用法】上为末。黄连余酒面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，米饭送下，不拘时候。

【主治】诸痔疮及便血不止。

71280 酒煎干蟾丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【异名】干蟾丸（《普济方》卷三七九）。

【组成】干蟾一枚（用无灰酒一升煎其酒半升以来却去蟾骨，煎令熟，以后于乳钵内并酒一时，研令如膏，次用后药） 肉豆蔻二枚（去壳） 槟榔一两 甘草一寸（炙微赤铍） 乳香半两（研入） 朱砂一两（研细） 麻黄半两（去根节） 膩粉一钱（研入） 胡黄连半两 黄连半两（去须） 丁香一分 芦荟一分（研入） 麝香一钱（研细） 牛黄一钱（研细）

【用法】上为末。都研令匀，入蟾膏内为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】小儿五疳，不生肌肉。

71281 酒煎大黄汤

《症因脉治》卷四。为《保命集》卷中“大黄汤”之异名。见该条。

71282 酒煎附子煎

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】大赭石一斤 荜茇 胡椒 附子各二两

【用法】上为细末。酒煮面糊为丸，如皂子大。每服二丸，空心米饮送下。

【主治】心腹积聚，风寒邪气，冷癖在胁，咳逆上气，喘嗽寒痰，痃癖痼冷，筋骨无力，百节痠疼，虚劳损败，阴汗泄精，腰肾久冷，心腹疼痛，下痢肠骨，呼吸少气，瘦悴异形，全不思食，身体大虚，五脏百病。

71283 酒渣鼻擦剂

《朱仁康临床经验集》。为《得效》卷十“硫黄散”之异名。见该条。

71284 酒煎附子四神丹

【方源】《幼幼新书》卷九引李安仁方。

【异名】四神附子煎(《传信适用方》卷二)、沉酒煎附子四神丹、四神附子丹(《普济方》卷二二五)。

【组成】水窟雄黄 雌黄 辰砂 透明硫黄各半斤

上别研水飞过，渗干，再同研匀。用烧药盒子一个，看大小用。临时先以牡丹根皮，烧烟熏盒子，令酽烟气黑黄色，入前四物在内，约留药盒子口下及一指，以醋调腊茶作饼子盖定，与盒子口缝平，用赤石脂泥固济盒子，用盒盖子盖之，令严，却用纸筋盐泥通裹盒子，固济约厚一寸，放令极干。初用炭火烧热，次加少火烧合通赤，常约令火五斤以来，渐渐添火气，小却添至五斤以来，照顾勿令炭厚薄不一，可添至三秤得济，去火渐令冷，入在地坑内，深一尺以上，用好黄土盖之。候三日取出，打破盒子，取药研细，约三十两。别入：

胡椒末 荜茇末各七两 真赤石脂末三两 好官桂心末六两 附子(及六钱以上者，炮，去皮脐，取末)十二两

【用法】上以好法酒一斗，熬至三升，然后入附子末为糊，和前药为丸，如鸡头子大，留少酒膏，恐药干。候干，轻病每服一丸，重病二丸至三丸，空心食前米饮汤送下；温酒、盐汤亦得。小儿吐泻慢惊，研一丸，米饮灌下。

【功用】升降阴阳，顺正祛邪，消风冷痰涎，散结伏滞气，通利关节，破瘀败凝涩奔冲失经之血，接助真气，生续脉息，补肾经不足，和膀胱小肠，秘精固气，定喘止逆，压烦燥，养胃气。

【主治】小儿慢惊，一切虚冷之疾。五脏亏损，下虚上壅，胸中痰饮，脐腹冷积，奔豚气冲，上下循环，攻刺疼痛，脾寒冷汗，中风痿痹，精神昏乱，霍乱吐泻，手足逆冷，阴毒伤寒，四肢厥逆，形寒恶风，向暗睡卧，乍寒乍乱。妇人产后诸疾，血气逆潮，迷闷欲绝，赤白带下，崩漏不止。

【加减】如觉热渴，即加木香、桂末一钱，同和服之。

【宜忌】如有固冷陈寒，宜常久服饵。如病安愈，不得多服。

消

71285 消化丸

《外台》卷七引《古今录验》。为原书同卷“芫花丸”之异名。见该条。

71286 消化丸

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)。

【组成】青礞石二两(消煨) 明矾 橘红三两 薄荷一两 猪牙皂角二两(火炙，去皮弦) 南星二两(生用) 半夏二两(生用) 枳壳一两半 白茯苓 枳实各一两半

【用法】上为细末，和匀，神曲打糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，每夜上床时，饴糖拌吞。次嚼嚼太平丸，二药相攻，痰嗽扫迹，除根立愈也。

【主治】劳热痰壅盛者。

【备考】陈修园注本《十药神书》有沉香，名“沉香消化丸”。

71287 消化片

【方源】《云南省农村中草药制剂规范》。

【组成】枳实 1 千克 木香 1 千克 厚朴 1 千克 神曲 1 千克

【用法】取枳实、木香、厚朴置简易挥发油——浸膏连续提取器中进行煎煮，至挥发油收集器中挥发油量不再增加为止，收取油层滤取煎液。药渣再煎煮1小时，滤过，合并两次滤液，浓缩至稠膏状。加入约 $\frac{1}{2}$ 神曲粉（过90目筛）混合，烘干，粉碎，过90目筛。与其余神曲粉充分混匀，用80%乙醇制粒，过14目筛，60℃烘干，取少量干燥颗粒研细，用此细粉吸附提取的挥发油，充分混匀，再将其余干燥颗粒按等量递加法混匀。加硬脂酸镁、滑石粉适量，混合压片。

【功用】健脾散积，理气止痛。

【主治】积食气滞，胸腹胀痛。

71288 消化汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】金银花二两 紫贝天葵五钱 天花粉三钱 当归一两 生甘草三钱 通草一钱

【用法】水煎服。一剂即消。

【主治】乳房作痛生痈。

71289 消化汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】白术 藿香 厚朴（姜汁炒） 神曲（炒） 白芍 陈皮 砂仁（炒） 枳实（炒）各一钱 木香三分

【用法】水煎，热服。

【主治】产后宿食痢疾，腹痛腹胀，恶闻食气，或食后更痛。

71290 消化膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】炮姜一两 红花八钱 白芥子 南星各六钱 生半夏 麻黄 黑附子各七钱 肉桂五钱 红芽大戟二钱 红娘虫八分 芝麻油五斤

【用法】以上诸药，用芝麻油炸枯后，每斤油加入樟丹（夏季兑樟丹八两五钱，冬季兑七两五钱）熬成膏，每斤内兑入麝香一钱六分，藤黄面一两。将膏药熔化后摊于布或纸

上，外贴患处。

【功用】回阳散寒，活血消肿。

71291 消气丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】皂荚五挺（长约及尺，不蛀者，去皮子，水煮五七沸，取出酥炙） 防己 人参 射干（不蛀者） 桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔纸炒）各一两 知母（焙）三分 马兜铃三十枚 槟榔七枚（锉）

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后荆芥汤送下，一日二次。

【主治】上焦热结，脾肺久壅，痰涕喘闷，脑昏背痛，常觉口干咽涩，饮食无味，时觉烦躁，鼻塞。

71292 消气丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】续随子（去壳研） 胡椒各五十粒 丁香二十一枚 木香一钱 蝎梢十四枚（炒） 阿魏一字（研）

【用法】上六味，捣罗四味为末，入研药，合研匀，烧粟米饭为丸，如麻子大。每服五丸至七丸，淡醋汤送下。

【主治】小儿腹胀。

71293 消气丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】木香一钱 萝卜子半两（巴豆一分炒黄色，去巴豆不用）

【用法】上为细末，糊丸如绿豆大。三岁儿三十丸，用米饮送下。

【主治】小儿气疳，腹胀喘粗。

71294 消气汤

《医方类聚》卷八十八。即《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方大成》卷三）“消气散”。见该条。

71295 消气散

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方大成》卷三）。

【组成】沉香 木香 人参 半夏（汤洗七次） 青皮（去白、炒） 桔梗（炒）各半

两 陈皮(去白,炒)一两 白茯苓(去皮) 草果仁(炒) 大腹皮(洗,焙) 紫苏(连梗) 木通各三两

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盏,加生姜四片,大枣一枚,煎,空心热服。

【主治】血气凝滞,心脾不和,腹急中满,四肢浮肿,饮食无味,小便不清。

【备考】本方方名,《医方类聚》引作“消气汤”。

71296 消气散

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】白术一两 薏仁一两 茯苓一两 人参一钱 甘草一分 枳壳五分 山药五钱 肉桂一分 车前子一钱 萝卜子一钱 神曲一钱

【用法】水煎服。日服一剂,初服觉有微碍,久则日觉有效,十剂便觉气渐舒,二十剂而全消,三十剂而全愈。

【功用】健脾行气利水。

【主治】气臌。乃气虚作肿,似水臌而非水臌也。其症一如水臌之状,但按之皮肉不如泥耳。必先从脚面肿起,后渐渐肿至上身,甚则头面皆肿者。

【宜忌】必禁食盐三月,后可渐渐少用矣。即秋石亦不可用,必须三月后可用之。

71297 消丹饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】玄参三两 升麻二钱 麦冬一两 桔梗二钱 生甘草一钱

【用法】水煎服。一剂丹化,不必二剂。

【主治】火丹。身热之后,其身不凉,遍身红紫之色。

【方论选录】此方用玄参解其浮游之火,以麦冬滋其肺金之火,用桔梗、升麻表散于毛窍之间,用甘草调和于脏腑,经络之内,引火外行,所以奏功神速耳。

71298 消丹饮

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】元参一两 升麻一钱 麦冬三钱

桔梗一钱 丹皮二钱 牛子二钱 甘草七分 淡竹叶十片(引)

【主治】赤游丹。色赤而干,发热作痛者。

71299 消风丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】草乌头半斤(用油四两炒令黄色) 麻黄(去根节,先煎,掠去沫,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 白芷各半两 防风(去叉) 白茯苓(去黑皮) 藿香叶 干姜(炮) 前胡(去芦头) 青橘皮(去白,炒干) 桂(去粗皮) 各一两 甘草(炙,锉) 二两 龙脑(研) 麝香(研) 丁香 木香 白僵蚕(炒) 各一分 蝉蜕半两(炒) 不蛭皂荚一两一分(去皮子,酥炙焦黄)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,温酒化下,不拘时候。

【主治】风邪引颊,口喎僻,言语不正。

71300 消风丸

【方源】《保婴撮要》卷三。

【组成】牛胆南星二钱 羌活 独活 防风 天麻 人参 荆芥 川芎 细辛各一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二丸,薄荷、紫苏汤调化下。

【主治】小儿风痫。

71301 消风丸

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】南薄荷 川羌活 川独活 北防风 明天麻 荆芥穗 正川芎 北细辛各一钱 胆南星二钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重一钱一颗。每日一丸,苏叶、薄荷煎汤化服。服完七丸,方服集成定痫丸。

【功用】疏散外感,开通经络。

【主治】小儿诸般痫证。

71302 消风丹

【方源】《异授眼科》。

【组成】黄柏五钱 秦艽五钱 防风五钱 细辛五钱 黄连五钱 木通五钱 薄荷一钱

【用法】上为细末。水一钟，浸一宿去滓，加菊花一钱，白蜜四两，熬成膏。出火毒调点。

【主治】风热目疾。

71303 消风汤

【方源】《会约》卷十九。

【组成】赤芍一钱半 生地二钱 荆芥 白芷 银花 羌活 独活 连翘 甘草 防风各一钱

【用法】水煎服。

【主治】干疥极痒，及一切疮肿热疖。

【加减】如热燥，加黄柏、苦参；如面上头疮，加川芎、白附各一钱，北细辛三分。

71304 消风汤

【方源】方出《常见病验方选编》，名见《古今名方》。

【组成】川芎 荆芥 防风 羌活各9克 薄荷6克 细辛3克

【用法】水煎服。每日一剂。

【功用】祛风止痛。

【主治】三叉神经痛。

【加减】疼痛甚者，加僵蚕6克，菊花12克；高血压，加夏枯草15克，决明子12克。

71305 消风饮

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】陈皮 白术（去芦） 当归（酒洗）白茯苓（去皮）各一钱 防己 独活 木瓜四分 秦艽六分 半夏（姜制） 牛膝 桂枝各八分 元胡索 羌活 枳壳（去瓤） 甘草各三分 防风五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服，不拘时候。

【主治】痛风，手足不能屈伸，周身疼痛。

【加减】气虚，加人参八分。

71306 消风饮

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】荆芥穗三钱 薄荷二钱 桂枝尖三钱 羌活三钱 草乌三钱 麻黄三钱 酒黄芩三钱 防风二钱五分 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】外冒风邪，头痛身热，自汗有嚏，

初感之时，脉象浮缓，或至二三日其脉象亦有微数者。

【加减】若咳嗽，加半夏，牛子各三钱。

71307 消风散

【方源】《局方》卷一。

【异名】人参消风散（《卫生宝鉴》卷九）。

【组成】荆芥穗 甘草（炒） 芎藭 羌活 白僵蚕（炒） 防风（去芦） 茯苓（去皮，用白底） 蝉壳（去土，微炒） 藿香叶（去梗） 人参（去芦）各二两 厚朴（去粗皮，姜汁涂炙熟） 陈皮（去瓤，洗，焙）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，茶清调下。如久病偏风，每日三服，便觉轻减。如脱着淋浴，暴感风寒，头痛身重，寒热倦疼，用荆芥茶清调下，温酒调下亦得，可并服之。小儿虚风，目涩昏困，及急慢惊风，用乳香、荆芥汤调下半钱，并不拘时候。

【主治】风湿上攻，或外侵肌肤，头目昏痛，瘙痒瘾疹，眼痒昏涩，耳鸣咳嗽，偏风，小儿疮疹，急慢惊风，胎风赤烂，妇人血风。

①《局方》：诸风上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦痛，肌肉蠕动，目眩旋晕，耳聩蝉鸣，眼涩好睡，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，瘙痒隐疹；妇人血风，头皮肿痒，眉棱骨痛，旋晕欲倒，痰逆恶心；或久病偏风，或脱着沐浴，暴感风寒，头痛身重，寒热倦疼；或小儿虚风，目涩昏困，及急慢惊风。②《普济方》：小儿痘疮或发或未发，忽面青暴吼，为风邪所伤，耳冷，尻冷，足下冷，耳后有红缕，心胸间细点如粟起。③《保婴撮要》：赤白游风。④《医学入门》：眼胞皮肉有似胶凝，肿如桃李，时出热泪及偏风牵引两脸赤烂，经年不安。⑤《便览》：丹疹属血风血热。⑥《明医指掌》：胎热，妇人妊娠多食辛厚味之物，妊娠将临月，两眼失明，不见灯火，头痛眩晕，腮颌肿，不能转项。⑦《张氏医通》：风热咳嗽，遍身疥癣。小儿疮疹余热。

【方论选录】①《医方考》：风热则表实，实者宜散之，荆芥、芎藭、防风、羌活皆辛散也；表实则里虚，虚则宜补之，人参、甘草、茯苓皆

甘补也;风盛则气壅,厚朴所以下气,陈、藿所以泄气;风热生痰,治以僵蚕;表热留连,治以蝉退。②《医方集解》:此足太阳、手太阴药也。羌、防、荆、芎之辛浮,以治头目项背之风;僵蚕、蝉蜕之清扬,以去皮肤之风;藿香、厚朴以去恶散满;参、苓、甘、橘以辅正调中,使风邪无留壅也。

【备考】本方去人参,加雄黄,名“雄风散”。(见《中国医学大辞典》)。

71308 消风散

【方源】《丹溪心法附余》卷一引《局方》。

【组成】天麻(去苗)一两 防风(去芦)二两 细辛(去苗叶土)半两 薄荷叶半两 川芎一两 甘草(炙)一两 吴白芷一两 朱砂一两(为衣)

【用法】上为细末。炼蜜为丸,如弹子大,朱砂为衣。每服一丸,细嚼,食后生姜汤送下;茶清亦可。

【主治】诸风上攻,头目昏眩,项背拘急,鼻嚏声重,耳作蝉鸣;及皮肤顽麻,瘙痒瘾疹;妇人血风,头皮肿痒。

【备考】本方方名,据剂型,当作“消风丸”。

71309 消风散

【方源】《洪氏集验方》卷五引蔡敏修方。

【组成】硼砂一钱 朱砂一字 雄黄一钱 甘草末一字 脑子一字

【用法】上为细末,和匀。少许敷之,吞咽不妨。

【主治】小儿一切口疮,并重舌鹅口。

71310 消风散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】川芎 羌活(去芦) 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 白僵蚕(炒) 蝉壳(炒)各一两 陈皮(去白) 厚朴(去粗皮,姜制)各一两

【用法】上为细末。每服二钱,茶清调下。

【主治】①《儒门事亲》:诸风掉眩,风痰风厥,涎潮不利,半身不遂,失音不语,留饮癰

泄,痰实呕逆旋运,口喎抽掇,僵仆目眩,小儿惊悸狂妄,胃脘当心而痛,上支两胁,咽膈不通,首风沐风,手足挛急。②《麻科活人》:麻疹其状如粟,红垒而起,间有不出,或只头面有,四肢无者。

71311 消风散

【方源】《济生》卷七。

【组成】石膏(煨) 甘菊花(去枝梗) 防风(去芦) 荆芥穗 羌活(去芦) 羚羊角(镑) 川芎 大豆黄卷(炒) 当归(去芦,酒洗) 白芷各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盏半,入好茶半钱,煎至八分,去滓,食后通口服。

【主治】妊娠胎气有伤肝脏,毒热上攻,太阳穴痛,呕逆,背项拘急,头旋目晕,视物不见,腮项肿核。

【宜忌】《重订严氏济生方》:“大忌酒面,煎炙、烧煨,鸡、羊、鹅、鸭、豆腐、辛辣,一切毒食,并房劳及稍温药。”

【临证举例】两眼失明 《重订严氏济生方》:有一妊妇,将临月,两眼忽然失明,灯火不见,头痛目晕,项腮肿满,不能转颈,诸医治疗不瘥,转加危困,偶得此方,对证合之服,病减七八,获安分娩。其眼带吊起,入物不辨,服四物汤加荆芥、防风,更服天门冬饮子,以此二般药间服,目渐稍明。

71312 消风散

【方源】《普济方》卷四十五引《保生回车论》。

【组成】龙脑薄荷二两(去土,令净) 荆芥穗二两 羌活半两 川芎半两 细辛(去苗)一分 白术二两(锉) 石膏(研极细,水飞晒干)一分 甘草半两(炙紫色)

【用法】上为末。每服二钱,茶清或醇酒调下,热服,一日三次,不拘时候。一切风寒或沐浴之后,并宜服之。

【主治】风头痛。

71313 消风散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《急救仙

方》。

【异名】神应消风散 (《金鉴》卷七十三)。

【组成】香白芷一两 全蝎一两 (去尖) 人参一两

【用法】上为末。每服二钱,中午间止吃粥,晚间不吃夜饭,次日空心温酒调下。早饭放迟吃,身上微燥为妙。

【主治】大风。

【宜忌】①《医方类聚》引《急救仙方》:忌生姜、胡椒,一切性热之物。②《卫生易简方》:须令病人别居静室,断酒戒色,耐性宽心。忌一切发风动气、荤腥、盐、酱、生姜、胡椒、生冷、性热之物。止素食淡饭糜粥乃可治疗。

【备考】第一日服本方;第二日服追风散;第三日服磨风丸。

71314 消风散

【方源】《普济方》卷一〇三。

【组成】柴胡 羌活 当归 (去芦头) 防风 川芎 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盞,加生姜三片,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】一切风热上攻,头面浮肿生疮,偏正头风。

71315 消风散

【方源】《普济方》卷三四一。

【组成】石膏 山茵陈 菊花 防风 荆芥 螺粉各二钱 白芷 川芎 阿胶 甘草各二钱 木香 白术各半钱

【用法】上锉作六服。水一盞,入好茶半钱,煎八分,通口服,头微汗得愈。

【主治】妊娠头旋目晕,视物不明,腮项肿核。因胎气有伤肝脏,毒气上攻,太阳穴痛,呕逆,背项拘急,致令眼晕生花,若加涎壅,危在旦夕。

71316 消风散

【方源】《普济方》卷三四八。

【组成】京墨 石膏 茵陈 甘草 菊花 防风 荆芥 阿胶 白术 南木香各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水二盞,茶少

许,煎至八分,温服。俟头上微汗出,立愈。

【主治】眼花血晕,视物不见。

71317 消风散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】人参 茯苓 甘草 紫苏叶 木瓜 泽泻 香薷 半夏曲 白扁豆 (炒) 陈皮 乌梅肉 厚朴 (炒) 各四钱

【用法】上为末。每服一钱,加生姜、大枣,水煎服。

【主治】小儿吐泻生风。

【加减】多困,加朱、麝。

71318 消风散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】藿香 白芷 全蝎 甘草 防风 青风藤

【主治】一切风毒上攻,头目拘急,鼻涩。

71319 消风散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】藿香 川芎 甘草 人参 白茯苓 荆芥 蓬州豆 甘草蚕 陈皮 蝉蜕 羌活 独活 防风

【主治】眼目头痛。

71320 消风散

【方源】《医统》卷五十五。

【异名】二味消风散 (《景岳全书》卷五十六)。

【组成】苏州薄荷叶 蝉退 (去头足土净) 各等分。

【用法】上为末。每服一钱,食远温酒调下。

【主治】皮风瘙痒。

71321 消风散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】荆芥穗 甘草 (炙) 川芎 羌活 僵蚕 (去嘴) 人参 茯苓 蝉蜕 藿香叶 防风各半两 厚朴 (姜炒) 芍药 陈皮 (去白) 各二钱

【用法】上为细末。用茶清或乳香煎汤调下,不拘时候。

【主治】小儿风热。因解衣风邪客于皮毛,

恶风，发热，多睡。

71322 消风散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】羌活 独活 僵蚕 藿香 枳壳 防风 天麻 地骨皮 蝉蜕各八分 前胡一钱半 柴胡 黄芩 天花粉 桔梗 茯苓 荆芥 紫草 牛子各一钱 人参 川芎各七分 甘草四分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《赤水玄珠》：痰盛惊搐，谵语，狂急，口张，目作上视。②《痘疹仁端录》：痘前热则生风，项强，牵引，直视，口渴，舌强，如中风状。

71323 消风散

【方源】《便览》卷一。

【组成】陈皮 当归 茯苓 白术各一钱 玄胡 半夏 牛膝各八分 甘草三分 枳壳 防风各五分 防己 羌活 独活各六分 木瓜四分 秦艽六分 川芎八分

【用法】上用水二盏，加生姜三片，煎服。

【主治】手足不能屈伸，周身疼痛。

71324 消风散

【方源】《便览》卷一。

【组成】荆芥穗 甘草（炙） 陈皮 厚朴（各五钱） 白僵蚕 蝉退 人参 茯苓 防风 川芎 藿香 羌活 白芷

【用法】上为末。荆芥茶清汤调服。

【主治】丹毒属血风血热，或头面赤肿，或成疮疖。

71325 消风散

【方源】《便览》卷一。

【组成】桔梗 甘草 柴胡 黄连 梔子 黄芩 防风 川芎 薄荷 葛根 黄柏 枳壳 天花粉 枇杷叶

【用法】用水一钟，酒半钟，煎，食远热服。

【功用】去肺风毒。

【主治】面鼻生疮，粉刺。

【宜忌】忌猪肉。

71326 消风散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】人参 僵蚕（炒） 甘草 荆芥穗 陈皮 厚朴（制） 茯苓 蝉退 防风 川芎 羌活 藿香各五钱

【用法】上为末。每服三钱，加土茯苓四两。水三碗，煎至二碗，分上下体，食前后服。

【主治】杨梅瘰疹及翻花疮。

71327 消风散

【方源】《疹科正传》。

【组成】防风 荆芥 羌活 甘草 陈皮 茯苓 白芍 蝉蜕 藁本 桔梗 生地 川芎 当归 何首乌

【主治】疹子余毒未尽，或因发汗过迟，以致蕴热未散，发为疮疥。

71328 消风散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】凉血消风散（《外科大成》卷四）。

【组成】当归 生地 防风 蝉蜕 知母 苦参 胡麻 荆芥 苍术 牛蒡子 石膏各一钱 甘草 木通各五分

【用法】上用水二钟，煎八分，食远服。

【功用】《方剂学》：疏风清热，除湿止痒。

【主治】风湿热毒侵袭肌肤，致患瘾疹，湿疹、风疹。

①《外科正宗》：风湿浸淫血脉，致生疮疥，瘙痒不绝；及大人、小儿风热瘾疹，遍身云片斑点，乍有乍无。②《金鉴》：钮扣风，瘙痒无度，抓破津水，亦有津血者；疥疮，浸淫疮，抓破津血者；血疖，形如紫疥，痛痒时作，血燥多热。③《方剂学》：湿疹、风疹，症见疹出色红，瘙痒，抓破后渗出津水，舌苔白或黄，脉浮数有力。

【宜忌】《方剂学》：服用本方时，不宜食辛辣、鱼腥、烟酒、浓茶等。

【方论选录】《中药方剂学》：痒自风来，止痒必先疏风，故方中以荆芥、防风、牛子、蝉蜕开发腠理，透解在表的风邪为主药；由于因湿热相搏而致水液流溢，故以苍术之辛苦温，散风祛湿，苦参之苦寒，清热燥湿止痒，木通渗

利湿热为辅药;风热客于皮肤涉及血分,又以当归和营活血、生地清热凉血,胡麻仁养血润燥,石膏、知母增强清热泻火之力,均为佐药;甘草解毒并能调和诸药为之使。合用有疏风清热,除湿消肿之功。

【临证举例】①急性肾炎《浙江中医杂志》(1986;9:392):用本方治疗急性肾小球肾炎100例,由风湿热邪客于肌表所致,方用荆芥、防风、大力子、当归、苍术各10克,蝉衣、生甘草、木通各5克,苦参、生地、茺蔚子各10~20克,知母5~10克,石膏20~30克。水肿明显者加茯苓皮、车前子;疮疡加紫花地丁、蒲公英。15天为1疗程。经1疗程服药后,81例痊愈(临床症状、体征消失,尿检正常),10例显效(临床症状、体征消失,尿蛋白,红细胞均在十以下),5例有效(临床症状,体征减轻,尿检蛋白>+,红细胞、白细胞>+),4例无效。总有效率96%。②湿疹《新医药学杂志》(1976;8:15):治疗湿疹44例,药用:荆芥3克,防风4.5克,当归6克,生地9克,苦参6克,蝉衣3克,苍术1克,厚朴1.5克,僵蚕3克,藿香3克,知母3克,牛蒡子4.5克,木通1.5克,甘草1.5克,石膏18克,薄荷1克。每日一剂。对皮损较重者,外用新鲜马齿苋进行湿敷。服药最少者5剂,最多者23剂,平均20剂。结果近期治愈(症状及皮损全部消失)38例,基本治愈(仅残留少许皮损,自觉症状基本消失)6例。对渗出型皮损者效果较好。治疗中,须饮食清淡,忌食厚味及辛辣食物。

71329 消风散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】白芷 细辛 荆芥 防风 川椒 全蝎

【用法】上为末。擦患处,以盐水漱,吐之。

【主治】牙疼。

71330 消风散

【方源】《医宗必读》卷六。

【组成】苍术 麻黄 荆芥 白芷 陈皮

各一钱 甘草五分

【用法】上用水一钟半,加生姜三片,葱白一茎,煎八分服。

【主治】四时感冒,发热恶寒,头痛身重。

71331 消风散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】防风 荆芥 羌活 蝉蜕 川芎 藿香 陈皮 甘草 桔梗 僵蚕

【用法】上为末。茶调服。

【主治】小儿生下三朝五日,忽然鼻塞勿乳,不能开口呼吸。

71332 消风散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】当归 生地 何首乌 防风 金银花 僵蚕 荆芥 白蒺藜 苦参 胡麻 知母 甘草

【用法】水煎服。

【功用】消风凉血。

【主治】脓窠疮。小儿肺经有热,脾经有湿,二气交作而发,初起作痒,搔破变作脓窠而疼。

71333 消风散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】防风 杏仁 陈皮 全蝎(糯米炒,去头翅) 陈胆星 白附子 人参 甘草 升麻 干葛 生姜 南枣

【用法】上为末,糊丸如绿豆大。米汤送下。

【主治】小儿肝中风。踞坐目斜视,举头不得,口嘴喎,手足不动。

【备考】若唇青面黄者可治,唇黑面白者不可治。

71334 消风散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】雨茶 甘菊 羌活 石膏 当归 川芎 羚羊角 白芷 荆芥 防风各等分 甘草八分

【用法】加生姜,水煎,食后服。

【主治】妊娠头旋目昏,腮项硬肿,此因胎气有伤,热毒上攻太阳,沉痛欲呕,背项拘

急，致令眼晕生花。

71335 消风散

【方源】《医部全录》卷三七四引叶心仰方。

【组成】川连 黄柏 黄芩 防风 荆芥 梔子 连翘 赤芍 白芍 川芎 陈皮 牛膝 甘草 蒺藜 京子 木瓜 苦参 玄参 羌活 独活 生地 大黄

【用法】水煎服。实者服七八帖，虚者少服。再服对金丸收功。

【主治】久年杨梅漏毒疮。

71336 消风散

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】羌活 独活 僵蚕 防风 天麻 白附 蝉蜕 柴胡 花粉 川芎 人参 炙草

【用法】生姜引。

【主治】痘疮中风。发热之时，腠理开张，或中风邪，忽然直视，张口吐舌，不能言语。

71337 消风散

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】甘菊 荆芥 当归 大豆叶（炒） 防风 茶叶 羚羊角（镑） 生石膏三四分

【主治】胎气伤于热毒，头旋眼花，腮项暴肿成核，痛甚呕吐。

71338 消风散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】人参 防风 川芎 厚朴 南星 半夏 桔梗 肉桂各一钱 当归 黄芩 白芷各二钱 羌活 独活各一钱半 柴胡七分 甘草三分（一方有蝉蜕一钱半，僵蚕二钱）

【用法】加童便煎服。

【主治】跌打损伤。

71339 消风散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地 当归 防风 荆芥 白芷 细辛 蝉蜕 僵蚕 花椒

【主治】风牙痛。不甚肿痛，不怕冷热。

【备考】外用草乌、僵蚕、蜂房（煨）、牙皂研末搽。

71340 消风散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】荆芥 僵蚕 蝉蜕 防风 连翘 甘草

【主治】风热上攻，头目昏痛，鼻嚏声重，皮肤瘙痒。

71341 消风散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】明矾三钱 蛇床子三钱 皮消三钱 桃丹（水飞）一钱五分 白鲜皮三钱 地肤子二钱 羌活各一钱 土荆皮二钱 荆芥一钱 白附子一钱 白芷一钱

【用法】晒脆为细末，用烧酒、醋和搽。

【主治】一切皮肤作痒，或起疙瘩，或破烂流黄水，游散不定。

71342 消风散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】烟胶二斤 苦参二斤 大枫子肉二百粒 小麦（炒黑）八合 明矾半斤 枯矾半斤 花椒半斤 硫黄八两 樟冰四两 升药底一斤 蛇床子半斤 炒红砒一两

【用法】上为末，外用。

【主治】风癬远年者。

71343 消风散

【方源】《马培之医案》。

【组成】荆芥一钱 当归五钱 防风一钱 苦参一钱 白芷八分 川芎五分 甘菊一钱半 蒺藜三钱 浮萍一钱 大胡麻三钱 蔓荆子五钱

【主治】痲风。肺经受毒，身面白斑麻木，汗孔不开，起于面者。

71344 消风散

【方源】《伤科方书》。

【组成】赤芍一钱二分 川芎一钱二分 当归五分 升麻一钱 羌活一钱 陈皮一钱二分 半夏一钱二分 防风七分 南星五分 甘草三分 老姜三片

【用法】水煎服。

【主治】跌打损伤，牙关紧闭。

71345 消风散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】蛇床子三钱 苦参二钱 枯矾一钱 艾叶七个 川椒五分 荆芥一钱半 薄荷一钱

【用法】水煎洗。

【主治】目痒如虫行症。

【备考】凡初期患此症者，先刺三阳络、素髎、内庭等穴；内服当归活血汤。如其不愈，再用本方洗之最妥。

71346 消风膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生草乌 31 克 生南星 31 克 黄柏 31 克 苏木 31 克 白芥子 6 克 五倍子 6 克 生栀子 6 克 干姜 15 克

【用法】先将适量之薯粉煮成糊状，再将上药共研为细末，加入拌匀，即成软膏样，外敷。

【主治】足跟溃疡。

71347 消水汤

【方源】《集成良方三百种》卷下。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 麦冬一两 车前子五钱（布包） 茯苓五钱 北五味二钱 牛膝三钱 刘寄奴三钱

【用法】水煎服。

【主治】燥证干甚，小肠细小，不能出便，胀甚欲死。

71348 消水散

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参三钱 白术五钱 肉桂一钱 附子一钱 甘草一钱 白芍三钱 熟地七钱 山茱萸四钱 良姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】心痛暴亡，因大寒者。

71349 消水膏

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】羊桃根一两（锉） 川大黄一两（锉、生用） 黄芩半两 赤小豆半合 黄柏半两（锉） 绿豆粉半两

【用法】上为粗散。用芸苔菜捣取自然汁，以蜜少许相和，调药令稀稠得所，看白畔肿赤处大小，剪生绢，上匀摊，可厚一钱，贴之，干即换之。

【功用】抽热毒，消肿气。

【主治】小儿痘，毒肿坚硬，疼痛，攻冲四畔焮赤。

71350 消平散

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】川芎 香附各五钱 苍术 苏叶 厚朴各五钱 藿香四钱 砂仁 白芷 陈皮各三钱 炙草 木香各二钱 半夏四钱 麦芽六钱 神曲五钱 山楂一两

【用法】上为细末。凡有停食积滞而腹痛者，一服立止。平常积滞，腹中有块而作痛者，以使君子煎汤调服，打下蛔虫，其痛自安。

【功用】消积，祛风，豁痰，宽胸，快气。

【主治】痘疮，停食积滞而腹痛，或积滞腹中有块而作痛。

71351 消石丸

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】消石一升 干姜 前胡 大黄各一斤 杏仁一升

【用法】上为末，蜜和为丸，如梧桐子大。每服三丸，饮送下，一日二次。五日后心腹诸疾随大小便去。月经绝则通，下长虫数十，亦利血及令热赤白汁。药利以意消息。

【主治】上气咳逆，口干，手足寒，心烦满；积聚，下利呕逆；若坠瘀血，上气，胸胁胀满，少气肠鸣，饱食伤中里急；妇人乳饮滞下，有邪湿，阴不足，大小便不利，肢节皆痛，癥瘕毒。

71352 消石丸

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】消石三分 柴胡 细辛 当归 茯神 芍药 甘遂各二分 大黄十分 黄芩 巴豆三十粒（去皮心，炒） 牛黄（别研） 葶苈子（炒，研）各一分

【用法】上为末，蜜为丸。一岁服胡豆大二丸，每日一次。以微利为度。

【功用】除痢止泻。

【主治】少小痞癖结积。

71353 消石丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】消石一两 川大黄一两半（锉碎，微炒） 巴豆三七枚（去皮心研，纸裹压去油） 附子三分（炮裂，去皮脐） 干姜三分（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】恶疟。心腹痛如锥刀所刺，胀满欲死者。

71354 消石丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】消石半两 柴胡半两（去苗） 细辛一分（洗去苗土） 当归一分（锉，微炒） 川大黄半两（锉碎，微炒） 茯神一分 赤芍药一分 甘遂一分（煨令炒黄） 黄芩半两 木香一分 甜葶苈一分（隔纸炒令紫色） 巴豆十枚（去皮心研，纸裹压去油）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服一岁儿一九，二岁二丸，三岁三丸，四五岁儿可服五丸，并空心以粥饮下。以得快利为度，若未利，明旦再服之。

【主治】小儿腹内痞结，妨闷。

71355 消石丸

【方源】《普济方》卷一〇〇引《指南方》。

【组成】硝石 赤石脂各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】痛夜发者。

71356 消石丸

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】消石半两 丹砂一分

【用法】上为细末，糯米粥为丸，如樱桃大。每服一丸，生糯米汁入油一两点化药，青柳枝打匀服。

【主治】伤寒烦躁，身热谵妄。

71357 消石丸

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】消石（研）三分 葶苈（纸上炒）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食前桑楸枝煎汤下。

【主治】脚气，喘急，咳嗽，浮肿，小肠涩。

【备考】本方原名消石汤，与剂型不符，据《普济方》改。

71358 消石丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】硫黄（别研） 石膏（水飞过，候干略，入甘锅子火煨赤） 天南星各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心食前温酒送下。如未效，加作五十丸。

【主治】肾厥头痛。

71359 消石汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】消石 附子 蛇虫各三两 大黄 细辛 干姜 黄芩各一两 芍药 土瓜根 丹参 代赭 蛭螭各二两 大枣十枚 桃仁二升 牛膝一斤 朴消四两

【用法】上咬咀。以酒五升，水九升渍药一宿，明旦煎取四升，去滓，下朴消、消石烱尽，分四服，相去如炊顷。去病后，食黄鸭羹，勿见风。

【功用】下病，散坚血。

【主治】血瘀。月水留为瘀血，大便不通。

71360 消石汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】消石（碎） 瞿麦穗 葵子 滑石（碎） 甘草（炙，锉） 大黄（锉） 木通（锉） 各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加葱白三寸，煎服七分，入生地黄汁半合，去滓温服，不拘时候。

【主治】小便不通，小腹急痛闷绝。

71361 消石汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】消石（研） 桃仁（去皮尖双仁，研） 大黄（生，锉） 甘草（炙，锉） 各一两 蒲黄一两半 大枣（去核）十枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。利瘀血为效。

【主治】从高坠堕，伤折肢体，瘀血不行，发热肿痛。

71362 消石汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】消石 萆薢 防风（去叉） 黄连（去须，炒） 大黄（锉，炒） 甘草（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 各一两 地榆（锉） 羌活（去芦头） 龙骨 代赭（煨） 桑根白皮（锉，焙） 各一两半 桂（去粗皮） 黄芩（去黑心） 各半两 石韦（去毛）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服。

【主治】乳石发动上攻，头面浮肿。

71363 消石饮

【方源】方出《史记》卷一〇五，名见《医方考》卷六。

【组成】消石

【主治】产后脉躁者。

【方论选录】《医方考》：脉躁，躁属有力故为有余，有余之疾宜攻矣，故用消石，以下其积血。

【临证举例】产后脉躁 菑川王美人，怀子而不乳，来召臣意，臣意往，饮以蓂莢药一撮，以酒饮之，旋乳。臣意复诊其脉，而脉躁，躁者有余病，即饮以消石一剂，出血，血如豆五六枚。

71364 消石散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】消石 泽泻 白薇 芍药 寒水石 瓜蒌各一两

【用法】上为散。每服方寸匕，水送下，日夜各一服。或未通，稍增之。

【功用】止烦，消血，解散。

【主治】金疮，先有散石，烦闷欲死，大小便不通。

71365 消石散

【方源】《颅凶经》卷下。

【组成】消石 大黄 绿豆各等分

【用法】上为末，每用时，随肿大小，取君达根研汁调涂肿上，如有恶物，即看有点子，以膏贴之，四面以散子熨之。若无君达根，即用鸡子白或车前根叶亦得。

【主治】孩儿身上无故肿，但觉肉色赤热。

71366 消石散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】消石 白矾 砒霜各半两

【用法】上为细末，于瓷盒中盛，盐泥固济，候干，炭火中烧令通赤，取出，向地中三日，出火毒，研细如粉。咽喉肿闭处，点少许便破。

【主治】喉痹。热毒气盛，肿痛不己。

71367 消石散

【方源】方出《圣惠》卷六十一，名见《普济方》卷二八七。

【组成】川消石三分 雄黄三分（研细） 白芷三分 白矾三分 玄参三分

【用法】上为细散。用生油和蜜调痛处，干即易之。以肿消为度。

【功用】熨毒散肿。

【主治】痈初结，赤肿热焮急痛。

71368 消石散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】川消石三分 紫檀香半两 甜葶苈一分 莽草一分 白芍药一分 川大黄半两（生用） 白薇半两

【用法】上为细散。以浆水旋调，稀稠得所，涂于肿上，干则易之，以热退肿消为度。

【主治】疮疖初生，热毒始结，疼痛妨闷。

【备考】方中白薇用量原缺，据《普济方》补。

71369 消石散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】消石一两 乳香一分

【用法】上为细散。以鸡子白调涂之。

【主治】小儿一切丹，遍身体热。

71370 消石散

【方源】方出《圣惠》卷九十一，名见《普济方》卷四〇六。

【组成】赤小豆一合 滑石半两 寒水石一分

【用法】上为细末。每用半钱，以冷水调涂患处。一方用猪脂。

【主治】小儿萤火丹。发如灼，初从额起，胁下正赤而多痛。

71371 消石散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】消石 茜草 铅霜各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，冷水调下。

【主治】三消渴疾。

71372 消石散

《圣济总录》卷六十。为《金匱》卷中“消石矾石散”之异名。见该条。

71373 消石散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】消石 蒲黄 青黛 甘草（炙）各等分

【用法】上为细末。干掺口中，津咽下。

【主治】积热喉闭，舌肿口疮。

71374 消石散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】消石（白者）

【用法】上为细末。每服二钱，血淋，山梔仁煎汤调下；热淋，小便赤而淋漓，脐下急痛，新水调下，或黄芩煎汤下；气淋，小腹胀满，尿后常有余沥，木通煎汤下；石淋，茎内痛割，尿不能出，尿中有沙石，令人闷绝，此证将消石用抄纸隔炒，纸焦为度，再研细，蜀葵子三十粒（打开），煎汤调下。

【主治】诸淋。

71375 消石散

【方源】《得效》卷七。

【组成】寒水石 朴消

【用法】上为末。以津润手指，点药敷疮。

立效。

【主治】诸痔。

71376 消石散

《普济方》卷二一四。为《医学纲目》卷十四引《灵苑》“透膈散”之异名。见该条。

71377 消石散

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】消石 人中白各等分 冰片少许

【用法】上为末。用一字吹入鼻中。

【主治】风邪犯脑，头痛不可忍。

71378 消石散

【方源】《新急腹症学》。

【组成】郁金粉二分 白矾末一分五厘 火消粉三分五厘 滑石粉六分 甘草梢一分

【主治】气郁型胆结石。

71379 消石膏

【方源】《外台》卷三十引《近效方》。

【组成】消石一斤 生麻油三升

【用法】上二味，先煎油令黑臭，下消石，缓火煎令如稠汤，膏成，以好瓷器中收贮。以涂贴疮肿，或热发服少许妙。用好酥煎更良。

【主治】一切热疮肿。

【宜忌】忌生血物。

71380 消石膏

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】砒黄半两 消石一两 白矾一两 膩粉一分

【用法】上为细末，用浆水一大盏，调成稀糊，入铛中，以慢火煎，又用冷浆水一升，候沸，即旋添，添尽似干，将出晒干。若来日发，今日初夜，以冷醋汤下一绿豆大，来日早晨再一服。

【主治】疔，往来寒热。

【宜忌】一日内不得食热物。

71381 消石膏

《医方类聚》卷七十八引《御医撮要》。为《圣济总录》卷一一四“麒麟竭丸”之异名。见该条。

71382 消血饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】元胡索 归尾 苏木 桃仁 红花 赤芍 五灵脂 没药

【主治】负重努伤，或有跌仆损伤，或妇人有经来瘀闭，或有产后恶露未尽，皆成死血，痛有定处，脉必芤涩。

71383 消血散

【方源】《外台》卷二十九引《广济方》。

【组成】蒲黄十分 当归 干姜 桂心各八分 大黄十二分 虻虫四分（去足翅，熬）

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹以酒送下，一日二次。渐渐加至匕半。

【主治】①《外台》引《广济方》：从高堕下，内损瘀血。②《圣济总录》：从高坠下，内损吐血。

71384 消污汤

【方源】《一盘珠》卷六。

【组成】干荷叶一枚

【用法】煎汤一碗，空心服。

【主治】妇人血崩。

【加减】腹痛，加香附。

71385 消导汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】厚朴（姜炒） 茯苓 砂仁 山楂 麦芽 神曲各一钱半 陈皮一钱五分 枳实八分 白芥子七分

【用法】生姜为引。

【主治】饮食留滞，胸膈上有一条杠起痛者。

【加减】如胃寒呕逆，加炮干姜一钱；如气滞而痛，加木香、香附；如食积坚硬难化，加槟榔、莪术。

71386 消导饮

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】厚朴 枳实 砂仁 山楂肉 半夏 神曲 槟榔 三棱 蓬术 丁香

【用法】加干姜，水煎服。

【功用】消食理脾。

【主治】小儿饮食过度，伤损脾胃，或饱闷，

或吞酸，或吐泻未愈，而痘随出。

71387 消导饮

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】香附 砂仁 神曲 麦芽 山楂子 干姜 兰草 木香 半夏

【用法】加生姜三片，水煎，温服。

【主治】妊娠饮食所伤，呕吐宿食，呕臭气不可闻，心腹绞痛，脉紧。

71388 消红汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】干葛二钱 玄参一两 当归一两 芍药五钱 升麻一钱 生地一两 麦冬一两 甘草一钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【功用】补阴以制火，凉血以化斑。

【主治】胃火郁极，身不发热，胸胁之间，发出红斑，不啻如绛云一片。

71389 消块丸

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】三棱 莪术 青皮 陈皮 香附 桃仁 红花 灵脂 甘草 牛膝 石碱 黄连 吴茱萸（炒） 益智（炒） 葵根 白术各一钱五分

【用法】碱石汤送下。

【主治】积聚

【加减】皮里膜外多痰，加二陈汤；食块，加山楂。

71390 消块丸

《丹溪心法》卷三。为《千金》卷十一“消石大丸”之异名。见该条。

71391 消芦散

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】茜草一两 金毛狗脊五钱 唐蜜根一两（即紫荆皮根） 芦根二两（去皮）

【用法】上用米醋同药贮小罐内，以厚纸封口极固，放水中煮好，口上开一小孔如箸头大，对肿处熏；若一时未破，加巴豆七粒去壳同人煮，再熏。若破后不能速于收功，吹生肌散。

【主治】喉风。因患者畏刀，以此熏破。

71392 消赤散

【方源】《普济方》卷二七八引《家藏经验方》。

【组成】黄丹一钱(生) 草乌二钱半 牡蛎四钱(火煨) 蛤粉八钱(生)

【用法】上为细末。每用三钱,汲井花水调,用鹅毛扫敷。

【主治】诸疮一时赤肿作痛。

71393 消坚丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】硃砂末 巴豆霜 轻粉各一钱 水银砂子两皂子大 细墨少许 黄明胶(末)五钱

【用法】上为末,面糊为丸,如麻子大。食后倒流水送下,一岁一丸。

【功用】①《小儿药证直诀》:消乳癖,去积。②《普济方》引《全要方》:消痰退热。

【主治】痰热膈实;乳癖。

71394 消坚丸

《百一》卷十五。为《三因》卷七“牡丹丸”之异名。见该条。

71395 消坚汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】当归五钱 白芍五钱 金银花五钱 蒲公英五钱 柴胡二钱 天花粉三钱 炙甘草一钱 全蝎三个(研末) 桔梗一钱五分 鼠粘子一钱五分

【用法】水煎汁一碗,调全蝎末服。十剂自消。如尚未破,四服可消。如日久未破,本方加附子三分,连服数剂亦消。

【主治】马刀挟纓疮。

71396 消坚汤

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】归尾二钱 郁金一钱 乳没各一钱 青皮一钱 僵蚕一钱 香附一钱 木香三分 枳壳一钱 元胡索一钱 泽兰一钱 佛手五分 桂枝三分

【用法】苏木末五分为引,煎服。

【主治】肝痛。左边肋肋肿痛如杯。

71397 消坚散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】归尾 桃仁 厚朴 三棱 莪术 乳香 没药 玄胡索 地栗粉 水红子 蜣螂 建曲

【主治】痞块。

71398 消坚散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】郁金 归尾 玄胡索 木香 青皮 佛手 香附 泽兰 僵蚕 新绛

【主治】肝痛。

71399 消串丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】白芍一两 白术一两 柴胡二钱 天花粉三钱 茯苓五钱 陈皮一钱 附子一片 甘草一钱 蒲公英三钱 紫背天葵五钱

【用法】水煎服。连服八剂而痰块渐消,再服十剂而瘰癧尽化,再服一月全愈。愈后可服六君子汤,以为善后之计,断不再发。

【主治】生痰块于颈项,坚硬如石,久则变成瘰癧,流脓流血,一块未消,一块复长,未几又溃,或耳下,或缺盆,或肩上下,有流出串走之状,故名鼠疮,又名串疮。

【方论选录】此方妙在蒲公英与紫背天葵为消串之神药,然非佐之以白芍、柴胡,则肝木不平,非辅以白术、茯苓,则脾胃之土不健,何以胜攻痰破块之烈哉?惟有攻有补,则调济咸宜,得附子之力,以引群药,直捣中坚,所以能愈宿疾沉痾于旦夕耳。

71400 消余丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】退钳锅一个 牡蛎不以多少(末)

【用法】上以牡蛎末纳在钳锅内,大火煨通赤,放冷,各为细末。每称一两,更入干葛一两,研匀,以鸡子清为丸,如梧桐子大。每服二十丸,猪肉汤送下。

【主治】消渴,小便不禁。

71401 消谷丸

《千金翼》卷十九。为《千金》卷十五“消食丸”之异名。见该条。

71402 消谷丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】陈曲(炒) 木香 人参 干姜(炮) 麝香(研) 甘草(炙, 锉) 枳壳(麸炒, 去瓢) 各等分

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如黄米大。每服二十丸, 温米饮送下。

【主治】小儿宿食不消, 体热多眠, 呕啰气上。

71403 消谷丸

【方源】《鸡峰》卷三十。

【组成】吴茱萸 大麦蘖 神曲(炒) 各等分

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心米饮送下。

【功用】消谷进食。

【主治】脾胃虚冷, 腹胁胀满, 脏腑不调。

71404 消谷丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】肉豆蔻一枚(面裹煨) 槟榔(尖者)一枚 神曲二两(炒) 青橘皮(去白) 京三棱(炮, 切) 陈橘皮(去白) 大麦蘖(炒) 各一两 木香半两

【用法】上为细末, 用汤浸蒸饼为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 食后橘皮汤送下。

【主治】脾胃气弱, 饮食多伤, 胸膈痞闷, 不思饮食。

71405 消谷丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】乌梅肉 川姜(炮、洗) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 各一两 香附子(去毛) 官桂(去粗皮, 不见火) 缩砂仁各三两 益智仁 紫苏叶 茯苓各二两(去皮) 甘草一两半(炙)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三五十丸, 食前熟水送下。

【功用】进饮食, 除宿滞, 破痰实; 常服不损气, 益脾胃, 散宿醒。

71406 消谷丹

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】肉豆蔻(面裹煨) 肉桂(去粗

皮, 不见火) 皂角黄 丁香(不见火) 白茯苓(去皮) 木香(不见火) 诃子肉 白术(麦麸炒) 人参(去芦) 白姜(炮, 洗) 橘红 神曲(炒) 厚朴(姜制一宿, 炒) 麦蘖(炒) 萆薢(洗净) 良姜(炒) 各等分

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如弹子大。每服一丸, 姜汤嚼下。

【功用】去脾脏风湿, 进饮食, 消浮肿。

【加减】有虚寒, 加附子半两(炮, 去皮脐)。

71407 消饮丸

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】干姜 茯苓各三两 白术八两 枳实四枚(炙)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服五丸, 一日三次, 稍加之。

【主治】①《外台》引《深师方》: 酒癖。饮酒停痰水不消, 满逆呕吐, 目视眈眈, 耳聋, 腹中水声。②《直指》: 水饮。

【宜忌】忌桃李、雀肉、大醋、生冷之类。

【加减】若下, 去枳实, 加干姜二两, 名为“五饮丸”。

71408 消饮丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】天南星 半夏 芫花 自然铜各等分(生用)

【用法】上为末, 醋煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服五七丸, 食前温水送下。良久葱粥投之。

【主治】一切积聚, 痰癖, 气块, 及大小结胸, 痛不能仰。

71409 消饮丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【异名】消食丸(原书卷五)。

【组成】白术(炒) 半夏曲各一两 白茯苓(去皮) 吴茱萸(汤泡七次, 炒) 人参(去芦) 枳实(去瓢, 麸炒) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 各半两(别为末)

【用法】上为细末, 将神曲、麦蘖、生姜汁煮糊为丸, 如梧桐子大。每服二三十丸, 食

后姜汤送下。

【主治】腹间虚热。

71410 消饮丸

【方源】《普济方》卷一六五。

【组成】半夏一两（汤洗七次） 陈皮（焙） 青皮（焙） 枳实（去瓢，麸炒） 干葛（焙） 生姜（炒） 各半两

【用法】上为细末，姜糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，茶、酒任下。

【功用】利膈下痰，散饮去滞。

【主治】痰饮。

71411 消饮散

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参 天花粉 茯苓各三钱 枳壳 厚朴各一钱 山楂二十粒 麦冬二两 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】素健饮啖，忽得消渴疾，日饮数斗，食倍面渴数，服消渴药益甚，是脾气之虚热。

71412 消肚丸

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】干姜 木香各一两 巴豆七粒（米醋同二味煮干，去豆） 肉豆蔻半两

【用法】上为末，醋糊为丸，如小豆大。三岁三十丸，食前米汤送下。

【主治】小儿疳气，腹胀喘粗，或肠鸣泄泻。

【加减】消肚急，木香只用一分，去肉豆蔻。

71413 消疔丸

【方源】《华氏医方汇编》卷二。

【异名】神效消疔散、釜墨膏（《青囊秘传》）。

【组成】松香二十两（用桑柴灰煎汁，澄清，入松香煮烂取出，纳冷水中，少时再纳灰水中煮，以色白如玉为度） 百草（取烟煤用，如以别种柴烟煤不验） 铜绿（研细，过绢筛，再研，无声为度） 各五两 乳香 没药（二味去油） 各三两 白蜡二两（切为粗末） 黄蜡十两（刮为粗片） 麻油六两

【用法】择洁净室，先将麻油入锅煎滚，次下松香稍滚，三下白蜡稍滚，四下黄蜡，五

下乳香，六下没药，七下铜绿，八下百草霜，滚过数次，于锅内冷透，搓成条子，为丸如桂圆核大，藏瓷器内。临用以一丸呵软，捻扁贴患处，顷刻止痛，次日肿消即愈。已走黄者贴之，亦霍然。

【主治】疔疮。

【宜忌】贴后忌荤腥、辛辣、沸汤、大热、生冷、发物、面食、豆腐、茄子、黄瓜、酒；忌水洗、恼怒、房事。

71414 消疔丸

【方源】《疡科纲要》卷下。

【异名】消疔丹（《青囊秘传》）。

【组成】明雄黄一两 生锦纹二两 巴豆霜（拣取白肉，纸包压去油净）四钱

【用法】上各为细末，加飞面五六钱，米醋为丸，如凤仙子大。每服五丸至七丸，最重证不过十二丸，不可多用，温开水吞。泄一二次，预备绿豆汤，冷饮数口，即止。小儿痰食实证，发热，大便不通者，每用二三丸，杵细饲之，泄一次即愈。

【主治】疔疮大毒，火焰方张，大便不行者。

【宜忌】虚人、孕妇勿用。

71415 消疔丹

《青囊秘传》。为《疡科纲要》卷下“消疔丸”之异名。见该条。

71416 消疔散

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】鸡一只 雄黄 巴豆

【用法】上捣烂，放膏药上，贴面扎之。立刻能消。

【主治】疔疮。

【备考】方中雄黄、巴豆用量原缺。

71417 消疔散

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】雄黄一钱（研末） 乌梅肉三个（打烂） 蜈蚣二条

【用法】上药共捣烂，涂疔上。根即拔出。

【主治】疔疮。

71418 消疔散

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】细辛 牙皂 硼砂 洋茶上片各等分

【用法】上为末，初起者用泉水调敷。未成可消，已成毒不走散。

【主治】疔毒并一切恶疮肿痛。

71419 消疔散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】斑蝥三钱 蟾酥五分 赤芍六分 血竭五分 麝香二分五厘 梅片二分五厘 全蝎二分五厘 蜈蚣一条 乳香（炙）一钱五分 没药（炙）一钱五分 玄参二分五厘

【用法】上为末。放小膏药内贴之。

【主治】疔疮。

71420 消疔散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】川黄连 川黄柏 大黄各五分 西煤灰一钱 灯心炭四分 梅片一分 荸荠粉二钱 麝香一分

【用法】上为细末。

【主治】疔疮。

71421 消疔散

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】银朱一钱 朱砂一钱 空青一钱 洋樟脑二钱 乳没各一钱 明雄黄 轻粉 蜂窠 磁石 杏仁 番木鳖仁各一钱 蜈蚣二钱 全蝎 斑蝥 巴豆仁各二钱 蟾酥一钱五分 月石 火消 荔枝核各一钱五分 铜绿一钱

【用法】上为末。掺膏药上贴之。

【主治】疔。

71422 消疔散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】苍耳虫三十条 煨人指甲一撮 蜘蛛五只 耳垢一撮 僵蚕一钱 蟾酥二钱 倒挂尘灰一把

【用法】上为细末。每取少许，放小膏药中，贴疔头上，日易一次。

【功用】消疔。

【宜忌】已溃禁用。

71423 消补丸

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】枳壳 槟榔 黄连 黄柏 黄芩 当归 阿胶（炒） 木香各一两

【用法】上为末，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空腹米饮送下，日进二三服。

【功用】安养胎气，消散癥瘕，调经进食。

【主治】妊娠癥瘕痞块，及二者疑似之间者。

71424 消矾丸

【方源】《卫生家宝》卷三。

【组成】白矾 焰消各等分

【用法】上为细末，入锅予内按实，以生茶叶数片盖之，火煨通红，伏火为度，茶叶旋添，直待伏火后却，连锅子入地坑一宿，取出为细末，糯米粥为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三丸，食后、临卧姜汤送下。

【主治】痰涎壅结，咳嗽咽痛。

71425 消矾丸

《魏氏家藏方》卷一。为《卫生总微》卷六“接生如圣丸”之异名。见该条。

71426 消矾散

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】马牙消 白矾各半斤 铅丹一分

【用法】上三味同研，入盒子固济，火烧令红，复湿地一夜，加龙脑半钱匕同研。每服一字匕，甘草汤送下。

【主治】小儿热嗽。

71427 消矾散

《类聚方》。为《金匱》卷中“消石矾石散”之异名。见该条。

71428 消肾丸

【方源】《医方类聚》卷一五七引《经验秘方》。

【组成】山茱萸（去核） 陈皮（去瓤） 青皮（去瓤） 山药 肉桂（不见火） 川楝子（去核） 马蔺花（醋煮妙香） 吴茱萸各二两 木香一两 茴香二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心温酒、盐汤任下。

【主治】小肠气。

71429 消肾丸

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】橘皮(拣净)二两(用巴豆十四粒同炒至黑色,去巴豆,用橘皮炒末二两)

【用法】醋糊为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,渐至五十丸,食前盐、酒汤送下;盐汤亦可。

【主治】肾大小偏坠,疼痛。

71430 消肾丸

【方源】《普济方》卷二四八。

【组成】牵牛半斤(取头末四两,二两炒熟,二两生用) 香附子(净)一两(半两炒,半两生用) 川楝子半两(半炒,半生用)

【用法】上为细末,用大蒜二十个,半煨半生,捣烂为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心葱盐汤送下。取大便三二行,不利再加,如利即减。

【主治】下部肾囊肿胀,攻击疼痛。

【宜忌】忌湿面。

71431 消肾汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】海藻 海带 昆布(俱洗淡) 橘核 桃仁 楝子肉各二钱 木香 白术 茯苓各一钱 玄胡 木通 当归 肉桂 人参各五分 淫羊藿三分 盐 酒各少许

【主治】一切疝气

【备考】本方改为丸剂,名“橘核消肾丸”(见《疡医大全》)。

71432 消乳丹

【方源】《卫生总微》卷十。

【异名】消乳丹(《普济方》卷三九四)。

【组成】丁香 木香 青皮(去瓢炒黄) 肉豆蔻(面裹煨) 牵牛子(炒黄)各半两

【用法】上为末,滴水为丸,如针头大。每服三五丸,乳上沾吮服。

【主治】饮乳过多,呃吐奶瓣不消。

71433 消乳丸

《普济方》卷三九三。为原书同卷引《汤氏宝书》“快膈消食丸”之异名。见该条。

71434 消乳丸

【方源】《婴童百问》卷六。

【组成】香附(炒)一两 甘草(炙) 陈皮各半两 缩砂仁 神曲(炒) 麦蘖(炒)各一两

【用法】上为末,泡雪糕为丸,如黍米大。七岁以上为丸如绿豆大。每服三十丸。食后姜汤送下。

【功用】温中快膈,止呕吐,消乳食。

【主治】小儿伤食不化,呕吐,脉沉者。

71435 消乳丸

《回春》卷七。为原书同卷“消食丸”之异名。见该条。

71436 消乳丹

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】虾蟆十个(烧灰) 木香一两 蓬术一两(炮) 青皮一两(去瓢) 青黛一两 肉豆蔻(面裹煨,去面)一两 膩粉二钱 续随子一分(炒) 麝香少许

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。每服五七丸,乳汁送下,不拘时候。

【功用】磨积化痞。

【主治】小儿伤乳凝滞。

71437 消乳丹

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】丁香 木香 青皮 生肉蔻 三棱 莪术各等分

【用法】上为细末,稀面糊为丸,如麻子大。每服五丸,米饮送下,一日二次。

【主治】乳哺不化,停滞中脘,或作呕恶。

71438 消乳丹

《普济方》卷三九四。为《卫生总微》卷十“消乳丸”之异名。见该条。

71439 消乳汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】四物汤加麦芽二两(炒)

【用法】水煎服。

【主治】无子食乳,欲其消者。

71440 消乳汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】知母八钱 连翘四钱 金银花三

钱 穿山甲二钱 (炒捣) 瓜蒌五钱 (切丝) 丹参四钱 生明乳香四钱 生明没药四钱

【功用】消肿止疼。

【主治】结乳肿疼或成乳痈新起者；一切红肿疮疡。

【临证举证】乳痈 在德州时，有张姓妇，患乳痈，肿疼甚剧，投以此汤，两剂而愈。然犹微有疼时，怱怱其再服一两剂，以消其芥蒂。

71441 消乳饮

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】二陈汤加藿香 麦芽 砂仁 生姜

【主治】小儿恣与乳哺无度，脾弱运化不及，满而溢出，呕吐。

71442 消肿丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】滑石 木通 白术 黑牵牛 (炒) 通脱木 茯苓 茯神 (去木) 半夏 (汤洗去滑) 陈皮各一分 木香半分 瞿麦穗 丁香各半钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，灯心、麦门冬汤送服。

【主治】水肿喘满，小便不利。

71443 消肿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】淡豉二两 (新好者；研) 巴豆一两 (去壳，河水半升煮干，去心，去油取霜) 京山棱 (煨，切) 大戟 (新者) 杏仁 (烧留性，研细) 各半两 五灵脂 (去砂石) 一分

【用法】上为细末，以生面水调，搜和为丸，如绿豆大。每服五丸，食后浓煎桑白皮汤送下。大便秘者，加至十丸；喘息者，用杏仁去皮尖，研细，煎汤送下。

【主治】水气腹胀，小便赤涩，头面、四肢、阴囊皆肿，喘息咳嗽，睡卧不得。

【宜忌】忌甘草三日，并须忌盐、酱、藏淹之物。

71444 消肿丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】人参 当归 大黄 (九蒸过) 各一两 桂心 瞿麦 苏木 白茯苓 葶苈子 广木香各一两四钱 木通五两

【用法】上为末，以木通煎汤为丸。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】血肿。

71445 消肿丹

《类证治裁》卷八。为《兰室秘藏》卷下“消肿汤”之异名。见该条。

71446 消肿汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】消毒汤 (《普济方》卷二七二)、消肿丹 (《类证治裁》卷八)。

【组成】鼠粘子 (炒) 黄连各五分 当归梢 甘草各一钱 瓜蒌根 黄耆各一钱五分 生黄芩 柴胡各二钱 连翘三钱 红花少许

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓稍热，食后服。

【主治】①《兰室秘藏》：马刀疮。②《扶寿精方》：一切无名肿毒并痈疽背瘰。

【宜忌】忌酒、湿面。

71447 消肿汤

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】白术 山梔各五钱 赤茯苓 萝卜子各三钱 葶苈 椒目 苏子各一钱 沉香三分 木香五分

【用法】水煎服。

【主治】水肿喘满，大小便不利。

71448 消肿汤

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】葶苈二钱 椒目一钱 猪苓一钱半 泽泻八分 葱白三根

【用法】上药水煎，并用牵牛末为丸，用本方送下，则大小便俱通。

【主治】水肿喘满，大小便不利。

71449 消肿汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】猪苓 泽泻 木通 车前子 葶苈子各二钱 地骨皮 五加皮 生姜皮 海

金沙 枳壳各一钱

【用法】加灯心三十茎，空心服。

【主治】腰以下肿，小便不利。

71450 消肿汤

【方源】《病科全书》。

【组成】夏枯草三钱 山慈姑二钱（去皮毛） 煅牡蛎二钱 海藻二钱 昆布二钱 生甘草一钱 桔梗二钱 元参三钱 花粉三钱 白芥子二钱

【主治】无名疔，骤然红肿，非色欲所至，即餐膳不谨。

71451 消肿饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】五灵脂 肉桂 川芎 当归各一钱五分 牛膝 青皮各一钱 玄胡索 黑牵牛各二钱

【用法】加生姜五片，水煎，空心服。

【主治】血肿。

71452 消肿散

【方源】《圣惠》卷九十。

【异名】消毒散（《普济方》卷四〇五）。

【组成】川大黄三分 杏仁三分（汤浸去皮，别研） 盐花三分

【用法】上为细散，入杏仁，以新汲水和，稀稠得所。旋取涂疮肿上，干即易之，以效为度。

【主治】小儿疮肿，毒热赤疼痛。

71453 消肿散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】附子（生，去皮脐，锉） 石硫黄（研） 天南星（生）各半两

【用法】上为细散，醋调涂向肿处，干则易之。

【功用】追风毒。

71454 消肿散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引《谭氏殊圣》。

【组成】清泉消石 白龙骨各一两

【用法】上为末，净器盛，铁槽水调一钱，扫涂患处。

【主治】①《幼幼新书》引《谭氏殊圣》，赤流

丹，忽然遍体肿满。②《中国医学大辞典》：骨节疼痛，皮肤周身发肿。

71455 消肿散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】大黄（蜜蒸） 山梔（炒） 甘草（炙） 干葛 橘皮 麻黄（去节，汤） 马牙消 川芎各等分

【用法】上为细末。每服三钱，蜜汤调下。

【主治】水气浮肿，喘呼不得睡，烦热躁扰，渴燥，大小便不利。

71456 消肿散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】郁金 甜葶苈 芒消（别研） 大黄 黄芩各半两 赤小豆一合 伏龙肝二两

【用法】上为细末。以生鸡子肉入蜜少许调，令稀稠得所，涂之，干即再涂。

【主治】风热毒气，上攻头面，或遍身赤肿疼痛。

71457 消肿散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】滑兰皮 大南星 赤小豆 白芷 姜黄各一分 白及半分

【用法】上为细末，酒调敷，或蜜水醋同调敷。

【主治】痈疽。

71458 消肿散

【方源】《医方类聚》卷一七七引《吴氏集验方》。

【组成】天南星二两半 赤小豆二两 草乌二两

【用法】上为末。米醋调涂肿处。

【主治】痈疔肿毒。

71459 消肿散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】白及 白蔹 牙皂 僵蚕 赤豆五倍 雄黄各三钱 南星 半夏 大黄 黄柏 草乌 白芷 贝母 山茨菇 芙蓉叶各五钱 天花粉 牡蛎各一两

【用法】上为末，姜汁、靛青调敷。

【主治】疮疡。

71460 消肿散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】大黄 水仙子 山药 苈根 青露 小赤豆 寒水石 水姜 香蛤粉 花蕊石

【用法】上为末。如干加醋蜜调匀。如疽毒未成，则当头罨之；若已成，四面围之，留一头，用替针膏贴之。

【主治】肿毒，一切疮疖。

71461 消肿散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】蛇头抓 天蓰藤 木虱药 仙人薯 土木香 紫金藤 大小青

【用法】上搗，酒温服，以渣敷之。

【主治】蛇咬，蛇节疔，蛇腹疔，蛇头疔，蛇背疔。

71462 消肿散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】乳香一钱 白及一钱 火丹草一钱

【用法】上各为末。羊脂调涂。

【主治】野火丹。

71463 消肿散

【方源】方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷二。

【组成】小茴香（炒） 山甲（炒） 全蝎（炒） 木香各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒调下。

【主治】疝气，外肾肿大。

71464 消肿散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】槐花（烧酒略炮，晒干） 牛膝 木瓜各三钱

【用法】上为末。每服二钱，黄酒送下。

【主治】腿肿痛。

71465 消肿散

【方源】《病科全书》。

【组成】生南星五钱 生半夏五钱 生草乌五钱 润竹五钱 生甘草三钱 细辛五钱 重楼一两

【用法】上为细末。烧酒调敷。

【主治】童子疔，证属寒痰所致者。

71466 消肿散

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】黄柏五两 姜黄三两 大黄三两 苍术五两 陈皮 香附 透骨草 败血草各三两 甘草一两

【用法】上为细末。青肿，用酒、醋调敷；灼痛，用水蜜调敷。

【主治】伤后血肿，发热疼痛。

71467 消肿散

【方源】《中医伤科学》。

【组成】制乳香 1 份 制没药 1 份 玉带草 1 份 四块瓦 1 份 洞青叶 1 份 虎杖 1 份 五香血藤 1 份 天花粉 2 份 生甘草 2 份 叶下花 2 份 叶上花 2 份 蜈蚣 2 份 大黄粉 2 份 黄芩 2 份 五爪龙 2 份 白及粉 2 份 红花 1 份 苏木粉 2 份 龙胆草 1 份 土黄连 1 份 飞龙掌血 2 份 绿葡萄根 1 份 大红袍 1 份 凡士林适量

【用法】上为末混和，用适量凡士林调煮成膏。外敷患处。

【功用】消瘀退肿止痛。

【主治】各种闭合性损伤肿痛。

71468 消肿膏

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷二八六。

【组成】鸡子一枚 新出狗屎如鸡子大

【用法】上二味搅调和。微火熬令稀稠得所，捻作饼子，于肿头坚处贴之，以纸贴上，以帛抹之。时时看之，觉饼子热即易，勿令转动及歇气，经一宿定。如多日患者，三日贴之，一日一易，至愈。

【主治】痈肿发背初作，及经十日以上，肿赤焮热，毒气盛，日夜疼痛，百药不效。

71469 消肿膏

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】生乌麻油 铅丹（研） 黄蜡各四两 熊脂 松脂各一两 水银 硫黄（研） 芒消（研）各半两

【用法】上取五月四日早，于净室中用银石器炭火上微煎至初五日早，勿令息火，膏成，看疮肿大小，以故帛摊贴之。未作脓便消。腊月腊日合亦良，其水银、熊脂于掌中研，入诸药。

【主治】发背痈疽，一切恶疮。

71470 消肿膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉叶 紫金皮各五两 白芷 当归 骨碎补 独活 何首乌 南星各三两 橙橘叶 赤芍药各二两 石菖蒲 肉桂各五钱

【用法】上为末，以热酒姜汁调，乘热缚肿，用葱汁茶清调和，温缚。

【主治】胸胁跌堕，打扑损伤肿痛，或动筋折骨。

【加减】动筋折骨，加山樟子叶、毛银藤皮及叶各五两，同前为末，酒调暖敷缚。

71471 消肿丸

【方源】《普济方》卷三九三引《全婴方》。

【组成】半夏 枳壳各半两 巴豆二七粒（同上炒黄去豆）

【用法】上为末，糊丸如小豆大。三岁三十丸，陈皮汤送下。

【主治】小儿腹急，并心下满。

71472 消肿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【异名】小槟榔丸（《得效》卷六）。

【组成】木香 槟榔 黑牵牛子（炒） 萝卜子（微炒）各等分

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎生姜、萝卜汤送下。

【功用】快气宽中，除腹胀，消宿食。

71473 消肿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】法曲四两（焙） 干葛二两 肉桂（去粗皮）一两 麝仁三十粒 巴豆二十五粒（去皮油，生用） 陈橘皮（去白）一两 槟榔半两 木香一两 缩砂仁一两 黑牵牛一升（用无灰酒半升浸一宿，取出焙干）

【用法】上为细末，用獭猪肚一枚，净洗，将牵牛盛在内，用无灰酒五升，慢火煮之，酒尽肚烂取出，于臼中捣极烂，和前药末一处，杵为丸，如绿豆大。每服五十丸，空心、日午、临卧温酒送下。

【功用】推气退肿。

【主治】蛊胀。

【备考】本方方名，《普济方》引作“木香丸”。

71474 消肿丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】陈仓米二两 蓬术 三棱 香附子各一两半（醋煮，焙） 干姜（炮）五钱 巴豆四十九粒（与米同炒黄色，裹一宿，去豆） 青皮 陈皮各一两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，姜汤送下。

【主治】胀满。

71475 消肿丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】木香 茯苓 厚朴（制）各一两 大黄 泽泻一两半 滑石 黑牵牛末各六两

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤送下。

【主治】胀满。

【备考】方中大黄用量原缺。

71476 消肿丹

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术三钱 茯苓一两 麦冬五钱 熟地五钱 山药一两 芡实五钱 苏子一钱

【用法】水煎服。一剂而喘少定，二剂而胀渐消，十剂而小便利，二十剂而一身之肿无不尽愈也。

【主治】肺、脾、肾三经之虚，气喘作胀，腹肿，小便不利，大便亦溏，渐渐一身俱肿。

【方论选录】方中白术、茯苓以健其脾土，麦冬、苏子以益其肺金，熟地、山药、芡实以滋其肾水，自然脾气旺而不至健运之失职，肺气旺而不至治节之不行，肾气旺而不至关门之不开，水自从膀胱之府而尽出于小肠矣，

安得而再胀哉!

71477 消胀散

【方源】《回春》卷七。

【组成】萝卜子(炒) 苏梗 干葛 陈皮 枳壳各等分 甘草少许

【用法】上锉。水煎服。

【主治】小儿腹胀。

【加减】食少者，加白术。

71478 消症饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】鲜首乌五钱(打碎) 白甘葛二钱 甘草 细茶各一钱

【用法】阴阳水慢火煎一伏时，露一宿，清晨服。

【主治】三日久症。

71479 消疝丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】金铃子(去核，炒黄) 赤朴儿(焙) 茴香(炒)各二两 肉桂(去粗皮)半两 甜瓜子(微炒)一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】寒在下焦，脐腹牵痛，膀胱重坠，久而不愈，渐至肿大，甚者生疮，时有脓汁，焮硬赤痛，不可忍者。

71480 消疝丸

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】苍术二两 茴香(盐炒) 玄胡各一两 牵牛半两(盐炒) 木香一钱 川楝半两(用巴豆二七，不要碎，炒黑，不用豆)

【用法】上为末，酒糊为丸。一半用酒送下，一半病发时酒调送下。

【主治】诸疝。

71481 消疝丸

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《医方集略》。

【组成】苍术一斤(泔浸，切片) 葱白一斤(切，和盐一两同炒黄，去葱) 川椒(微炒) 白茯苓 茴香(炒)各四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十至七十丸，空心温酒送下。

【主治】小肠疝气。

71482 消疝丸

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】橘核(盐炒) 藿香各一两 大茴荔枝核(炒) 青皮(醋炒) 陈皮各五钱 沉香二钱 硫黄三钱(火酒煮)

【用法】上为末，酒糊为丸。每服七十丸，空心温酒盐汤送下。

【主治】疝气偏坠。

71483 消疝丹

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】白术 荔枝核(炒) 山楂 小茴香(炒，研) 槟榔 木通 猪苓 岗橘子 昆布 白茯苓 海藻 官桂 泽泻 川楝子各等分

【用法】水二钟，煎一钟，食前洗浴温服。

【主治】小肠疝气。

【加减】如房劳肾虚，加人参五分。

71484 消疝散

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】苍术(炒)半两 木通半两 黄柏半两(炒) 青皮(炒)半两 厚朴(炒)半两

【用法】上为末。每服二钱，陈皮泡汤送下。

【主治】湿热疝痛。

71485 消炉散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】制过甘石(浮水炉甘石不拘多少，煨红童便淬七次，焙干，研极细末，水飞三次。再用羌活、防风、蔓荆子、川芎、白芷、川连、黄芩、菊花各等分煎浓汁，将甘石末拌透，晒干听用)一钱 火消三分 顶上四六冰片一分

【用法】搽匀点睛。内服加味导赤散。

【主治】赘肉拔睛。眼大角长肉一块及黑珠。

71486 消炉散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】煅甘石五钱（水飞） 大消五钱
硃砂三分 梅片三分

【用法】上为极细末。每晚点一次。先刺睛明一穴，外点消炉散。

【主治】胬肉攀睛。

71487 消炎丸

【方源】《外伤科学》。

【组成】牛黄 丁香 朱砂 蟾酥 百草霜各等分

【用法】制成丸剂。每次四粒，一日二至三次；儿童减半，婴儿服成人三分之一。外用醋调涂患处。

【功用】解毒，消炎。

【主治】脓疱疮。

71488 消炎散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】硼酸三钱 白矾一钱 梅片二分

【用法】水冲洗翳，一日三次。

【功用】消炎退赤。

【主治】五脏积热，肝火旺盛，上攻子头目，头痛目胀，风轮高起，左目旋螺突出，疼痛不已，热泪常流，惟厥阴弦紧。

71489 消炎散

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】芙蓉叶 大黄各十两 黄芩 黄连 黄柏 泽兰叶各八两 冰片三钱

【用法】上为细末。用黄酒或葱酒煎调敷，调成麻酱稠度，按照炎症范围和脓肿大小，摊于油纸上或塑料布上约 0.3~0.4 厘米厚，敷于患处，外加纱布敷盖固定。每日调换一至二次。在形成良好的包块后外敷消结膏。

【主治】腹膜炎和阑尾脓肿急性炎症期。

71490 消炎膏

【方源】《外科十三方考》。

【组成】飞滑石十两 硼砂一两五钱 龙骨二两 川贝三钱 冰片五钱 麝香五分

【用法】上为末，用凡士林制成 15% 软膏。外敷患处。

【主治】痔疮。

71491 消河饼

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】大田螺四个 大蒜（去皮）五个 车前子三钱（为末）

【用法】上研成饼，贴脐中，以手帕缚之。贴药后少顷，小便出，一二饼即愈。

【主治】①《古今医鉴》：水肿膨胀。②《惠直堂方》：水肿，小便闭淋。

71492 消实汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】枳壳五分 白术一钱 陈皮五分 茯苓三钱 甘草一钱 山楂十粒 柴胡一钱 白药三钱 炒栀子一钱

【用法】水煎服。

【主治】气实。

71493 消毒丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】五倍子 马牙消各一两 甘草三分（生，锉） 蓬砂 白矾（熬令汁枯） 升麻马勃各半两 丹砂（研） 麝香（研） 龙脑（研） 各一分

【用法】上为末，糯米饭为丸，如鸡头子大。每服一丸，含化，不拘时候。

【功用】化涎生津。

【主治】脾胃毒热上攻，咽喉肿痛。

71494 消毒丸

《三因》卷五。为《鸡峰》卷五“消毒黄龙丸”之异名。见该条。

71495 消毒丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】白僵蚕（炒去丝嘴） 牛蒡子（微炒） 各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十五丸。每服一丸，食后含化。

【主治】喉痹口疮，腮颊肿痛。

71496 消毒丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄耆一两半（蜜涂，慢火炙） 荆芥穗一两 枳壳三两（汤浸去瓢，切作片子，麸炒黄色） 薄荷叶（去土）半两 皂角子仁一两（炒令香熟） 槐花一两（炒赤） 蜗

牛十四枚(炙,去壳,焙干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五、七十丸,食后茶清送下。

【功用】消毒定痛。

【主治】肠风外痔,结核,或痒或痛。

71497 消毒丸

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】消毒僵黄丸(《杏苑》卷三)。

【组成】大黄 牡蛎(烧) 僵蚕(炒) 各一两

【用法】上为末,蜜为丸,如弹子大。每服一丸,新汲水化下,不拘时候。

【主治】时疫疮瘡恶证。

【方论选录】《医方考》:《内经》:陷脉为痿,留连肉腠。谓阳毒乘脉之虚而陷入之,便壅结而为痿核,留连于肉腠之间,正此疫毒疮瘡之谓也。苦能下热,故用大黄;咸能软坚,故用僵蚕、牡蛎。

71498 消毒丸

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】白丁香二钱 黄丹一钱 巴豆一钱

【用法】上为细末,水打面糊为丸,如萝卜子大。每服三四丸,八时筵丹二三丸,冷水送下。

【主治】疔疮。

71499 消毒丹

【方源】《解围元藪》卷四。

【异名】太白散。

【组成】明矾十两 白矾五钱 蛇床子七合(炒) 硫黄五两 海螵蛸五两

【用法】上为末。先将矾、矾渐掺入锅内,俟矾化枯收起,又将些掺下,如此待枯尽,方同下三味,和研细。

【主治】牛皮血癬疮。

【加减】如血风臭秽成片,湿肿黄水淋漓,或脓血粘渍太重,加核桃壳灰一两,以菜油调涂。

71500 消毒丹

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】朱砂

【用法】上先研为末,次用磁石引去铁屑,然后研为极细末。蜂蜜和水调匀服。二岁以下,可服三四分;五岁以下,可服六七分;十岁以下,可服八九分。

【主治】小儿痘疮疹子,不问已出未出。

71501 消毒汤

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】独活 防风 细辛 藁本 川芎 枸杞子 荆芥 漏芦 大黄 黄芩(去腐) 官桂 苦参 威灵仙 丹参 黄耆 当归 芍药 茯苓 黄连 无心草 黄柏 麻黄 葛根 蒺藜 菊花 杜仲 地骨皮 秦皮 茵陈 甘草 甘松 藿香 白芷 露蜂房 升麻 零陵香各一两 苍术三两 朴消五两 菖蒲八两

【用法】上为粗末。每用药半两,水二升,加葱三茎,槐、柳枝各一握,同煎十余沸,去滓,热淋洗浴。

【主治】百杂疮肿。

71502 消毒汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】升麻根 羌活 藁本 细辛 柴胡 葛根 黄芩(酒炒) 生地黄 黄连 黄柏 连翘 红花 当归 苏木 白术 苍术 陈皮 吴茱萸 防风 甘草

【主治】丹疹。

71503 消毒汤

【方源】《东医宝鉴》卷十一引《丹溪心法》。

【组成】赤芍药 连翘各一钱 甘草节 桔梗各五分 贝母 忍冬草 白芷 瓜蒌根各三分

【用法】锉作一帖,水煎服。

【主治】痘毒流注脉络,发为结核疮疖,甚者头面、胸胁、手足、肢节焮肿作痛。

71504 消毒汤

《普济方》卷二七二。为《兰室秘藏》卷下“消肿汤”之异名。见该条。

71505 消毒汤

《袖珍》卷三。即《普济方》卷二七五引《德生

堂方》“紫花地丁散”。见该条。

71506 消毒汤

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】防风 荆芥 牛子 首乌 甘草

【用法】肿毒在上，用升麻引；毒在于下，用牛膝引；在手，用桂枝引。

【主治】痘后余毒痘疔，肿者。

【加减】痛加乳香、没药、白芷。

71507 消毒饮

《易简》。为《局方》卷十“消毒散”之异名。见该条。

71508 消毒饮

【方源】《得效》卷十六。

【异名】加味荆黄汤（《医学入门》卷七）。

【组成】大黄半两（煨） 牛蒡子一分（炒） 甘草一分 荆芥半两

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后温服。

【主治】肝壅瘀血，两脸上下初生如粟米大，渐渐大如米粒，或赤或白，不甚疼痛，坚硬者。

71509 消毒饮

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】黄芩 黄连各半两 连翘一钱 陈皮 玄参各三钱 甘草 黍粘子 板蓝根 马勃各一钱 人参 僵蚕各一钱 桔梗三钱 升麻七钱 柴胡五钱 薄荷 川芎各五钱

【用法】水煎服。

【主治】疫疔时毒。

【加减】便硬，加大黄。

71510 消毒饮

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】消毒散（《万氏家抄方》卷四）。

【组成】皂角刺 金银花 防风 当归 大黄 甘草节 瓜蒌仁各等分

【用法】上咬咀。水、酒各半煎，食前温服。仍频提掣顶中发，立效。

【主治】便毒初发。

71511 消毒饮

《医方类聚》卷二六五引《经验良方》。为原

书同卷“鼠粘子汤”之异名。见该条。

71512 消毒饮

《奇效良方》卷六十二。为《圣济总录》卷一二〇“消毒散”之异名。见该条。

71513 消毒饮

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】六味消毒饮（《景岳全书》卷六十三）。

【组成】牛蒡子 连翘 甘草 绿升麻 山豆根 紫草各等分

【用法】上锉细片。水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】解痘毒。

【主治】①《准绳·幼科》：痘疮密则毒甚。②《痘科类编释意》：痘正出长时，气粗息重，兼内热者。

71514 消毒饮

【方源】《直指附遗》卷二十四。

【组成】牛蒡子（炒，研）三两 荆芥穗五钱 甘草（炙）一两 防风 升麻各七钱半 犀角三钱 麦门冬 桔梗各五钱（一方加朴消二钱）

【用法】上咬咀。每服一二钱，水煎服。

【主治】赤丹，火丹，紫蒞丹。

71515 消毒饮

《保婴撮要》卷十七。为《卫生总微》卷八引《千金》“消毒散”之异名。见该条。

71516 消毒饮

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】人参 甘草 黄连 牛蒡子各二钱

【用法】上为粗末。每服一钱，加生姜一片，水一盏，煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痘热盛，毒气壅遏。

71517 消毒饮

【方源】《医便》卷四。

【组成】荆芥（去根）一钱 连翘三钱 牛蒡子（炒，研）三钱 防风（去芦）甘草（生）各五分 犀角二分（另磨入）

【用法】上作一服。水煎，热服。

【主治】斑疹热甚紫黑者；或痘未出时。

71518 消毒饮

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】人参 紫苏 前胡 川芎 黄芩 桔梗 羌活 独活 枳壳 茯苓 甘草 防风 赤芍

【用法】水煎服。

【主治】肩疽。

71519 消毒饮

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】归尾 粉草 熟大黄 黑丑（捣碎）各三钱 僵蚕 贝母各二钱

【用法】用水、酒各一大钟，煎八分，空腹服。渣煎七分服。

【主治】便毒单生肿硬，大作痛者。

71520 消毒饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归 白芷 青皮（炒） 天花粉 贝母 柴胡 僵蚕（炒） 银花各三钱

【用法】上锉一剂。水煎服。先服人参败毒一二剂，方可服此药。如无前证，即服本方二三剂，或肿不消，宜服托里药。

【主治】吹乳、乳痈，憎寒壮热头痛者。

71521 消毒饮

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】羌活 防风 黄芩 连翘（去心格） 桔梗 甘草 人参 川芎 当归 柴胡

【用法】水煎服。外用敷毒散。

【主治】耳旁热毒赤肿者。

71522 消毒饮

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】防风 元参 连翘 牛蒡子 荆芥 桔梗 知母 山梔仁 甘草

【主治】咽喉肿痛，上膈热甚。

71523 消毒饮

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】当归 川芎 生地 赤芍 连翘 山梔 黄连 甘草

【用法】水煎服。

【主治】热客心脾，熏逼上焦而成口疮，或疳生走马，甚致齿龈黑烂，腮颊穿破。

71524 消毒饮

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】起痔汤去芒消

【用法】每日煎水洗三次，上生肌散三次。十日内全愈。

【主治】痔瘕，四下根裂开。

71525 消毒饮

【方源】《准绳·疡医》卷四。

【组成】木鳖子 大黄 瓜蒌 桃仁 草龙胆

【用法】上咬咀。浓煎，露一宿，清晨温服。

【主治】便毒初发。

71526 消毒饮

【方源】《痧痘集解》卷六引《准绳》。

【组成】牛蒡 甘草 木通 茯苓 生地 红花 犀角 芍药 连翘 灯心

【主治】①《痧痘集解》：血热毒壅，心火炽盛，痘色红紫，烦躁闷乱，小便不通，渴欲饮水等热症。②《医钞类编》：痘疗。

71527 消毒饮

【方源】《疹科正传》。

【组成】银花 连翘 生地 甘草 粘子 防风 荆芥 当归 丹皮 赤芍 木通

【主治】疹后余毒未尽，或因发汗过迟，以致蕴热未散，发为疮疥。

【加减】上部疮多，加川芎、桔梗；下部多者，加牛膝、黄柏；中部多者，加黄芩、白芷；四肢多者，加防风、桑枝。

71528 消毒饮

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】大黄看人虚实酌用 白芷 贝母 牡蛎 瓜蒌仁 当归各一钱 甘草四分 金银花 山梔仁各七分

【用法】上咬咀。水煎熟，空心服。

【主治】疮毒坚大者；便毒或单生或双生。

【加减】便毒已溃有脓，去大黄，加黄耆。

71529 消毒饮

【方源】《玉案》卷二。

【组成】香薷 川黄连 远志肉各一钱 石膏 麦门冬各一钱二分 北五味二十一粒 生甘草 茯神各八分

【用法】水二钟，加灯心三十茎，煎服。

【主治】暑毒入内，心中烦躁，睡卧不宁，精神恍惚。

71530 消毒饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】郁金 天花粉 干葛各一钱二分 甘草 赤芍各八分

【用法】加灯心二十茎，煎服，不拘时候。

【主治】五种丹毒。

71531 消毒饮

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】川芎 当归 桔梗 前胡 青皮 牛蒡 红花 蝉蜕 紫草 茯苓

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，色若胭脂，连片不起。

71532 消毒饮

【方源】《痘疹仁端录》卷十六。

【组成】麻黄（蜜、酒拌炒） 黄连 黄芩 黄柏 山梔 蝉退 红花 大黄

【用法】加灯心一钱，竹叶十片，水煎服。

【主治】麻疹欲出不出，壮热烦躁，舌焦唇烂。

【加减】如无舌苔，去大黄，以防后变；咳嗽，加杏仁、桔梗。

71533 消毒饮

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】蒲公英 紫花地丁各一钱二分 当归（酒洗） 白芍（醋炒） 赤芍 丹皮 地骨皮 天花粉各一钱 陈皮八分 生草三分 灯心五十寸

【用法】上用水三钟，煎一钟，食后服。仍以槐、艾叶水不时洗之。

【主治】乳房或乳头黑晕之内肿毒未破，发热恶寒，疮处或痛，或不痛，或麻木。

71534 消毒饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】荆芥 牛子各二钱 连翘 木通

各一钱 甘草 枳壳各八分 桔梗二分

【主治】痘已出，上焦壅热，胸膈不快。

71535 消毒饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】防风 荆芥 甘草 牛蒡 连翘 金银花

【用法】水煎服。

【主治】痘后疮毒。

71536 消毒饮

【方源】《一盘珠》卷五。

【组成】白芷（尾） 赤芍（尾） 归尾 苦参 川山甲 天丁 黄柏 丹皮 海桐皮 海石 黄芩 内红（消） 大黄 甘草 金银花 乳香 没药

【用法】水煎，入酒一盞服。以消为度。

【主治】一切恶毒，或红，或紫，或坚硬不破。

71537 消毒饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】大黄 麻黄 黄耆 陈皮 蝉退 各四两

【用法】用猪肉一斤四两，分作六块，酒、水各六碗，煎至六碗，每日食肉一块，汤一碗，分作六日吃。

【主治】杨梅疮。

71538 消毒饮

【方源】《外科集腋》卷三。

【组成】黄连 连翘 山梔 黄芩 木通 荆芥 薄荷 牛蒡子 犀角 甘草

【主治】重舌、木舌、紫舌，一切热毒。

71539 消毒饮

【方源】《履霜集》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 山楂 连翘（去瓢）各四分 前胡二分（去皮） 木通二分（去皮） 甘草一钱

【用法】水一盞，加灯心十根，煎三分，不拘时服。

【主治】热盛痘多。

71540 消毒饮

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】荆芥 防风 桔梗 枳壳 牛蒡子 升麻 苏叶 甘草 石膏

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿痘后余毒未尽，更兼不戒口腹，外感风寒，以致遍身出疹，色赤作痒，始如粟米，渐成云片。

71541 消毒饮

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】羌活 防风 黄芩 白芷各一钱五分 黄连 射干各一钱 玄参一钱五分 甘草一钱

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】大头瘟时疫，憎寒壮热，头面颈项俱肿，目不能开，口干舌燥。

【加减】如有痰，加竹沥，姜汁各半酒杯服；大便热结者，加生大黄三钱；小便赤涩，加泽泻、木通各一钱五分。

71542 消毒饮

《吉人集验方》下集。为《金鉴》卷七十二“五味消毒饮”之异名。见该条。

71543 消毒饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大黄四钱 黄芩三钱 黄柏三钱 木通三钱 牛蒡子三钱(炒) 大贝三钱 银花一两 胆草三钱 花粉三钱 甘草一钱 蒲公英五钱 全蝎五个

【用法】水煎服。

【主治】脾经湿热，肝火旺盛，眼胞肿胀坚硬，气轮之上起红泡，热泪长流。

71544 消毒散

【方源】《卫生总微》卷八引《千金》。

【异名】消毒饮(《保婴撮要》卷十七)、荆防消毒饮(《痘疹仁端录》卷四)。

【组成】牛蒡子二两(炒，纸衬) 甘草半两(锉，炒) 荆芥穗一两 防风一两

【用法】上为粗末。每服一大钱，水一盞，煎至五分，去滓温服。

【主治】外犯风寒，痘疹、麻疹出而不畅，咽喉肿痛。

①《卫生总微》：痘疹已未出，咽喉肿痛。②

《保婴撮要》：痘疮，大便不通。③《医学正传》：疮发身痛。④《寿世保元》：麻疹既出，一日而又没者，为风寒所冲，麻毒内攻。⑤《仁端录》：痘后将发痼毒。

【宜忌】下利者，不可与服。

【方论选录】《医方考》：牛蒡子疏喉中风壅之痰，荆芥穗清膈间风壅之热，生甘草缓喉中风壅之气，乃防风者，散诸风不去之邪也。

71545 消毒散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】大青 栀子仁 葛根(锉) 川朴消各二两

【用法】上为粗散。每服五钱，用水一大盞，入豉五十粒，煎至五分，去滓，下地黄汁半合，更煎三两沸，温服，不拘时候。

【主治】时气五日未解，壮热，心神烦躁。

71546 消毒散

【方源】《普济方》卷二七八引《圣惠》。

【组成】天南星 郁金 木鳖子(去壳) 草乌头 赤小豆 朴消(研细旋入)各等分(并生用)

【用法】上为细末。如肿赤色，用冷水调敷肿四畔，如不赤，温淡醋调敷。

【主治】一切肿毒，及肿而疼痛者。

71547 消毒散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】当归 甘草 大黄各五钱 金银花少许

【用法】上咬咀。水、酒各一盞，煎至一盞，去滓，露一宿，温服。

【主治】便毒。

71548 消毒散

【方源】《局方》卷十。

【异名】消毒饮(《易简》)、三味消毒散(《疮疡经验全书》卷八)、三味消毒饮(《麻科活人》卷二)、解毒三贤饮(《疡医大全》卷三十三)。

【组成】牛蒡子(煨)六两 荆芥穗一两 甘草(炙)二两

【用法】上为粗末。每服一钱，用水一盞，煎七分，去滓，食后温服。

【主治】疮疹壮热出而不快；上膈壅热，咽喉肿痛，口舌生疮。

①《局方》：小儿疮疹已出，未能匀透，及毒气壅遏，虽出不快，壮热狂躁，咽膈壅塞，睡卧不安，大便秘涩。及大人小儿上膈壅热，咽喉肿痛，胸膈不利。②《活幼心书》：小儿急惊风毒，赤紫丹瘤，咽喉肿痛，九道有血妄行及遍身疮疥。③《便览》：口舌生疮，牙根臭烂。

【宜忌】若大便利者，不宜服之。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“必胜散”。

71549 消毒散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【异名】消毒饮（《奇效良方》卷六十二）。

【组成】晚蚕蛾 五倍子 密佗僧各等分

【用法】上为散。每用少许掺贴。

【主治】①《圣济总录》：唇口并齿龈有疮肿，疼痛臭气，及一切恶疮。②《普济方》引《医方集成》：两唇肿裂。

71550 消毒散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】皂荚子五百枚（慢火炒裂） 薄荷（干者）二两 槟榔（锉）半两 甘草（炙，锉） 连翘各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧米饮调下；腊茶调亦得。

【主治】毒气项下结核，或为瘤者。

71551 消毒散

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】藜芦 大黄（锉，炒） 黄柏（去粗皮） 黄连 当归 甘草各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。以水一斗，煮至五升，去滓，浸淋疮处。即愈。

【主治】①《圣济总录》：瘰疬炽甚。②《疮疡经验全书》：十指赤痛面痒。

【备考】《疮疡经验全书》无当归。

71552 消毒散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】车螯一个（可盛二两消者） 朴消二两

【用法】上以消入车螯内，湿纸裹，黄泥固济，麻皮缠之，煅赤候冷去泥，同研如面。将绢铺地，薄摊药末于上，盆盖一食久。加乳香、地龙末各一分，白僵蚕、甘草末各半分和匀。每服半两，酒调去滓服，能饮酒者多与之。其滓涂患处一食久，即转下恶物。只两服或消，或破。别服补药。

【主治】发背欲结不结，四肢寒热。

71553 消毒散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引《医方妙选》。

【组成】川升麻 黄芩各半两 麦门冬（去心） 川大黄（锉碎，微炒） 川朴消各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】诸丹赤流，初发甚者。

71554 消毒散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】丁香 乳香各一钱 蝉壳 贯仲 紫花地丁各半两

【用法】上为细末。温酒调下。

【主治】疔疮毒气入腹，昏闷不食。

71555 消毒散

【方源】方出《百一》卷十六引周才传，名见《普济方》卷二八六。

【组成】赤土一皂子大 木鳖子七个（炮，去皮）

【用法】上为末，分三服。食后热酒或米饮调下。不动脏腑，不过一剂即效。

【主治】男子肾痛，妇人乳痛，一切赤肿嫩毒。

71556 消毒散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】当归 荆芥 甘草各等分

【用法】上为末。每服三五钱，水煎，去滓，热漱之。

【主治】喉肿。

71557 消毒散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】当归 白芷 甘草（生） 赤小豆

紫草茸各半两 贝母一两

【用法】上为末。每服二钱半，水、酒煎服，一日二次。

【主治】痈疽恶毒。

71558 消毒散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黄芩 黄柏各一两 大黄（生用）半两

【用法】上为细末。每用生蜜水调药如稀稠糊，摊在绯绢花子上，随目赤左右贴于太阳穴，如干，用温水频润。

【主治】眼赤肿，疼痛不定；兼治疮肿不消。

71559 消毒散

【方源】《走马急疳方》。

【组成】朴消一两 薄荷二两半 山梔一两七钱 黄芩一两半 甘草四两五钱 大黄一两三钱 连翘三两

【用法】上药各制过，为细末。

【主治】湿毒口疳。

71560 消毒散

【方源】《施圆端效方》引洛州张孔目方（见《医方类聚》卷一七九）。

【组成】大黄 牙消 青黛各等分

【用法】上为细末。水调，鸦翎扫。立消。

【主治】疮瘡肿毒。

71561 消毒散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】滑石一斤 黄柏二两 黄丹一两 乳香五钱 轻粉三钱

【用法】上为细末。每用干掺，或烧汤。及下注脓疮、风湿疥癣等疮，油调涂之。

【功用】生肌止痛，消毒散肿。

【主治】诸恶疮，脓疮，疥癣。

71562 消毒散

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】大黄 黄连各半钱 地骨皮一两 朴消三钱

【用法】上为粗末。每用三钱，水一大盏，煎至七分，去滓，冷用，鸡翎扫于疮肿处。

【主治】恶疮，赤肿瘤。

【备考】《医方类聚》引《疮科通玄论》有巴豆一两。

71563 消毒散

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】大力子 黄芩 连翘 大黄 升麻 玄参各等分

【用法】每服三五钱，水煎，去滓服，不拘时候。

【主治】诸疮毒肿。

71564 消毒散

《普济方》卷四〇五。为《圣惠》卷九十“消肿散”之异名。见该条。

71565 消毒散

《普济方》卷四〇六。为《圣惠》卷九十一“升麻散”之异名。见该条。

71566 消毒散

《万氏家抄方》卷四。为《丹溪心法》卷五“消毒饮”之异名。见该条。

71567 消毒散

【方源】《外科经验方》。

【组成】青皮（去白） 金银花 天花粉 柴胡 僵蚕（炒） 贝母 当归（酒炒） 白芷各二钱

【用法】用水二钟，煎至一钟，食远服。如增寒壮热或头痛者，宜先服人参败毒散一二服，方可服此药；如无前证，即服此药三二剂；或肿不消，宜服托里药。

【主治】吹乳，乳痛，便毒。

【加减】如便毒，加大黄（煨）一钱，空心服。

71568 消毒散

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】白芷 郁金 大黄 天花粉 草乌 南星 贝母 木鳖子 白及 黄柏 皂刺 石灰 甘草 石膏各等分

【用法】上为细末。同鸡子清调敷。内服犀角化毒丹一二丸。

【主治】瘰毒上攻头面，腮颌肿起疼痛，及一切恶毒疮肿。

71569 消毒散

【方源】《回春》卷五。

【组成】南星(姜制) 半夏(姜制) 陈皮 枳实 桔梗 柴胡 前胡 黄连 连翘 赤芍 防风 独活 白附子 苏子 莪术 蔓荆子 木通 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜二片，灯草一团，水煎服。

【主治】咽喉结核，肿块如桃，坚硬疼痛，颈项不回转，四腋下或有块硬如石。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“消解散”。

71570 消毒散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】归头 熟地(酒洗) 黄芩(酒炒) 黄连(酒洗)各一钱 黄柏(酒洗) 黄耆 羌活 桔梗 人参 生地 陈皮 防己 防风 泽泻 甘草 连翘

【用法】水二钟，煎服。

【主治】老人项疽，脉实而稍大，因忧闷生热所致。

71571 消毒散

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】黄连五钱 地骨皮一两 朴消三两

【用法】上为末。每用三五分，水一盏，煎至七分，去渣停冷，用鸡翎扫之。

【主治】一切恶疮赤肿，疼痛。

71572 消毒散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】贝母(去心)

【用法】一半生晒，一半微炒，和匀为末。每服一二钱，酒调下，病在上，食后服，病在下，食前服。

【主治】一切无名肿毒、疮疖。

71573 消毒散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】绿豆 五倍

【用法】上为细末。用醋调搽。

【主治】面疮赤肿。

71574 消毒散

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】黑丑 当归 银花 贝母 连翘 白芷 乳香 没药 大黄 甘草 防风 山甲 僵蚕 肉桂

【用法】上为细末。每服八钱，入酒少许，不通再服。

【主治】背发恶疮，不问阴阳毒。

【加减】手毒，加木通；脚毒，加木瓜、牛膝；乳痈，加漏芦；已成者，加黄耆。

71575 消毒散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】大黄一两 芙蓉叶(晒干为末)一两 麝香三分 冰片三分 五倍子一两 藤黄三钱 生矾三钱

【用法】上药各为末。米醋调成如厚糊一样，涂于多骨疽之左右四周。以药围其皮肉，中留一头如豆大，以醋用鹅翎不时扫之。

【主治】多骨疽，痈疽疔毒。

【宜忌】《串雅内编》：此方只宜于痈疔等阳毒，但不可施之阴症，似于多骨疽不甚相宜。

【方论选录】《串雅内编选注》：方中大黄、芙蓉叶清热解毒，麝香、冰片活血散瘀止痛，五倍子、藤黄、生矾有消肿止痛之功。凡痈疽疔毒初起，红肿痛热者，用醋调局部四周，有止痛消肿功效。

71576 消毒散

【方源】《良朋汇集》卷五引颜守乾方。

【组成】生大黄 白及各等分

【用法】上为末。凉水调搽患处。

【主治】无名肿毒，黄水白皮疮。

71577 消毒散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】牛蒡(微炒)四钱 荆芥 甘草各一钱 防风 犀角(镑)五分

【用法】水煎，温服。

【功用】快透消毒。

【主治】痘疮毒气太盛，稠密成片，发热惊搐，舒舌瞪眼，脸赤腮肿，遍身赤痛

71578 消毒散

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】金银花 连翘 白蒺藜 荆芥

白芷 牛蒡子 防风 白鲜皮 赤芍药 甘草

【用法】水煎服。

【主治】遍身痒疥。

【加减】疙瘩日久不愈，加何首乌；干燥，加当归；有热，加黄芩；下部多，加黄柏；小便涩，加木通。

71579 消毒散

【方源】《痘疹专门》卷上。

【组成】水银二钱 轻粉二钱 石膏二钱 铅三钱 官粉三钱(煨) 冰片三分(研) 大珍珠一钱

【用法】先将铅化开，倾入水银，再入后药，研细。用甘草汤洗疮口，敷药，三日一换。

【主治】痘后疮痂内陷，刀伤肉破，血流不止。

71580 消毒散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】净花 尖生 赤芍 防风 力子 地丁 犀角 当归 花粉 连翘 甘草

【主治】胃火热毒。

71581 消毒散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】鹿霜 公英 白芷 苏梗 橘叶 丝瓜瓢(煨) 葱白 甜酒

【主治】内外吹乳。

71582 消毒散

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】雄黄八钱 蜈蚣二条

【用法】共为末烧烟，熏三二次即愈，或用猪胆汁调涂亦可。

【主治】指头疮。

71583 消毒散

【方源】《杂证要法》。

【组成】薄荷一钱 白芷一钱 桔梗二钱 生甘草一钱 天花粉三钱 连翘二钱 僵蚕二钱 贝母三钱(捣碎) 金银花三钱

【用法】上加竹叶十五片，水煎服。

【主治】温疫斑疹出后，余毒未尽，两腮项作肿而痛。

71584 消毒膏

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】马牙消一两(烧赤，研) 乌头(大者二枚，烧存性，研) 三分

【用法】上为末。每用三钱匕，以白面三钱匕，加生姜汁一盞，同熬成膏，摊于帛子上热贴，每日换二次。

【主治】风毒走注疼痛，筋脉挛急。

71585 消毒膏

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】天南星

【用法】上为末。生姜自然汁调涂之。

【主治】妇人乳赤肿，欲作痈者。

71586 消毒膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】玄参二钱半 藁本 牛膝 续断 各一钱半 羌活二钱 葛根二钱半 柴胡(去苗)一钱 木鳖子(去皮)三钱 沉香三钱半 木香 当归(洗，焙) 升麻各二钱半 赤芍药半钱 丹参一钱半 何首乌二钱 牡丹皮一钱半 芝麻二钱 槐白皮 甘草 白藜 川芎 桃仁(汤浸，去皮尖) 杏仁(汤浸，去皮尖) 白附子 木通 赤茯苓 乱发(用水濯洗净，令干)各二钱半 细辛一钱半 白芷三钱 防风 黄耆各半两 苍术(去皮)一钱半 白及四钱 上好黄丹十三两 腊日澄清芝麻油一斤四两

【用法】上为末，同乱发一处，用油浸七日七夜，于净石锅或银器中以慢火煎，候白芷焦黄色放温，以白棉滤去滓，于瓷罐子内密封三日三宿夜，候取出倾于锅内，慢火轻温，再滤去滓，倾在上好瓷碗中，用慢火再熬动，次下黄蜡十五两，用竹篦子不住手搅令匀，次下黄丹，再搅令匀，以慢火再熬动，拾下搅令匀，续次再上火，三日方欲膏成，于瓷盒子内密封。每用时，用软白绢摊药匀，贴于患处。

【主治】一切肿毒，结硬疼痛。

71587 消毒膏

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】当归 黄耆 川芎 杏仁 白芷

白薇 零陵香 槐白皮 柳枝(嫩者) 木鳖子(用仁) 甘松各五钱(锉) 乳香 没药各三钱 轻粉一钱 朱砂 朱红各五分 麝香一分 黄丹(炒紫色) 黄蜡各八两 芝麻油一斤

【用法】上将锉药油浸七日,木炭火上煎杏仁焦色,滤去渣,下黄蜡,候溶开出火,下丹,急搅百十转,下乳香、麝香、朱砂等六味,不住手搅至凝,瓷盒内收贮,白光绢上摊之。

【功用】止痛生肌,清血脉,消毒败肿,通气脉。

【主治】头面五发恶疮,及烧汤冻破溃烂。

71588 消毒膏

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】防风 大黄 梔子仁 黄芩 黄连(另为末) 杏仁 石菖蒲 当归 白芷各三钱 脑麝一钱(另研)

【用法】上为粗末,用好猪脂一斤,切碎,炼去滓,取净油,同前药慢火煎,候白芷黄色为度。去滓净,再下黄连、脑、麝末,搅匀,密器收贮,每用少许。

【主治】诸般耳疾,疼痛不可忍者。

71589 消标散

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】牙消一分 硼砂五分 蒲黄 蛭蚰梅 腰黄各三分 青黛二分 冰片 麝香各五厘 乌梅肉四分(炙存性)

【用法】此药渐点,并内服滋阴之剂,静养自愈。

【主治】喉症过服苦寒,以致喉间结一柱肉,或横生,或直下,喉中稍疼,名为喉标。

71590 消指散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】硼砂一分 瓦葱一两 冰片三分 人参一钱

【用法】上为末。以刀轻刺出血,刺在生出指上,即时出水,敷星星在血流之处,随出随掺,以血尽为度。流三日不流水矣,而痛亦少止,再用化水汤煎服四剂,则指尽化为水,外用膏药加生肌散敷贴。

【主治】脚板下忽生二指,痛不可忍者。

71591 消胃汤

《不知医必要》卷二。为《脾胃论》卷下“清胃散”之异名。见该条。

71592 消胃饮

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】制半夏一钱 陈皮一钱五分 神曲一钱 厚朴一钱(姜炒) 莱菔子一钱(炒,研) 谷芽二钱(炒) 砂仁八分

【用法】加煨姜二片,水煎服。

【主治】气滞食阻,在阳明而作胀。

【方论选录】《证因方论集要》:厚朴苦泻实满,砂仁辛快结滞,神曲消食,谷芽开胃,半夏散痞,陈皮理气,菔子宽膨,煨姜和中。

71593 消食丸

【方源】《千金》卷十五。

【异名】消谷丸(《千金翼》卷十九)、曲蘖丸(《鸡峰》卷十二)。

【组成】小麦蘖 曲各一升 干姜 乌梅各四两

【用法】上为末,蜜为丸,每服十五丸,一日二次,加至四十丸。

【主治】①《千金》:数年不能食者及寒在胸中,反胃翻心者。②《局方》:脾胃俱虚,不能消化水谷,胸膈痞闷,腹肋时胀,连年累月,食减嗜卧,口苦无味,虚羸少气,胸中有寒,饮食不下,反胃翻心,霍乱呕吐,及病后新虚,不胜谷气,或因病气衰,食不复常。

71594 消食丸

【方源】《永类铃方》卷二十一引《全婴方》。

【组成】丁皮 砂仁 甘草 甘松 莪术 益智仁各一两 净香附子二两(一方加神曲、麦蘖)

【用法】上为末,糊丸如小豆大。大小加减,米汤送下。

【主治】小儿吐泻伤食,腹急不食。亦治泻痢。

71595 消食丸

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】木香半两 枳壳(去瓢,麸炒黄)

当归(去须土) 代赭石(火煅红,米醋淬不计遍数,以手捻碎为度) 朱砂(研,水飞)各半两 巴豆一分(取霜)

【用法】上为细末,糊丸如黍米大。一岁儿一丸,乳食前温水下。

【主治】小儿伤饱,乳食不化,壮热,腹胀疼痛。

71596 消食丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】乌梅(肉厚者)五十枚(捶破,炒焦黄色) 巴豆五十粒(生用,去皮壳) 胡椒二百粒 吴茱萸(汤洗七次)一两 肉桂(去粗皮)半两

【用法】上为细末,浓磨细松烟墨,水浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服五七丸,食后温水送下;如心腹痛,醋汤下。

【功用】消食化积。

【主治】久痢,心腹痛,胸膈不快,腹胀,不思饮食。

71597 消食丸

《魏氏家藏方》卷五。为原书卷二“消饮丸”之异名。见该条。

71598 消食丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】神曲(炒) 麦蘖(炒) 青皮(去瓤) 木香(不见火) 丁香(不见火) 京三棱(炮) 陈皮(去白) 蓬莪术(炮) 干姜(炮,洗) 良姜(炒)各等分

【用法】上为细末,用神曲糊丸,如麻子大。每服十五丸,生姜汤吞下。大人为丸如梧桐子大亦可服。

【主治】小儿宿食不化,瘦悴。

71599 消食丸

【方源】《医方类聚》卷二四六引《简易方》。

【组成】香附(炒)二两 缩砂仁一两 陈皮(去白) 甘草(炙) 神曲(炒) 麦蘖(炒)各半两

【用法】上为末,泡雪糕为丸,如黍米大。七岁以上为丸如绿豆大。每服三十丸,食后姜汤送下;或作末子,用百沸汤入盐点尤佳。

【功用】温中快膈。

71600 消食丸

《奇效良方》卷六十四。为《普济方》卷三九三引《汤氏宝书》“快膈消食丸”之异名。见该条。

71601 消食丸

【方源】《婴童百问》卷六。

【组成】缩砂(炒) 陈皮(炒) 三棱(煨) 蓬术(煨) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 香附子(米泔浸一宿,炒用) 枳壳 槟榔 乌梅各半两 丁香二钱半

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。每服二十或三十丸,食后紫苏汤送下。

【功用】宽中理气,消乳食,正颜色。

【主治】黄疸。

71602 消食丸

【方源】《回春》卷七。

【异名】消乳丸。

【组成】砂仁 陈皮 三棱(炒) 神曲(炒) 麦芽(砂)各五钱 香附(炒)一两

【用法】上为末,面糊为丸,如麻子大。食后白汤送下。

【主治】小儿宿食不消。

【备考】原书治上证,加白术(炒)五钱。

71603 消食丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】山楂 神曲(炒) 麦芽(炒) 萝卜子 青皮 陈皮 香附各二两 阿魏一两(醋浸,另研)

【用法】汤泡蒸饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食远姜汤送下。

【主治】一切食积停滞。

71604 消食汤

【方源】《郑侨医案选》。

【组成】党参15克 白术 茯苓 神曲 麦芽 竹茹 香附 青皮各12克 厚朴 陈皮各9克 白豆蔻3克 甘草6克

【功用】平肝理气,健脾消食。

【主治】肝气郁结,胃脘作痛,胀满食少,消化不良,胁痛,舌苔白,脉弦滑无力或弦

细无力。

【加减】若有惊悸不安，睡眠欠佳，加钩藤、炒枣仁；呕逆，加藿香、法半夏；大便腐臭，消化不良者，加酒大黄、鸡内金（炒）；大便腥冷，少腹冷痛，加高良姜。

71605 消食饼

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】莲肉（去皮） 山药（炒） 白茯苓（去皮） 芡实（去壳；炒） 神曲（炒） 麦芽（炒） 扁豆（炒） 山楂（去子）各等分

【用法】上为末。每四两，入白面一斤，水同和，烙焦饼用。

【主治】小儿时常伤食，皮黄肌瘦，肚大腹胀。

71606 消食散

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】白术（去芦，去油，陈壁土炒）二钱半 红陈皮（温水洗，去白）七分 南香附米（去毛，炒）七分 山楂（蒸，去核取肉）一钱 大麦芽（炒）一钱 四花青皮（去瓢）七分 砂仁（去壳）一钱 甘草（炙）五分 神曲（炒）七分

【用法】上为细末。每服一钱七分，清米饮或白汤任下；生姜煎服亦可。

【功用】和脾消食。

【主治】小儿腹痛，多是饮食所伤。

【加减】有寒，加藿香、吴茱萸；有热，加炒黄连。

71607 消食散

【方源】《幼科证治大全》引《济世全书》。

【组成】山楂 神曲 砂仁 麦芽 白术 陈皮 青皮 甘草（炙）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿伤食腹痛。

71608 消食散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】白术一钱 茯苓一钱 枳壳一钱 山楂二十粒 麦芽二钱 谷芽二钱 六曲三分 半夏一钱 甘草五分 砂仁三粒

【用法】水煎服。

【主治】伤食之症，心中饱闷，见食则恶，食之转痛。

71609 消食散

【方源】《医部全录》卷四四五。

【组成】神曲（炒） 麦芽（炒） 三棱 青皮 香附 山楂 厚朴 甘草 藿香 枳实 地黄 砂仁 黄连 枣子各等分

【用法】上为末。白汤调下。

【主治】小儿腹大泄泻，水谷不化，吃食不知饥饱。

71610 消蚀散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】明白矾（入银锅内，瓦盖，煨令性尽）一两 绿矾（煨熟） 雄黄 乳香 好胭脂 远志（水浸，取肉焙）各二钱

【用法】上为细末。蜜水研膏，敷恶肉上；麻油调亦得。先用洗疮方，然后敷此。

【功用】消蚀恶肉、朽骨。

【主治】痈疽。

71611 消脂饮

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】茯苓一两 茵陈一钱 防己一钱 炒梔子一钱 苡仁一两 泽泻三钱 木瓜一钱

【用法】水煎服。一剂小便利，二剂身热解，再用二剂而脚肿消，再二剂全愈。

【主治】脚气。

71612 消痈丸

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】夏枯草 连翘 蓖麻仁各四两

【用法】上为细末，装入猪大肠一段内，两头扎紧，酒浸蒸烂，为丸如梧桐子大。每服五十丸，酒送下。

【主治】瘰癧。

71613 消痈丸

《疡医大全》卷十八。为《医学心悟》卷四“消瘰癧丸”之异名。见该条。

71614 消痈丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】元参 土贝 左牡蛎各等分

【用法】夏枯草汤泛丸。每服三钱，夏枯草汤送下。

【主治】阴虚火盛灼液成痰，痹于络，致生颈项痰串，马刀瘰癧。

71615 消癆汤

《外科真诠》卷上。即《医学心悟》卷四“消癆丸”改为汤剂。见该条。

71616 消癆散

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】牛胶一斤（米糠炒成珠） 川山甲一斤（壁土炒成珠） 大黄（好酒九蒸九晒，取末）四两

【用法】上为细末。每服二三钱，酒调下。

【主治】瘰癧、痰核、流注未破者。

【备考】已破者，用加味五海饮数帖，酒煎调消癆散同服。

71617 消癆膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】黄丹十两 乳香（去油） 没药（去油） 儿茶 密陀僧 血竭各一两 麝香一钱（以上收膏时下） 当归五两 甲片五两 陈酒三两 肉桂一两 木鳖子一两 蜈蚣十条 象皮一两 黄连一两 黄柏五两 黄芩五两 艾叶一两 花粉一两 银花四两

【用法】先将当归等用香油三斤浸半月，夏五日，秋十日，熬枯去渣，入黄丹、乳没、儿茶、陀僧及麝香等药和匀成膏。用时摊贴。

【主治】痰癆。

71618 消疣水

【方源】《经验良方》。

【组成】升汞（末）一钱 明矾 龙脑 官粉（各末）五分 蒸馏醋 烧酒十二钱

【用法】上合涂患处。

【主治】霉痔。

71619 消疥丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】苦参 白芷 鲜皮各一两 枳壳 连翘 羌活 山栀 当归 荆芥各三钱

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每

服五十丸，食后白汤送下。

【主治】疥疮。

71620 消鸪汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】金银花八两（煎汤取汁二碗） 白矾三钱 寒水石三钱 菖蒲二钱 天花粉三钱 麦冬五钱

【用法】再煎一碗，灌之。一时辰后，眼不上视，口能出言。再用前一半，如前法煎饮，二剂而愈，断不死也。

【主治】饮吞鸪酒，白眼朝天，身发寒颤，忽忽不知，如大醉之状，心中明白但不能语言。

71621 消核丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】橘红（盐水洗，略去白）一两 赤茯苓一两（去皮） 生甘草节（去皮）四钱 半夏曲（姜汁拌，焙）七钱 片苓（酒拌，炒）八钱 僵蚕（水洗，炒黄）六钱 玄参（酒拌，焙）七钱 牡蛎（火煨，童便淬，另研）七钱 山梔仁（连壳，炒焦）八钱 天花粉七钱 瓜蒌仁七钱（另研） 大黄（煨）一两 桔梗（去芦）七钱 连翘（去枝梗）一两

【用法】上为末，汤泡蒸饼为丸，如绿豆大，晒干。每服八九十丸，白汤送下。

【主治】颈项、耳后结核，三五成簇，不红、不肿、不痛、不成脓者。

71622 消核汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】金银花 天花粉 山药各一钱五分 蒲公英 夏枯草 海石粉 南苍术 前胡各一钱

【用法】用水二钟，煎八分，食远服。

【主治】痰核。

71623 消核饮

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】海带 当归（酒制） 昆布 海藻 白芍 生地 柴胡 贝母 青皮 陈皮各一钱 夏枯草 荆芥 半夏 赤芍七分 防风五分 香附二钱

【用法】加生姜煎服。

【主治】瘰癧。

71624 消核散

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】海藻三两 牡蛎 玄参各四两 糯米八两 甘草(生)一两 红娘子(同糯米炒胡黄色,去红娘子,用米)二十八个

【用法】上为细末。每服一钱或一钱半,酒调服。

【主治】颈项痰凝瘰癧。

71625 消核锭

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】山慈菇二两 原寸香二分

【用法】上为细末,用糯米浆打糊成锭。醋磨涂。

【主治】瘰癧,痰核。

71626 消核膏

【方源】《徐评外科正宗》卷五。

【组成】制甘遂二两 红芽大戟二两 白芥子八钱 麻黄四钱 生南星一两六钱 姜半夏一两六钱 僵蚕一两六钱 藤黄一两六钱 朴消一两六钱

【用法】用真麻油一斤,先投甘遂、南星、半夏,熬枯捞出;次下僵蚕;三下大戟、麻黄;四下白芥子;五下藤黄,逐次熬枯,先后捞出;六下朴消,熬至不爆。用绢将油滤净,再下锅熬滚,徐徐投入炒透东丹,随熬随搅。下丹之多少,以膏之老嫩为度。夏宜稍老,冬宜稍嫩。膏成,趁热倾入水盆中,扯拨数十次,以去火毒,即可摊贴,宜厚勿薄。

【主治】瘰癧、乳核及各种结核。

【宜忌】已溃者不可贴。

71627 消恶汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参三钱 白术五钱 附子一钱 半夏一钱 南星一钱 陈皮一钱 白薇一钱

【用法】水煎服。

【主治】中恶、中痰,眼花猝倒,不省人事。

【方论选录】此方妙在补气之药多于逐痰祛邪。中气健于中,邪气消于外,又何惧痰

之不速化哉。

71628 消积丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】牵牛子一两(取末半两) 青橘皮(去白,焙)一两 丁香 木香 硃砂(研) 沉香(锉)各一两 槟榔二个(锉) 桂(去粗皮) 干姜(炮)各半两 巴豆十粒(去皮心膜,出油,研)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如豌豆大。每服一丸至二丸,食后、临卧橘皮汤送下。

【功用】宽利膈脘,思饮食。

【主治】积滞。

71629 消积丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】代赭(煨,醋淬三七遍,研) 礞石(研)各一两 桂(去粗皮) 白茯苓(去黑皮) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 巴豆(去皮心膜,压去油)各半两 京三棱(煨,锉) 楝实肉各一分 硃砂(研)三分

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二丸至三丸,木香汤送下。

【主治】久积癥癖,冷热不调,痰逆痞闷,心腹刺痛,喘满膨胀,泄利羸困,不思饮食。

71630 消积丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】丁香丸(《普济方》卷三九二)。

【组成】丁香九个 缩砂仁二十个 乌梅肉三个 巴豆二个(去皮油心膜)

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。三岁以上每服三五丸,三岁以下每服二三丸,温水送下,不拘时候。

【主治】小儿乳食积滞,吐泻腹胀,大便酸臭及一切积聚成疳。

①《小儿药证直诀》:小儿大便酸臭。②《医方类聚》引《简易》:小儿食积,面黄白色,多睡,口中气温,大便黄赤面臭。③《普济方》:小儿积聚成疳腹胀,及乳积,吐乳泻,此由啼哭未已,以乳与儿,停滞不化得之。④《幼幼集成》:小儿食停胃口面作吐。

71631 消积丸

【方源】《永类铃方》卷二十引《保婴方》。

【组成】砂仁 制青皮(锉) 净陈皮 莪术 三棱(并煨)各半两 巴豆二十一个(去皮膜,不去油,同前五味炒令黄色,去巴豆不用)

【用法】上为末,醋面糊为丸,如黄米大。每服二三十丸,温米汤送下,一日二次。

【功用】《普济方》:消化癖积,美进乳食。

【主治】①《永类铃方》引《保婴方》:小儿乳食宿滞不化,胸膈不利,呕吐恶心,便利不调,大便酸臭,重伤乳食,或作诸痛。②《普济方》:小儿一切所伤,面黄肌瘦,肚大腹胀,癖积块硬,头大脚细,虽进饮食,不生肌肉,腹内作痛,下痢腥臭。

71632 消积丸

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】白姜(炮) 肉豆蔻(面裹,煨)各一两 枳壳(炮) 三棱(炮) 莪术(炮) 姜黄(炮) 毕澄茄各五钱 百草霜(微炒) 陈皮(去白) 粉草(炙) 大曲饼(生)各三钱 巴豆五十枚(去油) 杏仁五十粒(去皮尖) 清油半两 酒煮黄蜡二两

【用法】上除巴、杏另研外,余为细末,入巴、杏拌匀,以清油熔蜡化开,入药末,作一蜡樞丸,合收,临用旋丸。每服一丸,空心生姜汤送下。

【功用】消化积。

【主治】小儿积聚。

71633 消积丸

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】木香 人参(去芦)各一钱半 黄连(炒去须) 蓬莪术(煨)各三钱 橘皮(去白) 青皮(去瓢,炒) 槟榔(去脐)二个

【用法】上为极细末,用面煮糊为丸,如黍米大。食后米饮送下。

【功用】宽腹胀,退面肿,进饮食,化滞物。

【主治】婴孩小儿积聚。

71634 消积丸

【方源】《婴童百问》卷五。

【组成】丁香二十粒 砂仁二十粒 使君

子五个 乌梅三个

【用法】上为末,烂饭为丸,如麻子大,加巴豆三个,去尽油同丸。每服三丸,陈皮汤送下。

【主治】小儿乳食伤积,心腹胀满,气粗壮热,或泻或呕。

71635 消积丸

【方源】《医学正传》卷八。

【组成】丁香九个 砂仁十二个 巴豆二个(去皮心膜及油)

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。三岁以上每服三五丸,三岁以下每服一二丸,温水送下。

【功用】磨积。

【主治】小儿腹痛,口中气温,面黄色,目无精彩,或白睛多,及多睡畏食,或大便酸臭者。

71636 消积丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】萝卜子(炒)三钱 紫苏子三钱 厚朴(姜汁炒)五钱 陈皮五钱 香附(炒)三钱 甘草(炙)二钱 青皮(炒)二钱 山楂肉五钱 白术(炒)一钱 茯苓五钱 人参三钱 黄连(姜汁炒)三钱 半夏曲三钱 枳实(炒)三钱 苍术五钱(米泔浸,炒)

【用法】上为末,神曲糊为丸。米汤送下。

【主治】小儿诸积。

71637 消积丸

【方源】《丹溪治法心要》卷八。

【组成】石燕五钱(七次醋淬) 木鳖子五钱(去油) 蜜陀僧一两 丁香 膩粉各四钱

【用法】上为末,神曲糊为丸,如粟米大。每服十五丸,米汤送下。

【主治】小儿积块。

71638 消积丸

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】丁香 茴香 陈皮 青皮 神曲 三棱 白术 巴豆 益智仁

【用法】上为末,为丸服。

【主治】小儿乳积、食积、气积。

71639 消积丸

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】丁香 枳壳 益智 三棱 莪术 巴霜 陈皮 神曲 茴香

【用法】上为末，为丸服。

【主治】小儿有积，大便不通。

71640 消积丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】人参 白术 茯苓 黄连 神曲 麦芽 使君子 山楂 橘红各六分 茺萸四分 胡连八分 阿魏 血竭各二分 芦荟五分 甘草四分

【用法】上为末，米糊为丸服。

【主治】小儿积块。

71641 消积丸

【方源】《诚书》卷十。

【组成】缩砂（去壳）二十一粒 百草霜三钱 巴豆（去油皮）二个 乌梅（去核）七个 杏仁（去皮尖，炒）二十一粒 半夏（去脐，汤泡七次）九个

【用法】上为末，煮面糊为细丸。每服奇数，生姜汤送下。

【主治】小儿吞酸，恶心呕吐，心腹刺痛，飧泄如痢。

71642 消积丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十三。

【组成】广皮 三棱 莪术 槟榔 青皮 卜子 枳实 草豆蔻 麦芽各一两 木香七钱 神曲二两 山楂肉 厚朴各一两五钱

【用法】上为末，黑沙糖为丸，每丸重一钱。每服一丸，白汤送下。

【主治】癥瘕痞癖。

71643 消积丸

【方源】《不居集》（下集）卷六。

【组成】海粉 石碱 三棱 莪术 五灵脂 红花 香附

【用法】上为丸服。治虚劳日久，不任舟车。禹功等丸者，宜四物汤送下。

【主治】一切积热瘀血，坚积石瘕。

71644 消积丸

《东医宝鉴·杂病篇》卷六。为《医学入门》卷七“白芥丸”之异名。见该条。

71645 消积丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】绿矾（炒红）二两 炒山楂 炒麦芽 陈皮 煨草果 槟榔 三棱 莪术 生木香（不见火） 神曲

【用法】上为末，用大腹皮四两煎汤，与神曲打糊为丸。每服三钱，米饮汤送下。

【主治】米、麦、果、菜、肉食积滞。

71646 消积丹

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】青皮一钱半 陈皮一钱半 葫芦巴 故纸 荆三棱 白牵牛 黑牵牛各三钱

【用法】上用巴豆二十个，大枣二十个，去核，巴豆去皮。每枣一个，包巴豆一个，用纸裹定，泥包成个烧饼，文武火烧干取出，将前项药同烧干，枣豆为细末，又用白面四两，包药成大烧饼，烧干，同药研为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸至九丸，空心醋汤送下。

【主治】冷积。

71647 消积汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】香附（醋炒）十两 艾叶（醋炒）二两 当归 莪术各二两 川芎 白芍 生地 桃仁 红花 三棱 赤芍 干漆各一两

【用法】上为末，醋糊为丸。每服二十丸，与调经丸间服。

【主治】血虚经闭。

【备考】本方方名，据剂型，当作“消积丸”。

71648 消积汤

【方源】《治痧要略》。

【组成】山楂 麦芽 槟榔 厚朴各八分 荆芥 香附 薄荷 泽泻各五分

【用法】水煎，稍冷服。

【主治】痧因积滞而痛者。

【加减】血瘀，加桃仁；头汗，加枳实、大黄；腹痛，加降香；胸胀，加枳壳、郁金。

71649 消积汤

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】山楂二钱 枳壳 厚朴 青皮 莪术 香附各一钱 砂仁 乌药各五分 木香三分

【用法】水二碗，煎八分，空心服数剂。

【主治】一切痞积。

71650 消积饮

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】缩砂仁五钱 陈皮(去白)三钱 良姜(油炒)二钱 丁香 粉草(炙)各二钱 茴香(炒)三钱 香附子(炒，去毛) 麦芽(生) 三棱(炮) 苍术(米泔浸)各三钱 莪术(炮) 厚朴(姜制) 青皮(炒，去瓢) 枳壳(煨，捶油) 大曲饼各三钱

【用法】上为细末，米汤调入烧盐，空心服，或冬瓜仁汤下。

【功用】常服调脾进食。

【主治】小儿脾胃虚冷，不能消化乳食，致成积痢，及冷气疝、虚疟、虚积吐利。

71651 消积饮

【方源】《卫生鸿宝》卷一引《刘氏简便方》。

【组成】陈年火腿骨(煨黑，研细)三钱

【用法】用火腿肉一斤，煮熟，去汁上肥油，取清汤一碗，将末送下。

【主治】积食。

71652 消积散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】黑丑(半生半熟) 槟榔 大黄各三钱 木香五分

【用法】上为末。每服一二分，黑糖调滚水下。

【主治】小儿食积，肚硬筋青，并下虫积。

71653 消脓汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】大黄五钱(后下) 黄芩三钱 黄连五钱 黄柏三钱 冬瓜仁 败酱草 银花各一两 连翘 蒲公英 地丁各六钱 当归 赤芍 木香各三钱

【功用】清热解毒，通便下热。

【主治】急性阑尾炎化热期或毒热期。

71654 消脓饮

【方源】《直指》卷八。

【组成】生南星一两 知母 贝母(去心，炒) 生地黄 阿胶(炒) 川芎 桑白皮(炒) 甘草(炙)各三分 防风 射干 北梗 天门冬(去心) 脑荷 杏仁(不去皮) 半夏(制) 紫苏叶 白芷 白及各半两

【用法】上为散。每服四钱，加生姜七片，乌梅一个，水煎，食后服。

【主治】肺有痈脓，腥气上冲，呕吐咳嗽。

71655 消痞丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】熊胆 朱砂(别研，水飞) 胡黄连 鳖甲(醋涂，炙黄) 柴胡(去苗) 黄连(去须，微炒)各半两 夜明沙(微炒) 槟榔 木香 陈橘皮(去白) 青橘皮(去白)各一分 干蟾二个(烧赤留性) 芦荟(别研) 麝香(别研)各一钱

【用法】上为细末，软梗米饭为丸，如黍米大。每服二十丸，温熟水送下，不拘时候。

【功用】退痞热，长肌肤，杀虫，美食。

【主治】小儿诸痞，肌肉消瘦，日晡作热，引饮无度。

71656 消痞丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】木香 槟榔各二两 青皮(去瓢) 姜黄 萝卜子(炒) 牵牛子各七钱半

【用法】上为末，糊为丸，如黍米大。每服二三十丸，食后姜汤送下，不拘时候。

【主治】小儿诸般腹胀，四肢肿满，气上喘促，小便不利。

71657 消痞丸

【方源】《走马疳急方》。

【组成】黑金属(即铁屑)一两(苦酒炒) 茅君散(即平胃散)二两

【用法】和匀，用醋糊为丸。空心米饮送下。

【主治】痞生于内，面黄腹胀，潮热便浊，腹痛及虫痛，羸瘦。

71658 消痞丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】苍术(米泔浸,炒) 陈皮 厚朴(姜汁炒) 枳壳(面炒) 槟榔 神曲(炒) 山楂(去子) 麦芽(炒) 三棱(煨) 莪术(煨) 砂仁 茯苓(去皮) 黄连(炒) 胡黄连 茺萸仁 芦荟 使君子(去壳) 各等分

【用法】上为末,使君子壳煎汤,泡蒸饼为丸,如弹子大。每服一丸,清米汤化下。

【主治】小儿五疳,皮黄肌瘦,发直尿白,肚大青筋,好食泥、炭、茶、米之物,或吐或泻,腹内积块,诸虫作痛。

71659 消疳丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】茅山苍术四两(一两用盐三钱化水一碗浸,一两用酒一碗浸,一两用陈土搅泥水待泥沉,用上面清泥水浸,一两用米泔水浸,春五、夏三、秋五、冬七日,每日倒换,擦洗一次。浸毕捞起,刮去粗皮,锉片晒干,微炒)

【用法】上为细末,罗过,约取头末极细者用二两,余不用。每服三钱,同猪肝四两(勿犯铁器,以竹刀切片),用清水共一处煮熟,连汤食之。三五服即愈,或再服二三服更妙。

【主治】疳积。

71660 消疳丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】芦荟一两(煨) 胡黄连五钱 五谷虫(先洗,瓦焙干)二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,空心米饮汤送下。至腹小,服理脾丸。

【主治】疳眼。因饮食失节,以致腹大面黄,肝血不能养目。

【宜忌】忌面食、炙博、发物。

71661 消疳丸

【方源】《仙拈集》卷四引《灵秘丹药》。

【组成】银珠(水飞) 儿茶各一钱 老茶 黄柏炭各三分 轻粉五分

【用法】上为末,黄蜡二钱,熔化为二十一

丸。每服七丸,空心酒送下。

【主治】下疳。

71662 消疳丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】大黄五两半 槟榔三两 黑丑(头末)三两五钱 芦荟 使君

【用法】上为末,面糊为丸。每服三钱,白汤送下。以虫下为验。

【主治】诸般虫积。

71663 消疳丸

【方源】《集验良方》卷五。

【异名】消疳口丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】山楂四两 陈皮一两 枳实一两(炒) 胡连一两 青黛五钱 芦荟(煨)五钱 人参五钱 使君子肉(煨)一两 青皮(炒)五钱 莪术(醋炒)五钱 茺萸六钱 神曲(炒)六钱

【用法】上为末,蒸饼为丸,如龙眼核大。每服一丸。

【主治】小儿肚大筋青,身热肉瘦,牙疳口臭。

71664 消疳丹

【方源】《外科传薪集》。

【组成】胡连五分 胆矾三分 儿茶五分 铜绿五分 麝香一分 绿矾一钱 滑石一钱 杏仁霜五分 西黄五分 青黛一钱 鸡内金五分 冰片一钱 干蟾炭三分 上芦荟五分 皂矾五分 人中白(煨)一钱 葶苈子五分 雄黄一钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】一切牙疳,臭烂不止。

71665 消疳丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】胡连五分 胆矾三分 儿茶五分 铜绿五分 麝香一分 绿矾一钱 滑石一钱 杏仁霜五分 西黄五分 青黛一钱 鸡内金五分 葶苈子五分 雄黄一钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】一切牙疳,臭烂不止。

71666 消疳汤

【方源】《回春》卷七。

【组成】山楂肉 白芍(炒) 黄连(姜汁炒) 白茯苓(去皮) 白术(去芦) 泽泻各一钱 青皮四分 甘草(生)三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《回春》：小儿疳病，大便色疳白，小便浑浊，或澄之如米泔。②《寿世保元》：小儿疳病，面黄肌瘦，肚大青筋。

71667 消疳饮

【方源】《幼科证治大全》引《济世全书》。

【组成】人参 白术 茯苓 黄连 胡黄连 神曲 青皮 砂仁 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿疳疾，身热面黄，肚大青筋，瘦弱。

【加减】伤食，加山楂；有虫，加使君子。

71668 消疳饼

【方源】《医便》卷四。

【组成】蛆(夏月取赖蛤蟆百余尺，端午前后取的更佳，去头、足、肠、肚、皮、骨，另放一处。先将肉香油煎熟与儿吃。再将皮、骨、肠、肚以钵头盛，放烈日中，上用稀筛盖之，任苍蝇攻钻生蛆，食骨上肉尽，然后取蛆洗净炒干，用重纸包，灰火内煨焦存性，为末)一两胡黄连二两山楂肉(去子净)四两真芦荟二两 砂仁二两 青皮(去白，麸炒)一两 茺莢一两 槟榔二两 蒿心末一两 西涯木香五钱

【用法】上为末，除滓净一斤，外用陈麦面十斤，沙糖二斤，饴糖一斤，将药面糖和匀，造成饼子，一两重一个。每日空心食一个，米汤送下。

【功用】消疳磨积。

【主治】小儿诸疳积。

71669 消疳散

【方源】《回春》卷五。

【组成】花椒 细辛 硼砂 枯矾 铜绿 黄连 青黛各等分

【用法】上为细末。先用凉水漱口，后将药末擦在牙齿缝处。

【主治】上焦湿热，走马牙疳。

71670 消疳散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】使君子(用白者，去油) 雷丸(去皮，用白者，红者杀人勿用，以米泔水浸苍术少许，将雷丸同苍术用火焅之，用雷丸去苍术炒干)各等分

【用法】上为细末。每一岁用一分，以鸡肝炖半熟，蘸药食。

【主治】小儿疳积，眼生翳膜遮睛。

【加减】若翳厚，加木贼草(烧灰)、雄黄、珍珠各一钱，另研极细末，入前药服。

71671 消疳散

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】人参 山药 使君子(去壳) 莲肉 茯苓各一两 锅巴四两 虾蟆(煨)一两 五谷虫五钱 鸡硬肝黄皮(烧灰存性)五钱

【用法】上为末。白糖霜四两调匀服。

【主治】小儿五疳。

71672 消疳散

【方源】《治痧要略》。

【组成】人中白三钱 花粉 硼砂 青黛 儿茶 冰片 真珠各一钱 薄荷 黄连 雨前茶各五分

【用法】上为极细末。先用浓茶拭净，搽患处。

【主治】痧后牙疳。

71673 消疳散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】苦参 儿茶 陀僧 蛤粉各等分

【用法】上为末。湿则干上，干则用猪油调搽，每日三四次。重者七日痊愈。

【主治】结毒下疳。

71674 消疳散

【方源】《卫生鸿宝》卷三。

【组成】薄荷 紫草 灯草灰 冰片各一钱 儿茶 硼砂 黄柏 炉甘石 石膏 青黛各一钱半 大黄二钱 橄榄灰八分 人中白四钱

【用法】上为细末，瓷器贮。先用茶湿青布，洗去白膜，以芦管吹药敷上。

【主治】小儿口疳发热，走马牙疳，及口疮热伤。

71675 消疳散

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】雄黄二分 石决明（煨）一钱五分 海螵蛸（煨，去壳）五分 真辰砂一分 滑石五分 炉甘石（童便泡一日一夜，烧透，以能浮水为度）五分

【用法】上为细末，加冰片五厘再研。量儿大小，或三四分，或五六分，用不落水鸡肝一副，竹刀切破，上开下连，掺药在内，线扎好，加淘米水入砂罐煮熟，连汤食尽。

【主治】疳积眼。

71676 消疳煎

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】茯苓 百合 海人草各大 石膏 牛膝各中 甘草小

【用法】水煎，时时服用。

【主治】小儿疳眼。

71677 消疽散

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】生地三钱 连翘三钱 忍冬藤一两 白芷三钱 夏枯草一两 地榆三钱 天花粉三钱 生甘草二钱 当归一两

【用法】水煎服。未溃，二剂则消；已溃，四剂痊愈。

【功用】补血散毒，凉血清火。

【主治】恶疽，四肢之间，或头面之上，忽然生疽，头黑皮紫，疼痛异常。

71678 消疽膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】松香 官粉 细六安茶各三钱 蓖麻仁（去皮）二十九粒

【用法】上为末，先将蓖麻捣烂，然后入药末，捣成膏。如干，少加麻油捣匀。摊青布上，贴患处，再以棉纸（大些）盖好，扎住。七日痊愈。

【主治】一切疽。

71679 消疹汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】杏仁 9 克 桑白皮 12 克 连翘 9 克 蝉蜕 6 克 赤小豆 31 克 公英 12 克 紫花地丁 12 克 甘草 6 克 浮萍 9 克 防风 6 克 赤芍 9 克 白术 6 克

【用法】水煎，内服。

【主治】荨麻疹。

71680 消痈汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】金银花七钱 当归五钱 蒲公英六钱 生甘草三钱 荆芥一钱 连翘一钱

【用法】水煎服。

【主治】小疮毒。

71681 消痈汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】金银花五钱至一两 连翘三钱至五钱 公英五钱至一两 赤芍三钱至五钱 花粉三钱至五钱 白芷二钱至三钱 川贝母三钱至五钱 陈皮三钱至五钱 蚤休三钱至五钱 龙葵三钱至五钱 鲜生地五钱至一两

【功用】清热解毒，散瘀消肿，活血止痛。

【主治】蜂窝组织炎，痈症初起，深部脓肿等化脓感染。

71682 消痈酒

【方源】《串雅内编》卷四。

【组成】万州黄药子半斤（紧重者为上；如轻虚，是他州所产，力薄，用须加倍）

【用法】取无灰酒一斗，投药入中，固济瓶口，以塘火烧一周时，待酒冷乃开。时时饮一盞，不令绝酒气，经三五日后自消矣。

【主治】痈疽。

71683 消酒药

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】鸡肫脰 干葛各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，酒送下。

【功效】饮酒令人不醉。

71684 消浮散

【方源】《治疹全书》卷五。

【组成】木杏 厚朴各二钱 陈皮一钱 沉香五分 海金沙二钱五分

【用法】上为细末。每日二次，米汤调下。

【主治】疹后浮肿。

71685 消浆饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】茯苓 山药各一两 芡实五钱 肉桂一钱 车前子二钱

【用法】水煎服。

【功用】补命门之火，兼利其水。

【主治】肠中作水声，如囊裹浆状。

71686 消黄汤

【方源】《永类铃方》卷七。

【组成】朴消（明者，熬成牙消）二钱 大黄（生用）半两 荆芥 黑牵牛（炒）各半两 甘草节四钱

【用法】上为末。酒调，空心服，以利为度。

【功用】利动毒气。

【主治】疗肿。

【宜忌】虚老人宜斟酌用。

71687 消黄汤

《杂病源流犀烛》卷十六。为《金匱》卷中“大黄消石汤”之异名。见该条。

71688 消黄汤

【方源】《中医原著选读》引关幼波方。

【组成】茵陈 60 克 篇蓄 金银花各 30 克 酒炒大黄 酒炒黄芩各 9 克 瞿麦 泽兰各 15 克 赤芍 丹皮 六一散（包）各 12 克 木通 4.5 克

【功用】清热利湿，解毒通淋。

【主治】黄疸持续不退。症见尿黄赤而灼热，尿频，尿痛，大便干，时有发热，舌苔稍黄，脉弦数，湿热下注者。

71689 消黄散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】风化朴消 真蒲黄各半两

【用法】蒲黄晒干为末，同朴消乳钵内细杵匀。每用一字至半钱，点揩舌上下。

【主治】风热温气上攻，舌硬肿大不消。

71690 消黄膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】朴消 大黄各一两（或入麝香五分）

【用法】上为末，用大蒜捣膏。贴积块。

【主治】癥瘕。

71691 消跌汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生米仁 带皮苓各二两 绵茵陈 泽泻各三钱 酒炒防己 木瓜各一钱 官桂 苍术各一钱半

【主治】肢脱。由霉雨湿地，跣足长行，水气浸淫，留于肢节，隐隐木痛，足跗肿胀，趾缝出水不止者。

71692 消蛊汤

【方源】《直指》卷十七。

【组成】紫苏茎叶 缩砂 肉豆蔻（生） 枳壳（制） 青皮 陈皮 三棱 蓬术 槟榔 辣桂 白豆蔻仁 草澄茄 木香各一分 半夏（制） 萝卜子（生） 甘草（炙）各一分半

【用法】上锉。每服三钱，加生姜、大枣，煎服。

【主治】气作蛊胀，但腹满，而四肢头面不肿。

71693 消梨饮

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】消梨汁

【用法】频频饮之；或将梨削浸凉水中，频频饮之。

【功用】大解热毒。

【主治】喉痹。

71694 消痔丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】犀角 象牙 乳香 没药各一两 明矾五钱

【用法】上为末，用黄蜡五钱熔化为丸，如梧桐子大。又用连翘、金银花各四两 好酒五斤煮，去滓。每服三丸，早晨、空心药酒送下。服二十一丸自愈。

【主治】痔漏。

71695 消痔丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】生地四两（水洗） 片芩一两五钱 金银花 枳壳（麸炒） 秦艽各一两 防风 大黄（九制） 当归 苍术（米泔浸炒） 地龙 槐花（炒） 赤芍各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】痔疮。痔漏初起，人壮便秘，血分壅热者。

71696 消痔散

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】密陀僧一钱 信一钱五分 白矾一钱

【用法】陀僧、矾四边，信居其中，放在新瓦上煨，烟尽为度，入地下过夜，出火毒，取出，加麝香二分，为末。吹入鼻孔内。时用手指揉鼻，上下三百度，其药味渐入痔，易化水矣。外用搜湿面团塞鼻孔，使药味上行，每日三四次点之。

【主治】鼻痔。

71697 消痔散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】硼砂一钱 轻粉 雄黄各三分 冰片五分

【用法】上为细末。用草梗咬毛蘸药，点痔上。每日五七次。渐化为水。

【主治】鼻痔。

71698 消痔散

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】乳香二两（明亮者佳） 没药（和尚头者佳）二两 大黄三钱 黄丹五分 朱砂五分 雄黄五分 五倍子三钱（去虫，用铜锅炒至栗壳色为度）

【用法】上为极细末，以菜子油调匀。用温汤洗净患处，再以鸭毛蘸药轻敷上。若粪门烂者，再加龙骨、血竭少许掺入前药内敷上，不烂者不必用。待好至七八分时，用海螵蛸三分贴于生肌。

【主治】痔。

71699 消痔散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】辛夷 丹皮各一两 白芷 枳实 桔梗各一两 炒梔五钱

【用法】上为末。莱菔汤送下。

【主治】鼻中生痔。

71700 消痔散

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】生地四钱 苦参二钱 连翘二两 银花二钱 泽泻二钱 地榆二钱 槐米二钱 胡黄连二钱 黄柏二钱 车前子三钱

【用法】上为末。

【主治】肛门肿疼，欲成痔漏。

71701 消痔散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】煨田螺一两 煨咸橄榄核一两 冰片五分

【用法】上为细末。用油调敷痔上。

【功用】消痔，退肿，止痛。

【主治】内痔脱出，直肠脱垂。

71702 消惊丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】人参 天麻 茯苓 朱砂 全蝎（焙） 直僵蚕（炒） 羚羊角 犀角各一钱 牛胆酿南星四钱 麝少许

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，菖蒲煎汤调下。

【功用】《医统》：镇心，利痰，解热。

【主治】诸惊。

71703 消惊膏

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】龙脑半钱 朱砂（研，水飞） 天南星 白附子（生末） 天麻（末） 蝎梢（末） 半夏（汤洗净，生为末）各二钱 水银（结砂子） 膩粉各一钱

【用法】上为细末，用石脑油盏内重汤煮过，搜和药末为丸，如黑豆大。每服一二丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【功用】截除惊痫，安镇心神，定宁搐搦，利膈脘，去壅滞。

【主治】小儿风热涎盛，惊痫搐搦。

71704 消清散

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】马牙消一钱八分 真蒲黄四分 制僵蚕一分 制牙皂一分三厘 梅片一分

【用法】先研马牙消、蒲黄，次下僵蚕、牙皂，共研如鹅黄之色，再入冰片，为极细末。吹喉。

【功用】消肿毒，祛风痰，退炎热。

【主治】一切咽喉红肿作痛。

71705 消斑饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川连 犀角 石膏 知母 尖生 梔炭 玄参 甘草

【主治】热邪传里，里实表虚，阳毒发斑，血热不散，蒸于皮肤。

71706 消斑散

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】白附子 花蕊石 川椒 南星 五倍子 牙皂 山茨菇各等分

【用法】上为末。姜汁调，临卧涂之。

【主治】面上一切斑驳。

71707 消散片

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】当归 300 克 麻黄（去根）100 克 川芎 100 克 细辛 100 克 雄黄 60 克 羌活 100 克 防风 100 克 苍术 800 克 甘草 100 克 天南星（制）100 克 蚯蚓（炙）300 克 生川乌 200 克 荆芥油 1 克

【用法】上药先将当归、麻黄、川芎、细辛、雄黄、羌活共研细粉，过 100 目筛，和匀。再将剩余的六味水煎二次，每次二小时，药汁滤过，澄清，混和后浓缩成清膏。然后与上述混合粉 760 克，碳酸钙 100 克搅和，制成颗粒，干燥。干燥颗粒拌加荆芥油及润滑剂，压制 2253 片即得。每服四片，一日三次。

【功用】温散寒凝，活血通络，解毒消肿。

【主治】痈疽初起，发背流注，以及风湿疼痛。

71708 消毒汤

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】天花粉一钱 贝母一钱 蔷薇根三钱 杏仁十粒 桔梗一钱 黄矾五分 白蒺藜一钱 乌梅一个 槟榔五分 乌梅根二钱 白芍二钱 人参五钱

【用法】水煎服。十剂可消，大人倍之。

【主治】无辜疔疮。

71709 消厥散

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白芍五钱 当归五钱 丹皮三钱 生地二钱 甘草一钱 人参一钱 炒黑荆芥三钱 炒梔子一钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。一剂而厥乃发，再剂而厥反定矣。

【功用】补肝凉血。

【主治】冬月伤寒，身热十二日，病已入肝，热邪极深，元气不足，欲厥而不能发厥者。

71710 消蛔丸

【方源】《痘科辨要》卷八。

【组成】白术（炒黄） 茯苓 干姜（炒黑） 甘草（生） 乌梅各一钱 黄连（姜炒） 胡黄连 雷丸各五分 雄黄少许

【用法】上为细末，糊为丸，如麻子大。每服五至二十丸，一日二三次，白汤送下。

【主治】痧痘夹蛔。

71711 消跖散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】茯苓一两 茵陈一钱 防己一钱 炒梔子一钱 薏仁一两 泽泻三钱 木瓜一钱

【用法】水煎服。

【主治】脚气。两跖忽然红肿，因而发热，两胫俱浮，作疼作痛。

71712 消暑丸

《局方》卷二（绍兴续添方）。为《鸡峰》卷五“消毒黄龙丸”之异名。见该条。

71713 消暑丸

【方源】《医学纲目》卷三十三。

【组成】绿豆粉 石膏各四两 白矾（枯） 硫黄各一两

【用法】水浸蒸饼为丸，如弹子大，朱砂为衣。用姜汁、醋点，新汲水化开服之。

【主治】头痛，恶心，烦躁，消渴，霍乱。

71714 消暑丸

【方源】《普济方》卷一一七。

【组成】醋煮半夏 酒煮黄连各二两 枳壳（净，炒） 茯苓各四两

【用法】上为末，为丸。任意吞下。

【主治】中暑，脏腑不调。

71715 消暑丹

《元戎》卷二。为《鸡峰》卷五“消毒黄龙丸”之异名。见该条。

71716 消暑散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】人参（捣末） 白面各等分

【用法】上和匀。每服二钱匕，新水调下，不拘时候。

【主治】中暑烦躁，多困乏力。

71717 消痞丸

【方源】《宣明论》卷四。

【组成】黄连 干葛各一两 黄芩 大黄 黄柏 梔子 薄荷 藿香 厚朴 茴香（炒）各半两 木香 辣桂各一分 青黛一两（研） 牵牛二两

【用法】上为细末，滴水为丸，如小豆大。小儿丸如麻子大。每服十丸，新水送下；温水亦得。

【主治】积湿热毒，甚者身体面目黄，心胁腹满，呕吐不能饮食，痿弱难以运动，咽嗑不利，肢体焦廑，眩悸隔热，坐卧不宁，心火有余而妄行，上为咳血、衄血，下为大小便血，肠风痔漏，三焦壅滞，热中消渴，传化失常，小儿疳积热。

【加减】本自利者，去大黄、牵牛。

【宜忌】忌发热诸物。

71718 消痞丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】大消痞丸（《东垣试效方》卷二）、大温中丸（《丹溪心法》卷三）。

【组成】干生姜 神曲（炒） 炙甘草各二

分 猪苓二钱五分 泽泻 厚朴 砂仁各三钱 半夏（汤洗七次） 陈皮 人参各四钱 枳实五钱（炒） 黄连（净，炒） 黄芩各六钱 姜黄 白术各一两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸至百丸，空腹白汤送下。

【主治】心下痞闷，一切所伤及积年不愈者。

71719 消痞丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄连五钱 黄芩二钱 厚朴七分 姜黄五分 干生姜 人参各四分 甘草三分 枳实二分 橘皮一分

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服三十丸，随乳下。

【功用】消痞。

71720 消痞丸

《活幼口议》卷十七。为原书同卷“三棱煎丸”之异名。见该条。

71721 消痞丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《瑞竹堂方》。

【组成】苍术四两（净，米泔浸，焙干，炒） 陈皮一两（去白） 青皮一两（净，去瓤） 木香二钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下；小儿三五七丸，米饮汤送下。

【主治】痢后肚腹满闷。

71722 消痞丸

【方源】《医方类聚》卷八十九引《施圆端效方》。

【组成】青皮（去白） 陈皮（去白） 京三棱（炮，切） 广茂（煨，切） 益智（炒） 缩砂仁 当归（切，焙） 半夏（姜制） 牵牛（炒） 丁皮各一两 硃砂（明者）一分（别研）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如小豆大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】一切痞气，心腹胀满，癖气聚滞不

快。

71723 消痞丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《经验秘方》。

【组成】南星 紫芫花 霍山自然铜各等分

【用法】上为细末，醋煮荞麦面糊为丸，如梧桐子大。每服四五丸，食后生姜、橘皮汤送下；温水亦得。

【主治】一切积聚，冷物酒伤，心腹闭闷。

【宜忌】大忌猪、羊血。

71724 消痞丸

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】枳实一两 白术(炒)一两 缩砂五钱(炒) 香附一两(炒) 桂九分 半夏(制)七钱 黄芩七钱(炒) 青皮七钱(炒) 红花八钱 甘草三钱 山楂肉二两 木瓜五钱

【用法】上为末，神曲一半，炼蜜一半，打糊为丸服

【主治】小儿瘕癖五积。

71725 消痞丸

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】鸡蛋五个 阿魏五分 黄蜡一两

【用法】铜勺内煎化，分作十块。每服一块，早晨滚汤送下。或腹痛，解出如胶漆之物自愈。

【主治】男妇痞块。

71726 消痞丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生香附(醋炒)四两 延胡索(醋炒)一两半 归尾二两 川芎 红花 浮海石 瓦楞子(火煅，醋淬)各一两

【用法】上为末，醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸。

【主治】积久成痞，痞散为臌者。

71727 消痞丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】阿魏 水红花子 三棱 莪术 肉桂各等分

【用法】上药为末，掺膏药内贴之。

【功用】消痞。

71728 消痞汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】陈橘皮(汤浸去白，焙) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 白术 槟榔(锉)各二两 半夏(汤洗七遍，炒令干) 人参各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分(拍碎)，同煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒痞满，心腹妨闷，不能食。

71729 消痞汤

《兰室秘藏》卷上。即《内外伤辨》卷下“木香化滞汤”之异名。见该条。

71730 消痞汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】二陈汤 姜连 山楂 木香 青皮 砂仁

【主治】膈间坚而软，无块者。

71731 消痞膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】三棱 蓬术 穿山甲 木鳖仁 杏仁 水红花子 萝卜子 透骨草(晒干) 大黄各一两 独头蒜四个

【用法】上用香油一斤，入前药十味，煎油成，以飞丹收之，后下细药真阿魏、乳香、没药各一两，麝香三钱，搅匀待冷，倾水中浸数日，用瓷瓶收贮，勿使泄气。用时以白布或坚白纸摊贴，八九日一换。或见大便去脓血勿以为异，亦有不去脓血而自愈者。若治泻痢，可贴脐腹。凡贴瘕积痞块，先用荞麦面和作一圈，围住患处四边，其块上放皮消二三两，盖厚纸以熨斗熨，令热气内达，然后去消，用膏药贴之。

【主治】瘕积痞块，泻痢。

71732 消痞膏

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】陀僧六两 羌活 蔓花子 阿魏各五钱 山甲三钱

【用法】用香油一斤半熬膏。摊布上，加麝

香贴。内用蓼花子三钱(研末),烧酒二斤泡,常服。

【主治】积聚难化,兼治痞满。

71733 消痞膏

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】朴消 蒜头(杵)各五钱 大黄 急性子各三钱 三棱 莪术各四钱 乳香(制) 真阿魏 没药(制)各二钱

【用法】将三棱、莪术、大黄、急性子研末。用脂麻油四两,煎蒜头、朴消及药末,煎好去蒜头,下黄丹二钱。候已成膏,以乳香、没药、阿魏三味研粉加入,再加麝香二分,搅匀,贮有盖瓦器内,俟三两日,火气去净。以白布或厚油纸摊贴,白天日一换。或见大便有脓血勿以为异,亦有不下脓血者。

【主治】积聚痞块。

【宜忌】忌房事及一切生冷物。

71734 消痞膏

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】巴豆仁一钱 甘草二钱 甘遂二钱 白信一钱五分 香附二钱 陀僧一钱 阿魏二钱 蜈蚣一条 羌活二钱 水红花子二钱 急性子三钱 原寸二分

【用法】上为细末,掺于膏药上贴之。可渐消去。

【主治】胸脘、胁肋并腹左右之内,有块坚硬作胀攻痛,日久不消者。

71735 消痞膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】香油半斤 密陀僧三两 阿魏二钱五分 水红花子一钱五分 麝香一钱五分 羌活五钱

【用法】先将羌活、水红花子熬枯去滓,熬至滴水成珠,入僧、魏、麝令匀。或作末药摊膏用。

【功用】软坚。

【主治】痰痞、痰块。

71736 消痛丸

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】干漆半两 良姜一两 三棱半两 斑蝥三个(炒)

【用法】上药加醋一升煮干,焙,为末,醋糊为丸。每服三十丸,醋汤送下;姜汤亦可。

【主治】妇人腹中常痛,上下不定,经年积血。

71737 消滞丸

《圣济总录》卷一六八。为《幼幼新书》(古藉本)卷十四引《婴童方》“雀粪丸”之异名。见该条。

71738 消滞丸

【方源】《卫生宝鉴》卷四。

【组成】黑牵牛二两(炒末) 五灵脂(炒) 香附(炒)各一两

【用法】上为末,醋糊为丸,如小豆大。每服三十丸,食后生姜汤送下。

【主治】①《卫生宝鉴》:一切所伤,心腹痞满刺痛,积滞不消。②《普济方》引《德生堂方》:妇人血气心腹疼,大便秘结。

71739 消湿散

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】牵牛子半斤(炒,取末二两) 赤茯苓(去黑皮) 木香 陈橘皮(汤浸去白,焙)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,煎葱白汤调下,不拘时候。

【功用】利水道。

【主治】伤寒瘀热在内,湿气郁而不散,熏发肌肉,小便不利,身体发黄。

71740 消渴丹

【方源】《活幼心法》卷末。

【组成】红花子

【用法】上为末。煎服。

【主治】大渴证。

71741 消溃散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】龟版(炙)一两 乳香三钱 没药三钱 黄连三钱 冰片五分 麝香一分 红粉底三钱

【用法】上为细末,过罗装瓶,每瓶重一钱。

敷于患处，或以硃砂膏贴之，每日一换。

【功用】活血消肿，化腐生肌。

【主治】诸疮溃后，破流血水，肿痛，久不溃脓。

71742 消寒饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术 人参各五钱 肉桂 肉豆蔻 甘草各一钱

【用法】水煎服。一剂即止。

【主治】终日腹痛，手按之而宽快，饮冷则痛剧。

71743 消蛾散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】薄荷二十两 青黛二十两 僵蚕二十两 白矾二十两 皮消二十两 黄连二十两

【用法】上为粗末，用猪胆汁二百个浸透晒干，共研为细末。每十六两细粉，兑冰片四钱，共研混合均匀。每用一二分，吹入喉内，一日三四次。

【功用】清火利咽，消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，单双乳蛾，口噤难开，汤水不下。

【宜忌】忌食辛辣食物。

71744 消愁汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍一两 当归一两 薏苡一两 玄参 柴胡各一钱五分 丹皮三钱 地骨皮五钱 白芥子一钱 熟地一两

【用法】水煎服。

【功用】补肝木而兼补肾水，开郁达郁。

【主治】干血癥。尼僧、寡妇、失嫁之女，丈夫久出不归之妻妾，相忍郁结，欲男子而不可得，内火暗动，燥干阴水，肝血既燥，必致血枯经断，朝热夜热，盗汗鬼交。日复一日，年复一年，饮食懈怠，肢体困倦，肌肤甲错，面目暗黑。

71745 消解散

《东医宝鉴·杂病篇》卷八。即《回春》卷五“消毒散”。见该条。

71746 消解散

【方源】《痘科金镜赋集解》卷二。

【组成】连翘七分 牛蒡七分 桔梗四分 山楂一钱 木通六分 蝉衣四分 川芎四分 升麻五分 葛根五分 防风四分 荆芥四分 前胡五分 紫草六分 甘草六分 黄连（酒炒）六分 黄芩（酒炒）六分

【用法】上为散。如小儿不能服散，用水煎服。

【功用】清火解毒。

【主治】痘未出，或已见点，欲出未出，或出不快，气血平和，身热烦渴，小便赤，大便秘者。

71747 消瘀饮

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归 芍药 生地黄 桃仁 红花 苏木 大黄三钱 芒消三钱 甘草

【用法】上锉一剂。水一钟半，煎至八分，入大黄煎，再入芒消。温服。

【主治】瘀血腹痛。

【备考】方中除大黄、芒消外，余药用量原缺。

71748 消瘀膏

【方源】《中医伤科学》。

【组成】大黄一份 梔子二份 木瓜四份 蒲公英四份 姜黄四份 黄柏六份 蜜糖适量

【用法】上为细末，水、蜜各半调敷。

【功用】祛瘀，消肿，止痛。

【主治】损伤瘀肿疼痛。

71749 消痰丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】皂荚（去皮，生用） 天南星（生用） 干薄荷叶 白附子（生用）各一两 半夏（生用）二两 人参三分 白矾（生用） 防风（去叉）各半两

【用法】上为末，以生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后、临卧生姜汤送下。

【主治】风痰头目眩晕，神思昏愤。

71750 消痰丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】黑牵牛四两半(生,半炒) 槐角子 青皮(去白)各半两 半夏(汤洗七次,焙干)一两 皂角(不蛀肥者,去皮子,涂酥炙黄)二两

【用法】上为细末,生姜面糊为丸,如小豆大。每服十五至二十丸,食后生姜汤送下。

【主治】风胜痰实,喘满咳嗽,风气上攻。

71751 消痰丸

《普济方》卷一六六。为《圣惠》卷五十一“木香丸”之异名。见该条。

71752 消痰丸

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】山甲(炙) 大黄 明矾各十六两 杏仁霜 当归身各八两 川芎四两

【用法】上为细末,水法为丸。每服三钱,白汤送下。

【功用】痰患初起可消,已成脓者服之减轻。

71753 消痰汤

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】白茯苓五钱 海藻 半夏 贝母 白芥子 天南星 人参 桔梗各三钱 昆布 生甘草各一钱 附子一分

【用法】水煎服。

【主治】瘰疬。

71754 消痰散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】白芥子三钱 茯苓三钱 陈皮三分 甘草一钱 丹皮二钱 白芍二钱 天花粉八分 薏仁五钱。

【用法】水煎服。

【主治】痰之久而成老痰者。

71755 消痰煎

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】陈皮 半夏 山楂 柴胡各八分 甘草三分 青皮 枳实各七分 苍术 厚朴各六分

【主治】疟疾痰多者。

71756 消醒丸

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】木香 茯苓 橘红 槟榔 三棱 蓬术 香附子 苍术 厚朴 干葛根各一两 官桂 缩砂仁 甘草(炙)各半两

【用法】上为末,神曲打糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前白汤送下。

【主治】酒积腹疼。

71757 消管丸

【方源】《外科全生集》(武昌节署本)卷四。

【组成】苦参四钱 川连(酒炒)二两 当归 槐花 萆薢各一两 五倍子五钱

【用法】上为细末,用小鳖二个(约八九斤),真柿饼四钱,二味共煮,以白捣烂,入前药末为丸。每服四钱,空心开水送下。

【主治】痔漏。

【备考】本方方名,原书潘敏德堂重刻本作“双鳖丸”。

71758 消管丸

【方源】《医方易简》卷九。

【组成】胡黄连(炒,取净末)一两 穿山甲(麻油炒黄色,取净末) 石决明(煅,取净末) 净槐米(微炒,取净末)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。服追管丸后再服此丸。早、晚各服一钱,清米汤送下,至重者四十日可愈。

【主治】一切肠脏痔毒成管成漏。

【加减】如疮口四边有硬肉突出者,可加蚕茧二十个(炒,研细末),和入前药内,为丸。

71759 消管方

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】消管錠(《外科证治全书》卷五)。

【组成】角刺尖(炙) 柘树膜(各净末)五钱(炙) 红腹金钱鳖(炙,净末)三钱 蟾酥 榆面各一钱

【用法】上为极细末。临用以棉纸作条子,量其管之深浅,以津拌药末卷上,塞入管中。

【主治】漏管。

71760 消管錠

《外科证治全书》卷五。为《外科全生集》卷

四“消管方”之异名。见该条。

71761 消腐散

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】藁本 槐花 当归 白芷 升麻 防风 生甘草 地骨皮 川芎 细辛 薄荷 各一钱

【用法】水煎去滓，温含口中，冷则吐之。

【主治】口内及喉间白腐，并治一切牙痛。

【加减】牙痛重者，加生姜三片，黑豆三十粒，煎服；细辛、升麻或减半用。

71762 消瘟丹

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】辰砂（研为极细末，水飞过） 丝瓜（近蒂者三寸，烧存性，为末）各等分

【用法】上为末。周岁以下每服一钱至一钱二分，一岁以上每服二钱，用蜜调下。

【功用】预防痘疮。

【主治】未曾出痘及临出者。

71763 消瘟散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】当归 川芎 陈皮 枸杞 桔梗（井水炒）各五分 黄连（姜汁炒）一钱 红花子二钱 木通（去皮） 白芍各六分 防风四分 甘草 升麻 花粉 荆芥各三分

【用法】上为末。生姜为引，空心服，间三日再服。

【功用】稀痘。

71764 消癥汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍一两 白术 鳖甲各五钱 甘草 郁金各一钱 枳壳五分 天花粉 丹皮 香附各二钱 茯苓 巴戟各三钱 白豆蔻二粒 广木香五分

【用法】水煎服。

【主治】饮食之时，忽遇可惊之事，遂停滞不化，久成癥瘕者。

71765 消漏丸

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地 苦参 银花 地榆 槐米 胡黄连 川柏 龟版

【主治】湿热盛，成痔漏。

71766 消瘤丹

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】白术三两 茯苓十两 人参三两 陈皮三钱 生甘草一两 薏仁五两 芡实五两 泽泻五两 半夏五两

【用法】上各为末，米饭为丸。常服自消。

【主治】诸瘤。

71767 消瘤丹

《青囊秘传》。为《圣济总录》卷一二五“天南星膏”之异名。见该条。

71768 消瘤丹

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】海藻三钱 海带三钱 贝母三钱 浮石四钱 蛤粉三钱 赤小豆三钱 乳没各二钱 昆布三钱 月石二钱 针砂二钱 夏枯草三钱 甘遂二钱

【用法】晒干为末。以葱汁、醋、蜜和敷。

【功用】消瘤。

71769 消瘤酒

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】万州黄药子（真者）半斤

【用法】用好酒一斗入药，封瓶，以糠火煨一周时，闻瓶口香气外出，瓶口有津即止，火不可太猛，待酒冷时饮。每饮一杯。不令绝酒气，三五日觉消，即停饮勿服。

【主治】瘰癧。

71770 消磨散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】蓬术 三棱 陈皮 山楂 草果（去壳）各一两

【用法】上为末。每服二钱，姜汤调下。

【主治】小儿诸食所伤，以致肚腹膨胀，面色黄瘦。

71771 消瘰丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【异名】消癧丸（《疡医大全》卷十八）。

【组成】玄参（蒸） 牡蛎（煨，醋研） 贝母（去心，蒸）各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，开

永送下，一日二次。

【功用】《中医方剂临床手册》：消瘰养阴，化痰软坚。

【主治】①《医学心悟》：瘰癧初起。②《中医方剂临床手册》：痰核。

【宜忌】宜戒恼怒，断煎炒，及发气、闭气诸物，免致脓水淋漓，渐成虚损。

【方论选录】《中医方剂临床手册》：方用玄参滋阴降火，苦咸消瘰；贝母化痰消肿，解郁散结；牡蛎咸寒，育阴潜阳，软坚消瘰。合而用之，对瘰癧早期有消散之功；病久溃烂者，亦可应用。

【备考】本方改为汤剂，名“消癧汤”（见《外科真诠》）。

71772 消瘰丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】牡蛎（煅）十两 生黄耆四两 三棱二两 莪术二两 朱血竭一两 生明乳香一两 生明没药一两 龙胆草二两 玄参三两 浙贝母二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，用海带五钱，洗净切丝，煎汤送下，一日二次。

【主治】瘰癧。

【方论选录】此方重用牡蛎、海带，以消痰软坚，为治瘰癧之主药。恐脾胃弱者，久服有碍，故用黄耆、三棱、莪术以开胃健脾，使脾胃强壮，自能运化药力，以达病所。且此证之根在于肝胆，而三棱、莪术善开至坚之结。又佐以血竭、乳香、没药，以通气活血，使气血毫无滞碍，瘰癧自易消散也。而犹恐少阳之火炽盛，加胆草直入肝胆以泻之，玄参、贝母清肃肺金以镇之。且贝母之性，善于疗郁结利痰涎，兼主恶疮。玄参之性，《名医别录》谓其散颈下核，《开宝本草》谓其主鼠瘻，二药皆善消瘰癧可知。

71773 消瘰膏

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生半夏一两 生山甲三钱 生甘遂一钱 生马钱子四钱（剪碎） 皂角三钱

朱血竭二钱

【用法】上药前五味用香油煎枯去滓，加黄丹收膏，火候到时，将血竭研细掺膏中，熔化和匀，随疮大小摊作膏药。临用时，每药一贴加麝香少许。

【功用】消瘰癧。

【临证举例】友人之女年五岁，项间起瘰癧数个，年幼不能服药，为制此药，贴之全愈。

71774 消瘰汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】海藻（洗） 龙胆草 海蛤粉各二两 通草 昆布（烧存性） 枯白矾 松萝各一两 半夏二两五钱 麦曲一两五钱 白芷一两

【用法】上为末。每服五钱，酒煮服。

【主治】瘰癧。

【宜忌】忌食甘草、虾、鱼、猪肉、五辛、诸毒等物。

71775 消瘰酒

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】昆布三钱 海藻五钱 沉香 雄黄各一钱（研末） 海螵蛸二钱

【用法】上咬咀，用好酒一升，汤煮，或浸十余日亦可饮。每服一二钟，不拘时候。

【主治】瘰癧。

71776 消瘰散

【方源】《扁鹊心书·神方》

【组成】全蝎三十个（去头足） 猪羊膑（即膝眼骨）各三十个（炙枯） 枯矾五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，饴米糖拌吞，或茶任之。

【主治】气瘰。

71777 消瘰散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】海藻（酒洗） 海带（酒洗） 昆布（酒洗） 海马（酒炙） 海红蛤 石燕（各煅） 海螵蛸各一两

【用法】上为末。清茶送下。

【主治】瘰气。

71778 消瘰散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】海藻一钱 龙胆草一钱 昆布五分 土瓜根二钱 半夏一钱 麦面一撮 甘草一钱 干姜五分 附子一片

【用法】水煎服。十剂必散。

【主治】瘰。

71779 消瘰膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】鲫鱼一尾 血余（鸡子大）一团 猪汁油一斤。

【用法】煎枯去滓，加黄蜡一两，熔化成膏。涂之。

【主治】瘰疽，瘰疽。

71780 消糖散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】皮消 黑糖各四两

【用法】入大碗内，水炖数滚，澄清去滓。滚黄酒冲服，尽量为度。

【主治】气胀。

71781 消翳丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】朱砂（研） 指甲末（水净洗，拭干，用木贼草打，取细末）各等分

【用法】上为极细末，以露水搜为丸，如芥子大。每用一丸，于夜卧时以新笔蘸水点在眼内，至中夜更点一丸。

【主治】小儿斑疮，眼生障翳。

71782 消翳散

【方源】《医学纲目》卷十三。

【组成】川芎 羌活 旋覆花 防风各二两 甘草 苍术（米泔浸一宿，去皮，晒干，不见火） 楮实 楮叶（并八月采，阴干）各一两 甘菊花 枳实 蝉蜕 木贼各一两

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下，早食后、临卧各一次。

【主治】暴赤眼。

【宜忌】忌湿面及酒。

71783 消翳散

《医学纲目》卷十三。为《兰室秘藏》卷上“龙胆饮子”之异名。见该条。

71784 消翳散

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《大方》。

【组成】芸苔菜（晒干）

【用法】上为细末。每点少许于目中，合目少时。

【功用】通透并去障翳。

【主治】目内翳。

71785 消癌片

【方源】《肿瘤的诊断与治疗》。

【组成】红升丹 琥珀 山药 白及各300克 三七620克 牛黄180克 黄连 黄芩 黄柏各150克 陈皮 贝母 郁金 蕲蛇各60克 犀角 桑椹 金银花 黄耆 甘草各90克

【用法】制成片剂，每片0.5克。每服1片，一日2~3次，饭后服。一个月为一疗程，4~6月为一治疗期，每疗程后停药一周左右。

【功用】活血凉血，解毒消癌。

【主治】舌癌、鼻咽癌、脑癌、食道癌、胃癌、骨肉瘤、乳腺癌、宫颈癌等。

【加减】如气虚，加用四君子汤；血虚，加用四物汤；气血俱虚者，二方合用。

【宜忌】服药期间，忌食蒜、葱、浓茶、鲤鱼等。

71786 消癖丸

《圣济总录》卷七十三。为《圣惠》卷四十九“皂荚丸”之异名。见该条。

71787 消癖丸

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】牵牛子一两（半生，半炒） 皂荚（肥者）三挺（烧令烟尽为度） 巴豆（去皮心，研出油）夏秋半两春冬一两

【用法】上药除巴豆外，为末，后入巴豆，再同研匀，用粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，橘皮汤送下。如常服，为丸如粟米大。每服三丸，茶送下。

【主治】小儿乳癖积块。

71788 消癖丸

【方源】《普济方》卷三九一引《幼幼新书》。

【组成】朱砂(研细) 杏仁各一分(汤浸, 去皮尖双仁, 别研如膏) 巴豆霜半分 鳖甲(醋涂炙令黄, 去裙襴) 犀角屑各半两

【用法】上为末, 入巴豆、杏仁研令匀, 炼蜜为丸, 如黄米大。百日儿每服一丸, 乳汁送下; 三四岁儿每服三丸, 薄荷汤送下。

【主治】小儿癥癖百病, 疳瘤, 腹胀黄瘦, 发渴不常, 客忤疳痢, 及吐逆不定, 心腹多痛, 惊风天钓。

71789 消癖丸

【方源】《直指》卷十二。

【异名】芫花丸(《医学入门》卷七)、消癖逐水丸(《保命歌括》卷二十三)。

【组成】芫花(炒) 朱砂(研细) 各等分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如小豆大。每服十丸, 浓煎枣汤送下。

【主治】疔母, 停水结癖, 腹胁坚痛。

71790 消癖丸

【方源】《普济方》卷三九一。

【组成】木香 人参 白术 白茯苓 当归各三分 枳壳(煨) 陈皮(去白) 三棱(炮) 莪术(炮) 桃仁(炒, 去皮) 麦芽(生) 香附子(炒, 去苗) 各三两 川楝肉三个 豆蔻(煨) 三个 缩砂仁一两 腻粉(炒) 一钱 全蝎三钱 代赭石三钱(火煨, 醋淬) 丁香二钱 白豆蔻肉一钱 阿胶三钱(炒) 五灵脂一钱 半夏(生) 南星(生) 各三钱 白姜(炮) 三钱 巴豆三钱(去油) 大曲饼五钱 厚朴三钱(姜制)

【用法】上为末。用甘遂、芫花各三钱(醋浸一宿, 焙, 为末) 入前药内。又将硃砂三钱(水澄去泥土) 瓦茶瓶上盏内熬成膏子, 再入芫、遂、醋, 同膏子煮面糊为丸, 如粟米大, 朱砂为衣。空心肉汁吞下。

【主治】小儿癖气。

【宜忌】一切药内有甘草者不可服, 忌三日。

71791 消癖丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】人参 陈皮 三棱 莪术 木香

黄连 砂仁 鳖甲 枳实 夜明砂 使君子 干蟾 半夏曲 麦芽 海昆布

【用法】上为末, 酒糊为丸, 如麻子大。米饮送下。

【主治】疔后腹中有癖块, 寒热不清者。

71792 消癖丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】三棱 莪术(各醋浸, 炒) 陈皮 枳壳(麸炒) 厚朴(姜汁炒) 山茱萸 使君子 夜明砂 黄连(炒) 木香 干姜(炒) 各二两 海藻(洗净) 半两 神曲 麦蘖 半夏曲各二钱 干蟾(炙) 九肋鳖甲(醋炒) 各三钱

【用法】上为末, 酒煮面糊为丸, 如麻子大。米饮送下。

【主治】疔母、食癥、痰癖、五饮成癖。

71793 消癖丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】人参 白术 白茯苓 陈皮 青皮 厚朴(姜汁炒) 枳实(麸炒) 半夏曲 砂仁 神曲 麦芽(俱炒) 各二钱 鳖甲(九肋, 醋炙) 三钱 三棱(酒煨) 莪术(煨) 木香 各一钱半 肉桂 干姜(炒) 各一钱 黄连三钱

【用法】上同姜炒, 为丸如黍米大。每服二十丸至五十丸, 米饮送下。

【主治】痞在胁下, 面黄肌瘦, 午后发热似疟者。

71794 消癖酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】红花五钱 当归三两 苘麻嫩根十两

【用法】用好酒十斤, 煮三炷香, 埋土内三日, 取出服之, 十日全消。

【主治】癖疾。

71795 消癖散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鳖甲(醋炙) 每一岁用一钱 全蝎三个(去头足, 焙干) 雄黄二分

【用法】上为末。用脂麻一撮(略炒), 沙

糖拌，五更时送下。十岁服十剂，二十岁服二十剂。

【主治】癖。

71796 消癖膏

【方源】《古今医鉴》卷十三引张南川方。

【组成】香油一斤 桃一两 榆二两 椿一两 槐一两 柳一两 柏枝一两 楮一两 猪鬃四两 血余一两 水红花穗一斤(上药入油内熬焦去滓，又入后药) 黄连一两 黄芩一两 黄柏一两 栀子一两 大黄一两 连翘一两 川乌一两 两头尖一两 川芎一两 防风一两 荆芥一两 木鳖子一两 薄荷一两 苍术一两 苦参一两 穿山甲一两 当归尾一两 蓖麻仁一两(上药入油内熬焦捞出，称前油。如油一两，入黄丹五钱，熬至滴水成珠，离火待温，入后细药) 阿魏一钱 血竭一钱 芦荟一钱 硼砂一钱 硃砂一钱 乳香一钱 没药一钱 胡黄连一钱 儿茶一钱 轻粉一钱 雄黄一钱 天竺黄一钱 蜈蚣三条(为末) 朝脑一两 麝香三分

【用法】临摊贴，药入麝，贴患处。

【主治】癖疾。

71797 消癖膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】穿山甲(焙，为末) 蕲艾 大蒜

【用法】入食盐、米醋共捣膏。贴患处，约两炷香。

【主治】癖疾。

71798 消蠱汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】金银花一两 蒲公英五钱 人参一钱 生甘草三钱 玄参五钱 青蒿五钱 天花粉三钱 葛根一钱 生地三钱

【用法】水煎一碗服。初起者，二剂即消。

【主治】蠱疽。

【宜忌】宜断欲、戒怒。

71799 消水肿膏

【方源】方出《本草纲目》卷四十六引《仇远稗史》，名见《杂病广要》。

【组成】田螺 大蒜 车前子各等分

【用法】上捣膏。敷贴脐上。水从便旋而出。

【主治】水气浮肿。

【临证举例】水肿 象山县民病此，得是方而愈。

71800 消水毒饮

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】吴茱半升 生姜 犀角 升麻 陈皮各一两 乌梅七个

【用法】用水七碗，煎至二碗，分二服。

【主治】水毒。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“消水毒饮子”。

71801 消水神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】牵牛三钱 甘遂三钱

【用法】水煎一服。

【主治】水肿。

71802 消石大丸

【方源】《千金》卷十一。

【异名】大消石丸(《三因》卷九)、消块丸(《丹溪心法》卷三)、千金消石丸(《准绳·类方》卷二)、夹钟丸(《家塾方》)。

【组成】消石六两(朴消亦得) 大黄八两 人参 甘草各二两

【用法】上为末，以三年苦酒三升置铜器中，以竹箸拄器中，一升作一刻，凡三升作三刻，以置火上，先纳大黄，常搅不息，使微沸尽一刻，乃纳余药，又尽一刻，有余一刻，极微火使可丸如鸡子中黄。欲下病者用二丸，若不能服大丸者，可分作小丸，不可过四丸也。欲令大，不欲令细，能不分为善。若入羸者可少食，强者不须食，二十日五度服，其和调半日乃下。若妇入服之，下者或如鸡肝，或如米汁正赤黑，或一升，或三升。下后慎风冷，作一杯粥食之，然后作羹臠自养，如产妇法，六月则有子。

【主治】十二癥瘕，及妇人带下，绝产无子。

【宜忌】禁生鱼、猪肉、辛菜。

71803 消石大丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】消石十二两(熬之令干) 蜀椒一升二合(去目闭口;汗) 水蛭一百枚(熬) 虻虫二两半(去翅足,熬) 大黄一斤 茯苓六两 柴胡八两(去苗) 芎藭五两 蛭蟪三十枚(熬)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸,空腹以饮送下,一日三次,五日进十丸,此皆不下,自此以后任意加之,一日可数十丸。与羊脂自补,若利当益下之,勿于圆。

【主治】男子女人惊厥口干,心下坚,羸瘦不能食,喜卧,坠堕血瘀,久咳上气胸痛,足胫不仁而冷,少腹满而痛,身重目眩,百节疼痛,上虚下实。又主女人乳余疾带下,五脏散癖,伏热,大如碗,坚肿在心下,胸中津液内结,浮肿膝寒,蛊毒淫跃,若渴大虚。

【加减】若女人月经闭,加桃仁三十枚(去皮尖双仁,熬)。

【宜忌】慎风冷。

71804 消石神丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】熟地三两 茯苓五两 薏仁五两 车前子五两 山茱萸三两 青盐一两 骨碎补二两 泽泻三两 麦冬五两 芡实八两 肉桂三钱

【用法】上为末,蜜为丸。早、晚滚水吞下各一两。

【主治】石淋。小便中溺五色之石,未溺之前痛甚,已溺之后,少觉宽快。

71805 消石粉散

【方源】《理渝》。

【组成】薄荷 连翘 牛子 荆芥 防风 羌活 独活 天麻 川芎 白芷 细辛 柴胡 升麻 元参 生地 当归 赤芍 蒲黄 郁金 黄芩 黄柏 黑山栀 胆南星 龙胆草 贝母 知母 桔梗 枳壳 丹皮 地骨皮 菊花 桑叶 蓉叶 柏叶 蓖麻仁 木鳖仁 五倍子 龟版 鳖甲 山甲 羚羊 大黄 甘草 凤仙各三钱

【用法】煎去滓,人朴消一斤,芒消、生石膏、熟石膏各八两,寒水石、滑石、人中白(煨)

各四两,元明粉二两,明矾、硼砂、礞石(煨)、磁石(煨)、雄黄、青黛(漂)、海石(煨)、轻粉、铅粉(炒)、黄丹(炒)各一两,黄连、朱砂各五钱,犀角二钱,花粉一斤,研细搅匀。治火毒,掺清阳膏贴,酌加冰片、麝香、西黄之类,并可用鸡清白蜜调敷。

【主治】火毒。

71806 消块神丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】蚯蚓粪一两 炒水银一钱 冰片五分 硼砂一分 黄柏五钱(炒) 儿茶三钱 麝香五分

【用法】上为细末,研至不见水银为度。将此药末用醋调成膏,敷在患处。

【主治】一切有块者。

71807 消疔毒膏

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】松香二十两(用桑柴炭煎汁,澄清入松香煮烂,取出纳冷水中少时,再纳灰水中煮,以色白为度) 乳香三两(每两用灯心二钱五分同炒去油,研细末) 没药三两(研制同上) 铜绿五两(研细;过绢筛,再研至无声为度) 百草霜五两(研细,过绢筛,再研至无声为度) 黄蜡十两(刮取粗片) 白蜡二两(切粗末) 麻油六两

【用法】用桑柴火先将麻油入锅熬滚;次下松香,候稍滚;三下白蜡,候稍滚;四下黄蜡,候稍滚;五下乳香,候稍滚;六下没药,候稍滚;七下铜绿,候稍滚;八下百草霜,再滚数次。于锅内太老则不适用,并少功效。冷透搓成如桂圆核大,藏瓷瓶内。临用以一丸捻扁,勿见火,或呵软,或热水炖软,贴患处。顷刻止痛,次日肿消,已破烂者亦效。

【主治】疔毒,痈疽。

71808 消乳岩丸

【方源】《疡医大全》卷二十。

【组成】夏枯草 蒲公英各四两 金银花 漏芦各二两 山茨菇 雄鼠粪 川贝母(去心) 连翘 金橘叶 白芷 甘菊花 没药(去油) 瓜蒌仁 乳香(去油) 茜草根 甘

草 广陈皮 紫花地丁各一两五钱 (一方去瓜蒌仁, 加天花粉、桔梗、广胶, 用夏枯草熬膏为丸。)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸。每服二三钱, 早、晚食后送下。

【主治】乳岩。

【宜忌】戒气恼。

71809 消乳食丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】砂仁 陈皮 三棱 莪术 神曲 麦芽各五钱 香附一两

【用法】上为末, 糊为丸, 如麻子大。每服二十丸, 紫苏煎汤送下。

【主治】小儿乳积, 食积。

71810 消乳食丹

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】丁香 木香 青皮 肉豆蔻 三棱 莪术各等分

【用法】上为末, 糊为丸, 如麻子大。每服五丸, 米饮送下。

【主治】内伤乳食不化, 面黄腹胀, 泻如抱坏鸡卵臭者。

71811 消乳痰丸

【方源】《幼幼新书》卷十九引《刘氏家传》。

【组成】大半夏半两 (萝卜一个, 切头子大, 水一碗煮尽) 人参二钱

【用法】上焙, 为细末, 姜汁糊丸, 如绿豆大。每服二三十丸, 食后姜汤送下。宜常服。

【主治】小儿痰涎。

71812 消乳痰丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】大半夏半两 (切作骰子大, 用萝卜一个, 亦切作骰子大, 用水一碗, 煮尽为度, 不用萝卜) 人参二钱半 (去芦头, 取末, 焙干称)

【用法】上二味焙干, 同为细末, 生姜自然汁煮糊为丸, 如绿豆大。每服二十丸, 食后姜汤送下。

【主治】小儿乳食不化而痰多者。

71813 消胀饮子

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】猪苓 泽泻 人参 白术 茯苓 半夏 陈皮 青皮 厚朴 紫苏 香附 砂仁 木香 槟榔 大腹皮 木通 莱菔子 甘草各等分

【用法】上锉。加生姜五片, 大枣一枚, 水煎服。

【主治】胀蛊, 单腹胀。

71814 消炎3号

【方源】《中草药通讯》(1972; 2: 14)。

【组成】板蓝根 30 克 猫眼草 30 克 人工牛黄 6 克 硃砂 3 克 威灵仙 60 克 制南星 9 克

【用法】制成浸膏干粉。每服 1.5 克, 一日四次。

【功用】《古今名方》: 清热解毒, 通经活络。

【主治】食管癌。

71815 消炎合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 31 克 连翘 31 克 黄芩 9 克 桔梗 9 克 草河车 9 克 紫草 6 克 赤芍 9 克 生地 15 克 元参 15 克 大青叶 31 克 野菊花 31 克 蒲公英 31 克 当归 9 克 大黄 6~9 克

【用法】水煎, 内服。

【主治】口炎。

71816 消毒灯照

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】一二十年旧船底上石灰

【用法】生青桐油调, 将光青布照疮大小摊贴; 又用青布作捻, 蘸桐油点火, 在疮上打碎, 觉痒受打, 不论条数, 灰干换贴, 再打。知痛为度, 红退毒消。

【主治】一切痈疽发背, 无名肿毒, 及对口诸疮, 已溃未溃。

71817 消毒饮子

《明医指掌》卷六。为《活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

71818 消毒饮子

【方源】《金鉴》卷七十六。

【组成】白茯苓 生地 连翘(去心) 牛蒡子(炒,研) 红花 甘草(生) 犀角(镑) 木通 赤芍各一钱

【用法】加灯心二十根,水煎服

【主治】①《金鉴》:疗毒火证。②《青囊全集》:火疮。

71819 消毒饼子

《续易简》卷五。为原书同卷“龙蛻饼子”之异名。见该条。

71820 消食饭灰

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】木香 枳实(炒) 黑白丑 砂仁 各二两 六神曲(炒焦)六两 山楂(炒焦)四两 槟榔 青皮(炒) 鸡内金(炙)各二两 麦芽(炒)四两 陈皮二两 饭锅巴(炒焦)八十两

【用法】上为细末。每服一羹匙,温开水送下,或用糖拌服。

【主治】消化不良。

71821 消食膏酒

【方源】《千金》卷十五。

【异名】茱萸膏(《普济方》卷二十一)。

【组成】猪膏三升 宿姜汁五升 吴茱萸一升 白术一斤

【用法】捣茱萸、术为细散,纳姜汁膏中,煎取六升,温清酒一升,每服方寸匕,一日二次。

【主治】脾虚寒劳损,气胀噎满,食不下通,噎。

【方论选录】《千金方衍义》:白术益脾;茱萸温中;宿姜通神明,止噎气;猪膏以滋虚劳津血;清酒以行萸、术性味也。

71822 消热饮子

【方源】方出《圣惠》卷七十四,名见《妇人良方》卷十四。

【组成】葵子一合 川朴消二两

【用法】上为粗末。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠时气,六七日热甚,大小便不利。

71823 消痞口丸

《饲鹤亭集方》。为《集验良方》卷五“消痞丸”之异名。见该条。

71824 消痞神丹

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】雄黄三钱 麝香五分 胆星二钱 全蝎 僵蚕各三钱 巴豆(去油)五分

【用法】上为净末,神曲为丸,如菜子大。每服三丸,白汤送下。

【主治】小儿诸痞,肚大黄瘦,腹痛虫积。

71825 消梨饮子

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】消梨三颗(绞取汁) 酒一合 薄荷汁一合 生姜汁一合 竹沥一合

【用法】上药相和,煮三两沸,分三次温服,不拘时候,拗开口灌之。

【主治】中风口噤不开,心膈壅闷。

71826 消暑神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参半两 青蒿七钱 香薷三钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】中暑,发渴引饮。

【方论选录】此方之妙,妙在人参以固元气,而后青蒿始得以散其邪。虽青蒿一味,亦能解暑,似不必人参之助;然解暑而不补气,暑虽解矣,人必弱也。惟与参同用,则祛邪之中,而有补正之道,暑散而不耗散真气,自然奏功如响。方中况有白术以健脾,香薷以追热,又用之咸宜乎?

71827 消痞块汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆二钱 白术一钱 当归八分 川芎一钱 附子六分 三棱八分 莪术八分 独活八分

【用法】水煎服。

【功用】消痞块。

71828 消痞神丸

【方源】《回生集》卷上。

【组成】香附米二两(童便浸,炒) 砂仁七钱(炒) 枳实一两(炒) 陈皮一两

(炒) 半夏一两二钱(姜炒) 厚朴一两二钱(姜炒) 山楂肉二两 当归身四两 沉香八钱 木香五钱 乌药一两 白术一两(土炒) 神曲一两一钱(炒) 苍术一两二钱(炒) 麦芽一两二钱

【用法】上药共炒，为末，老米和为丸，如梧桐子大。每服二钱五分，空腹白滚汤送下。

【主治】痞积。

71829 消痞神膏

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】密陀僧六两 阿魏五钱 羌活 水红花子各一两 穿山甲三钱 香油一斤许

【用法】火候照常熬膏法，膏成时下麝香一钱，用布照痞大小摊贴。

【主治】积年恶痞。

71830 消痞核桃

【方源】《景岳全书》卷五十五。

【组成】莪术(酒洗) 当归(酒洗) 白芥子 急性子各四两(俱捣碎) 皮消 海粉各八两 大核桃百枚

【用法】先以群药入砂锅内，宽水煮一二沸，后入大核桃重五钱者百枚，同煮一日夜，以重一两为度，取起晾干，先用好膏药一个，掺阿魏一钱，麝香半分，量痞大小贴住，以热手磨擦，每空心服前桃一个，三日后二个，以至三个。服完后，须四物汤之类数贴即愈。

【主治】痞块。

71831 消渴痞丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连 青黛 干葛各一两 黄芩 大黄 黄柏 山梔 薄荷 藿香 厚朴 茴香各五钱 木香 辣桂各二钱半 牵牛二两

【用法】上为末，水丸如小豆大，小儿如麻仁大。每服十粒，温水送下。

【主治】中消，或挟诸血肠风，心胁胀满，呕吐痿弱，湿热积毒。

【宜忌】忌发热物。

【加减】自利者，去大黄、牵牛。

71832 消瘀神丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】乳香一钱 没药一钱 桃仁四十个 滑石三钱 广木香一钱 槟榔一钱 白芍五钱

【用法】神曲糊为丸。每服百丸，米饮送下。连服二日，即下秽物而愈。倘二日少痊，不全愈者，此瘀盛也，用大黄一钱，煎汤送前丸二百丸，无不愈矣。

【主治】痢久不止，日夜数十行，下如清涕，内有紫黑血丝，食渐减少，脉沉细弦促。

71833 消痰饮丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】干姜一两半(炮裂，锉) 赤茯苓一两半 白术四两 枳壳一两半(麸炒微黄，去瓤) 半夏一两(汤洗七遍去滑)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十粒，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】酒癖。饮酒停痰水，食不消化，呕逆，不欲闻食气，腹中水声。

71834 消痰饼子

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】瓜蒌仁 杏仁(各另研细) 海石 朴消(风化者) 桔梗各等分

【用法】上为极细末，用生姜自然汁和炼蜜为丸。不拘时候，徐徐噙化。

【主治】痰结喉中，燥不能出。

【备考】《张氏医通》有连翘。

71835 消横痃膏

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】鱼腥一两

【用法】水熬，入角皂末一两，捣泥，又入姜黄末二钱，麝香三分。摊贴疮，留顶。

【主治】便毒。

71836 消下破血汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】柴胡 川芎 大黄 赤芍药 当归 黄芩 五灵脂 桃仁 枳实 梔子 赤牛膝 木通 泽兰 红花 苏木 生地

【用法】水煎，加老酒、童便和服。

【主治】下膈被伤。

71837 消上瘀血汤

《杂病源流犀烛》卷三十。为《准绳·疡医》卷六“清上瘀血汤”之异名。见该条。

71838 消中分利汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】厚朴(炒) 山楂 神曲(炒) 麦芽(炒) 陈皮 猪苓 青皮 泽泻 大腹皮

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾虚，伤食作肿，善能饮食。

71839 消内灵砂丹

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】黄蜡一两 巴豆十四枚(去壳，作两片，入黄蜡内，熬巴豆黑为度)

【用法】上药去巴豆，将硝砂二钱，用水煮干，只用一钱重，仍入黄蜡，并再熬，就入朱砂末一二钱，以黄蜡红为度，候冷刮下，如用时旋丸。小儿三岁，只服十丸，如黍米大，大入服十丸，如大麻子大，白痢，白姜汤送下；赤痢，甘草汤送下，空心服。如病入身体凉，脉微弦细，皆是好症，便用此药止。如病入身上有冷热，初不可便止，先服前药十丸，次服五苓散加车前同煎，三服小便清，退尽热，方可再用前药止住。

【功用】去积滞。

【主治】泻痢。

71840 消化无形汤

【方源】《青囊秘诀》卷上。

【组成】金银花一两 当归一两 甘草三钱 天花粉三钱 通草一钱 紫背天葵五钱

【用法】水煎服。

【主治】乳痈。

71841 消风化毒汤

《痘疹全书》卷一。为《片玉痘疹》卷七“消风去火化毒汤”之异名。见该条。

71842 消风化毒汤

《景岳全书》卷六十三。为《痘疹心法》卷十二“消风化毒散”之异名。见该条。

71843 消风化毒散

【方源】《痘疹心法》卷二十一。

【异名】消风化毒汤(《景岳全书》卷六十三)。

【组成】防风 黄耆 白芍药 荆芥穗 桂枝 牛蒡子 升麻各等分 甘草减半

【用法】上锉。加薄荷叶七片，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《痘疹心法》：痘疮成脓时发痒者。②《准绳·幼科》：痘疮里虚，痒塌黑陷，发热。

71844 消风化痰汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】南星 半夏 赤芍 连翘 天麻 青藤 僵蚕(洗去丝) 苍耳子 金银花 天门冬 桔梗各七分 白芷 防风 羌活 皂角各五分 全蝎(去毒) 陈皮各四分 白附子 淮木通各一钱 甘草二分

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，食后服。

【主治】风热郁结，痰注不散，致生结核，或生项侧，在颈、在臂、在身，肿痛者。

【宜忌】忌食煎炒热物。

71845 消风化痰汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】川乌一钱(童便浸炒) 白术一钱五分 羌活一钱 细辛 甘草各五分 黄芩七分(酒浸)

【用法】上咬咀，水煎八分，食后热服。

【主治】风热夹痰，眼眶眉棱骨痛，眼不可开，昼静夜剧。

71846 消风玉容散

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】绿豆面三两 白菊花 白附子 白芷各一两 熬白食盐五钱

【用法】上为细末，加冰片五分，再研匀收贮。每日洗面，以代肥皂用之。内服疏风清热饮。

【主治】吹花癣，俗称桃花癣。初如痞瘤，或渐成细泡，时作痛痒，发于春月，妇女多有之。

71847 消风宁嗽汤

《嵩崖尊生》卷七(扫叶山房本)。即原书(锦章书局石印本)“消风宁嗽散”。见该条。

71848 消风宁嗽散

【方源】《嵩崖尊生》卷七(锦章书局石印本)。

【组成】桔梗 枳壳 半夏 陈皮 前胡 干葛 茯苓各一钱 苏叶一钱二分 杏仁 桑白皮各一钱 甘草四分

【用法】加姜、葱，煎服。

【主治】感冒鼻塞，咳嗽。

【加减】冬月，加麻黄一钱，取汗后，用加味二陈汤一剂。

【备考】本方方名，原书扫叶山房本作“消风宁嗽汤”。

71849 消风百解散

【方源】《局方》卷二(宝庆新增方)。

【异名】百解散(《保婴撮要》卷十)。

【组成】荆芥 白芷 陈皮(洗，去白) 苍术 麻黄(去节)各四两 甘草(炙)二两

【用法】上为细末。每服二大钱，用水一大盏，加生姜三片，乌梅一个，同煎七分，温服，不拘时候；或茶酒调下。

【主治】①《局方》(宝庆新增方)：四时伤寒，身体烦疼，四肢倦怠，行步喘乏，及寒壅咳嗽，鼻塞声重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，气急满闷者。②《保婴撮要》：感冒风邪，发热自汗。

【加减】欲发散邪风，入连须葱白三寸同煎。

【方论选录】《医方考》：伤风宜解肌，咳嗽宜利气，荆芥、白芷、麻黄，可以解肌；陈皮、苍术、甘草，可以利气。《经》曰：辛甘发散为阳。夫六物皆辛甘，则皆解散矣。

【备考】本方方名，《北京市中药成方选集》引作“百解发汗散”。

71850 消风百解散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】防风一两半 苍术一两(制) 羌活一两半 甘草五钱 白芷一两 川芎一两 荆芥一两半 柴胡一两 蝉衣一两半 陈皮一两半

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】风伤肺气，湿伏皮肤，遏郁不散，身热，白痧疹不出，脉弦者。

【方义】此方防风散肌表陷伏之风，羌活散皮肤百节之风，白芷散肌肉头面之风，俱能胜湿。而苍术又能燥湿强脾，盖脾属土，土强则自能制湿而生金，金生则肺气自旺，而风邪不致陷伏。更以荆芥散血分之风，川芎行血中之气，陈皮利气和胃，甘草和胃缓中，蝉衣善透皮肤而发痧疹也，水煎温服，使中外调和，则风湿化而痧疹自透，发热无不退矣。柴胡一味，疏腠升阳，古今不同，恐引动虚阳，则气急鼻煽，势所必至矣。

71851 消风百解散

【方源】《活人方》卷三。

【组成】干葛四两 杏仁二两五钱 荆芥二两五钱 防风二两 桔梗二两 前胡一两五钱 薄荷一两五钱 甘菊一两 枳壳一两 甘草五钱

【用法】上为细末。每服三钱，临睡白汤调下。

【主治】或冒风，或伤热，甚则热极生风，外则头疼脑胀，鼻塞流涕，内则咽干喉痛，痰凝烦嗽。

71852 消风托里散

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】荆芥 山梔 归身 川芎 芍药 黄耆 苍术 茯苓 滑石 桔梗 黄芩 大黄 防风 乌药 薄荷 连翘 石膏 木瓜 槟榔

【用法】姜水煎，加好酒二小杯，热服。先服乌药顺气散五帖后再服此方。不愈，再服蛇酒方。

【主治】麻疯，起初形如樱桃。

【加减】疼痛，加乳香、没药。

71853 消风导赤汤

【方源】《金鉴》卷七十六。

【组成】生地 赤茯苓各一钱 牛蒡(炒，研) 白鲜皮 金银花 南薄荷叶 木通各八分 黄连(酒炒) 甘草(生)各三分

【用法】上加灯心五十寸，水煎，徐徐服。

【主治】婴儿胎痱疮，又名奶癣。痒起白屑，形如癣疥。

71854 消风导赤汤

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】生地一钱 赤芍一钱 鲜皮一钱 牛子一钱 防风五分 银花一钱 木通五分 竹叶五分 甘草三分

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】奶癣。

71855 消风导赤汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 9 克 赤芍 9 克 牛蒡子 9 克 白鲜皮 9 克 银花 9 克 薄荷 6 克 木通 7 克 黄连 6 克 甘草 6 克

【用法】水煎，内服。

【主治】急性湿疹。

71856 消风住痛散

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】消风散 住痛散

【用法】消风散煎，送住痛散合服。

【主治】跌仆损伤。

71857 消风返正汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】羌活一钱 天麻八分 蝎尾五支 僵蚕一钱五分（炒） 贝母二钱 羚羊角一钱五分 石斛三钱 花粉二钱 麦冬二钱 黄荆叶五片

【主治】风从足太阳而来，兼扰阳明，筋脉牵掣，口眼喎斜。

71858 消风羌活汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】羌活（去芦头） 甘菊花 麻黄（去根节） 芎藭 防风（去叉） 石膏（研） 前胡（去芦头） 黄芩（去黑心）各三两 甘草（炙、锉） 枳壳（麸炒，去瓢）四两 白茯苓（去黑皮） 蔓荆实各半斤 细辛（去苗叶）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盂，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风气不和，头昏目眩，鼻塞声重，

语声不出，身体倦怠，肢节疼痛，痰壅咳嗽，寒热往来。

71859 消风败毒散

《医学六要·治法汇》卷五。为《医学正传》卷八“荆防败毒散”之异名。见该条。

71860 消风败毒散

【方源】《回春》卷八。

【组成】归尾 川芎 赤芍 生地黄 升麻 干葛 黄芩各一钱 黄连 黄柏 连翘 防风各八分 羌活 金银花 甘草各五分 蝉退二个

【用法】上锉一剂。水煎，热服。

【主治】风湿热毒，致生杨梅天泡，初起者。

【加减】初服加大黄二钱，芒消一钱半，通利恶物，去净后勿用。

71861 消风败毒散

【方源】《医方集解》。

【组成】败毒散 消风散

【主治】风毒瘾疹，及风水，皮水在表，宜从汗解者。

71862 消风败毒散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】白茯苓二钱 荆芥三钱 防风一钱半 白僵蚕三钱（酒炒） 苏薄荷一钱半 厚朴一钱 藿香一钱 全蝉蜕二钱（去土） 苦桔梗二钱 羌活一钱半 独活一钱半 前胡一钱半 紫苏叶八分 柴胡二钱 枳壳一钱 玄参三钱 皂角刺三个 甘草一钱 生姜三片

【主治】乳蛾。初起寒热壮盛，头痛背痛，面赤目赤，喉红口红，或牙关紧闭，颈外肿者。

71863 消风败毒散

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】海桐皮 川乌（炮） 丹皮 川芎 芍药 干姜 银花 肉桂 五加皮 白芷 前胡 黄耆 甘草 甘菊 人参 羌活 防风

【用法】加生姜，水煎，入好酒二小杯，热服。五帖后用藿香、白芷、前胡、甘草、黄

耆、海桐皮、甘菊、人参、羌活、防风、芍药、僵蚕、生姜，水煎服。

【主治】大麻风，形如鸡爪，手足动摇，遍身皆痒，指屈而不伸者。

71864 消风定痛散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】荆芥四钱 白芷 防风 细辛 金蝎 升麻 川芎各二钱 胆矾二分 朴消 青黛各八分

【用法】上为末。每用一指蘸药搽于牙上，嚼半时，有津吐出。

【主治】牙齿疼痛，风热攻注，龈肉肿闷。

71865 消风顺气丸

《医林绳墨大全》卷六。为《医方类聚》卷九十六引《千金月令》“大麻丸”之异名。见该条。

71866 消风胜湿汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】防风三钱 荆芥穗四钱 蜜麻黄三钱 草乌三钱 独活三钱 苏薄荷三钱 皂角刺二钱 细辛一钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】头顶肿痛，在头顶之上，或在督脉部位，或在太阳经部位，或在少阳经部位，肿痛一块，其痛与拔发相似，几不可忍者。

【方论选录】此方以防风为君；以独活、草乌通行之品搜寻肌肤为臣；以芥穗、薄荷、皂刺清扬之品直达头顶为佐；细辛直入巅顶，偕蜜麻黄，发而不猛，逐其风湿之邪从汗而解为使，甘草调和诸药。剂中并无利湿之药，方名胜湿者，以风药力猛，能使湿邪与风俱随汗而去，故以胜湿命名。

71867 消风养血汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】荆芥 蔓荆子 菊花 白芷 麻黄(去节) 桃仁(去皮尖) 红花(酒炒) 防风 川芎各五分 当归(酒洗) 草决明 石决明 白芍药(酒炒) 甘草各一钱

【用法】煎服。

【主治】眼痛赤肿。

【方论选录】①《医方考》：是方也，荆芥、菊

花、蔓荆、白芷、麻黄、防风、川芎可以消风，亦可以去热，风热去，则赤肿去矣；桃仁、红花、当归、芍药、草石决明可以消瘀，可以养血，亦可以和肝，瘀消则不痛，养血和肝则复明；乃甘草者，和诸药而调木气也。②《医方集解》：此足太阳、厥阴药也。荆芥、防风、麻黄、白芷、甘菊、蔓荆轻浮上升，并能消风散热；桃仁、红花、川芎、归、芍辛散酸收，并能养血去瘀；两决明皆除肝经风热，专治目疾，瘀去血活则肿消，风散热除则痛止。又目为肝窍，搜风养血，皆以和肝。加甘草者，亦以缓肝而止痛也。

71868 消风除湿汤

【方源】《保命歌括》卷十四。

【组成】苏叶 槟榔 香附 陈皮 白芷 桔梗 五加皮 牡丹皮 木瓜各三钱

【用法】分作四服，用水二盏，加生姜三片，花椒二十粒，灯心二十茎，煎一盏，空心热服。微汗佳。

【主治】风湿脚气。

71869 消风透痧汤

【方源】《温热经解》。

【组成】僵蚕三钱 淡豆豉三钱 苦杏仁三钱 蝉退一钱半 前胡一钱半 薄荷一钱 菊花二钱 甘草八分 瓜蒌皮一钱半

【主治】羊毛痧，神昏谵语，耳聋直视不能言。

71870 消风凉血汤

【方源】《喉科秘决》卷上。

【组成】白芍七分 黄芩一钱五分 鲜生地二钱 桔梗一钱 荆芥五分 防风六分 梔子五分 僵蚕四分 黄柏七分 黄连三分 甘草三分 归尾五分 花粉六分 银花五分 山豆根五分 升麻三分 薄荷三分

【用法】加生姜一片，水二碗，煎七分，空心服。先服泻肝通圣散，泻后再用此方。

【主治】风热喉蛾，初起牙关强闭，头面侧肿，咽津则碍，憎寒壮热。

71871 消风桑白散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】桑白皮 防风 荆芥 前胡 升

麻 僵蚕 蔓荆子 芎藭 蝉退 羌活 薄荷

【用法】水煎，食后服。

【主治】胞睑风赤湿烂，两睑粘睛。

71872 消风脱甲散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】番白草 红花 甘草 威灵仙 山梔 蝉蜕 连翘 皂角针 大风子肉 薄荷 风藤 金银花 冬瓜皮 木通 苍术各一钱 土茯苓四两

【用法】水三碗，煎二碗，二次服，用好酒一大杯过口，滓再煎服。

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛，腐烂作臭，气血壮实者。

71873 消风清热汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】防风 9 克 荆芥 9 克 蒺藜 6 克 蝉蜕 9 克 当归 9 克 赤芍 9 克 生地 12 克 川芎 6 克 桃仁 6 克 红花 6 克 银花 15 克 连翘 15 克 蛇蜕 3 克 生石膏 15 克 大赭子 6~15 克

【用法】水煎，内服。

【主治】荨麻疹。

71874 消风清热饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】荆芥 9 克 防风 9 克 浮萍 9 克 蝉衣 6 克 当归 9 克 赤芍 9 克 大青叶 9 克 黄芩 9 克

【功用】消风清热。

【主治】急性荨麻疹风热型，舌质红，苔薄布，脉细滑。

71875 消风清燥汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 防风 黄芩 黄连 天花粉 蝉蜕 苦参 灵仙各一钱 甘草五分

【用法】用水二钟，煎取八分，食远服。

【主治】癩风初起。

71876 消风清燥汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】当归 9 克 威灵仙 6 克 防风 9 克 虫蛻 9 克 川芎 9 克 黄连 6 克 花粉 6 克 苦参 9 克 白芍 6 克 生地 21 克 黄芩 21 克 生石膏 12 克 甘草 6 克

【用法】水煎，内服。

【主治】脂溢性皮炎。

71877 消风散火汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬一钱五分 麦冬一钱五分 元参二钱 茯苓二钱 桔梗一钱 柴胡一钱 薄荷一钱 蝉衣一钱 桑叶一钱 连翘一钱五分 牛蒡子三钱 蒺藜二钱 竹叶十片 黑芝麻三钱

【主治】风火上升，面红目赤，口燥咽疼。

71878 消风犀角散

《疡科捷径》卷下。为《外科正宗》卷四“消毒犀角饮”之异名。见该条。

71879 消风豁痰汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】黄芩（酒炒） 羌活 红花 半夏（姜制） 陈皮 白茯苓 甘草 独活 防风 白芷 家葛 柴胡 升麻

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】风寒挟痰，颈项强痛。

【加减】一方多加紫金藤。

71880 消水毒饮子

《东医宝鉴·杂病篇》卷九。即《医学入门》卷七“消水毒饮”。见该条。

71881 消石半夏丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】消石 半夏（汤洗七遍去滑，焙）各半两

【用法】上药先捣半夏为末，次入消石，同研令细，再入白面一两，三味拌匀，更罗过，滴水为丸，如绿豆大。每服二十粒，生姜汤送下。

【功用】化痰。

【主治】肺热，胸中痰实，咽喉不利。

71882 消石矾石散

【方源】《金匱》卷中。

【异名】消石散（《圣济总录》卷六十）、矾石

散(《鸡峰》卷九)、矾消散(《医学入门》卷七)、消矾散(《类聚方》)、矾石消散(《证治宝鉴》卷九)。

【组成】消石 矾石(烧)各等分

【用法】上为散。每服方寸匕,以大麦粥汁和服,一日三次。病随大小便去,小便正黄,大便正黑,是候也。

【主治】女劳疸。黄家日晡所发热,而反恶寒,膀胱急,少腹满,身尽黄,额上黑,足下热,因作黑疸,其腹胀如水状,大便必黑,时溇。

【方论选录】《金匱玉函经二注》:肾者,阴之主也,为五脏之根,血尽属之。血虽化于中土,生之于心,藏之于肝,若肾阴病,则中土莫得而化,心莫得而生,肝莫得而藏,荣卫莫得而行,其血败矣,将与湿热凝淤于肠胃之间。肾属水,其味咸,其性寒,则治之之药,必用咸寒,补其不足之水,泻其所客之热,荡涤肠胃,推陈致新。用消石为君,《本草》矾石能除固热在骨髓者,骨与肾合,亦必能治肾热可知也。大麦粥汁为使,引入肠胃,下泄郁气。大便属阴,淤血由是而出,其色黑。小肠属阳,热液从是而利,其色黄也。《金匱要略直解》:《内经》,中满者泄之于内。润下作咸,消石之苦咸,矾石之酸咸,皆所以泄中满而润下,使其小便黄而大便黑也。然消石主胃胀闭,涤蓄结;矾石主热在骨髓,而经言劳者温之,是方得无太峻峭?然所服者,方寸匕耳,和以大麦粥汁,正所以宽胃而益脾也。

【临证举例】急性病毒性肝炎 《山西医药杂志》(1978;4:47):杨某某,男,5岁,于1957年5月发病,发热恶心呕吐,腹胀腹痛,不思食,小便色黄,肝功检查:谷丙转氨酶710单位,黄疸指数30单位,麝浊20单位,麝絮+++ ,诊为急性病毒性肝炎。经中西医结合治疗延续至10月份,疗效不佳,来我小组就诊。面容消瘦,巩膜及皮肤黄染,周身发痒,腹胀纳差,小便色黄,肝于肋下3cm。确诊后,停服一切药物,改服本方(消石三份,矾石十份,取山药代大麦,炼蜜为丸,每丸重1.5g,每服1丸,一日三次,饭后服)。七天后,临床症状

消失,饮食增加,肝脾未触及,亦无压痛。连服15天后,再次肝功检查,谷丙转氨酶100单位以下,黄疸指数7单位,麝浊8单位,麝絮+。随访二年余,身体健康,发育良好。

【备考】本方方名,《证治宝鉴》引作“矾石消石散”。

71883 消虫神奇丹

【方源】《傅青主男女科》。

【组成】当归 鳖甲 地栗粉各一两 雷丸 神曲 茯苓 白矾各三钱 车前子五钱

【用法】水煎服。

【主治】虫臌。小腹痛,四肢浮肿而未甚,面色红而有白点,如虫食之状。

71884 消肉化毒丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】山楂三钱 枳壳一钱 神曲三钱 雷丸三钱 厚朴一钱 大黄二钱

【用法】水煎服。

【主治】食牛、犬之肉,一时心痛,欲吐不能,欲泻不可。

71885 消血理中膏

【方源】《外台》卷二十九引《深师方》。

【组成】大黄二两 猪脂二斤 桂心一两 干姜一两 当归二两 通草 乱发各一两

【用法】上切,以膏煎发令消尽,捣药下筛,须令绝细,下膏置地,纳诸药搅匀,微火煎之,三上三下,即药成,去滓,以好酒送服一两,每日二次。一方不去滓。

【主治】堕落积瘀血。

71886 消衣神应方

【方源】方出《绛囊撮要》,名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】无名异三钱

【用法】上为末,以鸭蛋白调匀碗贮,次用老醋一茶杯,热滚和药同服。胎衣即缩,如秤锤样下来。如不下,再服一剂。

【主治】胞衣不下。

71887 消汗至神丹

【方源】《石室秘录》卷五。

【组成】黄耆 当归各七钱 桑叶十四片

北五味三钱 麦冬半两

【用法】水煎服。

【主治】大汗。

71888 消导二陈汤

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 白术 苍术 神曲 香附 砂仁 甘草

【功用】导痰，消食，健脾。

71889 消导二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生枳壳一钱半 六和曲三钱 炒楂肉二钱 真川朴一钱 仙半夏二钱 广皮红一钱 焦苍术八分 童桑枝一两

【功用】消食导滞。

【主治】伤寒夹食，食滞在胃。

【备考】先去外邪，继用本方。

71890 消导平胃散

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】苍术（米泔制） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 神曲（炒） 麦芽（炒） 枳实（麸炒） 香附米 甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】饮食所伤，胸膈痞闷，肚腹疼痛。

【加减】伤肉，加山楂；腹痛，加莪术；恶心，加砂仁；有痰，加半夏；伤酒，加姜炒黄连、干葛。

71891 消导宽中汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】白术一钱半 枳实（麸炒） 厚朴（姜制） 陈皮 半夏 茯苓 山楂 神曲 麦芽 萝卜子

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】水肿。

【加减】小便不利，加猪苓、泽泻。

71892 消阴止泻丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】苍术五钱 白术一两 附子三分 干姜一钱 山药一两

【用法】水煎服。连服十剂，不特泻止，精神亦健。

【主治】大泻。

【方论选录】此方用苍术以祛邪，用白术以利湿，用姜、附以生阳足矣，何又入山药补阴之多事也？不知人为外邪所侵，不惟阳气消亡，而阴精亦必暗耗，加人山药之补阴者，补真阴之精，非补邪阴之水也。况真阳非真阴不生，补其真阴，正所以速生阳气耳。阳得阴而姜、附无太胜之虞，反能助二术以生至阳之气。矧山药原是健脾利水之神物，原非纯阴无阳可比，故同用以出奇也。

71893 消阴来复汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】鹿茸一钱 附子八分 枸杞三钱 菟丝四钱 当归二钱 破故纸一钱五分 益智一钱 小茴香一钱 金毛脊二钱（去毛，切片） 木香五分 独活一钱（酒炒） 牛膝二钱 枣二枚 姜三片

【主治】肾痹者善胀，尻以代踵，脊以代头。

71894 消阴助阳汤

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】真台党参五钱 生甘草 花粉各三钱 焦白术 生黄耆各一两 银花二两 肉桂（去粗皮） 乳香各一钱 当归五钱

【用法】煎服。

【功用】大补气血。

【主治】两背忽生疮成痈，痒甚未溃，属阴症者。

71895 消阴利导煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归二钱 茯苓三钱 白术一钱五分 广皮一钱 厚朴一钱 肉桂五分 附子八分 木通一钱五分 大腹皮一钱五分 牛膝一钱五分 泽泻一钱五分 车前二钱 鲜姜皮一钱 苡仁一两

【主治】目窠上微肿，如新卧起之状，其颈脉动，时咳，阴股间寒，足胫肿，腹乃大，其水已成，以手按其腹，随手而起，如裹水之状。

71896 消块止痛丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】人参三钱 黄耆五钱 防风一钱

半夏三钱 羌活一钱 白术三钱 桂枝五分
茯苓五钱 薏仁五钱

【用法】水煎服。

【主治】痛风，遍身生块而痛者。

71897 消块和胃汤

【方源】《医学纲目》卷二十五。

【组成】人参三钱 白术一钱半 陈皮一钱 芍药 归身各五分 干葛三分 红花豆大 甘草二钱（炙）

【用法】水煎服，作一帖，下保和丸二十五丸，龙荟丸十五丸。

【主治】饮酒后受怒气，于左胁下与脐平作痛。自此以后，渐渐成小块，或起或不起，起则痛，痛止则伏，面黄口干，无力食少，吃此物便暖此味，转恶风寒，脉之左大于右，弦涩而长，大率左甚，重取则全弦。

71898 消坚化痰汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】陈皮 鳖甲 贝母 香附 茯苓 半夏 白芥子 川芎 海粉 木香 青皮 枳实 甘草 花粉

【用法】水煎服。

【主治】胸腹痞块，按之痛者。

71899 消坚溃脓膏

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】酒药一大丸糯米一合

【用法】将糯米炊饭，加黄酒少许同打烂，涂患处，不时用温酒湿之。一昼夜后揭去，未成即消，已成即溃。

【主治】一切阴疽，漫肿坚硬，不消不溃。

71900 消谷断下丸

《鸡峰》卷十二。为《千金》卷十五“消食断下丸”之异名。见该条。

71901 消饮白术丸

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】白术 半夏（汤洗去滑，焙）各三两 枳壳（去瓢，麸炒）四两 干姜（炮）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十粒，食前温米饮送下。

【主治】痰癖，及饮酒停痰，积聚不利，呕

吐，目视眈眈，耳聋，肠中水声。

71902 消饮白术煎

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】陈橘皮一两 泽泻 白术 茯苓 各半两 甘草 防己 葶苈 木香各一分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十粒，姜汤送下，不拘时候。

【主治】支饮上气，不得卧，身体肿满，小便不利。

71903 消饮茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】白茯苓（去黑皮） 前胡（去苗） 芎藭 羌活（去芦头） 桔梗（炒） 人参 独活（去芦头） 甘草（炙） 柴胡（去苗） 各半斤 陈橘皮（去白）四两

【用法】上为散。每服三钱，沸汤点服，不拘时候。或锉如麻豆，用前件药半两，水三盏，煎至一盏半，去滓，分二次温服。

【主治】伤寒表未解，气脉闭塞，津液不通，水饮气停在胸府，结而成痰，膈皖痞闷，倚息短气，体重多睡，头目旋运，嗜卧好眠，额角偏痛，腠理开疏，体常汗出。

71904 消饮倍术丸

【方源】《普济方》卷一六四。

【组成】白术五两 削术三两 桂心一两 干姜四两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十粒，食后温米饮送下。

【主治】胃虚，五饮酒癖，头痛眩，胃干呕，饮流肠间，动则有声。

71905 消疔化毒汤

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】紫地丁 甘菊花 金银花各一两 蒲公英五钱 夏枯草 连翘各三钱 郁金二钱 甘草四钱（生） 鲜菊叶二两（打汁冲）

【主治】疔毒。

【加减】若已溃烂，加当归一两。

71906 消疔泻毒丸

【方源】《费伯雄医案》。

【组成】西黄 明矾 巴豆肉 麝香 蟾酥

【用法】用绿豆粉为丸，如粟米大。成人服两粒。

【主治】疔疮。

71907 消疔酥信丹

【方源】《吉人集验方》卷下。

【组成】杜酥末六分 白矾五分（即白信石，若用红矾不效） 黑枣肉三钱 赤砂糖三钱

【用法】上为泥。凡治生疔，先将生姜擦患处，以开皮毛，或挑破疮头，然后用药一小块，涂于疔头之上，自可消散。

【主治】疔疮，痈疽发背。

【宜忌】切勿入口。

71908 消补兼施汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参一钱 白术五钱 薏仁五钱 茯苓三钱 黄耆五钱 防风五分 白矾一钱 白芍三钱 陈皮五分 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚痰滞，人身生块而不消者。

【方论选录】此方妙在补气多，而祛痰之药少，气足而痰自难留。况又有白芥子，无痰不消，白矾无坚不入，况又有白芍以和肝木，不来克脾胃之土，而土益能转其生化之机，又得薏仁、茯苓，以分消其水湿之气，何身块之不消乎？

71909 消尿蛋白饮

【方源】《千家妙方》引邓铁涛方。

【组成】黄耆 15 克 龟版 30 克（先煎） 淮山 15 克 苡米 15 克 粟米须 30 克 杜仲 12 克 扁豆 15 克 谷芽 15 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】健脾固肾，利湿化浊。

【主治】慢性肾炎（肾病型）。脾肾两虚，面色㿠白，唇淡，眼胞微肿，疲乏纳差，大便时溏，舌嫩，苔白，脉细尺弱。

71910 消肾脱钳丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】泽泻 木猪苓（去黑皮） 白术（炒） 木通（去皮） 青皮（去瓤） 青木香 陈皮（去白）各六两（为末） 川楝子（炮，去核） 胡芦巴（炒） 茴香（淘去砂，炒） 破故纸（炒）各十二两（用斑蝥三两各炒香熟，并去斑蝥不用） 黑牵牛一斤半（半生用，半炒熟，为末一斤）

【用法】上为细末。酒糊为丸，如梧桐子大。每服四十或五十丸，先用桃仁七粒，茴香一撮，葱头三茎同炒香熟，细嚼温盐酒送下。

【主治】一切下部疾病不可忍者。

71911 消乳进食丸

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】陈橘皮（汤浸，去白，焙干） 生姜（去皮，切，二味同炒黄色）各一两

【用法】上为末，水浸炊饼心为丸，如麻子大。一二岁儿每服七丸，橘皮汤送下。

【主治】小儿嘔逆，腹胀。

71912 消肿木香散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】木香 当归 射干 莽草 黄柏（别为末） 大黄各等分。

【用法】上为细末。每用药一大匙，入白面一匙头，淡醋调稀，慢火上熬令稠，摊在纸花子上，贴患处，勿令大干，别换新药，一日四五次。

【主治】湿毒肿，皮肉色不变。

71913 消肿止痛散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】芙蓉叶一两 陈小粉一两五钱 五倍子 生南星 生半夏 生草乌各三钱

【用法】上为末。醋调敷。

【主治】痈疽。

71914 消肿止痛膏

《中医伤科学》。即《外伤科学》“消肿止痛药膏”。见该条。

71915 消肿化毒丹

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】藤黄五两 天南星二两 麝香五分 赤小豆一两 川五倍五两

【用法】上为极细末。用白及二两打糊为丸。用醋磨敷患处。

【功效】消肿止痛。

【主治】无名肿毒及一切疮疡未溃者。

71916 消肿化痰散

【方源】《外伤科学》。

【组成】当归 赤芍 生地黄 延胡索 血竭 乳香 红花 大黄 姜黄 鳖甲 茄瓜根 红曲 赤小豆各等分

【用法】上为细末。醋调敷患处。

【功用】活血化痰，消肿止痛。

【主治】损伤初期，肿胀明显，瘀血作痛。

71917 消肿四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 赤芍各六分 车前子一钱 青木香五分 赤茯苓 猪苓 泽泻 大腹皮 葶苈一钱 防风 木通 槟榔各一钱

【用法】上为末。葱三根，水煎，食前服。

【主治】遍身浮肿。

【备考】方中赤茯苓、猪苓、泽泻、大腹皮用量原缺。

71918 消肿代刀散

【方源】《尤氏喉科秘书》。

【组成】火消（将皮纸数层包好，放在烟巨上烘，以去咸气，换纸再烘，研极细末） 薄荷 硼砂 大冰片 牙皂少许

【用法】上为细末，瓷瓶收存。难破喉疮用此药吹之，咳嗽一声即破。

【主治】喉疮不破者。

71919 消肿宁痛膏

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】乳香 没药 儿茶 雄黄各三钱 轻粉一钱 官粉一两

【用法】上各为细末。滤净猪油二两，下锅烧热，熬化黄蜡一两，搅入上药，入油，匀收钵内。用油纸摊贴。

【功用】去腐抽脓，定痛长肉。

【主治】杖疮。

71920 消肿托里散

【方源】《外科理例》卷二。

【组成】防风通圣散加人参 黄耆 苍术 赤茯苓 金银花

【用法】水煎服。

【主治】①《外科理例》：疮肿。②《玉案》：发背，不拘上下左右，并一切痈疽肿毒。

71921 消肿劫毒散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】毛屎梯叶七分 鸡屎子叶三分

【用法】上为末。用米泔水调，温刷。

【主治】一切无名肿毒，虚疡。

71922 消肿利咽汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】天花粉一两 连翘四钱 金银花四钱 丹参三钱 射干三钱 玄参三钱 乳香二钱 没药二钱 炙山甲一钱半 薄荷叶一钱半

【用法】煎汤服。

【主治】咽喉肿痛。

【加减】脉象洪实者，加生石膏一两；小便不利者，加滑石六钱；大便不通者，加大黄三钱。

71923 消肿泻毒汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】苦参三钱 白蒺藜 草胡麻 连翘 大黄 芒消各二钱 防风 诃子肉 羌活 独活各五分 牛膝 白芷 苍术 木瓜各一钱

【用法】水二钟，煎八分，空心服。泻三次，以温粥补之，午后再服丸药。十日可泻一次。

【主治】痲风，面肿痛。

71924 消肿定痛汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】柴胡 龙胆草 焦梔 生地 黄芩 白芍 秦艽 当归 川芎 薄荷 甘草 连翘 竹叶 大茴香

【功用】清肝火，和阴血，祛湿热，固胎元。

【主治】妇人妊娠两胯肿痛。

71925 消肿定痛散

《保婴撮要》卷十六。为《正体类要》卷下“消

毒定痛散”之异名。见该条。

71926 消肿定痛散

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】金果榄三钱 姜黄三钱 乳香一钱 没药一钱 梅花片四分（另研，后兑）

【用法】上为细末，过重罗后兑梅花片，用青茶卤调匀，温上患处，如干时，即用稀药水温温担之。

【功用】活血化瘀，温通营血。

【主治】痈肿热痛。

71927 消肿定痛散

【方源】《实用正骨学》。

【组成】紫荆皮 儿茶 炒大黄 炒木耳炒无名异各一斤

【用法】上为细末。蜜调匀，敷患处。

【功用】消肿散瘀，软坚定痛。

【主治】挫伤性肌肉肿胀疼痛。

71928 消肿南星散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】黄柏 姜黄 天南星 草乌头黄连各等分

【用法】上为末。以生姜自然汁调匀，贴两太阳穴。

【主治】诸般热眼，肿痛难开者。

71929 消肿活瘀膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】鸡血藤膏三分 麝香三分 穿山甲二分 第一仙丹三分 金果榄二分

【用法】上为细末，过绢罗，兑蜂蜜合膏。敷肿处。

【功用】活血化瘀，清热消肿。

【主治】腰椎结核症。

71930 消肿健脾汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 车前子 泽泻 厚朴 苡仁 炮姜 附子 陈皮 山药

【主治】久泻脾虚，以及发肿。

71931 消肿通气汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】石膏一钱五分 青皮 当归 皂角刺各一钱 白芷 天花粉各六分 金银花 甘草节各五分 瓜蒌仁七分 橘叶三十片 连翘八分 没药四分 升麻四分

【用法】上咬咀。用水、酒各半煎，食远温服。

【主治】妇人乳硬，其中生核如棋子。

71932 消肿遗粮汤

【方源】方出《丹溪心法附余》卷十六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】冷饭团（即土茯苓）十五两 防风 木通 薏苡仁 防己 茯苓 金银花 木瓜 白鲜皮 皂角刺各五钱 白芥子四钱 当归身七钱

【用法】上作三十服。每服用水一钟半，煎至八分，空心、午饭前、晚饭前各一服。

【主治】杨梅疮后肿块。

【禁忌】忌鱼、鸡、生冷，房事，及煎炒、茶酒十余日。

【加减】虚弱人加人参五钱

71933 消肿漱口方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】生蒲黄二钱（包） 红花一钱五分 归尾一钱五分 没药二钱 大青盐四钱

【用法】水煎，漱之。

【功用】消肿止痛，活血通经。

【主治】口腔齿龈肿痛。

71934 消肿万应汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】地骷髅三钱 大腹皮二钱 真川朴一钱 莱菔子二钱（拌炒） 青砂仁五分 六神曲一钱半 陈香橡皮八分 鸡内金两张 人中白（煅透）五分 灯心五小帚

【用法】以此方送下消臌万应丹。

【功用】消滞除胀。

【主治】黄疸变膨，气喘胸闷，脘痛翻胃，痞胀结热，伤力黄肿，噤口痢。

71935 消肿化臌丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】西洋参二两 巴豆霜一两五钱

甘遂(炙)三两 豆豉三两 玄胡(炙)四两 大黄五两 牙皂八两 大戟(炙)八两 杏仁(炒)三两 芫花(炙)六两 葶苈子四两 干姜四两 抽葫芦八两

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，每十六两用滑石细粉四两为衣。每服五分。

【功能】扶脾和中，利水消胀。

【主治】气臌、水臌，中满腹胀，四肢浮肿，水道不利。

【宜忌】孕妇忌服。

71936 消胀四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗)一钱 南芎八分 枳壳(去瓤，麸炒) 赤芍八分 枳实(麸炒) 青皮(去瓤) 陈皮 槟榔各一钱 半夏(汤泡切片，姜炒) 大腹皮各一钱 青木香五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎温服。

【主治】气块，时时膨胀。

71937 消炎止痛汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】杭白芍 18 克 醋柴胡 6 克 当归身 6 克 元胡 9 克 盐橘核 6 克 盐荔枝核 6 克 川楝子 9 克 香附 9 克 青皮 9 克 陈皮 9 克 小茴香 3 克 艾叶 6 克

【功用】消炎理气，养血活血，温暖下元。

【主治】慢性附件炎，盆腔炎。少腹痛，腰痠，带下增多。

71938 消炎止痛散

【方源】《实用正骨学》。

【组成】血花 牡蛎 黄连各五钱 麝香三分

【用法】上为细末，贮瓷瓶内，用时蜜调敷患部。

【主治】非骨伤性的，较严重的皮肤肿胀疼痛。

【方论选录】血花活血，牡蛎软坚，黄连、麝香消炎止痛。

71939 消炎止痛膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麝香 0.25 克 蟾酥 3 克 肉桂 10 克 当归 10 克 皂荚 20 克 芒消 30 克 滑石粉 50 克 薄荷油 2 克 血竭 2 克 山慈菇 5 克 白芥子(研细，放温水内发酵) 4 克 穿山甲 4 克 橄榄油 50 克 饴糖(后加) 100 克 水 50 毫升

【用法】配制成膏，外敷。

【主治】丹毒。

71940 消炎化毒汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连六分 黄芩一钱 大黄四钱 银花二钱 甘草五分 花粉二钱 木通一钱 青皮一钱 当归一钱五分 赤芍一钱 淡竹叶二十张

【主治】火盛下利，昼夜不休，作渴腹痛，时下脓血。

71941 消炎退翳丸

【方源】《中医临床集锦》。

【组成】蒺藜 谷精草 蒲公英 柴胡 黄芩 草决明各 1 千克 木贼草 夜明砂 望月砂 香附 赤芍 当归 红花 桃仁 玄参各 500 克 枳壳 炮穿山甲 川芎 桅仁各 250 克 蛇蜕 150 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服 9 克，一日三次。

【功用】散风活血，清热明目。

【主治】目赤肿痛，角膜云翳(角膜溃疡)。

71942 消炎解毒丸

【方源】《中药制剂手册》引《古今医鉴》。

【组成】蒲公英八百两 金银花二十两 防风十两 连翘二十两 甘草二十两

【用法】取蒲公英二〇八两，与金银花共轧为细粉。取下余蒲公英五九二两，按煮提法提取二次，浓稠膏约 166 两。然后细粉与膏混合，制成丸，用糖水挂衣。每服二十丸，温开水送下，一日二次。小儿酌减。

【功用】清热解毒，凉血消炎。

【主治】由热毒引起的疮疡疔肿，红肿疼痛，妇女乳疮，小儿疮疖。

71943 消炎解毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】玄参一两 桔梗 粉甘草 赤芍 僵蚕各五钱 薄荷 竹叶各三钱 板兰根 黄芩 山豆根各五钱 连翘一两 杭菊花四钱 天花粉五钱 二花一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。成人每服三钱，温开水送下，一日二次。小儿、老人酌减。

【主治】温毒咽喉肿痛，耳前耳后肿，风热上壅，头面肿大及湿热痈疮

【禁忌】体弱而无炎症者忌服。

71944 消毒一锭金

【方源】《青囊秘传》。

【组成】羊角(瓦焙)一两 血余炭一两 贝母一两五钱 黄耆(蜜炙)二两五钱 全蝎二十个 天龙四条 山甲五钱 生军五钱

【用法】上为末，面糊为丸，朱砂为衣。每服一钱，酒送下。

【功用】消毒。

71945 消毒五圣汤

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】五灵脂 白僵蚕 郁金 贝母 大黄各三钱

【用法】酒、水各半，煎服。连服三帖。

【主治】便毒肿痛。

71946 消毒止血散

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】京牛黄五分 珍珠五分 血竭五分 云连一钱 旱三七五分 乳香七分 没药七分 冰片二分

【用法】上为极细末。

【功用】清热解毒，散结止血。

【主治】痈疡流注。

【方论选录】方中用牛黄、珍珠清心镇惊，解毒护心，黄连清热解毒，乳香、没药、血竭活血通络，三七止血。盖瘟邪容易经血脉走窜入心，故方中用众多血药，引牛黄、云连入于血分以解毒，施于疮疡斑疹，急毒攻心有效。

71947 消毒化坚汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归一钱 黄耆一钱 白芍一钱 玄参六分 天花粉六分 连翘一钱五分 柴胡一钱 黄芩五分 牛蒡七分 龙胆草四分 升麻七分 桔梗一钱 陈皮八分 羌活七分 薄荷四分 海昆布七分 甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】瘰癧马刀，生耳前后，或项下胸腋间，累累如珠者，未破已破皆治。

【加减】一方加甘草节、知母、贝母、海藻更佳。

71948 消毒化斑汤

《原机启微》卷下。为《兰室秘藏》卷下“消毒救苦散”之异名。见该条。

71949 消毒化斑汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】桔梗 牛蒡子(炒) 人中黄 连翘 防风 柴胡 胆草 升麻 蝉退 密蒙花

【用法】水煎服。

【主治】痘疮起发自头面，渐肿欲作脓血者。

【备考】《片玉痘疹》有紫草、无柴胡。

71950 消毒化斑汤

《准绳·幼科》卷五。为《痘疹心法》卷二十二“消毒化斑散”之异名。见该条。

71951 消毒化斑汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】白芷 黑梔仁(炒)各八分 防风 黄芩(炒) 陈皮 白芍药各一钱 羌活七分 甘草三分 犀角(锉细末)一钱

【用法】上为一剂。白水二钟，煎至七分，去滓净，再煎滚，先将犀角生末，入在碗内，后入滚药于角末内，搅匀温服。

【主治】小儿斑疹。

71952 消毒化斑散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】消毒化斑汤(《准绳·幼科》卷五)。

【组成】升麻 柴胡 桔梗 甘草 龙胆草 牛蒡子 连翘 防风 蝉蜕 密蒙花各等分

【用法】上锉细。加淡竹叶十片，水一盞半，煎一盞，食后服。

【主治】痘疹。

71953 消毒升麻汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】升麻 干葛 荆芥 牛子 赤芍 各二钱

【用法】甘草生姜引。

【主治】麻为风寒所触，已出而复没者。

71954 消毒圣神汤

《疡医大全》卷七。为《洞天奥旨》卷十四“消毒神圣丹”之异名。见该条。

71955 消毒达原丸

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】生军 葛根各二斤 滑石 山楂 各一斤 神曲 木通 枳壳 黑梔 黑丑 黄芩各八两 防风 荆芥 苏叶 龙胆草 苍术 羌活 草果 槟榔 厚朴 知母 车前子各四两 甘草二两 生姜八钱

【用法】上为末，糊为丸，每丸重二钱。每服一二丸，开水化下。

【主治】瘟疫头疼，筋骨痛，先寒后热，初起舌苔白色，三四日黄色，五六日黑色芒刺，大便不通，或水泻，小便黄赤短少，甚则谵语发狂，口鼻出血，拽衣摸床，呃逆不止。

71956 消毒百应丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】苍术 黄柏 槐花 金银花 当归 皂角各四两

【用法】上六味切片，分作四份。每份用水七碗，煎至四碗，去滓，留药汁浸大黄片一斤，浸一宿，次日取出，安筛内晒干。如此将四次水浸晒尽为度。将大黄为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每一次六十四粒，空心熟白水送下。

【主治】痔漏疮，脏毒。

【宜忌】忌厚味、胡椒、烧酒之类。

71957 消毒托里散

《医学六要·治法汇》卷四。为《陈氏小儿痘疹方论》“托里消毒散”之异名。见该条。

71958 消毒红玉膏

【方源】《普济方》卷三四七引《德生堂方》。

【组成】寒水石(煨)二两 黄丹(炒)半两

【用法】上为细末。新凉水调涂两乳肿处，日换二三次。

【主治】吹乳肿痛。

71959 消毒连翘饮

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】牛蒡子 连翘 防风 白芷 金银花 茯苓 当归 木通 射干 白术 黄耆 芍药 甘草 天花粉

【用法】水煎服。

【主治】痘后热毒尚留经络，结成痈肿。

【加减】大便秘甚，加酒炒大黄。

71960 消毒利黄汤

【方源】《中医临证撮要》。

【组成】川黄连 1.5 克 生山梔 4.5 克 淡竹叶 6 克 生甘草 2.4 克 连翘壳 4.5 克 西茵陈 6 克 赤茯苓 6 克 细木通 2.4 克 炒麦芽 4.5 克 生枳壳 2.4 克

【功用】清胎毒，利黄疸。

【主治】新生儿黄疸。婴儿出生十天左右，面目身黄，啼哭不安，腹胀，不思吮乳，或发热，舌红口干，指纹青紫。

【加减】大便干燥，加生大黄 2.4 克；大便溏泻，去生山梔，加生白术 3 克；吐乳，去生甘草，加藿香梗 3 克；发热不退，加京赤芍 3 克；夜啼不安，加净蝉衣 2.4 克，灯心 1.2 克；抽风，加嫩钩藤、僵蚕各 6 克。

71961 消毒快斑汤

【方源】《片玉痘疹》卷七。

【组成】桔梗 甘草节 荆芥穗 赤芍药 黄耆 牛蒡子 防风 当归尾 玄参 连翘 前胡 木通 天花粉

【用法】水煎服。

【主治】痘疹，发热一二日而出者。

71962 消毒青黛饮

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】黄连 甘草 知母 石膏 柴胡 升麻 山梔仁 玄参 人参 青黛 生地黄

【用法】竹叶为引，水煎服。

【主治】痘疮收靥后，大热，两目如火，身发斑者。

71963 消毒青黛饮

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【组成】黄连 甘草 石膏 知母 柴胡 玄参 生地 山梔 犀角 青黛 人参

【用法】水二钟，加生姜一片，大枣二枚煎，临服入苦酒一匙。

【主治】热邪传里，里实表虚，血热不散，热气乘于皮肤而为斑，轻则如疹子，重则如锦纹，重甚则斑烂皮肤。

【加减】大便实者，去人参，加大黄。

71964 消毒拨翳汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川芎 归尾 白菊 黑梔 防风 生地 赤芍 决明 木贼 薄荷 甘草

【主治】麻症目有赤筋。

71965 消毒定痛散

【方源】《正体类要》卷下。

【异名】消肿定痛散（《保婴撮要》卷十六）、定痛散（《实用正骨学》）。

【组成】无名异（炒） 木耳（炒） 大黄（炒） 各五分

【用法】上为末，蜜水调涂，如内有瘀血，砭去敷之。若腐处，更用当归膏敷之尤妙。

【主治】跌扑肿痛。

71966 消毒贵金散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连六钱 鸡内金二个（俱用猪胆汁浸炙七次） 轻粉三钱 儿茶三钱 冰片三分 麝香二分

【用法】上为末。掺用。

【主治】一切疔疮，初起热甚者。

【加减】如至夜痛甚者，加雄鼠粪煨存性为君。

71967 消毒保婴丹

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】神功消毒保婴丹（《摄生众妙方》卷十）、保婴丹（《古今医鉴》卷十四）、神效消毒

保婴丹（《寿世保元》卷八）。

【组成】缠豆藤（或黄豆、绿豆根上缠绕细红丝者，于八月福生生炁日采之，阴干听用）一两五钱 黑大豆三十粒 赤小豆七十粒 新升麻七钱半 山楂肉一两 荆芥（连穗）五钱 防风（去芦）五钱 生地黄（酒浸，焙）一两 川独活五钱 甘草（生）五钱 当归（酒洗）五钱 赤芍药七钱半 黄连（去枝梗）五钱 桔梗五钱 辰砂（另研，水飞）一两 牛蒡子（炒）一两 老丝瓜（隔年经霜者，取连藤蒂五寸，烧存性）二个。

【用法】上为细末，和匀，用净砂糖拌丸，如李核大。每服一粒，浓煎甘草汤化下。

【功用】预防痘疹。

【备考】《纲目拾遗》有连翘七钱五分。

71968 消毒活血汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】紫草茸 当归 前胡 牛蒡 木通各六分 生地 白芍 连翘 桔梗 甘草各五分 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 黄耆各七分 山楂肉八分 人参三分 生姜一片

【用法】同煎服。

【主治】痘色红紫干枯，黑陷，紫陷。

【加减】如烦渴，去参、耆，加酒炒麦冬、花粉。

71969 消毒活血汤

【方源】《痘科金镜赋》卷六。

【组成】当归 白芍 连翘 生地 黄芩 黄连 牛蒡 桔梗 山楂 木通 紫草茸 前胡 甘草

【用法】煎服。

【主治】痘疮。

71970 消毒神圣丹

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【异名】消毒圣神汤（《疡医大全》卷七）。

【组成】金银花四两 蒲公英二两 生甘草二两 当归二两 天花粉五钱

【用法】水煎服。

【主治】背痈，或胸腹头面手足之疽。

【方论选录】《疡医大全》：方中金银花专能内消疮毒，然非多用，则力轻难以成功。生甘草一味已足解毒，况又用之于金银花内，益足以散邪而卫正。蒲公英阳明经药也，且能散结逐邪；天花粉消痰圣药。当归活血，血不活所以生痛，今血活而痛自愈。

71971 消毒神效丹

《医方易简》卷十。为《古方汇精》卷二“消毒神效散”之异名。见该条。

71972 消毒神效散

【方源】《古方汇精》卷二。

【异名】消毒神效丹（《医方易简》卷十）。

【组成】鲜山药五两（不见水） 土朱 松香 白洋糖各一两 全蝎十个

【用法】上共捣烂，围之留顶，药上盖纸，周时一换。初起即散，已成者，搽三次，收小出毒随愈。

【主治】发背，痈疽，乳痈，一切外患。

71973 消毒凉膈散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】黄芩 黑梔各一钱五分 连翘二钱 牛蒡子一钱五分 薄荷七分 甘草一钱

【主治】咽喉初起肿痛。

71974 消毒凉膈散

【方源】《医家四要》卷三。

【组成】防风 荆芥 牛蒡子 连翘 梔子 黄芩 芒消 大黄 薄荷 甘草

【主治】喉痹，咽喉肿痛。

71975 消毒流气饮

《杏苑》卷七。为《玉机微义》卷十五“十六味流气饮”之异名。见该条。

71976 消毒宽喉散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】寒水石（生）四两 马牙消 朴消各六钱 青黛半两

【用法】上为极细末。每服二钱，浓煎薄荷汤点匀，热漱咽喉内，冷吐，误咽不妨，不拘时候，日用三五次。

【主治】急慢喉痹，咽喉闭塞，或舌本强硬，满口生疮。

71977 消毒黄龙丸

【方源】《鸡峰》卷五。

【异名】消暑丸（《局方》卷二绍兴续添方）、消毒丸（《三因》卷五）、黄龙丸（《永类铃方》卷二十一引《全要方》）、消暑丹（《元戎》卷二）。

【组成】半夏半斤 茯苓 甘草（生）各二两

【用法】上为细末，生姜汁作糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，生姜汤送下；烦躁，新汲水送下，不拘时候。

【主治】中喝烦躁，汗出身热，头疼，痰逆恶心，口燥多渴，胸膈不利，饮食减，昏困嗜卧；又暑毒热气内伏，久久不已，变成痄疔、黄疸，减食，日渐羸瘦。

【方论选录】《医方集解》：此方不治其暑，而治其湿。用半夏、茯苓行水之药，少佐甘草以和其中。半夏用醋煮者，醋能开胃散水，敛热解毒也。使暑气湿气俱从小便下降，则脾胃和而烦渴自止矣。

71978 消毒救苦丹

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】防风 羌活 麻黄 升麻 生地 川芎 藁本 连翘 黄柏 当归 柴胡 陈皮 黄芩 苍术 细辛 甘草 白术 干姜 红花 茺莢

【用法】水煎，空心服。

【主治】大麻风，四肢生疮，手足无力，鼻塌指落。

71979 消毒救苦汤

《东垣试效方》卷四。为《兰室秘藏》卷下“消毒救苦散”之异名。见该条。

71980 消毒救苦散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】消毒救苦汤（《东垣试效方》卷四）。消毒化斑汤（《原机启微》卷下）。

【组成】防风 羌活 麻黄根 升麻 生地 连翘 酒黄柏各五分 当归身 黄连各三分 川芎 藁本 柴胡 葛根 酒黄芩 生黄芩 苍术各三分 细辛 生甘草 白术 陈皮 苏木 红花各一分 吴茺莢半分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

【功用】斑证悉具，消化便令不出，如已出稀者，再不生斑。

【主治】《原机启微》：小儿斑疹，未满二十一日而目疾作者，生翳羞明，眵泪俱多，红赤肿闭。

71981 消毒救苦散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】大黄三钱 黄芩 黄连 黄柏 芙蓉叶 大蓟根 白及 白敛 天南星 半夏 红花 檀花 当归尾 赤小豆 白芷各一钱五分 朴消 雄黄（另研末）各一钱

【用法】米醋调涂，敷四周，留头，如干即又敷。

【功用】消肿散毒。

【主治】疮疡。

71982 消毒麻仁丸

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】杏仁（生，去皮尖）二两 大黄（生）五两 山梔子仁十两

【用法】上药炼蜜为丸。每服三十至五十丸，夜卧温汤吞下，利下赤毒胶涎为效；治小儿惊热，每服三五丸，以蜜汤化下极效。

【功用】搜风，顺气，解毒。

【主治】①《局方》（宝庆新增方）：诸般风气上壅，久积热毒，痰涎结实，胸膈不利，头旋目运；或因酒、面、炙煨、毒食所伤，停留心肺，浸渍肠胃，蕴蓄不散，久则内郁血热，肠风五痔，外则发疮疡痈疽，赤斑游肿，浑身躁闷，面上黧赤，口干舌裂，咽喉涩痛，消中引饮；或伤寒时疫，口鼻出血烦躁者；及风毒下注，疮肿疼痛，脚气冲心闷乱；一切风热毒气，并皆主之。②《直指》：肝热风毒，攻眼赤痛。

71983 消毒麻仁丸

【方源】《医统》卷六十九。

【组成】芝麻四两（研，取汁） 杏仁二两（去皮尖，研如泥） 大黄五两 山梔十两

【用法】上为末，炼蜜入麻汁和丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】胃实便秘，能饮食而小便赤。

71984 消毒清肺饮

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】防风 荆芥 牛蒡子 连翘 桑皮 知母 贝母 陈皮 赤茯苓 百合 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻后喘嗽，鼻如烟煤。

71985 消毒散血汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷四。

【组成】牛蒡（制） 生白芍（酒洗） 桃仁（炒去皮尖，研烂） 酒炒大黄各一钱 红花（酒洗） 没药 乳香（俱用灯心同研细，煎药将熟投入）各五分

【用法】水煎，温服。

【主治】痘疮当靨时，忽然腹痛。由于热毒凝滞，瘀血作痛，其痛着在中腕。

71986 消毒溃坚汤

【方源】《普济方》卷二八八。

【组成】黄连一钱 黄芩五分 黄柏五分 生地黄四分 知母四分 羌活一钱 独活四分 防风四分 藁本四分 当归尾四分 桔梗五分 黄耆二分 人参三分 甘草三分 连翘四分 苏木二分 防己五分 泽泻二分 橘皮二分 山梔子二分 五味子二分 麦门冬二分 枳壳二分 猪苓二分

【用法】上药锉，如麻豆大，都作一眼。水二盏，煎至一盏半，去滓，食后温服。

【主治】痈肿，瘰癧，乳病。

71987 消毒溃坚汤

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】羌活 黄连（酒炒） 黄柏（酒炒）各一钱 生地（酒洗） 桔梗各五分 黄耆二钱 人参 甘草 连翘 防己（酒洗） 陈皮 泽泻（炒） 山梔仁（姜汁拌炒） 五味子（碎） 麦门冬 枳壳（炒） 猪苓各五分

【主治】痈肿，瘰癧，恶疔，乳痈，脑疽。

71988 消毒犀角汤

《玉案》卷三。为《活人书》卷二十一“鼠粘子

汤”之异名。见该条。

71989 消毒犀角饮

《局方》卷六(吴直阁增诸家名方)。为《活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

71990 消毒犀角饮

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】牛蒡子(炒,研)二两 荆芥一两 防风 升麻 豆豉各五钱 甘草五钱 犀角二钱

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盞,煎至七分,去滓温服。乳母亦可服。

【主治】小儿腮耳颌赤肿红晕者。

【加减】脏腑实,加大黄一二片,即安。

71991 消毒犀角饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】消风犀角散(《疡科捷径》卷下)。

【组成】犀角(镑) 防风各一钱 甘草五分 黄连三分

【用法】上用水二钟,加灯心二十根,煎取四分,徐徐服之。

【主治】小儿丹毒,身热气粗,啼叫惊搐不宁。

71992 消毒犀角饮

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】桔梗 荆芥 连翘 防风 黄芩 犀角 生大力子

【主治】斑痧已出,身热不减。

71993 消毒犀角饮

【方源】《疡医大全》卷十五。

【组成】鼠粘子(微炒)四钱 荆芥 黄芩 甘草各一钱 防风 犀角各五钱

【用法】水煎服。

【主治】内蕴热邪,咽喉不利,重舌,木舌,一切热毒。

71994 消毒犀角散

《普济方》卷二七二。为《活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

71995 消毒僵黄丸

《杏苑》卷三。为《卫生宝鉴》卷九“消毒丸”之异名。见该条。

71996 消食化气丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】苏子(水洗净,炒,取末)二两 香附米(水洗净,炒,取末)二两 白豆蔻(面包煨面熟为度,取末)二两 砂仁(炒,取末)一两 广陈皮(水洗净,晒干,取末)三两 山楂(水洗净,去核,晒干,取末)三两 南星一两(照半制度) 白茯苓(取末)二两 枳实(麸皮炒,取末)一两五钱 白术(土炒,取末)八两 枳壳(麸皮炒,去皮,为末)一两 沉香(经入水即沉者方可用,取末)一两 神曲(炒,取末)三两 广木香(取末)一两 半夏五钱(同生姜、皂角、白矾各二钱五分同煮为末) 川芎(晒干,取末)一两 萝卜子(炒,取末)一两 粉甘草(炒,取末)一两 麦芽(水洗净,炒,取末)三两

【用法】上药为末,米糊为丸,如绿豆大。每服或三钱,或四钱,姜汤送下。

【功用】消食化气。

71997 消食平胃汤

【方源】《陈氏幼科秘诀》。

【组成】藿香 厚朴 苍术 半夏 香附 陈皮 山楂 神曲 茯苓

【用法】水煎服。

【主治】伤食吐泻,乳食不化,或吐与泻皆酸臭。

【加减】泻色黄赤属热,加姜炒黄连;青白属冷,只用本方,甚则加木香、丁香、肉桂、干姜、肉蔻等;腹痛,加砂仁;身热,加柴胡;伤食重,枳实、青皮、槟榔可渐知;身凉吐沫、泻青白、呵欠、烦闷不渴、啰气、常见露睛,此病久荏苒,因成吐泻,急宜补脾,量加人参、白术、干姜、肉桂、附子、木香、丁香等。

71998 消食导气饮

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 川芎 半夏 青皮 陈皮 枳实 香附 神曲 砂仁 木香

【用法】用水一钟半，加生姜三片，煎七分，食远温服。

【主治】脾土本虚，不胜肝气，凡遇怒气便作泄泻。

71999 消食健脾丸

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】枳实 白术 山楂 人参 神曲 鸡内金 麦芽 连翘

【功用】消食健脾。

【主治】脾胃病。

72000 消食健脾丸

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】苍术 陈皮 厚朴 甘草 炒盐 胡椒 山楂 神曲 麦芽 白茯苓

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【功用】消化食积。

【主治】胃强脾弱，能食而不化。

72001 消食清郁汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】陈皮 半夏（姜汁炒） 白茯苓（去皮） 神曲（炒） 山楂（去核） 香附米 川芎 麦芽（炒） 枳壳（麸炒） 栀子（炒） 黄连（姜汁炒） 苍术（米泔浸） 藿香 甘草

【用法】上为末，加生姜三片，水煎服。

【主治】膈杂闷乱，恶心，发热头痛。

72002 消食断下丸

【方源】《千金》卷十五。

【异名】消谷断下丸（《鸡峰》卷十二）。

【组成】曲 大麦蘖各一升 吴茱萸四两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日三次。

【主治】寒冷脏滑者。

72003 消结神应丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】黄芩（酒炒） 黄连（炒） 山梔仁 生贝母 海昆布（酒洗） 海藻（酒洗） 桔梗 麦蘖（炒）各一钱五分 紫背天葵 玄参 连翘 瞿麦各二钱 薄荷叶一钱五分

【用法】上为末，酒煮稀糊为丸，如芡实大。每服一丸，酒送下。

【主治】小儿颈下或耳前后有结核者。

72004 消核防风薄

【方源】《医心方》卷二十一引《深师方》。

【组成】莽草八分 芎藭八分 大黄十分 当归十分 防风十分 芍药十分 白薇十分 黄耆十二分 黄连十分 黄芩十分 梔子仁四分

【用法】上为末，以鸡子白和涂故布若练上，以薄肿上，日四五次，夜三次。

【主治】妇人乳痈生核，积年不除。

72005 消恶安胎汤

【方源】《傅青主男女科》卷下。

【组成】当归一两（酒洗） 白芍一两（酒炒） 白术五钱（土炒） 茯苓五钱 人参三钱 甘草一钱 陈皮五分 花粉三钱 苏叶一钱 沉香一钱（研末）

【主治】妇人怀子在身，痰多吐涎，忽然腹中疼痛，胎向上顶。

【备考】《辨证录》有乳香末一钱。

72006 消热大黄丸

【方源】《幼幼新书》卷十九引《婴童方》。

【组成】大黄十分 柴胡 升麻 杏仁 芍药各四分 枳实（炙）三分 黄芩 知母 梔子仁各五分 钩藤皮二分（炙） 寒水石八分 细辛一分

【用法】上为末，蜜为丸，如大豆大。三岁十五丸，白饮送下。常取通为度。

【主治】小儿体有热，热实黄瘦，大便涩，食少兼惊。

72007 消热定惊煎

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】柴胡 升麻 梔子仁 芍药各七分 子芩 知母各八分 寒水石十二分 竹叶（切）一升 甘草二分（炙） 杏仁六分（去皮）

【用法】上以水四升七合，煮取一升半，绞去滓，纳蜜、葛汁，文武火煎，搅勿住手，至一升二合。一月内及初满月儿，一合为三服，中

间进乳；出一月，一服半合；五、六十日儿，一服一合；百日儿亦一合；出一百日，服一合半；一、二岁二合；日二夜一，冬温服之。

【主治】小儿惊热，欲发痫。

72008 消积二陈汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 甘草 杏仁 枳实 玄明粉 石菖蒲 归尾 赤芍

【主治】积聚，癥瘕，痞癖，痞块。

【加减】内热，加黄芩；有滞，加厚朴；痛甚，加莪术。

72009 消积三棱煎

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】沉香一两（为末） 槟榔一两（为末） 京三棱 蓬莪术 乌梅肉（焙干，为末）各二两

【用法】上将京三棱、蓬莪术二味锉碎，用酸醋浸一宿，取出焙干为末，入沉香等拌匀，每称药末一两，用肥巴豆十五个（去皮心膜细研，以竹纸裹压数次去油，取霜），与前项药末一两，再研匀，醋煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后温生姜汤送下。

【主治】脾胃虚弱，少食多伤，五积六聚，气块痞痛。

72010 消积万灵丹

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】朱砂 神曲 麦芽 槟榔 山楂各二两 豆霜四两 雄黄二两 麝香五钱 胆星一两五钱 全蝎 僵蚕各五钱

【用法】上为细末，与豆霜调匀，水泛小丸，如米粒大，朱砂为衣，每包四厘。每服一包，温开水送下，未周岁者减半。

【主治】小儿五积六聚，呕吐胀满，痢疾。

【宜忌】不可多服。

72011 消积化痞丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】白术五两 茯苓三两 六曲二两 地栗粉八两 鳖甲一斤（醋炙） 人参五钱 甘草一两 白芍三两 半夏一两 白芥子一两 萝卜子五钱 厚朴五钱 肉桂三钱 附

子一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五钱，临睡送下，以美物压之。

【主治】痞块。

【方论选录】此方有神功，妙在用鳖甲为主，则无坚不入；尤妙用地栗粉，佐鳖甲以攻邪，又不耗散真气。其余各品，俱是健脾理正之药，则健脾而物自化。尤妙用肉桂、附子，冲锋突围而进，则鳖甲大军相继而入，勇不可当，又是和平之师，敌虽强横，自不敢抵抗，望风披靡散走，又有诸军在后，斩杀无遗，剿抚并用，有不告捷者哉？

【备考】本方方名，《医门八法》引作“栗粉丸”。

72012 消积化聚丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】三棱 莪术 陈皮 丁香 阿魏 青皮 木香 白芷 川归 草豆蔻 川贝 玄明粉 黄连 香附 神曲 麦芽 甘松 砂仁 莱菔子（炒）各五钱

【用法】上为末，酒为丸，如梧桐子大。每服八十丸，姜汤送下，或酒送下。

【主治】五积六聚，气积胀满，不食。

72013 消积化聚丸

【方源】《明医指掌》卷十。

【组成】三棱 白术（炒） 茯苓 黄连 干漆（炒去烟） 木香 礞砂 益智（炒） 归尾（酒洗） 麦芽（微炒）各三两 红花 砂仁（炒） 门冬 枳壳（炒） 穿山甲（烧灰） 青皮 柴胡 神曲（炒）各二两 蓬术（煨） 槟榔（炙） 桃仁 香附（姜汁拌，炒） 鳖甲（醋炙）各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，重三钱。空心陈米汤送下。

【主治】五积六聚，痞癖攻痛。

72014 消积化聚汤

《陈氏幼科秘诀》。为原书同卷“化积健脾汤”之异名。见该条。

72015 消积正元散

《保命歌括》卷二十七。为《医学入门》卷八

“开郁正元散”之异名。见该条。

72016 消积正元散

【方源】《便览》卷三。

【组成】白术(炒) 茯苓 陈皮 青皮 砂仁 麦芽 山楂 甘草各三分 香附(炒) 神曲(炒) 枳实(炒) 海粉 玄胡各五分 莪术 红花

【用法】加生姜三片,水煎,空心服。

【功用】开郁气,化痰,健脾胃,消积止痛,攻补兼施。

【加减】上焦火郁,加黄连;下焦火,加盐、姜、梔、柏;冷气作痛,加沉香、木香各五分

【备考】方中莪术、红花用量原缺。

72017 消积皂矾丸

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】内金二两 雷丸五钱 山楂 神曲各四两 麦芽二两 陈皮三两 白术 皂矾各四两 苍术 茯苓各二两 川朴三两 扁豆 山药各二两 炙草 炙耆各三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。三岁小儿每服五至十丸,其他按年龄酌情增减,饭后温开水化下。

【主治】小儿消化不良,胃呆胃弱,慢性贫血,面黄肌瘦,肠寄生虫病,吃土,吃炭,泄泻,肠炎。

【宜忌】热性病勿服。

72018 消积阿魏丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】威灵仙一两 阿魏三钱 磁石(煨过) 牵牛 槟榔各五钱 莪术(煨)五钱 三棱一两 穿山甲(黄土炒黄)

【用法】上为末,醋面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,米汤送下。

【主治】久年痞块,食积兼有形者。

72019 消积肥儿糕

【方源】《医方易简》卷三。

【组成】建曲二两(去心) 淮山二两 使君子肉五钱 燕窠一两 海螵蛸五钱(浸淡) 五谷虫(取回此虫用大瓮一只装住,用

麻布盖口,绳扎固,米泔水向布外淋下,以半瓮水为度,欲换水,即将瓮复转去尽浊水,再放新米泔水,早晚一换,三四日方干净可用,然后放新瓦上火焙)二两。

【用法】上为末,加上白糖二两,糯米粉八两,合各药末微炒为饼,与儿食之。

【功用】消积肥儿。

72020 消积保中丸

【方源】《回春》卷三。

【组成】陈皮(去白)二两 青皮(清油炒)四钱 白茯苓(去皮)二两半 白术(土炒)三两 香附(醋炒)二两 半夏一两(泡七次,姜汁炒) 木香三钱(不见火) 槟榔七钱 莪术(醋浸,炒)八钱 三棱(醋浸,炒)八钱 莱菔子(微炒)一两 砂仁四钱 神曲(炒)一两 麦芽(炒)六钱 白芥子(炒)一两 黄连(姜汁炒)一两 真阿魏(醋浸)三钱 山梔仁(姜汁炒)一两 干漆(炒净烟)三钱

【用法】上为细末,姜汁、酒打糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,食后白汤送下。

【功用】顺气化痰,理脾消滞,散痞结,除积块,进饮食,清郁热。

【备考】加人参五钱尤效。

72021 消积通经丸

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【异名】调经化瘀丸(《中药制剂手册》)。

【组成】南香附(醋炒)十两 艾叶(醋炒)二两 当归(酒洗)二两 南芎一两 赤芍一两 生地二两 桃仁(去皮)一两 红花(酒洗)一两 三棱(醋炒)一两 莪术(醋炒)一两 干漆(炒)一两

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,临卧淡醋汤送下。

【功用】调经行血,温中化瘀。

【主治】①《鲁府禁方》:经闭。②《中药制剂手册》:气血不调引起的血瘀、血滞,经血不调,行经腹痛,经闭不通,以及骨蒸烦热、腰腿痠痛。

【宜忌】孕妇忌服。由于血虚引起的经闭不

宜服用。

72022 消积理中汤

【方源】《中医医案八十例》。

【组成】党参 白术 三棱 莪术 鸡内金 白芍 地骨皮各9克 茯苓 玄明粉(冲)各6克 干姜 酒大黄(后下)各3克

【功用】温中健脾，消食开胃，软坚泄热。

【主治】胃结石(胃柿石)。食滞于胃，运化失职，结聚成积，胃脘胀满不适，不思饮食，并可触到坚硬团块，推之移动，稍有压痛。

【加减】若大便溏泻，可去大黄、玄明粉，或减量；五心烦热，加鳖甲、地骨皮；小便短赤，倍用茯苓，再加车前子。

72023 消积集香丸

【方源】《卫生宝鉴》卷四。

【组成】木香 陈皮 青皮 三棱(炮) 广茂(炮) 黑牵牛(炒) 白牵牛(炒) 茴香(炒)各半两 巴豆半两(不去皮，用白米一撮同炒，米黑去米)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，温姜汤送下，不拘时候。以利为度。

【功用】消散积聚。

【主治】寒饮食所伤，心腹满闷疼痛，及积聚、痰癖、气块久不愈。

72024 消息向导丸

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】肉桂 蛇床子 川乌 马蔺花 良姜各五钱 丁香 韶脑 木鳖子(去壳)各二钱五分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如弹子大，黄丹为衣。每用一丸，以生姜汁化开，先将腰眼温水洗净后，将此药涂腰眼上，令人以手搓磨往来千遍，药尽方止，然后贴造化争雄膏。即用兜肚护住，初贴时忌七日，不得行房事，如人房，再用三钱贴脐上，又服中和丸一丸，然后行房，纵泄亦不多；如种子者，候女人经后一、三、五日将腰肾上膏药俱揭去，早上用车前子为末一钱，温汤调服，至晚交合，方得全泄成孕。

【主治】腰膝疼痛，两足痠辛，下元不固，胞冷精寒，小便频数，遗精白浊，及妇人下寒，赤白带下，子宫冷痛，久不孕。

72025 消脘桔梗散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】桔梗(去芦头，炒) 木占斯 防风(去叉) 甘草(炙、锉) 败酱 厚朴(去粗皮，姜汁炙) 桂(去粗皮) 人参 细辛(去苗叶) 干姜(炮)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心温酒调下，一日三次。以愈为度。

【主治】发背痈肿。

72026 消痞无价散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】石决明一两半(煅过) 芦甘石五钱(童便煅) 滑石五钱 雄黄二钱 朱砂五钱 冰片五分 海螵蛸五钱(煅，去壳)

【用法】上为细末。每服三分或五六七分，用不落水鸡肝，竹刀切片，上开下连，掺药在内，将箬包好，入砂罐，米泔半碗，重汤煮熟，连汤食尽。眼盲者，服四五肝即愈。

【主治】小儿疳积，疳眼。

72027 消痞化虫丸

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】茺莢 黄连 神曲 麦蘖各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。随儿大小加减，空心米汤送下。

【主治】小儿因疳生虫，五心烦热者。

72028 消痞生肌散

《吴氏医方类编》卷一。为原书同卷“生肌散”之异名。见该条。

72029 消痞羊肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】谷精草 地骨皮各五钱 胡连 柴胡各三钱 甘草 芦荟各三分

【用法】上为末。羊肝一具，竹刀剖片勿断，将药末五分掺入肝内，用线捆好，砂锅内煮熟，任服。七日即愈。

【主治】心脏受痞，小便不通，口干舌烂，牙臭。

72030 消痞芩黄汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】大黄 芒消 芩黄 芦荟(生) 川连 胡黄连 黄芩 雄黄

【用法】水煎服。

【功用】泻热毒。

【主治】牙疳。毒热攻胃，龈肉赤烂疼痛，口臭血出，牙枯脱落，穿腮蚀唇。

【加减】服后便软及不食者，去大黄、芒消，加石膏、羚羊角。

72031 消痞扶脾散

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】茯苓 淮山药各二十两 芡实十两 炒麦芽五两 炒莲子十两 炒谷芽五两 炒扁豆 炒薏米各十两 炒内金 炒福参各五两

【用法】上为细末，和梗米粉为散。

【主治】小儿脾胃虚弱，饮食减少，面黄肌瘦，泄泻便溏。

72032 消痞鸡肝散

【方源】《仙拈集》卷三引《集验》。

【组成】鸡肝一具(不落水) 雄黄二分(研末)(一方加谷精草、海粉)

【用法】瓷碗盛之，捣匀。好酒二盏入肝内，饭上蒸熟食。三四次愈。

【主治】小儿五疳。

72033 消痞明目汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】苍术6克 鸡内金3克 神曲当归各6克 酒白芍3克 甘草1.5克

【功用】消痞健脾，养肝明目。

【主治】疳疾上目，病变初期，始见雀目者。

【方论选录】方中苍术健脾除障而明目，鸡内金、神曲健脾消食而除积，当归、酒白芍补养肝血，甘草健脾和中。

72034 消痞金蟾丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】大癞虾蟆十只(将砂仁填满其腹，以线系其脚，倒挂当风处，阴干，炙脆为末) 山楂 枳实 广皮 槟榔 胡连 雷

丸 使君子肉(炒香) 麦芽各一两 党参 於术各五钱

【用法】上为细末，为丸如米粒大，炙甘草粉为衣。每服十丸至十五丸，五更空心时糖汤送下。

【主治】小儿蛊胀。

72035 消痞肥儿丸

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】使君子(去壳) 胡黄连 黄连(炒) 芦荟 龙胆草(去芦) 缩砂(去壳) 三棱(煨) 橘红 茯苓(去皮) 白术(土炒) 香附(炒) 木香 苍术(米泔水浸炒) 槟榔(去脐) 人参各二钱五分 诃皮(炒)二钱 夜明砂(炒)三钱半 神曲(炒) 麦蘖(炒)各五钱 柴胡(去芦)三钱 莱菔子(炒) 芩黄各三钱五分

【用法】上为末，蒸饼为丸，如黍米大。用米饮汤送下。

【主治】小儿五疳。

72036 消痞肥儿丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草各三钱 神曲 麦芽 山楂各三钱半 胡连 芦荟 黄连各二钱半

【用法】黄米粉糊为丸，如粟米大。每服八分，白汤送下。

【功用】消痞化积，清热杀虫，补脾进食。

72037 消痞肥儿丸

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为原书“肥儿丸”之异名。见该条。

72038 消痞肥儿丸

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为原书“肥儿丸”之异名。见该条。

72039 消痞肥儿丸

《全国中药成药处方集》(抚顺方)。为原书“肥儿丸”之异名。见该条。

72040 消痞定痛散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黑羊角(煨)二钱 川山甲(炒)二钱 乳香一钱 没药一钱

【用法】上为末，作一服。空心黄酒调下。

【主治】下疳痛不可忍者。

72041 消疳保和丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】神曲(炒) 麦芽(炒) 半夏曲 使君子肉各五钱 白术(炒) 陈皮 山楂肉各一两 茯苓六钱 胡黄连 木香各二钱 砂仁五钱 川黄连(姜炒)六钱 莱菔子(炒)二钱 三棱(醋浸一宿，炒干)一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如芥子大。每服五分或八分，米饮汤送下。

【主治】小儿重积重疳。

72042 消疳退云饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【异名】消疳退云散(《眼科菁华录》卷下)。

【组成】陈皮 厚朴(姜汁炒) 苍术(米泔浸) 莱菔子(炒，研碎)少许 柴胡 甘草(炙)少许 枳壳(麸炒) 草决明(炒，研碎) 桔梗 青皮 黄连(酒炒) 蜜蒙花 梔子(炒黑) 黄芩(酒炒) 神曲(炒) 家菊花各等分。

【用法】上锉一剂。姜皮、灯心为引，水二钟煎服，滓再煎服。

【主治】疳眼伤脾湿热熏，木盛土衰风毒生，渴泻肚大青筋露，目札涩痒且羞明，时时揉鼻常掇发。

72043 消疳退云散

《眼科菁华录》卷下。为《审视瑶函》卷四“消疳退云饮”之异名。见该条。

72044 消疳退热饮

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】山楂(去子) 乌药 灯心 竹茹 槟榔尖 使君子 芫荽仁 淮木通 黑牵牛 大黄 柴胡 莪术(煨) 枳壳(去瓢) 黄芩 甜葶苈

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】肝胆经热毒瘰癧，小儿疳积发热，肚大青筋，骨瘦如柴。

72045 消疳退翳汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】胡黄连1.5克 青黛0.3克 炒山楂 炒神曲各6克 鸡内金3克 槟榔6克

【功用】消疳除积，清肝退翳。

【主治】土虚木旺，肝火上攻，白膜满遮，糜烂枯凸者。

72046 消疳理脾汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】芫荽 三棱 莪术 青皮(炒) 陈皮 芦荟 槟榔 使君子肉 甘草(生) 川黄连 胡黄连 麦芽(炒) 神曲(炒)

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】脾疳。面黄，肌肉消瘦，身体发热，困倦喜睡，心下痞硬，乳食懒进，睡卧喜冷，好食泥土，肚腹坚硬疼痛，头大颈细，有时吐泻，口干烦渴，大便腥粘。

72047 消疳清热汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川连 芦荟 青皮 建曲 尖生胡连 使君子 胆草 楂肉 谷芽 茯苓 当归

【主治】麻疹正期后连热，疳黄肌瘦，癆瘵。

72048 消疳解毒散

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【异名】革四(《痧症全书》卷下)、五十二号 泰象方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】薄荷五分 儿茶一钱 冰片一分 人中白三钱 天花粉一钱 甘草五分 青黛(水澄)一钱 黄连五分 牛黄一分 珠子二分 雨前茶五分 白礞一钱

【用法】上为极细末，以无声为度。先以浓茶拭净，方吹。

【主治】痘后牙疳。

72049 消疳麝香丸

《医方类聚》卷二五四引《简易方》。为《元和纪用经》“麝香丸”之异名。见该条。

72050 消痛万全汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】金银花七钱 当归五钱 生甘草三钱 蒲公英三钱 牛蒡子二钱 芙蓉叶七

个(无芙蓉叶时,用桔梗三钱,天花粉五钱)

【用法】水煎服。

【主治】身上、手足之疮疽。

72051 消痈苍耳汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】苍耳子二钱 甘草五分 杏仁薄荷 瓜蒌各一钱

【用法】水酒各一钟,煎服。其滓包敷脐上,二服见效。

【主治】肠痈。小腹作痛,恶寒,肚皮紧急,一脚不能举步。

【加减】有脓者,加木香、当归各五分。

72052 消痈还阳丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】人参三钱 白术一两 生甘草三钱 天花粉三钱 生黄耆一两 金银花二两 肉桂一钱 当归五钱 乳香末一钱

【用法】水煎服。

【功用】大补气血,消痰化毒。

【主治】阴痈,两臂之间忽然生疮而变成痈疽者。

72053 消痈护产汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】当归一两 川芎五钱 金银花五钱 蒲公英三钱 荆芥一钱 生甘草二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后痈毒。

72054 消痈顺气散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】乌药 当归 川芎 白术 黄芩 羌活 防风 陈皮 桔梗 甘草 独活 白芍 连翘 人参 香附 米仁 紫菀

【主治】妊娠生痈,或暴怒伤肝,忧郁伤脾,或恣食膏粱炙煏伤胃,或形寒饮冷独伤肺,经久变为热,发为咳嗽,甚则肺叶焦萎,略吐臭痰,或红或黄,或脓或血,胸中疼痛,胀满喘急,不能安卧,名曰肺痈。更有举重伤筋,或闷挫伤腰,气血停滞日久,则成腰疽肾痈,胎气受损。又有贪淫之辈,服金石亢

热之药,助行房事,积毒流注胎中,则成孕痈,腹皮甲错,腹上热如火灼,按之沉而痛,脉沉数而滑者。

【方论选录】是方芎、归、芍以养血,参、术、草以补气,乌、陈、附、梗以利上、中、下三焦滞气、逆气,羌、防、独活以理周身百节之游风、伏风;芩、翘清热清火;米、菀止嗽排脓。气血足则胎自安,气不滞,血不瘀,则痈毒自散,且火泻热清毒势解而嗽止矣。

72055 消痈益志丹

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】远志肉(米泔浸洗、晒、炒)

【用法】上为末。每服三钱,热酒送下。

【主治】痈疽,未溃即散,已溃即敛。

72056 消痈散毒汤

《观聚方要补》卷八。即《玉案》卷六“消痈散毒饮”。见该条。

72057 消痈散毒饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】青皮 浙贝母 天花粉各二钱 蒲公英(开黄花,即满地金钱)一握(捣汁) 连翘 鹿角屑 当归各一钱五分

【用法】水、酒各一钟,煎服。

【主治】乳痈,恶寒发热,掀肿疼痛。

【备考】本方方名,《观聚方要补》引作“消痈散毒汤”。

72058 消菰通结汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】净朴消四两 鲜莱菔五斤

【用法】将莱菔切片,同朴消和水煮之。初次煮,用莱菔片一斤,水五斤,煮至莱菔烂熟捞出。就其余汤,再入莱菔一斤。如此煮五次,约得浓汁一大碗,顿服之。若不能顿服者,先饮一半,停一小时,再温饮一半,大便即通。

【主治】大便燥结久不通,身体兼羸弱者。

【加减】若脉虚甚,不任通下者,加人参数钱,另炖同服。

【方论选录】软坚散结,朴消之所长也。然其味咸性寒,若遇燥结甚实者,少用之则无

效，多用之则咸寒太过，损肺伤肾。其人或素有劳疾或下元虚寒者，尤非所宜也。惟与莱菔同煎数次，则朴消之咸味，尽被莱菔提出，莱菔之汁浆，尽与朴消融化。夫莱菔味甘，性微温，煨熟食之，善治劳嗽短气，其性能补益可知。取其汁与朴消同用；其甘温也，可化朴消之咸寒；其补益也，可缓朴消之攻破。若或脉虚不任通下，又借人参之大力者，以为之扶持保护。然后师有节制，虽强悍亦可用也。

72059 消黄去疸汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】茵陈三钱 苡仁三两 茯苓二两 车前子三两 肉桂三分

【用法】水煎服。

【主治】黄疸。一身尽黄，面目亦黄者。

【方论选录】黄疸虽成于湿热，毕竟脾虚不能分消水湿，以致郁而成黄。本方用茯苓、苡仁、车前大剂为君，分消水湿，仍是健脾固气之药，少用茵陈以解湿热，用桂引入膀胱，尽从小便而出，无事张皇，而暗解其湿热之横。此方之澹而妙，简而神也。四剂之后减半，加白术一两，再用四剂，则全愈而无后患矣。

72060 消黄败毒散

【方源】《医钞类编》卷二十一。

【组成】羌活 柴胡 桔梗 前胡 独活 茯苓 枳壳 川芎 大黄 芒消 甘草 薄荷

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】热毒壅积。

72061 消黄栀子汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】大黄四钱 芒消三钱 栀子三钱

【用法】煎大半杯，热服。

【主治】阳黄，汗出腹满者。

72062 消虚至凉汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】元参七钱 麦冬五钱 白芥子二钱 竹叶三十片 干菊花二钱 生地三钱

陈皮五分 丹皮二钱。

【主治】人病火盛之症，大渴引饮，呼水自救，朝食即饥，或夜食不止，或久虚之人，气息奄奄，不能饮食者。

【方论选录】方中玄参能去浮游之火，使阳明之余火，渐渐消灭；麦冬消肺中之热，断胃中之路；用生地清肾中之火，断胃之去路；加丹皮截胃之旁路；竹叶、白芥子清痰行心，又截胃中之路。四面八方，俱是分散其势，则余火安能重聚。

72063 消痔千金散

【方源】《医统》卷七十四引《活人心统》。

【组成】孩儿茶五分 冰片半分 熊胆二分 甘草三分 赤石脂 黄连各三分 寒水石五分 硼砂一分

【用法】上为细末。猪胆汁调搽。或人胆内以竹管入胆内，以线缚口，紧插入肛门内挫之，自然痔病愈。

【主治】大便诸痔，肿胀不已。

72064 消斑化疹汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】玄参五钱 归尾三钱 石膏三钱 白芍五钱 地骨皮三钱 丹皮三钱 荆芥二钱 木通一钱 青蒿三钱 升麻一钱 麦冬三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿发热二三日，肌肤之间隐隐发出红点，如物影之摇动，时有时无者。

72065 消斑快毒汤

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】连翘 玄参 生地 牛蒡 木通 蝉蜕 丹皮 荆芥穗 黄连 甘草 地丁 赤芍

【主治】痘疮夹疹夹斑，肤红如醉者。

【加减】极热者，加木黄，及灯心二十茎。

72066 消斑青黛饮

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄连 甘草 石膏 知母 柴胡 山梔仁 玄参 升麻 生地 黄芩 人参 青黛

【用法】加生姜三片、豆豉二十粒为引，水煎服。

【主治】阳毒发斑。或发于面部，或发于背部，或发于四肢，极其稠密，状如绵纹。

【备考】方中黄芩，《幼科指南》作“黄耆”。

72067 消斑青黛饮

【方源】《回春》卷二。

【组成】柴胡 玄参 黄连 知母 石膏 青黛 生地黄 山梔 犀角 人参 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎，临服人醋一匙同服。

【主治】热传里，里实表虚，血热不散，热气乘虚出于皮肤而为斑，轻如疹子，重则如锦纹，重甚则斑烂皮肤。

【方论选录】《医方集解》：发斑虽出胃热，亦诸经之火有以助之。青黛、黄连以清肝火，梔子以清心肺之火，玄参、知母、生地以清肾火，犀角、石膏以清胃火。此皆大寒而能解郁热之毒者；引以柴胡，使达肌表，使以姜、枣，以和营卫，其用人参、甘草者，以和胃也。胃虚故热毒乘虚入里，而发于肌肉也。加苦酒者，其酸收之义乎！

72068 消斑青黛饮

【方源】《羊毛瘟证论》卷下。

【组成】大生地二两（取汁） 犀角尖三钱 黄连一钱 玄参五钱 生石膏一两 知母八钱 山梔子二钱 柴胡八分 甘草二钱 生大黄一钱 青黛一钱 黄蜜五钱

【用法】水煎去滓，入生地汁、青黛、黄蜜，和匀服。

【主治】羊毛瘟邪，毒火内炽，攻解不当，下迟伤阴，内外火并，攻胃发斑，色现紫赤，狂躁作呕者。

72069 消斑青黛饮

【方源】《麻疹集成》卷四。

【组成】青黛 川连 知母 尖生 梔炭 玄参 甘草

【主治】热邪传里，里实表虚发斑。

72070 消斑承气汤

【方源】《片玉痘疹》卷七。

【组成】枳壳 厚朴 大黄（酒炒） 黄柏 黄芩 梔子 连翘 木通 甘草（一方有紫草）

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】毒火内蓄，痘疮应出不出，热甚腹胀气粗，烦躁闷乱，大便秘结。

【加减】病甚者，加芒消。

【方论选录】斑之为病，火毒伏于胃家，郁于肌肉则为此征，故用枳、朴、木通以宽其胃气，芩、柏、梔、翘以清其郁火，甘草以和其中，大黄为君，以通利之，则斑自消矣。

72071 消斑活命饮

【方源】《医方经验汇编》。

【组成】川大黄（酒炒） 黄芩（酒炒） 连翘 甘草 梔子（炒黑） 苏荷 板蓝根 青黛 西洋参（隔汤炖） 当归（酒洗） 大生地（炒） 广郁金 紫背浮萍 紫菊花（亦可用根）

【用法】水煎服。

【主治】葡萄疫。

72072 消斑神效汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】玄参一两 麦冬一两 升麻三钱 白芷一钱 白芥子三钱 沙参三钱 丹皮五钱

【用法】水煎服，连服三剂。

【主治】一时身热，即便身冷，满体生斑如疹者。

【方论选录】此证乃火从外泄而不得，尽泄于皮肤，故郁而生斑。本方之妙，在用玄参、麦冬以消斑。尤妙在升麻多用，引玄参、麦冬以入于皮肤，使群药易于奏功，而斑无不消也。

72073 消斑解毒汤

【方源】《痘疹金镜赋》卷六。

【组成】金银花 木通 防风 荆芥 连翘 牛蒡 甘草 黄芩 知母 归身 紫草 山梔

【主治】热极发斑，色赤如火，或发紫大斑。

72074 消暑十全饮

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】人参 厚朴(姜制) 白术 香薷 木瓜 白扁豆 黄耆 陈皮 白茯苓 甘草 各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，不拘时服。

【功用】消暑气，进饮食。

72075 消暑十全饮

【方源】《玉机微义》卷十一。

【异名】消暑十全散(《赤水玄珠》卷二)。

【组成】香薷 扁豆 厚朴 甘草 紫苏 白术 茯苓 藿香 木瓜 檀香

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】①《玉机微义》：伤暑。②《赤水玄珠》：伏暑，胃气不和，心腹满痛。

72076 消暑十全散

《赤水玄珠》卷二。为《玉机微义》卷十一“消暑十全饮”之异名。见该条。

72077 消暑十全散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】香薷二钱 扁豆(炒，捶) 厚朴(姜制) 陈皮 甘草(炙) 白术 茯苓 木瓜 藿香 苏叶各一钱

【用法】水煎，热服，不拘时候。取微汗效。

【主治】伤暑，兼感风邪，发热头痛。

【方论选录】《医略六书》：暑伤心脾，风侵经络，故头痛恶心，发热口干焉。香薷散夏月之表，厚朴疏胸腹之里，扁豆助脾却暑，白术燥湿健脾，藿香快胃以祛暑，木瓜舒筋以和脾，陈皮理中气，茯苓清治节，苏叶散风邪，甘草和胃气也。此调中解表之剂，为风暑合邪之专方。

72078 消暑至神汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】青蒿五钱 石膏五钱 麦冬五钱 半夏一钱 黄连一钱 人参三钱 甘草一钱 茯苓五钱 竹叶五十片

【用法】水煎服。

【主治】中暑。

【方论选录】此方妙在用青蒿去暑，再加二钱香薷，则暑气自化。用石膏以平泻其胃中

之邪火，邪火一去，胃气始转，水能下行，不蓄停于膀胱之内，而散逸于四肢；况又有茯苓导其下行者乎？又虑火气伤心，复加黄连以救心，人参以救肺，各脏既安，胃邪必通，此治阳症之妙法也。

72079 消暑活产丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 当归二两 川芎一两 肉桂二钱 青蒿一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后忽感中暑，霍乱吐泻。

【方论选录】产妇只补气血，气血既回，暑气自散，况方中又有祛寒解暑之味乎，所以奏功独神也。或疑惑暑是热，胡为反用肉桂？不知气血大虚，遍身是寒，一感暑气便觉相拂，非有大热之气，深入腹中也，不过略感暑气，与本身之寒，两相攻击以致霍乱。今仍用肉桂以温其虚寒，以青蒿而解其微暑，用之于大剂补气血之中，是以驾御而不敢有变乱之形。此立方之妙，而建功之神也，又何必疑哉！

72080 消暑清心饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】香薷(去老梗) 泽泻(去粗皮) 各一两(炒熟，锉，去壳一斤，用生姜一斤切碎，煮烂拌匀，酿一宿，焙干) 净黄连 羌活 猪苓(去皮) 厚朴五钱(去粗皮，锉碎，每一斤用生姜一斤切薄片，烂杵拌匀，酿一宿，慢火炒干) 白术 干葛 赤茯苓(去皮) 升麻 川芎各半两 甘草一两二钱

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盏，煎七分，不拘时候，带凉服。

【主治】小儿暑风。伏热中暑，烦躁作渴，神气不清，及有惊搐。

72081 消暑清心饮

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】香薷 泽泻 扁豆 黄连 薄荷 猪苓 厚朴 葛根 赤茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】中暑惊搐。

72082 消暑清心饮

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】藿香 泽泻 白术 肉桂 辰砂 茯苓

【用法】水煎服。

【主治】小儿暑风。

72083 消痞大成膏

《景岳全书》卷六十四。即原书同卷“攻坚败毒膏”加芦荟、木香各一两，蟾酥三钱。见该条。

72084 消痞五疳丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】胡连五钱 木香三钱 麝香六分 芦荟三钱 赤茯苓四钱 蝉退八钱 使君肉五钱 泽泻四钱 蛤粉 胆草 粉甘草各三钱 金灯十五个 水獭肝一两 羊肝一两 防风三钱

【用法】除麝香另研，獭肝、羊肝焙干外，余者共为细末，水泛小丸，三厘重。三岁以下每服三丸，三岁以上每服五丸。

【功用】消痞除积。

【主治】面黄肌瘦，懒食喜睡，腹胀泄泻，日晡潮热，目赤眵多，白翳遮睛，眼睑烂痒，口舌生疮，惊悸咬牙，肌肉肿痛，齿龈出血，喜食生冷，口唇蚀裂，咳嗽气喘，肚大青筋。

【宜忌】忌食生冷、硬物。

72085 消痞化积丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】枳实 姜黄连 人参 白术 麦芽 半夏曲 紫朴 云茯苓各三两 炙甘草 干姜各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，七分重。每服一丸，开水送下，一日二次。

【功用】通肠胃，助消化，消痞胀。

【主治】小儿痞积，乳食停滞，泻痢频繁，肚胀腹痛，呕逆不食，面黄肌瘦。

【宜忌】忌食生冷、硬物。

72086 消痞去积丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】黑豆 制香附 五灵脂各五钱 (炒)

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服五分，姜汤送下。

【主治】一切痞积、气积、酒积、食积。

72087 消痞阿魏丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】阿魏 川连 制南星 姜半夏 瓜蒌仁 白芥子 连翘 神曲 川贝 麦芽 山楂 莱菔子各一两 风化消 食盐 胡连各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，辰砂为衣。每服一二钱，开水送下。服后食胡桃肉以除药气。

【主治】①《重订通俗伤寒论》：痞。②《饲鹤亭集方》：诸般积聚、癥瘕、痰癖。

72088 消痞阿魏丸

【方源】《中药成方配本》(苏州)。

【组成】醋浸阿魏五钱 胡黄连二钱五分 黄连一两 莱菔子二钱五分 焦山楂一两 焦六曲一两 炒麦芽一两 瓜蒌仁五钱 漂半夏一两 制南星一两 象贝五钱 连翘五钱 风化消二钱五分 石碱二钱五分 生姜二两

【用法】先以阿魏、莱菔子、瓜蒌仁三味研末起头，余药共研细末，将生姜煎汤溶化风化消、石碱为水泛丸，如绿豆大，约成丸六两八钱。每服一钱五分，每日二次。服后略食胡桃肉，以解药气。

【功用】消痞。

【主治】痞瘕癥块。

【宜忌】孕妇忌服。

72089 消痞狗皮膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】三棱 蓬茂 米仁 山梔 秦艽 各一两五钱 黄连四钱 大黄 当归各九钱 甲片四十片 全蝎四十只 木鳖二十个 巴豆十粒

【用法】上用麻油一百二十斤，煎枯去滓后，下黄丹五十二两收膏，加入阿魏、阿胶、芦荟各一钱，麝香、乳香、没药各三钱，研末调和膏内。用时将膏在热茶壶上烘至暖烱，

贴患处，以手心揉百转，无不效验。贴后能作寒热、肚痛下秽，其疾消，愈矣。

【主治】一切气疾痞块，癥瘕血块，积聚腹胀疼痛。

【宜忌】百日内禁忌酒色气恼，劳心劳力，诸般发物。

72090 消痞狗皮膏

【方源】《中药成方配本》(苏州)。

【组成】羌活四两 独活四两 防风四两 麻黄四两 威灵仙四两 桂枝四两 制川乌四两 制草乌四两 三棱四两 蓬莪术四两 当归四两 赤芍四两 乌药四两 秦艽四两 生香附四两 白芷四两 桃仁四两 草果二两 常山四两 大黄四两 槟榔二两 红花四两 干姜四两 制白附二两 五加皮四两 生地四两 僵蚕四两 全蝎四两 (以上为甲组药) 麝香一钱 阿魏二两 肉桂一两 白胡椒一两 公丁香五钱 广木香五钱 制乳香一两 制没药一两 山奈一两 苏合油一两 (以上为乙组药)

【用法】将甲组药用麻油五十斤，浸一日，用文火煎至药枯，去滓滤清，再煎至滴水成珠，加入东丹(炒热)十九斤，渐渐下入，搅匀为度，约成膏五十三斤。在摊膏时加入乙组药(研末)及苏合油(烱化)和匀，每张连皮，大者一两，小者六钱。烘软贴患处。

【功用】软坚消痞。

【主治】癥瘕积聚。

【宜忌】孕妇慎用。

72091 消痞肥儿丸

【方源】《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。

【组成】鸡内金四两(炒) 焦山楂 六神曲 炒麦芽 炒白术各一两半 炒君子一两二钱 川黄连 胡黄连 炒谷虫 拣人参各一两 云茯苓 炙甘草各九钱 炒芦荟八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，七分重。三岁以上者每服一丸，三岁以下至一岁者减半，一岁以内者服四分之一，每日可服二、三次。

【功用】消痞杀虫。

【主治】脾虚食滞，积久成痞，腹大颈细，青筋暴露，面苍骨立，寐不合睛，骨蒸发烧，嗜食无厌；痞胀，由于食积肠胃，以致脘腹胀大，口臭唇裂，肌瘦发烧；虫积，由于蛔虫盘聚，腹内结块，起伏无定，攻窜疼痛，寐而惊醒，形消瘦立。

【宜忌】脾胃寒泻者忌服。

72092 消滞千金丸

【方源】《普济方》卷一七四。

【组成】牵牛(头末)四两 香附子二两 五灵脂一两半 京三棱五钱

【用法】上为末，醋糊为丸。每服二三丸，甘草汤送下。

【主治】老人虚人，一切虚寒痼癖积块，攻胀疼痛；诸脏气虚，积聚烦闷；及饮食中蛊毒，或宿食留饮，妇人产后败血不消，女子月水不通，结为癥瘕，时发寒热，唇口焦黑，肢体瘦削，嗜卧，多厌食，少腹痛，大便糟粕，变成冷痢。

72093 消滞止痛丸

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】公丁香 广木香 紫蔻仁 京三棱 蓬莪术 炒白术 葶苈子 牙皂角 明没药 肉桂 干姜 穿山甲 巴豆霜 川厚朴 玄胡 吴茱萸 五灵脂 酒大黄各二两

【用法】上为细末，醋水为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服十粒，早晨温开水送下。三岁每服一丸。

【主治】胃脘寒痛，饮食不消，恶食吐酸，胸膈胀满，肚腹疼痛。

【宜忌】虚弱者及孕妇忌用。

72094 消滞升阳汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】厚朴 半夏 枳壳 广皮 升麻 葛根

【功用】消胃滞，发表邪。

【主治】胃家有痰饮食滞，无汗，胸前饱闷。

72095 消滞调脾饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】陈皮 滑石 黄连各八分 神曲

麦芽 白芍 车前子 泽泻各六分

【用法】加生姜三片，水煎，不拘时服。

【主治】小儿泄泻，臭秽之极。

72096 消湿化怪汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白术九钱 茯苓三钱 薏仁九钱 芡实九钱 泽泻五钱 肉桂五分 车前子二钱 人参三钱 牛膝二钱 萆薢三钱 白矾五分 陈皮二钱 白芥子三钱 半夏二钱

【用法】水煎服。

【功用】峻补脾气，分消湿邪。

【主治】脾经湿气，结成肿块，脚肚之上，忽长一大肉块，如瘤非瘤，如肉非肉，手不可按，按之而痛欲死。

72097 消温散火汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】生甘草二钱 地榆二钱 茯苓三钱 兰汁二钱（如无，以青黛二钱代之） 马齿苋三钱 红花二钱 蒲公英五钱 白术三钱 天花粉三钱 车前子三钱 薏仁五钱

【用法】加水煎汁一碗服。

【主治】敦疽、鼠伏疽属阳症者。

72098 消寒止痛丹

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】广陈皮一两 广木香四两 白胡椒 全蝎 巴豆霜各二两 寒食面四两

【用法】上为细末，醋为丸，如绿豆大。每服五粒，冷开水送下。三至十岁用二粒。

【主治】胃脘寒痛，气滞不舒，食积腹痛，饮食过度，嘈心倒饱，内伤生冷，寒气串疼，疟疾膨胀。

【宜忌】孕妇及虚弱症忌用。

72099 消愁破结酿

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】僵蚕（炒）五钱 全蝎五个 白芷一两 白芥子（炒）一两 白术（土炒）二两 附子三分 紫背天葵根八两

【用法】先将前六味各为末，将天葵煮汁一碗，同入在黄酒内，用酒二十斤，煮三炷香，三日后，日服三杯，以面红为度。

【主治】瘰癧。

72100 消痰荡秽汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】水蛭（炒黑，净末）三钱 当归二两 雷丸三钱 红花三钱 枳实三钱 白芍三钱 牛膝三钱 桃仁四十粒（去皮，捣碎）

【用法】水煎服。

【主治】血瘀。

72101 消痰清胃汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】陈皮（去白）一钱半 法半夏二三钱 茯苓二钱 炙草一钱 泽兰叶二三钱 生姜二钱 荆芥七分

【用法】水煎，热服。

【主治】瘀血犯胃，脉弦涩，不恶食，呕逆而多血腥者。

72102 消痰塌血汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】青皮一钱 陈皮（去白）八分 木香六分 砂仁 黑丑 槟榔 厚朴各一钱 苏木七钱 红花一钱 枣木心三钱 川归三钱 使君壳 香附子（炒） 莱菔子（炒） 桃仁各一钱 莪术 三棱（煨） 赤苓 木通 白术 枳壳（炒） 黄连（炒） 栀子（炒） 苏子（炒）各一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人血蛊，胀满善食，肚如笊箕者。

72103 消痰止咳膏

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】米白糖一斤 好猪板油四两 谷雨前茶叶二两

【用法】上用水四碗，先将茶叶煎至二碗半，将板油去膜切碎，连苦茶、米糖同下熬化，听用。每服数匙，白滚汤冲服。

【主治】咳嗽。

72104 消痰平胃汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】玄参 青蒿各一两 半夏 茯神 麦冬 车前子各三钱

【用法】水煎服。

【主治】春温。春月伤风，谵语潮热，脉滑。

【方论选录】此方主青蒿者，以青蒿能散阴热，尤能解胃中之火；得玄参、麦冬更能清上焦之炎，火热去而痰无党援；又得半夏、茯苓、车前以利其水，则湿去而痰涎更消。痰消而火热更减，欲作郁蒸潮热，迷我心君，胡可得哉！

72105 消痰利气汤

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】陈皮 贝母 茯苓各一钱半 杏仁 荆芥各一钱 紫苏 枳壳 桑皮（鲜者尤妙） 泽泻各八分

【用法】先服两帖。痰消喘定，去贝母、荆芥、枳壳、杏仁，加荆芥子，倍茯苓。

【主治】四肢不能转侧，痰气喘促，饮食不进，腹胀甚者。

72106 消痰降火汤

【方源】《顾松园医镜》卷十四。

【组成】贝母 瓜蒌霜 花粉 茯苓 苏子 橘红 枳壳 连翘 黄芩

【功用】消痰利气降火。

【主治】痰火上升而聋者。

【加减】原书治上证，加竹沥、梨汁，甚则加黄连。

72107 消痰降火汤

【方源】《喉科秘诀》卷上。

【组成】花粉二钱 玄参二钱 白芍一钱 枯芩一钱 桔梗一钱 甘草五分 山豆根五分 半夏五分 白茯苓一钱 知母一钱 桑皮一钱 黄连五分

【用法】水二碗，煎七分，空心服。

【主治】痰热喉症。

72108 消痰茯苓丸

《直指》卷十八。为《百一》卷五引《全生指迷方》“治痰茯苓丸”之异名。见该条。

72109 消痰咳嗽丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白术 牵牛（炒） 槟榔 白芷 厚朴（制）各二两 半夏五两（洗） 陈皮四两

（去白） 干生姜一两半 人参 木香 青皮 各一两 赤茯苓 枳壳（麸炒，去瓤）各三两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后生姜汤送下。

【功用】消痰快气，除咳嗽，利咽喉。

72110 消痰消核膏

【方源】《理渝》。

【组成】甘遂 南星 半夏各一两

【用法】麻油熬，下麻黄、大戟、僵蚕各四钱，白芥子五钱，藤黄六钱，朴消七钱，黄丹收。贴患处。

【主治】痰核。

72111 消痰流气饮

【方源】《外科集腋》卷二。

【组成】僵蚕 石菖蒲 木香 木通 菊花 防风 羌活 黄连 黄芩 甘草 川芎 各等分

【用法】上为末。每服二钱，茶清送下。

【主治】气壅头目不清。

72112 消痰噤化丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】苦丁茶 孩儿茶各五钱 牛黄四钱 天花粉三钱 川贝母 硼砂 真沉香各二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。噤口中润下。

【主治】一切痰气凝结，痰嗽喘急。

72113 消障复明散

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】归尾 生地 赤芍 蝉蜕 连翘 荆芥 防风 龙胆草 草决明 木贼草 谷精草 黄芩各等分

【用法】上为散。灯心煎汤送下。

【主治】麻毒未清，流入肝脾，眼红流泪，起障未消。

72114 消障救目汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】石蟹一钱半（生，研末） 连翘一钱半 羚羊角一钱 草决明一钱 白蒺藜一钱 防己一钱 羌蔚子一钱 龙胆草五分

(酒炒) 木贼草五分 甘菊花八分

【用法】水煎服。

【主治】眼生翳障，及胬肉、红筋、白膜。

72115 消障救睛散

【方源】《古方选注》。

【组成】石蟹一钱五分(生研) 羚羊角一钱(镑) 草决明一钱 连翘一钱五分 白蒺藜一钱 龙胆草五分(酒炒灰) 甘菊八分 木贼草五分 汉防己一钱 茺蔚子一钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【功用】消翳。

【主治】白睛胬肉，状若鱼胞浮睛。

【方论选录】方中石蟹为君，味咸性大寒而燥，去湿热，消胬肉，如鼓应桴，堪称仙品。佐以羚羊角之精灵，息肝风，散恶血；草决明疗青盲，去白膜；连翘泻客热，散结气，专泄大小眦之热；酒炒龙胆退湿热之翳；白蒺藜散风破血；木贼、防己疗风胜湿；甘菊化风；茺蔚行血，诸药皆入肝经，仍能上行于肺。用之屡验，故敢质诸当世。

72116 消瘤二反膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】甘草 大戟 芫花 甘遂

【用法】先用甘草煎浓膏，笔蘸涂瘤四围，待干再涂，共三次；次以大戟、芫花、甘遂等分为末，以醋调，另用笔蘸药涂其中，不得近着甘草处。次日则缩小些，又以甘草膏涂四围，比先小些，中涂照前，自然渐渐缩小而消矣。

【主治】瘰瘤、瘰癧、结核。

72117 消瘤神应散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】山慈姑 海石 昆布 贝母各等分

【用法】上为末。每服二钱，白滚水调下。

【主治】瘰瘤。

72118 消瘤碧玉散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】硼砂三钱 冰片 胆矾各三分

【用法】上为细末。用时以箸头蘸药点患

处。

【功用】开结通喉，搜热。

【主治】喉瘤。

72119 消瘰化坚汤

《医林纂要》卷十。为《兰室秘藏》卷下“救苦化坚汤”之异名。见该条。

72120 消瘰五海丸

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】海带 海藻 海蛤 海螵蛸 昆布 大贝 木香各一两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸重三钱，蜡皮封固。成人每服一丸，饭前温开水送服，或煎一碗当茶饮，一日三次。小儿酌减。外用樱桃核、好醋磨敷患处。

【主治】瘰瘤初起，肉色不变，渐长渐大。及瘰癧。

72121 消瘰五海饮

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】消瘰五海散(《回春》卷五)。

【组成】海带 海藻 海昆布 海蛤 海螵蛸各三两半 木香 三棱 莪术 桔梗 细辛 香附各二两 猪殃子七个(陈壁土炒，去油，焙干)

【用法】上为末。每服七分半，食远米汤送下。

【主治】脂瘤，气瘤。

72122 消瘰五海饮

【方源】《易简方便》卷四。

【组成】海带 海藻 昆布 海螵蛸 海螵蛸各五钱

【用法】煎汤，当茶饮。

【主治】瘰瘤。

72123 消瘰五海散

《回春》卷五。为《古今医鉴》卷九“消瘰五海饮”之异名。见该条。

72124 消瘰顺气散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生地二两 浙贝母二两 蛤粉(煨)一两五钱 海藻一两五钱 昆布一两五钱 浮海石(煨)一两五钱 海带一两五钱

【用法】上为细末。每服二钱，温开水冲服，一日二次。

【功用】平肝顺气，化癥消瘕。

【主治】脖项胸前癭瘤瘰癧，结核坚硬经久不消。

72125 消凝大丸子

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】川芎 当归各七钱 防风 荆芥 羌活 藁本 薄荷各半两 桔梗 甘草(炙)各七钱 滑石 石膏 白术 黄芩 山梔各一两 连翘 菊花各七钱

【用法】先将滑石、石膏另研，余作细末，和匀，炼蜜为剂，每剂一两，分八丸。每服一丸或二丸，茶汤嚼下。

【主治】目中青暗，如物伤状，重者白睛如血贯，或有眵泪沙涩。

【方论选录】上方消凝滞药也。君以川芎、当归治血和血；臣以羌活、防风、荆芥、藁本、薄荷、桔梗疗风散邪，引入手足太阳经；佐以白术、甘草、滑石，石膏调补胃虚，通泄滞气，除足阳明经热；使以黄芩、山梔、连翘、菊花去热除烦。淫热反克，风热不制者，俱宜服也。

72126 消翳复明膏

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】黄丹(水飞)四两 青盐一两(另研) 白沙蜜一斤 诃子八个(去核取末) 海螵蛸三钱(取末)

蜜熬数沸，净纸搭去蜡面，却下黄丹，用棍搅匀，旋下余药，将至紫色取出。

黄连十两 蕤仁半两 木贼草一两 龙胆草二两 杏仁七十五个(去皮尖)

【用法】上药黄连等五味入瓷器内，以水一斗浸之，春、秋五日、夏三日、冬十日，入锅内，文武火熬至小半斤，滤去滓，重汤炖成膏子，却入前药熬之，搅成紫色，入龙脑一钱。每用少许，点眼，药干，净水化开用。

【主治】阳跻受邪，内眦即生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然。

【方论选录】上方以黄连为君，以疗邪热也；蕤仁、杏仁、龙胆草为臣，为除赤痛，润烦躁，解热毒也；黄丹、青盐、龙脑、白沙蜜为佐，为收湿烂，益肾气，疗赤肿，和百药也；诃子、海螵蛸、木贼草为使，消障磨翳也。

72127 消翳复明膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄丹一两 青盐二钱半 海螵蛸 真珠各七分半 熊胆 麝香各二分 片脑五分(临时加入) 诃子二个(去核，研末) 槐柳枝各四十九条 冬蜜(熬一沸，去白沫，滤净)四两(上将蜜和黄丹炼至紫色，旋下余药，熬至滴水沉下成珠为度，除脑、麝成膏，后入) 黄连二两半 防风 当归 龙胆草 生地黄各五钱 木贼 白菊花各二钱半 蕤仁一钱 杏仁五分

【用法】上如前煎熬成膏，入蜜和匀，瓷碗盛，放汤瓶口上蒸炖成膏，滤净，入脑、麝和匀。点眼，又以热汤泡化洗眼。

【主治】眼目昏花，翳膜遮睛，内外障眼，一切眼疾。

72128 消臌万应丹

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】煨透人中白一两 地骷髅 莱菔子 六神曲各五钱 砂仁二钱(以上俱炒) 陈香橼一个

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服五七丸，灯心汤送下。

【主治】黄疸变臌，气喘胸闷，脘痛翻胃，痞胀结热，伤力黄肿，噤口痢。

72129 消臌至神汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【异名】八宝串(《串雅内编》卷三)。

【组成】茯苓一两 人参七钱 雷丸三钱 甘草二钱 萝卜子七钱 白术五钱 大黄六钱 附子一钱

【用法】水十碗，煎汤二碗，早服一碗，必然腹内雷鸣，少顷必下恶物满桶，即拿出倾去，再换桶，即以第二碗继之，又大泻大下，

至黄昏而止。淡淡米饮汤饮之，不再泻。

【主治】气臌血臌，食臌虫臌，经年而不死者。

72130 消癖神火针

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】蜈蚣一条 木鳖 五灵脂 雄黄 乳香 没药 阿魏 三棱 莪术 甘草 皮消各一钱 闹杨花 硫黄 山甲 牙皂各二钱 麝香三钱 甘遂五分 艾绒二两

【用法】作针。

【功用】消癖。

72131 消癖逐水丸

《保命歌括》卷二十三。为《直指》卷十二“消癖丸”之异名。见该条。

72132 消癖清肌汤

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】柴胡 鳖甲各一钱 黄芩 山楂肉 神曲 白芍药各七分 半夏 地骨皮 人参 木通各五分 胡黄连 甘草各三分

【用法】加生姜三片，煎服。

【主治】腹有癖块，寒热如疟，口渴尿赤，盗汗咳嗽，或昼歇夜发。

【加减】甚则加棱、蓬；虚则加苓、术。

72133 消癥去积丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】川楝子（巴豆七粒炒紫色，去巴豆）三棱（煨） 莪术（煨） 槟榔 青皮 陈皮 川芎 当归 玄胡（炒） 血竭 黄连 香附各五钱 木香三钱 阿魏二钱半 干漆二钱（炒）

【用法】上为末，醋化阿魏、神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】男女血瘕、血症、气块疼痛，寒热面黄，少食肿胀。

72134 消癥破积丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】三棱（煨） 干漆（炒去烟） 大黄（煨） 硃砂（入醋煎干） 巴豆（去油）各一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每

服三丸至七丸，空心米汤送下。

【功用】破一切血，下一切气。

【主治】男妇五积六聚，七癥八瘕。

【宜忌】不可过服。

72135 消风火解毒汤

《幼科证治大全》引《保赤全书》。为《片玉痘疹》卷七“消风去火化毒汤”之异名，见该条。

72136 消肿止疼药膏

【方源】《外伤科学》。

【组成】姜黄五两 羌活五两 干姜五两 梔子五两 乳香五钱 没药五钱

【用法】上为细末。用凡士林调成10%软膏，外敷患处。

【功用】祛瘀，消肿，止痛。

【主治】骨折、脱位初期及软组织损伤瘀肿疼痛者。

【备考】本方方名，《中医伤科学》引作“消肿止痛膏”。

72137 消肿止痛药水

【方源】《云南省农村中草药制剂规范》。

【组成】草乌20克 南星20克 半夏20克 雪上一枝蒿10克 白花蔓陀萝子20克 两面针子20克 重楼20克 细辛20克 冰片适量

【用法】上为粗末，置密闭容器内，加95%乙醇500毫升，冷浸7天，每日振摇数次，倾出上清液，药滓再冷浸两次，每次用95%乙醇300毫升最后一次用双层纱布过滤，合并三次滤液，加95%乙醇至1000毫升，混匀，装瓶备用。外用药涂擦患处，每日三至四次。

【功用】消肿止痛。

【主治】关节扭伤疼痛，风湿关节痛，疔肿。

【宜忌】有大毒，禁止内服。

72138 消毒犀角饮子

《御药院方》卷九。为《活人书》卷二十一“鼠粘子汤”之异名。见该条。

72139 消毒犀角饮子

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】犀角（磨水） 防风 荆芥各一钱半 牛蒡子二钱 甘草五分

【用法】水一盞半，煎七分，入犀角水，徐徐服。

【主治】斑或隱疹，瘙癢作痛，及風熱瘡毒。

72140 消積滯集香丸

【方源】《蘭室秘藏》卷上。

【組成】京三棱 廣茂 青皮 陳皮 丁香皮 益智 川楝子 茴香各一兩 巴豆（和皮米炒焦）五錢

【用法】上為細末，醋糊為丸，如綠豆大。每服五七丸，食前溫水、生薑湯任下。

【主治】傷生冷硬物不消。

72141 消脂膜導痰湯

【方源】《濟陰綱目》卷六。

【組成】半夏（姜制） 南星（火炮） 橘紅 枳殼（去瓢，麸炒） 茯苓 滑石（研細）各一錢 川芎 防風 羌活各五分 車前子七分

【用法】上細切，作一服。加生薑五片，水煎，空心服，以干物壓之。

【主治】①《濟陰綱目》：宮冷不孕。②《醫略六書》：痰納胞門，閉遏子宮，天癸不調，不能孕育。

【方論選錄】《醫略六書》：南星散痰燥濕，半夏燥濕化痰，防風祛閉以勝濕，枳殼滯滯以化氣，滑石通肌利竅，羌活燥濕通經，橘紅利氣除痰，川芎活血行氣，茯苓滲濕以清經脈，車前利濕氣以淨子宮，生薑開豁痰涎以清廓胞門也。水煎溫服，使痰化結開，則胞門清肅而經脈融和，天癸无不如度，何患不能生子乎！

72142 消癥止痛藥膏

【方源】《中醫傷科學講義》。

【組成】木瓜二兩 梔子一兩 大黃五兩 蒲公英二兩 地盤蟲一兩 乳香一兩 沒藥一兩

【用法】上為細末，飴糖或凡士林調敷。

【功用】消癥，退腫，止痛。

【主治】骨折傷筋，初期腫脹疼痛劇烈，不破皮者。

72143 消風去火化毒湯

【方源】《片玉痘疹》卷七。

【異名】消風化毒湯（《痘疹全書》卷一）、消風火解毒湯（《幼科証治大全》引《保赤全書》）。

【組成】防風 升麻 白芍 桂枝 荊芥 穗 葛根 牛蒡子（炒）

【用法】淡竹葉為引，水煎服。

【主治】痘初出之時，遍身作癢，爬搔不止者，此因火邪留于肌肉皮膚之間，不能即出所致。

72144 消風活血解毒湯

【方源】《喉科秘訣》卷上。

【組成】鮮生地一錢 銀花五分 干葛五分 防風五分 荊芥五分 升麻三分 連翹一錢 枳實八分 歸尾五分 赤芍一錢 桔梗一錢 山豆根五分 黃芩一錢 梔子四分 苦參根五分

【用法】水二碗，煎八分，不拘時候服，要溫服、多服。

【主治】痰熱喉。喉痛痰涎，略憎寒壯熱，生雙單鵝。

72145 消水腫歸氣飲子

【方源】《普濟方》卷一九二。

【組成】蘇葉（連嫩枝）一兩二錢 大腹皮三錢 川木通四錢 茯苓皮 姜皮 陳皮 桑皮 桔梗 地骨皮 五加皮 茯苓 麥門冬 甘草 五味子 草果各二錢

【用法】上為末，分為六服。每服七八錢，用水二鍾，加生薑三片，煎至八分，食前、臨卧連滓服，日進四服。腫消藥盡，六服全安。

【主治】面虛浮腫，四肢腫大，甚者入腹脇，致胸滿氣喘，微嗽，泄瀉，眠卧不能。

【宜忌】宜只吃白粥十日、半月、二十日。大忌生冷、油膩、酒醋、咸雞、鴨子、面食、硬飯、蔬菜。

72146 消腫調脾順氣湯

【方源】《古今醫鑑》卷六。

【組成】蒼朮 陳皮 厚朴 草果 砂仁 猪苓 木香 檳榔 大腹皮 香附 枳殼 澤瀉 桔梗 三棱 莪朮 官桂 大茴香

木通 人参 木瓜 桑白皮 牵牛(女用黑,男用白) 大黄 甘草

【用法】上锉。加生姜,水煎服。

【功用】消胀满,顺气和脾,除湿利水。

【主治】水肿。

72147 消毒加味犀角饮

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】牛蒡子三两(炒) 荆芥穗五钱 甘草(炙)一两 防风 川升麻各七钱半

【用法】上锉散。每服二钱,水一盞煎,去滓令温,时时令呷,或频灌之。

【主治】小儿毒气壅遏,壮热心烦,疮疹虽出,未能匀透,口舌生疮,不能吮奶。

【宜忌】大便不利者,不宜服。

72148 消食化气香壳散

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】青皮(炒) 陈皮(炒)各四两 萝卜子(炒) 木香 三棱(炒) 蓬术(炒) 神曲(炒) 麦蘖(炒)各一两 枳壳(炒)二两 半夏二两半 枳实(炒)一两 香附子一两半(醋浸) 槟榔 山楂 草果各一两 陈仓米一升(用巴豆二十粒炒黄色,去巴豆不用)

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,渐加至七八十丸,食后淡汤或白汤送下。

【功用】醒脾去积,顺气化痰。

72149 消痞退翳羊肝散

【方源】《仙拈集》卷三引《汇集》。

【组成】白术 苍术 莪术 水红花子各一钱

【用法】上为末。用羊肝一具,以竹刀切片,勿断,将药末掺内合定,饭锅上蒸熟食之。

【主治】疳癖壅眼。

72150 消痞退翳鸡肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】肉果二个 使君子五个 胡黄连 芦荟各一钱

【用法】上为末。鸡肝一具,酒少许,同捣烂去滓,人前药末调匀,蒸熟食之。吃二三

服立愈。

【主治】小儿肚大泄泻,面黄肌瘦,眼目障翳。

72151 消痞退翳猪肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】木鳖子 苍术 三棱 槟榔 远志各一钱半 木贼 蝉蜕各一钱 黄连 大黄 莪术各五分

【用法】上为末。用健猪肝一具,以皮消洗去血水,用竹刀切相连薄片,掺药在内,放砂锅内蒸熟,与儿食。如不肯食,焙干,或拌干饭内,或入面饼内令食。

【主治】疳癖,并痘症壅眼。

72152 消管祛脓火升丹

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】水银 火消 白矾各一两 皂矾五钱 雄精三钱 乌梅肉二钱 月石二钱五分

【用法】上药如法升三炷香,冷定刮下研细,每药五钱,加冰片一分、朱砂一钱再研和,用面浆糊作条如线香式,阴干,临用插眼内。

【主治】一切痈疽初溃,脓出不透,或久溃生管不敛。

滯

72153 滯干散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】滑石二两 白芷半两 寒水石粉半两 黄丹(生,看多少用,颜色如桃红为度)

【用法】上为极细末,和匀。每用干擦患处。

【主治】津液不收摄,泄汗,玄府不闭,腠疏,汗多不止。

海

72154 海马汤

《本草纲目》卷四十四。即《圣济总录》卷七十三“术香汤”。见该条。

72155 海马散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】海马(炙黄)一对 辰砂一钱 雄

精三钱 麝香五厘 梅片一分 甲片(黄土炒)一钱

【用法】上为细末,另加水银少许,研至不见星为度。外用。

【主治】痈疽发背,不腐溃者。

72156 海艾汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】海艾 菊花 薄荷 防风 藁本 藿香 甘松 蔓荆子 荆芥穗各二钱

【用法】上用水五六碗,同药煎数滚,连滓共入敞口钵内,先将热气熏面,候汤温,蘸洗之,留药照前再洗。

【主治】①《外科正宗》:油风。血虚,肌肤失养,风热乘虚攻注,毛发脱落成片,皮肤光亮,痒如虫行。②《中医皮肤病学简编》:斑秃。

72157 海石丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海石 三棱 莪术 桃仁 红花 五灵脂 香附 蚶壳 石碱各等分

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,白术煎汤送下。

【主治】痰与食积、死血成块。

72158 海石散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海石二钱 香附一钱

【用法】上为末。川芎、山梔煎汤,加姜汁令辣,调服。

【主治】脾痛、疝痛。

72159 海龙丸

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】海藻(酒洗,炒) 昆布(酒洗,炒) 白茯苓(炒) 穿山甲(炒)各二两 全蝎一百个(尾全者) 龙胆草(酒洗,炒)一两五钱 当归身(炒)一两 核桃五十个(劈开去肉,将全蝎嵌在核内,合紧煨存性)

【用法】上为细末,荞麦面打糊为丸,如梧桐子大。每服三钱,早晚白汤送下;酒下亦可。

【主治】瘰癧。

72160 海龙粉

《种福堂方》卷四。为原书同卷“生肌散”之

异名。见该条。

72161 海仙丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】船板青五两 酥油饼末一两半

【用法】上为细末,稀面糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,酒送下,不拘时候。

【功用】解诸大毒。

【主治】诸伏热,头目不清,神志昏塞。

72162 海仙膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】赤葛 苦参各等分

【用法】上锉片,用香油浸过,煎至焦枯滤去滓,称香油一斤净,再煎沸,徐徐入密陀僧、水粉各四两。

【主治】风损诸疮,痈疽肿毒。

72163 海半散

《普济方》卷三八一。为《圣惠》卷七十六“吹鼻散”之异名。见该条。

72164 海附丸

【方源】《宋氏女科》。

【异名】海粉丸(《竹林女科》卷二)。

【组成】香附四两 海石二两(醋煮) 桃仁(去皮) 白术各一两

【用法】上为末,神曲糊为丸。每服五十丸,空心清米汤送下,两日服一次,壮盛者,一日进一服。

【主治】怀孕另有血块如盘者。

72165 海青丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海粉一两 青黛三钱 黄芩二钱 神曲一两

【用法】留半煮,为丸如梧桐子大。每服二三十丸,白汤送下。

【主治】痰积泄泻。

72166 海青丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】海蛤粉 青黛 瓜蒌仁 诃子皮 便香附 半夏各一两

【用法】姜汁糊为丸。每服三十丸,姜汤送下。

【主治】火郁肺胀，气急息重者。

72167 海青膏

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】黄丹四两（水飞） 诃子八个（去核，为细末） 乌鱼骨（白者）二钱 青盐一两（另研） 白沙蜜（净者）一斤

【用法】上将蜜滚去白沫，先下黄丹，用槐条四十九根，少时下余药。不住手一顺搅，直搅蜜紫色，滴水中不散为度。后再用黄连二两为末，水三大碗，于熬药锅内熬数沸，将锅并槐条上药洗净，别用瓷器收之，澄清。专洗风赤冷泪等眼。前所熬膏子药，用点云翳白膜等疾。

【主治】一切昏翳内障眼疾。

72168 海明散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】川芎一两 苍术（童便浸一宿，去皮，焙） 木贼（去节，童便浸，晒） 蝉壳（洗，晒） 蛇皮（皂角水洗，新瓦焙） 羌活 防风 羌蔚子 楮实 地骨皮 荆芥穗 旋覆花 白蒺藜（炒，去刺） 烂石膏 细辛 杏仁（浸，去皮，晒） 甘草（盐水炙）各半两 全蝎五枚

【用法】上为细末。每服一钱半，食后、临卧服，或秦皮煎汤下。

【主治】风眼昏泪翳膜。

72169 海金散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】黄烂浮石

【用法】于草阴地为末。每服二钱，生甘草煎汤调下。小肠气，茎缩囊肿，用木通、灯心、赤茯苓、麦门冬煎汤调下。

【主治】血淋、沙淋，小便涩痛；亦治小肠气，茎缩囊肿。

72170 海参丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】海参一斤 全当归（酒炒） 巴戟肉 牛膝（盐水炒） 破故纸 龟版 鹿角胶（烊化） 枸杞子各四两 羊肾（去筋，生打）十对 杜仲（盐水炒） 菟丝子各八两

胡桃肉一百个 猪脊髓十条（去筋）

【用法】上为细末，鹿角胶为丸。每服四钱，温酒送下。

【功用】补气，壮阳，益肾，强筋骨，健步；久服填髓种子，乌须黑发，延年益寿。

【主治】腰痛，梦遗泄精。

72171 海参粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】海参适量

【用法】先将海参煮烂，细切，入米，加五味。

【功用】①《老老恒言》：温下元，滋肾补阴。②《药粥疗法》：补肾，益精，养血。

【主治】①《老老恒言》：痿。②《药粥疗法》：精血亏损，体质虚弱，性机能减退，遗精，肾虚尿频。

72172 海带丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】海带 贝母 青皮 陈皮各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食后嚥化一丸。大效。

【主治】瘰气久不消。

【备考】《种福堂方》有海藻。

72173 海带散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】海带（炒）半两 乌梅肉 天南星（生）各一两 麝香二分（别研，后入）

【用法】上为细末 入瓷盒内，勿令透气。如患急，以半钱匕，于腮里牙关上搯，便自开口。

【主治】风口噤，牙关不开。

72174 海带散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】海带不拘多少

【用法】上为散。临卧贴。一两宿愈。

【主治】缘唇疮。

72175 海神散

《杨氏家藏方》卷十四。为《圣济总录》卷六“必效散”之异名。见该条。

72176 海桐酒

《医方类聚》卷九十八引《施圆端效方》。为《活人书》卷十八“薏苡仁酒”之异名。见该条。

72177 海桐散

【方源】《医方类聚》卷一六九引《施圆端效方》。

【组成】轻粉一钱匕 海桐皮 茴茹 黑狗脊 蛇床子 硫黄各半两

【用法】上为细末。油调搽疥癣，上熏鼻中。

【主治】风疮疥癣。

72178 海桐散

《医学入门》卷六。为《卫生总微》卷十九“海桐皮散”之异名。见该条。

72179 海桐散

【方源】《伤科方书》。

【组成】独活 牛膝 秦艽 桂心 生地 陈皮 赤芍 续断 当归 防风 丹皮 加皮 姜黄 海桐皮各等分

【用法】上用童便、水、酒煎服。

【主治】手足伤。

72180 海桐煎

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】海桐皮十两 牛膝九两 楮实七两 枳实六两 木香 白芍药各四两 桂八两

【用法】上为细末，蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食前空心服。

【主治】久患脚膝湿痹，行履不得。

72181 海浮汤

【方源】《产科心法》卷下。

【组成】明乳香二钱 没药 浙贝 茯苓 各一钱五分 生黄耆三钱（酒炒） 炙草五分

【用法】水煎服。

【主治】肠痈脓出后，仍有微痛者。

72182 海浮散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【异名】生肌散（《济阳纲目》卷八十八）。

【组成】乳香 没药各等分

【用法】上为细末。搽恶肉上。

【功用】①《疮疡经验全书》：去恶肉。②《济

阳纲目》：止痛生肌。

【主治】疮有恶肉不去。

72183 海粉丸

《竹林女科》卷二。为《宋氏女科》“海附丸”之异名。见该条。

72184 海菜丸

【方源】《得效》卷十九。

【组成】海藻菜 荞麦（炒，去壳） 白僵蚕（炒断丝）

【用法】上为末，取白梅肉泡汤为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，临卧米饮送下。其毒当自大便泄去。

【主治】痲生于头项上交接处，名蛇盘痲者。

【宜忌】忌食豆腐、鸡、羊、酒、面。

72185 海葱散

【方源】《经验良方》。

【组成】海葱五厘

【用法】上为末。顿服，每日一次。

【主治】虚证水肿。

72186 海蛤丸

【方源】《外台》卷二十引《广济方》。

【组成】昆布（洗） 橘皮 赤茯苓 汉防己 海蛤（研） 郁李仁 桑根白皮 泽漆（炙） 槟榔 杏仁（去皮尖）各四分 大黄六分 葶苈子二十分（微火熬令黄）

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日二次，加至二十五丸。以小便利为度。

【主治】小便涩，水肿，气妨闷，不能食。

【宜忌】忌食热面、冷滑、大酢。

72187 海蛤丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】海蛤三分 汉防己半两 甜葶苈半两（隔纸炒 令香熟） 槟榔半两 木通半两（铍） 猪苓半两（去皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前冬葵根汤送下。

【主治】小肠实热，小腹胀满，小便赤涩。

72188 海蛤丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】海蛤一两（研细） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 海藻一两（洗去咸味） 昆布一两（洗去咸味） 赤茯苓一两 汉防己二两 泽漆一两 桑根白皮二两（锉） 木通二两（锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】水气，遍身浮肿，上喘，小便不通。

72189 海蛤丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】海蛤一两（研细） 汉防己半两 桂心半两 木通一两（锉） 牵牛子一两（微炒） 白术半两 甘遂半两（煨令微黄）

【用法】上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎香薷汤送下，以利为度，不利再服。

【主治】石水。脐腹妨闷，身体肿满，大小便不利，喘息。

72190 海蛤丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】海蛤一两（研细） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒） 汉防己一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 甘遂半两（煨令微黄）

【用法】上为末，别捣葶苈如泥，纳药末中和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】大腹水肿，四肢洪满，小便涩少。

72191 海蛤丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】海蛤二两（研细） 木通半两（锉） 葵子一两 滑石二两 蒲黄一两 车前子一两 赤茯苓半两 赤芍药半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以葱白汤送下。

【主治】小便不通，脐间窘急，三焦积热，气不宜通。

72192 海蛤丸

【方源】《普济方》卷三三一引《博济》。

【组成】舶上茴香 半夏 芫花（醋炒令干） 红娘子（去翅头足，略炒） 玄胡索 川苦楝 硃砂（去砂石取霜用） 海蛤 芫青（去头足，微炒）各等分

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，用朱砂为衣。每服十丸，盐汤送下；妇人醋汤送下；五淋，生姜汤送下；心气痛，生姜醋汤送下。

【主治】小肠积败，妇人赤白带下并五淋。

72193 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】海蛤（研）二两 木香一两一分 桂（去粗皮）半两 防己 诃黎勒皮 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 槟榔一两半（锉） 旋覆花一两 鳖甲（去裙襕，醋炙）一两一分 郁李仁（汤浸，去皮尖，研）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，食前浓煎木通汤送下。

【主治】鼓胀。四肢羸瘦，喘急息促，饮食渐减，小便涩少，小腹妨闷。

72194 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】海蛤（研）一两半 消石（研）二两 葶苈（微炒，研）一两半 杏仁（汤去皮尖 双仁，炒黄，研）一两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎木通汤送下，一日二次。

【主治】水气，头面俱肿，四肢无力，小便涩。

72195 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】海蛤（研）三分 葶苈（隔纸炒）桑根白皮（切）各一两 赤茯苓（去黑皮）一两 郁李仁（汤浸，去皮，炒） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，炒）各半两 防己（锉）三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，渐加至三十丸，米饮送下，早、晚各一服。

【主治】石水。四肢细瘦，腹独肿大。

72196 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】海蛤（别研） 赤茯苓（去黑皮）各一两 狼毒（煨熟）三分 桑根白皮（炙，锉） 玄参（微炙）各一两 膩粉半两 薏苡仁 陈橘皮（汤浸去白，焙） 防己 葶苈（炒紫色，研） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两

【用法】上药除海蛤外，捣罗为末，同海蛤再研匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，空心橘皮汤送下，一日三次，五日后觉齿痒即住药。先服大枣散，后服本方。

【主治】遍体浮肿，腹胀上气不得卧，大小便涩。

72197 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】海蛤（烧灰）半两 滑石（研） 凝水石（研）各一两 白丁香（研）五十枚 膩粉 粉霜各一钱

【用法】上为末，面糊和作饼子，以湿纸裹，烧熟，捣罗为末，薄面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，温酒送下。

【功用】分水气。

【主治】水蛊，腹胀喘嗽。

72198 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】海蛤（研如粉） 诃黎勒皮（焙） 柴胡（去苗） 赤茯苓（去黑皮） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 赤芍药 牵牛子（炒令熟）各一两半 桑根白皮（炙，锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 贝母（去心，焙） 白槟榔（锉） 郁李仁（汤浸，去皮，别研） 大黄（炒，锉） 枳壳（去瓢，麸炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹煎枣汤送下，一日二次。

【主治】脚气上冲，头目面浮肿，咳嗽喘乏，气促胸胀，两肋硬，腰重，小便涩，胯冷，腿膝疼痛乏力。

72199 海蛤丸

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】海蛤半两 白瓷屑（定州者，研，水飞过）一两 滑石（研） 商陆（切，焙） 漏芦（去芦头）各半两

【用法】上为细末，取生何首乌自然汁一升，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前灯心汤送下。

【主治】小便卒淋涩不通。

72200 海蛤丸

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】海蛤 半夏 芫花（醋炒） 红娘子（去翅足） 诃子（炒） 玄胡索 川楝子（面裹煨，去皮） 茴香（炒）各一两 乳香三钱 硃砂半两 朱砂（半入药，半为衣） 没药各一两（研） 当归一两半

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如小豆大。每服五丸至十丸，醋汤送下。

【主治】妇人小便浊败，赤白带下，五淋脐腹疼痛，寒热，口干，舌涩，不思饮食。

72201 海蛤丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】海蛤（醋淬三遍） 当归 海金沙 膩粉 硃砂各一钱 海藻 粉霜各半两，水蛭二十一个（炒） 青黛 滑石 乳香各一钱 朱砂二钱（为衣） 地胆二十一个（去头足翅）

【用法】上为末，盐煮面糊为丸，如小豆大，朱砂为衣。每服十丸，煎灯草汤，空心服之。小便下冷浓恶物乃效，却以黄连、紫河车、板蓝根各二钱，煎汤漱口。

【主治】癰疽。

72202 海蛤丸

【方源】《医学纲目》卷十六引丹溪方。

【组成】海蛤（烧为灰，研极细，过数日火毒散用之） 瓜蒌仁（蒂瓢同研）

【用法】上以海蛤入瓜蒌内，干湿得所，为丸。每服五十丸。

【主治】痰饮心痛。

72203 海蛤丹

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】海蛤 膩粉 青滑石 寒水石 玄精石 白丁香各一分

【用法】上药滴水和一为块子，以湿纸三重裹，用白面包作球子，用煆灰火烧半日，球响为度，滴水为丸，如梧桐子大。第一日服三丸，第二日三服六丸，至第七日服七丸，方不加丸数，黑饴龙脑水送下。

【主治】水气。

【宜忌】忌食盐、鱼、湿面等物。

72204 海蛤汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】海蛤 紫苑（去苗土） 远志（去心）各一两 大戟 木香 防己各半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞半，煎至八分，热服。若取下恶水，即以白粥补之。

【主治】涌水。

【宜忌】禁盐一百二十日，兼不得服荒花、甘遂药。

72205 海蛤汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【异名】海蛤散（《奇效良方》卷三十九）。

【组成】海蛤 泽漆叶（新者） 防己 木通（锉） 百合各一两 桑根白皮（锉，炒）一两半 郁李仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 牵牛子（炒） 槟榔（锉）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，空心、日午温服。

【主治】脚气变成水肿，小便不通，喘息。

72206 海蛤汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】海蛤 木通（锉） 猪苓（去黑皮）各半两 滑石（碎） 冬葵子（微炒）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加灯心十茎，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠子淋。

72207 海蛤汤

【方源】《幼幼新书》卷三十二引张涣方。

【组成】海蛤 桑根白皮各一两 汉防己

白术（炮） 赤茯苓各半两 甜葶苈（隔纸炒紫色） 川朴消 木猪苓（去黑皮）各一分

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，煎至五分，去滓，乳食后温服。

【主治】小儿肿满，大小便不利。

72208 海蛤汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】海蛤 泽泻 木猪苓（去皮） 木通 滑石 桑白皮 葵菜子各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加灯心十茎，通草二寸，同煎至七分，食前温服。

【主治】水气，肢体肿满，元气发动，遍身壮热，小便不通。

72209 海蛤散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】海蛤一两（研细） 泽漆叶一两 汉防己一两 桑根白皮一两（锉） 百合一两 赤茯苓一两半 槟榔一两 木通一两（锉） 牵牛子一两（微炒） 甜葶苈一两（隔纸炒，令紫色） 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服，不拘时候。以利为度。

【主治】肺气咳嗽，面目浮肿，小便不通，喘息促急，欲成水病。

72210 海蛤散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】海蛤一两半 石燕半两 白盐一分（炒） 鱼脑中石子半两

【用法】上为细散，入乳钵中，研令极细。每服以葱白五茎（切），甘草二寸（生用，锉），用水一中盞，煎至六分，去滓，调下散子一钱，食前频服即通。

【主治】小肠壅热，小便赤涩淋漓，疼痛不通。

72211 海蛤散

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】海蛤 滑石 甘草各一两（炙） 芒消半两

【用法】上为散。每服二钱，鸡子清调下。

【主治】妇人伤寒血结胸膈，揉而痛不可抚近者。

72212 海蛤散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】海蛤一枚（烧灰） 硫黄（研）半两 干漆（炒令烟尽，研细）半两

【用法】上药更加麝香少许，细研为散。先用净帛拭患处，以药敷之。有涎吐却。

【主治】牙齿宣露。

72213 海蛤散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海蛤（研） 人参 海藻（马尾者，汤洗去咸，焙） 白茯苓（去黑皮） 半夏（水煮一两沸，去滑，切，焙）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，入猪鬃子末一钱匕，甜藤一尺（去根五寸取之），甘草一寸，水五盏，同煎取一盏半，分三次。每次调散二钱匕，临卧服。男人四服，女人八服，永除。次用丸药宣下。

【主治】瘰瘤。

72214 海蛤散

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】海蛤三分（研） 茴香子三分（炒香熟） 薏苡仁半两 白术半两 槟榔半两（面裹，煨）

【用法】上为细末。每服半钱，早、晚乳食前温酒调下。

【主治】气击于下，小儿阴肾肿大而坚硬。

72215 海蛤散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】泽泻 海蛤 防己各一分 萝卜子三十粒

【用法】上为末。三岁每服一钱，酒调下，连进二服。小便利，即效。

【主治】小儿疳水，肿满气急。

72216 海蛤散

《奇效良方》卷三十九。为《圣济总录》卷八十三“海蛤汤”之异名。见该条。

72217 海蛤散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】蛤蜊壳（醋炙五次）

【用法】上为末。每服一钱，烧酒送下。

【主治】胃气痛。

72218 海犀膏

【方源】《理渝》。

【组成】水胶一两 乳香一两

【用法】五月午日以上药煎水摊纸上阴干，剪贴患处；或入明雄、飞矾各等分，朱砂三分，刷纸剪贴。

【主治】痈毒诸痛。

72219 海蛸散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】乌贼骨（焙为黄色，去壳）

【用法】上为细末。外用。

【主治】鼻疮疳疔，阴囊湿痒，阴蚀肿痛，疮多脓汁，溃瘍不敛，蝎螫痛楚。

72220 海藻丸

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】海藻 木防己 甘遂 苡蓉 蜀椒（去汗） 芫花（熬） 葶苈子（熬）各一两

【用法】上为末，蜜和为丸，如梧桐子大。每服十丸。不愈，当增之。

【主治】腹中留饮。

72221 海藻丸

【方源】《深师方》引褚仲堪方（见《外台》卷九）。

【组成】海藻三分 麦门冬五分（去心） 昆布 干姜 细辛 文蛤 桂心 蜀椒（汗）各二分

【用法】上为末，蜜和。每服如杏仁许，夜卧一丸，着舌上，稍稍咽汁，尽更着一丸。

【主治】三十年咳，气奔上欲死。

【宜忌】忌食生葱、生菜等。

72222 海藻丸

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【组成】海藻一两（洗） 水银一两 椒目一两 芒消一两 葶苈一两（熬） 大黄一两 甘遂一两（熬） 杏仁三十枚（去皮尖，熬） 桂心一两 附子一两（炮） 茯苓一

两 大戟一两 松萝一两 干姜一两 巴豆三十枚(去心皮,熬)

【用法】上药治下筛。蜜和服如小豆二丸,一日三次。不知,稍稍加之。

【主治】水症。腹内胸胁牢强,通身肿,不能食。

【宜忌】忌食猪肉、大酢、生葱、芦笋。

72223 海藻丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】海藻一两(洗去咸味) 肉苁蓉三分(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 牡蛎粉半两 茴香子三分(去苗) 木香半两 沉香半两 天雄三分(炮裂,去皮脐) 牛膝半两(去苗) 硫黄半两(研细)

【用法】上为末,入硫黄,都研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下;盐汤送下亦得。

【主治】虚劳损,肾阴肿痛。

72224 海藻丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】海藻一两(洗去咸味) 汉防己一两 甘遂半两(煨微黄) 吴茱萸一两(汤浸七遍,焙干,微炒) 川椒一两(去目及闭口者,微炒去汗) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色) 芫花一两(醋拌炒令干)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七丸,以温酒送下,一日三次。

【主治】酒癖。因酒后饮水,停留于胸膈之间,两胁下痛,短气而渴。

72225 海藻丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】海藻半两(洗去咸味) 汉防己半两 甘遂半两(煨微黄) 枳壳一两(麸炒微黄,去瓤) 川椒半两(去目及闭口者,微炒去汗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸,食前以粥饮送下。以利为度。

【主治】腹中留饮,宿食不消。

72226 海藻丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】牛黄丸(《圣济总录》卷七十九)。

【组成】海藻一两(洗去咸味) 椒目一两(微炒,去汗) 昆布一两(洗去咸味) 牵牛子一两(微炒) 桂心一两 牛黄一分(研细) 甜葶苈二两(隔纸炒令紫色,别研如膏)

【用法】上为末,入葶苈搅令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以蜜汤送下,一日三四次。

【主治】①《圣惠》:风水,皮肤肿满,上气喘急,不能眠卧。②《圣济总录》:大腹水肿,气息不通,证候危笃者。

72227 海藻丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻(洗去咸;炙干) 槟榔(锉) 昆布(洗去咸,炙干) 诃黎勒皮 文蛤(研)各三两 半夏(汤洗七遍) 生姜(切,焙)各二两 小麦(米醋浸三宿,晒干)三合 海蛤(研)二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,含化,一日三次。

【主治】咽喉中噎闷成瘕。

72228 海藻丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻(洗去咸,焙) 干姜(炮裂)各二两 昆布(洗去咸,焙) 桂心 逆流水柳须各一两 羊脂七枚(阴干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如小弹子大。每含一丸咽津,不拘时候。

【主治】诸瘕瘤。

【宜忌】忌食五辛、湿面、热物之类。

72229 海藻丸

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】海藻(洗,晒)一两 海蛤(煨) 松萝各七钱半 当归 川芎 官桂 白芷 细辛 藿香 白藜 明矾(煨) 昆布(洗,晒)各五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每次一丸,含咽下。

【主治】瘕瘤。

72230 海藻丸

【方源】《得效》卷三。

【组成】海藻 海带各一两 斑蝥二十八个（去足翅） 巴豆二十八个（去壳完全者）

【用法】上斑蝥、巴豆二味一处，生绢袋盛，用好醋一碗，以瓦铤盛四味同煮，将干，去斑蝥、巴豆不用。只将海带二味研细为末，以淡豆豉一百粒，以煮药余醋略浸，蒸研为膏，和末约为丸，如梧桐子大。每服用麝香少许，朱砂三钱，乳钵细研至无声，却入麝香再研匀为衣，晒干，以新瓦瓶收之。每初服七粒，二服十粒，三服十五粒，若未愈，再进三服，皆用十五粒，乃用盐炒茴香细嚼，空心服，酒吞下。

【主治】偏坠小肠气。

【宜忌】忌食鸭子并酢酱、动气等物。

72231 海藻丸

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】海藻半两（洗，焙干） 木香 槟榔 川椒（去目，炒） 甘遂各半两 川乌半两（炒，小儿去之，老入用）一两 白牵牛二两（取末半两） 黑牵牛二两（取末半两） 茴香（微炒） 猪苓（去皮） 泽泻各三钱 吴茱萸四钱（椒炒）

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，空心盐汤、酒任意下，黄涎下者验。十五岁以下小儿，二十五至五十丸。

【功效】利大、小便。

【主治】奔豚疝气，膀胱小肠气，卵顽肾木及小儿偏坠，一切肾气。

【宜忌】忌甘草。

72232 海藻丸

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】海藻四两 三棱六两 茴香九两 牵牛一两二钱（炒）

【用法】上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温盐水送下。

【主治】肾气。

72233 海藻汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】海藻散（《圣惠》卷四十六）。

【组成】海藻四两 半夏 五味子各半升 细辛二两 杏仁五十枚 生姜一两 茯苓六两（一方无五味子、生姜）。

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三次服，一日三次。

【主治】咳而下利，胸中痞而短气，心中时悸，四肢不欲动，手足烦，不欲食，肩背痛，时恶寒。

72234 海藻汤

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻（洗去咸汁，炙）半斤 小麦面半两 特生礞石（煨）五两

【用法】上药以经年陈醋一升，拌小麦面焙干，再蘸醋焙，以醋尽为度，入二药为末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日二次，不拘时候。

【主治】五癭。

72235 海藻酒

【方源】《外台》卷二十三引《肘后》。

【组成】海藻一斤（去咸） 清酒二升

【用法】上二味，以绢袋盛海藻酒渍，春、夏二日。一服二合，稍稍含咽之，一日三次。酒尽更以酒二升渍，饮之如前，滓晒干为末，每服方寸匕，一日三次。尽更作三剂佳。

【主治】颈下卒结，囊渐大欲成癭。

72236 海藻酒

【方源】方出《千金》卷八，名见《普济方》卷一八五。

【组成】海藻 茯苓 防风 独活 附子 白术各三两 大黄五两 鬼箭 当归各二两

【用法】上咬咀，以酒二斗，浸五日。初服二合，渐加，以知为度。

【主治】游风行走无定，肿或如盘大，或如瓠，或着腹背，或着臂，或着脚。

72237 海藻散

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】海藻十分（洗） 昆布一两（洗） 海蛤一两（研） 通草一两 松萝（洗） 干

姜 桂心各二两

【用法】上药治下筛。每服一钱匕，酒送下，一日三次。

【主治】气瘕。

72238 海藻散

【方源】《外台》卷二十三引《崔氏方》。

【组成】海藻八两（洗去咸汁） 贝母二两 土瓜根二分 小麦曲二分（炒）

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】瘕。

72239 海藻散

《圣惠》卷四十六。为《千金》卷十八“海藻汤”之异名。见该条。

72240 海藻散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】海藻（洗去咸味） 海带 海蛤 昆布（洗去咸味） 木香各半两 金箔三十片 羊脂三枚（微炙） 猪脂三枚（微炙）

【用法】上为细散。每服半钱，以温酒调下，一日三四次。

【主治】小儿瘕气，肿结渐大。

72241 海藻散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻（洗去咸，炙干） 龙胆 海蛤（研） 木通（锉） 昆布（洗去咸，炙干） 礞石（煅，研） 松萝各半两 小麦面一两 半夏（汤洗七遍）半两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，一日三次，不拘时候。

【主治】气瘕初作。

72242 海藻散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻（洗去咸，焙） 龙胆 昆布（洗去咸，焙） 土瓜根 半夏（为末，生姜汁和作饼，晒干） 小麦面（微炒）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】瘕病，咽喉肿塞。

72243 海藻散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻（洗去咸，焙） 海蛤各三两 昆布（洗去咸） 半夏（汤洗七遍，焙） 细辛（去苗叶） 土瓜根 松萝各一两 木通（锉） 白薇 龙胆草各二两

【用法】上为细末。每服一钱匕，酒调下，一日二次。

【主治】五瘕。

【宜忌】不得作劳用力。

72244 海藻散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】海藻（洗去咸，焙）一两一分 昆布（洗去咸，焙）一两半 海蛤（研） 木通（锉） 桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮）半两 羊脂十枚（去脂炙令黄）

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下，夜再一服。

【主治】瘕瘤。

72245 海藻散

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】海藻 大戟 锦纹大黄 续随子（去壳）各一两（上锉碎，用好酒二盏，净碗内浸一宿，取出晒干后用） 白牵牛（头末，生用）一两 桂府滑石半两 甘遂（麸炒黄）一两 肉豆蔻一个 青皮（去白） 陈皮（去白）各半两

【用法】上为细末。大人每服二钱，气实者三钱，平明冷茶清调下。至辰时取下水三二行，肿减五七分，隔二三日平明又一服。小儿肿服一钱，五岁以下者半钱。

【主治】男子、妇人遍身虚肿，喘，满闷不快。

【宜忌】妇人有孕不可服。忌食咸鱼、肉百日。

72246 海藻散

【方源】《医统》卷八十。

【组成】海藻（洗） 昆布 何首乌（不犯铁器） 皂角刺（炒黄色）各一两 蛇退一条

【用法】上为细末。用猪项下刀口肉烧熟，

蘸药末食之。向患处一边侧卧一伏时。每核上灸七壮，烟从口中出为度。

【主治】瘰癧。

72247 海金花丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】海金花一分 丁香一两 琥珀一分(研细) 败龟一分(涂酥炙令黄) 甜葶苈一分(隔纸炒令黄色) 麝香一钱(研细) 皂荚子二十枚(炒黄，为末，约重一斤)

【用法】上为末，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以温酒送下。

【主治】气毒瘰癧，结硬不消，日夜疼痛。

72248 海金沙丸

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】真川黄柏(研细末) 净海金沙各等分

【用法】上以鲜猪脊髓，去皮，只用髓质生打为丸，晒干。每服二三钱，淡盐汤吞服。

【主治】淋浊，不论新久。

72249 海金沙散

【方源】方出《证类本草》卷十一引《本草图经》，名见《圣济总录》卷九十五。

【组成】海金沙一两 蜡茶半两

【用法】上为细末。每服三钱，煎生姜、甘草汤调下，未通再服，不拘时候。

【主治】小便不通，脐下满闷。

72250 海金沙散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】海金沙(别捣)二两 滑石(研细) 甘草(炙，锉) 山栀子仁各一两

【用法】上将甘草、栀子仁为细散，入余药再研匀。每服一钱匕，茶清调下，不拘时候。

【主治】气淋，结涩不快。

72251 海金沙散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】海金沙 滑石(碎) 石膏(碎) 木通(锉) 甘草(炙，锉) 井泉石(碎) 各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，煎灯心汤调下，不拘时候。

【主治】沙石淋涩，疼痛不可忍。

72252 海金沙散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】海金沙 滑石(碎) 各一分 膩粉一钱匕

【用法】上为散，再研匀。每服一钱匕，温汤调下。

【主治】沙石淋。

72253 海金沙散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】海金沙二钱 大黄(生) 乳香(研) 没药(研) 各一钱 麒麟竭一分

【用法】上药除研者外，为散和匀。每服二钱匕，乳香温酒调下，不拘时候。

【主治】打扑内损疼痛。

72254 海金沙散

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】牵牛一两半(半生半炒) 甘遂 海金沙各半两。

【用法】上为细末。每服二钱，煎倒流水一盏调下，食前服。得宣利，止后服。

【主治】脾湿太过，通身肿满，喘不得卧，腹胀如鼓。

【备考】《卫生宝鉴》有白术一两。

72255 海金沙散

【方源】《御药院方》卷八。

【异名】大海金沙散(《赤水玄珠》卷十五)。

【组成】海金沙(研) 木通 瞿麦穗 滑石(研) 通草各半两 杏仁(汤浸，去皮尖，麸炒黄，研) 一两

【用法】上为细末。每服五钱，水一盏半，加灯心二十根，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】小便淋涩，及下焦湿热，气不施化，或五种淋疾，癃闭不通。

72256 海金沙散

【方源】《得效》卷八。

【组成】海金沙 滑石末各一两 甘草末一分

【用法】上为末。每服一匕，用麦门冬汤下；

灯心汤亦可。

【主治】膏淋。

72257 海金沙散

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】泽泻 滑石(研,水飞) 猪苓 海金沙(研)各五钱 石韦 净肉桂各一钱(去皮) 白术 甘草 赤茯苓 芍药各三钱

【用法】上为末。每服三钱,水一盞,加灯心,同煎至七分,空心温服。

【主治】五淋涩痛。

72258 海金沙散

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】海金沙 郁金 滑石 甘草各等分

【用法】上为末。每服四五分,白汤调下。

【主治】下焦湿热,不施化而小便不利。

72259 海金沙散

【方源】《便览》卷二。

【组成】海金沙一钱 白术一钱 苍术八分 厚朴一钱 陈皮八分 泽泻七分 猪苓七分 茯苓皮一钱 五加皮五分 生姜皮五分 大腹皮五分 商陆七分 甘草皮五分

【用法】上用水二钟,煎至一钟,稍热服,滓再煎服。

【主治】水肿。

72260 海金沙散

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归(酒洗) 大黄(酒浸) 川牛膝(酒洗) 木香 雄黄 海金沙各等分。

【用法】上为细末。每服一钱半,临卧好酒调服。两服痊愈。

【主治】五淋。

72261 海金沙散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】香附米(酒炒) 正川芎(酒炒) 赤茯苓(酒炒)各五钱 海金沙 白滑石(水飞)各一两 陈枳壳(炒) 宣泽泻(焙) 陈石韦(焙) 尖槟榔(炒)各二钱五分

【用法】上为细末。每服一钱,淡盐汤调下。

【主治】小儿诸淋属热者。

72262 海桐皮丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】海桐皮一两 柏子仁三分 羌活三分 石斛一两(去根,锉) 防风三分(去芦头) 当归三分(锉、微炒) 桂心一两 侧子一两(炮裂,去皮脐) 仙灵脾一两 芎藭一两 麻黄一两(去根节) 牛膝一两(去苗) 莽草一两(微炙) 枳壳一两(麸炒微黄,去瓢)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】偏风。手足不遂,筋骨疼痛。

【备考】方中枳壳,《医方类聚》引《神巧万全方》作“白芷”。

72263 海桐皮丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】海桐皮一两(锉) 桂心一两 牛膝一两(去苗) 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 石斛一两(去根节) 熟干地黄一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、及晚食前以温酒送下。

【主治】妇人腰脚风冷疼痛,行立无力。

72264 海桐皮丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】海桐皮(锉)二两 白芥子(研)半两 乳香(研)半两 芸薹子(研) 地龙(炒) 甜瓜子各一两 牡蛎(生)三两 枫香脂(研)一两 金毛狗脊(去毛)二两 威灵仙(去土)一两半 蔓荆实一两 苍术(炒)一两半 草乌头(生,去皮尖)一两 木鳖子(去壳)一两半 没药(研)半两 续断一两 自然铜(煅,醋淬七遍) 乌药各二两半

【用法】上药除研外,为末和匀,醋煮面糊为丸,如绿豆大。每服二十丸,空心、食前木瓜温酒下。

【主治】摊缓风,手足不随,或时麻木,口眼喎斜,头昏脑闷。

72265 海桐皮丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】海桐皮二两（锉细） 石斛（去根）三分 羌活（去芦头）半两 赤箭一两半 牛膝（酒浸，切，焙） 白附子（生） 防风（去叉）各一两 木香 山芋各三分 菊花 牡荆子各半两 丹砂一两（研）

【用法】上为细末，以天南星末二两半，同好酒煮为膏，为丸如梧桐子大。每服十五丸，茶、酒任下。

【主治】中风。手足不随，身体疼痛，肩背拘急。

72266 海桐皮丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】海桐皮（锉） 防风（去叉） 牛膝（酒浸，切，焙） 羌活（去芦头）各半两 郁李仁（去皮尖双仁，炒，研）一分 大腹（锉）二枚 蒴藿叶一束（捣取汁一升）

【用法】上药除蒴藿汁外，为末，先以蒴藿汁同酒一升熬成膏，入药末，搜和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下。

【主治】一切风冷，身体手足疼痛。

72267 海桐皮丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】海桐皮（锉） 楝实（锉、炒） 木香 石斛（去根） 茴香子 牛膝（寸截，酒浸一宿，焙干）各一两 槟榔（煨，锉）一两 芎藭一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】久服壮筋骨，驻颜，利胸膈，调脾胃，补益。

【主治】下脏风虚，耳内蝉声。

72268 海桐皮汤

《圣济总录》卷二十。为《圣惠》卷十九“麻黄散”之异名。见该条。

72269 海桐皮汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】海桐皮（锉） 桂（去粗皮） 木香 天麻 人参 羌活（去芦头） 独活

（去芦头） 牛膝（酒浸，切，焙） 金毛狗脊（煨，去毛） 石斛（去根） 黄耆（锉） 防风（去叉） 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙） 萆薢 麻黄（去根节）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盞，加生姜二片，煎至七分，去滓，稍热服；如伤风冷，头疼壮热，加葱白煎，并两服，出汗愈。

【主治】妇人血风攻注，四肢无力劳倦，头目昏眩，背项拘急，骨节痠痛。

72270 海桐皮汤

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】海桐皮 铁线透骨草 明净乳香 没药各二钱 当归（酒洗）一钱五分 川椒三钱 川芎一钱 红花一钱 威灵仙 白芷 甘草 防风各八分

【用法】上为粗末。装白布袋内，扎口煎汤，熏洗患处。

【主治】一切跌打损伤，筋翻骨错，疼痛不止。

72271 海桐皮汤

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】海桐皮 独活 赤芍药 秦艽 五加皮 川断 当归尾 肉桂 牡丹皮 生地 川牛膝 防风 广陈皮 姜黄

【用法】用童便、酒煎，空腹服。

【主治】足伤。

72272 海桐皮酒

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】海桐皮 五加皮 独活（去芦头） 防风（去叉） 枳壳（去瓢，麸炒） 杜仲（去粗皮，炙）各一两 牛膝（去苗） 薏苡仁各二两 生地黄半斤

【用法】上锉细，绵裹，以无灰酒二升，春、夏浸七日，秋、冬二七日。每日空腹温服一大盞，一日三次，常令酒气不绝。

【主治】风冷流子脚膝，行立不得。

72273 海桐皮酒

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《风科集验方》。

【组成】海桐皮 牛膝(酒浸) 枳壳(麸炒,去瓤) 杜仲(去皮丝,锉,炒) 防风(去芦) 独活(去芦) 五加皮各二两 生地黄二两半 白术半两(去芦) 薏苡仁一两

【用法】上咬咀,以生绢袋二个两停盛药,以好酒一斗五升,亦合两瓷器内浸酒。每服一盞,日三夜二。服之常使酒力熏熏,百日行履如故。

【主治】湿痹,手足弱,筋脉挛,肢节疼痛无力,不能行履。

72274 海桐皮酒

《普济方》卷一五四。为《三因》卷十三引《传信方》“牛膝酒”之异名。见该条。

72275 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】海桐皮一两(锉) 附子半两(炮裂,去皮脐) 赤箭半两 桂心半两 牛膝半两(去苗) 防风半两(去芦头) 石斛半两(去根节,锉) 独活半两 当归三分(锉,微炒) 仙灵脾五两 酸枣仁半两(微炒) 羚羊角屑半两 芎藭半两 木香半两 五加皮半两 赤芍药半两 细辛半两 槟榔一两 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水、酒各半中盞,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】肝脏风毒流注脚膝,筋脉拘急,疼痛不可忍。

【宜忌】忌食猪肉、毒鱼、酒、蒜等。

72276 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】海桐皮一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 麻黄二两半(去根节) 天麻二两 牛膝二两(去苗) 桂心一两 防风一两半(去芦头) 当归一两 酸枣仁一两(微炒)

【用法】上为末。每服三钱,以水一中盞,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】历节风。身体四肢无力,骨节疼痛。

72277 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】海桐皮一分(锉) 羌活三分 羚羊角屑三分 独活三分 防风三分(去芦头) 桂心半两 当归三分 赤芍药三分 石斛一两(去根,锉) 牛膝一两(去苗) 赤茯苓三分 酸枣仁三分(微炒) 槟榔一两 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盞,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】脚气疼痛,皮肤不仁,筋脉缓弱,不能行履。

72278 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】海桐皮一两(锉) 防风二两(去芦头) 黑豆一两(炒熟) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒下,一日三四次。

【功用】辟外风,止疼痛。

【主治】伤折。

72279 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】海桐皮一两(锉) 桂心一两 白芷一两 当归一两(锉,微炒) 漏芦一两 芎藭一两 羚羊角屑一两 赤芍药半两 没药半两 川大黄半两(锉碎,微炒) 木香半两 槟榔三两

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】妇人血风,身体骨节发歇疼痛不止。

72280 海桐皮散

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】海桐皮一两 羚羊角屑 薏苡仁各二两 防风 羌活 简桂(去皮) 赤茯苓(去皮) 熟干地黄各一两 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱,水一盞,加生姜五片,同煎至七分,去滓温服。

【主治】风湿,两腿肿满疼痛,及一切风顺

凝滞气阴，百节拘挛痛。

72281 海桐皮散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】海桐皮（锉） 五加皮（去粗皮，锉） 萆薢（炒） 薏苡仁（炒）各一两 虎骨（涂酥，炙，令黄） 枳壳（麸炒，去瓢） 赤芍药 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）各一两半 恶实（炒）半两 防风（去叉） 续断 杜仲（去粗皮，锉，炒） 郁李仁（汤退去皮尖双仁，炒） 熟乾地黄（焙）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，渐加至三钱匕，空腹、食前各一次。

【主治】肾中风。踞而腰痛，脚肿疼重，耳鸣面黑，志意不乐。

72282 海桐皮散

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】海桐皮（锉） 独活（去芦头） 五加皮（锉） 防风（去叉） 郁李仁（炒，去皮，别研如膏）各一两 杜仲（去粗皮，炙，锉） 枳壳（去瓢，麸炒） 薏苡仁（炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 虎胫骨（酥炙） 恶实（炒） 熟干地黄（焙干）各一两半 朴消（别研）二两

【用法】上药先将十一味捣罗为散，次入郁李仁膏，并朴消同研匀。每服二钱匕，温酒调下，早、晚食后夜卧各一眼。

【主治】风毒流入脚膝，行履艰难，向夜筋脉痹挛疼痛。

72283 海桐皮散

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】海桐皮 草乌头（锉碎，盐炒） 地龙（炒，去土） 蒺藜子（炒，去角）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、夜卧冷酒调下。

【主治】湿脚气，及肾脏风下注，满脚生疮痒痛，脓水出。

72284 海桐皮散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】海桐皮 牛膝各一两 天南星 当归 白附子 干蝎 白僵蚕 川芎 没药 地龙各半两 膩粉一钱

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如绿豆大。温酒送下，不拘时候。

【主治】妇人血风走注，疼痛不定。

72285 海桐皮散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【异名】海桐散（《医学入门》卷六）。

【组成】海桐皮 当归（去芦，洗净，焙干） 牡丹皮（去心） 熟干地黄 牛膝（去芦酒浸，焙干）各一两 山茱萸 补骨脂各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，加葱白二寸，煎至五分，去滓温服。

【主治】①《卫生总微》：小儿脚挛不能伸举。②《普济方》：小儿禀受肾气不足，血气未荣，脚趾拳缩无力，不能伸展。

72286 海桐皮散

【方源】《直指》卷四。

【组成】独活 萆薢（盐水浸，焙） 川芎 当归各三分 桃仁（去皮，焙） 天麻 辣桂 牛膝 麻黄（去节） 枳壳（制） 海桐皮 白芍药 川乌（炮，去皮脐） 松节 防风 杜仲（姜制） 甘草（炙）各半两 麝香一分 虎胫骨（酒炙黄）一两

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】历节走注，骨节疼痛。

72287 海桐皮散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】黄连 全蝎 硫黄 花椒 大腹皮 樟脑 海桐皮 白芷 轻粉 黄皮 蛇床 枯矾 榆树皮 斑蝥少许 径松皮 剪草

【用法】上为细末。蜡油调敷。

【主治】阴囊湿痒。

72288 海桐皮煎

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】海桐皮（酒浸半日，炙）一两 桂

(去粗皮)半两 附子(炮裂,去皮脐)一两 牛膝(酒浸,切,焙)二两 甘草(炙)一两 大黄(锉,炒) 羌活(去芦头) 独活(去芦头)各半两

【用法】上为末。每次三两,先用黑豆一盞,生姜半两切碎,水五升,同煎至三升,绞去滓,入前药末,煎如稀汤,以瓷盒盛。每服一匙头,煎当归酒调下。

【主治】妇人血风走注,皮肤瘙痒或瘾疹丹起,筋脉肌肉疼痛。

72289 海桐皮煎

【方源】《永乐大典》卷一三八八〇引《大方》。

【组成】乌头(生) 海桐皮 牛膝 骨碎补 虎骨(煨) 当归各四两 木鳖子 白胶香(别研) 乳香(别研)各二两 自然铜 没药(别研)各一两

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如绿豆大。每服五七丸至十五丸,茶汤、酒盐汤送下。

【主治】男子风寒湿痹,气血凝滞,筋骨疼痛,手足麻木。

72290 海浮石丸

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】海浮石 人中白各半钱 麝香少许 雄黄一钱

【用法】上为细末,以糯米粥和成膏,捻剂子扎在病处齿缝内。涎涎净便效。凡用此药,先须用槐枝子煎汤或荆芥汤、葱白汤漱口,然后用之乃妙。用药了,以纸条子封闭,贴药齿缝,涎自然出,只三四日愈。

【主治】走马疳。

72291 海浮石丸

《家塾方》。为原书“夷则丸”之异名。见该条。

72292 海浮石散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】海浮石

【用法】上为细末。每服二钱,煎麦门冬、赤茯苓汤调下。

【主治】肾气热证,小便秘涩黄色。

72293 海蛤索饼

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】海蛤(捣研如面)一两 甘遂三分(为末,绢罗如面,用白面和作剂) 郁李仁(汤浸,去皮,微炒,研)一两一分

【用法】上药以桑根白皮一两,用水二升煮。如嗽,即加干枣三十枚(劈破),同煮取一升,去滓,入前药和,如作索饼法煮令熟,看冷暖得所,空腹服食。须臾快利,小便甚多,勿怪。

【主治】水气,头面浮肿,坐卧不安。或嗽喘者。

72294 海犀膏散

【方源】方出《证类本草》卷十六引《斗门方》,名见《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】海犀膏一大片

【用法】于火上炙令焦黄色,后以酥涂之,又炙,再涂令通透,可碾为末,用汤化三大钱匕,放冷服之。即止血。

【主治】肺破出血,忽嗽血不止者。

【备考】海犀膏,即水胶。

72295 海螵蛸丸

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】海螵蛸(竹刀子刮下软者,研细,水飞过,晒干)一两 丹砂(研细,水飞)一分

【用法】上为细末,熔好蜡为丸,如绿豆大。每用一丸,安在大眦上。立奔障翳所,如无翳,即在眼眦不动,神效。

【主治】外障眼,及赤翳贯瞳人攀睛等。

72296 海螵蛸散

【方源】《幼幼新书》卷十六引《惠眼观证》。

【组成】海螵蛸(浮石也) 牡蛎(煨过) 马兜铃 木香各二钱 牵牛子一钱半(生、熟各半)

【用法】上为末。每服半钱,用生姜煎汤调下。

【功用】定喘。

【主治】小儿咳喘。

【宜忌】不得近盐、醋。

72297 海螵蛸散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】海螵蛸二枚(烧)

【用法】上为细末。每服方寸匕，酒调下，一日三次。

【主治】妇人小户嫁痛。

72298 海藻浸酒

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】海藻(洗去咸) 赤茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 独活(去芦头) 附子(炮裂，去皮脐) 白术各三两 鬼箭(去茎用羽) 当归(切，焙)各二两 大黄(锉，醋炒)四两

【用法】上锉，如麻豆大，生绢囊贮，以酒二斗浸之，春、夏五日，秋、冬七日。初服三合，空心、午时、临卧各一服。若频利即减，未利加至四五合，以愈为度。

【主治】气肿，行走无定，或起如蚌，或大如瓠，或着腹背，或着臂脚。

72299 海马拔毒散

【方源】《急救仙方》卷一。

【组成】海马一双(炙) 穿山甲(黄土炒) 水银 朱砂各二钱 雄黄三钱 轻粉一钱 脑子少许 麝香少许

【用法】上除水银外，各研为末，和合水银，再研至无星。针破疮口，点药入内，一日一点。神效。

【主治】发背，诸恶疮，兼治疗疮。

72300 海马保肾丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】海马一对 砂仁二钱 远志肉(炙)二钱 杞子三钱 鹿茸(去毛)三钱 黄耆一两三钱 山药三钱 白术(炒)三钱 肉桂(去粗皮)二钱 锁阳三钱 茯苓六钱 蛤蚧(去头足)一对 苁蓉(炙)一两 人参(去芦)三钱 熟地六钱 杜仲炭三钱 狗脊(去毛)三钱 钟乳石(煅)二钱 阳起石(炙)一钱 巨胜子一钱 黄精(炙)一钱 龟版(炙)一钱 淫羊藿(炙)五分

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，用牡蛎粉二钱为衣。每服二钱，一日二

次，温开水送下。

【功用】滋阴益气，补骨助阳。

【主治】肾气虚寒，精神衰弱，脑亏健忘，四肢无力。

【宜忌】忌色欲及刺激性食物。

72301 海石二陈汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】海石 半夏 陈皮 甘草 白茯苓

【主治】壮疟。

【加减】胸前饱闷，加草果、苍术、厚朴、枳壳；恶寒头疼，加羌活。

72302 海桐皮洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】海桐皮 60 克 透骨草 30 克 乳香 10 克 没药 10 克 当归 15 克 花椒 15 克 红花 15 克 威灵仙 30 克 白芷 15 克 防风 15 克 甘草 15 克

【用法】煎汤熏洗。

【主治】皮肤瘙痒症。

72303 海桐皮浸酒

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】海桐皮 五加皮 独活 天雄(炮裂，去皮脐) 石斛(去根) 桂心 防风(去芦头) 当归 杜仲(去粗皮，炙微黄) 仙灵脾 萆薢 牛膝(去苗) 薏苡仁各二两 虎胫骨三两(涂酥炙令黄) 生干地黄二两

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用清酒三斗，春夏浸七日，秋冬浸二七日，每日时时暖饮一小盏。常令熏熏，不得大醉，重者不过两剂，若酒尽，旋旋添之，以药味尽即止。

【主治】风毒脚膝软弱，行立不得。

72304 海桐皮浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】海桐皮 五加皮 独活 侧子(炮裂，去皮脐) 天麻 桂心 防风(去芦头) 枳壳(麸炒微黄，去瓢) 杜仲(去粗皮，炙微黄)各一两 牛膝五两(去苗) 薏苡仁六两 生地黄半斤

【用法】上锉细和匀，以生绢袋盛，用清酒一斗浸之，春、夏七日，秋、冬二七日，每日随性饮一盞。常令有酒气，不得大醉。

【主治】一切风。

72305 海桐皮浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】海桐皮 五加皮 独活 防风(去芦头) 干蝎(生用) 杜仲(去皱皮，炙微黄) 酸枣仁(微炒) 桂心 侧子(炮裂，去皮脐) 薏苡仁各一两 生干地黄三两

【用法】上锉，如豆大，用生绢袋盛，以好酒二斗，于瓷瓶中浸，密封，秋、夏七日，春、冬二七日开取。每日温饮一小盞，不拘时候。

【主治】风毒流入脚膝，疼痛行立不得。

72306 海桐皮浸酒

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】海桐皮(锉) 五加皮(锉) 独活(去芦头) 防风(去叉) 干蝎(炒) 杜仲(去粗皮，切) 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 薏苡仁(炒) 各一两 生干地黄(焙) 三两

【用法】上为粗末，生绢囊贮，以好酒一斗五升，浸于瓷瓶中密封，秋、夏三日，春、冬七日开取，每服三合，加至四五合，食前温酒送下，不拘时候。甚者常令酒气相续。

【主治】热毒风结成疽，肿痛行履不得。

72307 海桐皮煎丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】海桐皮半斤 牛膝半斤(去苗。上药并锉细。以水一斗，于大锅中煎至一升，用沙盆内烂研，绞取浓汁。即却于银锅中，渐渐入酒三升，煎为膏) 附子二两(炮裂，去皮脐) 川乌头一两(炮裂，去皮脐) 虎胫骨四两(涂酥炙令黄) 川大黄三两(锉碎，微炒) 桃仁二两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 五加皮一两 赤芍药一两 肉桂一两(去皱皮) 麻黄一两(去根节) 当归一两 赤箭一两 地龙一两(微炒) 木香一两 独活一两 没药一两 防风一两(去芦头) 骨碎补一两 乳香一两 麒麟竭

一两 干蝎一两(微炒) 天南星一两(炮裂) 麝香半两(研细)

【用法】上为末，加麝香都研令匀，入前膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】风毒走注，肢节疼痛，不可忍。

【宜忌】忌生油、毒鱼、滑物。

72308 海蛤玉粉散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】海蛤不拘多少。

【用法】上为末。每服二钱，入蜜少许，冷水调下，不拘时候。

【功用】解脏中积毒热。

【主治】血痢。

72309 海藏当归丸

【方源】《元戎》卷十一。

【异名】增损当归丸(《玉机微义》卷三十二)。

【组成】四物汤各半两 加防风半两 独活半两 全蝎半两 续断一两 苦楝七钱 玄胡七钱 木香二钱半 丁香二钱半 茴香一两(炒)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【主治】三阴受邪，心、脐、小腹疼痛。

72310 海藻玉壶汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】海藻消瘰汤(《嵩崖尊生》卷六)。

【组成】海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 半夏 连翘 甘草节 独活各一钱 海带五分

【用法】上药用水二钟，煎至八分，量病上下食前后服之。

【功用】《方剂学》：化痰软坚，消散瘰瘤。

【主治】①《外科正宗》：瘰瘤初起，或肿或硬，或赤不赤，但未破者。②《方剂学》：肝脾不调，气滞痰凝。石瘰，坚硬如石，推之不移，皮色不变。

【宜忌】凡服此药，先断厚味、大荤，次宜绝欲虚心。

【方论选录】《方剂学》：本病多成于气滞痰凝，由气及血，以致气血结聚而成。故用海藻、昆布、海带化痰软坚，为治瘰疬主药；青皮、陈皮疏肝理气，当归、川芎、独活活血以通经脉，配合理气药可使气血和调，促进瘰疬的消散。象贝、连翘散结消肿，甘草调和诸药，共以收化痰软坚，行气活血之功。

72311 海藻连翘汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】白茯苓 陈皮（去白） 连翘 半夏（姜制） 黄芩（酒拌炒） 黄连（酒炒） 南星（姜制） 牛蒡子（炒） 柴胡 三棱（酒炒） 莪朮（酒炒） 僵蚕（抄去丝） 昆布 海藻 羌活 防风 桔梗 夏枯草 川芎 升麻

【用法】上加生姜、薄荷，煎，食后服。

【主治】诸般结核，瘰疬、马刀、瘰疬、痰核。

72312 海藻消瘰汤

《嵩崖尊生》卷六。为《外科正宗》卷二“海藻玉壶汤”之异名。见该条。

72313 海藻散坚丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】海藻 昆布各二两 小麦四两（醋煮，晒干） 柴胡二两 龙胆草（酒拌，炒焦）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，临卧白汤送下；浸化咽之，尤好。

【主治】肝经瘰疬。

72314 海藻散坚丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】海藻 昆布 龙胆草 蛤粉 通草 贝母 桔矾 真松萝各三钱 麦曲四钱 半夏二钱

【用法】上为末。酒调服。或蜜丸绿豆大，每次三十丸，临卧葱白煎汤送下，并含化咽之。

【主治】瘰疬、马刀坚硬，形瘦潮热不食；兼治一切瘰气。

【宜忌】忌甘草、鱼、鸡、猪肉、五辛、生

冷。

72315 海藻散坚丸

《何氏济生论》卷六。为《赤水玄珠》卷十五“海藻溃坚丸”之异名。见该条。

72316 海藻散坚丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】全蝎二十个 蛤粉一两 土贝一两 没药（去油）一两 丹皮一两 夏枯草（熬膏） 毛藤各一斤（熬膏听用） 海藻四两（用斑蝥廿一个，醋煮去蝥）。

【用法】上为末，以二膏为丸。初服十五丸，渐至三十丸，白汤送下。

【主治】肝经湿火，流注经络，颈项结聚，结核小瘰。

72317 海藻溃坚丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】海藻 海带 昆布各一两 广茂青盐各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如指尖大。每服一丸，食后噙化。

【主治】瘰气大盛，久不消散。

72318 海藻溃坚丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【异名】海藻散坚丸（《何氏济生论》卷六）。

【组成】海藻 昆布 川楝肉 吴茱萸（汤泡）各一两 木香 青皮 小茴 荔枝核（炒） 玄胡索（炒） 肉桂各五钱 海带 橘核（炒） 桃仁（麸炒，去皮尖）各一两 木通七钱

【用法】酒糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心盐、酒任下。

【主治】木肾如斗，结硬如石。

72319 海浮石滑石散

【方源】《医学从众录》卷二。

【组成】海浮石 飞滑石 杏仁各四钱 薄荷二钱

【用法】上为极细末。每服二钱，用百部煎汤调下。

【主治】小儿天哮，一切风湿燥热，咳嗽痰喘。亦治大人。

涂

72320 涂丁膏

【方源】《医方类聚》卷一七九引《烟霞圣效方》。

【组成】隔年葱白（如无，新葱切作片子研烂亦可） 白沙蜜（如无，新蜜亦得）

【用法】将葱研烂，滴蜜同研如膏药相似。先于疮上拨动，或见血，不见血，涂药在上，绵帛盖之，如人行一里地，其疮觉痛；更待多时，其丁自出，然后生肌药贴之。

【主治】丁疮。为感四时非节之气，不慎房酒，铜器内造食物，及人汗滴在食中，生其此证。

【宜忌】慎忌食毒物。

72321 涂舌丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】乌贼骨 蒲黄各等分

【用法】炒，为细末。涂舌上。

【主治】舌肿出血如泉者。

72322 涂凶法

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】涂凶麝香散（《御药院方》卷十一）。

【组成】麝香一字 薄荷叶半字 蝎尾（去毒，为末）半钱 蜈蚣末 牛黄末 青黛末 各一字

【用法】上同研，用熟枣肉剂为膏，新绵上涂匀。贴凶上，四方可出一指许。火上炙手频熨。百日内外小儿可用。

【主治】《御药院方》：小儿百日内发搐。

72323 涂凶法

【方源】《普济方》卷三七二。

【异名】涂顶膏（《奇效良方》卷六十四）。

【组成】草乌（炮） 芸苔子各等分

【用法】上为末，用新汲井水调。涂凶顶上。

【主治】小儿天钩惊风。

【备考】《奇效良方》本方用乌头（生用，去皮脐）、芸苔子各二钱。上为末，每用一钱，新汲水调敷儿顶上。

72324 涂凶膏

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣惠》卷三十七。

【异名】杏仁膏（《圣济总录》卷一一六）、通鼻散（《普济方》卷五十七）。

【组成】杏仁半两 蜀椒 附子 细辛各六铢

【用法】上咬咀。以醋五合，渍药一宿，明旦以猪脂五合煎令附子色黄，膏成，去滓，待冷以涂絮。导鼻孔中，一日二次，兼摩顶上。

【主治】小儿鼻塞不通，涕出。

【方论选录】《千金方衍义》：杏仁下气，蜀椒温中，附子逐湿，细辛去风，皆利窍之品；其用醋者，藉以引领诸药入于肝经，且遏椒、附之性，缓行不骤也。

72325 涂角药

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】赤小豆 白药子 天花粉 槐花 滑石 黄白皮 寒水石各等分

【用法】上为末。用生赤芍药、地黄、藕节、雪草捣汁，调涂患处。即散。

【主治】小儿丹毒。

72326 涂顶油

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】生麻油二升 沉香半两 白檀香半两 木香半两 苏合香一两 蔓荆子半两 防风半两（去芦头） 余甘子半两 川朴消一两半 甘松子一分 零陵香一分 丁香一分 白茅香一分 犀角屑一分 龙脑一分 空青三分（研细） 石膏三两（捣研） 生铁三两 莲子草汁二升

【用法】上除汁药外，细锉，以新绵裹，子不津铁器中盛，以前麻油、莲子草汁浸，经七日后，取涂子头顶上。

【功用】养发，补心，除顶热，明目。

【主治】眼疾。

72327 涂顶油

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】麻油二合 消石一两（细研） 川朴消一两（细研） 莲子草汁半合 白蜜半合

【用法】上药同研令匀，以瓷盒中盛之。每

用一匙，涂于顶上。

【主治】脑热风，目暗。

72328 涂顶膏

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】乌喙（去皮脐，去苗） 莽草 石南 细辛 皂荚（去皮子） 续断 泽兰 白术 辛夷 防风（去芦头）各二两 柏叶一斤 松叶二斤 猪脂四斤

【用法】上为细末，以酒一升，浸一宿，滤出，以猪脂煎药焦黄，膏成，去滓。沐发了，以涂之。

【主治】头风痒，白屑。

72329 涂顶膏

《奇效良方》卷六十四。为《普济方》卷三七二“涂凶法”之异名。见该条。

72330 涂唇膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】石燕子（为末）

【用法】每用一捻，蜜少许调。奶食前后涂儿唇上，一日三五次。

【主治】襁褓小儿咳嗽吐乳，久不愈。

72331 涂脐散

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】井底泥 青黛 伏龙肝

【用法】共为末，调匀。涂脐上，干再换。

【主治】孕妇瘟疫，恐伤胎气者。

72332 涂脐膏

【方源】《医方类聚》卷一二八引《济生》。

【组成】地龙 猪苓（去皮） 针砂各一两

【用法】上为细末，搗葱涎调成膏。敷脐中，约一寸高阔，绢帛束之，以小便多为效，一日二次。

【主治】水肿，小便绝少。

72333 涂脐膏

【方源】《得效》卷九。

【组成】地龙 猪苓（去皮） 甘遂 针砂各一两

【用法】上为末，搗葱涎调成膏。敷脐中约一寸高，阔绢帛束之。以小便多为度，一日二次。

【主治】水肿，小便绝少。

【备考】方中甘遂原缺，据《东医宝鉴·杂病篇》补。

72334 涂摩膏

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】护火草（大叶者。亦名景天） 生姜（不洗，和皮） 盐各等分

【用法】研为膏。涂摩痒处。如遍身瘾疹，涂发甚处，余自消。

【主治】瘾疹。

72335 涂香油方

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】松皮一两 天麻二两 莽草一两 秦艽一两（去苗） 独活二两 川乌头三两 川椒二两（去目） 白芷二两 芎藭二两 辛夷二两 甘松一两 零陵香一两 沉香一两 羊躑躅一两 木香一两 郁香一两 甘菊花一两 牛膝一两（去苗） 松叶半斤 杏仁二两（汤浸去皮）

【用法】上为细末，以醋五升渍一宿，滤出，以生乌麻油六斤，于铛内微火煎令沸，候白芷色焦黄，膏成，以绵滤去滓，瓷器内盛。一依涂油之法任意涂之。以发生为度。

【功用】长发。

72336 涂凶麝香散

《御药院方》卷十一。为《小儿药证直诀》卷下“涂凶法”之异名。见该条。

72337 涂容金面方

《医部全录》卷一三一。即《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医鉴》“皇帝涂容金面方”。见该条。

72338 涂擦雄黄膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】猪肪脂三两 天麻 香白芷各三钱 巴豆五个（重半钱） 轻粉二钱 黄蜡 雄黄各五钱 麝香半两

【用法】上以猪肪脂煮天麻、白芷、巴豆黄色，滤去巴豆等不用，澄清，入上项轻粉等四味和匀，放冷为度。每用少许，临卧涂患处。以痒住为度。

【主治】发际内诸痒疮，及肤起瘾疹，痒不可忍。

浴

72339 浴汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】盐五升（熬令赤） 鸡毛一把（烧作灰）

【用法】以水一石，煮盐作汤，纳鸡毛灰着汤中，适冷暖以浴。

【主治】产后中风流肿，及妇人阴冷肿痛。

72340 浴汤

【方源】《幼幼新书》卷十四引《婴童方》。

【组成】莽草 丹参 肉桂各三两 菖蒲半斤 蛇床子二两 雷丸五十个

【用法】水三升，煮十余沸，适寒温，浴儿。

【主治】小儿伤寒，寒热不休，不能服药。

【宜忌】避阴及目。

72341 浴风汤

【方源】《普济方》卷三二六。

【组成】蛇床子 吴茱萸（汤浸七次，石灰炒干） 草乌各等分

【用法】上为细末。煎汤洗之，一日三五次。

【主治】阴中痒痛。

72342 浴目方

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】黄连二分 朴消半分 防风 白芷 归尾 红花 胆矾各一分 古钱一文（货泉半两、五铢及开元通宝皆可用，余不足用。要以上铜青厚者为佳，得自古矿中者尤佳）

【用法】以碗盛水，于饭上蒸透，频频洗目；冷则复温之。

【主治】目赤肿，感于风热，或时令传染而暴发者。

【方论选录】黄连、朴消以去热，防风、白芷以祛风，归尾、红花以散血，胆矾、古钱皆能敛阴、除湿泪、泻肝热、敛心神。此洗目良方，无激火动血气之失。

72343 浴体法

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】浴体天麻散（《御药院方》卷十一）。

【组成】天麻末二钱 全蝎（去毒，为末）朱砂各五钱 乌蛇肉（酒浸，焙干） 白矾各二钱 麝香一钱 青黛三钱

【用法】上为细末。每用三钱，水三碗，桃枝一握，叶五七枚，同煎至十余沸，温热浴之。勿浴背。

【主治】①《小儿药证直诀》：胎肥、胎热、胎怯。②《御药院方》：小儿百日内发搐。

72344 浴肠汤

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】大黄四两（湿纸裹，煨） 大青叶 梔子仁 甘草（炙）各一两

【用法】上为末。水五升，末四两，煎减二升，纳朴消五合，再熬去一升，取汁二升，分四服。量虚实与之，大泻为度。

【主治】阳厥发狂，将成疸。

【宜忌】如喜水，即以水浇之；畏水者，勿与吃，大忌。

72345 浴疔方

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】草乌 麻黄根 艾叶 地骨皮 朴消各一两

【用法】上为极细末。用水一桶，椒一合，葱一斤，同煎汤，入醋一钟，于密室中自用手巾围搭四肢，候汤可浴，浴之令汗透，务使久浴；面上汗如珠，徐起，或坐、或卧片时，汗收着衣，避风。五日再浴。如此三五次，内服换肌散等药。

【主治】疔风。

72346 浴毒汤

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 甘草（锉） 黄芩（去黑心）各一两 柏枝一把（截如筹子长） 大豆一合

【用法】上为粗末。每用三四匙，以水二升，煎至一升，乘热淋洗，一日三四次。候洗下腐子，即用平肌散敷之。

【主治】瘰癧。

72347 浴毒汤

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】何首乌不拘多少

【用法】上为粗末。每用药末一两，干艾叶半两，水一大碗，同煎至水减半，滤去滓，稍热洗，冷即再暖。

【主治】诸疮疼痛，坚硬不消，及破后脓水不绝，恶肉未退，好肉不生。

72348 浴毒汤

【方源】《外科精义》卷下引《拾遗卫生方》。

【组成】木通 藁本 管仲 白芷 荆芥 甘松 薄荷各等分

【用法】上咬咀。用药二两，水五升，入芒消半两，煎至三升，热洗浴疮。

【主治】小肠炎，阴疮痒痛。

72349 浴体天麻散

《御药院方》卷十一。为《小儿药证直诀》卷下“浴体法”之异名。见该条。

浮

72350 浮水散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《婴童宝鉴》。

【组成】蜗牛二七个（甘草水洗） 草龙胆一两（为末，以蜗牛搜作饼子后阴干）

【用法】上为末。每服一捻许，浮水与饮，只一服效。

【主治】小儿渴不止，腹急身热。

72351 浮水散

《外科十三方考》。为原书“枳马二仙丹”之异名。见该条。

72352 浮水膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】水桦（晒干）五两

【用法】上为末，以白蜜调和稀稠得所，入瓷盒中盛。每卧时涂面。

【功用】令面光白。

【主治】面皴疱。

72353 浮石丸

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一五八。

【组成】浮石

【用法】上为末服；亦可为蜜丸。

【主治】卒得咳嗽。

【备考】①浮石，原作“浮散石”，据《圣惠》改。②《普济方》本方用浮石二两，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以米饮送下，一日三四次。

72354 浮石丸

【方源】《名家方选》。

【组成】莪术 三棱 桃仁 大黄 浮石各等分

【用法】上为末，糊为丸服。

【主治】经闭，及血块。

72355 浮石丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】海浮石 龙骨 牡蛎 消石各二钱 荞麦 大黄各三钱

【用法】上为末，糊为丸。每服一钱，白汤送下。

【主治】青盲阔大等内障。

72356 浮石散

【方源】方出《本事》卷六，名见《普济方》卷一七六。

【组成】浮石 舶上青黛各等分 麝少许

【用法】上为细末。每服一钱，温汤调下。

【主治】消渴。

【方论选录】《本事方释义》：浮石气味咸平，入手太阴；舶上青黛气味苦辛微寒，入足厥阴，麝香气味辛温，入手足少阴，能引药入经络，凡消渴之病，必因阳盛阴亏，津液内涸所致，故以咸平微苦寒之味助其阴，犹恐不能直入病所，又以辛香走窜之品引其入里，无不效验矣。

72357 浮石散

【方源】《医方类聚》卷一七九引《新效方》。

【组成】海浮石（研为粉） 黄丹（研）各一两 巴豆二十粒（去壳膜油）

【用法】上为末。每用少许，外敷患处。死肌恶肉如推下也。

【主治】死肌恶肉。

72358 浮麦汤

【方源】《保婴撮要》卷十九。

【异名】浮麦散(《准绳·幼科》卷五)。

【组成】浮麦不拘多少

【用法】炒香。每服三五钱，水煎服。

【主治】小儿痘，自汗。

72359 浮麦散

《准绳·幼科》卷五。为《保婴撮要》卷十九“浮麦汤”之异名。见该条。

72360 浮麦散

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】人参二钱 当归 熟地黄各一钱五分 麻黄根五分 黄连(酒炒)五分 浮小麦一撮

【用法】水一钟半，煎七分服。

【主治】产后阴虚盗汗。

72361 浮萍丸

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】干浮萍 栝楼根各等分

【用法】上为末，以人乳汁和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹时饮送下，一日三次。

【主治】消渴，虚热。

【方论选录】《千金方衍义》：《本经》言浮萍下水气，止消渴，以其能开发腠理，通行经脉也。此方以肺气固结，津不行而渴，故用水萍，兼取栝楼根协济，以建清热止渴之功。

72362 浮萍丸

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷二九九。

【组成】浮萍草一分(末) 黄丹一分 麝香一钱(细研)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，含化。

【主治】口疮久不愈。

72363 浮萍丸

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】水中萍

【用法】洗，晒干为末，以牛乳汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】热渴不止，心神烦躁。

72364 浮萍丸

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】浮萍草(阴干) 晚蚕沙 白薄荷叶各一分

【用法】上为末，用薄荷自然汁煮面糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】小儿疮子不出，烦闷惊悸。

72365 浮萍丸

《济阳纲目》卷八十四。为《丹溪心法附余》卷四“灵草丹”之异名。见该条。

72366 浮萍丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】紫背浮萍 苍耳草 苍术各二两 苦参三两 黄芩 僵蚕 钩藤 豨莶草 防风各一两五钱

【用法】上为末，酒法为丸。每服二钱，白滚汤送下。

【主治】一切阴阳顽癣。

72367 浮萍丸

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】紫背浮萍(取大者，洗净，晒干)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，豆淋酒送下。

【主治】①《金鉴》：白驳风。②《赵炳南临床经验集》：圆形脱发(油风脱发)，皮肤瘙痒病(瘾疹)，白癣风，荨麻疹(痞瘤)

【备考】《赵炳南临床经验集》本方用紫背浮萍一斤，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二至三钱，一日二次。

72368 浮萍汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】青萍汤。

【组成】浮萍三钱 丹皮三钱 芍药三钱 甘草三钱(炙) 生姜三钱 大枣三枚(擘)

【用法】流水煎大半杯，热服。覆衣取汗。

【主治】太阳温疫，发热头痛。

【方论选录】温疫得之中风，亦是桂枝汤

证，但发于春夏之月，但热无寒，不宜桂枝辛温，故以浮萍泄卫气之闭，丹皮、芍药泄荣血之郁也。

72369 浮萍酒

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】浮萍不拘多少

【用法】捣烂，用好酒一斤或半斤煎滚，冲浮萍内半时许，通口服。随嚼浮萍草敷疔上。

【主治】红丝疔。

72370 浮萍散

【方源】《幼幼新书》卷十四引郑愈方。

【组成】浮萍 麻黄 京芎 天麻各二钱

【用法】上为末。每服二钱，薄荷酒调下。覆令出汗。

【功用】出汗。

【主治】小儿伤寒壮热。

72371 浮萍散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】浮萍草

【用法】阴干，为末。每服一二钱，用羊子肝半片，入盆子内，以竹杖子刺碎烂，投水半合，绞取肝汁，调药服之。不甚者，一服便愈；若目已伤者，十服愈。

【主治】小儿疮疹入眼，痛楚不忍，恐伤其目。

72372 浮萍散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】浮萍一两 荆芥 川芎 甘草 麻黄（去根）各一两 或加当归 芍药

【用法】上为粗末。每服一两，水二盏，煎至七分，去滓温服。汗出则愈。

【主治】癩风。

【备考】《明医指掌》本方用法：加入葱白、豆豉，煎服。

72373 浮萍散

【方源】《回春》卷四。

【组成】浮萍草（于秋暮取霜露打过者）不拘多少

【用法】以净瓦摊开，阴干，其瓦一日一易，不可见日，务要阴干，用纸包起，临时研为

细末。先取井水或新水洗净脱出肛，次以药末掺上。

【主治】脱肛。

72374 浮萍散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】浮萍五钱 防风 黄耆 羌活各三钱 当归二钱 干葛一钱 麻黄五分 生草四分

【用法】水煎，量疾重轻，分二三服。

【主治】丹毒。

72375 浮萍散

【方源】《医级》卷八。

【组成】浮萍（晒干） 黄芩 白芷各一钱

【用法】上为末。四物汤同煎调下。汗出病愈。

【主治】痲、癬、疥、癩。

72376 浮椒丸

【得效】卷四。为《普济方》卷二十引《医方大成》“胡椒丸”之异名。见该条。

72377 浮珠丸子

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】雄黄（水飞过） 朱砂（细研） 膩粉各半钱 巴豆五粒（去油）

【用法】上为末，和匀，以天南星末酒煮糊为丸，小儿如粟米大，大人如梧桐子大。用金钱薄荷汤送下。

【功用】取积。

【主治】小儿积聚。

72378 浮萍草丸

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】干浮萍草半两 川升麻半两 黄药半两 黄丹半两（炒令紫色，研）

【用法】上为末，研入黄丹令匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。常含一丸咽津。

【主治】乳石发动，口舌生疮。

72379 浮萍草散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】浮萍草一两（四月十五日者） 麻黄半两（去根节） 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两

【用法】上为细散。每服二钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，和滓热服，不拘时候。

【主治】伤寒无汗。

72380 浮萍煎膏

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】浮萍草一两 川升麻一两 黄柏一两 甘草一两（半生用）

【用法】上细锉，和匀，以猪脂一斤，同于银锅中以文火煎至半斤，滤去滓，膏成。每服半匙，含化咽津。

【主治】口舌生疮，久不愈者。

72381 浮萍一粒丹

《仙拈集》卷一。为《普济方》卷一一六引《瑞竹堂方》“去风丹”之异名。见该条。

72382 浮萍天冬汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【组成】浮萍三钱 天冬三钱 生地三钱 玄参三钱 丹皮三钱 生姜三钱 栝楼根三钱

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】温疫，少阴经证，口燥舌干而渴者。

72383 浮萍石膏汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】青萍石膏汤（原书卷四）。

【组成】浮萍三钱 石膏三钱 杏仁三钱 甘草二钱（炙） 生姜三钱 大枣三枚（擘）

【用法】流水煎大半杯，热服。覆衣取汗。

【主治】温疫身痛，脉浮紧，烦躁喘促，无汗者；疫疹初起，太阳证之重者。

72384 浮萍地肤汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】浮萍草 9 克 净麻黄 2 克 净蝉蜕 2 克 地肤子 9 克 苦参片 4 克 白僵蚕 9 克 白蒺藜 9 克 豨莶草 9 克 生苡仁 12 克 粉丹皮 4 克 白鲜皮 9 克 生甘草 2 克

【用法】水煎，内服。

【主治】风寒型荨麻疹。疹出色白，碎小微红，冷时发作，遇热则轻，畏风，兼以表症，苔薄白，脉浮紧。

72385 浮萍地黄汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】青萍地黄汤（原书卷四）。

【组成】浮萍三钱 生地三钱 丹皮三钱 芍药三钱 甘草一钱 生姜三钱 大枣三枚

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】温疫，太阴经证，腹满喘干者。

72386 浮萍当归汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】青萍当归汤（原书卷四）。

【组成】浮萍三钱 当归三钱 生地三钱 丹皮三钱 芍药三钱 甘草三钱 生姜三钱

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】温疫，厥阴经证，烦满者；疹病，厥阴经证，烦满囊缩发斑者。

72387 浮萍茯苓丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】浮萍一分 茯苓半分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，黄酒送下。

【主治】紫白癜风。

72388 浮萍黄芩汤

【方源】《治疫全书》卷五。

【异名】浮萍黄芩煎（《松峰说疫》卷二）。

【组成】浮萍三钱 黄芩一钱 杏仁二钱（泡，去皮尖） 甘草二钱（炙） 生姜三钱 大枣二枚

【用法】流水煎大半杯，温服。覆衣。

【主治】温疫身痛脉紧，烦躁无汗。

72389 浮萍黄芩煎

《松峰说疫》卷二。为《治疫全书》卷五“浮萍黄芩汤”之异名。见该条。

72390 浮萍葛根汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【组成】浮萍三钱 葛根三钱 石膏三钱 玄参三钱 甘草三钱 芍药三钱

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】温疫，阳明经证，目痛鼻干，烦躁不卧者。

72391 浮萍葛根汤

【方源】《治疫全书》卷五。

【组成】浮萍三钱 葛根二钱 石膏（煨）二钱 元参二钱 生姜三钱 甘草一钱

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】瘟疫，阳明经证，目痛鼻干，烦渴不眠。

72392 浮翳坠翳丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】石决明一两 知母一两 细辛五钱 五味子半两 生地黄二两 人参二两半 防风一两 兔肝一具

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，茶清送下。

【主治】浮翳内障之证，初患之时，不痒不疼，从瞳神内映出白色，暗处看则其翳宽大，明处看其翳略小，全无血色相混。缘脑风冲入于眼，脑脂流下，致成内障。

72393 浮萍葛根半夏汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】青萍葛根半夏汤（《医学金针》卷八）。

【组成】浮萍三钱 葛根三钱 石膏三钱 元参三钱 芍药三钱 半夏三钱 生姜三钱 甘草二钱

【用法】流水煎大半杯，热服。

【主治】温疫，阳明经症，呕吐者。

72394 浮萍葛根芍药汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【异名】青萍葛根芍药汤（《医学金针》卷八）。

【组成】浮萍三钱 葛根三钱 石膏二钱 元参一钱 甘草一钱 生姜二钱 芍药一钱

【用法】流水煎半杯，热服。

【主治】疹病，阳明经证备而泄利者。

涣

72395 涣邪汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍 熟地 麦冬各五钱 甘草 柴胡 香附各一钱 陈皮三分 白术 玄参

各三钱 天花粉五分 苏子一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴气素虚，更加气恼，偶犯风邪，因而咳嗽。

涤

72396 涤中丸

《圣济总录》卷九十七。为原书卷三十二“大黄丸”之异名。见该条。

72397 涤风散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】黄连（去须） 蔓荆子各半两 五倍子三钱

【用法】上为细末。分三次，用新水煎，滤清汁，以手沃洗。

【主治】风毒攻眼，赤肿痒疼。

72398 涤风散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】羌活 防风 白芷 吴萸 细辛 官桂 芫花 当归 芍药各五钱

【用法】上为粗末。赤皮葱（连须切碎）半斤，用醪醋拌匀炒热，帛包，于疮上熨之，稍冷易之。以痛止为率。

【主治】风肿疼痛。

72399 涤邪汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】泽兰一钱五分 琥珀一钱 丹皮二钱 天冬三钱 荆芥炭一钱 条黄芩一钱五分 煨天麻八分 白薇一钱 焦山栀三钱 桔梗一钱

【用法】水煎服。

【主治】经水先来，更受热邪，寒热往来，或昼轻夜剧，或但身热，不论神昏、欲痉、欲厥等候。

【宜忌】忌食生冷之物。

【加减】如呕者，加川连（姜汁炒）八分；如不省人事者，先用苏合丸一丸，开水化服，再服本方一二剂；如热甚而狂者，童便一盞冲入药内；如神昏、欲痉、欲厥者，本方去桔梗、天冬、白薇三味，加大黄（醋炒）四

钱，元明粉二钱，桂枝五分；如腹痛拒按者，瘀血尚多，本方去桔梗、白薇、天冬，加制军三钱，元明粉一钱五分，天仙藤一钱五分；如腹微痛者，本方加桃仁二钱（去皮尖）；如受风，加防风；受寒，加柴胡；受湿，加六一散；受暑，加青蒿之属。

72400 涤光散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】枯白矾五分 铜青三分

【用法】上为末。水和药，瓷器盛，重汤煮三五沸。隔纸蘸洗，一日三五次。

【主治】目疾，屡服寒凉药不愈，两眼蒸热，如火之熏，赤而不痛，满目红丝，血脉贯睛，瞽闭昏暗，羞明畏日；或上睑赤烂，或冒风沙而内外眦皆破。

72401 涤饮丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】黑丑三两 枳实一两半（炒） 朴消三两 白矾三两 牙皂三两 枳壳一两半（炒）

【用法】上为末，萝卜汁为丸。每服二三钱，白汤送下。以胀退、大腹和软为度。

【功用】逐饮涤结。

【主治】留饮。大腹胀满，便秘，脉沉紧数者。

【方论选录】饮留于中，气结不化，故大腹胀满，大便不通焉。黑丑逐饮，枳实破结，朴消荡热逐留饮，枳壳泻滞通便秘，白矾、牙皂消溶水湿以通窍也。萝卜汁为丸，白汤下，使饮化气行，则肠胃肃清，而大便无不通，胀满无不退矣。此逐饮涤结之剂，为留饮气结胀闭之专方。

72402 涤肠丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】冬瓜子 土贝母各二两 甘草一两五钱 黄耆 栝楼 枳壳 僵蚕（制） 肥皂（炒）各一两 炙甲片五钱 牛黄三钱 乳香（炙）七钱

【用法】上为末，水法为丸，如绿豆大。每服二钱，开水送下。

【主治】大小肠痢，二便下脓；兼治肺、肝、胃诸内痢。

72403 涤肠汤

【方源】《医统》卷三十六引《发明》。

【组成】生枳壳 生大黄各三两 尖槟榔 黑牵牛（为末）各半两 白朴消二两 生枳实一两

【用法】上为粗末。每服一两，水一盞半，煎八分，空心食前服。

【主治】积滞下痢，里急后重，日夜无度。

72404 涤肠汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】大黄六钱（锦纹佳） 归尾三钱 赤芍三钱 桃仁二十粒（去皮尖） 延胡索二钱 红花一钱 木香八分 冬瓜子三钱（或肥皂核仁亦可）

【用法】水煎服。

【主治】大肠生痢。

72405 涤昏膏

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】好崖蜜一斤 黄连一两 没药半两 黄丹一两（炒紫色）

【用法】以黄丹入蜜同熬黑，煎黄连成稠汁，入二药内煎熬稠，更入没药末同熬数沸，滤去滓。洗患处，甚妙；后更用通天散搐鼻。

【主治】一切风眼，疼痛不可忍者。

72406 涤空丹

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】食盐四钱 明矾 火消 皂矾 水银各一两 白砒三钱

上为细末，炒老黄色，入阳城罐升三炷香，冷定，刮取灵药一两。加：

明雄 朱砂 血竭 乳香（去油） 没药（去油）各六钱 槐花米（净末） 穿山甲（焙，净末）各一两

【用法】上药和匀，研细，老米打糊为丸，如萝卜子大。每服一分，用土茯苓四两，猪牙皂角一条，照各部位再加引经药煎汤送下，一日三次。

【主治】结毒杨梅，顽疔，瘰癧。

72407 涤毒散

【方源】《云歧子保命集》卷上。

【组成】甘草半两 芒消九分 大黄一两
(酒浸) 当归

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，先煮甘草、当归至一盏，后入大黄，取六分，去滓，入消，煎一二沸，温服。以利为度，未利再服。

【主治】时气疮痍，五发疮疡，喉闭雷头。

【备考】方中当归用量原缺。

72408 涤垢汤

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】僵蚕不拘多少(去嘴，研末)

【用法】煎汤，浴之，或一日一次，或二日一次，毒必发出，然后用换形散搽之。

【主治】小儿乳癣，症类疥癣，起于手足，次遍腹背，缠绵不已。

【备考】《仙拈集》引本方用僵蚕、葱白、花椒各二钱。

72409 涤垢饮

【方源】《秋症指南》卷一。

【组成】黄芩三钱 赤芍一钱半 粉葛一钱半 麦冬二钱半 枳壳八分 生甘六分 秦皮五分 川连八分 花粉一钱半 粉丹一钱 桔梗八分 油归八分 杏仁一钱半 酒大黄一钱半

【用法】水二碗，煎至一碗服。

【功用】行阳明壅滞，宣气血郁热。

【主治】寒热往来，腹痛下痢，里急后重。

【加减】小便不利，加滑石；红多，加白头翁二钱；白多，加橘红五分。

72410 涤胎散

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】官桂一两半 丹皮一两半 川芎八钱 冬葵子三两

【用法】上为散。每服三钱，加葱白三枚，煎汤调下。

【主治】胎死腹中，疼痛不止，小腹重坠，脉紧细者。

【方论选录】产妇触损胎元，子遂死于腹

中，故疼痛不止，小腹重坠焉。官桂温经暖血，丹皮散瘀下胎，川芎行血海以调血气，葵子滑产门以逐死胎也。为散，葱白汤下，使阳气通行，则血气调和，而冷热并化，死胎岂能久羁腹中？而乘药势速下，其腹中疼痛有不霍然者乎。

72411 涤热汤

《圣济总录》卷六十。为《伤寒论》“茵陈蒿汤”之异名。见该条。

72412 涤烦丸

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】茴香一两(炒) 槟榔一枚 大黄一两(湿纸裹煨)

【用法】上为细末，用白面与药末各等分，滴水为丸，如梧桐子大。每服五丸，临卧烂嚼，温酒送下。

【主治】积年伏暑，遇夏头昏，肢体倦怠，不进饮食，烦渴多困。

72413 涤烦汤

【方源】《医钞类编》卷四。

【组成】青荷叶 麦冬 五味 生地 茯神 远志 竹叶 酸枣仁 炙草 莲肉

【用法】水煎服。

【主治】心虚有热而烦。

72414 涤痔散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】白矾末半两

【用法】上一味，取小便三升，入矾末，乘热洗之。

【主治】脉痔，下部如虫啮，痒痛出血。

72415 涤寒汤

【方源】《百一》卷五。

【组成】橘皮二两 天南星 草果子(炮，去皮)各四两

【用法】上咬咀。每服四钱，加生姜二十片，水二盏，煎至八分，去滓，空心、食前服。

【主治】痰饮。

72416 涤瘀汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】山楂 苏木 桃仁 陈皮各一钱

半 归尾 红花各一钱 泽兰四钱 甜酒

【主治】腹痛，痛不移处，为死血。

【备考】方中甜酒用量原缺。

72417 涤痰丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】白附子一两(炮) 天南星(汤泡七次) 白僵蚕(直者，炒去丝) 滑石三两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】痰饮。

【备考】方中天南星、白僵蚕用量原缺。

72418 涤痰丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】木香 槟榔 青皮(去白) 陈皮(去白) 京三棱(煨，锉碎) 枳壳(麸炒，去瓢) 大黄(湿纸裹，煨令香熟) 半夏(汤洗七次)各一两 黑牵牛(微炒)二两

【用法】上为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食后生姜汤送下。

【功用】升降滞气，清膈化痰。

【主治】三焦气湿，痰饮不利，胸膈痞满，咳唾稠浊，面目热赤，肢体倦怠，不思饮食。

72419 涤痰丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】好皂角(不要虫蛀损者)十两(水浸一宿，去皮弦，火炙黄色，取净末二两五钱) 猪牙皂角一两(依皂角制法) 枳壳二两五钱(一两半火炙，一两生用) 黑牵牛二两(末)

【用法】上用朴消五钱，井花水泡开，不用滓末，澄清消水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，临卧用井花水送下。如一月服三五服，至老无风瘫、麻木之疾。

【主治】男子、妇人远年日久积聚痰涎，或饮酒食后，吐唾日久，面黄肌瘦，皮肉枯涩，眼无神光；又治偏正头风。

72420 涤痰丸

《普济方》卷一六四。即《瑞竹堂方》卷二引完颜府判方“敌痰丸”。见该条。

72421 涤痰丸

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】半夏曲 枯矾 皂角(去皮子) 玄明粉 茯苓 枳壳各等分

【用法】上为末，霞天膏为丸服。

【主治】①《嵩崖尊生》：多痰。②《风劳腋膈四大证治》：痰多，食饮才下便痰涎裹住，不得下者。

【备考】《风劳腋膈四大证治》本方用法：每服三十丸。

72422 涤痰丸

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】白术(土炒)二两 半夏曲 川芎 香附米各一两 神曲(炒) 茯苓各五钱 橘红四钱 甘草二钱

【用法】上为末，粥为丸。每服八十丸，以涤痰汤送下。

【主治】妇人形肥盛，不孕，以身中有脂膜闭塞子宫。

【加减】如热者，加黄连、枳实各一两。

72423 涤痰丸

《丸散膏丹集成》。即《奇效良方》卷一“涤痰汤”制成丸剂。见该条。

72424 涤痰丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】橘红二两 姜仁三两 半夏二两 茯苓二两 苏子三两 沉香五钱 杏仁三两 贝母三两 海蛤粉二两 葶苈子一两五钱 明矾三两(煨) 南烛叶二两 白芥子一两

【用法】上为末，水泛为丸。每服三钱，用萝卜三斤，生姜一片，煎汤送下。

【主治】气急痰壅。

72425 涤痰丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】大黄五斤 炒黑丑 黄芩各一斤八两

【用法】上为细末，水泛小丸，每斤丸药用百草霜一两，煨金礞石粉二两，桃胶二钱化水上衣。每服二钱，开水送下。

【功用】清热化痰，开痰化痞。

【主治】痰火痰结，气急疯痫，湿热咳嗽，

喘满胸闷，痰涎壅盛，大便燥结。

【宜忌】孕妇忌服。

72426 涤痰汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【异名】涤痰散（《兰台轨范》卷二）。

【组成】南星（姜制） 半夏（汤洗七次）各二钱半 枳实（麸炒）二钱 茯苓（去皮）二钱 橘红一钱半 石菖蒲 人参各一钱 竹茹七分 甘草半钱

【用法】上作一服。水二钟，加生姜五片，煎至一钟，食后服。

【功用】《丸散膏丹集成》：豁痰清热，利气补虚。

【主治】中风，痰迷心窍，舌强不能言。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足太阴药也。心脾不足，风邪乘之，而痰与火塞其经络，故舌本强而难语也。人参、茯苓、甘草补心益脾而泻火；陈皮、南星、半夏利气燥湿而祛痰；菖蒲开窍通心，枳实破痰利膈，竹茹清燥开郁，使痰消火降，则经通而舌柔矣。

【备考】本方制成丸剂，名“涤痰丸”（见《丸散膏丹集成》）；其用量、用法为：为细末，用胆星烱化泛丸，如梧桐子大。每服二三钱，熟汤送下。

72427 涤痰汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 麦门冬 胆南星 枳实 黄连 人参 桔梗各五分 竹茹一钱

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】心火克肺金，久而不愈，传为肺痿，咽嗑雌哑，胸膈痞闷，呕吐痰涎，喘急难卧者。

72428 涤痰汤

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】当归一两 茯苓四两 川芎七钱五分 白芍药 白术（土炒） 半夏（制） 香附米 陈皮 甘草各一两

【用法】上作十帖。每帖加生姜三片，水煎，送服涤痰丸。

【主治】妇人肥盛，不孕，以身中有脂膜闭

塞子宫也。

72429 涤痰汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】栝楼（捣烂）五钱 胆星 半夏各二钱 橘红一钱五分 茯苓 枳实（麸炒） 黄芩 黄连 石菖蒲 竹茹各一钱 甘草（炙）五分 生姜三钱

【用法】水煎，温服。如痰闭呃甚者，用白矾一两，水二钟，煎一钟，入蜜三匙，少煎，温服即吐；如不吐，饮热水一小盏，未有不吐者，吐后呃即止。

【主治】膈间痰闭，呃逆者。

72430 涤痰汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】竹黄 明麻 枳实 橘红 胆星 菖蒲 竹茹 甘草

【主治】风痰迷心窍，舌强不语。

72431 涤痰散

《回春》卷二。为方出《百一》卷五，名见《医学纲目》卷二十五“二贤散”之异名。见该条。

72432 涤痰散

《兰台轨范》卷二。为《奇效良方》卷一“涤痰汤”之异名。见该条。

72433 涤邪救苦汤

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】黄连 大黄 牛蒡 红花 滑石 木通 蝉蜕 荆芥 泽泻 青皮 赤芍 山楂

【用法】加灯心二十茎，阴阳水煎服。

【主治】痘毒火下注大肠，邪毒逼迫，欲解不解，毒垢秽臭无伦者。

72434 涤秽免痘汤

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】丝瓜小小蔓藤丝（五六月间取）

【用法】阴干，约二两半重，收起，至正月初一日子时，父母只令一人知，将前丝瓜藤煎汤，待温，洗儿全身头面上下，以去其胎毒，洗后亦不出痘也；如出亦轻，只三五颗而已。一方用葫芦藤蔓，如上法洗亦妙。

【功用】去胎毒，预防痘症。

72435 涤秽免痘汤

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】楝树子一升许

【用法】正月初一日，煎汤待温，洗儿全身头面上下，以去其胎毒，洗后亦不出痘也；如出亦轻，只三五颗而已。

【功用】去胎毒，防痘疹。

【临证举例】预防痘疹 扶沟王大中，每用楝树子如上法洗，已经验数人，皆长大而不出痘，尤妙。

72436 涤秽消痧汤

【方源】《急救痧症全集》卷下。

【组成】瓜蒌 牛蒡子 僵蚕各一钱 薄荷 泽泻各五分 陈皮 银花

【用法】水煎，冷服。

【主治】触冒秽浊不正之气，发痧，胸膈痞满，痰滞气逆等症。

【备考】方中陈皮、银花用量原缺。

72437 涤秽漱口散

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】羌活 防风 甘草 贯众 香附 荆芥 藿香 川芎 寄奴 银花

【用法】水煎，漱口，吐出毒涎。

【主治】白粉痲，形如白粉，肌肤如霜，服追风散三日后，唇肿，牙缝出血，遍身如刀刺，口臭。

【宜忌】吐出漱水，不可咽下；少顷方可吃粥，不至毒气入肠。吐时须用有盖桶盛之，埋过，勿令好人染其毒也。

72438 涤滞消痰汤

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】木香三钱 香附米三钱 黑姜三钱 延胡索三钱 当归身四钱 吴茱萸三钱 蜈蚣二条 血余三钱 人参二钱 山甲一钱 川芎三钱 陈皮四钱

【用法】水煎，温服。

【主治】产后腹痛。因其腹中素有陈寒结气，及至产后血行多滞，以致恶露不尽，凝聚作痛。

流

72439 流气丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】木香 川茴香（微炒） 菖蒲 青皮（去瓢） 蓬莪茂（炒，铤）、红橘皮（去瓢） 槟榔 萝卜子 补骨脂（微炒） 草澄茄 缩砂仁 神曲（微炒） 麦蘖（微炒） 枳壳（去瓢）各一两 牵牛（微炒）一两半

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后细嚼白豆蔻仁一枚，白汤送下。

【功用】消导滞气，通和阴阳，消旧饮。

【主治】五积六聚，癥瘕癖块留饮。皆系寒气客搏于肠胃之间，久而停留不去，变成诸疾。

【备考】虽年高气弱皆可服。

72440 流气丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】人参 焦术 茯苓 炙甘草 清夏 广皮 丁香 沉香各二钱 木香 肉桂各一钱 香附四钱 白芷 紫苏 草果仁 青皮 大黄各二钱 枳壳 厚朴各三钱 槟榔 莪术 麦冬 木瓜 木通 白蔻仁各二钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，姜汤送下。

【功用】散寒通滞，行气健胃。

【主治】胸膈闷满，饮食不下，气滞作痛，周身浮肿，气郁痰喘，小便不利，疮毒气肿。

【宜忌】忌生冷硬物。

72441 流气饮

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【异名】明目流气饮（《袖珍》卷三）。

【组成】大黄（炮） 川芎 菊花（去枝） 牛蒡子（炒） 细辛（去苗） 防风（去苗） 山梔（去皮） 白蒺藜（炒，去刺） 黄芩（去芦） 甘草（炙） 玄参（去芦） 蔓荆子（去白皮） 荆芥（去梗） 木贼（去

根节)各一两 苍术(米泔浸一宿,炒控)二两 草决明一两半

【用法】上为末。每服二钱半,临卧用冷酒调下。如婴儿有患,只令乳母服之。

【主治】肝经不足,内受风热,上攻眼目,昏暗,视物不明,常见黑花,当风多泪,怕日羞明,堆眵赤肿,隐涩难开,或生障翳,倒睫拳毛,眼弦赤烂;及妇人血风眼,及时行暴赤肿眼,眼胞紫黑。应有眼病,并宜服之。

72442 流气饮

《痘疹心法》卷十二。为《玉机微义》卷十五“十六味流气饮”之异名。见该条。

72443 流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】紫苏 桔梗 枳壳 乌药 甘草 芍药 白芷 川芎 防风 厚朴 木瓜 香附 官桂 川楝子

【用法】水二钟,加生姜三片,大枣一枚煎,不拘时候服。

【主治】蜈蚣串。

72444 流气饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白檀香 沉香 乌药 桔梗各一钱五分 香附 白豆蔻 枳壳 缩砂 苍术各二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】心腹刺痛,皆因心事忧郁,不得舒畅,而作痛如刺。

72445 流气饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】当归 川芎 赤芍 黄耆 人参各五分 甘草节 广木香 紫苏 乌药各四分 桔梗 厚朴 枳壳各三分

【用法】水煎服。

【主治】虚而结痼。

72446 流气饮

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 青皮 陈皮 白芷 乌药 木香

【主治】痘疮。

72447 流气饮

【方源】《幼科释谜》卷六。

【组成】蝉退 甘草 羌活 天麻 当归 防风 大黄 薄荷 赤芍 杏仁各等分

【用法】上为末。每服五钱,水煎服。

【主治】小儿风毒患眼。

72448 流气饮

【方源】《昇授眼科》。

【组成】芍药 茯苓 防风 甘草 柴胡 羌活 独活 川芎 青皮 紫苏 荆芥 麦冬 连翘 石膏

【用法】水煎,饱时服。

【主治】头风引邪,不能四散,攻入于目,目有障膜,形如垂帘者。

【加减】夏月,加黄连。

72449 流气散

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】当归 延胡索 川芎 乌药 肉桂 桃仁 木香 赤芍药 枳壳 蓬术 青皮各等分

【用法】上为末。每服二钱,酒调下。

【主治】脏腑虚弱,气血不调;或兼外邪,成形作痛,攻注上下。

72450 流气散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】广木香

【用法】晒干,研末。口服;或摊大膏药贴之。

【主治】气滞胸腹,经络作痛。

72451 流水汤

【方源】《外台》卷十七引《小品方》。

【组成】半夏二两(洗十遍) 粳米一升 茯苓四两

【用法】上切。以东流水二斗,扬之三千遍令劳,煮药,取五升,分服一升,白昼三次,夜二次。

【主治】虚烦不得眠。

【宜忌】忌羊肉、饴、醋物。

【备考】方中粳米,《医心方》引作“秣米”。

72452 流伤饮

【方源】《伤科秘方》。

【组成】刘寄奴一钱 骨碎补五钱 元胡五钱

【用法】水二钟煎，加童便一小钟冲服。

【主治】跌扑挫伤，筋骨碎断，内有瘀血者。

【加减】如伤重，加山羊血（研）一钱，或加地龙二条（去垢，炙，为末）。

72453 流金丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二引《全要方》。

【组成】半夏二钱（制） 白矾（枯）二钱 寒水石（煨）六钱 朱砂一钱 雄黄一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】小儿咳嗽痰盛。

72454 流金丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】大黄四两（酒浸，切薄片，九蒸九晒。初用大香二炷蒸熟透，取晒。如初次蒸不透，后次虽八蒸亦不能透矣） 石膏二两（水飞） 陈皮（去白） 香附（去毛）各一两五钱 桔梗一两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。噙服。

【主治】内外上下诸积热。

72455 流金丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】枝子仁（炒黑）五两 白石膏四两 牙皂（煨，去弦）二两 枳壳（炒）二两 生矾二两 礞石（煨）二两 陈皮三两 木香五钱 锦纹大黄（酒浸一宿，切片，九蒸九晒，每蒸一炷香，晒干）六两 香附（童便浸一宿，晒干，炒）三两五钱 胆南星（炒）二两 贝母四两（去心）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂五钱研末为衣。每服四十丸，薄荷姜汤送下。

【主治】一切痰火痰厥，中风瘫痪，小儿急惊。

72456 流金散

《圣济总录》卷三十三。为《肘后方》卷二“太乙流金方”之异名。见该条。

72457 流金膏

【方源】《医统》卷四十三引《经验方》。

【组成】白石膏（微煨，研细末，无滓为度） 大黄（锦纹者；不见铁器捣碎，如豆大，好酒浸半日，蒸熟晒干，九蒸九晒为度）各二两 片黄芩（酒洗） 橘红各一两半 连翘（去枝，酒洗） 川芎 桔梗 贝母各一两 腊胆 南星 苏州薄荷叶 香附子各半两

【用法】上药各精制，为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，午后或临卧细嚼。

【主治】火痰咳逆。

【宜忌】忌酒、面、诸湿热物。

72458 流注汤

【方源】《仙拈集》卷四引《顾体集》。

【组成】上茯苓（刮去皮，打碎）四两 龙胆草二钱 贝母 僵蚕 银花 槐花 五倍子各三钱 橘红 防己 防风 木通各一钱 甘遂七分 皂角子九个

【用法】水三碗，煎三大钟。每日早、中、晚各热服一钟，痰在上，食后服；在下，食前服。

【主治】湿痰流注，漫肿无头，皮色不变，久而不治，则发热作脓，未破者。

【宜忌】方内有甘遂，忌甘草。

【加减】虚弱，加石斛、苡仁；痰在头顶、胸，加夏枯草；在脊背，加羌活；胁肋，加柴胡；在肚腹，加赤芍、泽泻；在臂，加独活；在腿脚，加木瓜、牛膝；已破头者，只服四五剂，随服十全大补汤加川贝母、石斛、乳香十余剂方能全愈。

72459 流注饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】地榆 苦参各二两 银花 红花各三两

【用法】酒、水煎服。

【主治】湿痰流注。

72460 流注散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】木香一钱半 雄黄五分 朱砂六分 蝉退 全虫各七个 金银花子五钱

【用法】共为末，分三服。酒调下。

【主治】流注。

72461 流经散

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】当归 肉桂各三钱 京芍药四钱 威灵仙三钱 乌豆半钱 牡丹皮二钱 川芎三钱 黑牵牛三钱（炒） 乌药半钱 地黄半钱

【用法】上咬咀，半水半酒煎服。

【主治】妇人脚疼腰痛，甚不转侧，日夜呻吟不止，或有发热。皆因经行之际水湿所触，气血凝滞，住而不行，流入脚经，故成疾。

72462 流星串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】红曲一两 澄茄四两 香附四两

【用法】上为末。每服一钱。

【主治】积滞，大便红。

72463 流星散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《九篇卫生方》。

【组成】半夏十四枚（大者，生用） 胡椒四十九粒

【用法】同为粗末。每服半钱，水一盞，人生油七滴，煎至四分，去滓温服。

【主治】小儿胃气虚冷，痰吐呕逆。

【备考】《普济方》本方用法：每服半钱，水一盞，入生姜一片，油七滴，煎至四分，去滓温服。

72464 流积丸

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】青黛 黄芩 海石 神曲（炒）

【主治】痰积下流，肠虚而泄。

72465 流气饮子

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】紫苏叶 青皮 当归（洗） 芍药 乌药 茯苓 桔梗 半夏（汤洗七遍，焙干

为末，姜汁和，阴干） 黄耆 枳实（麸炒，去瓤） 防风各半两 甘草（炙） 橘皮（洗）各三分 木香一分 连皮大腹（锉，姜汁浸一宿，焙）一两 川芎三分

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，加生姜三片，大枣一个，同煎至一盞，去滓温服。

【主治】①《全生指迷方》：气晕。但晕而不眩，发则伏地昏昏，食顷乃苏，脉虚大而涩。由荣卫错乱，气血湮浊，阳气逆行，上下相隔；气复通则苏。②《妇人良方》：妇人臂痛。

72466 流气饮子

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】黄耆 桂心 苦梗 白芍药 甘草 当归 陈皮 大腹皮 桑白皮 紫苏叶 紫苏梗各一两 大黄 木通各三钱

【用法】上咬咀。每服三大钱，水一盞，加生姜三片，大枣一枚，煎至八分，空心温服。须要温，热则泻人。

【主治】诸般气疾并泄泻。

72467 流脑合剂

【方源】《古今名方》引江西中医学院方。

【组成】生石膏 鲜生地各 60 克 知母 连翘各 15 克 大青叶 30 克 丹皮 黄连 黄芩各 12 克 赤芍 淡竹叶 桔梗 甘草各 9 克 水牛角 120 克（先煎，取汁 200 毫升）

【用法】先将石膏、大青叶煎汤代水，合牛角汁再煎诸药；先后煎二次，共煎药液 200~400 毫升，分三次服。一昼夜可连服 2~4 剂。

【功用】清热解毒，凉血救阴。

【主治】流行性脑脊髓膜炎，证属气血两燔者，见有高热，头痛剧烈，呕恶肢痛，颈项强直，咽痛或红肿，皮肤出血点较明显，舌绛，脉数。

72468 流气导滞丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】人参 白术 茯苓 制甘草 清夏 紫丁皮 白芷 盆沉香 草果仁 紫苏 青皮 大黄 槟榔 莪术 寸冬各七钱 木瓜 木通 大腹皮 陈皮 枳壳各一两 木

香五钱 香附二两四钱 肉桂三钱五分 厚朴一两四钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，早、晚白开水送下。

【功用】疏通气血，消导滞塞，宣经活络，开郁破结。

【主治】寒郁气滞，腹部作胀，胸满气塞，不思饮食，噎膈反胃，食后胀痛，吞酸嘈杂，宿食不消。

润

72469 润下丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】加味润下丸(《摄生众妙方》卷六)。

【组成】南星一两 半夏二两(各依橘红制) 黄芩 黄连各一两 橘红半斤(以水化盐五钱，拌令得所，煮干，焙燥) 甘草(炙)一两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服五七十丸，白汤送下。

【功用】降痰。

【主治】胸膈有痰，兼嗽。

【加减】上热，加青黛；有湿，加苍术；或加参、萸，看虚实作汤使。

72470 润下丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】陈皮(去白，淡盐水浸泡，刮锉，炒)二钱 枳壳(炒) 桔梗 大半夏(姜汤泡七次) 甘草 苏子(炒) 莱菔子(炒) 白茯苓各一钱

【用法】上为末，神曲糊丸，如黍米大。白汤送下。

【主治】小儿痰嗽，固痰甚气弱不可下者。

72471 润下丸

《医方集解》。为方出《百一》卷五，名见《医学纲目》卷二十五“二贤散”之异名。见该条。

72472 润下丸

【方源】《痧症全书》卷下。

【组成】大黄(酒制)四两 黑丑(炒，头末)二两

【用法】上为末，牙皂煎汁为丸，如凤仙子大。每服一钱，多至二钱，灯心汤送下。

【功用】润肠，兼利小便。

【主治】大肠燥实，二便秘结，痧毒壅盛者。

72473 润下丸

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】南星一两 半夏三两 黄芩 黄连各一两 橘红五钱 白矾三两

【用法】姜汁、竹沥和丸。

【主治】痰郁肠胃，脉滑而沉，变生百病。

72474 润下汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】牛膝一两 降香 苏木 梔仁各一钱

【用法】水煎，童便兑服。

【主治】负重奔走，纵情女色，六淫受伤，血从脊上，或呕或吐，势如潮涌，不可抑遏。

72475 润土汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参 生地各一两 甘草一钱 地骨皮五钱 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】胃气燥，口渴善饮，时发烦躁，喜静而不喜动，见水果则快，遇热汤则憎。

72476 润木汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归 白芍各一两 焦术 茯苓各五钱 金樱 菊花各三钱 炒梔一钱 五味 甘草各五分

【主治】肝燥梦遗。

72477 润气煎

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】陈橘皮(汤浸，去白，焙) 紫菀(去土) 人参 紫苏叶 甘草(炙，锉) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 五味子(去梗)各一两

【用法】上为细末。蜜半盏，生姜自然汁三分同药和匀，置瓷器中，甑上炊熟。每服半匙许，热汤化下，不拘时候。

【主治】产后上气喘急，咽噎不利。

72478 润生丸

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】人参（不拘多少） 川乌 草乌 白芷 当归 槐角子 何首乌 枳壳 连翘 海风藤 乌药 杜仲 桔梗 石楠叶 肉桂 各四两 干姜 白僵蚕 甘草 赤芍药 升麻 虎骨 防己 白花蛇（酒浸） 乳香 没药 沉香各一两

【用法】上为细末。用麻黄二十斤，去节，水煎一日，去滓，将汁熬成膏，入药末和为丸，每丸重五钱。清晨送下一丸。

【功用】消风顺气。

【主治】大麻疯。

【宜忌】不可见风。

72479 润光丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】琥珀一两 防风 玄参 当归 蔓荆子 牛蒡子 草决明各一两五钱 甘草 苍术 大黄 菊花各一两二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】两毗红肿，赤灌瞳仁。

72480 润华膏

【方源】《红炉点雪》卷二

【组成】人参五钱 麦门冬（去心）一两 阿胶珠一两 款冬花五钱 紫苏五钱 五味子一两 杏仁（去皮尖）五钱 百药煎五钱 贝母一两 栗壳（去筋膜）五钱 乌梅肉一两 桔梗一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧嚼化。

【主治】一切劳嗽，肺痿喘急。

【备考】本方方名，据剂型，当作“润华丸”。

72481 润血汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】当归须一钱二分 川芎一钱 麻仁一钱 桃仁（去皮尖）一钱 红花（酒洗）三分 甘草（生）四分 赤芍药 黄芩 生地黄七分 橘皮（去皮）七分

【用法】上咬咀。水煎熟，食前服。

【主治】噎，食物必屈曲，水饮难下者。

【加减】如大便结闭，加酒炒大黄少许。

72482 润肌汤

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 当归 白芍 熟地 香附 陈皮 贝母 白芷各八分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】杖疮，日久不敛。

【加减】寒热，加柴胡，骨皮；口干，加麦冬、五味子；脓清，加黄耆；脓多，加川芎；敛迟，加肉桂。

72483 润肌散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】当归 生地各五钱 真麻油四两

【用法】将药入油内熬十数沸，去滓，加黄蜡一两，瓷瓶收贮。

【主治】一切疮疖，结盖后干痛，及冬月手足冻裂，并汤火伤。

72484 润肌膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】珠子沥青四两 白黄蜡八钱 乳香二钱

【用法】上于铁铛内，先下沥青，随手下黄蜡、乳香，次入麻油一二匙，俟沥青溶开，微微熬动，放大净水一盆于其傍以搅药，用铁铈滴一二点于水中试之，如硬，再少入油，如软硬合宜，用新绵滤于水中揉扯，以白为度，以瓷器内盛之，或油纸裹。每用不拘多少，先于火上炙裂口子热，捻合药亦火上炙软，涂裂口上，用纸少许贴之，自然合矣。

【主治】手足皴涩，皮肤裂开，疼痛不能迎风入手。

72485 润肌膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】麻油四两 当归五钱 紫草一钱

【用法】上同熬，药枯滤清，将油再熬，加黄蜡五钱，化尽，顷入碗内，顿冷。搽擦患处。

【主治】秃疮干枯，白斑作痒，发脱。

72486 润肌膏

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】香油四两 奶酥油二两 当归五钱 紫草一钱

【用法】将当归、紫草入二油内，浸二日，文火燂焦去滓，加黄蜡五钱，溶化尽，用布滤，倾碗内，不时用柳枝搅冷成膏。每用少许，日擦二次。

【主治】白屑风。因肌热当风，风邪侵入毛孔，郁久血燥，肌肤失养，头面作痒，抓起白屑皮脱去又起，其燥痒倍增，肌肤燥裂者。

72487 润肌膏

【方源】《疡医大全》卷十九。

【组成】当归身一两五钱 粉甘草一两 白芷八钱 血竭六钱 紫草茸五钱 白蜡（切片）二两

【用法】用真麻油八两，先将当归身、白芷、甘草熬深黄色，滤去滓，再入血竭熬化，又滤净，再入紫草、白蜡片略沸十数滚，即起火，滤去紫草滓，其色即鲜明可爱则膏成。先将葱汤浸洗良久，随以本膏擦之。

【主治】腰痛。风寒气郁于皮毛，致血不荣于肌表，皮稿则多痛，手足似无皮之状。

【宜忌】就暖勿见风冷。

72488 润字丸

【方源】《湿温时疫治疗法》。

【组成】酒炒锦纹一两 制半夏 前胡 山楂肉 天花粉 白术 广陈皮 枳实 槟榔各一钱二分五厘

【用法】每药须晒干为末，姜汁打神曲为丸，如梧桐子大。每服二三钱。

【主治】湿热食积，胸满不食，腹痛便秘，及夏秋赤白痢。

72489 润字丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】大黄三两 前胡一两半 枳实一两半（炒） 杏仁二两 牙皂一两半 花粉三两 槟榔一两 楂肉三两（炒） 橘红一两半 半夏一两半（制）

【用法】上为末，水泛为丸。每服二三钱，空心白滚汤化下。

【功用】疏痰通闭。

【主治】实痞喘嗽，大便闭结，脉沉者。

【方义】痰实内壅，不得施化，而大便闭结，遏热刑金，故喘嗽不止焉。杏仁疏痰降气，牙皂搜风涤痰，橘红利气化痰，半夏燥湿化痰，植肉消滞化积，前胡降气疏痰，槟榔破滞气以消积，枳实攻坚积以推陈，花粉清热邪壅结，大黄荡地道不通。泛丸汤下，俾痰消热降，则胸宇廓然，而肺金清肃，喘嗽自宁；津液施化，大便无闭结之患矣。此疏痰疾通闭之剂，为痰实喘嗽秘结之专方。

72490 润体丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】防风（去芦叉）一两半 白龙脑（别研） 乳香（别研） 羚羊角末（别研如粉） 附子（炮，去皮脐） 白僵蚕（微炒） 槟榔 肉豆蔻仁 沉香 蒺藜子（微炒） 丁香 蔓荆子（去白皮） 牛黄（别研如粉） 藿香叶 麻黄（去根节） 生犀角末（别研） 雄黄（研飞） 麝香（研如粉） 木香 辰砂（研飞） 茯苓（去皮） 白附子（炮） 羌活（去芦） 原蚕蛾（微炒） 人参（去芦） 肉桂（去粗皮） 芎藭各一两半 真珠末（别研如粉） 独活（去芦）各三分 干蝎（微炒） 半夏（水煮三十沸，薄切，焙干，入生姜汁炒） 川乌头（炮裂，去皮脐，捣碎炒黄）各二两 白花蛇（酒浸，炙，去皮骨，取肉） 天麻（去苗）各三两 琥珀（别研如粉） 膩粉（研） 白豆蔻仁各半两 金箔六十片（为衣）

【用法】上为细末，入研药令匀，炼蜜为丸，如鸡头大。每服一九，加至二九，细嚼，温酒送下，荆芥茶下亦得。如破伤中风，脊强手搐，口噤发痫，即以热豆淋酒化破三丸，斡口开灌下，少时再服，汗出乃愈；若小儿惊风诸病，每服半丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】诸风手足不遂，神志昏愦，语言謇

涩，口眼喎僻，筋脉挛急，骨节烦疼，头目眩晕，恍惚不宁，健忘怔忡，痰涎壅滞；及皮肤顽厚，麻痹不仁。

72491 润体丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】郁李仁 大黄 桂心 黑牵牛 当归 黄柏（并生用）各五钱 轻粉少许

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温水或生姜汤送下。

【主治】诸气愤郁，肠胃干涸，皮肤皱揭，胁痛，寒疟，喘咳，腹中鸣，注泄鹜溇，肋肋暴痛，不可反侧，噤干面尘，肉脱色恶；及丈夫癰疽，妇人少腹痛，带下赤白，疮疡痼疔，喘咳潮热，大便涩燥；及马刀挟瘰之疮，肝木为病。

72492 润体丸

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】当归三两 人参 黄耆 黄芩 桔梗 薄荷 石膏 苍耳子 玄参 僵蚕 蝉蜕 全蝎 黄连各一两 乌蛇一条

【用法】上为末，炼蜜为丸。先服驱风养血汤，又用防风、荆芥、归尾、苦参、黄柏烧汤洗浴后，用擦药方擦之，再服润体丸，每服百丸，空心好酒送下。

【主治】鸡皮疯。因血燥气虚入风，致形如鸡皮，粗糙不润，以手磨则粗刺。

【备考】擦药方：水银、硫黄、雄黄各五钱、砒一钱、藜芦、黄连、黄柏各五钱，大枫子一两，共为末，后用香油调擦。

72493 润肝汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地一两 山茱萸四钱 白芍五钱 当归五钱 五味子一钱 玄参三钱 丹皮三钱 炒梔子一钱

【用法】水煎服。

【功用】大滋肾水。

【主治】肾水匱涸，人有晨夕之间，多时易怒，不必有可怒之事而心烦意躁，不能自遣，至夜则口干舌燥，只有一更睡熟，余则终夜常醒。

【方论选录】此方补肾者六，补肝者四也。绝不去治心，而心气自交于肾者，因肾之足，则心不畏木火之炎，可通其交肾之路也。

72494 润肠丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】凌霄花干 天台乌药 人参 皂荚子（炒熟，去粗皮）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，或五十丸，至百丸，不拘时候以温水送下。此方不损气，以通为度。

【主治】一切风秘，虚人及老人津液内枯，不得传送者。

72495 润肠丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔纸微炒） 防己 天门冬（去心，焙） 枳壳（去瓢，麸炒）各半两 槟榔（锉）一分 牵牛子（白者，炒香，为细末）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎人参汤待温送下，不拘时候。

【主治】肺脏壅盛，心胸满闷，咳嗽烦喘，咽隔痰滞，不欲饮食，大便多秘。

72496 润肠丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】枳壳（去瓢，麸炒，为末） 大麻仁（别研）各一两

【用法】上研匀，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温水或生姜汤送下。

【主治】妊娠大便不通，腹肋坚胀。

72497 润肠丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》。

【组成】大黄（湿纸裹煨，锉细） 枳壳（去瓢，麸炒） 当归（去芦）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服二三十丸，白汤送下。

【主治】痔疮已用枯药，痔将焦枯，粪门急迫，恐大便坚实难出者。

72498 润肠丸

《儒门事亲》卷十二。为《宣明论方》卷四“软

金丸”之异名。见该条。

72499 润肠丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】大黄(去皮) 当归梢 羌活各五钱 桃仁(汤浸,去皮尖)一两 麻子仁(去皮,取仁)一两二钱五分

【用法】上除麻仁另研如泥外,余为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心用白汤送下。

【功用】润燥,和血,疏风。

【主治】饮食劳倦,风结血结,大便秘涩,或干燥闭塞不通,全不思食。

【方论选录】《医方集解》:此手足阳明药也。归尾、桃仁润燥活血,羌活搜风散邪,大黄破结通腑,麻仁滑肠利窍,血和风疏,肠胃得润,则自然通利矣。

72500 润肠丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】苁蓉润肠丸(《医学纲目》卷二十三)、苁沉丸(《医学入门》卷七)、肉苁蓉丸(《不知医必要》卷三)。

【组成】肉苁蓉(酒浸,焙)二两 沉香(别研)一两

【用法】上为细末,用麻子仁汁打糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心米饮送下。

【主治】发汗利小便亡津液,大腑秘结。

【宜忌】老人虚人皆可服。

72501 润肠丸

【方源】《直指》卷十五。

【异名】大润肠丸(《得效》卷六)。

【组成】杏仁(去皮尖,略炒) 枳壳(浸,去瓢,炒) 麻仁 陈皮各半两 阿胶(炒) 防风各二钱半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每五十丸,老者苏子煎汤送下,壮者荆芥泡汤送下。

【主治】大便秘涩。

72502 润肠丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】肥皂角十五片(五片醋炙焦,去皮

及子;五片生用,去皮子,共为末;五片水一升,揉取浓汁,滤过,慢火炒,银石器中熬成膏子,入后药) 南木香一分 青橘皮一分(去瓢) 槟榔一分(生用) 陈橘皮一分(去白)

【用法】上为末,和前皂角末令匀,却以皂角膏搜和成剂,看得所后,如硬,入少蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温熟水送下。

【主治】大肠风结气涩。

72503 润肠丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】威灵仙茸一两半 郁李仁(去皮)半两 木香二钱 枳实二钱半(麸炒) 麻仁七钱半 槟榔三钱 人参二钱半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,食后临卧生姜汤送下。

【功用】常服消食下气,祛风润燥。

【主治】津液耗少,大便秘涩,下焦气滞。

72504 润肠丸

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】麻子仁(另研) 大黄(酒煨)各一两半 桃仁泥子 当归尾 枳实(麸炒) 白芍药 升麻各半两 人参 生甘草 陈皮各三钱 木香 槟榔各二钱

【用法】上除麻仁、桃仁外,为末,却入二仁泥子,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,食前温水送下。

【主治】风中脏腑,胸膈痞闷,大便涩滞。

72505 润肠丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】润麻丸(《衡要》卷六)。

【组成】麻子仁 当归 桃仁 生地 黄枳壳各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸服。

【功用】润血燥。

【主治】大便不通。

【备考】《衡要》本方用法:上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心白汤送下。

72506 润肠丸

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】麻黄(炒)半两 枳壳(炒)半两 大黄(蒸) 乳香一两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前芝麻汤送下。

【功用】常服滋润大肠，通利燥涩。

【主治】三焦不顺，五脏不和，风结肠胃，津液枯燥，大肠壅滞，及产后津液暴竭，肠胃热涩，而致大便闭者。

72507 润肠丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】麻子仁 桃仁(去皮尖)各一两 枳实五钱 芍药一两 当归 大黄(煨)各半两

【用法】上除麻仁，桃仁别研如泥外，余药研为细末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】润燥，活血，疏风。

【主治】脾胃伏火，风血秘结，大便秘涩，或干燥塞不通，全不思食。

72508 润肠丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】归尾 郁李仁 麻仁 枳实 桃仁 芍药 皂角子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】男子血虚气结，大便不通；妇人产后血虚燥秘。

72509 润肠丸

【方源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】麻子仁 桃仁(去皮尖，另研)各一两 羌活 当归尾 大黄(煨) 皂角仁 秦艽各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】妇人伏火风热，大肠干燥，大便不通者。

72510 润肠丸

【方源】《广嗣纪要》。

【组成】火麻子(去壳，取净仁，研细)二两 桃仁(去皮尖，另研，生用)一两

【用法】上研极细末，和匀炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枳壳汤送下。

【主治】妊娠血虚蓄热，而致便难者。

72511 润肠丸

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】当归五钱 枳壳五钱 百草霜一两五钱 大黄五钱(纸包煨)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤下。

【主治】痔漏。大肠内结燥疼痛。

72512 润肠丸

【方源】《育婴秘诀》。

【组成】麻子仁(去壳) 杏仁(去皮尖，略炒) 桃仁(去皮尖)各半两 归梢 枳壳(炒)各七分半 阿胶(蛤粉炒)二分半 紫苏子(炒) 萝卜子(炒)各三分

【用法】上共为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服二三十丸，陈米汤送下。

【主治】老人、虚人、小儿、产妇大便秘结者。

72513 润肠丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】桃仁 麻仁 当归尾 大黄 羌活各五钱 升麻 红花 郁李仁

【用法】上除桃仁、麻仁另研为泥外，余为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心白汤送下。

【主治】脾胃中伏火秘结，及风结血结。

【备考】方中升麻、红花、郁李仁用量原缺。

72514 润肠丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】四物汤一倍 加青皮三倍

【主治】产后血枯便秘。

【备考】本方改作汤剂，名“润肠汤”(见《女科指南》)。

72515 润肠丸

《痘学真传》卷七。即《片玉痘疹》卷十二“润肠汤”改作丸剂。见该条。

72516 润肠丸

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】当归尾 怀生地 火麻仁 光桃仁 莱菔子

【用法】水煎，热服。

【主治】小儿正气虚弱，痘后大便秘结枯涩。

【备考】本方方名，据剂型，当作“润肠汤”。

72517 润肠丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地 油归 苁蓉各一两 人参五钱

【主治】产后便结。

72518 润肠汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】润燥汤（《摄生众妙方》卷七）。

【组成】麻子仁一钱半（细研，用水浸，滤去皮，取浓汁） 脂麻半盏（微炒，研，用水浸，取浓汁） 桃仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄熟，研如泥）一两 荆芥穗（捣末）一两

【用法】上煎数沸，入盐少许，如煎茶，不得煎过。食前恣意饮之。以利为度。

【主治】大便秘涩，连日不通。

72519 润肠汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生地黄 生甘草各一钱 大黄（煨） 熟地黄 当归稍 升麻 桃仁 麻仁各一钱 红花三分

【用法】上咬咀。水二盏，煎至一盏，去滓。食远温服。

【主治】大肠结燥不通。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作“和血润肠汤”；《医方集解》引作“当归润肠汤”。

72520 润肠汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】蜂蜜一两 香油五钱 朴消一撮

【用法】上合一处，水一钟，煎数沸，温服。

【主治】虚人、老人大便秘结。

72521 润肠汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】甘草 归尾 生地黄 火麻仁 桃仁

【用法】研泥，水煎服。

【主治】痘疹收靥后血枯不能润肠，大便秘结者。

【加减】有热者，加知母、石膏；自利者，加白术、升麻。

【方论选录】《痘学传真》：精血干燥，津液不能濡润大肠，而致便秘。故用归、地以养血，桃仁以祛瘀，麻子以润肠，甘草以和胃。大肠润泽，则便通利矣。

【备考】①本方原名“润肠丸”，与剂型不符，据《准绳·幼科》改。②本方改为丸剂，名“润肠丸（见《痘学真传》）”。

72522 润肠汤

《医学六要·治法汇》卷六。为《古今医鉴》卷八“通幽汤”之异名。见该条。

72523 润肠汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归 熟地 生地 麻仁（去壳） 桃仁（去皮） 杏仁（去皮） 枳壳 厚朴（去粗皮） 黄芩 大黄各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。水煎，空心热服。大便通即止药，不能多服，如修合润肠丸，将药加增减各为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤吞下。

【主治】大便闭结不通，为实热燥闭者。

【宜忌】切忌辛热之药。

【加减】发热，加柴胡；腹痛，加木香；血虚枯燥，加当归、熟地、桃仁、红花；风燥闭，加郁李仁、皂角、羌活；气虚而闭，加人参、郁李仁；气实而闭，加槟榔、木香；痰火而闭，加瓜蒌、竹沥；因汗多，或小便去多，津液枯竭而闭，加人参、麦门冬；老人气血枯燥而闭，加人参、锁阳、麦门冬、郁李仁，倍加当归、熟地、生地，少用桃仁；产妇去血多，枯燥而闭，加人参、红花，倍加当归、熟地，去黄芩、桃仁。

72524 润肠汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归三钱 知母 麦门冬 桃仁 麻仁 苏子 生地各一钱五分

【用法】水煎，食前服。

【主治】血枯粪结。

72525 润肠汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 桃仁 枣仁 生地 杏仁 各一钱二分 青皮

【用法】水煎，临服加生蜜五钱调服。

【主治】产后大肠枯燥，大便不通。

【备考】方中青皮，用量原缺。

72526 润肠汤

《女科指南》。即《郑氏家传女科万金方》卷四“润肠丸”改作汤剂。见该条。

72527 润肠散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】枳实（麸炒） 青皮 陈皮各一两

【用法】上为末。每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

【主治】老人气虚中风及产后大便不通。

72528 润肠散

【方源】《医学纲目》卷二十三引朱丹溪方。

【组成】人参 黄耆各一钱 厚朴八分（炒） 地黄七分 桃仁 枳壳（炒）各一钱 甘草少许（炙） 锁阳 苁蓉各二钱 桃仁一钱

【用法】煮粥，入竹沥服之。

【主治】脾约。血虚肠燥，大便秘涩，小便如常，咽塞不通，食下便有痰出，脉涩。

72529 润肠散

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】朴消一斤（童便两碗拌入，锅内炒干） 雄猪大肠头尺许（晾干半干）

【用法】将消研末入肠内，不拘多少，以塞满为度，两头线扎紧，略晒片时，入锅内炒焦黄色，研为细末。配痔漏大灵药服；外以纸捻蘸药插入管中。

【主治】痔漏。

72530 润肠散

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】鳖头灰 五倍末 伏龙肝 生矾末 赤石脂 诃子肉各五钱（俱晒干）

【用法】上为极细末。葱汤洗净，掺于肠头上，频频换之。以愈为度。

【主治】痢后脱肛。

72531 润肠粥

【方源】《女科秘旨》卷六。

【组成】苏子一合（去壳） 新米二合

【用法】煮粥食。

【主治】产后大便不通。

72532 润肠煎

【方源】《外科证治全书》卷五。

【组成】枳壳二钱 油当归二钱 杏仁泥二钱 槐角二钱 橘皮二钱 火麻仁五七分

【用法】水煎，顿服。

【主治】大肠干燥，或津液枯竭，或风热气秘。

【宜忌】气虚者，枳壳减半；血弱者，倍用油当归。

72533 润肠煎

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】生耆一两 当归五钱 火麻仁五钱（炒） 肉苁蓉一钱半（洗净） 郁李子三钱（炒） 胡桃一枚（带皮，打碎）

【用法】水煎服。

【主治】一切大便秘结，或年老久病之人，气虚血亏，不能生液，往往多便结之症。

72534 润肠膏

【方源】《医学正传》卷三。

【异名】秘方润肠膏（《保命歌括》卷二十八）。

【组成】新取威灵仙四两（捣汁，四五月开花者） 生姜四两（捣汁） 真麻油二两 白砂蜜四两（煎沸，掠出上沫）

【用法】同入银石器内搅匀，慢火煎，候如汤，时时以箸挑食之。一料未愈，再服一料。

【主治】膈噎，大便燥洁，饮食良久复出，及朝食暮吐，暮食朝吐者。

72535 润肾丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】苍术一斤（用韭菜一斤捣汁拌，九蒸九晒；又用小茴香一斤同蒸一次，去茴晒干） 熟地黄一斤 五味子半斤 干姜（冬）一两（夏五钱，秋七钱）

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心米饮送下。

【功用】善退劳热。

【主治】脾肾俱虚。

【加减】虚寒，加韭子一两；有火，加黄柏一两；大便燥，加黑芝麻四两。

72536 润金饮

【方源】《喉症集成》卷四。

【组成】川贝 尖生 黄芩 黑栀 力子 甘草 麦冬 知母 花粉 连翘

【主治】肺胃火热，口渴，咽痛。

72537 润肤丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】桃仁一两 红花一两 熟地一两 独活一两 防风一两 防己一两 粉丹皮一两五钱 川芎一两五钱 全归一两五钱 羌活二两 生地二两 白鲜皮二两

【用法】共为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服一至二钱，温开水送下一日二次。

【功用】活血润肤，散风止痒。

【主治】牛皮癣（白庖风），鱼鳞癣（蛇皮癣），皮肤淀粉样变（松皮癣），毛发红糠疹，脂溢性湿疹，皲裂性湿疹（鹅掌风）。

72538 润肤膏

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】槐米末 松脂 黄蜡各二钱 黄柏末一钱 白矾半钱 乳香少许 膩粉三厘

【用法】上以清油三两，先煎令沸，次入松脂，候消即入黄蜡，候熔消即入槐花、黄柏、白矾、乳香、膩粉搅匀，收入瓷器内。涂疮上。

【主治】皮肤风热生疮，麻痺赤色。

72539 润肺丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】半夏 阿胶 紫苑 桔梗 贝母

款冬花 汉防己各一两 蛤蚧一对

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，食后生姜汤下；白汤亦得。

【功用】化痰涎，止喘痞，利胸膈肺气。

【主治】风壅咳嗽。

72540 润肺丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】朱砂（水飞） 五灵脂（微炒）各二两 苦葶苈（隔纸炒） 杏仁（去皮尖，麸炒） 半夏曲各一两

【用法】上为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食后生姜汤送下。

【主治】肺气不调，咳嗽声重，日久不止，痰涕结搏，咽嗑不利，心神烦躁，头目昏重，精神不爽，心忪烦悸，喉中呀呷，逐气有声，一切痰实。

72541 润肺丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】鹅梨二个（去皮及子） 栝楼二个（去皮） 麻黄二两（去节） 皂角三挺（去皮弦并子，捶碎，上四味一处用河水一升半浸少时，银器内熬成膏为用） 天南星 半夏各一两半 生姜三两（同半夏、天南星作曲炒干） 枯白矾一两半 寒水石二两（烧）

【用法】上为细末，用前膏为丸，如梧桐子大，每服五七十丸，温生姜汤送下。

【主治】肺气不利，咳嗽痰实，咽嗑干燥。

72542 润肺丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】诃子 五味子 五倍子 黄芩 甘草各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。噙化。

【主治】嗽而失音。

72543 润肺丸

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】百部二两 黄连一两 明矾一两 桑皮一两 使君子三两 鹤虱二两 楝根二两 甘草五钱

【用法】上为末，白及膏糊丸。每服三钱，滚水送下。

【功用】杀虫，化湿热。

【主治】湿热生虫蚀肺，咳嗽不止，烦心恶热，脉数者。

【方论选录】湿热不消，变化生虫而侵蚀肺叶，故咳嗽不止，烦心恶热焉。黄连清热燥湿，百部温肺杀虫，明矾却湿以杜生虫之本，鹤虱杀虫以绝化虫之源，桑皮清肺气以肃金，甘草缓中州以和胃，使君子健脾气化积，楝根皮泻湿热杀虫，白及膏润补肺之残缺也。糊丸，滚汤下使湿热顿消则虫积自化，而肺损复完，安有咳嗽成劳之患乎，此杀虫化湿热之剂，为虫蚀肺叶咳嗽之专方。

72544 润肺汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）甘草（炙，锉）各一两 干姜（炮）麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙）知母（焙）款冬花 桑根白皮 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后临卧热服。

【主治】伤寒客邪在肺，咳嗽声重，身体微热。

72545 润肺汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙干）二两 甘草（炙）一两 紫苏子（炒）一分 贝母（炒，去心）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入干柿一枚（切），煎至六分，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】肺气喘急，四肢乏力，饮食无味。

72546 润肺汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】人参 生姜（切，与半夏同炒）各一两 半夏（汤洗七遍，焙，切，同生姜炒）半两 甘草（锉、炙） 陈橘皮（去白，

焙） 竹叶各二两（切）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，日三服，夜一服。

【主治】咳逆短气。

72547 润肺汤

《圣济总录》卷一七五。为《局方》卷十“润肺散”之异名。见该条。

72548 润肺汤

【方源】《普济方》卷三二〇。

【组成】人参（去芦）杏仁（去皮尖）麻黄 紫菀（洗去皮后炒）各半两 陈皮（浸，去瓢）桔梗（去芦，炒）阿胶（锉，炒令沸燥）甘草各三钱 贝母（去心，炒）

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞，煎至七分，热服之。

【主治】妇人咳嗽，咽痛，喉中鸣。

72549 润肺汤

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】知母二钱 紫菀五钱半（洗净）山梔仁五分 甘草一钱半（炒）麻黄五分（滚汤泡，去白沫，晒干）荆芥五分（去梗）马兜铃五分（去筋膜）前胡二钱（去芦）赤芍一钱 桑白皮二钱半（去红皮，用蜜炒）半夏三钱（汤泡七次，晒）赤茯苓二钱（去皮）杏仁五钱半（去皮尖，研成泥用）黄芩二钱半（去腐土）

【用法】每服一两四钱半，用水二大钟，加生姜五片，初感风寒，加葱白三根；久患咳嗽，加枣二枚，不用葱白，煎至一钟半，去滓，临睡时，将身右卧，用绢帛顶住右软肚，次用竹筒缓缓吸药，热服不言语呼唤。

【主治】上盛下虚，脾肺湿热，气喘，咳嗽痰盛，心胸气闷，不思饮食，或寒热往来，或感冒风寒，喘嗽气急，五劳七伤，吐血。

【宜忌】切忌房劳。

72550 润肺汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】天冬二钱 麦冬八分 阿胶一钱 苁仁一钱 当归八分 白及一钱 百合八分

桔梗六分

【功用】润肺。

72551 润肺汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】川芎(炒) 阿胶 缩砂各一钱
乌梅 生姜 紫苏 杏仁各五分

【用法】水煎，温服。

【主治】胎妇喘咳。

72552 润肺饮

【方源】《医宗必读》卷九。

【组成】贝母(糯米拌炒) 天花粉各三钱
桔梗一钱 甘草五分 麦门冬(去心) 橘
红(去白) 茯苓(去皮) 各一钱半 知母
(酒炒) 七分 生地黄二钱半

【用法】用水二钟，加生姜三片，煎至七分，食后服。

【主治】肺经燥痰，脉涩面白，气上喘促，洒淅寒热，悲愁不乐，其痰涩而难出者。

72553 润肺饮

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】麦冬 玄参各五钱 甘草 半夏
各一钱 桔梗二钱 竹叶五十片

【用法】水煎服。

【主治】春日感冒风寒，肺热逼胃，身热谵语。

72554 润肺饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】沙参 麦门冬 地骨皮 生地各
9克 当归尾6克

【功用】养阴润肺，以降虚火。

【主治】赤丝虬脉。肺阴不足，目干涩而痒，丝脉细而色淡者。

【方论选录】方中沙参、麦冬养阴滋肺，地骨清肺中虚热，生地凉血育阴，归尾活血通络，引血下行。

【加减】目中痒甚，加荆芥穗1.5克，以祛风止痒。

72555 润肺散

【方源】《博济》卷二。

【组成】甜葶苈一两(铤子内纸衬，慢火内

炒热) 肉桂一两 马兜铃二枚(大者，微炒)

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，煎至七分，放温，食后时时呷一口，可自早至午服尽，或临卧温水调一字，或半字亦可。

【主治】①《博济》：肺气壅滞，咳嗽不已。②《圣济总录》：壅滞咳嗽，面带浮肿。

72556 润肺散

【方源】《局方》卷十。

【异名】润肺汤(《圣济总录》卷一七五)、人参润肺散(《直指》卷八)。

【组成】贝母(去心，麸炒黄) 杏仁(汤浸，去皮尖及双仁者，焙干，麸炒) 各二两半 麻黄(去根节) 人参各二两 阿胶(炒令黄燥) 桔梗各半两 陈皮(去白) 一分 甘草(炙) 一两

【用法】上为粗末。每服一钱，水八分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】小儿肺气不利，咳嗽喘急，语声不出，痰涎壅塞，胸膈烦满，鼻塞清涕，咽喉干痛。

72557 润肺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参一两 陈皮 五味子 紫菀 干姜 杏仁各三分 桂 甘草各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，人生姜三片，大枣一枚，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肺感寒气，咳嗽气喘，痰涎不利，胸满背痛。

72558 润肺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】阿胶 杏仁各一两 糯米五合

【用法】上为细末。每服一钱，白汤调下，不拘时候。

【主治】肺虚咳嗽。

72559 润肺散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】瓜蒌实一枚(去子用瓢)

【用法】上为末，以寒食面和为饼子，炙黄为末。每服一钱，温水化乳糖送下，一日三

次。效乃止。

【主治】小儿隔热，咳嗽痰喘，甚者久不愈。

72560 润肺散

【方源】《医学纲目》卷二十六引朱丹溪方。

【组成】贝母一两 瓜蒌仁半两 青黛五钱

【用法】上为末，姜蜜调成膏。噙化。

【主治】①《医学纲目》引朱丹溪：咳嗽。②《东医宝鉴·杂病篇》：燥痰干嗽，劳嗽。

72561 润肺散

【方源】《玉机微义》卷五十。

【组成】麻黄二钱 甘草一钱 人参 知母各二钱半 陈皮一分 桔梗 阿胶（炒）百部各半钱

【用法】上为末。三岁儿每服一钱，水煎服。

【主治】小儿涎嗽不已，气急烦渴。

72562 润肺膏

【方源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】羊肺一具 干柿 真酥 绿豆粉杏仁（研碎）各一两 白蜜二两

【用法】上将羊肺洗净，次将五味药用水解薄打搅，令稠粘得所，灌入肺中，白水煮熟，如常服食。

【主治】劳久嗽，肺燥肺痿。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“羊肺汤”。

72563 润肺膏

【方源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】紫菀 杏仁（去皮尖） 款冬花 核桃肉各一两 麻黄 桔梗 诃子 细辛各五钱 枯矾一钱 清油半斤 生姜二两（取汁） 蜜一斤

【用法】先将油炼香熟，次入蜜又炼，去沫，却下末药，搅匀。每服二三匙，临卧白汤调服。

【主治】咳嗽痰喘。

72564 润河汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】黄耆一两 熟地一两 山茱萸四

钱 麦冬四钱 北五味一钱 白术五钱 防风五分 茯苓三钱 附子一分

【用法】水煎服。多服久服乃效。

【主治】肾水衰耗，不能上润于脑，则河车之路干涩而难行，故背脊骨痛。

【方论选录】此方补气有黄耆、白术，补水则有熟地，山茱，去湿则有茯苓，去风则有防风，引经则有附子，而又麦冬以生肾水之母，自然金胜生水，水足则河车之路不干，不干则润金滋骨可知，又何痛之作楚。既不痛矣，又何背之不直哉。

72565 润泽丸

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】大黄一两 黑牵牛（半生半熟）天仙子各一两

【用法】上为细末，用皂角子为丸。每服五七十丸，温水送下。

【主治】遍身热疮疥。

72566 润经汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归一钱 白芍 川芎 香附（醋制） 熟地（焙）八分 阿胶（蛤粉炒珠） 黄芩 蒲黄（炒） 侧柏叶（盐水炒） 白术（蜜炙）各六分 砂仁四分 炙甘草三分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】妇人二十七八岁，身体困倦，饮食少进，经水时下，淋漓不止，或成片，或流赤白黄水，面色青黄目眩，眼花，四肢痠痛，将成崩漏。

【加减】如咳嗽，加五味子、杏仁（去皮尖）各六分；气急，加半夏（制）、苏叶各四分；泄泻，加肉豆蔻（煨）、粟壳各四分；肚痛，加枳壳（麸炒）、玄胡索、干膝（炒令烟尽）各八分。

72567 润胃丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】石膏五钱 知母一钱 玄参一两 生地五钱 牛膝三钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】胃火沸腾，大便闭结，烦躁不宁，

口渴舌裂，两目赤突，汗出不止。

72568 润胃汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参五钱 麦冬二两 天花粉三钱 玄参一两 丹参一两 甘草一钱 山楂二十粒 神曲二钱

【用法】水煎服。

【主治】阳明虚火，烦躁口渴，面红耳赤，时索饮食，饮后仍渴，食后仍饥，两足乏力，不能起立，吐痰甚多。

72569 润秋汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】麦冬五钱 北五味一钱 人参一钱 甘草一钱 百合五钱 款冬花一钱 天花粉一钱 苏子一钱

【用法】水煎服。

【功用】润肺。

【主治】秋燥。

72570 润便汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】瓜蒌 30 克 元明粉 9 克（冲服）晚蚕沙 9 克 皂角子 9 克 火麻仁 15 克 麦冬 9 克 炒枳实 9 克 川厚朴 9 克 莱菔子 9 克（炒） 油当归身 15 克 油白芍 9 克 柏子仁 9 克

【功用】滋阴养血，理气润便。

【主治】便秘（习惯性便秘）。大便燥结，便下不畅。

【方论选录】方中瓜蒌、枳实、厚朴、莱菔子理气润肠；当归身、白芍养血润燥；火麻仁、柏子仁、麦冬滋阴润肠；蚕砂、皂角子润肠通便；元明粉软坚泻下。

72571 润胆汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍一两 当归一两 柴胡一钱 炒栀子二钱 玄参一两 天花粉三钱 菖蒲八分

【用法】水煎服。

【主治】少阳胆气不舒，风邪乘之，火不得散，双耳忽然肿痛，内流清水，久创变为脓

血，身发寒热，耳内如沸汤之响，或如蝉鸣。

72572 润胞汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】蜜 香油 酒各半盏

【用法】煎滚，温服。

【主治】临产浆破，胎涩产难。

72573 润胎饮

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】当归身一两 冬葵子三钱

【用法】水煎，去滓，入白蜜一匙，温服。

【主治】产难，脉濡涩者。

【方论选录】产母血亏经燥，无以润泽胞门，故产户干涩难产，不能遽下焉。当归身养血荣经，最能泽枯润燥；冬葵子滑胎利窍，足以易产催生。水煎入蜜，使血充经润，则产门滑利，而胎无枯涩之虞，何难产之足患哉。

72574 润神散

【方源】《三因》卷十。

【组成】人参 黄耆 甘草（炙） 桔梗 麦冬各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎七分，自汗，入淡竹叶、小麦同煎，不拘时服。

【主治】劳瘵憎寒，发热口干，咽燥，自汗，疲剧烦躁。

72575 润麻丸

《衡要》卷六。为《丹溪心法》卷五“润肠丸”之异名。见该条。

72576 润酒汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地二两 白术一两 巴戟天一两

【用法】水煎服。

【功用】大补肾水，兼补肾火。

【主治】阴已痿弱，肾水燥，见色不举，若勉强入房，耗竭其精，则大小便牵痛，数至圉而不得便，愈便则愈痛，愈痛则愈便。

【方论选录】此方用熟地以滋肾中之真阴，巴戟天以补肾中之真阳，虽补阳而仍是补阴之剂，则阳生而阴长，不至有强阳之害，二者补肾内之水火，而不为之通达于其间，则

肾气未必遽入于大小之肠也。加入白术以利其腰脐之气，则前后二阴，无不通达，何至有干燥之苦，数圉而不得便哉。

72577 润喉丸

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】甘草粉 300 克 硼砂 15 克 食盐 15 克 玄明粉 30 克 酸梅 750 克（去核）

【用法】共研为细末，以荸荠粉 250 克为糊制丸，每丸重 3 克。含服。

【主治】慢喉暗。语调嘶哑，日久不愈，喉部微痛不适，干嗽，喉痒，干咳痰少。

72578 润喉汤

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】熟地一两 山萸四钱 麦冬一两 生地三钱 桑白皮三钱 甘草一钱 贝母一钱 薏仁五钱

【用法】水煎服。先服化癰神丹六剂后，续服本方。

【主治】喉生癰疮，先痒后痛。

【加减】久则加肉桂一钱。

72579 润喉散

【方源】《丹溪治法心要》卷六。

【组成】桔梗二钱半 粉草一钱 紫河车四钱 香附子三钱 百药煎一钱半

【用法】上为细末。敷口内。

【主治】气郁夜热，咽干哽塞。

72580 润焦汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】地骨皮 半夏（汤洗七次） 柴胡（去苗） 泽泻各五两 茯苓 麦门冬（去心） 甘草（炙） 人参各一两

【用法】上锉散。每服四钱，水二盏，加生姜五片，竹茹如指大，煎七分，去滓，空心服。

【主治】三焦实热，目眦急痛，腰肋热，脊背连膻中烦闷，饮食未定，头面汗出，关格不通，不吐不下，或气逆不续，走哺不禁，或泄泻，溺涩，遗溺。

72581 润脾膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】生地黄汁一升 生麦门冬四两 生天门冬（切）一升 葳蕤四两 细辛 甘草 芍药 白术各二两 黄耆 升麻各三两 猪膏三升

【用法】上咬咀，诸药苦酒淹一宿，绵裹药，临煎下生地黄汁，与猪膏共煎取膏，水气尽，去滓。取细细含之。

【主治】脾热，唇焦枯无润。

72582 润滋汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 元参一两 当归一两 白芍一两 炒栀子三钱 麦冬一两 山药五钱

【用法】水煎服。

【主治】脾胃干枯，燥极生风，手足牵制者。

【方论选录】此方用人参、山药生胃以健脾，归芍平肝以生血，麦冬以生肺气，元参、炒栀子清火去风兼解燥。内热既除，外症牵掣自愈，死症可望生也。

72583 润输汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】黄耆五钱 当归一两 川芎五钱 升麻五分 红花五分 麦冬 肉苁蓉各五钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚不能推送，大肠闭结不通，饮食无碍，并无火症之见，亦无后重之机，有至一月不便者。

72584 润稿汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地 麦冬 葳蕤各一两 甘草五分 百合五钱 贝母一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴虚枯槁，肺气困乏，嗑塞喉干，咯痰动嗽。

72585 润膈丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】阿胶（炒燥） 熟干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮） 山芋 五味子各一两 麦门冬（去心，焙） 贝母（去心，炒） 百部 柏子仁（炒，别研） 丹参 茯神（去

木)各半两 人参 远志(去心) 防风(去叉)各一两 杜仲(去粗皮,炙,锉)半两

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如弹子大。每服一丸,水一盞化破,煎至六分,时时温呷。

【主治】积年咳嗽上气,涎唾稠粘,五心烦躁,不思饮食,心肺留热。

72586 润膈丸

《普济方》卷一六一。为《简易方》引《必用方》(见《医方类聚》卷八十五)“大阿胶丸”之异名。见该条。

72587 润燥丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】生地 熟地 当归 阿胶各一两 麻仁 杏仁各五钱 枳壳三钱

【用法】蜜丸服。

【主治】老人便秘。

72588 润燥丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】熟地二两 白芍一两 柴胡五分 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【主治】素多内热,肾水不足以养肝,肝木太燥,生风颠仆,目不识人,左手不仁。

72589 润燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】当归润燥汤(《东垣试效方》卷七)。

【组成】升麻 生地黄各二钱 熟地黄 当归梢 生甘草 大黄(煨) 桃仁泥 麻仁各一钱 红花五分

【用法】上除桃仁、麻仁另研如泥外,锉如麻豆大,都作一服。水二盞,入桃仁、麻仁泥,煎至一盞,去滓,空心稍热服。

【主治】大便燥结。

72590 润燥汤

《东垣试效方》卷三。为《兰室秘藏》卷上“当归润燥汤”之异名。见该条。

72591 润燥汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 甘草各五分 归身梢 生地 枳壳各一钱 火麻子(去壳,捶碎)二钱 桃仁泥二钱 槟榔五分(取汁)

【用法】先将上六味煎,后入桃仁泥及槟榔汁调服。

【主治】产后气血俱虚,大便闭涩不通。

72592 润燥汤

《摄生众妙方》卷七。为《杨氏家藏方》卷四“润肠汤”之异名。见该条。

72593 润燥汤

【方源】《点点经》卷一。

【异名】桃杏散、开滞散。

【组成】桃仁 杏仁 大黄各二钱

【用法】共研末。煎一碗,蜜兑服。

【主治】大便不通,小便自利;及酒疾湿毒成淋,气凝血枯,小便不通,小腹作痛,肿结肾囊。

72594 润燥汤

《准绳·类方》卷六。为《古今医鉴》卷八“通幽汤”之异名。见该条。

72595 润燥汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】生地 山梔 升麻 柴胡 石膏 生姜

【主治】瘟疫燥甚者。

【加减】自汗,加桂枝;无汗,加苏叶、干葛;虚者,加麦门冬;渴,加天花粉;咳嗽,加杏仁。

72596 润燥汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】凉膈散去芒消、大黄,加当归、白芍、生地、荆芥、鼠粘子。

【主治】痘疹过用丁、桂热药,咽痛,烦躁,大便秘结。

72597 润燥汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归二三钱 熟地三五钱 生地二钱 威参八钱 肉苁蓉三钱 枸杞一钱半 牛膝一钱半 小茴(盐炒)三分 麦冬一钱

【用法】水煎,空心服。

【主治】伤寒血虚而燥，二便艰涩。

72598 润燥汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】当归二钱 熟地（再用姜汁入瓷器内炒干）二钱 麦冬（去心，炒）一钱 陈皮（去白）八分 白豆蔻（去壳，炒，研）八分 肉苁蓉一钱半 威参四钱

【用法】水煎，加牛乳、白蜜、竹沥、姜汁各四五匙调合，每用半杯，频频服之，不得间断。或食稀粥或猪肉汤、羊肉汤。

【功用】养血润燥。

【主治】噎塞而食不下，火燥而津液枯者。

【宜忌】忌食鸡鸭、炙煨之类。

【加减】服药而有气不足者，加人参，或加沙参、黄耆之类，但由轻而重，不得顿加。

72599 润燥饮

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬一两 熟地一两 苏子一钱 白芥子二钱 甘草一钱 桔梗三钱 天门冬三钱 山茱萸五钱 北五味五分 人参一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴虚枯槁，肺气困乏，噎塞喉干，咯痰动嗽。

【方论选录】此方用二冬以润肺，用熟地、茱萸以补肾，肺肾相通；加人参、五味以益气，气旺而津液尤易生也；又恐过于补肾，而不上走益肺，故加桔梗升提之味，使益肺多于益肾；尚虑用参以助燥，更入苏子、甘草调和于上焦之间，同白芥子以消膈膜之痰，又不动火以增燥，亦何致有痰嗽之患哉。

72600 润燥饮

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】麦门冬一斤（去心）

【用法】蒸晒为末。每服二钱，酒磨犀角一钱调下。

【主治】乳汁不出，脉涩洪者。

【方论选录】产妇素禀阳脏燥热之气伤于阳明，不能化血液为乳，故乳汁不出焉。麦门冬清心润燥，以滋阳明之津液，犀角尖清心降

火，以全阳明之血气。麦冬为末，犀角酒磨，空心饮之，使心火降而燥热化，则阳明之津液自充，而乳汁自化，何有不乳之患哉。

72601 润血饮子

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】阿胶一两 竹沥半盏 人乳半盏 蜜五匙

【用法】水一钟，入阿胶化开，煎至七分，加竹沥、人乳、蜜，徐徐服之。

【主治】血槁成噎。

72602 润肺膏丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引《王氏手集》。

【组成】水蓼 桑针 覆盆子 枸杞子各半两 皂儿（炮） 杜茴香 生姜 甘草各一两 京三棱（炮） 胡桃十个

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作八十丸。细嚼，温熟水送下，儿小白汤化下。

【主治】小儿寒壅咳嗽。

72603 润木安魂汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】当归一两 白芍一两 甘菊花三钱 北五味五分 茯苓五钱 白术五钱 炒栀子一钱 金樱子三钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】肝血燥，怒气伤肝，忽然梦遗，久而不止，凡增烦恼，泄精更多，两胁多闷，火易上升于头目，饮食倦怠，发躁发胀。

72604 润肌皮肤膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大风子仁十六两 大麻子仁十六两 潮脑十六两 核桃仁十六两 京红粉十六两

【用法】将大风子仁、大麻子仁、核桃仁研成细泥，红粉另研；用腊七两，香油十三两五钱，松香一两。先用松香熬油，蜡溶化后，开起化净，下入大风子仁、潮脑等；其后京红粉冷后再下，混合搅匀，装瓶，重一两。用细布包药，每瓶分三、四次，擦患处，每日二三次，将药液擦入毛孔内，至皮肤觉痛时

即药力发挥作用。擦药三五日，如肉皮不疼，去布使药擦，如肉皮疼，即停止用药，过一星期再用。

【功用】消癍，祛湿，润皮肤。

【主治】酒渣鼻，蝴蝶脸，面部粉刺，白癍风，土癍，汗癍，脚气，骑马癍，风癍，钱癍。

72605 润阴坚骨汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】元参一两 熟地二两 麦冬一两 牛膝二钱

【用法】水煎服。

【主治】痿病。阳明胃火，铄尽肾水，骨中空虚，久卧床席，不能辙起。

【方论选录】此方之妙，全不在治阳明，而直治肾经以补其匮乏。肾水一生，则胃火自然息焰，况又有麦冬以清肺气，牛膝以坚膝胫。故以此方长治之，则痿废之状可免。

72606 润肝安胎汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参 茯苓 扁豆 山药各三钱 半夏 熟地 白术各五钱 川芎 麦冬 丹皮 苏子 神曲各二钱 白豆蔻一粒 陈皮三分

【用法】水煎服。

【主治】妇人肝血太躁，怀妊之后，恶心呕吐，思酸解渴，见食则憎，困倦欲卧。

72607 润肠五仁丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桃仁三两 杏仁二两（去皮） 松子仁三两 郁李仁三两 柏子仁三两

【用法】上为末，蜜为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】产后血瘀便秘，脉沉涩滞者。

【方论选录】产后血瘀，气逆不能施化津液而肠胃枯涩，大便燥结不通。桃仁破瘀血以润燥，杏仁降逆气以润肠，松子仁润胃燥以解郁，柏子仁养心神以泽枯，郁李仁润肠散结以宣通也。蜜丸以润之，饮下以和之，使

瘀化气平，则津液施化而胃肠无枯涩之虞，何秘结之足患乎？

72608 润肠化痰汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】当归三钱 生地一钱半 干漆（炒烟尽）二钱 大黄（酒煨）一钱半 陈皮一钱 枳壳（炒）一钱 威参四钱 红花（酒炒）七分 桃仁（去皮尖）一钱

【用法】水煎，入酒、韭汁服。

【主治】死血在膈，大便燥。

72609 润肠降火汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】当归二钱 大云 诃子 槟榔 厚朴 黄柏 桔梗 天冬 麦冬各一钱半 腹皮 陈皮 黄芩各一钱 甘草三分

【用法】竹茹一团，葱三根为引。

【主治】酒伤开膈之后，大便秘，小便胀，饮食稍进，仍有痰涎，口干胸膈不利。

72610 润肠理气汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】苡蓉（洗去甲）二钱 当归 生地 小茴 酒军各一钱 李仁 腹皮 香附 厚朴 槟榔 车前各一钱半 甘草八分 木香三分

【用法】葱白为引。

【主治】大便不通，少腹膨胀作痛，如石坚硬作痛。

72611 润肠橘香丸

《御药院方》卷七。为《鸡峰》卷十三“橘皮杏仁丸”之异名。见该条。

72612 润肤生血饮

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】五味子九粒 天门冬一钱半 麦冬一钱 熟地黄一钱 生地黄一钱 当归一钱 黄耆一钱 黄芩（酒洗）一钱 栝楼仁 桃仁各五分 红花（酒洗）一分 升麻二分

【用法】水煎服。

【主治】燥症。血虚，津液涸竭，肌肤皱揭，毛发焦枯，手足干燥，搔之屑起，血出痛楚，

指甲厚反，不能搔痒；或燥金用事，久晴不雨为燥者。

【加减】大便燥，加麻仁、郁李仁。

72613 润肺止嗽丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】天冬五钱 黄芩五钱 黄耆三钱 知母三钱 杏仁（去皮、炒）二钱 贝母三钱 青皮（炒）五钱 橘皮三钱 苏子（炒）三钱 生地三钱 桑皮五钱 淡竹叶三钱 紫菀五钱 天花粉五钱 冬花五钱 瓜蒌仁五钱 枣仁（炒）三钱 五味子（炙）五钱 桔梗二钱 前胡二钱 甘草（炙）二钱

【用法】上共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重二钱。每服二丸，日服二次，温开水送下。

【功用】润肺定喘，止嗽化痰。

【主治】肺气虚损，咳嗽喘急，痰涎壅盛，久嗽声哑，逢节必犯。

72614 润肺止嗽膏

【方源】《痘疹一贯》卷六。

【组成】清油一两 蜜二两 生姜汁（自然汁）半两 紫菀 麻黄 杏仁 细辛 桔梗 诃子 桔矾各二钱

【用法】上除矾、蜜、姜汁外，将群药用水三碗，煎一碗，再用水二碗，煎六分；将药滓又加水一碗半，煎四分，共合二碗药汁熬成一碗，入矾、蜜、姜汁、慢火煎熬漆黑，则成膏子。临卧每服三五匙。六七岁小儿每服二三匙。

【主治】咳嗽。

72615 润肺化痰汤

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】桔梗三钱 桑白皮三钱 炙甘草二钱 黄芩二钱 玄参五钱 麦冬三钱 关门冬三钱 贝母二钱 陈皮五分 生地三钱 升麻一钱

【用法】水二碗，煎八分，食后服。数剂自消。

【主治】赤炎风疮，遍身有赤点子。

【加减】倘左寸肺旺大，乃心火也，本方去

黄芩，加黄连一钱。

72616 润肺化痰膏

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十二。

【组成】大白梨汁一斤 白茯苓四两（乳制，晒干，研极细末） 麦冬四两（熬汁） 川蜜一斤 川贝母二两（去心，研末） 核桃肉四两（去皮净，捣烂）

【用法】先将梨汁熬熟，次将蜜炼熟，入药在内，再熬成膏。如痰有血，入童便四两在内，每早空心白汤调半茶钟服。

【主治】小儿哮喘。

72617 润肺百花膏

《全国中药成药处方集》（武汉方）。即《济生》卷二“百花丸”改为膏剂。见该条。

72618 润肺扶气汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】茯苓 人参 白术 甘草 麦门冬 黄芩各一钱 桔梗 百合 薏苡仁各八分 北五味九粒 当归 生地各一钱二分

【用法】水煎，加藕汁半钟，食后服。

【主治】痿症，肺枯气弱。

72619 润肺和肝膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参五钱 生薏米一两 麦冬八钱 橘红四钱 桑叶八钱 枇杷叶八钱（炙，包煎） 杭芍六钱（生） 石斛八钱（金） 甘草三钱 炒枳壳四钱

【用法】共以水煎透，去滓再熬浓汁，少兑蜜炼为膏。每服三钱，白开水送下。

【功用】止嗽化痰理肺。

【主治】肝肺气道欠调，时作咳嗽。

72620 润肺降气汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】沙参 萎仁各四钱 桑皮 苏子各二钱 杏仁三钱 旋复花一钱（绢包） 橘红一钱 郁金二钱 合欢花二钱 鲜姜皮五分

【主治】肺燥。肺受燥凉，咳而微喘，气郁不下。

72621 润肺除嗽饮

【方源】《医学正传》卷二。

【组成】人参 杏仁 生甘草 薄荷各三分 五味子九粒 款冬花 紫菀茸 麻黄 陈皮(去白) 石膏(煨) 桔梗 半夏 桑白皮(蜜炒) 枳壳(麸炒) 乌梅 栗壳(去瓢,蜜炙)各等分

【用法】上细切。加生姜三片,细茶一撮,水一盞半,煎至一盞服。

【主治】远年咳嗽。

72622 润肺通窍汤

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】茯苓 陈皮 当归 白术 威灵 杏仁各六分 肉桂 北芥子 半夏 莱菔子各三分 干姜 苏子各二分

【主治】体虚,肺胀无汗,白面肌瘦,但气急鼻煽。

72623 润疮生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】槟榔一两 白芍药一两 丁香一两 细辛一两 黄连一两 川芎莠一两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁) 桂心一两 天南星一两 牛膝一两(去苗) 羌活一两 附子一两(生,去皮脐) 藁木一两 防风一两(去芦头) 木鳖子一两(去壳) 当归一两 木香一两 白芷一两 乳香一两 白胶香一两 麝香半两(细研) 蜡四两 羊脂一斤 野驼脂一斤 猪脂一斤

【用法】上药除脂、蜡、麝香外,都细锉,以米醋半升拌令匀,浸一宿,先取三般脂于铛内文火煎沸,即下诸药,煎半日,候白芷色赤漉出,下蜡令消,以绵滤过,瓷盒盛,调入麝香令匀。看患处大小,涂贴于上,日二度换之。

【主治】一切痈疽发背,肌肉不生,干急疼痛。

72624 润燥五仁丸

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】郁李仁 火麻仁 柏子仁 瓜蒌

仁 桃仁各一两 生地黄 熟地黄各二两 当归身 防风一两五钱 山药一两五钱 淮膝一两 陈皮一两五钱 远志八钱 独活八钱

【主治】燥证秘结。

72625 润燥至神汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】熟地 元参各九钱 火麻子一钱 升麻二钱 牛乳一碗

【用法】水二钟,煎六分,将牛乳同调一碗服之。

【主治】肺燥,大便闭结。

72626 润燥安胎汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 益母草二钱 黄芩一钱 麦冬五钱 生地三钱 阿胶二钱 五味子二分

【用法】水煎服。

【功用】补肾添精,兼补肺清热。

【主治】妊妇怀妊至三四月,水虚,自觉口干舌燥,咽喉微痛,无津以润,以致胎动不安,甚则血流如经水。

72627 润燥肺经汤

【方源】《点点经》卷三。

【组成】连翘 生地 木通 山梔 腹皮 当归 元胡 肥知母 瓜蒌仁(去净油) 淡竹叶(去尖) 甘草

【用法】灯心、熟石膏为引。先服六合定中丸,随服此汤。

【主治】肌肉消瘦,作渴,胸膈烦躁,时烧时退。

72628 润燥泻肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】玉竹四钱 葵皮三钱 桑皮三钱 沙参四钱 麦冬二钱 黄芩一钱 贝母二钱 杏仁三钱 苡仁四钱

【用法】梨汁半杯冲服。

【主治】肺火自本经而发者,缘燥气相逼,清肃之令不能下行,故肺气焦满,微喘而咳,

烦渴欲饮，鼻端微红，肌肤作痒。

72629 润燥破痰汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】白芍一两 香附一钱 青黛五分 天花粉二钱 白芥子二钱 玄参五钱 茯苓三钱 山药三钱

【用法】水煎服。

【功用】疏肝气，补肝血，兼补肾消痰。

【主治】肝气甚郁，老痰结成粘块，凝滞喉咙之间欲咽不下，欲吐不能。

【备考】老痰最难速化，此方必须多用，但不可责其近功耳。

72630 润燥涩精汤

【方源】《证因方论集要》卷二。

【组成】熟地 白芍(炒) 菟丝子 龙骨 山药 麦冬 玉竹 龟板胶

【主治】遗精，不时悬饥，畏闻人声，烦躁昏倦，溺时作痛。

【方论选录】熟地以滋肾阴，山药以补脾阴，麦冬以养肺阴，白芍以敛肝阴，菟丝温阴中之阳，玉竹润气分之燥，龙骨性涩以固精窍，龟胶质厚以遏阴火。

72631 润肺豁痰宁嗽汤

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】陈皮五分 半夏(姜制)五分 白茯苓四分 甘草(炙)三分 黄柏(酒炒)五分 黄芩(酒洗)三分 知母(酒炒)五分 贝母(去心)五分 天冬(去心)三分 麦冬(去心)三分 紫菀(酒洗)三分 款冬花(酒洗)三分 桔梗三分 熟地黄五分 当归三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎，温服。

【主治】咳嗽。

浣

72632 浣肌散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】枫香(别研) 荆芥穗各一两 大

黄 苦参 当归 升麻 白蒺藜 枳壳(去瓢，炒)各二两 射干一两半

【用法】上同焙干，碾为细末，入枫香和匀。每用五钱，水三升，同煎三、五沸，通手淋洗。

【主治】①《杨氏家藏方》：风热客搏，皮肤搔痒，隐疹痞瘤，疮疡疥癣，抓之出水，浸淫不止，或风气游走暴肿。②《中医皮肤病学简编》：荨麻疹。

【备考】方中枫香，《普济方》引作“槐花”。

浸

72633 浸汤

【方源】《千金翼》卷二十一。

【组成】桃 柳各十斤 苡苕 藜芦 乌头(去皮) 茵芋 丹参 楮叶 白羊羴 柏叶 槲皮 大黄 鬼扇 桑甲 藁本 枣叶 松叶 食茱萸各二斤 盐五升

【用法】上细锉，纳大釜中，以水七斗，煎取汁四斗，去滓，纳槽中。令病者卧浸，旦至食时便出，日中时复入，日西复出，其汤常欲得暖，以自消息，出汤即用十种粉粉之，不得使风入，被覆温卧，使身汗流，病即愈。

【主治】风冷因湿，致面疱起，身体顽痹，不觉痛痒，或目圆失光，或言音粗重，或瞋蒙多睡，或从腰宽，或以足肿，眉须堕落。

【备考】十种粉：蒹藻、艾叶、瓜根、虎掌各三斤，菟丝、木防己、狐骨各五两，矾石二两，大盐一升，马牙消三两，上为散。出汤，用粉粉身，使风不入。风多者可用。诸癰病生疮，一切诸恶疮，只用粉粉之。

72634 浸酒

【方源】《千金》卷四。

【异名】浸药酒(《圣惠》卷七十二)。

【组成】大麻子三升 菴蒿子二升 桃仁一升 桂心 灶屋焙煤各四两 土瓜根 射干各六两 牛膝八两

【用法】上咬咀，以清酒三升，绢袋盛药，浸五宿。每服一盏，送下干漆丸；或单服之

亦佳。

【主治】月经不通，百疗不愈者。

72635 浸酒

【方源】《圣惠》卷二十一。

【异名】浸药酒(《永乐大典》卷一三八七九引《十便良方》)。

【组成】虎胫骨一斤(涂酥，炙令黄) 侧子五两(炮裂，去皮脐) 当归五两(锉，微炒)

【用法】上细锉，以生绢袋盛，以清酒一斗五升浸之，春、夏三日，秋、冬七日。每次暖一小盏服之，不耐酒人，随性饮之，常令醺醺。

【主治】风腰脚疼痛冷痹。

72636 浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】杜仲八两(去皱皮，炙微黄色) 石南三两 羌活三两 附子三两(炮裂，去皮脐) 牛膝三两(去苗) 防风二两(去芦头)

【用法】上细锉，以生绢袋盛，用好酒二斗，于瓷瓶中浸，七日后开取。每饮一盏，日三四度。

【主治】诸风，腰脚疼痛。

72637 浸酒

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】海藻一两(洗去咸味)

【用法】上细锉，以清酒四升，浸两宿，滤去滓。每取半盏，细细含咽，不计时候服之。以愈为度。

【主治】瘰气，咽喉噎塞妨闷。

72638 浸酒

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】虎胫骨八两(炙令黄，捶碎如棋子) 丹参 天麻各一大两 桂 牛膝 菝葜 人参各一大两 乌头二升(炒令得所) 羚羊角 杜仲 芎藭各六分 薏苡仁八分 南椒半两(择去闭口者)

【用法】上细锉，吹去末，生绢袋宽盛，沉

于三斗酒中，浸令没，密封经七日开。空腹量性饮，恒令微有酒气。取一盏，添一盏，药味薄则换。

【功用】益血，添气力。

【主治】诸头目腰脚筋骨风。

72639 浸酒

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】老公须根 毛里金钗根 狗骨子根 大叶毛吹曲

【用法】上浸酒。暖服，不可煎。

【主治】马瘕。

72640 浸毒散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】毛藤子 石楠藤 铁菱角 穿山蜈蚣 背子蜈蚣 赤麻菱 金脑香 梭婆子根 飞天蜈蚣 赤梗过路蜈蚣

【用法】上水煎，入醋少许，和暖浸洗。

【主治】蛇头子及一切蝮蛇瘡。

72641 浸药酒

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】紫苏三两 牛膝三两 丹参三两 生姜六两 生地黄三升 香豉三升 紫菀三两 防风四两 橘皮三两 大麻仁一升五合

【用法】上细切，绢袋盛，以清酒二斗五升，浸三宿后开。每服温一盏，用下桃仁丸，酒更添。

【主治】痲气，漫心胀满不下食，发即更胀连乳满，头面闭闷，咳气急者。

【宜忌】忌茺萸。

72642 浸药酒

《圣惠》卷七十二。为《千金》卷四“浸酒”之异名。见该条。

72643 浸药酒

《永乐大典》卷一三八七九引《十便良方》。为《圣惠》卷二十一“浸酒”之异名。见该条。

72644 漫洗药

【方源】《准绳·疡医》卷四。

【组成】赤梗 红花 蜈蚣

【用法】水煎，浸洗之。

【主治】足心痛。

72645 浸酒药

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】常山(炒) 苍术(浸,炒)各一两 草果 青皮 陈皮 贝母 甘草各五分 鳖甲一片(炙)

【用法】上锉碎,用老酒半瓯,入瓶中浸。每次服一二盏。

【主治】久疟,诸药不效者。

【宜忌】忌恼怒、劳佚、冷食。

【加减】久疟,加人参。

72646 浸黄酒

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参(拣肥大者,去芦)五钱 白术(去梗,泔浸,土炒)一两二钱 茯苓(竖白者,去皮,为末,水澄去浮,晒干)八钱 大甘草(炙)五钱 当归(全用,酒浸,姜制)六钱 生熟地黄(拣,酒浸)各五钱 白芍(酒炒)五钱 牛膝(去苗,酒浸,焙)八钱 杜仲(姜汁炒,净)六钱 生姜(洗,切)五钱 黄柏(厚者,酒洗,炒)一两 知母(南者,去皮毛,酒炒)八钱 破故纸(盐、酒炒)三钱 甘州枸杞(去萼)一两 茅山苍术(浸,炒)六钱 山药(大者,焙)五钱 琐阳(酥炙)七钱(如无,以苁蓉代) 山茱萸(去核)七钱 石菖蒲(去毛,焙)五钱 远志(甘草水煮,去心)五钱 陈皮(去白,盐水浸,焙)七钱 莲肉(去心,焙)八钱 鹿角霜五钱(如无,加菟丝子) 天门冬(去心)五钱 麦门冬(去心)五钱

【用法】上各制净,各称足,冬用黄酒,夏用烧酒五十壶,坛内用生绢袋装药系口,入坛中,春浸十四日,夏浸七日,秋浸十四日,冬浸二十一日出。日饮数杯,药滓焙干,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服七八十丸,酒送下。可以常服。

【功用】补气血,理脾胃,滋肾水,强腰脚,益精神,开心明目。

【主治】虚损。

72647 浸熨汤

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】木通一两 生姜一两 葱白七茎 陈橘皮一两 川椒半两

【用法】上都细锉。以水二大碗,煎至七沸,去滓,倾入盆内。看冷暖,坐儿于盆中浸之;将滓于儿脐下熨之。立通。

【主治】小儿小便不通。

72648 浸虎骨酒

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】防风二两(拣,去芦) 秦艽二两 草薢二两 羌活二两 虎骨二两(酥炙) 川牛夕二两(去芦) 败龟壳(捶碎) 晚蚕沙二两(炒黄色) 枸杞子五两 苍耳四两(炒黄色,捶碎) 川乌二两(炮,去皮脐) 松节二两 当归二两

【用法】上细锉碎,用无灰酒一斗,入药浸在坛内,牢固密封,俟十四日,开坛取酒。每日早、午、夜三时各取酒一盞服之,勿令药力断绝;候病痊时,将药晒干为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心用好酒送下,间服小续命汤佐之。

【主治】一切风疾。

【临床举例】风疾 丞相史史深,节宣不谨,遂染风邪,手足拘挛,不堪跪拜,病越十年。饮此酒及一升,便手可梳头,二升手足屈伸有力,三升语言舒畅,行履如故,四升四肢通暖,五升百节俱遂,举步如飞。

72649 浸脚矾石汤

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】白矾石二两

【用法】上以浆一斗五升,煎三五沸浸脚良。用清水亦可。

【主治】脚气冲心。

濯

72650 濯化丹

【方源】《眼科六经法要》。

【组成】赤石脂十两 甘草六两
上共研极细末。然后用：

薄荷一两 僵蚕一两 麻黄一两 北细辛
五钱 蔓荆子一两 紫草七钱 龙胆草四钱
黄连一两 芦荟一钱 草乌四钱

水煎，去滓，以浸石脂、甘石，绵纸封贮
器口，日晒夜露，干时再加：

空青石一两 珊瑚三钱 琥珀二钱 上血
竭一钱 珍珠五分（需用未经穿过孔者，还
须塞入白豆腐内，加水煮2小时，方能取出
合药）

【用法】共研极细腻。每晚取少许点于障
上。

【主治】目外障。

【加减】翳膜厚者，可加硃砂少许，不可多
加。

72651 涩肠丸

【方源】《玉机微义》卷五十。

【组成】龙骨 海螵蛸 诃子（炮，去核）
各等分

【用法】上为末，糊为丸，如小豆大。每服
三十丸，米汤送下。

【主治】小儿下痢赤白，后重频并。

72652 涩肠散

【方源】《婴童百问》卷八。

【组成】诃子（炮） 赤石脂 龙骨

【用法】上为末。用腊茶少许和药掺肠头
上，绢帛揉入；治痢，米汤调。

【主治】小儿久痢，大肠脱出不收。

72653 涩精金锁丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】韭子一斤（酒浸三宿，滤出焙干，
杵为末）

【用法】上用酒糊为丸，如梧桐子大，朱砂
为衣。每服二十丸，空心酒送下。

【功用】涩精。

72654 涩翳七宝丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】珍珠五钱 琥珀二两 石决明二
两 龙脑一分 羌蔚子一两 人参一两 熊
胆一两

【用法】为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服一钱，食前茶清送下。先用涩翳还睛散，
后用此方。

【功用】消翳。

【主治】涩翳证。瞳神内微赤如凝脂之色，
瞳神端正，渐渐昏朦，时复涩痛而无泪出，其
翳无定，或聚或开。

72655 涩翳还睛散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】车前子一钱半 防风一钱 桔梗
一钱 元参一钱 五味子五分 知母二钱
黄芩一钱 细茶二钱半 羌蔚子一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，
食前去滓温服。后用七宝丸。

【主治】涩翳证。瞳神内微赤如凝脂之色，
瞳神端正，渐渐昏朦，时复涩痛而无泪出，其
翳无定，或聚或开。

涌

72656 涌泉汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】王不留行（炒）三钱 川山甲
（炒）三钱 天花粉 归身各一钱五分 木通
甘草各一钱

【用法】用健猪前蹄有七孔者一只，煮烂取
汁三碗，煎药至半碗，二次顿热，食远服之。
外用旧木梳，火烤热，梳乳上七房，次第梳
之。其乳若涌泉。

【主治】乳汁不下。

72657 涌泉汤

【方源】《胎产良方》。

【组成】漏芦一钱 瞿麦八分 茯苓八分
当归一钱 川芎一钱 三棱五分 生地八分
白芍（炒）六分 泽泻六分 香附六分 甘
草四分

【用法】黄酒为引，水煎服。

【主治】乳汁缺少。

【临证举例】乳汁还通 赵某，女，27岁，已婚。1983年元月17日，生子四天无乳；两乳胀满作痛，情志郁闷不舒，有低热，善太息。证属精神郁闷，气滞不宣，脉络阻塞，乳胀而不得出。宜疏肝理气通乳。方用涌泉汤加味：漏芦12克，瞿麦9克，茯苓9克，川芎6克，三棱4.5克，生地9克，炒白芍6克，泽泻6克，香附6克，王不留行12克，青皮6克，山甲3克，蒲公英9克，两剂，每日一剂。服药后，乳即下，情志愉快，纳食增加。

72658 涌泉散

【方源】方出《圣惠》卷八十一，名见《妇人良方》卷二十三。

【组成】穿山甲（涂醋，炙令黄色）。

【用法】上为末，每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】产后乳汁少及不下。

72659 涌泉散

【方源】《产育宝庆》卷下。

【组成】川山甲半两（醋浸，炒令轻空） 脂麻（退皮）一合 胡桃二个（敲去壳，汤浸，去皮） 肉豆蔻（面包，火内炮令面焦，去面不用）

【功用】下乳。

【备考】《普济方》本方用法：除胡桃仁、芝麻外，二味为细末，再入胡桃仁、芝麻一同捣为膏。每服一匙，好酒调下。合面睡一时，后用猪蹄汤投之。又用木梳二个梳两乳千余遍。其乳自下如涌泉。隔日再进一服。

72660 涌泉散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】防风一两 葱白二十茎

【用法】用无灰酒一升，同煎至八分，时时服，一日尽之。

【功用】下奶。

72661 涌泉散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】漏芦 百部 麦门冬（炒，去心） 没药 乳香各一分（研）

【用法】上为细末。每服一钱，热酒调下。右手梳左乳四十九度，左手梳右乳四十九度。

【功用】下奶。

72662 涌泉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】白药子二两 栝楼根二两 蛇蜕皮半两（炙黄） 漏芦（去苗）半两

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】气血凝滞，乳脉不行。

72663 涌泉散

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】瞿麦穗 麦门冬（去心） 王不留行 紧龙骨 穿山甲（炮黄）各等分

【用法】上为末。每服一钱，食前热酒调下，后食猪蹄羹少许，一日三次。投药后，用木梳左右乳上梳三十来梳。

【主治】①《卫生宝鉴》：妇人因气，奶汁绝少。②《东医宝鉴·外形篇》：乳汁不行，胀痛。

72664 涌泉散

【方源】《普济方》卷三四六引《德生堂方》。

【组成】王不留行半两 木香 苍术各二钱半 白芍药一钱半 当归二钱半 陈皮一钱 川山甲（炮）一钱半

【用法】上为细末。每服二三钱，食后、临卧好酒调下。次日用肥猪肉煮，用米浸搗粉，下猪肉汁内作羹食之。

【主治】产后无乳。

72665 涌泉散

【方源】《校注妇人良方》卷二十三。

【组成】王不留行 瞿麦 麦门冬 龙骨各二钱

【用法】用猪蹄汁一碗，酒一杯，煎服。以木梳于乳上梳下。

【功用】下乳。

【宜忌】忌食姜、椒、辛辣饮食。

72666 涌泉散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】王不留行 白丁香 漏芦 天花粉 僵蚕各等分

【用法】上为末。猪悬蹄煮汁调下。

【主治】气滞少乳，乳胀痛，及乳痛肿。

72667 涌泉散

【方源】《便览》卷四。

【组成】瞿麦穗一钱 柴胡一钱 天花粉一钱 桔梗八分 青皮 白芷 木通 当归 赤芍 连翘 甘草各五分 皂角三分

【用法】煮猪腿精肉清汁二钟，加姜、葱，煎服。

【主治】因气恼，乳汁少。

72668 涌泉散

【方源】《回春》卷六。

【异名】舟制涌泉散(《医略六书》卷三十)。

【组成】穿山甲(炒) 白僵蚕 肉豆蔻(面包煨熟)各四钱 皂角五钱 胡桃仁(去皮)四两 芝麻(炒)半斤

【用法】上为末。每服不拘多少，温酒调下。先用木梳频刮乳房，后服药。

【主治】乳汁不通，不问虚盛。

72669 涌泉散

【方源】《宋氏女科》。

【组成】王不留行 天花粉 甘草各三钱 当归 川山甲(醋炙)各五钱

【用法】上为末。每服三钱，猪蹄汤或熟酒调下。

【主治】乳汁不通。

72670 涌泉散

【方源】《寿世保元》卷七。

【异名】秘传涌泉散(《济阴纲目》卷十四)。

【组成】王不留行(酒浸) 白丁香 漏芦 天花粉 白僵蚕(炒) 穿山甲(炒黄色)各五钱

【用法】上为细末。每服三钱，食后以猪蹄汤调下。

【主治】乳妇思虑滞结，乳汁不行。

72671 涌泉散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 生黄耆 通草各二钱 瞿麦 木通 川山甲 王不留行各一钱半

【用法】水煎服。另用雄猪蹄一对，酒煮，去浮油，连汤饮。

【功用】催乳。

72672 涌泉膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】斑蝥(去头足翅，焙，为末)

【用法】揉和蒜膏，如小豆许，点在膏药中，准疮口处贴之。少顷，脓出即去药。或用绿矾、直雀屎少许，用饼药调一点，敷疮头软处，亦破，须四围涂药护之。

【主治】痈疽软而疮头不破，或已破而疮头肿结无脓。

72673 涌泉膏

【方源】《理渝》。

【组成】海龙或海马一对 附子一两 零陵香 穿山甲 琐阳各三钱

【用法】油熬，黄丹收，槐枝搅，下阳起石、冬虫夏草末，高丽参，川椒、丁香，搅匀。贴足心。徒起泡无益也。

【主治】命门火衰，真阳上浮者。

【宜忌】少年勿用。

72674 涌泉膏

【方源】《理渝》。

【组成】海马 鹿茸 人参 大茴 苁蓉 熟地 地龙

【用法】麻油熬，黄丹收。沉香，肉桂掺贴之。

【主治】命门火衰，真阳上浮者。

72675 涌涎汤

【方源】《活人方》卷一。

【组成】人参芦一钱 桔梗二钱 牙皂(炙，去皮)五分

【用法】水煎，加盐三钱五分，乘热一气服，服后以鹅翎探吐，未尽，再服。

【主治】中风，胸次痰结，痞满不和。

72676 涌铁膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】粪鼠头一个 蜈蚣虫十九个 土消虫十个 芫青 马肉中蛆(焙) 酱内蛆(焙) 蛻螂 巴豆 信 硃砂 夏枯草 磁石 黄丹 苏木 地骨皮各一两 石脑油三两 蒿柴灰汁三升

【用法】将灰汁、石脑油以文武火熬成膏，次下诸药令匀，瓷器内收贮。临用时看疮大小点药。良久箭头自然涌出。

【主治】箭头、一切针刺入肉。

72677 涌痰汤

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】甘草一两 桔梗一两 瓜蒂五钱 枳壳 陈皮各五钱

【用法】用水十碗，煎至五碗，去滓，连连饮尽。吐后得宽后，可服参苓白术散调理。

【功用】探吐。

【主治】噎膈。

72678 涌泉神应散

【方源】《普济方》卷三二五引《德生堂方》。

【组成】金银花 黄耆各三两半 当归 甘草(切)各二两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，酒半盞，煎至八分，去滓，滓再熬，临卧服。

【主治】妇人吹奶，或两乳肿痛，即为奶痈。

浚

72679 浚川丸

【方源】《袖珍》卷三引张子和方。

【组成】甘遂 芒消各二钱 郁李仁一钱 大黄三钱 黑牵牛末二两

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服三、五十丸，温水送下。

【主治】积聚。

72680 浚川丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】十水丸(《医学入门》卷七)。

【组成】桑白皮 大戟 雄黄 茯苓 芫花 甘遂 商陆 泽泻 巴戟 葶苈各五钱

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十丸，姜汤或木香汤送下。

【主治】十种水气初起。

【宜忌】忌鱼、面、盐百日。

【加减】从面肿起，根在肺，桑白皮加至一两；从四肢肿起，根在脾，大戟加至一两；从背肿起，根在胆，雄黄加至一两；从胸肿起，根在皮肤，茯苓加至一两；从胁肿起，根在肝，芫花加至一两；从腰肿起，根在胃，甘遂加至一两；从腹肿起，根在肺，商陆加至一两；从阴肿起，根在肾，泽泻加至一两；从手肿起，根在腹，巴戟加至一两；从脚肿起，根在心，葶苈加至一两。

72681 浚川丸

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】大戟 芫花(醋炒) 沉香 檀香 南木香 槟榔 蓬莪术 大腹皮(洗，焙干) 桑白皮(锉，炒)各半两 黑白牵牛(晒，研取生末)一两 巴豆(去壳膜心，存油)三十五粒

【用法】上药除牵牛末、巴豆外，前九味内沉香、檀香、木香、槟榔不过火，余五味焙干，同沉香等为末，就加牵牛末和匀，巴豆碎切在乳钵内，杵极细，入前药末，同再杵匀，水煮面糊为丸，如麻仁大。每服十七丸，浓煎葱汤候温，五更初空心送下。去水未尽，停一日减用十三丸，次减作九丸，再减至七丸，汤使下法如前，证退即止，仍投南星腹皮散。

【主治】水肿及单腹胀，气促食减，遍身面浮。

【加减】如单腹胀甚，能饮食气壮者，加甘遂末同丸取效。

【宜忌】忌甘草。

72682 浚川散

《医学纲目》卷四。为原书同卷引张从正方“大圣浚川散”之异名。见该条。

72683 浚牛膏

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】大田螺

【用法】用葱、盐，加少许麝香，捣烂为膏。热烘细绢摊，贴小腹，用手摩之。

【主治】儿辈小腹硬胀刺痛，小便赤涩难通，欲尿则啼，不尿则痛，未愈而痘随发。

72684 浚水汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白术一两 杜仲三钱 山药一两 薏仁 芡实各五钱 防己 桂枝各五分

【用法】水煎服。

【主治】水郁之症。遇寒心痛，腰腹沉重，关节不利，艰于屈伸，有时厥逆，痞坚腹满，面色黄黑。

72685 浚血丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】人参 白术（生） 赤茯苓各一两 甘草（炙）四钱 半夏曲七钱（炒） 浮石五钱（煨） 牡丹皮五钱 当归身四钱 桃仁三钱（干漆拌，炒，去漆） 穿山甲三钱 桂三钱（病在胁下，用官桂，在少腹，用肉桂）

【用法】上为末，红曲为丸。每服三钱，温酒送下。瘦人去半夏、浮石，加生地黄，蓬术，蜜丸服之。

【主治】肥人多年内伤，血蓄于胃，杂于痰涎，诸药不效者。

72686 浚荣散

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】红花 归尾 紫草 丹皮 荆芥穗 地丁 牛蒡 木通 赤芍

【用法】加地龙三条，临服和猪尾半盏。

【主治】痘气至而血不至，乳郭饱满而根窠晦者。

殺

72687 殺羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】殺羊角（镑） 姜蕤 木通（锉）各一两半 甘菊花 泽泻 大黄（锉，炒）各

一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，下芒消一钱匕，空心、临卧温服。

【主治】肝肺实热，目生白翳。

72688 殺羊角饮

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】殺羊角（镑） 人参 赤茯苓（去黑皮） 羌活（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 梔子仁（炒） 牡丹皮 黄芩（去黑心） 麦门冬（去心，炒） 蔷薇根皮 大黄（炒）各一两 防己二两 胡黄连半两 甘草（炙）三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盞，加生姜半分（拍破），盐豉四十粒，同煎一盞，去滓，更入淡竹沥少许，搅令匀，食前温服。

【主治】健忘多惊，大便难，口中生疮。

72689 殺羊角散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】殺羊角五两（炙令微黄） 藁荷四两半 梔子仁七枚 牡丹一两 赤芍药一两 黄连一两（去须） 犀角屑一两

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中蛊毒，腹内坚如石，面目青黄，小便淋沥，变易无常。

72690 殺羊角散

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】殺羊角（镑，微炒）一两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】诸脏虚邪，夜卧恍惚，神不安。

瓶

72691 瓶中关开神效散

【方源】《齐氏医案》卷四。

【组成】盆硝 僵蚕（去蛹，微炒） 青黛各八分 甘草二分 蒲黄五分 马勃三分

麝香 洋片各一分

【用法】上药各为细末，称足和匀，瓷瓶收贮，如遇急慢喉痹，咽痛肿塞不通，即用前药一钱，以新汲水半盏调匀，细细呷咽。果是喉痹，即破出紫血而愈，不是喉痹，亦立消散。若是诸般舌胀，用药五分，以指蘸药擦在舌上下，咽唾，小儿只用二三分，亦如前法用，并不拘时候。

【主治】急慢喉痹，咽痛，肿塞不通，舌胀。

粉

72692 粉散

【方源】《外台》卷十五引《范汪方》。

【组成】乌头(炮) 桔梗 细辛 白术各一两

【用法】上药治下筛，以铅朱为色粉四升，和令调，以粉身。

【主治】风瘙，身体瘾疹。

72693 粉散

《鬼遗》卷四。为《外台》卷二十四引《深师方》“胡粉散”之异名。见该条。

72694 粉散

【方源】《外台》卷二十三引《延年秘录》。

【组成】麻黄根三两 防风 干姜 细辛各二两 白藟一两

【用法】上药治下筛。以粳粉五升，熬令黄，合和以粉身。

【主治】大病后，身体虚肿汗出。

72695 粉散

【方源】《外台》卷十七引《张文仲方》。

【组成】白粉 干姜 牡蛎各三分(熬)

【用法】上为散。欲卧时粉阴下，至起亦粉。疏布袋中扑之佳。

【主治】阴下湿痒，痿弱。

72696 粉散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引《婴童方》。

【组成】牡蛎(煨) 乌头(烧) 麻黄根各三分 石膏一分 真朱二分 麝半分

【用法】上为末。粳米粉二升，和散微炒，

绢袋盛粉，遍身丹有疮汁，粉之愈；麻油涂后粉立愈。

【主治】尔朱丹，及一切丹。

72697 粉霜

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】皂矾一两 明矾一两二钱五分 汞一两 盐一两二钱半 火消一两二钱半

【用法】上为末，入阳城罐内，打火三炷香，先文后武，取出冷定听用。点疮。

【主治】梅疮。

【备考】本方方名，《疡医大全》引作“梅疮灵药”。

72698 粉丹散

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【异名】吹耳丹(《赤水玄珠》卷二十八)、吹耳散(《治疹全书》卷下)。

【组成】轻粉 黄丹

【用法】上为末。竹筒吹耳内，左眼有翳吹右耳，右患吹左耳。

【主治】眼生翳膜。

72699 粉艾丹

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】猪胆汁 宫粉 艾

【用法】先用猪胆汁浴净，再用宫粉调涂碗内晒干，用艾熏至老黄色，取下为末。绢袋扑之。

【主治】胎癰。

72700 粉龙丸

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】龙胆草 蚌粉

【用法】上为末。每服半钱，用米饮调下。

【主治】小儿疳困。

72701 粉代散

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】轻粉三钱 代赭三两(煨) 白矾三两

【用法】上为散。每服三钱，米饮调下。

【主治】气逆痰壅，病痢脉弦者。

【方论选录】气逆不化，痰涎上壅，闭遏心

包，而神明失指，故病壅时发焉。轻粉劫痰，搜涤经络之伏结；代赭镇坠，下平逆气之有余；白矾化湿却水，治痰生之源，以杜绝其根。俾痰化气平，则膈中无逆上之气，而神明得主宰之权，焉有痼病不瘳乎？此劫痰镇坠之剂，为痰逆病痼之专方。

72702 粉灰散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】轻粉一钱 枣子（烧灰）一钱 蚯蚓粪（火焙干）五钱 生甘草五分

【用法】上药各为末。油调搽。

【主治】小儿耳烂生疮。

72703 粉肌散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】芎藭一两 白术 藁本（去土）各二两 米粉四两

【用法】上为末。粉身。

【功用】辟温。

72704 粉肌散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】川芎 藁本 远志皮 白芷各一两 米粉一升

【用法】上为末。粉肌。

【功用】辟温。

72705 粉汗方

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】牡蛎半斤（烧，研如粉） 麻黄根一两（捣罗为末）

【用法】二味同拌匀，寝寐中有汗处，使人敷之。

【主治】盗汗，腠理开疏。

72706 粉汗散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】麻黄根一两 牡蛎一两（烧赤） 龙骨半两 赤石脂半两

【用法】上为细末，盛以绢袋，如扑粉扑之。

【主治】汗出过多。

72707 粉汗散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】牡蛎（煨）二两 麻黄根（炒） 赤石脂 糯米各一两 龙脑一钱 麝香少许

【用法】上为末。用生绵绢包药，扑有盗汗出处。

【主治】小儿睡中遍身盗汗。

72708 粉汗散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】黄连（生） 牡蛎（煨） 贝母各七分 糯米三两

【用法】上为细末。用生绵绢包药，扑有盗汗处。

【主治】小儿睡中遍身盗汗。

72709 粉米汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】花粉三钱 苡米一两 藿香一钱 薄荷一钱 黄连五分（酒炒） 黄芩一钱（酒炒） 木香五分 木通一钱（酒炒） 当归一钱五分 赤芍一钱（酒炒） 荷叶一角 绿豆一撮

【主治】暑湿烦渴，腹痛，下利脓血。

72710 粉红丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】温惊丸。

【组成】天南星（腊月酿牛胆中百日，阴干，取末）四两（别研，无酿者，只锉炒熟用） 朱砂一钱五分（研） 天竺黄一两（研） 龙脑半字（别研） 坯子胭脂一钱（研，乃染胭脂）

【用法】用牛胆汁为丸，如鸡头子大。每服一丸，小者半丸，沙糖温水化下。

【主治】惊疳。

72711 粉红散

【方源】《济生》卷五。

【组成】干胭脂一钱 枯矾一两

【用法】上为末。每用一钱，生蜜调如稀糊，扫口疮咽喉内。咽了药，来日大便，退了疮皮为验。

【主治】小儿白口疮，咽喉恶烂声哑。

72712 粉连散

《普济方》卷四〇七。为《幼幼新书》卷三十一引张焕方“胡黄连散”之异名。见该条。

72713 粉身方

【方源】《肘后方》卷八引姚大夫方。

【异名】粉身散(《千金》卷九)。

【组成】芎劳 白芷 藁本各等分

【用法】上药治下筛。纳米粉中,以涂粉于身。

【功用】辟温病。

72714 粉身散

《千金》卷九。为《肘后方》卷八引姚大夫方“粉身方”之异名。见该条。

72715 粉身散

【方源】《普济方》卷一五一引《删繁方》。

【组成】芎劳四两 藁本四两 远志 白朮各四两 米粉一斗(研)

【用法】上为散。粉身。若欲多时,加药增粉用之。

【功用】辟温。

72716 粉灵砂

【方源】《得效》卷五。

【组成】灵砂一两 蚌粉(同炒略变色)二两 丁香 胡椒各四十九粒

【用法】上为末,生姜自然汁煮半夏糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,翻胃,煨生姜汤送下;虚人脾痛,炒盐汤送下。

【主治】脾痛翻胃。

72717 粉金散

【方源】《医学纲目》卷十九。

【组成】黄柏 草乌各等分

【用法】上为末。蜜调敷之。

【主治】瘰癧溃与未溃。

72718 粉草汤

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】粉草节 当归尾 赤芍药 香白芷 大黄 木鳖子 荆芥 黄耆 南木香各等分

【用法】上咬咀。酒、水各一大盏,煎至八分,露一宿,五更服。

【主治】一切无名肿毒恶疮。

【加减】热多,加大黄;冷多,加当归,白芷;腰肿多,加青木香;便毒,加甘草。

72719 粉草饮

【方源】《奇效良方》卷六十九。

【组成】甘草一两(生用) 白矾(生)半两 延胡索一两

【用法】上为细末。每服半钱,水一盞,煎至六分,去滓放冷,细细呷之

【主治】中药毒,吐逆躁烦。

72720 粉草散

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】玄明粉一斤 甘草(为末)二两

【用法】上和匀。每服一钱二分,桃花汤或葱白汤调下。

【主治】膈上气壅滞,五脏秘塞邪热。

72721 粉草膏

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】粉草四两(长流水浸,炭火炙干,再浸,再炙三次) 当归四两

【用法】慢火熬至稠膏,去滓,再煎大稠为度。每服三钱,空心热酒化下。

【主治】悬痈已成不能消。

72722 粉砂饼

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】粉霜 胡粉各一两 硃砂 丹砂 白丁香 膩粉各半两

【用法】上为末,入面一两,水和捏作饼,如棋子大,慢火烧熟。每服一饼,麝香,米饮嚼破服。

【主治】瘰癧。

72723 粉香散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】膩粉二钱匕,乳香一钱 葱一根(煨熟,去焦皮)

【用法】前二味为末。与葱同研如膏,摊在帛上贴疮,三日一换。

【主治】恶疮。

72724 粉香散

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】蚌粉不拘多少（研根细，水飞过）麝香少许（研）

【用法】上为末。用绵裹，朴粉儿身。

【主治】婴小身热，受蒸不解，及挟时行温病。

72725 粉香散

《医学纲目》卷十五。为《瑞竹堂方》卷五“香粉散”之异名。见该条。

72726 粉姜散

【方源】《普济方》卷三六六。

【组成】粉 干姜

【用法】上为末。安少许在舌上，时时用之，立效。

【主治】小儿急中卒风不语。

72727 粉胶散

【方源】《普济方》卷三〇〇引《海上方》。

【组成】干小粉（炒焦存性）

【用法】熔牛胶调，摊纸上贴之；好米醋调尤妙。

【主治】冻瘡疮。

72728 粉黄膏

【方源】《三因》卷十六。

【组成】硫黄一分（为末） 萝卜（切去盖，剉作瓮子，入硫黄在内，以竹针盖定，安糠火煨一宿，取出研细） 轻粉 乌头尖各少许（为末）

【用法】上为末，以面油调，卧时敷。

【主治】肺热，鼻发赤瘰，俗谓酒渣。

72729 粉黄膏

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】蛤粉一两 石膏五钱 轻粉五钱 黄柏五钱

【用法】上为细末，暑天用无根水，秋、冬用麻油调敷。

【主治】黄水疮。

72730 粉隔汤

【方源】《肘后方》卷四引《胡洽方》。

【异名】矾石汤（《兰台规范》卷四）。

【组成】矾石一两

【用法】水二升，煮取一升，纳蜜半合，顿服。须臾未吐，饮少热汤。

【主治】胸中多痰，头痛，不欲食，及饮酒则瘀阻痰。

72731 粉蜜膏

【方源】《幼幼新书》卷五引《吉氏家传》。

【组成】蜜少许 轻粉一钱

【用法】熟水解开蜜，调轻粉。点儿口极少许。令泻一二行，不可再服。

【主治】儿生三五日，脏腑不通，六十日内诸患。

72732 粉糖丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】膩粉半钱 砂糖如弹丸大一块

【用法】二味同研令匀，丸如梧桐子大。每服五丸，临卧温熟水送下。

【主治】大肠壅结不通。

72733 粉糖水

【方源】《仙拈集》卷一引《生生编》。

【组成】绿豆粉 白糖各一两

【用法】新汲水调，频服。

【主治】中暑霍乱。

72734 粉霜丸

【方源】《准绳·幼科》卷八引《仙人水鉴》。

【组成】粉霜 白丁香各一钱 巴豆一枚（不出油）

【用法】上为末，烂饭为丸，如绿豆大。每服二丸，井花水送下。

【主治】小儿疳，一切泻。

72735 粉霜丸

【方源】《永乐大典》卷九八〇引丁时发方。

【组成】粉霜 真珠末各半两 朱砂 半夏（姜汁浸）各一分 白附子一个（炒） 蝎十四个（全者） 水银一分（结砂） 脑 麝各少许

【用法】上为末，蒸饼心为丸，如卜子大。每服三丸，淡姜汤送下。

【主治】小儿惊风，久积涎生。

72736 粉霜丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】粉霜 硃砂 海蛤 寒水石(烧粉) 玄精石 白丁香 头白面各一钱 轻粉三钱 海金沙一钱

【用法】上为末,着纸裹数重,上使面裹,又纸裹,冷酒煎了,桑柴火烧,面熟为度,宿蒸饼为丸,如柏子大。每服三丸,生姜汤送下,一日三次;二日加一丸,至六日不加即止,以补之妙。

【主治】水鼓满不食,四肢浮肿,大小便闭,不进饮食。

72737 粉霜丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】粉霜二钱 膩粉一钱 砒霜一钱

【用法】上为末,以烧饭为丸,如黍米大。每服三丸,空心以冷水送下。

【主治】赤白痢,诸药不效者。

72738 粉霜丸

【方源】《普济方》卷二五五。

【组成】丁香 木香 粉霜 五灵脂 朱砂各二钱 硃砂 乳香 麝香 信(湿纸裹,煨候烟尽)各一钱 肉豆蔻 巴豆(去壳,湿纸裹,煨香)各二两

【用法】上为细末,醋糊为丸,如黍米大。每服二丸,随汤引下;若心痹疼,石菖蒲汤送下;气刺撮痛,陈皮汤送下;腹胀满闷,萝卜汤送下;咳逆满闷,柿叶汤送下;小肠冷气疼,水盐汤送下;膈气翻胃,丁香汤送下;小儿羸瘦,藿香汤送下;脾寒疟疾,草果汤送下;癫狂失志,柳桃汤送下;小便频并,茴香汤送下;十种水气肿,猪苓汤送下;血痢,槐花甘草汤送下;五般淋沥,灯心汤送下;盗汗出,龙胆草汤送下;酒积肚腹痛,温酒送下;赤白痢,煎陈皮汤送下;中暑热者,沙糖水送下;水泻不调,生姜汤送下;山岚瘴气,不服水土,温酒送下;妇人赤白带下,艾醋汤送下。

【主治】心痹疼,气刺撮痛,腹胀满闷,咳逆满闷,小肠冷气疼,膈气翻胃,小儿羸瘦,脾寒

疟疾,癫狂失志,小便频并,十种水气肿,血痢,五般淋沥,盗汗,酒积肚腹痛,赤白痢,中暑热,山岚瘴气,妇人赤白带下。

72739 粉霜散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】粉霜一两 天南星末一分 黄丹半两(炒紫色) 麝香半两 定粉一分

【用法】上为细末。先用盐浆水洗过,以纸捻子搨药,扫在疮上,每日三四次。

【主治】小儿走马疳疮。

72740 粉霜散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】粉霜 消石各半两 蛇蛻灰二两

【用法】上为细末。每服二钱匕,温酒调下;醋汤亦得。渐渐连并三两服,如更未下,即服丹砂散。

【主治】子死腹中,或渐胀满。

72741 粉霜散

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】羊蹄根三钱 轻粉一钱 白矾一钱 天花粉二钱 冰片一分 儿茶一钱

【用法】上药各为末。醋调搽之。一二次即效。

【主治】温奶疮,白壳疮。

72742 粉霜散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】粉霜 6 克 砒霜 1 克 黄丹(飞过)10 克 天南星 10 克

【用法】上为细末。用菜油 20 毫升,调敷患处。

【主治】足跟溃疡。

72743 粉黛散

【方源】方出《医说》卷四引《类编》,名见《医略六书》卷二十二。

【异名】黛蛤散(《中药成方配本》)。

【组成】青黛 蚌粉

【用法】用新瓦将蚌粉炒令通红,拌青黛少许。每服三钱,米饮下。

【主治】痰嗽。

72744 粉麝散

【方源】《得效》卷十九。

【异名】龟甲散(《疡科选粹》卷五)。

【组成】生龟一个(乌者) 轻粉 麝香

【用法】将乌龟打死去肉取壳,酸醋一碗炙,醋尽为度,仍煨令白烟尽,存性,用碗盖地上出火毒,为末,入轻粉,麝香拌匀。临用先以葱水洗干,将药掺上。

【主治】外疔疮臭烂,数十年不愈者。

72745 粉矾平胃丸

【方源】《医统》卷十八。

【组成】苍术(米泔浸) 白术各二两 厚朴(姜汁炒)半两 陈皮一两 甘草 砂仁各五钱 皂矾二两(用粉制)

【用法】上药除皂矾为细末。皂矾另制,红籼米粉一升,先将皂矾砂锅内炒去烟尽,再下粉炒香熟为度,取起,和前平胃末一处醋煮糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,姜汤送下,一日二次。

【主治】脾胃积滞,湿郁黄胖而似浮肿。

【宜忌】忌面食生冷。

72746 粉乳托里散

《直指》卷二十二。为《本事》卷六“内托散”之异名。见该条。

72747 粉香生肌散

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】轻粉一钱 乳香一钱 没药一钱 黄丹二钱(微炒) 赤石脂五钱 寒水石三钱(煨)

【用法】上药各为末。湿则干搽,干则油调搽。

【主治】嵌指甲伤。

72748 粉霜半夏丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏四两 白矾三两 黑牵牛子二两 粉霜一两

【用法】上为细末,以生姜自然汁煮糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服十丸,食后白汤送下。

【功用】化痰涎,利胸膈。

72749 粉色干燥药粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】樟丹六两 五倍子八两 枯矾四两 上官粉四两 轻粉四两

【用法】与其他药粉合用撒扑或油调成糊剂用,常用量为5~20%。

【功用】祛湿收敛,固皮止痒。

【主治】慢性湿疹(顽湿疡)神经性皮炎,头癣(秃疮)

【宜忌】本药粉有一定刺激性,凡发现湿热性(急性皮炎)皮肤病,溃烂疮面多粘膜损害慎用,对尿过敏者禁用。

料

72750 料物丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】萆薢 红豆(去壳) 台椒(去目并合口者,炒出汗) 白姜(炮,洗) 良姜(微炒) 胡椒 茴香(淘去沙,炒)各半两 附子(炮,去皮脐,切片更炒)一两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心米饮送下。

【主治】脾元怯弱,不进饮食。

益

72751 益儿丸

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《吉氏家传》。

【组成】人参 白术 茯苓 柴胡 甘草(炙) 陈皮 鳖甲(醋炙) 京三棱(煨)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,食后米饮化下,一日三次。

【主治】一切疳瘦,夜多盗汗,肌热。

72752 益儿丸

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【异名】调中丸。

【组成】人参 白术 茯苓 柴胡 当归

陈皮 白芍药各半两 鳖甲 山棱 干姜各一分

【用法】上为细末，米煮面糊为丸，如麻子大。每服三五十丸，空心米饮送下。

【功用】化癖，进食长肌。

【主治】荣卫不和，肌体清瘦，或发寒热，面色萎黄。

72753 益儿丸

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】神曲(炒黄) 白芫荑(去扇，炒)各一两 宣连(去须)二两 陈皮 木香各半两(一方有没石子，芦荟各一两)

【用法】上为细末，猪胆汁和药末成剂，再入胆内，系口定，以浆水煮数沸，取汁为丸，如绿豆大。每服一二十丸，米饮送下；腹胀，木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】胃冷，气不和，食不消化，痞气。

72754 益儿丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】黑豆二合(炒) 使君子(去壳)一百粒 五谷虫一两 白面十两(炒黄) 黄米三合(炒黄)

【用法】上为末，炼蜜为丸，重二钱。每服一丸，早、午、晚各一次。

【功用】去积聚，补脾胃。

72755 益儿饼

【方源】《回春》卷七。

【组成】白术(去芦)四钱 槟榔一钱半 木香一钱 神曲(炒)二钱半 山楂肉 使君子(去壳) 水红花子各五钱

【用法】上为末，入黄蜡、面、水和作煎饼吃。

【主治】小儿癖疾。

72756 益卫散

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】人参 贝母 白及 百合 阿胶 桔梗 天门冬各一钱 山药 木香 甘草各七分

【用法】水二钟，煎八分，通口服，滓再煎

服。兼服庚字化毒丸，标本同治。

【主治】梅疮。毒中脾经，疮标发际、口吻，或堆肛门，形如鼓钉。

72757 益元丸

《普济方》卷二一七引《仁存方》。为《圣济总录》卷一八五“龙骨丸”之异名。见该条。

72758 益元丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《杏苑》卷七。

【组成】人参一两 白术 熟地 黄柏(炒黑)各二两 山药 海石 南星各一两 琐阳半两 干姜(烧灰)半两 败龟版(酒炙)二两

【用法】上为末，粥为丸服。一云酒糊为丸。

【主治】血气虚，有痰，白浊，阴火痛风。

【备考】《杏苑》本方用法：为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，盐汤送下。

72759 益元汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】熟附子 干姜 黄连 人参各五分 五味子九粒 麦冬 知母各一钱 葱 甘草 艾各三分

【用法】水二钟，加生姜一片，大枣二个，煎之，临服入童便三匙，顿冷服。

【主治】伤寒身热，头疼全无，便作躁闷，面赤，饮水不得入口。

72760 益元汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】当归 生地 人参 黄耆各二钱 川芎 白术 丹皮各一钱五分。

【用法】水二钟，加大枣一个，煎服。

【主治】去血过多，瘕。

72761 益元汤

【方源】《慈幼新书》卷四。

【组成】人参 黄耆 甘草 白术 陈皮 当归 川芎 升麻 桔梗 生姜

【用法】水煎服。

【主治】痘疹，元气虚弱者。

72762 益元汤

【方源】《麻症集成》。

【组成】川连 知母 洋参 北味 麦冬 黄芩

【主治】麻疹，面赤身热，烦躁，饮水不入口。

72763 益元散

【方源】《宣明论》卷十。

【异名】太白散(《伤寒直格》卷下)、天水散(《伤寒标本》卷下)、六一散(《伤寒标本》卷下)、神白散(《儒门事亲》卷十三)、双解散(《摄生众妙方》卷四)。

【组成】桂府赋白滑石六两 甘草一两(炙)

【用法】上为细末。每服三钱，加蜜少许，温水调下，不用蜜亦得，一日三次；欲饮冷者，新汲水调下；解利伤寒，发汗，煎葱白、豆豉汤调下；难产，紫苏汤调下。

【功用】利小便，宣积气，通九窍六腑，生津液，去留结，消蓄水，止渴宽中，补益五脏，大养脾肾之气，安魂定魄，明耳目，壮筋骨，通经脉，和血气，消水谷，保元，下乳催生；久服强志轻身，驻颜延寿。

【主治】身热，吐利泄泻，肠癖，下痢赤白，癰闭淋痛，石淋，肠胃中积聚寒热，心躁，腹胀痛闷；内伤阴痿，五劳七伤，一切虚损，痼瘕，惊悸，健忘，烦满短气，脏伤咳嗽，饮食不下，肌肉疼痛；并口疮牙齿疳蚀，百药酒食邪毒，中外诸邪所伤，中暑、伤寒、疫疠，饥饱劳损，忧愁思虑，恚怒惊恐传染，并汗后遗热劳复诸疾；产后血衰，阴虚热甚，一切热证，兼吹奶乳痈。

【宜忌】孕妇不宜服。

【加减】加黄丹，名红玉散；加青黛，名碧玉散；加薄荷叶(末)一分，名鸡苏散。

【方论选录】①《医方考》：滑石性寒，故能清六腑之热，甘草性平，故能缓诸火之势。②《成方切用》：滑石重能清降，寒能泄热，滑能通窍，淡能行水，使肺气降而下通膀胱，故能祛暑住泻，止烦渴而利小便也。加甘草者，和

其中气，又以缓滑石之滑降也，其数六一者，取天一生水，地六成之之义也。

【临证举例】①膀胱炎 《福建中医药》(1965, 6: 20): 林某某, 男, 69岁。突感尿意急迫, 排尿频繁, 量少, 滴沥难下, 小腹部灼痛, 诊断为急性膀胱炎。唇口红甚, 舌苔黄浊, 脉数有力, 给六一散二两, 冲开水 600 毫升, 澄清, 分三次服, 每日一剂, 连服四天痊愈。②晕厥 《山西中医》(1987; 2: 29): 张某某, 男, 48岁, 厨师。1977年5月14日初诊。患者一年前用鳍刺刺伤右手食指, 翌日全身不适, 低热, 右肢剧痛, 纳呆、恶心、晕厥, 经强心输液复苏。此后常无规律晕厥。患者面容憔悴, 神情恐慌, 右背及右腿外侧均见大小不等之绀斑十余块, 大者如掌, 小者似卵, 质硬压痛, 舌红有瘀点, 诊为破伤中毒, 毒瘀血分。遂予六一散 200 克, 每次用绿豆水冲服 10 克, 一日二次, 十日后诸症缓解, 又十日诸证痊愈。③疱疹 《山西中医》(1987; 2: 30): 雷姓女婴, 8个月, 因腹泄服西药后全身泛发疱疹, 小豆样, 疹周红润, 伴咳嗽, 低烧, 舌红, 指纹淡红浮现, 小便淋沥不畅。遂予六一散 30 克, 冲调徐徐凉饮, 晚 7 时许服药, 夜畅尿数次, 翌晨疱疹全消, 一切恢复正常。

【备考】本方加青黛, 又名“若玉散”(见《准绳·类方》)。

72764 益元散

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 川芎 黄芩 陈皮 香附 白芷 甘草

【用法】坐蓐之月服之。

【功用】安胎。

【加减】如虚, 加人参。

72765 益元散

《医方集解》。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”之异名。见该条。

72766 益元煎

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】白术一斤 建曲六两 扁豆 广

皮 麦芽 茯苓各八两 小蝉肝四两(即水鸡肝)

【用法】炼蜜为丸。每服一钱五分,米饮调下。

【主治】一切食积腹胀,气弱血衰诸证。

72767 益牙散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】熟地黄 地骨皮 川芎 青盐(炒) 香附子 破故纸各二两 细辛 防风各二钱半 白蒺藜 五加皮 石膏各五钱 川椒 猪牙皂角各二钱。

【用法】上为细末。每早蘸药擦牙,用百沸汤漱口咽下。

【功用】补肾,去脾湿热,固齿止疼,明目,乌须发。

72768 益中丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】神曲二两(炒黄) 干姜二两(炮) 枳壳(去瓢,麸炒)半两 陈橘皮(去白)一两 高良姜二两(炒) 大麦芽二两(炒香熟) 肉豆蔻(面裹煨)半两 丁香半两。

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,温米饮或热水送下,不拘时候。

【功能】健脾暖胃,消冷化痰。

【主治】中满胀闷,噎气吞酸,心腹时痛,不进饮食。

72769 益中丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】鹿茸(蜜炙) 丁香 木香 茴香(炒) 山药 黄耆(蜜炙) 木通(油炒) 官桂(去皮) 干姜(炮) 青盐 石斛 天雄(炮) 附子(炮) 鹅管石(火煨,酒淬) 阳起石(火煨,酒淬) 肉豆蔻 川牛膝(酒浸,焙) 破故纸(炒) 葫芦巴(炒) 菟丝子(酒浸,焙) 金铃子(去核) 覆盆子 熟地黄(酒浸,焙) 萆澄茄 马兰花(醋炒) 肉苁蓉(酒浸,焙) 韭子(酒浸,焙)各二钱半 沉香 人参各一钱一字 麝香三字。

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐

子大。每服三十丸,加至五十丸,空心温酒送下。

【功用】益真气,补虚惫。

【主治】下焦伤竭,脐腹绞痛,两胁胀满,饮食减少,肢节烦疼,手足麻痹,腰腿沉重,行步艰难,目视茫茫,夜梦鬼交,遗泄失精,神气不爽,阳事不举,小便滑数,气虚肠鸣,大便自利,虚烦盗汗,津液内躁。

72770 益中丹

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】高良姜 干姜各二两 半夏 橘皮各四两

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,白饮送下。

【主治】太阴病,食则吐,胃中痛,腹胀时噫者。

72771 益中汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】丁香半两 草果子三枚(去皮,炒) 人参半两 青皮半两 诃黎勒一分 桂心□分

【用法】上为细末。每服半钱或一钱,米饮调下。

【主治】小儿呕吐泄痢。

72772 益中汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】人参 白术 黄连 黄芩 枳壳 干姜 甘草

【主治】肠鸣下气,暂止复响。

72773 益中散

【方源】《续名家方选》。

【组成】白术 茯苓 橘皮 芍药 干姜 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】感寒冷,泄泻腹痛者。

72774 益中膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】助胃膏。

【组成】肉豆蔻 丁香 缩砂仁 诃子肉

(炮,去核)各二钱半 粉草(炙) 青皮(去白)各半两 陈皮(去白)一两 马芹(净洗,焙干)三钱

【用法】除丁香不过火,余七味焙,仍同丁香为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸至二丸,空心白汤化下。

【主治】脾胃虚弱,吐泻腹胀,肚痛困倦,有因感冷而泻,夜起频数,大便过时,食不克化。

72775 益气丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】麦门冬(去心) 人参各二钱 橘皮(去白) 桔梗 炙甘草各五分 五味子一钱(去子)

【用法】上为极细末,水浸油饼为丸,如鸡头子大。每服一丸,细嚼,唾津咽下。

【功用】补上益气。

【主治】语言多,损气懒语。

72776 益气丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】熟地八两 人参四两 山药四两 茯苓三两 山萸肉四两 丹皮三两 泽泻三两 附子一两五钱 肉桂一两五钱 补骨脂一两五钱

【用法】炼蜜为丸。每服三五钱,早空心滚汤送下。

【主治】两尺脉举按无力,阴中之阳有亏者。

72777 益气丸

【方源】《活人方》卷四。

【组成】人参一两 泽泻五钱 丹皮五钱 沉香三钱 椒红三钱 附子一钱五分 肉桂一钱五分

【用法】炼蜜为丸。每服三五钱,黎明空心白滚汤送下。

【主治】臌胀。

【方论选录】人参益三焦元气为君,泽泻、丹皮清利三焦相火为臣,沉香、椒红化中宫凝浊之气,附子、肉桂补命门真阳之火。

72778 益气汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】半夏一升(洗,四破) 宿姜八两 芎藭 细辛 附子(炮) 玄参 当归各三两 桂心 甘草(炙) 茯苓各二两 杏仁六十枚(去二仁皮尖,碎)

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,去滓,分温三服。

【主治】脉极。虚寒则咳,咳则心痛,喉中介介如哽,甚则咽肿喉痹。

【宜忌】忌牛肉、饴、生葱、菜、猪肉、冷水、菰菜、海藻酢物。

72779 益气汤

《普济方》卷二十三。为《脾胃论》卷下“清神益气汤”之异名。见该条。

72780 益气汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】茴香 木香 全蝎 玄胡 陈皮 石菖蒲各一钱 羌活 僵蚕 川芎 蝉蜕各五分 穿山甲一钱 甘草一钱五分

【用法】酒煎服。

【主治】因大气得之,气闭耳聋者。

72781 益气汤

【方源】《傅青主男女科·男科》。

【组成】人参 甘草各一钱 黄耆二钱 五味子三十粒 柴胡 白芍各七分 姜三片 枣二枚

【用法】水煎,热服。

【主治】两手发麻,困倦嗜卧。

72782 益气汤

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】黄耆一钱五分(蜜水炒) 人参一钱 白术一钱(炒) 当归一钱 麦冬一钱 炙甘草五分 藿香一钱 五味子十粒

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】鼻痛过于解散,其始流清涕者,继成浊涕,渐而腥秽黄赤间杂,皆由渗开脑户,日积月累而致尪羸。

【加减】虚寒,少入细辛;内热,监以山栀。

72783 益气汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】人参 白术 当归各三钱 川芎八分 茯苓一钱五分 陈皮 厚朴各四分 苏梗 炙甘各五分 腹皮六分 木香二分(磨) 萝卜子三分 木通五分

【主治】产后误用耗气药,以致腹胀。

72784 益气汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】当归 党参 白术 陈皮 柴胡 黄耆(炙) 升麻 甘草(炙) 红枣

【主治】肛门下坠。

72785 益气散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】附子二两(大者。炮裂,去皮脐,切片,如纸厚,用生姜四两取汁,以慢火煮附子令汁尽,焙干) 缩砂(去皮)半两(微炒) 肉豆蔻(去皮)一分 蜀椒(去目并闭口,炒去汗)一分 茴香子半钱(微炒)

【用法】上为散。每服三钱,用羯羊子肝二枚(去筋膜,切作片),入葱白、盐、醋各少许,拌药令匀,用竹杖子串于猛火上炙,令香熟就热吃,空心以温酒一盏送下。

【主治】脾肾虚劳,滑泄不止,饮食不进,肌体羸瘦。

72786 益火丹

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】人参 焦术 熟地 当归 炮姜 附子 泽泻 牛膝 炙草

【主治】鼻衄。属虚火,饮热恶冷者。

72787 益心丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】黄耆(蜜炙) 茯神(去木) 人参(去芦) 远志(水煮,去心) 熟干地黄各一两(洗) 北五味子二两 龙齿(煨,别研) 柏子仁各半两(别研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,白汤送下,不拘时候。

【主治】心气不足,梦中遗泄。

72788 益心丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 当归各五钱 麦冬 炒枣仁各一两 天花粉 北五味 远志 神曲 丹砂各一两 菖蒲五分 菟丝子三钱

【用法】水煎服。

【主治】劳心思虑,心血亏损,心火沸腾,夜梦不安,久侧惊悸健忘,形神憔悴,血不华色。

72789 益心汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】益智仁二十七粒

【用法】上为细末。每服二钱,米饮调下。

【主治】产后小便频数及遗尿。

72790 益水汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】生地四钱 归身二钱 丹皮八分 甘草 百合各一钱 童便半杯

【主治】诸失血过多,元阴虚损。

72791 益母丸

【方源】《妇人良方》卷十三引《产乳》。

【异名】一母丸(《医方类聚》卷二二四引《管见良方》)、知母丸(《校注妇人良方》卷十二)。

【组成】知母一两(洗,焙)

【用法】上为粗末,以枣肉为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,煎人参汤送下。

【主治】子烦。妊娠因服药致胎气不安,有似虚烦不得卧者。

72792 益母丸

《普济方》卷三五六。为《本草纲目》卷十五引《产宝》“济阴返魂丹”之异名。见该条。

72793 益母丸

《丹溪心法附余》卷二十一。为原书同卷“返魂丹”之异名,见该条。

72794 益母丸

《准绳·女科》卷四。为原书同卷“黑神丸”之异名。见该条。

72795 益母丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】益母草一斤 川芎一两 赤芍一

两 归身一两 术香一两

【用法】炼蜜为丸，如弹子大，每丸三钱重。

【主治】胎前产后百病。

72796 益母丸

【方源】《灵验良方汇编》卷上。

【组成】益母草四两 白术一两 条芩八钱

【用法】炼蜜为丸，如弹子大。清汤送下；虚人，安胎饮送下。可以常服。

【主治】孕妇诸证。

【加减】有气，加木香；胸膈不舒，加紫苏、陈皮。

72797 益母丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】益母草四十斤（熬成膏约三斤）真龟胶一斤（蛤粉炒） 白当归二斤 川芎一斤（俱蒸熟）

【用法】上药三味为末，入益母膏为丸，每丸重三钱，晒干，瓷瓶收贮。胎动不安，蕲艾汤送下；催生，砂仁三钱煎汤送下；产后血块痛，红花汤送下；血晕，山楂汤送下；虚脱及血崩，人参汤送下；产后痰多，昏乱不知人事，醋炒红花汤送下；月水先期，或一月两次，或恹恹不息，人参、条芩、杜仲汤送下；月水过期，非红非紫，桃仁、红花汤送下；赤带，用赤鸡冠花，白带，用白鸡冠花煎汤送下；血枯，红花汤送下；肉淋，黄连、人参汤送下；吐血，黄芩、侧柏汤送下；便血，地榆汤送下；虚损，熟地、白芍、陈皮汤送下；阴虚，潮热往来，沙参汤送下；骨痛，地骨皮汤送下；男人白浊，三角酸煎汤送下；梦遗，茯神、杜仲、白鸡冠汤送下；脚、跟肿，皮脱出水，牛膝汤送下；心痛，桃仁汤送下；血虚头痛，川芎、白芍汤送下；腰痛，杜仲汤送下；腰痛胁胀，气冲胸塞，芍药、杜仲汤送下。

【主治】胎动不安，难产，产后血气痛，血晕，血崩虚脱，产后痰多，昏乱不知人事，月经先期或过期，赤白带下，血枯，肉淋，吐血，便

血，虚损，阴虚潮热，骨痛，白浊，梦遗，足跟痛，心痛，血虚头痛，腰痛胁胀，气冲胸塞。

72798 益母丸

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】益母草八两（不犯铁器，摘、碎，风干，为末） 当归 川芎 赤芍 木香（忌火） 清陈阿胶各一两（蛤粉炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，胎前腹痛，胎动下血不止，寒热往来，状如疟疾，米汤化下；胞衣不下，炒盐汤化下；产后中风，无灰酒化下；气喘恶心，两肋疼痛，温酒化下；身热，手足顽麻，百节疼痛，温米汤化下；眼黑血晕，青盐汤化下；腹有血块，童便酒化下；产后痢疾，米汤化下；泻血，枣酒化下；白带，胶艾汤化下；血崩，糯米汤化下。

【主治】妇人经闭，胎前产后诸疾。

72799 益母丸

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】益母草四两 当归四两

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心白滚汤送下。

【功用】预防小产。

72800 益母丹

【方源】《肯堂医论》卷下。

【组成】山楂末三钱

【用法】浓煎益母草汤、陈酒和童便调下。第一日服三服，二日服二服，三日服一服，第四日、第五日山楂末减半，第六日、第七日去山楂末，只服三味，第八日止药。

【功用】产后服之，百疾不生。

72801 益母汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】益母草（锉）一大剂 川芎 当归各二钱

【用法】水煎，去滓，入黄酒、童便各一盞服。

【功用】大有补益，去旧生新。

【主治】产后恶露不尽，攻冲心腹，或作眩

晕,或寒热交攻。

72802 益母汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】苍术 杜仲 枸杞 羌活 茯苓 当归 陈皮 羊藿 川芎各一钱半 白术 姜炭各一钱 干葛三钱 甘草三分

【用法】松杉节、茄根为引。

【主治】酒伤脾胃,四肢痿软作战,或筋搐痛。

72803 益母汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍(酒炒) 熟地(姜汁炒) 条芩 陈皮 香附(醋炒) 阿胶(蛤粉炒)各一钱 益母草 白术(去芦)各一钱半 玄参 蒲黄(炒)各八分 甘草四分

【用法】上锉一剂。水煎,空心服。

【主治】妇人血崩。

72804 益母汤

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】熟地 陈皮 香附 阿胶 益母草 白术 蒲黄 甘草 黄芩各一钱

【用法】水煎,空心服。

【功用】凉血补血。

【主治】血崩。

72805 益母饮

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】益母草 人参 白术 炒姜 黄耆 炙甘草 当归

【用法】以水一盏半,煎一盏,温服。

【主治】行堕胎药不能产,恶寒战慄如灌水,虽蒙重被,尚鼓颌不止,须臾反烦热如灼,虽寒天欲得凉风,或腰腹疼痛,乍来乍止,其来也,如刺如割,如绞如啮,而流汗如雨,呻吟不已,或又渴好热汤,而阴门下瘀液臭汁。

72806 益母散

【方源】《幼幼新书》卷三十六引《婴童方》。

【组成】益母草(烧)二两 盐花(炒)一两 伏龙肝半两

【用法】水调涂。

【主治】痈疖。

72807 益母散

【方源】方出《妇人良方》卷十二,名见《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》。

【异名】干地黄散(《普济方》卷三四四)。

【组成】生地黄 益母草各一两 当归 黄耆各半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盏,加生姜四片,煎至六分,去滓,不拘时候服。

【主治】妊娠从高坠下,腹痛下血,烦闷。

72808 益母散

《普济方》卷三四九。即《圣惠》卷八十“益母草散”。见该条。

72809 益母散

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】益母草(开花时采)

【用法】上为细末。每服二钱,空心温酒下,一日三次。

【主治】带下赤白,恶露下不止。

72810 益母散

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】白芷 当归 滑石各一钱 益母草三分 肉桂八分 麝香一分

【用法】水煎,温服。

【主治】胎前不降生,临产水干,孩子不下。

72811 益母煎

【方源】《医方类聚》卷二一二引《肘后方》。

【异名】益母草膏(《赤水玄珠》卷二十)。

【组成】益母草不拘多少

【用法】以竹刀切,洗净,银器中煎成,瓷器中密封之。以酒服。

【主治】一切血病,产妇及一切伤损。

72812 益光散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】寒水石八钱 菟丝子三钱 知母三钱 玄参五钱 石决明四钱 车前子三钱(外包) 大生地六钱 寸冬三钱 川芎二钱 梔子三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝火太盛，肾水亏乏，耗散真阴，瞳神渐渐缩小。

72813 益血丹

【方源】《元戎》。

【组成】当归（酒浸，焙） 熟地黄各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。细嚼，酒送下。

【主治】久虚亡血，大便燥。

72814 益后汤

【方源】《辨证录》卷三十三。

【组成】茯苓一两 白芍一两 地榆三钱 穿山甲一片（土炒，为末） 山药一两 薏仁一两

【用法】水煎服。连服四剂而肛门宽快，又四剂内外之痔尽消。再将前方每味加增十倍，修合丸散，以蜜为丸，每日未饮之先，滚水送下五钱。服一料自然全愈，不再发也。

【主治】痔漏。

72815 益多散

【方源】《医心方》卷二十八引《古今录验》。

【组成】生地黄（洗，薄切一寸，以清酒渍令淡，乃捣为屑）十分 桂心二分 甘草五分（炙） 术二分 干漆五分

【用法】上为末。每服方寸匕，食后以酒下，一日三次。

【主治】男子腰屈发白，横行伛偻。

72816 益阳丹

【方源】《普济方》卷三十三引《洗洗方》

【组成】丁香二钱 木香三钱 木通二钱（去皮） 远志一两 石莲肉半两 麦门冬半两（去心） 白茯苓半两 龙骨（煨）一两半 夏半两（切作小粒，用大猪苓半两同炒色黄，去猪苓） 茴香半两（用斑蝥十四个，去翅足，同炒黄色，去斑蝥）。

【用法】上为末，同酒煮山药入砂盆内杵干下，丸如梧桐子大。每服四十丸，空心盐酒或盐汤送下。

【主治】丈夫心肾不交，阳气萎弱，才交即

泄，梦遗白浊。

72817 益阳丹

《普济方》卷二一九。为《千金》卷二十“苁蓉补虚益阳方”之异名。见该条。

72818 益阳散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】丁香枝杖 藿香 零陵香 吴茱萸 甘松 紫稍花 菟丝子 桂 蛇床子 笏香 木香 杜狗脊各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞半，煎三五沸，乘热熏洗。须在密室中，勿令见风，仍温暖盖覆。

【主治】湿冷乘袭下部肿痛。

72819 益阳散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】天南星

【用法】上为末。每服三钱，加京枣二个，同煎服。

【主治】小儿吐泻不止，或攻伐过多，四肢发厥，虚风不省人事。

72820 益阴丹

《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。为《三因》卷十八“济阴丹”之异名。见该条。

72821 益阴丹

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】黑豆一升（炒熟，去皮） 香附子末四两半 干姜（炮） 生干地黄各一两

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒、米饮送下。

【功用】补理。

【主治】血虚、血劳、血气、血风。

72822 益阴汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】山萸 地黄 丹皮 芍药 麦冬 五味 山药 泽泻 灯草 地骨皮 莲子

【主治】里虚，盗汗有热。

72823 益阴散

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】黄柏 黄连 黄芩(以蜜水浸,炙干) 白芍 人参 白术 干姜各三钱 甘草(炙)六钱 雨前茶一两二钱

【用法】香油釜炒红,为末。每服三四钱,红米饮下。

【主治】阳浮阴弱,咯血,衄血。

72824 益阴煎

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】生地三钱 知母 黄柏各二钱 龟版四钱(酥炙) 缩砂仁 甘草(炙)各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】妇人四十九岁后,天癸不行,因血热复来者。

72825 益阴煎

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】熟地 巴戟天 破故纸 淡苁蓉 杜仲 杞子 菟丝子 山萸 覆盆子 葡萄肉 鹿角霜

【主治】龟背。

72826 益欢散

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为《古今医鉴》卷六引李同峰方“金蟾散”之异名。见该条。

72827 益寿丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】人参六两 破故纸六两(芝麻炒香熟) 何首乌一斤八两 秦当归六两(酒洗) 五加皮六两 川牛膝六两 生地黄六两 枸杞子六两

【用法】上药各为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,白汤送下。

【主治】补虚,益寿。

72828 益寿丹

《普济方》卷二二四。为原书同卷“神仙巨胜子丸”之异名。见该条。

72829 益寿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】附子三两 肉桂三两 法夏一两

陈皮一两 羊腰三对 虎骨八两 吴萸三两(盐水炒) 川椒一两 白附子一两 小茴香一两 白术三两 苍术二两 艾绒一两 当归三两(酒洗) 破故纸二两 香附一两五钱(生) 川芎一两五钱 杜仲四两(盐水炒) 续断二两 巴戟天一两 黄耆一两五钱 党参一两五钱 香附一两五钱(炙) 酒芍一两 五加皮一两五钱 益智一两 蒺藜一两五钱 川楝一两 桂枝一两 天生磺三两(飞好) 干鹿尾三条 胡芦巴一两 川乌一两 鹿角八两 云苓二两 川萆薢一两 肉豆蔻一两五钱 菟丝一两 干姜一两 茵陈一两 胡桃仁二两 公丁香一两 生姜三两 五味一两 枸杞二两 大葱头三两 缩砂仁一两 甘草一两

【用法】用麻油十五斤炸枯药,去滓,熬至滴水成珠,入飞净黄丹五斤十两成膏。

【功用】延年益寿。

72830 益志汤

【方源】《三因》卷八。

【异名】益智汤(《准绳·类方》卷六)。

【组成】鹿茸(酥涂炙,去毛尽) 巴戟(去心) 熟干地黄(酒浸) 枸杞子 苁蓉(酒浸) 牛膝(酒浸) 附子(炮,去皮脐) 桂心(不焙) 山茱萸 白芍药 防风(去叉) 甘草(炙)各等分

【用法】上为散。每服四大钱,水一盂半,加生姜五片,盐少许,煎七分,去滓,食前服。

【主治】右肾虚寒,小便数,腰肋引痛,短气咳逆,四肢烦疼,耳鸣,面黑,骨间热,梦遗白浊,目眩,诸虚困乏。

72831 益肝汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 白术 牛膝 川断 山药 木瓜 远志 乌药 乳香

【功用】调荣卫,和气血。

【主治】经正行而男女交合,败血不出,精

射胞门，精与血搏，入于任脉，留于胞中，轻则血沥不止，阴络伤则血内溢，重则瘀血积聚，少腹硬起作痛，小便频涩，病似伏梁，甚则厥气上冲，奔窜胸膈，病似癫状，终身不愈。

72832 益肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 半夏 柴胡 黄芩 草决明 甘草 蒺藜 胆草 楮实子

【用法】水煎，食后服。

【主治】乌风内障。

72833 益肝煎

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】柴胡（醋炒）一钱 丹参（酒炒）三钱 生左牡蛎四钱 乌药一钱 制香附一钱 当归三钱（小茴五分拌炒） 琥珀八分 桑叶一钱 巨胜子三钱 荔枝五枚

【用法】水煎服。

【主治】肝经病，痞满，噎逆呕哕，心胃疼痛，腹满。

【加减】如气虚者，加生地、沙参、砂仁；血虚者，加生地、川芎、白芍；金不制木者，加百合、天冬；水不涵木者，加杞子、菊花；心火夹杂者，加川连；如木旺土衰者，加白术（土炒），天仙藤、茯神。

72834 益君汤

【方源】《简明医彙》卷三。

【组成】当归 白芍药 生地黄 熟地各二钱 人参五分 白术 茯苓 麦冬 梔子 陈皮各八分 甘草三分 乌梅一个

【用法】加炒米百粒，水煎成，调辰砂（水飞）五分，临睡服。

【主治】心血少而嘈者。

72835 益肾丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】胡芦芭 破故纸 川楝子（同牡蛎炒，去蛎取肉） 鹿茸 熟地黄 益智仁 山茶萸 代赭石各七钱五分 海螵蛸 龙骨 熟艾 丁香（尚好者） 沉香 乳香各五钱 禹余粮 赤石脂各七钱五分

【用法】上为末，糯米粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用菖蒲汤空心送下。

【主治】下元虚，小便频数者。

72836 益肾散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】甘遂（以面包，不令透水，煮百余沸，取出，用冷水浸过，去面，焙干）

【用法】上为细末。每服三钱，以猪腰子细批破，以盐、椒等物淹透烂切，掺药在内，以荷叶裹，烧熟，温淡酒调下。

【功用】泻下。

72837 益肾散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】益智散（《丹溪心法》卷四）、益肾膏（《普济方》卷五十三）。

【组成】磁石（火烧醋淬七次，研细，水飞） 巴戟 大川椒（开口者）各一两 沉香 石菖蒲各半两

【用法】上为细末。每服二钱，用猪肾一只，细切，和以葱白、少盐并药，湿纸十重裹，煨令香熟，空心嚼，以酒送下。

【主治】肾虚耳聋。

72838 益肾膏

《普济方》卷五十三。为《直指》卷二十一“益肾散”之异名。见该条。

72839 益肺丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参三钱 白术三钱 当归三钱 麦冬五钱 北五味三分 柴胡五分 荆芥五分 山药三钱 芡实三钱

【用法】水煎服。四剂而脾胃元气开，又四剂而咳嗽之病止，又服四剂痠疼之疾解，又四剂潮热汗出之症痊，再服十剂气旺而各恙俱愈。

【主治】多言伤气，咳嗽吐痰，久则气怯，肺中生热，短气嗜卧，不进饮食，骨脊拘急，疼痛发痠，梦遗精滑，潮热汗出，脚膝无力。

72840 益肺汤

【方源】《诚书》卷七。

【组成】牡丹皮 桑白皮(蜜炙) 荆芥穗(炒) 紫菀 当归 枇杷叶(洗净,蜜炙) 白芍药 藕节 玄参 丹参 甘草 橘红

【用法】水煎服。

【主治】衄血不止。

72841 益肺汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】麦冬二两 天门冬五钱 生地 玄参各一两

【用法】水煎服。

【主治】肾火乘肺,两目生翳,其色淡绿,瞳子痛不可当。

72842 益肺汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】北沙参 煅牡蛎 归身 白芍 白术 茯苓 炙草 白及 淮山药 麦冬 玉竹

【主治】疹后虚喘声嘶。

【加减】痰多者,加川贝母、苏子、米仁、广皮;气虚极者,加蜜炙黄耆、大生地。

72843 益肺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】糯米炒黄 阿胶 黄耆各一两

【用法】上为细末。每服二钱,煎鹿胶汤调下,不拘时候。

【功用】调益肺胃,收敛营卫。

72844 益肺散

【方源】《普济方》卷一五九。

【组成】麻黄(去节)一两 五味子 杏仁(去皮尖,炒) 甘草(炙) 陈皮各半两

【用法】每服三钱,水一盞,加生姜五片,煎七分,去滓,食后服。

【主治】肺寒咳嗽,声重多涕,发喘。

72845 益经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地一两(九蒸) 白术一两(土炒) 山药五钱(炒) 当归五钱(酒洗) 白芍三钱(酒炒) 生枣仁三钱(捣碎) 丹皮二钱 沙参三钱 柴胡一钱 杜

仲一钱(炒黑) 人参二钱

【用法】水煎服。

【主治】年未七七,由于心、肝、脾之气郁,经水先断。

72846 益荣丹

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】当归二两(去芦,酒浸,焙) 紫石英(火煅醋淬七次,研细)一两 桑寄生 柏子仁(炒,另研) 酸枣仁(去壳) 小草 木香(不见火) 茯苓(去木) 桑寄生 卷柏叶(酒炙) 熟地黄(洗净,酒蒸,焙) 龙齿各一两(另研) 辰砂半两(另研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七十丸,食前用麦门冬汤送下。

【功用】滋血助心。

【主治】思虑伤心,忧虑伤肺,血少气虚,目涩口苦,唇燥舌咸,怔忡,白浊。

72847 益荣汤

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】当归(去芦,酒浸) 黄耆(去芦) 小草 酸枣仁(炒,去壳) 柏子仁(炒) 麦门冬(去心) 茯神(去木) 白芍药 紫石英(细研)各一两 木香(不见火) 人参 甘草(炙)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,大枣一个,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】思虑过度,耗伤心血,心帝无辅,怔忡恍惚,善悲忧,少颜色,夜多不寐,小便或浊。

72848 益荣汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【异名】养荣汤(《赤水玄珠》卷二十八)、养血益荣汤(《杂病源流犀烛》卷二)。

【组成】人参 当归(酒洗) 红花(酒洗) 甘草 赤芍(桂水炒)

【用法】水煎服。

【主治】疹子之出,浑身如锦纹色白者。

72849 益荣汤

【方源】《胎产良方》。

【组成】当归一钱 川芎一钱 生地五分 香附八分 荆芥六分 焦杜仲八分 续断七分 山萸肉八分 茯苓八分 陈皮三分 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】产后恶露不断。

72850 益荣煎

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】党参三钱 白芍一钱(醋炒) 枣仁一钱(炒) 柏子仁一钱(炒去油) 黄耆三钱(炙) 茯神二钱 远志五分 甘草一钱 当归身三钱(炒) 木香五分 紫石英二钱(研)

【用法】生姜三片,大枣二个为引。

【主治】怔忡。

72851 益胃丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】缩砂仁 川姜(炮,洗) 陈皮(去白) 厚朴(去皮,锉,姜制炒) 丁香各二两(不见火) 白术四两(炒) 肉豆蔻一两半(面裹煨) 半夏二两半(汤泡七次)

【用法】上为细末,好面糊为丸,如梧桐子大。每服五六十丸至百丸,空心姜汤或橘皮汤送下。

【主治】脾气胃气俱虚,中脘停痰,呕啰不止。

72852 益胃丹

【方源】《幼幼新书》卷二十一引张涣方。

【异名】沉香豆蔻丸(《百一》卷十九)、沉香丸(《普济方》卷三九七)。

【组成】沉香(炮) 当归(焙) 木香 白术(炮)各一两 白芍 蓬术 砂仁 人参各一两

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。每服十丸至十五丸,点麝香汤送下。

【功用】调冷热,和脾胃。

【主治】冷热不调。

72853 益胃汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】丁香 人参 桂心 阿胶

【用法】上为细末。每服一钱,水六分盏,加生姜三片,同煎至四分,温服。

【主治】小儿胃虚身热,呕吐不止。

72854 益胃汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄耆 甘草 半夏各二分 黄芩 柴胡 人参 益智仁 白术各三分 苍术一钱半 当归稍 陈皮 升麻各五分

【用法】上咬咀。水二大盏,煎至一盏,去滓,食前稍热服。

【主治】头闷,劳动则微痛,不喜饮食,四肢怠惰,躁热短气,口不知味,肠鸣,大便微溏,黄色,身体昏闷,口干不喜食冷。

【宜忌】忌饮食失节,生冷硬物、酒、湿面。

【备考】本方方名,《医方集解》引作“参术益胃汤”。

72855 益胃汤

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】丁香 人参(去芦头)各一两 诃黎勒皮一分 官桂 大黄(炮黑黄)各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一小盏,加生姜二片,煎至五分,去滓温服。

【主治】胃虚挟热,呕吐不止。

72856 益胃汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】当归 茯苓 白术 陈皮 黄耆 甘草 防风 升麻

【主治】齿病,胃气伤者,喜热而恶寒。

72857 益胃汤

《医级》卷八。为《内外伤辨》卷中“升阳益胃汤”之异名。见该条。

72858 益胃汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】沙参三钱 麦冬五钱 冰糖一钱 细生地五钱 玉竹(炒香)一钱五分

【用法】水五杯,煮取二杯,分二次服,滓

再煮一杯服。

【主治】阳明温病，下后汗出，胃阴受伤。

72859 益胃散

【方源】《内外伤辨》卷十一。

【异名】温胃汤（《脾胃论》卷下）、温胃散（《医部全录》卷四三八）。

【组成】陈皮 黄耆各七钱 益智仁六钱 干生姜 白豆蔻仁 泽泻 姜黄各三钱 缩砂仁 甘草 厚朴 人参各二钱

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，煎至七分，食前温服。

【主治】服寒药过多，或脾胃虚弱，胃脘痛。

72860 益胃散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】木香 丁香 藿香 陈皮 缩砂 白豆蔻仁各一分 甘草（炙）一钱

【用法】上为细末。每服二钱，煎姜、枣汤乘热调下。

【功用】快膈益脾，止呕进食。

72861 益胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】黄连 五味 乌梅 生甘草各五分 炙甘草三分 升麻二分

【主治】每饮食即出汗者。

【宜忌】忌湿面、酒、五辛。

72862 益胆丸

【方源】《古今名方》。

【组成】郁金 120 克 玄参 滑石粉 明矾 金银花各 100 克 火消 210 克 甘草 60 克

【用法】上为末，为丸。每服 1.5 克，一日二次。

【功用】行气散结，排石通淋。

【主治】胆结石，肾结石，膀胱结石，尿道结石，阻塞性黄疸及肾炎，胆囊炎。

72863 益胆汤

【方源】《普济方》卷三十四引《圣惠》。

【异名】泄热益胆汤（《圣济总录》卷四十二）。

【组成】黄芩 甘草（炙）各二两 人参 桂（去皮）各一两 苦参 茯苓（去皮）各五钱

【用法】上药治下筛。每服三钱，水一盏半，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】泄热。

【主治】肝胆俱虚，热气上熏，口中常苦。

72864 益胆汤

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】黄芩（去朽） 甘草（炙） 人参 各一钱 官桂五分 苦参 茯神各三分 远志（取肉去骨）七分

【用法】上切细，作一服。水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】谋虑不决，肝胆虚气上溢则口苦。

72865 益神丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】硫黄（洒甘草水研一日） 木香 肉豆蔻（去壳） 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 干姜（炮）各一两

【用法】上为末，和匀，用糯米粥为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心酒送下。

【功用】补元脏。

【主治】久冷。

72866 益神散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤加丁香 半夏曲

【主治】吐食，不纳谷气。

72867 益神散

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】川楝子 炒麦芽 炒枳壳 使君子肉（醋制炒） 炒乌药 炒枳实 炒猪苓 炒山楂 炒川朴 炒泽泻 炒槟榔各四两大黄（酒制炒） 莪术（醋制炒） 三棱（醋制炒） 胡黄连（炒） 青皮（炒）各一两二钱五分 青矾（隔纸炒） 六曲（醋制炒）各八两 干漆（炒绝烟） 苍术（醋制炒）各七钱五分 四制香附十二两 针砂五

钱 陈皮一钱五分

【用法】上为极细末。每服一钱，清晨用黄沙糖拌和，开水调下。

【主治】小儿肚大青筋，已成痞积，及妇人经水不调。

72868 益真丸

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】人参 黄耆 吴白术各半两 木香一分 熟干地黄六钱 鳖甲四钱 当归（去苗） 白芍药 白茯苓 阿胶（炒成珠子） 鹿角霜各三钱 桑寄生二钱 枳实一钱（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，清汤送下，一日两次，不拘时候。

【主治】痰嗽。

72869 益真丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《烟霞圣效》。

【组成】天门冬 麦门冬（各去心） 干地黄 车前子 枸杞子 人参 补骨脂（炒） 茴香（炒香）各等分

【用法】上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前温酒或盐汤送下；米饮亦得。

【功用】久服利九窍，益精气，悦颜色，长精神，明耳目，壮筋骨，美饮食，养肺气，通血脉。

【主治】诸虚不足，五劳七伤，面色无光，饮食无味。

72870 益损汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】熟地黄一钱五分 当归身一钱二分 白芍 茯苓 白术（蜜炙） 陈皮各一钱 人参 知母各八分 黄柏七分 甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】生育过多，血海干枯，经闭。

72871 益脑散

【方源】《外台》卷三十六引刘氏方。

【异名】益脑地榆散（《圣惠》卷八十六）。

【组成】地榆六分 蜗牛十二分（熬） 青黛三合 麝香一分 人粪（烧灰） 兰香根（烧灰） 蚬蛇胆各一分 龙脑香二豆许

【用法】上为散。每服半钱匕，以饮下。

【主治】孩子头干，肚中有无辜者。

72872 益脑散

【方源】《颅凶经》卷上。

【异名】益脑吹鼻地榆散（《圣济总录》卷一七二）。

【组成】地榆（炙） 虾蟆（烧）各一分 蜗牛壳二十个 青黛 石蜜各二分 麝香二大豆许

【用法】上为末，吹鼻。当有黄水出。

【主治】孩子脑疳鼻痒，毛发作穗，面色赤。

【宜忌】忌甜物。

72873 益容丸

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】使君子（取肉，锉碎，焙干） 厚朴（去粗皮，米泔浸） 芎藭 橘红 甘草各二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂角子大。二岁以上服一丸，以下服半丸，陈米汤化下，不拘时候。

【主治】小儿五疳羸瘦，发热白黄，或脾虚减食，泄泻无时，腹痛。

72874 益黄汤

《集验良方》卷五。为《小儿药证直诀》卷下“益黄散”之异名。见该条。

72875 益黄散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】补脾散（原书同卷）、益黄汤（《集验良方》卷五）。

【组成】陈皮（去白）一两 丁香二钱（一方用木香） 诃子（炮，去核） 青皮（去白） 甘草（炙）各五钱

【用法】上为末。三岁儿服一钱半，水半盏，煎三分，食前服。

【主治】脾胃虚弱，脾疳，腹大身瘦。

72876 益黄散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆二钱 陈皮(去白) 人参各一钱 芍药七分 生甘草 熟甘草各五分 黄连少许

【用法】上为细末。每服二钱 水一盞，煎至五分，食前服。

【主治】胃中风湿。

72877 益黄散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤加诃子 陈皮

【功用】调中进食。

【主治】脾胃虚弱，腹肚泄利。

72878 益黄散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】陈皮(去白) 肉豆蔻(炮)各五钱 丁香二钱 诃子肉(炮，去核)二钱 甘草二钱半

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，煎七分，空心温服。

【主治】脾虚受冷，水谷不化，泄泻注下，盗汗出多。

72879 益黄散

【方源】《痘治理辨》。

【组成】丁香 诃子(煨) 青皮(去瓢) 陈皮(去白) 木香各一分

【用法】上为细末。每服一钱，水半盞，煎至三分盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃冷呕吐，脾虚泄泻，或因疮烦躁，渴饮冷水过多，致伤脾胃。

72880 益黄散

【方源】《幼科类萃》卷五。

【组成】陈橘皮一两 青橘皮 诃子肉 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，煎至六分，食前温服。

【主治】小儿脾疳泄泻。

72881 益黄散

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参(去芦) 白扁豆(去皮，炒) 黄耆各一钱 茯苓一钱半 神曲(炒)二钱 石莲肉(炒)一分 白芷 木香 甘草各五分 藿香叶三叶

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】呕逆吐泻，不进饮食，久则羸弱，将成慢惊。

72882 益智丸

【方源】《普济方》卷四十一引《护命》。

【组成】益智子(去皮) 萆薢 狗脊(去毛) 芎藭 巴戟天(去心) 干木瓜 续断 牛膝(酒浸，切，焙)各半两 附子(炮裂，去皮脐，大者)一枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心盐汤送下。

【主治】小肠虚寒，小便后余沥，阴萎不起。

72883 益智丸

【方源】《普济方》卷二一六引《仁存方》。

【组成】益智仁四两(以盐二两同炒，为末)

【用法】糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前用白茯苓、甘草煎汤送下。

【主治】心肾不足，夜多小便，眼见黑花。

72884 益智丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】朱子读书丸。

【组成】石菖蒲(一寸丸节)一两 橘红(去白)七钱 甘草二钱五分 当归身五钱 人参七钱 茯神一两 远志(去心，用甘草汤浸一宿)一两

【用法】上为细末，面糊为丸，如金凤子大，朱砂为衣。每服五丸，卧时用灯心汤送下。

【功用】益智。

72885 益智丸

【方源】《保婴撮要》卷六。

【组成】益智仁 茯苓 茯神各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心白滚汤送下。

【主治】脾肾虚热，心气不足；亦治白浊。

72886 益智汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】益智仁四斤半 京三棱(煨)一斤半 干姜(炮)三两 青皮 蓬莪茂 陈皮各十二两 甘草(炒)十五斤 盐(炒)十六斤半

【用法】上为细末。每服一钱，沸汤点下，不拘时候。

【功用】常服顺气宽中，消宿冷，调脾胃。

【主治】一切冷气，呕逆恶心，脐腹肋肋胀满刺痛，胸膈痞闷，饮食减少。

72887 益智汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】益智(去皮) 乌头(炮裂，去皮脐)各一两 青橘皮(汤浸，去白，焙)各三分 麻黄(去根节) 干姜(炮)各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，盐半钱，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒四肢厥冷，其脉沉细。

72888 益智汤

【方源】《杂类名方》。

【组成】干生姜四两 杏仁一斤(炒) 白面三斤(炒) 甘草七两(炒) 盐三两(炒，旋加) 益智仁三两 京三棱一两 青皮 陈皮各二两 蓬莪茂一两

【用法】上为极细末。白汤点服。

【主治】破伤见血。

72889 益智汤

《准绳·类方》卷六。为《三因》卷八“益志汤”之异名。见该条。

72890 益智汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】陈皮 茯苓 白术(蜜炙) 甘草(炙) 苍术(制)二钱 益智仁(盐水炒) 柴胡各一钱 升麻五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】胃中浊气渗入膀胱，白淫时常随小便而出，浑浊如米泔。

72891 益智酒

【方源】《普济方》卷二十九引《指南方》。

【组成】益智(为末)

【用法】用好酒浸两宿，去药，微温酒服。

【主治】肾虚寒，小便数。

72892 益智散

【方源】《局方》卷三。

【组成】益智仁(去皮)二两 干姜(炮)半两 青皮(去白)三两 川乌(炮，去皮脐)四两

【用法】上为散。每服三钱，水二盏，入盐一捻，生姜五片，大枣二个(擘破)，同煎八分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒阴盛，心腹痞满，呕吐泄利，手足厥冷；及一切冷气奔冲，心胁脐腹胀满绞痛。

72893 益智散

【方源】《普济方》卷二八四引《护命》。

【组成】益智子(去皮) 甘草(炮)各一两 荆三棱三两(捶碎，醋一挑煮干，焙) 蓬莪术二两 川芎二钱

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生葱、桂枝同煎取九分，空心和滓吃；小肠气痛，葱酒送下。

【主治】一切冷气，小肠气，诸般不和之气。

72894 益智散

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】益智(去皮，炒) 蓬莪茂(煨，锉) 京三棱(煨，锉) 青橘皮 陈橘皮(二味并汤浸，去白，炒) 白茯苓(去黑皮)各一两 人参 甘草(炙，锉)各半两 木香一分 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)一两一分

【用法】上为散。每服一钱匕，入盐少许，沸汤点下，不拘时候。

【主治】脾胃虚冷，积聚沉结，宿食不消。

72895 益智散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】牡蛎 人参 厚朴 甘草 花粉

龙骨 白及 陈皮 赤芍 益智仁 黄耆
川芎 当归 熟地 雄鸡肫胗 山药 黄芩

【功用】补血固肾。

【主治】膀胱气虚，小便数，或遗尿不知。

【加减】肾气虚寒者，加补骨脂、肉豆蔻、远志肉，除黄芩，花粉。

【方论选录】是方参、耆、陈、草以补气，芎、归、芍、地以补血，牡蛎、白及、龙骨以止数固遗，益智仁、山药缩泉，鸡肫胗性涩而治便数遗溺，花粉、黄芩以清妄行之热，厚朴、陈皮行气温胃。胃和水谷分利，荣卫平复矣。

72896 益智散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】益智（去壳） 甘草

【用法】上为末。干咽下，或沸汤点下。

【主治】心气不足，口臭。

72897 益智散

《丹溪心法》卷四。为《直指》卷二十一“益肾散”之异名。见该条。

72898 益智散

《幼幼集成》卷四。为《育婴秘诀》卷四“益智仁散”之异名。见该条。

72899 益脾丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】葛花二两 小豆花一两 绿豆花半两 木香一分

【用法】上为细末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎红花汤送下。或夜饮，津液下五丸，不醉大妙。

【功用】饮酒不醉，益脾胃。

72900 益脾汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参一钱 山药五钱 芡实三钱 巴戟天三钱 砂仁一粒 半夏三分 茯苓二钱 扁豆一钱 神曲一钱 肉果一枚 白术三钱

【用法】水煎服。服三月胃气开，再服三月脾气壮，但见有益不知有损矣。

【主治】脾气受损，不食则腹中若饥，食则若饱闷，吞酸溏泻，日以为常，遂至面色萎黄，吐痰不已。

72901 益脾饼

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】白术四两 干姜二两 鸡内金二两 熟枣肉半斤

【用法】上药四味，白术、鸡内金皆用生者，每味各自轧细焙熟，再将干姜轧细，共和枣肉，同捣如泥，作小饼，木炭上炙干。空心时当点心细嚼咽下。

【主治】脾胃湿寒，饮食减少，长作泄泻，完谷不化。

72902 益脾散

【方源】《得效》卷十一。

【组成】白茯苓 人参 草果仁 苏子（微炒） 木香（湿纸裹，热火内煨） 甘草 陈皮 厚朴（去粗皮，姜汁炒）

【用法】上锉散。每服一钱，加生姜一片，红枣一个，米乳前服。合滓乳母服。

【主治】和胃，进乳，消痰。

72903 益脾散

【方源】《普济方》卷三六〇。

【组成】四君子汤加陈皮 厚朴 木香 生姜 大枣

【用法】水煎服。

【功用】和胃。

【主治】噤风。用控痰汤取吐后，胃气不和者。

72904 益脾散

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】鳊鱼（炙干，为末） 肉果（煨去油，为末）

【用法】每服五分，清米汤送下。

【主治】痢久不止。

72905 益脾散

【方源】《观聚方要补》卷十。

【组成】白术二钱半 甘草五分 苡仁 泽泻 神曲 半夏 茯苓各八分 赤豆一百

粒 薄荷 茵陈各二分

【用法】姜水煎服。

【功用】补中行湿。

【主治】小儿水肿。

【加减】元气不足，加人参。

72906 益瞳丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】萸肉二两（去净核） 野台参六钱 柏子仁（炒）一两 玄参一两 菟丝子一两（炒） 羊肝一具（切片，焙干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，开水送下，一日二次。

【主治】目瞳散大昏耗，或觉视物乏力。

72907 益母草丸

《普济方》卷三一九。即《圣惠》卷七十“益母草煎丸”。见该条。

72908 益母草丸

《校注妇人良方》卷二十。为《本草纲目》卷十五引《产宝》“济阴返魂丹”之异名。见该条。

72909 益母草汁

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】益母草一握（洗）

【用法】上研取汁。少灌耳中。

【主治】耳聋。

72910 益母草汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】益母草散（《普济方》卷三四八）。

【组成】益母草（干者）一两 藕节（干者） 人参各半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】产后血运烦闷。

72911 益母草汤

【方源】《古今医彻》卷四。

【组成】益母草一钱五分 当归一钱 杜仲一钱（盐水炒） 牛膝一钱 川芎五分 丹皮一钱 香附一钱（醋炒） 茯苓一钱 山楂一钱半 广皮一钱 炒熟砂仁末一钱

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】产后恶露未尽，腹疼痛者。

【加减】甚者，加桃仁、玄胡、红花。

72912 益母草饮

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】生益母草不拘多少（洗，锉）

【用法】上捣取汁。每取三二分服之。以滓敷痛上，干则易。

【主治】小儿痈疮肿痛。

72913 益母草散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】益母草一两 人参半两（去芦头） 黄芩半两（锉） 葛根半两（锉） 生干地黄半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血虚烦渴，口干心躁。

72914 益母草散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】益母草 干藕节 红花子各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后恶血冲心，烦闷多渴。

【备考】本方方名，《普济方》引作“益母散”。

72915 益母草散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】益母草一两 赤芍药 桂心 当归（锉，微炒） 川大黄（锉，微炒） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）各三分 牛膝（去苗） 蒲黄 苏枋木（锉）各半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，在于腹中不散，身体烦闷，及腹内疔刺疼痛不可忍。

72916 益母草散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】益母草灰一合 胡黄连半两 川升麻一分 牛黄半分(细研) 麝香一分(细研) 人中白一分(烧灰) 黄柏一分(锉)

【用法】上为细散。净揩齿后，用药少许，干掺齿龈上，一日三次。

【主治】小儿疳疔，蚀口齿，骨出。

72917 益母草散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】益母草(开花时采，阴干)

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下，一日三次。

【主治】妇人赤白恶露下不止，久不愈。

72918 益母草散

【方源】《普济方》卷三四八引《仁存方》。

【组成】生益母草汁三合(根亦可) 生地黄汁三合 童便一合 鸡子清一个

【用法】上煎药汁令热，入鸡子清搅匀，作一服。

【主治】产后血晕心闷乱，恍惚如见鬼。

72919 益母草散

《普济方》卷三四八。为《圣济总录》卷一六〇“益母草汤”之异名。见该条。

72920 益母草膏

《赤水玄珠》卷二十。为《医方类聚》卷二一二引《肘后方》“益母煎”之异名。见该条。

72921 益母草膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】益母草(鲜，干的亦可)四百八十两 川芎四十八两 白芍四十八两 当归四十八两 生地八十八两 木香十六两

【用法】上切，洗净泥土，水煎三次，分次过滤后去滓，合并滤液，用文火煎熬，浓缩至膏状，以不渗纸为度，每两清膏汁再兑炼蜜一两成膏。每服三至五钱，开水调下。

【功用】调经，祛瘀生新。

【主治】经期不准，血色不正，量少腹胀，产后瘀血腹痛。

72922 益母草膏

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【异名】坤膏、坤草膏。

【组成】益母草若干

【用法】于端午日采紫花方茎之益母草，连根洗净，于石臼内捣烂，以布滤取浓汁，入砂锅中，文武火熬成膏，如沙糖色为度。用遮光瓶装或瓷缸存贮。每服一匙，用红糖水冲下；或用黄酒冲下。

【功用】去瘀生新。

【主治】经血不调，恶露不尽。

【宜忌】孕妇忌服。

72923 益容仙丹

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】淡秋石五两 白礞砂二两五钱 片脑一钱五分 薄荷五两 柏子肉五钱 牛黄五分 哈芙蓉二分 甘松五钱 膈肭脐五分(酥炙) 朱砂一两五钱(水飞细末) 粉草一斤(去皮，熬膏)

【用法】上药各为细末，粉草膏子为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每次一丸，噙化，以致津液满口，咽下，不拘早晚。

【功用】浇灌诸经，辅正祛邪，光泽肌肤，久服百病不生。

72924 益智子汤

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】益智仁二十四枚

【用法】上为末，水一中盏，加盐少许，同煎服。

【功用】益气安神，补不足，安三焦，调诸气。

【主治】遗精虚漏，小便余沥，夜多小便。

72925 益智子汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】益智仁四十九粒 白茯苓(去皮)二钱

【用法】水二钟，煎八分，加盐一捻，空心温服。

【主治】肾虚遗溺。

72926 益智子散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】益智子一两（去皮） 沉香三分 赤茯苓三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 白术三分 槟榔三分 紫苏子三分（微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 木香半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脾气虚滞，心腹胀闷，四肢烦疼，少思饮食。

72927 益智子散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】益智子 川乌头（炮裂，去皮脐） 肉桂（去皴皮） 当归（锉，微炒） 干姜（炮裂，锉） 细辛 高良姜（锉） 甘草（炙微赤，锉） 各半两 前胡一两（去芦头） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒，曾经发汗吐下，寒气未退，脾胃气虚，胸膈烦满，手足逆冷。

72928 益智子散

【方源】《圣惠》卷三十九。

【组成】益智子三分（去皮） 缩砂三分（去皮） 香薷三分 草豆蔻三分（去皮） 丁香半两 干木瓜三分 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服一钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，微温细呷之。

【主治】饮酒过多，腹胀满不消，心下痞急妨闷。

72929 益智子散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】益智子一两（去皮） 附子三分（炮裂，去皮脐） 缩砂三分（去皮） 白豆蔻半两（去皮） 丁香一分 黄耆三分（锉） 白术三分 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参半两（去芦头） 桂

心半两 白茯苓半分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 川芎三分 高良姜三分（锉） 藿香三分 当归三分（锉碎，微炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妇人肠胃久虚，气弱多欲呕吐，全不下食，四肢无力。

72930 益智仁汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】益智仁 干姜（炮） 甘草（炙） 茴香（炒） 各三钱 乌头（炮，去皮） 生姜各半两 青皮（去白）二钱

【用法】上咬咀。每服四钱，水二盏，加盐少许，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】肾经有积冷，疝痛，连小腹挛搐，叫呼不已，其脉沉紧。

72931 益智仁汤

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】益智仁 石菖蒲 白茯苓 莲子肉 陈皮 缩砂仁 半夏曲 木香 厚朴（制）各二钱 甘草（炙）一钱

【用法】上锉细。每服一钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏煎服，不拘时候。

【功用】益火生土，增进饮食。

72932 益智仁散

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】益智仁 白茯苓各等分

【用法】上为末。每服一钱，空心米汤调下。

【主治】小儿遗尿；亦治白浊。

72933 益智仁散

【方源】《育婴秘诀》。

【异名】益智散（《幼幼集成》卷四）。

【组成】益智仁 破故纸（炒） 白茯苓各等分

【用法】上为细末。盐汤调服。

【主治】遗尿。

72934 益智仁散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】益智仁 补骨脂 白茯苓 乌药

【用法】上为末。每服一钱，米饮送下。

【主治】遗尿。

72935 益智煮散

《普济方》卷二十一。为《圣济总录》卷四十五“益智仁煮散”之异名。见该条。

72936 益卫运化汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参（少者，或用沙参） 蜜耆二钱 桂心七分 麦冬 车前子各一钱 小茴（盐炒）五分 升麻（盐炒）四分 茯苓一钱半 怀牛膝八分

【用法】水煎，顿服。服后用手指探喉取呕。

【主治】产后气虚，膀胱不能运化，小便闭塞。

72937 益卫养荣汤

【方源】《伏温症治》。

【组成】鲜生地四钱 麦冬六钱 天冬三钱 金石斛三钱 杭菊花三钱 金银花三钱 薏苡仁六钱 桑寄生三钱 冬桑叶三钱 玄参三钱

【功用】清肺益卫，滋阴养荣。

【主治】伏温证后期，身微热，口微渴，头项微痛，四肢痿废，不能起坐，脉数而微弱者。

【加减】筋骨疼痛者，加萆薢、秦艽、通草；手指蠕动者，加钩藤；臂痛者，加嫩桑枝一尺。

72938 益元七宝丹

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】何首乌赤白各一斤（用米泔水浸一日，竹刀刮去皮，打块如棋子大） 牛膝八两（用黑豆五升，木甑沙锅蒸三次，晒三次，为末，加盐一二钱同浸） 枸杞子八两（酒浸，洗净，晒干，为末） 茯苓赤白各一斤（赤者用牛乳浸、白用人乳浸一宿，晒干，研末） 兔丝子八两（酒浸三日，晒干，为末） 破故纸八两（炒干，为末） 当归八

两（酒浸一宿，晒干，为末）

【用法】上药俱不犯铁器，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，早晨空心酒送下，午后姜汤送下，临卧盐汤送下。

【功用】去五脏杂病，生津液，健体轻身，益精明目，乌发固齿，壮阳增力。

72939 益元固真汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参 白茯苓 莲蕊 巴戟 益智仁 黄柏（酒炒） 升麻各二钱 山药 泽泻各一钱半 甘草梢二钱

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】纵欲强留不泄，淫精渗下而作淋者。

72940 益元透肌汤

《种痘新书》卷十二。为《痘疹金镜录》卷四“益元透肌散”之异名。见该条。

72941 益元透肌散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】桔梗 紫草茸 川芎 山楂 当归 茯神 牛蒡子 甘草 僵蚕 陈皮 糯米五十粒

【用法】水一钟，加灯心十四根，大枣二个，煎六分，温服。

【主治】痘疹四日，见点已齐，气血和平，但不肥大、不成浆者。

【加减】第五日如无别症，加黄耆；第六日，加人参、白术，去紫草、牛蒡子；第七日如面上浆水足，去桔梗，加丹皮；第八日，加山药、米仁，其浆自足。

72942 益元透肌散

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【异名】益元透肌汤（《种痘新书》卷十二）。

【组成】桔梗 紫草 川芎 山楂 木通 人参 甘草 糯米五十粒 蝉蜕 鼠粘子 陈皮

【用法】水一钟，加灯心十四根、大枣二个，煎六分，温服。

【功用】匀气解毒，透肌达表，领出元阳，

助痘成浆，易结脓窠。

【主治】痘证壅热。

72943 益元凉肌散

《痘疹会通》卷五。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”之异名。见该条。

72944 益元资始丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】人参 肉苁蓉 远志肉 杜仲 淮山药 熟地黄 山萸肉各四两 鹿角胶 菟丝子 牛膝 川巴戟 鱼胶 补骨脂 白茯苓 女贞实各三两 五味子、桂心 柏子仁 青盐各一两 附子 枸杞子 巨胜子各二两 牡丹皮 白蒺藜各八两 鹿茸全副

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，清晨空心淡盐汤送下。

【功用】补益。

72945 益元散邪汤

【方源】《会约》卷三。

【组成】当归二三钱 白芍（煨）一钱半 陈皮一钱 白术 熟地各三四钱 山药二钱 甘草（炙）一钱 黄耆（蜜炒）一钱半 麻黄（去节）八分 桂枝一钱 生姜（煨）一钱半

【用法】水煎，热服。略盖以取微汗。

【主治】元气太虚，脉大无力，外感寒邪，憎寒壮热，身痛头痛。或呕恶泄泻。

【加减】头痛，加川芎、白芷各一钱，北细辛二分；泄泻，去当归，加草薢四钱，茯苓一钱，木香（煨）三分；三阳并病，加柴胡二钱。

72946 益气开痰汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】淮耆（炙）一钱 玉竹（炙）一钱半 白术一钱 当归一钱半 半夏一钱 羊藿一钱半 胆星一钱 茯神一钱半 石膏一钱 枣仁一钱 槟榔一钱 甘草四分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】酒伤腹痛，发叫如狂，人事不知，四肢痛搐，口流涎沫。

72947 益气止血方

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】党参 白术 黄精 三七粉

【功用】补脾益气，兼以止血。

【主治】脾虚崩漏。

72948 益气止淋汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参 杜仲 续断各三钱 制益智 茯苓各二钱 炒前仁 甘草梢各一钱半 升麻八分

【用法】水煎服。

【功用】补气升提。

【主治】妊娠数月，小便频数而痛，尿量不减，色白有时呈淡黄色，欲解不能，腰部作胀，舌淡苔正常，脉缓无力。

72949 益气内消散

【方源】《回春》卷八。

【异名】抑气内消散（《寿世保元》卷九）。

【组成】当归 川芎 白芍（酒炒） 白术（去芦） 青皮（去瓢） 陈皮 半夏（姜炒） 桔梗 羌活 白芷 独活 厚朴（姜汁炒）各八钱 防风 黄芩 乌药 香附 槟榔各一两 苏叶一两半 沉香二钱 木香 人参 粉草各五钱

【用法】上锉。水煎，温服。服十余剂即消；若再服，照分量制酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，酒送下。

【主治】瘰癧并诸瘤结核。

72950 益气分清饮

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】明党参三钱 香薷四钱 茅苍术四钱 泽泻三钱 升麻二钱 车前子四钱 草果三钱 伏龙肝三钱 广砂三钱 木通三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】霍乱吐止泻不止者。

【方论选录】方用香薷为君，暖中宫，消暑气；以党参、苍术、广砂、草果、甘草、灶土为臣，和其脾胃；以升麻、泽泻为佐，升

清降浊；以车前、木通为使，分其清浊，其吐泻自止矣。

72951 益气左金汤

《外科证治全书》卷二。为《金鉴》卷六“益气清金汤”之异名。见该条。

72952 益气安胎饮

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】黄耆 党参 糯米 白术 菟丝子 续断 白芍 甘草 苎麻根 莲房炭

【功用】益气养血安胎。

【主治】气血两虚，胎动不安。

72953 益气安神汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】黄连八分 生地黄 麦门冬（去心） 酸枣仁（炒） 远志（去心） 人参 黄耆（蜜炙） 淡竹叶 胆星各一钱 小草六分 当归一钱二分 茯神（去皮木）二钱一分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎服。

【主治】七情六淫相感而心虚，夜多梦寐，睡卧不宁，恍惚惊怖痰癎。

72954 益气导源汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】茯苓四钱 泽泻三钱 广缩砂三钱 大腹皮四钱 升麻三钱 茅苍术四钱 车前子四钱（炒） 木通三钱 猪苓三钱 通草一钱

【用法】水煎，温服。

【功用】健脾利水。

【主治】气水肿胀。

【宜忌】忌盐。

【方论选录】此方以苍术为君，大健其脾胃；以茯苓、广砂为臣，培养其脾胃；以泽泻、升麻、腹皮为佐，升降其上下内外之水气；以猪苓、车前、木通、通草为使，直导其水气由小便出，小便一利，肿胀自愈矣。

72955 益气导溺汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参五钱 白术二钱 扁豆 云苓各三钱 桂枝一钱 炙升麻一钱 甜桔梗一钱半 通草二钱 台乌一钱半

【用法】水煎，温服。

【功用】补气升提。

【主治】妊娠气虚下陷，小便不通，脐腹胀痛，面色苍白带青，心悸气短，神倦食少，舌淡苔白，脉沉滑无力。

72956 益气收乳汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】党参 黄耆 当归 白芍 麦冬 山茱萸 甘草

【功用】补气养血，佐以固摄。

【主治】气虚，乳汁自漏。

72957 益气收浆汤

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】何首乌 白芍 黄耆 桔梗各二钱 人参七分 白术三钱 陈皮 砂仁 甘草各一钱 山楂肉一钱二分

【用法】米泔水煎服。

【主治】痘不收靥。

72958 益气时症丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】藿香叶一两五钱 橘皮六钱 香薷六钱 厚朴（制）六钱 砂仁六钱 泽泻六钱 于术六钱 苏叶六钱 木瓜六钱 苍术（炒）四钱 檀香四钱 法半夏八钱 茯苓八钱 扁豆八钱 滑石八钱

【用法】上为细末。每十两三钱细末，兑沉香粉六钱，混和均匀，炼蜜为丸，重三钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】扶正气，祛暑湿，理胃肠。

【主治】夏令感受暑邪，发烧发冷，头痛眩晕，内伤饮食，呕吐作泄，肚腹疼痛。

72959 益气快中丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】沉香 木香各三两 大黄 槟榔 厚朴 干姜 使君子 干漆 当归 麦芽

雷丸 小茴 大茴 茯苓 芫花 皂角 巴霜各一两 丁香 麝香 黄连各三钱 人参酌用

【用法】上为末，陈老炒米磨面一斤，以滴醋、烧酒各一斤半，打糊为丸，如豌豆大，阴干，收瓷器，勿走药气。每服三分，空心白滚汤送下。病甚者，早、晚二服，弱者只宜服三五丸，壮者十服为止，亦可间日一服，小儿每服三五丸。

【主治】胃脘疼痛，饱闷膨胀，膈噎，痞积癥瘕，惊风吐泻，诸气积聚。

【宜忌】孕妇忌服。

72960 益气补元汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参五钱 白术 茯神 熟地各四钱 酒白芍 黄耆各三钱 肉桂五分 甘草(炙)一钱

【用法】水煎服。

【功用】补气摄血。

【主治】劳伤气血，经血暴下，面色苍白，心悸气短。

【加减】口干咽燥，去肉桂，加阿胶三钱，艾叶一钱半；血久不止者，加广三七五分。

72961 益气补冲汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参五钱 白术 云神各四钱 秦归三钱 熟地四钱 黄耆 枸杞 菟丝甘草(炙)各三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】气血双补，兼滋肝肾。

【主治】气血亏甚，经闭数月，皮肤干燥不润，形体消瘦，心累气短，动则喘逆，头晕目眩，腰痠无力，食少，舌质淡，苔正常，脉缓无力。

72962 益气补肾汤

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】人参 黄耆(蜜炙)各一钱二分 白术二钱 白茯苓一钱 甘草(炙)五分 山药 山茱萸肉各一钱半

【用法】水二钟，加大枣二枚，煎八分，食前服。

【主治】淫欲过度，肾家不能纳气归元，使诸气逆奔而上，头痛眩晕。

72963 益气补肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】阿胶二钱(蛤粉炒) 五味子五分 地骨皮 天冬 麦冬 人参各二钱 百合三钱 贝母 茯苓各二钱 苡仁四钱

【用法】加糯米一撮，煎汤代水饮。

【主治】肺劳。肺气大虚，身热气短，口燥咽干，甚则咳嗽吐血。

72964 益气补漏汤

【方源】《顾氏医经》卷四。

【组成】人参 白芍 黄芩 生地 益母川断 甘草

【主治】气虚胎漏。

72965 益气固阴汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】党参 玉竹 白术 熟地 川续断 沙苑子 杞子 黄耆(炙) 当归 白芍

【主治】小儿头软块。

72966 益气固肠丸

《回春》卷六。即原书同卷“收带六合丸”之异名。见该条。

72967 益气固精丸

【方源】《医部全录》卷三三一引《杂兴方》。

【组成】破故纸(酒浸，春三、夏一、秋二、冬五日，焙，研末) 金银花各二两 还筒子 芡实各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤、温酒任下。

【功用】补血，黑发，益寿。

72968 益气保生丸

【方源】《点点经》卷一。

【组成】真神曲(系六月六日造者良，研细，用黑羊肉二斤，煮烂取汁，去滓，炒曲文武火焙干人药)一斤 当归(酒洗)四两 白

芍(乳蒸)一两 川芎(童便、葱汁炒)三两 生地(酒炒)一两 白术(土炒)二两 茯苓(乳蒸)三两 陈皮(童便炒)二两 远志(猪心血炒)二两 车前子(盐水炒)二两 黄耆(蜜炙)三两 秦艽(蜜炙)三两 怀膝(酒炒)三两 杜仲(盐水炒)三两 粉葛(醋炒)一两 麻仁(乳蒸,童便炒)三两 黄芩(酒炒)三两 天冬(童便炒)二两 肉苁蓉(去甲,童便炒)三两 金箔(搗细和匀)三百张

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,早晨开水送下。

【功用】调补。

【主治】伤酒。

72969 益气养元丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄耆十两 白术(麸炒)十五两 升麻五两 柴胡五两 山药五两 党参(去芦)十两 当归十两 甘草五两 橘皮十两 人参(去芦)二两五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重三钱。每服一丸,温开水送下,一日二次。

【功用】培养元气,健脾和胃。

【主治】元气亏损,脾胃虚弱,身体疲倦,精神不振。

72970 益气养荣汤

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 人参 白术 白茯苓 甘草 桔梗 橘皮 贝母 香附 黄耆 柴胡

【用法】水二钟,加生姜三片,大枣二个,煎八分,温服。

【功用】止咳嗽,补气血。

【主治】《保婴撮要》:气血损伤,四肢颈项等处患肿,不问软硬赤白痛否,日晡发热,或溃而不敛者。

72971 益气养荣汤

【方源】《慈幼心传》卷下。

【组成】人参 白术 川芎 当归 生地

白芍 柴胡 贝母 黄耆 桔梗 金银花 皂角刺 夏枯草

【用法】水煎服。

【主治】恶核瘰癧,溃不收口。

72972 益气养荣汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参 当归各四钱 香附(醋炒)一钱二分 干膝(捶碎,炒令烟尽)一钱半 干姜(炒) 肉桂各一钱 陈皮(去白)七分

【用法】水煎服。

【主治】产后气血虚弱,风冷所乘,搏于脏腑,积聚为患。

【加减】如无参者,加黄耆(蜜炒)三五钱;如坚结不能化者,加三棱(醋炒)一钱半,莪术(火炮)一钱半。或多服不应,须用丸药渐磨之法。

72973 益气养神汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】人参 当归 白芍(酒炒) 知母(去毛) 麦门冬(去心) 梔子(炒)各一钱 陈皮五分 生甘草 升麻各三分 前胡 白茯苓(去皮)各七分

【用法】上锉剂。加大枣一个,水煎,食远温服。

【主治】伤寒新愈,方起劳动应事,或多言劳神而微复动热者,曰劳复。

72974 益气养营煎

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】川芎 生甘草节各一钱 当归 银花 茯苓 生黄耆各二钱 炙山甲一钱五分 荆芥八分

【用法】加葱一支,酒半杯,早、晚每投一剂。外治须急聚根脚,中敷玉枢丹,四围以坎宫锭敷之。更加用生葱一两,黄蜜三钱,大远志肉八钱,捣烂成饼,重汤蒸热,贴于患处。

【主治】疽患漫肿多日,脚散顶平。

72975 益气养脾汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】黄耆二钱 白术一钱 条参 当归 玉竹 茯苓 生地 陈皮 薄荷各一钱半 红花 地榆各五分 甘葛二钱 甘草三分

【用法】生姜、大枣为引，小儿胎发一团，烧灰存性，兑服。

【主治】酒毒伤肺，大肠下血，饮食减少，人渐消瘦，后脏红肿，疙瘩坚硬。

72976 益气除风汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】黄耆 12 克 白术 当归 白芍各 9 克 防风 僵蚕各 6 克

【功用】补中益气，养血除风。

【主治】气虚受风之上胞下垂。起病较急，忽然上胞下垂，痒如虫行，头痛，目眩。

72977 益气健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】人参三两 白术三两 陈皮一两半 炙甘草八钱 枳实一两半 白茯苓二两

【主治】脾弱不能运化，四肢倦怠，面色萎黄，口淡耳鸣，食少。

【加减】大便泄泻，加山药、扁豆、炒莲肉；甚者，加肉豆蔻。

72978 益气健脾汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参二钱 白术一钱五分（去芦，土炒） 白茯苓（去皮）三钱 陈皮二钱 白芍（炒）三钱 苍术一钱五分（米泔浸） 干姜（炒黑）八分 诃子（煨）二钱 肉桂（面裹煨）六分 升麻（酒洗）四分 甘草（炙）八分

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】气虚泄泻，饮食入胃不住，完谷不化。

【宜忌】忌油腻。

【加减】腹痛加桂。

72979 益气健脾汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 陈皮 半夏 山楂 神曲 苡仁 泽泻

【主治】脾胃气虚，饮食少。

【加减】症非泄泻下痢，宜加当归；气虚甚者，加黄耆、炮姜；滞重者，加厚朴。

72980 益气润燥丸

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】熟地六两 杏仁（炒，去皮尖） 枳壳（炒） 橘红各二两五钱 阿胶（炒） 苁蓉各半两 苏子 荆芥各一两 当归三两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心白汤送下。

【主治】阴虚便秘，气脱里急后重，作恶干呕，渴而索水，饮食不进。

72981 益气调荣汤

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】人参三分 当归二分 陈皮二分 熟地黄二分 白芍四分 升麻二分 黄耆五分 半夏（泡）三分 白术二分 甘草（炙）二分 柴胡二分 麦门冬三分

【用法】上咬咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】中风，肩膊痛久尚未痊愈者。

【宜忌】忌食辛热之物。

【备考】本方方名，《普济方》引作“调胃汤”。

72982 益气培元饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】大熟地 制杜仲各三钱 丹皮八分 茯苓一钱二分 淮山药二钱 建泽泻五分 柴胡六分 当归 山萸肉 枸杞子 炒白芍各一钱五分 甘草梢一钱

【用法】加姜皮半分，南枣三个，水煎服。

【主治】遗精白浊，溺下砂淋，茎中痒痛，腰膝痠痛诸证。

72983 益气救脱汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】人参 三七粉

【功用】峻补元气，止血固脱。

【主治】产后气虚血崩之轻证。

72984 益气清金汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】益气左金汤（《外科证治全书》卷二）。

【组成】苦桔梗三钱 黄芩二钱 浙贝母（去心，研） 麦冬（去心） 牛蒡子各一钱五分（炒研） 人参 白茯苓 陈皮 生栀子（研） 薄荷 甘草各一钱（生） 紫苏五分

【用法】加竹叶三十片，水三钟，煎一钟，食远服，滓再煎服。

【主治】喉瘤。

72985 益气清脏汤

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】人参 当归 条芩 黄连 生地 赤芍药 槐角 川芎 升麻 枳壳 秦艽 白术 茯苓 甘草

【用法】水二钟，加生姜一片，灯心二十根，水煎服。

【主治】痔漏。

72986 益气散风汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参 黄耆各三钱 甘草 半夏各一钱 白术五钱 柴胡二钱 茯苓三钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】气虚伤风，头痛发热，身疼腰重，骨节俱痠疼，恶风无汗。

72987 益气滑胎丸

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】赤茯苓一两 赤芍药一两 槟榔一两 川芎半两 诃黎勒皮三分 枳实半两（麸炒微黄） 川大黄一两（铤，微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【功用】妊娠令易产。

【备考】本方方名，《普济方》引作“滑胎丸”。

72988 益气疏风汤

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】升麻 甘草 当归 川芎 生地 白芍 桔梗 天花粉 黄芩 麦冬 前胡 青皮 干葛 紫苏 连翘 防风

【用法】水煎服。

【主治】肺经受热，多语损气，喉瘤生于喉间两旁，或单或双，形如圆眼大，血丝相裹如瘤。

72989 益气聪明汤

【方源】《东垣试效方》卷五。

【组成】黄耆 甘草各半两 芍药一钱 黄柏一钱（酒制，铤，炒黄） 人参半两 升麻 葛根各三钱 蔓荆子一钱半

【用法】上咬咀。每服三钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，临卧近五更再煎服之。得肿更妙。

【功用】令目广大，久服无内外障、耳鸣耳聋之患。又令精神过倍，元气自益，身轻体健，耳目聪明。

【主治】饮食不节，劳役形体，脾胃不足，得内障，耳鸣或多年目暗，视物不能。

【宜忌】忌烟火酸物。

【加减】如烦闷或有热，渐加黄柏，春、夏加之，盛暑夏月倍之，如脾胃虚去之。

【方论选录】《医方集解》：参、耆甘温以补脾胃；甘草甘缓以和脾胃；干葛、升麻、蔓荆轻扬升发，能入阳明，鼓午胃气，上行头目。中气既足，清阳上升，则九窍通利，耳聪而目明矣；白芍敛阴和血，黄柏补肾生水。盖目为肝窍，耳为肾窍，故又用二者平肝滋肾也。

72990 益火生光汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】丽参3克 茯苓9克 远志3克 炙甘草6克 巴戟天 肉苁蓉各9克 肉桂1.5克

【功用】温肾助阳，开心明目。

【主治】心虚目瞑。因思虑过度，损伤心脾，或命门火衰，神光不能生发而致双目不痛不痒，不红不肿，羞明怕光，不时瞑目，重者双目紧闭，欲睁不能；有时忽然睁开，如常人之状，瞬间复闭如故，眦部淡赤或呈虚浮，神光内沉，瞳神微昏。或兼心悸失眠，或兼五更泄泻，阳萎滑精。

【加减】若兼心悸、失眠，可加炒枣仁 12 克，以养心安神；若兼阳萎、滑精，可加芡实、锁阳各 9 克，以固肾涩精；兼五更泻泄者，可加煨肉蔻 9 克，以温中止泻。

【方论选录】方中丽参、茯苓、远志、炙甘草补心气以发神光；丽参、茯苓、炙甘草且能健脾补中以助脾阳；巴戟天、肉苁蓉温肾阳以助命门相火；肉桂辛甘大热，以补火助阳。心脾、肾三经之阳气充沛，神光生有源、发有力，眼睑运动自如，何羞明、目瞑之有？

72991 益火散寒汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】肉桂一钱半 干姜（炮）一钱 桂枝八分 羌活七分 苍术一钱 秦艽二钱 防风一钱 甘草八分 陈皮八分

【用法】生姜为引服。

【主治】寒邪外中，身体切痛，脉弦紧者。

【加减】寒甚者，加附子；手臂痛甚，加片子姜黄、海桐皮；寒邪滞者，加麻黄、白芍。

72992 益心止遗丸

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】熟地一斤 山药一斤 芡实一斤 生枣仁五两 巴戟天二两 麦冬三两 北五味三两 莲子半斤（同心用）

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每服一两，白滚汤送下。

【主治】遗精。

72993 益水平火汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 生地一两 麦冬一两 玄参一两 菖蒲一钱

【用法】水煎服。一剂而痛止，二剂而响息，

三剂而痊愈、耳不再聋。

【主治】肾水不足，肾火上冲，耳中如针触而生痛，耳聋。

【方论选录】前四味乃补水之药，又能于水中泻火，且不损伤肾气，则肾火自降；菖蒲引肾气而上通，火得路而上达，又何有阻抑之虞乎！此方治已聋者尚有奇功，矧治未聋之耳，有不取效者哉！

72994 益本滋肾丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄柏（去粗皮） 知母（去毛，各锉碎，酒洗）各等分

【用法】上为极细末，水为丸，如梧桐子大。每服一百五十丸，空心热汤送下，服后以干物压之。

【主治】眼昏暗，将成内障。

72995 益母八珍汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参（去芦，米炒） 净白术 当归各二钱 白茯苓 白芍（酒炒）各一钱半 熟地三钱 川芎一钱 益母草一钱半 炙草一钱 生姜二片 大枣二枚

【主治】月经不调，或前或后。

72996 益母止啼汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】人参 黄耆 当归 麦冬 橘红 甘草

【主治】子鸣。妊娠七八月，忽然儿啼腹中者。

72997 益母四物汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】熟地黄 当归 白芍（酒炒） 川芎 益母草 黄芩（酒炒） 黄连（姜汁炒） 白术（蜜炙）各一钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】胎漏，内热作渴者。

72998 益母地黄汤

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【异名】生地黄汤（《医级》卷九）。

【组成】生地 益母草各二钱 当归 黄耆(炒)各一钱

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】妊娠跌坠,腹痛下血。

72999 益母佛手散

【方源】《胎产要诀》卷二。

【组成】川芎一钱 益母草(忌铁器)二钱 当归身(酒洗,去芦)七钱

【用法】临月之时可常服。

【功用】胎前调理。

【加减】虚,加人参。

73000 益母草子散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】益母草子一两 桂心半两 当归三分(锉,微炒) 赤芍药半两 熟干地黄半两 大麦蘖半两(微炒) 鬼箭羽半两 红蓝花半两 川大黄三分(锉,微炒) 赤鲤鱼皮灰半两 乱发灰半两 密陀僧半两(烧醋淬过) 虻虫一两(去翅足,微炒) 水蛭一两(炒令黄) 麝香一分(研入)

【用法】上为细散,以赤马尿半中盏,酒半中盏,拌和前药令匀,直候干,研入麝香。每服二钱,食前以温酒调下。

【主治】产后恶血稽留,经久未消,致月水不通,面色萎黄,脐腹疼痛,肌瘦无力。

73001 益母草子散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】益母草子半两 刘寄奴半两 芸蓂子二分(微炒) 肉桂三分(去粗皮) 没药半分 当归半两(锉,微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,以水酒各半中盏,煎至五分,和滓热服,不拘时候。

【主治】产后恶血,腹内疼痛,口干心烦。

73002 益母草汁粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】益母草汁二合,生地黄汁二合 藕汁二合 生姜汁半合 蜜二合 白梁米一合(水淘,研令细)

【用法】先以水一大盏,煮米作粥,次入诸

药汁,更煎三二沸。每服二合,一日三次。

【主治】产后虚劳,血气不调,腹肚绞痛,血晕昏愤,心热烦躁,不多食。

73003 益母草饮子

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】益母草汁二合 地黄汁二合 淡竹沥一合 童便一合 红蓝花半两 紫葛半两(锉)

【用法】先以水一大盏,煎后二味至五分,去滓,入诸药汁,更煎三二沸,分温四服,不拘时候。

【主治】产后血运,烦闷,气欲绝。

73004 益母草饮子

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】益母草绞汁

【用法】每服半升。

【主治】妊娠热病,胎死腹中。

73005 益母草涂方

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】益母草灰一升

【用法】以醋和为团,以炭火煨七度后,入乳钵中研细,用蜜和匀,入盒中。每至临卧时,先浆水洗面,后涂之。

【功用】令面光白润泽。

【主治】面黧黯。

73006 益母草煎丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】益母草二斤 青蒿二斤 桃枝一握(长一尺) 柳枝一握(长一尺)(以上四味细锉,用童便一斗,于银铛中,煎至三升,绞去滓,煎成膏) 柴胡二两(去心) 朱砂一两(细研,水飞过) 天灵盖一两(涂酥炙令微黄) 鳖甲二两(涂醋炙令黄,去裙襕) 木香一两 赤芍药二两 犀角屑二两 甘草一两(炙微赤,锉) 麝香半两(细研) 桃仁五两(汤浸,去皮尖双仁,生研如膏)

【用法】上为末,用益母草煎都和捣为丸,如梧桐子大。每服三十丸,用乌梅、甘草煎

汤送下，不拘时候。

【主治】妇人骨蒸劳瘦，月候不通，心神烦热，四肢疼痛，不能饮食。

【备考】本方方名，《普济方》引作“益母草丸”。

73007 益母草煎丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】益母草汁一升 青蒿汁一升 无灰酒一升 生姜汁三合 童便一升 蜜五合（以上同于银器中，慢火熬成膏） 柴胡一两（去苗） 人参三分（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 琥珀三分（细研） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 地骨皮三分 白术三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 桔梗半分（去芦头） 当归半分 赤芍药一两 生干地黄一两 鬼箭羽一两 麝香一分（细研）

【用法】上药前六味熬成膏；余药为末，用熬成膏和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温水送下。

【主治】妇人热劳烦闷，四肢疼痛，经脉滞涩，腹肋妨闷，不欲饮食。

73008 益母种子丸

【方源】年氏《集验良方》卷五。

【组成】益母草（上截）十两 人参二两 白术（土炒，去芦）四两 归身四两（酒洗） 白茯苓三两 川芎二两 熟地四两（砂仁酒炒） 白芍（酒炒）二两 生草二两 木香二两 砂仁二两（炒）

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每空心服三钱。

【主治】妇人一切月水不调，气血两虚，不孕。

73009 益母胜金丸

《医钞类编》卷十六。为《医学心悟》卷三“益母胜金丹”之异名。见该条。

73010 益母胜金丹

【方源】《医学心悟》卷三

【异名】益母胜金丸（《医钞类编》卷十六）。

【组成】熟地 当归各四两 白芍（酒炒）三两 川芎一两五钱 牛膝二两 白术 香附（酒、醋、姜汁、盐水各炒一次） 丹参 茺蔚子各四两 益母草一斤（酒、水各半，熬膏）

【用法】炼蜜为丸。每早服三钱，开水送下，晚服二钱，用清酒送下。

【主治】女人经血不调，及室女经闭成损。

【加减】经水后期而来，小腹冷痛为寒，加肉桂五钱；经水先期妄行，自觉血热，加丹皮二两，酒炒条芩五钱；凡遇经水作痛，乃血凝气滞，加玄胡索一两。

73011 益母毓麟丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】当归 熟地各四两 党参 鹿角霜 白术 茯苓 川断 杜仲 香附 白芍 菟丝子各二两 川芎 川椒 甘草各一两

【用法】加蜜二十两为丸服。

【主治】妇人血气俱虚，经水不调，腹痛腰痠，饮食不甘，瘦弱不孕及赤白带下。

73012 益血和中散

【方源】《古方汇精》。

【组成】败龟版（煨存性）

【用法】每服三钱，糖拌，好酒送下。尽醉即消。

【主治】乳岩，乳疔初起。

73013 益血润肠丸

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】熟地黄六两 杏仁（炒，去皮尖）麻仁各三两（以上三味俱杵膏） 枳壳（麸炒） 橘红各二两五钱 阿胶（炒） 肉苁蓉各一两半 苏子 荆芥各一两 当归三两

【用法】上为末，以前三味膏同杵千余下，仍加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心白汤送下。

【主治】①《准绳·类方》：年高老人，大便秘涩。②《活人方》：久病及老年肾水虚寒，精枯血竭，脾肺之元气虚，失统运转导之用，里

急后重,时泄清水。

73014 益血润肠丸

【方源】《鳞爪集》卷二。

【组成】当归四两 生地四两 熟地四两 桃仁四两 生军二两 枳壳四两 杏仁四两 麻仁四两 厚朴四两 黄芩四两 熟军二两 甘草二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五六十九丸,空心白汤送下。

【功用】祛风养血。

【主治】老人虚人,津液亡,大肠秘。

73015 益血润肠汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地四钱 麻仁二钱 枳壳(去瓢,麸炒)一钱 肉苁蓉(酒洗,去甲)二钱 杏仁(杵)一钱 当归三钱 阿胶(蛤粉炒)一钱五分

【主治】阴结。凡虚弱及老人大便不通者。

73016 益阴去邪汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】陈皮一钱半 半夏二钱 茯苓一钱半 甘草一钱 当归二钱 沙参二钱 女贞子二钱 熟地三钱 山药一钱半 生姜一钱半

【用法】水煎服。

【主治】阴虚脉弱,外感咳嗽,或肾气不足,水泛为痰。

【加减】便不实者,去当归,加白术一钱半;寒甚而嗽不止者,加细辛四分;喘急者,加麻黄七分,白芍一钱,以防麻黄之重表也。

73017 益阴生血汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】熟地一两 茺萸 白术 白芍 麦冬各五钱 人参三钱 白芥子三钱 五味子五分

【用法】水煎服。

【主治】血虚不能养筋,左手半边不仁,语言謇涩,口角流涎。

73018 益阴地黄丸

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】生地黄 熟地黄各二两 茯苓一两 泽泻五钱 牡丹皮 山茺萸 当归各一两 柴胡五钱 五味子三钱 山药一两 菊花五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。空心盐汤化下。

【主治】水不足而目不明。

73019 益阴地黄丸

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一斤 山药八两 麦冬十两 北五味三钱 山茺萸八两 丹皮六两 茯苓六两 地骨皮十两 泽泻四两

【用法】炼蜜为丸服。服本方一年,永不再发。

【功用】补肾水,退肾火。

【主治】肾水不足,虚火冲入咽喉,痰中吐血如丝,服化丝汤血止后,善后调理。

73020 益阴地黄丸

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】六味地黄丸加当归 北五味

【主治】临经发热,尺部脉弱,阴不足,阳气下陷子阴中。

73021 益阴利产方

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】阿胶八两 赤小豆一升

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服三四钱,温酒送下。

【主治】难产累日,脉微数。

【方论选录】产妇阴血不足,无以荣养其胎,故欲产之时,累日不能遽下。阿胶补阴血之不足,小豆降心气之有余,蜜以丸之,酒以行之,使心肾交通,则水火既济而沟满渠通,安有产难累日不下之忧哉。

73022 益阴补气丸

《原机启微》卷下。为《兰室秘藏》卷上“益阴肾气丸”之异名。见该条。

73023 益阴肾气丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】益阴补气丸《原机启微》卷下。

【组成】泽泻 茯苓各二钱五分 生地黄（酒洗，干） 牡丹皮 山茱萸 当归稍（酒洗） 五味子 干山药 柴胡各五钱 熟地黄二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，淡盐汤送下。

【主治】眼目内障。

【备考】本方方名，《摄生秘剖》引作“明目地黄丸”。

73024 益阴肾气丸

【方源】《四明心法》卷中。

【组成】熟地（自制杵膏） 山药 萸肉 丹皮 茯苓 泽泻 五味 当归 生地（酒拌杵膏）

【用法】上为末，入二膏加炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】诸脏亏损，发热晡热，潮热盗汗；或寒热往来，五心烦热；或口干作渴，月经不调；或筋骨疲倦，饮食少思；或头目不清，痰气上壅，咳嗽喘甚，胸膈痞闷；或小便赤数，两足热痛；或脚足痿软，肢体作痛。

【备考】本方方名，《成方切用》引作“抑阴地黄丸”。

73025 益阴肾气丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】泽泻 茯神 生地 丹皮 山药 当归 柴胡 熟地 人参 山萸肉 五味子 远志各五钱 石菖蒲四钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五十丸，空心盐汤送下，一日三次。

【主治】肾阴心阳两虚，目昏不痛，日日出暴泪。

73026 益阴固本丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】熟地八钱 丹皮三钱 山萸肉四钱 淮山药四钱 云苓五钱 泽泻三钱 金樱子五钱 菟丝子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二钱，米汤送下。

【功用】固精。

【主治】肾阴亏损，虚火上炎，阳萎，遗精，滑精，目眩。

73027 益阴固本丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】熟地四两 山萸肉二两 丹皮二两 茯苓四两 白术二两（土炒） 菟丝子二两 黄连五分 肉桂三分 芡实二两 金石斛五钱 牡蛎八钱（煅） 莲须二两 杭芍五钱 淮山药四两（炒） 麦冬八钱（去心）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】滋补肾阴，收涩固精，交通心肾，兼顺中州。

【主治】时常滑精，心烦躁汗，夜寐不实，气短懒言，饮食减少。

【方论选录】本方亦宗六味地黄汤，去泽泻之通利，重在滋补肾阴，并仿金锁固精丸意小有加减，旨在收涩固精，合交泰丸以交通心肾，治其怔忡，另加健脾之品兼顾中州。

73028 益阴治痢方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参四两 潼关蒺藜四两（酒洗） 泽泻一两五钱 大熟地十二两（九制） 淮山药六两 麦冬三两（去心） 酒白芍三两 煅龙骨二两 宣木瓜二两（酒炒） 云茯神五两（抱木） 煅牡蛎二两 伸筋草一两五钱（酒炒） 远志肉八钱（去骨） 丹皮一两五钱 炙甘草八钱 当归身三两（酒洗） 菟丝子三两 莲须三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大服。

【功用】补阴，伸筋，壮阳气。

【主治】痢症及一切阴虚，心肾不交。

73029 益阴养荣膏

【方源】《古方汇精》卷四。

【组成】蜜刺海参 大淡菜 建莲肉 南枣各八两

【用法】文武火熬，须昼夜不断火，候成膏，去滓。每早用一大匙，开水化下，服尽一料即愈。

【主治】童子癆。初起发热咳嗽，阴虚盗汗，脾胃不香，遗精咯血。

73030 益阴通闭丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】阿胶八两 粉炒枳壳一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】孕妇大便不通，脉涩数。

【方论选录】妊娠血亏气滞，津液无以下润肠胃，故大便不通，胎因不安焉。阿胶补阴益血，力能护养胎元，兼滋肠燥；枳壳破滞化气，性专通泄大便，燥结自行。蜜丸以润之，饮下以和之，使阴血内充，则滞气自化，而津液四布，大便自通，胎得所安，何虚秘之足患哉。

73031 益阴清热汤

【方源】《会约》卷三。

【组成】当归一钱 白芍 生地 麦冬各一钱半 黄芩二钱 甘草一钱 玄参一钱 泽泻八分 木通八分 梔仁(炒黑)八分 陈皮八分 石膏(生用)二钱 黄柏(炒焦)一钱 扁豆(炒，研)二钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒余热，口渴便赤，烦躁便实，脉洪。

【加减】舌苔黄，加黄连一钱；目赤，加胆草八分；大便燥，加酒炒大黄一钱半；妇人血热，加青蒿二钱；胁痛，加青皮八分；口渴，加花粉一钱。

73032 益寿比天膏

【方源】《回春》卷四。

【组成】附子(去皮脐) 牛膝(去芦) 虎胫骨(酥炙) 蛇床子 菟丝子 川续断 远志肉 肉苁蓉 天门冬(去心) 麦门冬

(去心) 杏仁 生地 熟地 官桂 川楝子(去核) 山茱萸(去核) 巴戟(去心) 破故纸 杜仲(去皮) 木鳖子(去壳) 肉豆蔻 紫梢花 谷精草 川山甲 大麻子(去壳) 鹿茸各一两 甘草二两(净末，看众药蕉枯方下) 桑槐 柳枝各七寸

【用法】上锉细。用真香油一斤四两浸一昼夜，慢火熬至黑色；用飞过好黄丹八两，黄香四两入内，柳棍搅不住手；再下雄黄、倭硫、龙骨、赤石脂各二两，将铜匙挑药滴水成珠，不散为度；又下母丁香、沉香、木香、乳香、没药、阳起石、煅蟾酥、哑芙蓉各二钱，麝香一钱为末，共搅入内；又下黄蜡五钱。将膏贮瓷罐内，封口严密，入水中浸五日去火毒，每一个贴六十日方换。

【功用】添精补髓，保固真精；善助元阳，滋润皮肤，壮筋骨，理腰膝，通二十四道血脉，坚固身体，返老还童。

【主治】下元虚冷，五劳七伤，半身不遂，或下部虚冷，膀胱病症，脚膝痠麻，阳事不举。赤白带下，沙淋血崩，疮疖。

73033 益寿比天膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】牛膝二两五钱 生地二两五钱 杜仲二两五钱 木鳖子二两五钱 虎骨(生)二两五钱 巴戟二两五钱 续断二两五钱 苁蓉二两五钱 生山甲二两五钱 山萸肉二两五钱 远志二两五钱 熟地二两五钱 补骨脂二两五钱 肉果二两五钱 官桂二两五钱 菟丝子二两五钱 紫梢花二两五钱 蛇床子二两五钱 天麻子二两五钱 川楝子二两五钱 甘草五两 海胆一两二钱五分 桑枝七寸 槐枝七寸

【用法】上药酌予碎断，用香油二百四十两炸枯，去滓过滤，炼至滴水成珠，入黄丹一百两搅匀成膏，取出放入冷水中去火毒后加热溶化，再兑入细料面三两，搅匀摊贴，每张油重五钱，布光。贴脐部，肾俞。

【功用】暖丹田，滋肾水，培元补气。

【主治】气虚血亏，梦遗滑精，肾寒精冷，腰痠腹痛。

【备考】益寿比天膏细料面：雄黄五钱，龙骨五钱，石脂五钱，母丁香一两，沉香一两，木香一两，乳香一两，没药一两，阳起石一两，芙蓉叶一两，鹿茸二两二钱，共研细粉过罗。

73034 益寿永贞膏

《医部全录》卷三三一。为《扶寿精方》“琼玉膏”之异名。见该条。

73035 益寿永真膏

《扶寿精方》。为原书“琼玉膏”之异名。见该条。

73036 益寿地仙丸

《圣济总录》(文瑞楼本)卷一九八。即原书(人卫本)卷一八六“内养丸”。见该条。

73037 益寿地仙丹

《丹溪心法》卷三。为《圣济总录》卷一八六“内养丸”之异名。见该条。

73038 益寿固元膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】熟地九两 杜仲三两 枣仁一两八钱 五味子三两 虎骨六两 远志一两八钱 吴萸三两 首乌三两 麦冬三两 茜草一两八钱 地骨皮二两 淫羊藿三两 艾叶二两四钱 黄耆三两 补骨脂三两 枸杞子三两 巴戟三两 附子三两六钱 肉苁蓉三两 当归九两 牛膝一两八钱 覆盆子三两 龟版六两 狗脊三两

【用法】上药酌予碎断，用香油四百两炸枯，过滤去滓，炼至滴水成珠，入黄丹一百七十六两，搅匀成膏，取出放入冷水中去火毒后加热溶化。摊时每十六两膏药加入细粉面二钱，每张油重五钱。微火化开，男子贴肾俞穴，女子贴脐部。

【功用】补肾散寒，固精止痛。

【主治】男子气虚，梦遗滑精，偏坠疝气。妇女血寒腹痛，白带，腰腿疼痛。

【宜忌】孕妇忌贴。

【备考】摊时细料面：赤石脂二钱，硫黄一

钱，狗肾二钱，乳香二钱，没药二钱，公丁香一钱，阳起石二钱，共为细粉。贴时加入细料：肉桂四两，冰片二钱，麝香一钱，丁香五钱，共为细粉。

73039 益寿固真丹

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四。

【组成】菟丝子(酒浸，煮，焙，捣作末)三两 熟地黄(酒蒸，下筛) 生地黄(酒浸，焙) 磁石(火煅，醋淬九次，研，水飞) 何首乌(泔浸一宿，切作片) 黑豆汁(拌蒸，晒干) 肉苁蓉(酒浸，去鳞甲，蒸，取肉)各二两 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 山药(微炒) 当归(酒洗，焙) 白茯苓(水飞) 泽泻(酒蒸) 牡丹皮各一两半 人参 苁仁 山茱萸(酒浸，取肉) 石斛(酒洗，焙) 覆盆子(酒洗，焙) 枸杞子(酒洗，焙) 五味子(酒洗，焙) 蛇床子(炒，掇去皮) 杜仲(去皮，锉，姜汁炒去丝) 巴戟(盐水煮，去骨) 鹿茸(燎去毛) 韭子(炒) 赤石脂(水飞) 益智(去皮，盐水煮一沸) 莲花蕊破故纸(炒) 柏子仁(去皮) 青盐 天雄(童尿浸三日，炮，去皮脐) 阳起石(火煅)各一两 腊脐(酥炙黄色)一部(无则以黄狗阴茎三个或五个，酥炙黄色代用)

【用法】上药不犯铁，捣为细末，糯米粉和清酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服二三钱，空心盐汤、温酒或米饮送下。中年人最宜常服。

【功用】填精补血，益气养神，返老还童，延年益寿。

【宜忌】忌葱蒜萝卜及醋，酒色亦宜节。

【加减】夏月去天雄，加黄柏。

73040 益寿黑豆方

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】旱莲草五钱 黑桑椹四钱 白何首乌三钱 故纸六钱 骨碎补六钱 金樱子四钱 何首乌三钱 杜仲四钱 明青盐二两 生地六钱 白茯苓六钱 柏子仁四钱 蛇床

子三钱 肉苁蓉四钱 菟丝饼六钱 甘枸杞五钱 川续断四钱 川牛膝六钱 槐角子二两 远志肉六钱 川石斛四钱

【用法】腰子雄黑豆二十碗，用水三十碗，将前药煮至二十碗，盛于净器，入黑豆在内浸过一宿，俟黑豆吃干药水，取起风干，用柳木甑子蒸透，取起风干，再将药渣用水二十碗煎至十五碗，取起药渣，仍入豆再浸一宿，候豆又吃干药水，取起再入甑蒸透，要不见火，不见日，风干，以新瓷罐收贮。每服四钱至五钱，清晨空心用白滚水送下。

【功用】补益。

73041 益肝双补丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万金方》。

【组成】细辛 酸枣仁（微炒） 白茯苓 楮实子 覆盆子 五味子 附子（炮） 石斛（去苗） 破故纸（炒） 鹿茸（去皮，酥炙令黄） 肉桂 白术 沉香 枳实（麸炒令黄） 熟干地黄各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早晨空心、晚食前温酒送下。

【主治】肝虚寒，色面青黄，胸胁胀满，筋脉不利，背膊痠疼，羸瘦无力。

73042 益肾固精丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】炙龟版六钱 生牡蛎四钱 鹿角胶三钱（蛤粉炒） 蛤蚧尾一对 大熟地三钱 炒杭芍二钱 益智子二钱（盐水炒） 菟丝饼四钱 云茯苓三钱 炒山药二钱 山萸肉二钱 牡丹皮三钱 五味子一钱 金樱肉二钱 石莲肉三钱 建泽泻二钱

【用法】上为细末，饴糖为丸，如绿豆大。每晚服二钱，白开水送下。

【功用】补肾，养肝，理脾。

【主治】遗精。

【方论选录】本方即龟鹿二仙胶、七味都气丸、苁菟丹合成补肾固涩之品而成。本方药味似嫌滋腻，以饴糖为丸，补中健脾，构思精巧。

73043 益肾固精丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】大熟地八两 山萸肉四两 淮山药四两 牡丹皮四两 云茯苓四两 龙骨三钱（生研，水飞） 莲须一两 芡实二两（炒） 线胶四两

【用法】用牡蛎熟粉炒线胶成珠后，去牡蛎、磨粉，再同以上各药共研细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服四钱，早、晚用鹿含草煎汤送下。

【功用】补肾固精。

【主治】遗精。

73044 益肾泻火汤

【方源】《临证偶拾》。

【组成】生地 龟版各 12 克 黄柏 知母 梔子 怀牛膝各 9 克 木通 龙胆草各 4.5 克

【功用】益肾泻火，滋补肾阴。

【主治】阴茎异常勃起。症见性交之时，阴茎明显而持久地勃起，也不射精；性交之后，阴茎仍持续不倒。但逢疲劳过度时反而出现遗精，舌苔白腻，脉沉细。

【加减】若用上方稍有好转，可去梔子、木通、龙胆草，加生鳖甲 12 克，炙山甲、地鳖虫各 6 克。

73045 益肾调肝汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】柴胡 当归 白芍 山茱萸 紫河车 香附 益母草

【功用】疏肝补肾。

【主治】肝郁肾虚，经行先后无定期。

73046 益肾调经汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】杜仲 续断 熟地各三钱 当归二钱 白芍（炒）三钱 益母草四钱 焦艾巴戟 乌药各三钱

【用法】水煎服。

【功用】温肾调经。

【主治】肾虚，经来色淡而多，经后腹痛腰

痿，肢软无力，脉沉弦无力。

73047 益明长智丸

【方源】《证治宝鉴》卷三。

【组成】龟心九枚 龙骨 远志 龟版 辰砂 石菖蒲 天门冬 麦门冬 柏子仁 白茯苓 玄参 桔梗 人参 丹参 酸枣仁 胆南星 熟地黄 五味子 川当归 茯神 甘草 熊胆

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。灯心，大枣煎汤送下。

【功用】清心益智。

【主治】健忘。

73048 益金散风汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参五分 甘草一钱 五味子三粒 麦冬三钱 紫苏一钱 蔓荆子一钱 天花粉一钱 桔梗三钱

【用法】水煎服。

【功用】补肺气，表风邪。

【主治】气虚伤风头痛，发热盗汗，畏风。

73049 益府紫金錠

【方源】《疡科选粹》。

【组成】文蛤三两 茨菇二两 大戟一两 雄黄八钱 真射八钱 续随子三钱

【用法】上为末，糯米糊和匀，即成錠。

【主治】痈疽。

73050 益荣安神汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 茯神 枣仁 柏仁各一钱 橘红 甘草各五分 人参一钱 龙眼肉八个 竹茹一九 大枣二枚

【主治】产后气血两亏，神魂无所依，妄言妄见，轻则睡中呢喃，重则不睡妄言，而无块痛者。

【加减】渴，加麦冬、五味；汗多，加参、芪、麻黄根；痰，加竹沥、姜汁；泻，加茯苓、白术；便秘，加苡蓉、麻仁。

73051 益荣荡滞饮

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄 大黄 人参 白术 茯苓 黄耆 桂枝各等分 甘草减半

【用法】以水二合，煮取一合，去滓温服。

【主治】痢疾经杂治数日不愈，气血虚者。

73052 益胃升阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】升阳益胃汤（《便览》卷四）。

【组成】柴胡 升麻各五分 炙甘草 当归身（酒洗） 陈皮各一钱 人参（去芦） 炒神曲各一钱五分 黄耆二钱 白术三钱 生黄芩少许

【用法】上咬咀。每服二钱，水二大盏，煎至一盏，去滓稍热服，不拘时候。

【功用】①《兰室秘藏》：补胃气以助生发之气。②《便览》：大补气血，滋养脾胃。

【主治】妇人经候不调，漏下不止，水泄日二三行，食罢烦心，饮食减少，甚至瘦弱。

【加减】有嗽，去人参；腹中痛，加白芍药三分，中桂少许；渴或口干，加葛根二分。

73053 益神定志丸

【方源】《普济方》卷三七〇。

【组成】人参 茯神（去心） 远志（去心） 白茯苓 白附子（炮） 天麻 天门冬（去心） 麦门冬 羌活 甘草（炙）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂角子大，朱砂为衣。灯心、薄荷汤化下。

【功用】益神清心，调脉定志。

【主治】婴孩急惊风，发作已过，神不安稳，恍惚怯人，怔忡烦悸，闷郁不爽。

73054 益真鹿茸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】石斛 牛膝（酒浸一宿，焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 紫石英 鳖甲（醋炙） 续断 柏子仁 五味子 黄耆（蜜炙） 巴戟（去心）各一两 安息香（酒浸，去砂石） 鹿茸（酒炙） 沉香各半两 山药 覆盆子各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒、盐汤或糯米饮送下。

【主治】冲任俱虚，血海久冷，经候不调，肌体羸瘦，饮食减少。

73055 益脑地榆散

《圣惠》卷八十六。为《外台》卷三十六引刘氏方“益脑散”之异名。见该条。

73056 益脑吹鼻散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】地榆末一分 虾蟆灰一分 青黛半两 谷精草一分 干蜗牛壳十四枚（微炒） 麝香一钱

【用法】上为细散。以两黄米大，吹入鼻中。当有黄水出为效。

【主治】小儿脑疳，鼻痒，毛发作穗，面黄羸瘦。

73057 益营内托散

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】柴胡七分 干葛一钱 熟地一钱 当归八分 人参五分 甘草三分 秦艽八分 续断八分 生姜 大枣

【主治】阴虚不足，外感寒邪，不能托邪外出者。

【加减】阴胜之时，外感寒邪者，去秦艽、续断，加细辛、附子各五六分；火盛阴虚，邪不能解者，加人参五分；脾肾两虚痰多者，加茯苓八分，白芥子五分；泄泻者，加山药、扁豆各一钱；腰腹痛者，加杜仲、枸杞各一钱。

【方论选录】营不能营，则虚邪客人，表散不愈，治当补血以托邪。故用人参、熟地补营中之虚。同当归、秦艽活营中之血；续断以理营中之伤，茯苓以解营中之热，柴胡、干葛一提一托，迅达肌表；生姜、大枣，一辛一甘，调和营卫；更有人参、熟地与柴、葛并用，鼓舞诸经之邪，托者自托，提者自提，两不相碍，使清浊攸分，表里融洽，何邪不散，何表不解乎。

73058 益黄健脾汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】陈皮 枳壳 半夏 山楂 茯苓 当归 川芎 腹皮 木香 白芍 白术

【用法】甘草浓煎，又用蟾酥酒调少许服。

【主治】夹脾疳，面清黄，唇淡白，发渴发喘。

73059 益清雄黄丸

《嵩崖尊生》卷六。为《局方》卷八“解毒雄黄丸”之异名。见该条。

73060 益智二伏汤

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】益智仁一钱五 茯苓 茯神各三钱 糯米一撮

【用法】水煎服。

【主治】小儿遗尿或尿白浊。

73061 益智木律散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】木律二分 当归 黄连各四分 羊胛骨灰 益智皮 熟地黄各五分 草豆蔻皮一钱二分 升麻一钱五分

【用法】上为极细末。先用温水嗽口净，擦之。

【主治】寒热牙痛。

73062 益智五味丸

【方源】《普济方》卷二十九引《如宜方》。

【组成】益智仁 肉苁蓉 巴戟（去心） 人参 五味子 骨碎补 茴香 覆盆子 龙骨 熟地黄 菟丝子（制）各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下。

【主治】肝肾俱虚，精气耗散。

73063 益智太乙丸

《普济方》卷一〇二。为《圣济总录》卷十四“太一丸”之异名。见该条。

73064 益智仁煮散

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【异名】益智煮散（《普济方》卷二十一。）

【组成】益智（去皮） 乌药（锉） 桂（去粗皮） 天仙藤各一两 莎草根（炒，去毛） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草

(炙)各二两 干姜(炮) 木香 川芎 白术 丁香各半两 人参一分

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣二个(擘破)，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脾脏冷气，肠鸣相逐，饮食无味。

73065 益智火煮散

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】青木香半分 舶上茴香一分 青橘皮一两 干姜半两 乌梅二两(生用) 益智一两(生用)

【用法】上为末。每服二钱，水二盞，加大枣五个，同煎至八分。先吃枣后药，食前服。过热不妨。

【主治】脾肾风虚，脾元冷急，虚滑不止，饮食不进。

73066 益智安神汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】柏子仁四钱 石菖蒲三钱 生地三钱 知母三钱 白芍五钱 胆星三钱 远志肉三钱 石决明六钱 茯神三钱 甘草一钱 羚羊角五分

【用法】水煎服。

【主治】云雾移睛。

73067 益智助神汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白术 熟地各一两 白芥子 天花粉 炒黑荆芥各三钱 山茱萸 巴戟天各五钱

【用法】水煎服。

【主治】猝中邪气，眼目昏花，遂至神魂牵缠，谵语淫乱，低声自语，忽忽如失。

73068 益智固真汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】黄耆(蜜炒)一钱五分 人参三钱 白术(酒炒，去芦)一钱 白芍(酒炒)一钱 白茯神(去皮木)一钱 五味子十二粒(夏用十六粒) 当归身(酒炒)一钱 麦冬(去心)一钱 巴戟肉三钱 益智仁(去壳)

一钱 酸枣仁(炒)一钱 山药一钱 泽泻一钱 升麻五分 黄连(酒炒)一钱五分 黄芩一钱 黄柏(酒炒)七钱 知母一钱 莲蕊一钱 生甘草梢一钱五分

【用法】上锉，分作二剂。水煎，空心服。

【功用】补心宁神，滋阴固本。

【主治】遗精。

73069 益智和中丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】木香 黄连 生地黄各二分 黄耆 人参 麦门冬 神曲末 当归身 干生姜 陈皮 姜黄各五分 缩砂仁七分 桂花一钱 桂枝一钱五分 益智仁二钱二分 炙甘草二钱五分 麦蘖面三钱 草豆蔻仁四钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下；细咀亦当。

【主治】饮食劳倦。

73070 益智和中汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】肉桂一分 桂枝四分 牡丹皮 柴胡 葛根 益智仁 半夏各五分 当归身 炙甘草 黄耆 升麻各一钱 白芍药一钱五分 干姜少许

【用法】上为粗末，都作一服，水三盞，煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】肠澼下血，或血色紫黑，腹中痛，腹皮恶寒，右手关脉弦，按之无力，而喜热物熨之。

73071 益智调中汤

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】白豆蔻三分 益智仁三分 缩砂仁 甘草各二分 姜黄三分 厚朴三分 陈皮七分 泽泻三分 黄耆七分 干姜三分 人参二分

【用法】上为末。都作一服，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前温服。

【主治】因服寒药过多，致脾胃虚弱胃脘痛。

【宜忌】忌生冷硬物果木之类及麸粉麴食，

须忌常远,免致后患。

73072 益脾清肝汤

《准绳·幼科》卷三。为《校注妇人良方》卷二十四“益脾清肝散”之异名。见该条。

73073 益脾清肝散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】益脾清肝汤(《准绳·幼科》卷三)。

【组成】炙甘草 柴胡各五分 川芎 当归 黄耆各一钱 丹皮七分 人参 白术(炒) 茯苓各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝火伤脾,寒热体痛,脾胃虚弱。

73074 益脾镇惊散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】人参一钱半 白术(土炒) 茯苓各三钱 朱砂八分 钩藤二钱 甘草(炙)五分

【用法】上为细末。每服一钱,灯心汤调下。

【功用】镇心,抑肝,益脾。

【主治】惊泻。小儿气弱受惊,夜卧不安,昼则惊惕,泻泄粪稠若胶,色青如苔。

73075 益精鹿茸散

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】鹿茸(去毛,酥炙)

【用法】上为散。每服一钱匕,渐至二钱匕。浓煎苁蓉酒七分一盏,放温,入少盐空心调下。如欲为丸,即以鹿茸(去毛,酥炙)一两肉苁蓉(酒浸一宿,焙干) 蛇床子(洗,焙干)各一分,同为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,温酒或盐汤送下。

【主治】欲事过度,肾久虚,精气耗惫,精少,腰脚痠重,神色昏黯,耳鸣焦枯,阳道萎弱。

73076 益母草留颜方

【方源】《外台》卷三十二引《近效方》。

【组成】益母草(五月五日收取,暴令干,烧作灰,取草时勿令根上有土,有土即无效)。

【用法】烧之时,预以水洒一所地,或泥一

炉烧益母草,良久烬无,取斗罗筛此灰,干则以水熟搅和搜之,令极熟团之,如鸡子大作丸,晒极干,取黄土泥作小炉子,于地四边各开一小孔子,生刚炭上下俱着炭,中央着药丸,多火经一炊久,即微微着火烧之,勿令火气绝,绝即不好,经一复时药熟,切不得猛火。若药熔变为瓷巴黄,用之无验,火微即药白色细腻,一复时出之于白瓷器中,以玉槌研(如无玉槌,以鹿角槌亦可),绢筛,又研三日不绝,收取药,以干器中盛,深藏,旋旋取洗手面,令白如玉;女项颈上黑,但用此药揩洗,并如玉色。

【主治】面上黧黑色,及老人皮肤兼皱。

73077 益智桑螵蛸散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】益智仁 桑螵蛸 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂

【用法】上为末。空心米饮下。

【主治】脬内素有冷气,因产后气虚无阳以输化,小便清长而数者。

73078 益气升阳除湿汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】沙参五钱 白术三钱 炙甘草一钱 陈皮二钱 升麻七分 柴胡一钱 云苓二钱 茅苍术二钱 焦柏一钱

【用法】水煎,温服。

【功用】升阳除湿。

【主治】带下淋漓不止,色黄质薄,气短神疲,面色皤白,舌淡苔白,脉虚弦。

73079 益气平胃健脾饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参三钱(研) 茅术二钱 山药四钱 扁豆四钱 朱茯神四钱 远志一钱半(肉) 杭芍三钱 炒梔二钱 净蝉衣二钱 厚朴一钱 陈皮一钱半 生草一钱 鲜荷叶半张

【功用】益气健脾和胃,宁心安神,清热除烦。

【方论选录】本方系以平胃散为主,暗寓参

苓白术散意，旨在益气健脾和胃，又加朱茯神、远志、白芍等药宁心安神，复虑时值盛夏，暑湿留连，故以蝉衣宣散，栀子、荷叶等清热除烦，处方亦颇严谨，足资效法。

73080 益气补虚杜仲散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）蛇床子三分 五味子三分 熟干地黄一两 萆薢一两（锉） 巴戟三分 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心三分 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳羸乏少气，五脏萎损，腰痛不能行。

【备考】本方方名，《普济方》引作“杜仲散”。

73081 益气活血散瘀汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】黄耆 党参 白术 鸡血藤 鬼箭羽 红花 桃仁 川楝子 银花 丝瓜

【功用】补气活血化瘀。

73082 益气理脾枳术丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参四钱 云苓六钱 生于术三钱 甘草一钱五分 陈皮三钱 薏米五钱（生） 焦麦芽一两 槟榔三钱（焦） 焦楂六钱 壳砂一两五钱 炒枳壳三钱 扁豆五钱（炒） 杭芍三钱（生） 莱菔子五钱 川郁金四钱 石斛五钱（金）

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三钱，白开水送下。

【功用】补气健脾，和胃消食，渗湿去痰。

【主治】肺脾气虚，湿痰不化，食少乏力，大便溏泻。

73083 益气清肺缓肝丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参三钱 朱茯神六钱 生于术三钱 生甘草一钱五分 次生地六钱 生

杭芍三钱 牡丹皮四钱 建泽泻三钱 真熊胆三钱 乌犀角三钱 带心麦冬六钱 白蔻仁二钱 浙贝母四钱 苦桔梗三钱 金石斛三钱 川郁金六钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱，早、晚白开水送下。

【功用】益气，清肺，缓肝。

【方论选录】益气取四君子汤，用西洋参，益气养阴而不燥；血热套《小品方》芍药地黄汤和《千金要方》犀角地黄汤，清热凉血散瘀尤好；缓肝以真熊胆，乌犀角为主药。

73084 益气滋阴健脾饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参三钱（研） 子术三钱（土炒） 山药四钱（炒） 扁豆四钱（炒） 朱茯神四钱 远志一钱半（肉） 杭芍三钱（炒） 花粉三钱 净蝉衣二钱 陈皮二钱 杜仲四钱（炒） 木瓜四钱

【用法】鲜荷叶一两，炒谷芽三钱为引。

【功用】益气养阴，健脾安神，活络定痛。

【主治】脾胃气阴两虚，怔忡不宁，腰腿疼痛。

73085 益阴化湿利节丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】生地四钱 泽泻一钱半 丹皮一钱半 云苓三钱 海桐皮二钱 片姜黄一钱 独活一钱半 没药二钱 秦艽二钱 青皮一钱半 盐柏一钱半 知母一钱半（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为小丸。每服二钱，白开水送下。

【功用】益阴补肾，化湿利节。

【主治】肾虚风湿侵袭之关节痛。

73086 益脑吹鼻地榆散

《圣济总录》卷一七二。为《颅卤经》卷上“益脑散”之异名。见该条。

73087 益脾养阴除湿丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参三钱 生于术五钱 茯神五钱 橘红二钱 当归五钱 干地黄六钱 白

芍三钱(炒) 青皮一钱五分(炒) 远志二钱(肉) 梔子三钱(炒) 木香一钱五分 广砂一钱五分(仁) 胆草三钱(酒洗) 炙半夏三钱 泽泻三钱 甘草一钱

【用法】上为极细末，加生姜三钱，红枣肉二十个，熬汤，少兑炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱，白开水送下。

【功用】益脾养阴除湿。

73088 益府秘传冲虚至宝丹

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】紫草茸八两 当归四两 鲜笋一斤 红花 木通 麻黄 白芷 白及 牡丹皮 赤芍 怀生地 牛蒡子 甘草各四两

【用法】上咬咀，用水三十碗，锅内煮去二分取起，再水十碗，煎至五碗，去滓，共前汁煎滴水成珠，加蜂蜜四两，再熬成珠为度，听用。另以梅花蕊一钱半，蟾酥三钱，紫河车一具(酒煮成膏听用)，僵蚕(炒)一两，全蝎(酒洗)、穿山甲(炒)、川黄连(酒炒)、杏仁(去皮尖，另研)、黄芩、蜂房(炒)、连翘(炒)、地肤子(炒)、大胡麻各一两。为细末，煎膏一半为丸，如龙眼大。每服一丸，鲜鸡汤送下。立起分地而出。

【主治】痘疮初起，气血两虚，倒塌陷黑不起，不分地界，或咳或泻。

73089 益府秘传拨云龙光散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】蕤仁(五两，去粗壳取仁，用温水浸，去嫩皮膜尖心，用上好白竹纸包裹，捶去油以尽为度)五钱 牛黄二分五厘 白磁砂五分(即好白细瓷器四五钱重，用头酸醋一碗，将瓷器以砂罐盛，放炭火内烧红，先投入醋内，以七次为度。又用童便一碗，烧红，投内以七次为度。又将醋、童便合一碗，又烧红投入以七次为度。先将瓷研炼，以水澄清，用中间阴干) 好珍珠(八九分，将雄鸡一只，以珠入鸡肚内过一宿，然后杀鸡取珠，用豆腐蒸过用)五分 硼砂二钱五分 琥珀五分 真熊胆(三分，以瓷瓦盛，放火

上煨去水)二分五厘 硃砂(三四分，将冷水一碗，以水煮干为度)一分 当门子一分 白丁香一分 海螵蛸(水煮过六七次)二分 冰片一分 人龙(用男人孩子口内吐出食虫，即用银簪破开，河水洗刮令净，阴干)二分

【用法】上药精制细研。任意点眼。

【主治】诸般翳障，攀睛胬肉，内障青盲。

兼

73090 兼气汤

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】大黄五分 麦门冬(去心) 甘草各三分 细辛二分 甘竹叶一合(切) 黄芩四分

【用法】上用水三升，煮一升二合。作一服，一日二次。

【主治】四五岁小儿壮热。

73091 兼气散

【方源】《外台》卷十一引《广济方》。

【组成】栝楼三两 石膏三两(研) 甘草三两 甘皮二两

【用法】上为散。每服一方寸匕，渐加至二方寸匕，食后煮大麦饮送服，白昼二次，夜间一次。

【主治】消渴。

【宜忌】忌热面、海藻、菰菜。

【备考】方中甘皮，《普济方》作“柑子皮”。

73092 兼攻汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】石膏五钱 人参三钱 白术一两 厚朴二钱 天南星三钱 半夏三钱 陈皮一钱 麦冬一两

【用法】水煎服。

【功用】泻火平胃，祛痰养脾。

【主治】感邪气于一时，即狂呼大叫，见人大骂，大渴索饮，身出大汗，有似亡阳。

73093 兼金丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】大黄(湿纸裹煨)八钱 消石 桂

心 甘草(炙)各四两 桃仁四十个(去皮尖)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七丸，至十丸，米饮送下。

【主治】热入膀胱，脐腹上下兼肋肋疼痛，便燥，欲饮水，按之痛者；及妇人血闭疼痛。

73094 兼金散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】细辛 黄连各等分

【用法】上为末。先以熟水搵帛揩净，掺药患处。良久涎出吐之。

【主治】蕴毒上攻，或下虚邪热，口舌生疮。

73095 兼提汤

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上“并提汤”之异名。见该条。

73096 兼补煮散

【方源】《外台》卷十八引《苏恭方》。

【组成】黄耆 人参 独活 芎藭 防风 当归 桂心 草薢 防己 茯苓 白术 丹参各八两 附子(生用) 甘草(炙)各四两 杏仁(去皮尖双仁) 生地黄 生姜 磁石三十分(碎如豆)

【用法】上切，分为三十服。每服别以生姜一两、生地黄一两、杏仁十四枚，捣碎，以水二升，煮取七合，布绞去滓，日晚或夜中服之。

【主治】脚气初患，脚足皮肤舒缓，足上不仁，膝下疼痛，眉眼动，左肋下气，每饱食即发，膈上热，脐下冷，心虚，阴汗且疼。

【宜忌】忌猪肉、冷水、海藻、菰菜、生葱、桃、李、雀肉、醋物、羊肉、茺蓂及饧等。

【加减】呕逆者，加半夏一两。

73097 兼补厚朴汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】厚朴汤(《普济方》卷二四三)。

【组成】厚朴 芎藭 桂心 干地黄 芍药 当归 人参各二两 黄耆 甘草各三两 吴茱萸二升 半夏七两 生姜一斤

【用法】上咬咀。以水二斗，煮猪蹄一具，

取汁一斗二升，去上肥，内清酒三升，合煮取三升，分四服。每次一服，如人行去行二十里，更进一服。

【主治】恶风毒气，脚弱无力，顽痹，四肢不仁，失音不能言，毒气冲心；并治诸气咳嗽，逆气呕吐。

【备考】原书治上症，经用麻黄汤、独活汤后，继用本方。

73098 兼味竹叶汤

《鬼遗》卷三。为原书同卷“五味竹叶汤”之异名。见该条。

宽

73099 宽中丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】乌头(炮裂，去皮脐) 吴茱萸(汤浸，焙，炒) 高良姜 甘遂(麸炒) 大黄 梔子仁各半两 巴豆(去皮心膜，研出油)四十九粒

【用法】上为末，用枣肉为丸，如小绿豆大。每服一丸，生姜、橘皮汤送下。

【功用】逐积滞，化宿食，利胸膈。

【主治】积聚宿食不消。

73100 宽中丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【异名】指迷宽中丸(《普济方》卷二十二引《简易》)。

【组成】黄橘皮四两 白术二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎木香汤送下。

【主治】脾胃不调，冷气客于中，壅遏不通而为胀满者。

73101 宽中丸

【方源】《三因》卷十六。

【组成】大附子(炮，去皮脐) 木香(炮) 青皮 大黄(湿纸裹煨)各等分

【用法】上为末，醋煮糊丸，如梧桐子大。每服十丸，姜汤送下；头疼甚，调救生散送下。

【主治】气滞不快，饮食不消，胸膈痞塞，凝痰聚饮，状如伤寒，头疼，胸痞。

73102 宽中丸

【方源】《普济方》卷二〇四引《卫生家宝》。

【组成】三棱一两 莪术一两 缩砂仁（炒） 青皮（去白） 沉香 陈皮（去白） 香附子 胡椒各半两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后紫苏、生姜汤送下。

【功用】宽胸膈，化冷物。

【主治】十膈五噎，滞满不通。

73103 宽中丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】槟榔（面裹煨熟）二两 木香二两 半夏二两（生姜制） 陈橘皮 青橘皮各半两 京三棱七钱半 牵牛四两（微炒，取头末二两）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后生姜汤送下。

【主治】气不升降，痰涎郁塞，饮食不化。

【备考】方中槟榔用量原缺，据《普济方》补。

73104 宽中丸

【方源】《医方类聚》卷八十九引《王氏集验方》。

【组成】苍术（去粗皮，米泔浸三日，炒干） 乌药（去粗皮） 香附子（火燎去毛）各二两 三棱（醋煮，切，焙干） 广茂（煨） 青皮（去瓤） 陈皮（去白） 干姜（炮） 良姜（炒） 小茴香（炒） 神曲（炒） 麦芽各一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心生姜汤送下。

【功用】宽中下气，暖胃调脾，消克饮食，补益虚损。

【主治】五劳七伤，下元虚冷，脚膝无力，腰滞腿疼，筋骨软弱，心胸胀满，呕逆恶心，恶闻食气，七疝八瘕，五积六聚，痞癖气块，胁肋疼痛，脐腹胀满，面黄肌瘦，身体倦怠，

脾胃不和，不思饮食；风湿气痹，霍乱转筋，上吐下泻，气逆冲心，翻胃吐食，多年气痢，小肠疝气；妇人月事不行，脐腹疼痛，一切沉滞之气。

73105 宽中丸

【方源】《医学纲目》卷十六引丹溪方。

【组成】枳壳

【用法】上为末，酒糊为丸。

【主治】诸般气痛。

73106 宽中丸

【方源】《医方类聚》卷一九五引《修月鲁般经》。

【组成】香附四两 陈皮 青皮 枳壳 枳实 三棱 莪术各二两 神曲 麦芽 糖球子各一两 牵牛（头末）十二两

【用法】上为末，滴水为丸。每服五六十丸，食远白汤吞下。

【主治】肚内痞闷。

73107 宽中丸

【方源】《普济方》卷二十二。

【组成】大腹子（炮，去皮脐） 青皮 大黄（湿纸裹煨）各等分

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，姜汤送下。

【主治】气滞不快，饮食不消，胸膈痞塞，凝痰聚饮，状如伤寒，头疼胸痞。

73108 宽中丸

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】木香五钱 三棱 莪术 青皮 陈皮 槟榔 桔梗 缩砂仁 人参 当归各一两

【用法】上为细末，用酒为丸，如梧桐子大。米汤、姜汤送下。

【功用】宽胸进食，消痞化积。

【主治】一切气疾，诸般停滞，肚腹疼痛不止。

73109 宽中丸

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】山楂不拘多少（蒸熟，晒干）

【用法】上为末，作丸服。

【主治】胸膈痞闷，停滞饮食。

73110 宽中汤

【方源】《幼幼新书》卷二十一引张涣方。

【组成】高良姜 木香各半两 丁香 青橘皮（炒） 桔梗 甘草（炙）各一分

【用法】上为细末。每服半钱，温酒调服。

【主治】小儿心腹痛不可忍。

73111 宽中汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】青皮 厚朴 陈皮各一钱 香附一钱五分 白豆蔻 丁香 砂仁各七分 木香五分

【用法】上药加生姜、盐，用水煎服。

【主治】七情气郁，三焦痞塞，阴阳不和。

73112 宽中汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】枳壳 当归 赤茯苓 生地黄 甘草 赤芍

【主治】痘疮，误服温燥，阳盛阴虚，津竭便秘。

73113 宽中汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】山楂 厚朴（炒） 陈皮 熟半夏 桔梗 麦芽 神曲 木通 木香

【用法】加生姜一片为引，水煎服。

【主治】小儿霍乱吐泻，气壮食重者。

73114 宽中汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】蚕豆（炒）二钱 糖霜一钱 鸡子黄一枚

【用法】上药以水一合，先煮蚕豆三沸，去滓，内糖霜及鸡子黄搅匀，临卧、空心顿服。

【主治】腹中挛急，大便燥结。

73115 宽中汤

《眼科撮要》。为《异授眼科》“宽中散”之异名。见该条。

73116 宽中散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤（白术、人参、白茯苓、炙甘草）加知母 贝母 乌梅 干姜

【主治】胸膈烦闷，冷热不调，痰涎咳嗽，不美饮食，日夜壮热。

73117 宽中散

《得效》卷三。为《局方》卷三“五膈宽中散”之异名。见该条。

73118 宽中散

【方源】《奇效良方》卷十六。

【组成】白豆蔻（去皮）一两 青皮（去白） 缩砂（去皮） 丁香各二两 木香一两半 甘草（炙）二两半 陈皮（去白）四两 香附子（炒去毛） 厚朴（去粗皮，姜汁制，炒）各八两 沉香一两 槟榔二两

【用法】上为细末。每服二钱，用生姜盐汤调服，不拘时候。

【主治】忧恚郁结，或作寒热，遂成膈气，不进饮食。

73119 宽中散

【方源】《便览》卷二。

【组成】枳壳 桔梗 甘草 茯苓 半夏 芍药

【用法】上药用水一钟半，加生姜三片，煎服。

【主治】脾胃气滞，膈塞腹满，胸胁不利，胃脘疼痛，吞酸嘈杂。

【加减】膈塞腹满，加紫苏叶、青皮、大腹皮、厚朴、香附；气盛少食，加麦芽、砂仁、山楂；气结胸胁不利，或咳嗽，加炒瓜蒌仁、桑白皮；郁气胸膈痛，加香附、抚芎；冷气胃脘作痛，加青皮、陈皮、元胡、木香、草豆蔻；气郁胸中，心下满闷，加川连、神曲、贝母；气盛久郁，膈间上下游走，吞酸嘈杂刺心，加细辛、梔子、黄连、枳实，气病感寒作喘，加苏子、麻黄、杏仁、荆芥穗；病后气肿，加大腹皮、五加皮、苏子。

73120 宽中散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】四物汤去川芎、熟地，加生地、枳

壳、赤茯苓、甘草。

【用法】上为散。每服一方寸匕，水煎，去滓服。

【主治】痘疹，误用辛热而致便秘者。

73121 宽中散

【方源】《活人方》卷五。

【组成】宣姜二三斤

【用法】每块姜均切两片，粗线穿好，晒极干，浸于极陈无秽真金汁内七昼夜，取出，烈日晒露七昼夜，挂当风处，一浸一晒，各足七七四十九日，在地上筑一土堆，于中挖一大孔，放数斤炭火，入姜煨透，去净炭火，以砖盖闭，勿令透风，一周时开看，候姜成炭取出，星月下露七日，然后研为极细末，收贮瓷罐内，勿使透风经湿。每服三钱，白汤调服。

【功用】豁痰利气，温中散结。

【主治】多忧多郁之人，中气虚寒之体，寒湿痰饮停滞三脘，自呕恶而成反胃，由噎塞而致关格，两关脉沉滑，或濡软无力者。

73122 宽中散

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】枳壳一钱 赤芍八分 甘草（炙）八分 当归一钱六分

【用法】上为散。水煎服。

【主治】痘疮服燥药太过，津液耗散，大便秘结者。

【方论选录】便秘似实而由虚变实，则未敢以实而破之。且痘证尤不敢轻下也。枳壳为宽其中，赤芍为清其热，而当归以润之，甘草以和之。秘者可通矣。

73123 宽中散

【方源】《异授眼科》。

【异名】宽中汤（《眼科撮要》）。

【组成】青皮四两 陈皮四两 丁香四两 甘草四两 朴消四两 细辛五钱 厚朴二两（姜汁炒） 白豆蔻二两

【用法】上为末。每服二钱，盐汤送下。

【主治】午后二目昏暗。

【备考】原书治上症，并宜外点珍珠膏，灸风府穴。

73124 宽气汤

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《惠眼观证》。

【组成】白矾 葱

【用法】上药煎汤洗软肠头，打喷嚏二三次；用白矾、五倍子末干涂，急打喷嚏；用白绢作兜兜定，再用蜣螂粪及艾烧熏。

【主治】肠出二三寸，经日不收者。

73125 宽气汤

【方源】《百一》卷六。

【异名】缩砂香附汤（《得效》卷三）。

【组成】香附子六两（新砂盆内打令净，焙干称） 乌药二两（去心，取肉称，用真天台者） 缩砂仁一两 甘草一两一分（炒）

【用法】上为细末，每服一大钱，浓煎橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】①《百一》：利三焦，顺脏腑。②《得效》：调中快气。

【主治】三焦气滞，脘腹胀痛，大便秘结。

①《百一》：大便气秘；②《得效》：心腹刺痛；③《奇效良方》：小儿噫宿腐气，心膨膜满，或时冷痛。

【备考】《得效》本方用法：为末，每服一钱，用紫苏叶三片，盐少许，沸汤调下。

73126 宽气汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】柴胡 乌药 秦艽 甘草 酒蒸太黄各一钱 白芍一两 茯苓三钱 当归三钱 天麻 防风各三分 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】天禀甚厚，素好烧酒，一时怒气相激，火盛肝伤，遂致口眼喎斜，如似中风，未尝身仆，且善饮食，脉洪大有力。

73127 宽气饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳壳（水浸，去瓢，麸炒微黄） 枳实（制同上）各一两 人参（去芦） 甘草

(炙) 各半两

【用法】上锉，焙为末，每服半钱至一钱，净汤调服，不拘时候；惊风发搐，姜汁、葱汤调服；热极者，入宽热饮，薄荷蜜汤调下；或麦门汤亦可。

【功用】通利关节，消痰逐水，进美饮食。

【主治】胸膈痞结，气逆不和，不思饮食，精神昏倦；及蓄气成搐，传变成急慢惊风者。

73128 宽气饮

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】枳壳（去瓢）一两 人参（去芦）五钱 天麻 僵蚕（炒，去丝嘴） 羌活 甘草（炙）各三钱

【用法】上锉碎。每服二钱，用水一盏，生姜三片，煎至五分，不拘时候服。

【主治】小儿风痰壅满，风伤于气，不能言语。

73129 宽气饮

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】杏仁（去皮尖，炒） 桑白皮（炒） 橘红 苏子（炒） 枳壳（麸炒） 枇杷叶（蜜炙） 麦冬（去心） 生甘草 苦葶苈

【用法】水煎服。

【主治】小儿龟胸。

73130 宽肝汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参一两 熟地二两 附子一钱 柴胡五分 甘草三分 肉桂三钱

【用法】水煎服。

【主治】猝犯阴寒之气，两胁痛极，至不可受，如欲破裂者。

73131 宽肠丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳壳（炒微黄，用清油浸透一宿，焙干）五钱 麻仁（去壳） 木通（去皮、节） 大黄（半生半炮） 槟榔 大腹皮（洗净，焙干）各二钱半

【用法】上除麻仁用乳钵研极细外，槟榔不

过火，余焙同研成末，入乳钵中与麻仁再杵匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十至五十丸，以枳壳、甘草煎汤，空心送下；一二月婴儿，温蜜汤化服。

【主治】痢后里急，大腑闭涩不通。

73132 宽肠丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】黄连 枳壳各等分

【用法】上为末。面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】以五灰膏涂痔疮之后，脏腑秘结不通者。

73133 宽肠丸

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】黄连 枳壳 百药煎各等分

【用法】上为末，用水糊丸，如梧桐子大。每服三十丸，用米汤送下。

【主治】痔漏。

73134 宽肠药

【方源】《医部全录》卷二〇八引《千金》。

【组成】槐花 大黄 枳壳 木通 连翘 瞿麦 当归

【用法】上用半酒半水煎。

【主治】痔疮用枯药敷后，肛门痛急者。

73135 宽快汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】香附（杵净）二两 天台乌药（去心） 枳壳（制）各一两半 缩砂仁七钱半 苏子（炒）半两 青木香三钱 甘草（炙）七钱半

【用法】上为末，每服二钱，陈皮煎汤调下；或吞青木香丸少许。

【主治】气不下降，大腑涩滞。

73136 宽胀散

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】槟榔 官桂 木香 大腹皮 沉香 青皮各一钱 香附 小茴香各一钱五分

【用法】上药加生姜为引，水煎服。

【主治】妇人阴疝。

73137 宽带汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术一两 巴戟天五钱 补骨脂一钱 肉苁蓉三钱 人参二钱 麦冬三钱 五味子三分 杜仲三钱 莲肉二十个（不去心） 熟地五钱 当归二钱 白芍三钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人脾胃不足，带脉拘急，小腹之间自觉紧迫，急而不舒，断难生子者。

73138 宽带汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术二两 杜仲一两 甘草二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人脾胃不足，带脉拘急，小腹之间自觉紧迫，急而不舒，断难生子。

73139 宽咽酒

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】酒一盏 皂角半条

【用法】将皂角就酒揉掇，浓汁出，急煎一沸，淘温与服。立便冲破，吐出水及血痰。如口噤咽咽不得，即以麻油揉掇皂角汁灌。

【主治】喉闭，逡巡不救。

73140 宽热饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳壳一两（去瓢，锉片，用巴豆十五粒，作二边去壳膜心，同炒枳壳至微黄色，去巴豆片） 大黄一两 粉草七钱半 元明粉二钱半

【用法】上锉，焙为末，临时入元明粉，在乳钵内同前药末研匀，每服半钱至一钱。儿小者抄一字，用姜蜜汤或薄荷汤调服，不拘时候。

【主治】小儿伏热在里，风痰壅满，气促昏闷；或脾胃停滞，日久饮食减少，面黄脉实，发热无时者。

73141 宽热散

【方源】《普济方》卷三七四引《傅氏活婴方》。

【组成】枳壳一两 大黄二两 朴消（研）甘草半两（炙）

【用法】上为末，用锡盒藏之。每服一字，薄荷七叶煎汤送下。

【主治】小儿惊风潮热，客忤痞积。

73142 宽热散

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】石膏 黄芩 甘草 赤芍药 葛根各二钱半 麻黄（去节） 柴胡半两

【用法】上锉散。三岁儿，每服二钱，水一小盏，生姜少许，葱白三寸，豆豉一撮，煎汤冲服。

【主治】小儿惊风。

73143 宽胸丸

【方源】《新医药学杂志》1973;3。

【组成】芫花 900 克 高良姜 延胡索 檀香各 450 克 细辛 150 克 冰片 30 克

【用法】上药提取挥发油，制成浸膏，晒干，研细，装入胶囊，每个胶囊 0.3 克。每服 0.3 克，一日三次。

【功用】温中散寒，芳香开窍，理气止痛。

【主治】冠心病，心绞痛。

【备考】本方方名，《北京市中成药规范》改作“宽胸片”。

73144 宽胸片

《北京市中成药规范》。即《新医药学杂志》1973;3“宽胸丸”改为片剂。见该条。

73145 宽胸饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】柴胡 郁金 川芎 当归 降香 香附 陈皮 砂仁 甘草 延胡索

【功用】疏肝。

【主治】肝实胸痛，不能转侧，善太息者。

73146 宽筋丸

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】防风 荆芥 麻黄（连节，去根）干木瓜 独活各一两 牛膝半两（上药锉碎，用好酒浸二宿，漉出，焙干为末） 草乌头二两 黑豆一两（上二味用水五碗，煮令干，去黑豆，薄切乌头焙干，亦为末）

【用法】上二末和匀，醋糊为丸，如梧桐子

大。每服十丸，渐加至二三十丸，食后温茶或酒送服。

【主治】风壅气道不宣，筋脉拘挛，难以屈伸；兼治脚气疼痒。

73147 宽筋汤

《普济方》卷三七一。为原书同卷引《全要方》“续命汤”之异名。见该条。

73148 宽筋散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】羌活一两 防风一两 续断一两 桂枝四钱 当归一两五钱 芍药一两 甘草四钱

【用法】上为末。陈酒调服。

【功用】宽筋止痛。

73149 宽脾散

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】川芎 茯苓 甘草 白术

【用法】上锉散。水煎，食远服。

【主治】小儿余热不除。

73150 宽缓汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 茯苓各二钱 当归三钱 白芍五钱 甘草 苏叶 黄芩各一钱 竹叶三十片

【用法】水煎服。

【主治】少阳之气不和，胸中胀急，烦闷不安，上不能食，下不能出，大小便窘迫之极。

73151 宽腰汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】车前子三钱 薏仁五钱 白术五钱 茯苓五钱 肉桂一分

【用法】水煎服。

【主治】腰痛。日重夜轻，小便艰涩，饮食如故者。

73152 宽腹丸

【方源】《永类铃方》卷二十一。

【组成】牵牛 萝卜子 陈皮(净) 青皮 木香(炮)各一两 槟榔 紫苏子 木瓜各半两

【用法】上药用巴豆七粒(不去壳)同炒黄，去巴豆，共为末，糊为丸，如小豆大。三岁儿，每服三十丸，紫苏、木瓜汤送下。

【主治】小儿疳气，腹胀，不思饮食，或面肿者。

73153 宽膜汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】白芍三钱 枳壳三分 甘草五分 神曲三钱 白芥子三钱 郁金一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝气郁甚，老痰结成粘块，凝滞喉咙之间，欲咽不下，欲吐不能。

73154 宽膈丸

【方源】《三因》卷八。

【组成】木香 京三棱(炮) 青皮各半两 半夏三两(汤洗七次) 大腹子一分

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后米汤送下。

【主治】气不升降，胸膈结痞。

73155 宽膈丸

【方源】《奇效良方》卷十六。

【组成】麦门冬(去心) 甘草(炙)各五两 人参四两 川椒(炒出汗) 远志(去心，炒) 细辛(去苗) 桂心各三两 干姜(炮)一两 附子(炮)一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前米汤送下。

【主治】七情郁结，膈塞不通，食冷物即发，其病紧痛欲吐，食饮不下，甚者手足冷，短气，或上气喘急、呕逆。

【加减】夏，加麦门冬、甘草、人参各一两。

73156 宽膈散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】山梔仁(炒黑) 川芎 枳实各一钱半 桔梗七分 甘草五分

【用法】上加生姜，水煎服。

【主治】胸满。

73157 宽肠丸散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】当归 荆芥 枳壳 香附 甘草各等分

【用法】上为末，米饮调下二钱。

【主治】年深日近痔疾。

73158 宽中八宝散

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】木香 归尾 萝卜子 真苏子 槟榔 砂仁各一钱半 沉香 牙皂各一钱

【用法】上为末。每服一钱，或二钱，黄酒调下。

【主治】七情忧思，胸腹胀满痞塞。

【加减】小水不利并水肿，加苦葶苈子末一钱五分，蜈蚣后段炙末一钱。

73159 宽中下气汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】枳实四钱 香附末三钱 延胡索三钱(酒炙) 槟榔三钱 瓜蒌仁四钱 广砂仁三钱 郁金四钱 甘草二钱 葶苈子三钱

【用法】水煎。温服。配用鲜姜熨法。

【主治】中宫积有逆气，由脏腑而溢于经络，或客于胸部，或客于胃部，及一发作，则胸胁刺痛不已，甚则痛不可忍。

【方论选录】方以枳实为君，能宽中下气，佐以香附、元胡散滞气，郁金、广砂破郁气，蒌仁、葶苈能引逆气下行，槟榔能逐逆气下降，甘草和药调中。其中宫之逆气既散，则胸胁之痛自止矣。

73160 宽中安虫丸

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】使君子二两(去壳) 陈皮二两 干姜七钱(煨) 槟榔七钱 乌梅二十个 木香五钱 南星五钱(姜制)

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每晨服三四钱，砂糖水送下。

【主治】虫积肠胃而胀。

73161 宽中进食丸

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“宽中喜食无厌丸”之异名。见该条。

73162 宽中快斑汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】陈皮 半夏 白术 枳实 木香 神曲 砂仁 黄连(姜炒) 甘草 厚朴 青皮 连翘 山楂肉

【用法】上加生姜作引，水煎服。

【主治】痘疹起发，内伤饮食，腹中饱闷或痛，中气郁遏，致痘疹不能透发者。

73163 宽中快癍汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】青皮(醋炒) 陈皮 枳壳(炒) 南山楂 麦芽(炒) 木香 黄连(生) 连翘(去心) 厚朴(炒) 甘草(生)

【用法】上加生姜、灯心为引，水煎服。

【主治】痘疹起胀之时，过予饮食，滞热内郁，痘不起胀，懒食恶食，肚皮发热，大便臭粘。

73164 宽中沉参散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏五分 五味子 鹿角胶 茯苓各三分 白术 沉香 款冬花 川芎 紫菀 石斛 山药各二分 人参四分

【用法】上为细末。每服二钱，食前生姜汤调下。

【功用】消饮，养肺，止咳。

73165 宽中和气散

【方源】《女科万金方》。

【组成】藿香 青皮 蓬术 归尾 牛膝 枳壳 半夏 陈皮 白豆蔻 木香 卜子 茯苓 腹子

【用法】上加生姜三片，用水二钟煎，食前服。

【主治】感气胸满不宽，手足麻木。

73166 宽中降逆汤

【方源】《温病刍言》。

【组成】莱菔子 焦山楂 麦芽 焦曲各10克 厚朴 酒大黄 枳实各6克

【用法】水煎服。

【功用】宣导中焦，理气降逆。

【主治】食滞中焦，脘腹胀满，呃逆暖气，

不思饮食。

73167 宽中顺气丸

【方源】《普济方》卷一八三。

【组成】当归(酒浸)半两 芍药半两 白术半两 皂角(直大者,去皮弦,蜜炙)一两半 芒消一两(别研) 大黄二两(生) 郁李仁(去皮)一钱半 牵牛(微炒,取末)二两半 人参(去芦)半两

【用法】上为细末,水泛为丸,如梧桐子大。每服四十丸,渐加至五十丸,食远、临卧温酒或饮汤送下。

【功用】分阴阳,济水火。

【主治】血实气虚,胸胁痞满,或咳逆上气,肋助内疼,痰唾稠粘,咽喉不利,热结心烦,大便迟涩不下。

73168 宽中养胃汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】苍术(炒)四分 香附七分 枳壳(麸炒)五分 厚朴(姜炒)五分 藿香五分 山楂三分 陈皮一钱 砂仁三分(细研) 神曲(炒)四分 槟榔三分 麦芽(炒)四分 枳实(麸炒)四分 半夏五分 茯苓五分 青皮(去瓢)三分 甘草(炙)三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,水煎,食远服。

【主治】胸膈胀满,饮食少用。

73169 宽中祛痰丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【异名】祛风化痰丸(《普济方》卷一六四)。

【组成】半夏四两(汤泡七次,晒研为末,用生姜自然汁捏作饼,阴干) 荆芥穗一两 白矾(枯)一两 麻黄四两(去节) 槐角子一两(麸炒) 陈皮(汤洗,去白)一两 朱砂一两(研末,水飞过,一半入药,一半为衣)

【用法】上为细末,生姜自然汁打糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、临卧用皂角子仁炒黄,同生姜煎汤送下。

【功用】宽中理气,祛痰搜风。

【主治】饮食过多,酒色太过,喜食酸咸作

成痰饮,于胸膈则满闷,呕逆恶心,流则臂膊大痛,升则头目昏眩,降则腰脚重痛,轻则左瘫右痪,重则猛然倒地。

【宜忌】忌食猪羊血、猪肉、鸡鹅、蘑菇、黄瓜、茄子等物。

73170 宽中透毒饮

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】山楂三钱 青皮六分 葛根四分 陈皮五分 前胡八分 莱菔子七分 麦芽一钱 桔梗 蝉蜕各三分

【用法】上加生姜三分,水煎服。

【主治】痘已发未发,而饮食内伤者。

73171 宽中透毒饮

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】葛根 桔梗 前胡 青皮 厚朴(姜炒) 枳壳(麸炒) 山楂 麦芽(炒) 蝉蜕 连翘(去心) 牛蒡子(炒,研) 黄连 荆芥穗 甘草(生)

【用法】上加生姜、灯心为引,水煎服。

【主治】痘欲出,发热呕吐烦渴,大便酸臭。

【加减】若大便秘,小便赤涩,腹热闷痛,加大黄、木通通利之。

73172 宽中健脾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】白术六两 人参 黄耆 苍术 茯苓 五加皮各二两 黄连(用茱萸水炒) 白芍 泽泻各二两半 陈皮(用盐水炒) 半夏 香附 薏苡仁 山楂各三两 草豆蔻 苏子 萝卜子各一两半 沉香六钱 大瓜蒌二个(每个镂一孔,用川椒末三钱,多年粪碱末二钱,装入瓜蒌内,纸糊瓜口,盐泥固济,晒干,煨红为度,去泥与黑皮)

【用法】上药同为末,用荷叶、大腹皮煎汤煮黄米糊丸,如梧桐子大。每服百丸,白汤送下。

【主治】单腹胀,及脾虚肿满,脘中闭塞,胃口作痛。

73173 宽中理气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】木香半两 青皮 陈皮各一两 槟榔 白蔻仁 萝卜子 草澄茄 干姜 胡芦巴 丁香皮 厚朴各半两 黑牵牛一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，食后生姜汤送下。

【功用】顺理诸气，宽利胸膈，调和脾胃，消化痞滞，升降阴阳，进美饮食。

【主治】心腹胀满，腹肋刺痛，呕啰痰水，噫闻食臭，全不思食。

73174 宽中理气丸

【方源】《普济方》卷二十四引《德生堂方》。

【组成】枳实 槟榔 青木香 丁香 神曲 苍术 香附子 葛根各一斤 草澄茄半斤

【用法】上为细末，水糊为丸，每服三十丸，加至五十丸，酒、水、生姜汤任下，不拘时候。

【功用】宽中理气。

【主治】脾胃不和。

73175 宽中愈胀汤

【方源】《女科指南》。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 黄连 枳实 半夏 姜黄 陈皮 知母 黄芩 厚朴 猪苓 泽泻 砂仁 干姜

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】中满单胀。

73176 宽气化痰丸

【方源】《幼科铁镜》卷六。

【组成】大黄三分 杏仁 百合 木通 桑皮 甜葶苈 天门冬 石膏各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。食后临卧，白热水化下。

【主治】小儿龟胸。

73177 宽肠枳壳散

《婴童百问》卷七。为《局方》(人卫本)卷九(吴直阁增诸家名方)“滑胎枳壳散”之异名。见该条。

73178 宽性如意丹

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】白信五厘 巴霜二分 雄黄 白

芷各一钱 母丁香五分

【用法】上为细末，红枣肉捣为丸，如梧桐子大。每服大人二丸，小儿一丸，白汤送下。

【主治】寒痰食积，翻胃噎膈，水泄肚疼，心痛。

73179 宽咽救生散

《普济方》卷六十一引《仁存方》。为《圣济总录》卷一二二“如圣散”之异名。见该条。

73180 宽胸行气散

【方源】《疯门全书》。

【组成】桔梗 木通 枳壳 香附 乌药 芥子 杏仁 陈皮 川芎 酒芍 甘草

【用法】上为散。用灯心为引，水煎服。

【主治】麻风，服感字丸后，胸前觉滞，且多痰者。

73181 宽筋活血散

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】泽兰 秦艽 羌活 独活 香附 归身 苏木 木瓜 续断 加皮 乌药 荆芥 红花 杜仲 枳壳 甘草

【用法】上药酒煎，空心服。

【主治】脚髁骱伤。

73182 宽中喜食无厌丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】宽中进食丸。

【组成】木香五分 青皮 人参 干姜各一钱 炙甘草一钱五分 白茯苓 泽泻 槟榔 橘皮 白术各二钱 缩砂仁 猪苓各二钱五分 半夏七钱 枳实四钱 草豆蔻仁五钱 神曲五钱五分(炒) 大麦芽面一两(炒)

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食远米汤送下。

【功用】资形气，喜饮食。

家

73183 家宝丹

【方源】《丹溪心法》卷一。

【组成】川乌 南星 五灵脂(姜汁制，另

研) 草乌各六两 白附子 全蝎 没药 辰砂各二两 羌活 乳香 白僵蚕(炒) 各三两 片脑五钱 天麻三两 麝香二钱半 地龙四两 雄黄 轻粉各一两

【用法】上为末。每服三分, 不觉, 服半钱, 茶酒调服皆可; 或炼蜜为丸, 如弹子大。含化。

【主治】风疾瘫痪, 痿痹不仁, 口眼喎斜。

73184 家宝丹

【方源】《广笔记》卷二。

【组成】何首乌二两(取鲜者, 竹刀切片, 晒干) 川乌四两(先用湿纸包煨, 去皮) 草乌四两(温水浸半日, 洗去黑毛, 刮去皮, 与川乌同切厚片, 将无灰酒和匀, 入砂器中, 炭火慢煮, 渐渐添酒, 煮一日夜, 以入口不麻为度) 苍术四两(米泔浸一宿, 去皮, 切片, 酒炒) 大当归二两(酒洗) 白附子二两(去皮) 麻黄(去头节, 滚汤泡去沫) 桔梗(炒) 粉草(炙) 防风 白芷 川芎 人参 天麻 大茴香(炒) 荆芥(炒) 白术(面炒) 各四两 木香 血竭 细辛各一两

【用法】上为极细末, 炼蜜为丸, 如弹子大, 每丸重二钱。酒化开, 和童便送下; 如不能饮者, 酒化开, 白汤送下; 产后腹痛者, 酒化开, 益母汤送下; 室女经脉不通者, 用桃仁、苏木、红花、当归煎汤送下。

【主治】妇人产难, 胎衣不下, 血晕, 胎死腹中, 及产后小腹痛如刀刺; 兼治诸气中风, 乳肿, 血淋, 胎孕不安, 赤白带下, 呕吐恶心, 心气烦闷, 经脉不调或不通, 反胃, 饮食无味, 面唇焦黑, 手足顽麻, 一切风痰。

【宜忌】劳热有虚火者, 不宜服。

73185 家宝丹

【方源】《外科传薪集》。

【组成】薄荷头二钱 枪消二钱 灯心灰二分 雄精五分 大梅片三分

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】喉风。

73186 家莲散

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】莲肉(泡, 去皮心, 微火焙干) 四两 厚朴(姜炒) 一两 干姜(炒黑) 一两

【用法】上为细末。每服二三匙, 米饮调下, 一日三次。

【主治】经年久泻冷泄, 及休息痢。

73187 家秘丸

【方源】《中国麻疯病学》。

【组成】光橘叶(即十大功劳, 又名八角茶, 剪去刺, 以醇酒拌, 九蒸晒, 再去叶中筋, 晒干为末) 一斤 元参四两

【用法】上研细末, 水泛为丸。每服二钱, 白汤送下。

【主治】麻疯病愈后。

73188 家秘煎

【方源】《中国麻疯病学》。

【组成】防风 甘菊花 独活 荆芥穗 甘枸杞 羌活 山梔子各等分

【用法】水煎服。

【主治】初期麻疯。

【加减】面部, 加白蒺藜、当归、天花粉、天麻、鼠粘子、薄荷、苍耳、蔓荆子、谷精草; 下部, 加杜仲、金银花、牛膝、宣木瓜、桔梗、炙虎骨、枳壳、熟地、木通; 摄血归元, 加连翘、元参; 补虚, 加桑螵蛸、夏枯草; 血虚加苏木、红花; 妇人加四物汤。

73189 家菊散

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】家菊花(去蒂) 石膏(水飞) 牛蒡子各等分

【用法】上为末。每服二钱, 早、晚食后茶、酒任意调服。

【功用】去风明目。

【主治】诸般头风。

73190 家方黄膏

【方源】《梅疮证治秘鉴》卷下。

【组成】胡麻油 蜜蜡各百钱 牛脂 椰子油 猪脂各七钱 乳香三钱 郁金六钱 烟草叶茎二十枚

【用法】先以麻油入铁盏内，武火煎烟草茎，以焦枯为度，次以文火将四种蜡脂油熔化，以粗布滤去渣滓，以柳木篦搅之，候膏欲凝，而后渐渐入乳香、郁金末，搅之，纳瓷器盛贮。

【主治】阴疮，疔疮，或因梅毒而致头面部腐烂。

73191 家韭子丸

【方源】《三因》卷十二。

【组成】家韭子六两（炒） 鹿茸四两（酥炙） 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 熟地黄 当归各二两 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸）各一两半 杜仲（去皮，锉制，炒断丝） 石斛（去苗） 桂心 干姜（炮）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，空心、食前、盐汤温酒送下。小儿遗尿，别作一等小丸服。

【功用】补养元气，进美饮食。

【主治】少长遗尿；男子虚弱，阳气衰败，小便白浊，夜梦泄精。

【备考】本方方名，《明医指掌》引作“韭子丸”。

73192 家韭子丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】韭子三两（炒） 鹿茸三两（酥炙） 苁蓉三两（酒洗） 熟地五两 当归二两 菟丝三两（饼） 萸肉三两 巴戟三两（炒） 杜仲三两（炒） 肉桂一两半（去皮） 干姜一两半（炒）

【用法】上为末，陈酒糊丸。每服三五钱，淡盐汤送下。

【功用】温肾壮阳。

【主治】肾脏虚寒，遗溺，脉缓涩者。

【方论选录】肾脏虚寒，真阳不秘，故闭藏失职，遗溺不止。韭子壮真阳以温肾，鹿茸补肾以壮阳，巴戟温肾脏以祛寒湿，苁蓉润肾脏以温精血，熟地填补真阴，肉桂温暖真阳，萸肉涩精秘气，当归养血营经，杜仲

补肾脏以作强，干姜暖胃气以散寒冷，菟丝填补肾脏也。陈酒丸，盐汤下，俾肾脏充足，则真阳秘密，而寒邪自散，水府蓄泄有权，安有洩溺遗失之患乎！

73193 家猪屎散

【方源】《外台》卷二十四引《集验方》。

【组成】猪屎

【用法】取猪屎烧作灰，下绢筛。以粉掺败疮中令满，汁出脱去，便敷之。若更生青肉，复着白蔹散。

【主治】败痈深疽，深烂青黑，四边坚强，中央脓血恶汁出，或间有碎骨从中出者，经用赤龙皮汤洗之，白蔹散敷之，止后长敷家猪屎散至愈。

73194 家传大明膏

【方源】《回春》卷五。

【组成】大黄 苍术 柴胡 龙胆草 藁本 细辛 赤芍 菊花（倍） 红花 黄柏 黄芩 连翘 梔子 荆芥 防风 木贼 黄连 蒺藜 薄荷 羌活 独活 麻黄 川芎 白芷 天麻 蔓荆子 玄参 苦参 归尾 木通 生地黄 桑白皮 车前子 枳壳 皮消 甘草

【用法】上锉十大帖，用童便五碗煎熟，用炉甘石一斤，入炭火烧红，淬入药中十次，研烂去粗滓，将药入水铜盆内，重汤煮干成饼，晒干研千余下，每两入焰消八钱，黄丹五分，又研千余下，收入瓷罐内。点眼。

【主治】翳膜攀睛，烂弦，赤障，胬肉，血灌瞳人，迎风流泪，怕日羞明，视物昏花，疼痛不止。

【加减】如胬肉、云翳、昏矇、烂弦、风眼，入冰片少许。

73195 家传木通散

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《婴童妙诀》。

【异名】木通散（《普济方》卷二一四引《济生》）、木通汤（《奇效良方》卷三十五）。

【组成】木通一两 牵牛子半两（炒） 滑

石一两

【用法】上为粗末。加灯心、葱白，水煎去滓，温服。

【主治】小便不通，腹痛。

73196 家传正气散

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】苍术 陈皮 厚朴 藿香 半夏 乌药 枳壳 香附子 大腹皮 甘草

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】心腹胀满，或出远方，不服水土。

73197 家传芎归汤

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】川芎 当归尾 青皮（不去瓢） 木香 山楂 山梔仁（炒） 木通 川楝子 小茴香 猪苓 泽泻各等分

【用法】上咬咀。用流水煎，空心服。

【主治】诸疝。

73198 家传西圣膏

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 熟地 白术 苍术 甘草节 陈皮 半夏 青皮 香附 枳壳 乌药 何首乌 白芷 知母 杏仁 桑皮 金银花 黄连 黄芩 黄柏 大黄 白蒺藜 栀子 柴胡 连翘 薄荷 威灵仙 木通 桃仁 玄参 桔梗 白鲜皮 猪苓 泽泻 前胡 升麻 五加皮 麻黄 牛膝 杜仲 山药 益母草 远志 续断 良姜 藁本 青风藤 茵陈 地榆 防风 荆芥 两头尖 羌活 独活 苦参 天麻 南星 川乌 草乌 文蛤 巴豆仁 芫花各五钱 细辛 贝母 僵蚕 大枫子 川山甲各一两 蜈蚣二十一条 苍耳头二十一个 虾蟆七个 白花蛇 地龙 全蝎 海桐皮 白及 白蔹各五钱 木鳖子八两 桃 柳 榆 槐 桑 楝或杏 楮或椿七枝各三七寸 血余四两

【用法】上药用真麻油十三斤浸之，春五、夏三、秋七、冬半月，日数毕，入大锅内，慢火煎至药枯，浮起为度，住火片时，用布袋滤净

药渣，将油称准，将锅展净，复用细绢滤油入锅内，投血余，慢火熬至血余浮起，以柳棒挑看，似膏溶化之象，熬熟，每净油一斤，用飞过黄丹六两五钱，徐徐投入，火加大些，夏秋亢热，每油一斤，加丹五钱，不住手搅，俟锅内先发青烟，后至白烟，叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成，即便住火，将膏滴入水中，试软硬得中，如老加熟油，若稀加炒丹少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得所为佳，掇下锅来，搅挨烟尽，下细药搅匀，倾水内，以柳棍搅，成块再换，冷水浸半时，乘温每膏半斤，拔扯百转，成块又换冷水投浸。用时，取一块铜杓内熔化摊用。细药开后：乳香、没药、血竭各一两，轻粉八钱，朝脑二两，龙骨二两，赤石脂二两，海螵蛸五钱，冰片、麝香各三钱，雄黄二两，上药共为末，加入前膏内。五劳七伤，遍身筋骨疼痛，腰脚痠软无力，贴膏肓穴、肾俞穴、三里穴；痰喘气急咳嗽，贴肺俞穴、华盖穴、膻中穴；左瘫右痪，手足麻木，贴肩井穴、曲池穴、三里穴；遗精白浊，赤白带下，经脉不调，血出崩漏，贴阴交穴、关元穴；痢疾水泻，贴丹田穴；疟疾，男贴左臂，女贴右臂；腰痛，贴命门穴；疝气，贴膀胱穴；头风，贴风门穴；心气痛，贴中脘穴；走气痛，贴章门穴；寒湿脚气，贴三里穴；胸腹胀闷，贴中脘穴；噎食转食，贴中脘穴；痞疾，先用面作圈，围痞块上，入皮消两许，纸盖，熨斗熨热去消，贴膏再熨，出汗至腹内觉热方止；跌打损伤及诸毒诸疮，俱贴患处。凡内外诸症，贴之必用热布熨之，疥癣疹癩等症，贴脐熨之，汗出为度；血痕痞块，加阿魏、马齿苋膏各二两贴之。

【主治】男妇小儿，远年近日，五劳七伤，左瘫右痪，手足麻木，遍身筋骨疼痛，咳嗽痰喘，疟疾痢疾，痞疾走气，遗精白浊，偏坠疝气，寒湿脚气；及妇人经脉不调，赤白带下，血崩经漏；并跌打损伤，一切肿毒瘰癧，顽疮结毒，臭烂，筋骨疼痛不能动履者。

73199 家传异功丸

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】泽泻一两二钱 猪苓(汤浸, 去皮)三分 官桂半两(减半) 茯苓三分 白术半两 人参半两(去芦) 辰砂半两(另研)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如芡实大。若夏月行路, 轿里含化, 免吃水; 若小儿夏月心热, 烦渴引饮, 煎灯草、竹叶汤化下, 遇渴投之。

【功用】消暑生津。

【主治】暑热口渴。

73200 家传和中丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】人参 炙甘草 当归 川芎 车前子 猪苓 泽泻 神曲 麦芽(俱炒) 诃子肉(面裹煨) 石莲肉各二钱 白术 白茯苓 陈皮 白芍 黄连(炒) 各三钱 木香 干姜(炒) 肉豆蔻(面裹煨) 各二钱

【用法】上为细末, 酒煮面糊为丸, 如黍米大。米饮送下。

【主治】休息痢, 及疳痢。

73201 家传定志方

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】石菖蒲 麦冬 枣仁 茯苓 茯神各二两 木香五钱 熟地五钱 白芍三两 黄芩三两 砂仁 人参 白术各二两

【用法】上为蜜丸。每服七十丸, 龙眼、竹叶汤送下, 一日二次。

【主治】妊娠无外感症, 忽然心悸, 醒则烦闷, 睡则多惊, 或卧中言语恍惚, 及腹胀腹满, 连脐急痛, 坐卧不宁, 气逆迫胎, 皆血虚内热乘心故也。

73202 家传保和丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】白术 陈皮 半夏曲 白茯苓 神曲各三钱 枳实(炒) 厚朴(姜汁炒) 香附(酒浸) 山楂 麦芽曲各二钱半 黄连(姜汁炒) 连翘(去子) 莱菔子各二钱

【用法】上药为末, 荷叶浸水, 煮粳米糊为丸, 如麻子大。姜汤送下。

【功用】补脾胃, 进饮食。

【主治】食积。

73203 家传保和丸

【方源】《育婴秘诀》卷一。

【组成】人参 白术(去芦) 各三钱 白茯苓(去皮) 一钱半 甘草(炙) 山楂肉 麦芽 神曲(炒) 各一钱

【用法】上为末, 另用神曲水煎作糊为丸。

【主治】脾胃素弱, 不能传化, 饮食略多, 便成内伤。

73204 家传养肝丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】羚羊角(镑, 另研) 五钱 生地黄(酒浸) 熟地黄(酒浸) 肉苁蓉(酒洗) 甘枸杞子 防风(去芦) 草决明(炒) 菊花 羌活 当归(酒洗) 沙苑蒺藜(炒) 各一两 楮实子(炒) 五钱 羊子肝(小肝叶, 煮, 焙干, 为末)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 加至七十丸至百丸, 早, 盐汤下, 午, 茶下, 临卧, 酒下, 不饮酒人当归汤送下。

【功用】补肝血, 益肾气。

【主治】肝肾不足, 目失荣养, 视力减弱昏花, 二目艰涩, 大眦赤色, 迎风流泪, 或翳膜不散。

73205 家传神异散

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】乳香 没药 牛黄 冰片 熊胆 朴消霜 青鱼胆 黄连 黄柏 赤石脂 孩儿茶 轻粉 白占

【用法】上前十二味为末, 后一味入麻油少许熬化, 再入前药末煎成膏。贴之。

【功用】清热解毒, 消肿定痛。

【主治】痔漏。

【备考】本方方名, 据剂型, 当为家传神异膏。

73206 家传凉惊丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄连(净) 黄芩(去腐) 山梔仁 黄柏各等分 朱砂 雄黄(俱飞) 减半

【用法】上为极细末，和匀，雪水煮面糊为丸，如黍米大。一岁儿，每服十五丸，渐加至五十丸，薄荷汤送下。

【功用】退热解毒，镇惊安神。

【主治】小儿五脏热盛动风者。

73207 家传消痢丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】天花粉（捣烂，水浸三日，取沉者，晒干用）四两 绿豆粉四两（用薄荷叶蒸过）香附米（童便浸）二两 贝母一两 茯苓一两 白术一两 柿霜四两 牛皮胶三两 牡蛎（煅）百合 山茨菇 杏仁各二两 细茶 粉草各一两 青黛六钱 硼砂三钱 白矾二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二钱，一日二次，俱白滚水送下。

【主治】痢疾。

73208 家传剪红丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】枳壳（炒）槐子（炒）侧柏叶（炒）荆芥穗各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如黍子大。量儿大小给服，米饮送下。

【主治】小儿痢下纯血，及大人肠风下血。

73209 家传滑胎饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】大腹皮 人参 当归 白芍 川芎 广皮

【用法】上药或加炒黄芩前子水煎。临服入童便一盞。

【主治】妇人难产。

73210 家姜黄连丸

《冯氏锦囊·女科》卷十七。为《济生》卷四“蒙姜黄连丸”之异名。见该条。

73211 家秘三黄丸

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】黄芩 黄连 大黄 甘草 广皮

【主治】内伤齿痛，属胃肠热盛，脉洪数应下者。

73212 家秘天地煎

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】天冬 地黄 黄柏 知母 川贝母 甘草 麦冬 桑白皮 地骨皮

【用法】水煎三四次。冲玄武胶服。

【主治】内伤腋痛，属水中之火刑金者。

73213 家秘天地煎

《症因脉治》卷二。为原书同卷“知柏天地煎”之异名。见该条。

73214 家秘天地煎

【方源】《症因脉治》卷二。

【异名】家秘知柏天地煎。

【组成】黄柏 知母 天门冬 地黄 广皮

【主治】内伤呃逆，因阴精不足，相火上冲者。

73215 家秘正气散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】藿香 厚朴 广皮 半夏 干葛 竹茹 麦芽 白茯苓

【用法】水煎服。

【主治】胃有痰涎，呕吐酸水。

【加减】胃火旺，加川连，冲芦根汁服；胃寒，加生姜；胃燥，加天花粉，冲竹沥、萝卜汁温服。

73216 家秘甘露饮

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】人参 薄荷 葛根 滑石 泽泻 鲜藿香 甘草 白茯苓 麦门冬

【用法】水煎，冷饮。

【主治】热气霍乱，心腹绞痛，上吐下泻，烦闷扰乱，昏不知人。

73217 家秘戊己汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】白芍 甘草 陈皮

【主治】血虚腹痛兼气滞者。

73218 家秘归经汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 白芍药 黄芩 黄柏 丹

皮 生地 甘草

【用法】水煎，加磨犀角汁冲服。

【主治】内伤吐衄，阴虚火动，血随火升，错经妄越所致者。

【加减】大便结者，加大黄同煎。

73219 家秘芎归汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归 川芎 生地 连翘 细辛 蔓荆子

【主治】内伤血亏头痛。

73220 家秘冲和汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】羌活 黄芩 防风 生地 白芷 白芍 甘草

【主治】太阳伤寒，自汗发热。

【加减】寒热，加柴胡；眼眶目痛口渴，加葛根，去白芷；小便赤，加木通；渴而有痰，加天花粉；渴而消水，加石膏；呕吐，加半夏；痞满加枳、连。

73221 家秘坎离丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】补阴丸加鹿角胶三两 补阳丸加玄武胶三两

【主治】阴阳两虚。

73222 家秘肝肾丸

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】天门冬 生地 当归 白芍药 黄柏 知母

【功用】滋阴降火。

【主治】内伤胁痛，因肝肾真阴不足，龙雷之火上炎者。

73223 家秘羌活汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】羌活 防风 秦艽 柴胡 葛根 独活 川芎 苏梗 木通 钩藤

【主治】风寒湿三气痛痹。

73224 家秘补阳丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 白芍药各四两 肉桂 附

子各一两 天门冬 生地各八两

【用法】前四味为末，天地煎膏为丸。

【主治】阳虚内寒。

73225 家秘补阴丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 白芍药各四两 黄柏 知母各二两 天门冬 生地各八两

【用法】前四味为末，天地煎膏为丸。

【主治】阴虚内热。

73226 家秘补肝汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归 白芍药 生地 川芎 青皮 香附 木通 苏梗 钩藤

【主治】肝血不足，肝气不调，致内伤胁痛者。

73227 家秘和中汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】人参 当归 黄耆 白术 广皮 甘草 升麻 柴胡 川芎 细辛

【主治】内伤头痛，因气虚者。

73228 家秘泻白散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 黄芩 石膏 川黄连

【主治】实火刑金，肺热喘咳，唇焦便赤。

【加减】胃火，加葛根；脾火，加白芍；肝胆之火，加柴胡；心火，加辰砂；肾火，加黄柏；大肠之火，加枳壳；小肠之火，加木通。

73229 家秘泻白散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 加白芍 川连

【主治】脾经咳嗽。咳而右胁隐痛，神衰嗜卧，面色萎黄，腹胀黄肿，身重不可以动，动则咳剧而肺有热者。

【加减】胃火，加石膏；肝火，加黄芩；心火，加黄连；肾火，加黄柏。

73230 家秘泻白散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 黄芩 山梔 川黄连

【主治】肺壅不得卧。肺素有热，喘咳气逆，时吐痰涎，右胁缺盆牵引作痛，甚则喘息倚肩不得卧。

73231 家秘泻白散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 桔梗 石膏 川黄连 黄芩

【主治】肺痿。肺热痿软，皮毛干揭，上则喘咳，下则挛拳，脉浮数者。

【备考】原书治上症，合二母二冬汤同用。

73232 家秘泻黄散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】苍术 厚朴 广皮 甘草 枳壳 川黄连

【主治】湿热腹胀。面目黄肿，小便赤涩，大便黄糜，日晡潮热，烦渴口苦者。

【加减】酒客，加干葛；腹痛，加大黄；小水赤，加木通、滑石；阳明热，加干葛；寒热，加柴胡；气虚，加人参。

73233 家秘香薷饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】川连 厚朴 香薷 甘草 人参 广皮

【主治】暑气呕吐。头眩目暗，呕吐暴作，身热恶寒，烦渴引饮，唇干齿燥，腹中疼痛，小便短赤，气怯脉虚大者。

【加减】口渴，加干葛、竹茹；有痰，加半夏、藿香。

73234 家秘保和散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】苍术 厚朴 半夏 陈皮 枳壳 鲜麦芽 楂肉 香附 槟榔 干葛 莱菔子

【用法】上为细末，多冲萝卜汁、竹沥，拌湿晒干，研为细末。白汤调服。

【主治】内伤胃脘痛。外感寒湿，内伤饮食，胸前闷痛，脉沉实者。

73235 家秘保和散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】半夏 熟苍术 厚朴 香附 神曲 麦芽 干葛 白豆蔻 广皮 连翘 莱菔子

【主治】积滞之谷疸。

73236 家秘保和散

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】半夏 厚朴 枳壳 香附 楂肉 莱菔子 麦芽 川连 豆蔻 石菖蒲

【用法】上为细末。白汤泡服；或煎汤服。有燥热者，冲竹沥、萝卜汁。

【主治】夹食伤寒，痰涎食重，胶固胃中，胸满寒热。

73237 家秘独圣散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】山楂肉一斤

【用法】研细末。滚白汤调服。

【主治】饮食伤脾，久痢纯血。

73238 家秘胆星丸

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】陈胆星 青黛 海石 龙胆草 甘草

【主治】胆火成痰，痰火内扰不得眠。

73239 家秘胆星汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】陈胆星 柴胡 黄芩 广皮 甘草 青黛 海石

【主治】肝胆郁火成痰，胁肋作痛。

73240 家秘祛痛散

【方源】《直指》卷六。

【组成】青皮（去瓢） 五灵脂（研飞，去砂净） 川楝子 川山甲各二钱 良姜（香油炒） 延胡索 没药各一钱五分 沉香一钱 八角茴香二钱 槟榔一钱五分 木香一钱二分 砂仁少许

【用法】上咬咀为粗末，用木鳖子去壳一钱二分锉片，同前药炒令焦香，去木鳖子不用，共为末。每服一钱，加盐一星，用酒或滚水送下。

【主治】诸般心气疼痛，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，小肠吊症，及妇人血气刺痛。

73241 家秘神术汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】熟苍术 防风 葛根 广皮 厚朴

【主治】外感风湿，口吐清水。

73242 家秘神术汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】苍术 防风 石膏

【用法】三味同煎。

【主治】风热霍乱。头痛身热，上吐下泻，心腹绞痛，甚则转筋。

73243 家秘桂枝汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】桂枝 麻黄 芍药 甘草 苍术 防风 羌活 独活

【主治】太阳寒湿，手足痿软，不能举动，皮肤不仁，关节重痛。

73244 家秘消坚散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】三棱 莪术 槟榔 枳实 香附 海石

【主治】癖积脘痛。胃脘有块，常痛不休。

【加减】上部癖积，加苍术、厚朴；下部癖积，加青皮，枳壳。

73245 家秘消胀散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】半夏 厚朴 枳实 香附 麦芽 山楂 苍术 槟榔 广皮 干葛 神曲 莱菔子

【用法】上为细末。用木通、大腹皮各三钱煎汤调服。

【主治】肠胃停滞，诸腹胀大。

73246 家秘消积散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 神曲 红曲 山楂 鲜麦芽

【主治】饮食伤脾，积痢不止。

73247 家秘消滞汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】平胃散加莱菔子 枳实 山楂 麦芽

【主治】食滞。

73248 家秘润肺饮

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】米仁 百合 杏仁 人参 天冬 麦冬 知母 五味子

【主治】喘咳气逆，肺壅不得卧，由肺燥液干者。

73249 家秘理中汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】人参 白术三钱 干姜（炮）一钱半 甘草（炙） 附子各一钱

【用法】上药煎就去滓，入童便、獾猪胆汁各半杯，再煎一二沸服之。

【主治】中寒呕吐，阴盛格阳，不纳药者。

【备考】方中人参，用量原缺。

73250 家秘黄芩汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】黄芩 山梔 柴胡 甘草

【主治】少阳里热，不得卧。

73251 家秘清胃汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】升麻 生地 川连 山梔 甘草 干葛 石膏

【主治】积热咳嗽，面赤烦躁，嗽则多汗，夜卧不宁，清晨嗽多，小便赤涩，由于中焦积热者。

73252 家秘清胃汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】升麻 川连 山梔 丹皮 生地 木通 甘草

【用法】水煎。以药汁磨生犀角冲服。

【主治】阳明经热，致筋脉挛缩。

73253 家秘清胆汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 陈皮 竹茹

甘草 厚朴 生姜

【主治】胆邪乘胃，呕苦吐酸。

73254 家秘舒筋丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】当归二两 白芍药二两 知母二两 黄柏二两 秦艽四两 木瓜四两（上俱为末） 金银藤二斤 钩藤一斤 天门冬六两 怀生地六两 威灵仙四两（酒浸） 何首乌四两（蒸）

【用法】上将后六味水煎，去渣，收厚膏，拌前药末，打为丸。

【主治】内伤筋挛。

73255 家秘温肺汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】款冬花 生姜 陈皮 百部 苏子 桔梗

【主治】喘咳气逆，肺壅不得卧，由于肺有寒者。

73256 家秘滋肾丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】黄柏二两 知母二两 肉桂二钱

【用法】上为细末，玄武胶为丸。

【主治】肾痹。肾火上炎，腰痛遗精，小便时时变色，足挛不能伸，骨痿不能起。

73257 家秘截疟饮

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】羌活 柴胡 升麻 半夏 厚朴 槟榔 青皮 枳壳 木通 楂肉

【主治】伤寒似疟。

73258 家常八仙酒

《仙拈集》卷三。为《奇方类编》卷下“神仙酒”之异名。见该条。

73259 家方紫金沙散

【方源】《梅疮证治秘鉴》卷下。

【组成】紫金沙（即露蜂房，炒） 鲛甲（炙）各一两 蛇蛻皮（炒）半两 辰砂 琥珀各一钱半

【用法】上研极细末。每服五分，白汤或温酒送下，一日三次。或为丸用亦可。

【主治】脓淋初起，脓汁常漏下，如妇人白带，或阴头下际穿小窍漏下脓水。

73260 家传胎产金丹

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】当归（酒洗） 丹皮（水洗，晒干，勿见火） 蕲艾（醋煮） 延胡索（酒拌，炒干） 川芎 益母草（上头半截，童便浸，晒干） 青蒿 白薇（洗净，人乳拌） 人参 赤石脂（火煅，水飞亦可） 白茯苓 川藟本（洗净） 白术（土炒）各二两 生地（酒洗，煮不犯铁器） 鳖甲（醋炙）各四两 香附四两（醋、酒、盐、童便各浸一两） 桂心 没药（去油） 粉草（酒炒）各一两二钱 北五味一两（去梗，焙） 沉香六钱

【用法】上为细末，用新鲜头生男胎紫河车一具，长流水浸半日，洗净，放入黑铅罐内，再将黄柏四两放河车底下，加白酒酿二斤，清水二碗，灌满铅罐，以铅化封口，再以铁锅盛水，将铅罐悬在锅内，煮两日夜为度，取出捣烂，和入药内，拌匀晒干，再研为末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重三钱五分，水飞米砂为衣，再以黄蜡为皮，如蜡丸式收贮。妇人临产，每服一丸，米汤化下；产下，每服一丸，童便好酒送下；产后，每服一丸；行经后，每服一丸，川芎当归汤送下；苦子小产者，胎动欲产，每服一丸，白滚汤送下，每月常服二三丸；产后血崩，童便好酒送服一丸；产后血晕，当归川芎汤送服一丸；产后惊风，防风汤送服一丸；儿枕痛者，山楂黑砂糖汤送服一丸；胞衣不下，干姜（炒黑）煎汤服一丸；产后虚怯者，川芎当归汤每日送服一丸。凡产后诸证，俱加好酒、童便服。

【功用】种子安胎。

【主治】妇人经水不调，诸虚百损，及胎前产后诸证。

73261 家传丁香脾积丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】丁香 木香 良姜（清油炒）各一钱 青皮 皂角（烧存性） 槟榔各二钱 三

棱(煨) 莪术(煨)各三钱 巴豆四十九粒(去壳膜油,另研如泥)

【用法】上前八味为细末,入巴豆泥,研令匀,醋煮面糊为丸,如麻子大。每服五丸,原物汤送下。

【主治】小儿冷积腹痛,及伤食泄泻。

73262 家传三因冲和丸

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【异名】冲和丸(《准绳·类方》卷五)。

【组成】人参 石斛 白蔻仁 广陈皮各一两 山楂肉二两(各为末,合研令匀,碗盛碟盖,饭上蒸熟,取起待冷方开) 远志(甘草汤泡,去心,取末)一两 山梔(炒焦色,取末)二两 香附(童便浸半日,洗净,醋炒末)二两(三味共研匀,如上法蒸熟,勿令泄气) 海石(末)二两 苍术(米泔浸,洗去浮皮,炒黄取末)二两(二味如上法同蒸) 川芎(末)二两 北柴胡(末)一两 青黛一两(三味和匀,蒸如上法)

【用法】上用谷芽取粉,打糊为丸,如梧桐子大,晒干,用益元散五钱、水飞神砂五钱为衣。常服五十丸,食后白汤送下。胃气开顺,少觉舒泰,则减数服之。可与补中益气汤、六君子汤相兼服。

【功用】养心扶脾,疏肝开胃,畅达三焦,贯通五脏,赞坎离有升降之能,和表里无壅塞之患。

【主治】内伤。

【方论选录】心为脾母,补心则土有力;肝为脾贼,平肝则土乃和。方中以人参、石斛、豆蔻、广皮、山楂调胃补心,接丹田之气;远志、山梔、香附透畅心胞,达膈间之滞气;海石、苍术消痰湿而通内外;川芎、柴胡、青黛疏肝郁,调达者也。此方不犯炎凉,久服则胃和脾壮,体泰康强。

73263 家传升阳固脱汤

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草(炙) 当归 白芍 地黄 升麻 猪苓 泽泻 葛

根 陈皮 乌梅 诃子肉各等分

【用法】上咬咀。量儿大小,水煎服,不拘时候。

【主治】久泻不止,非清气下陷,则肠滑不禁,及肺虚不行。

73264 家传加味枳术丸

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】白术二两 枳实(炒) 陈皮 苍术(制,炒) 香附 神曲(炒)各一两 砂仁五钱

【用法】上为末,荷叶煮米糊为丸。

【功用】补益脾胃,消积进食。

【主治】内伤脾胃。

【加减】气虚者,加人参五钱。

73265 家传加味胃苓丸

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】苍术(制) 厚朴(姜制) 陈皮 白术 猪苓 泽泻 香附(酒浸,炒) 神曲(炒) 白茯苓各等分 炙甘草减半

【用法】上为末,荷叶煮粳米糊为丸。米饮送下。

【功用】导饮消食。

73266 家传安胎保肺膏

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】当归 白芍 生地 熟地 天冬 麦冬 百合 贝母 茯苓 山药 白术 黄芩 杜仲 川断 阿胶 龟胶 款冬花 梨汁

【用法】早、晚调服。

【主治】妊娠体虚感邪,失于表散,邪客肺分,干嗽声嘶,气急不能伏枕,精神困敝。

73267 家传治痢保和丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 枳壳(炒) 厚朴(姜汁炒) 黄连(炒) 山楂肉 萝卜子(炒) 神曲(炒) 麦芽(炒)各五分 木香 槟榔 炙甘草各减半

【用法】上为细末,别取神曲糊为丸,米饮送下。

【主治】小儿痢疾，其积有未尽者，有久痢原未得下者，或脾虚不可下者。

73268 家传枳术越鞠丸

【方源】《保命歌括》卷十一。

【组成】白术二两 枳实(炒) 苍术 香附(盐酒浸) 抚芎 神曲(炒) 陈皮各一两

【用法】上为细末，丸如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【功用】补中解郁。

73269 家传茱萸内消丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】吴茱萸(酒醋浸一宿，焙干) 山茱萸(蒸，去核) 马兰花(醋浸，焙) 川楝子(蒸，去皮核) 桂心 舶上茴香(盐炒) 玄胡索(略炒) 橘红 青皮(去白) 海藻(洗去盐)各一两 桃仁(炒，去皮尖) 白蒺藜(炒，去刺) 木香各半两

【用法】上药为末，酒糊为丸，如麻子大。每服二十丸至五十丸，温酒、盐汤送下。

【主治】寒湿所袭，留伏作痛，癰疽偏大。

73270 家传养脾消积丸

【方源】《幼科发挥》卷一。

【组成】白术一两 陈皮七钱五分 苍术 厚朴(姜汁炒) 枳壳(麸炒) 半夏曲 青皮 神曲 麦芽 山楂各五钱 甘草(炙)三钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如黍米大。每服二三十丸，米饮送下。

【功用】消宿食，去陈积。

【主治】小儿食鸡肉太早，自此成积，日渐羸瘦，不思乳食。

73271 家传秘结祛痛散

【方源】《保命歌括》卷三十。

【组成】青皮(去白) 五灵脂(研飞，去沙土) 川楝子肉 穿山甲(土拌炒)各二钱 良姜(香油炒) 玄胡索 没药各一钱五分 沉香一钱 八角茴香二钱 槟榔一钱五分 木香一钱二分 砂仁少许

【用法】上咬咀，为粗末，用木鳖(去壳)一

钱二分切片，同药炒至香焦，去木鳖不用，研为细末。每服一钱，加盐一星，用酒或滚水调下。

【主治】诸般心气疼痛，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，小肠吊疝，及妇人血气刺痛。

73272 家传秘捶红膏药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】千金子肉一两 蓖麻子肉四两 桃仁一两 杏仁一两 老木鳖子肉一两

【用法】上共捣烂，入藤黄一钱，蟾酥一钱，乳香末三钱、没药三钱，研匀，再捶入松香，看老嫩得宜，再入樟冰一两，血竭、银朱为颜色，隔水炖烊，摊贴患处。

【功用】消散痈疽。

【主治】阳症痈疽。

73273 家传清气化痰丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】天南星四两 大半夏四两(二味先用米泔水各浸三五日，以透为度，洗净切片，以碗一个，盛贮晒干，先姜汁、次皂汁、又次矾汁、又次消水，浸一旦夕晒干) 青皮(去瓢) 陈皮(去白) 枳壳(去瓢，麸炒) 枳实(麸炒) 白术(去芦) 白茯苓(去皮) 苏子(炒) 白芥子(炒) 萝卜子(炒) 香附(盐水炒) 瓜蒌仁 干葛 桔梗(去芦) 苦杏仁(去皮) 黄芩(酒炒) 神曲(炒) 麦芽(炒) 山楂(蒸，去子) 白豆蔻(去壳) 前胡(去芦) 甘草各一两

【用法】上为细末，用前浸四味药水，加竹沥一碗，泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，茶或姜汤送下。

【功用】化痰清火，开胸顺气，消痞除胀，醒酒消食。

【主治】痰饮。

73274 家秘川连枳壳汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄连 枳壳 木通 厚朴 甘草

【主治】湿热泻利。

【加减】口干，加干葛；腹痛应下者，加大

黄、玄明粉。

73275 家秘木通羌活汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】木通 桔梗 羌活 荆芥

【主治】太阳里热不得卧，身热汗出，口渴引饮，小便不利。

73276 家秘加味枳术丸

【方源】《直指》卷六。

【组成】白术（泔浸，土炒）二两 枳实（去瓢，麸炒）一两 神曲（炒） 麦芽（炒，研取粉） 陈皮（去白） 山楂肉 香附（炒）各一两 砂仁（炒）五钱

【用法】上为细末，荷叶烧陈老米饭为丸，如绿豆大。每服五十丸，用清米饮或滚水送下；如胸膈胀闷，枳壳汤送下；如伤酒，干葛汤送下。

【功用】宽中进食，和畅脾胃。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少，胸膈膨闷，酒伤食积，气滞腹满。

【加减】脾胃虚弱者，加人参五钱。

【备考】本方方名，《医统》引作“加味枳术丸”。

73277 家秘加减理中汤

【方源】《保命歌括》卷二十。

【组成】理中汤加熟附子共五钱

【用法】上用水二盏，煎至一盏，去滓，入童便、獾猪胆汁各半杯，煎一二沸服之。

【主治】寒吐，阴盛格阳，不纳药者。

73278 家秘知柏天地煎

《症因脉治》卷二。为原书同卷“家秘天地煎”之异名。见该条。

73279 家秘枳壳黄连汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】川连 枳壳 木通 甘草

【主治】中热泻。发热口渴，唇干齿燥，小便赤涩，腹中一泻即泻，一泻即止，少顷复痛复泻，肛门如火，粪色多黄。

73280 家秘荆防甘桔汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】荆芥 防风 甘草 桔梗 薄荷 大力子

【主治】伤寒咽痛。

【加减】恶寒身痛，加羌活；腰痛足冷，加独活；潮热，加升麻，柴胡。

73281 家秘烂口神效散

【方源】《寿世新编》。

【组成】顶上人中白一两五钱（煅过） 上孩儿茶四钱 洋青黛三钱（水飞） 苏薄荷二钱（去梗） 关黄柏一钱五分（炒） 明雄黄一钱 大梅片二三钱（或五分） 青果核三钱（炕，研极细末） 制铜绿六分 枯白矾八分 鸡内金二钱（刷净秽，炕存性） 白硼砂一钱五分

【用法】共选道地药材，为极细末，瓷罐收贮，塞极紧。临用时，先用温水漱净口中涎秽，再蘸药少许搽烂处，含片刻，吐去毒涎，逾时又搽，数次即愈。

【主治】口舌牙龈腐烂疼痛，走马牙疳，烂喉诸症。

73282 家秘神验松葱膏

【方源】《寿世新编》。

【组成】明净松香一二斤（放入大铜锅，清水煮烊，俟其融化，滚浮水面，用竹划缓缓闭去热水，速倾冷水盆中，少顷即趁热扯拔，如作米糖式，如太烧手，入冷水一冰即取出；冷定难以扯拔，则再入清水锅中煮烊，如前再拔，如是，少则五次，多则七次，拔多愈妙。用新鲜连须全葱三四斤，洗净稍干，捣烂取汁，去滓不用，以葱汁将松香缓缓煮干，仍用冷水一倾，随意做成饼式，愈陈愈妙，称二两） 明雄黄七钱 飞东丹五钱 炒黄柏二钱 洋青黛二钱（水飞） 无名异二钱（炒，研极细） 大梅片五分（另研） 人中白三钱（煅） 上宫粉一钱五分（炒） 净轻粉五分（炒） 制铜绿五分 枯白矾一钱 孩儿茶二钱 真绿豆粉五钱（晒干，和匀）

【用法】上选顶料，共为极细末，瓷瓶内贮塞紧。用时先将烂疮洗净，流水湿烂者，用

绵蘸干即可扑之，二三次即结痂而愈；如疮干用女人搽头陈香油调搽；若白秃疮，宜将头发剃去，洗净疮痂再搽。

【主治】小儿头面耳鼻一切干湿疮痂，及白秃疮。

73283 家秘温疟地黄汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】熟地 丹皮 山药 白茯苓 山茱萸 泽泻 柴胡 独活 白芍 细辛

【主治】肾受冬寒，至春夏始发为温疟。

73284 家藏神验血竭膏

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】当归（酒洗） 白芷 大黄 黄连 黄柏 木鳖子（去壳） 皂角 杏仁 露蜂房各一两 乳香 没药 血竭各三两 血余一两 飞丹一斤 麻油二斤

【用法】上除乳没血竭，余药入油熬焦，去渣，熬至滴水成珠下丹，用柳树棍不住手搅，软硬适中，入乳香等药搅匀即成。

【主治】一切痈疽疔毒。

73285 家传不换金正气散

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】苍术（米泔浸，炒）四两 厚朴（姜汁拌炒）四两 粉甘草（炙）二两 橘红（焙）三两 藿香叶 半夏（姜制）各二两 木香（湿纸裹煨） 人参 白茯苓各一两

【用法】上为散。每服五钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】感冒风寒，或伤生冷，或瘴疟，或疫疔。

浆

73286 浆水饮

【方源】《养老奉亲》。

【组成】浆水三升（酸美者） 青粱米三合（研）

【用法】上煮作饮，空心渐食之，一日二三次。

【功用】宣利。

【主治】老人五淋病，身体烦热，小便痛不利。

73287 浆水饮

《会约》卷十。为《保命集》卷中“浆水散”之异名。见该条。

73288 浆水散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】浆水饮（《会约》卷十）。

【组成】半夏二两（汤洗） 附子半两（炮） 干姜五钱 良姜二钱半 甘草五钱（炙） 桂五钱

【用法】上为细末。每服三五钱，浆水二盏，煎至一盏。和滓热服，甚者三四服，微者三服。

【主治】暴泄如水，周身汗出，一身尽冷，脉微而弱，气少不能语，甚至呕吐。

73289 浆水粥

【方源】《医方类聚》卷二六一引《食医心鉴》。

【组成】白米二合

【用法】上以浆水煮白米作稀粥，临熟下葱白，和匀食之。

【主治】小儿夜啼，小便不通，肚痛。

73290 浆水渍方

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】浆水

【用法】上取一升，以盐半两，和煎令沸。温浸患指，一日三五度。

【主治】代指肿痛。

73291 浆水葱白粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】粟米二合 葱白三十茎（去须）

【用法】上以浆水煮作稀粥，临熟，投葱白搅令匀。温温服之。

【主治】小儿小便不通，肚痛。

瓷

73292 瓷药散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白瓷药一两（细研） 柏叶一两

(微炙) 柏树细枝一两(锉,炒黄) 茜根一两(锉)

【用法】上为细散。每服二钱,热酒调下,不拘时候。

【主治】妇人崩中,下血不止。

【备考】方中茜根,《普济方》作茜根。

资

73293 资生丸

《广笔记》卷二。为原书同卷“保胎资生丸”之异名。见该条。

73294 资生丸

《霍乱论》卷下。为《张氏医通》卷十六“九味资生丸”之异名。见该条。

73295 资生丸

【方源】《医学摘粹·杂证要法》卷二。

【组成】白术三两(米泔水浸,用山黄土拌,九蒸晒,去土,切片,焙干) 橘皮二两 山楂二两(蒸) 神曲二两(炒) 白茯苓一两五钱(人乳拌,饭上蒸,晒干) 人参三两(人乳浸透,饭锅上蒸透) 白豆蔻五钱(微炒) 扁豆一两(炒) 莲肉一两(去心,炒) 山药一两半(炒) 芡实一两半(炒) 薏苡仁二两(炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,每服二钱,细嚼,淡盐汤送下。

【主治】胃有虚热,不能食,常觉饱闷,面黄赤,身常恶热,大便燥结。

73296 资生丹

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】洋参 扁豆 芡实 泽泻 建曲 茯苓 米仁 莲肉 橘红 谷芽 甘草

【主治】脾胃虚弱,泄泻者。

73297 资生汤

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】全当归三钱 真川芎二钱 炮姜炭一钱 炙甘草五分 牡丹皮一钱 山楂肉二钱 鲜红花八分 白茯苓一钱 黑豆三十粒(炒令熟透,以酒少许沃之)

【用法】水煎服。

【功用】祛瘀生新,产后调护。

【加减】胞衣不下,加木通、牛膝;血晕,加花蕊石、泽兰、童便;中风,加独活、荆芥、黑豆;恶露不下,加苏木、桃仁、桂;不语,加石菖蒲、北细辛;腹痛,加五灵脂、延胡、肉桂;心痛,加蒲黄、五灵、延胡;血不止,加荆芥、白芷(俱炒黑);头痛,加荆芥、细辛、葱白;胁痛,加青皮、赤芍、木香;腰痛,加杜仲、续断、补骨脂;乍寒乍热,加肉桂、柴胡;脚膝痛,加牛膝、威灵仙;口干,加麦冬、生地;虚肿,加陈皮、防己;泄泻,加木香、车前子;呕吐,加藿香、生姜;遍身痛,加羌活、秦艽;虚汗,加黄芪、浮麦;惊悸,加远志、朱砂;虚脱,加人参、附子。

【方论选录】妇人以血为本,故多用四物。熟地黄泥膈、白芍酸寒,故产后只用芎归二味为君;炮姜、茯苓除产后虚热为臣;红花代桃仁破血力缓,丹皮消瘀除热为佐;山楂消肉积、除血痕、止儿枕痛,且能消食,甘草和中补土为使。全方祛瘀生新,为产后调护之主方。

73298 资生汤

【方源】《竹林女科证治》卷二。

【组成】紫厚朴(姜汁炒) 藜艾(醋炒) 各七分 当归(酒洗) 川芎各一钱五分 川贝母(去心,另研) 菟丝子各一钱 川羌活 甘草各五分 荆芥穗 生黄耆各八分 枳壳(麸炒) 六分 白芍(酒炒) 一钱二分 姜三片

【用法】上用水二钟,煎八分,入川贝母末和匀,空心温服。临月服三五剂,永无难产之患。若七个月起服,七月服一剂,八月服二剂,九月服三剂,十月服三五剂,临产再服一剂,甚效。

【主治】向有难产,或惯滑胎,或偶动胎气。

73299 资生汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两 玄参五钱 于术三钱 生鸡内金二钱（捣碎） 牛蒡子三钱（捣碎）

【主治】劳瘵羸弱已甚，饮食减少，喘促咳嗽，身热脉虚数者；亦治女子血枯不月。

【加减】热甚者，加生地黄五六钱。

73300 资成汤

【方源】《不居集》卷十。

【组成】人参 白芍 扁豆 山药 茯神 各一钱 丹参八分 橘红六分 甘草五分 莲肉一钱五分 檀香三分

【用法】上用雄健无病猪肚一具，酒洗磨净，取清汤煎药。或为丸亦可。

【主治】虚劳遗精盗汗，食少泄泻，血不归经，女子崩漏不止，虚劳不任膏、术、归、地者。

【加减】虚热者，加丹皮、地骨皮；惊恐不寐，怔忡多汗者，加枣仁；火灼肺金，干枯多嗽者，加百合；便血失血者，加地榆、续断；小便不利者，加车前子；痰多者，加贝母。

【方论选录】方用人参大补元气，以猪肚大健脾胃，茯神、丹参滋养心阴，扁豆、山药培补脾元，白芍缓肝，甘草补土，佐以莲肉合丹参交通心肾，加以檀香、陈皮芳香醒脾。合而用之，则脾胃之气上行心肺，下通肝肾，一滋心阴，一理脾元，壮子益母也。

73301 资血汤

【方源】《普济方》卷三三三。

【组成】马鞭草 荆芥穗各四两 桂心 枳壳 川芎 当归 赤芍药各三两 牡丹皮一两 一方有红花少许

【用法】上为粗末。每服四钱，乌梅一个，水二盏，同煎至一盏，去滓，空心、食前服，一日四次。

【主治】妇人血热气虚，经候涩滞不通，肢体麻木，肌热生疮，浑身疼痛烦倦；或室女及笄，经脉未行，日渐黄瘦，将成癆疾。

【备考】有此证，服至半月或一月，经脉自通。非一二服便见特达之效而鄙之勿服。

73302 资政丸

《百一》卷十五引王吉老方。为原书同卷“去铃丸”之异名。见该条。

73303 资本润燥汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】熟地二两 桑叶三十片 山茱萸五钱 沙参一两 白术一两 甘菊花三钱

【用法】水煎服。

【主治】燥症善惊，腰不能俯仰，丈夫癲疝，妇人小腹痛，目盲眇突。

73304 资生大造丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】人参二两 山药二两 山茱萸二两 补骨脂二两 五味子一两（去蒂） 川牛膝二两 覆盆子一两 楮实子一两 龟版一两（酥炙） 鹿角胶二两 生地一两 枸杞子一两 肉苁蓉二两 菟丝子一两 紫河车一具 白茯苓四两 川杜仲二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每早四钱，白开水或盐汤送下。

【功用】添精补髓，益气生血，固元阳，健脾胃，壮筋骨，安五脏，驱风湿，令人耳目聪明，不受外邪，健步乌须。

【宜忌】忌生姜、胡椒、生萝卜、油面，炒料等物。

73305 资生肾气丸

《金鉴》卷二十七。为《济生》卷四“加味肾气丸”之异名。见该条。

73306 资生顺坤方

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】香附米一斤（四制，春、秋三日，夏二日，冬七日，晒干为末，筛去头末取中末半斤用） 川当归三两（酒浸） 白术三两（土炒） 川芎（雀脑者） 白芍药 熟地黄 生地黄 白茯苓 牡丹皮 黄芩（去朽，炒） 益母草 柴胡 臭椿根白皮各二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心淡醋汤送下，食干物厌之。

【功用】和气调经，养血清热。

【主治】女人寒少热多，久无子孕。

73307 资生健脾膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参二两 于术一两五钱（炒）
广砂仁一两（小粒，研） 木香一两（研） 茯苓二两（研） 陈皮一两二钱 柏子仁一两五钱（炒） 三仙四两（炒黄） 山药一两 紫姜朴一两 小枳实一两二钱（炒，研） 炙甘草五钱

【用法】上药以水熬透，滤去滓，再熬浓，加炼蜜为膏，瓷罐收盛。每用四钱，白水冲服。

【主治】脾胃病。

【方论选录】本方为资生丸加减而得。方以参、术、苓、草、山药甘平补脾元，砂仁、陈皮、紫朴、三仙、枳实辛香调胃气，又以柏子仁润而通之，能补能运，为至和补养之良方。

73308 资生通脉汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】白术三钱（炒） 生淮山药一两 生鸡内金二钱（黄色） 龙眼肉六钱 山萸肉四钱（去净核） 枸杞果四钱 玄参三钱 生杭芍三钱 桃仁二钱 红花一钱半 甘草二钱

【用法】水煎服。

【主治】室女血枯经闭，饮食减少，灼热咳嗽。

【加减】灼热不退，加生地黄六钱；咳嗽，加川贝母三钱、米壳二钱；泄泻，去玄参、加云苓二钱，或酌加白术用量；大便干燥，加当归、阿胶各数钱；小便不利，加车前子三钱、地肤子二钱；肝郁者，加生麦芽三钱、川芎、莪术各一钱；汗多者，加生龙骨、生牡蛎各六钱。

73309 资寿小金丹

《百一》卷一。为《鸡峰》卷二十九“小金丹”之异名。见该条。

73310 资寿黑龙丸

《普济方》卷一一五引《简易》。为《圣济总

录》卷九“黑龙丸”之异名。见该条。

73311 资寿解语汤

《医方大成》卷一引《简易》。为《圣惠》卷十九“桂心散”之异名。见该条。

73312 资生健乾丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】秋石四两 鹿角霜四两 人参（拣明实者佳） 枸杞子 山茱萸肉 麦门冬（去心） 天门冬（去心） 杜仲（姜汁炒断丝） 生地黄 熟地黄（各酒浸）各二两

【用法】上为末，老米面作糊为丸，如梧桐子大。男子每服五十丸，空心滚白汤送下。一月后，候女子月经方过，金水正生之时，男子空心服车前子汤半盏，至夜交会，即有子矣。

【主治】丈夫少病而无子者。

【备考】此种子良方，寒热不偏，君佐不紊，滋补无过。

73313 资液救焚汤

【方源】《法律》卷五。

【组成】生地黄二钱（取汁） 麦门冬二钱（取汁） 人参一钱五分（人乳拌蒸） 炙甘草 真阿胶 胡麻仁（炒，研）各一钱 柏子仁七分（炒） 五味子四分 紫石英 寒水石 滑石各一钱（俱敲碎，研为末） 生犀汁（研）三分 生姜汁二茶匙

【用法】上除四汁及阿胶，余八物用名山泉水四茶杯，缓火煎至一杯半，去滓，入四汁及阿胶，再上火略煎，至胶烊化斟出，调牛黄细末五厘，日中分二三次热服。空朝先服崔氏八味丸。

【主治】五志厥阳之火而成之关格。

烫

73314 烫火药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】烫火散（《中华人民共和国药典》一部）。

【组成】地榆炭八两 黄柏四两 生大黄二两 寒水石（煨）二两 石膏（煨）四两

【用法】共研为细粉，过罗。香油调敷患处。

【功用】清热解毒。

【主治】汤烫火灼，红肿起泡。

73315 烫火散

《中华人民共和国药典》一部。为《北京市中药成方选集》“烫火药”之异名。见该条。

73316 烫伤膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生地榆面六钱 乳香粉四钱 凡士林四两

【用法】上调匀成膏，涂纱布上外贴，或制成油纱条外用。

【功用】解毒止痛，润肤收敛。

【主治】一二度烫伤。

73317 烫伤膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生大黄末 30 克 地榆末 60 克 麻油 500 毫升 黄蜡 60 克

【用法】麻油入锅加温，加入黄蜡熔化，离火，加入药末调和成膏。直接涂布疮面。

【功用】清火，解毒，收敛。

【主治】水火烧烫伤。

73318 烫脚散

《普济方》卷二四六。为《圣济总录》卷八十四“汤脚散”之异名。见该条。

73319 烫火软膏

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】乳香三钱 没药三钱 藤黄三钱 黄蜡二两

【用法】将上药（黄蜡除外）用麻油十两炸枯去滓，再入黄蜡收膏，用丝绵过滤，八折得净膏九两六钱，分装圆铁盒，每盒重六钱。用药少许涂患处，不愈再涂。

【主治】烫伤，火伤。

73320 烫火药膏

【方源】《中药制剂学》。

【组成】麻油一斤 官粉三两 蜂蜡一两五钱 生地二两 米壳一两 冰片一钱

【用法】将麻油加热至 150~200℃时，加

入生地、米壳，不断搅拌，炸至枯浮为度，药渣捞出，压榨出油与炼油合并，加入蜂蜡搅拌，使之熔化后，过 100 目罗，炼油继续加热，投入官粉，不断搅拌，使温度上升至 280℃时急速搅拌，至色纯黑透明离火，搅拌降温至 70℃，加入冰片搅拌，使冰片熔融均匀即得。敷烫伤处，暴露，夏天每日换药一次，冬天隔日换药一次。

【功用】消炎止痛，祛腐生肌。

【主治】水火烫伤。

73321 烫伤软膏

【方源】《浙江中草药制剂技术》。

【组成】白芷二两 忍冬藤二两 紫草二两 冰片一钱 麻油二斤 蜂蜡一两五钱

【用法】将麻油加热至 140℃，加入白芷和忍冬藤，煎熬 10 分钟，再入紫草，继续加热维持 140℃约 20 分钟（以白芷焦黄为度），加入蜂蜡搅溶，离火，立即用多层纱布滤去渣，待冷至 40℃左右，加入研细冰片搅匀，乘热倾入盛于灭菌器中的适当大小的灭菌纱布中，使之浸透，备用。取纱布敷于烧伤面，外盖消毒纱布包扎，每 3~4 天换药 1 次。

【功用】解毒消炎。

【主治】Ⅱ度烧伤。

73322 烫伤乳剂

【方源】《中药制剂汇编》引《赤脚医生》。

【组成】白糖一斤 石灰三至五两 陈茶叶二至四两 桐油适量

【用法】将陈茶叶加水 6000 毫升，煎至 3000 毫升，去滓搅匀，沉淀后过滤，再加白糖搅拌过滤，最后放入桐油适量，边加边搅拌，待成白色乳状即成。外涂，每日数次，不包扎，暴露伤面。

【功用】制酸止痛。

【主治】烫火伤。

73323 烫伤药膏

【方源】《中药制剂汇编》引《辽宁医药》。

【组成】大黄 250 克 黄芩 75 克 黄柏 125 克 甘草 75 克 米壳 75 克 生地黄 75

克 冰片 250 克 蜂蜡 150~250 克 香油 2500 克

【用法】先将香油熬开,放入药材炸焦,温度控制在 160~220℃30 分钟,用 150 目筛趁热滤过,加入蜂蜡,待温度降至 50℃以下时,再加入冰片细粉,搅拌均匀即得。外涂于患处。

【功用】清热消炎,祛瘀生新。

【主治】烧伤,烫伤。

73324 烫洗囊湿止痒药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白鲜皮五钱 地肤子五钱 蛇床子五钱 独活四钱 川楝子四钱 吴茱萸四钱 小茴香五钱 川椒三钱 枯白矾二钱 明雄黄二钱 生甘草三钱

【用法】上为粗末,装布袋内水熬熨洗。

【功用】清热渗湿,祛风止痒。

【主治】阴囊湿疹,瘙痒者。

羞

73325 羞明立胜散

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】黄连三钱 秦皮二钱 防风二钱 黄芩二钱

【用法】上以水煎,用新羊毛笔蘸刷洗眼。

【主治】风热攻目,隐涩难开。

诸

73326 诸石丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】金星石 银星石 玄母石 禹余粮石 滑石 自然铜 磁石 生干地黄 龙仙石(出齐州,又名龙涎石) 阳起石 密陀僧 凝水石各一两

【用法】上捣碎,以罐子盛,用炭火十斤煅,以火尽为度,取出捣研为末,醋煮面糊为丸,如小豆大。每服十五丸,用补药茯苓散二钱匕,以白花蛇酒调下。

【功用】取五色虫。

【主治】大风疾。

73327 诸咳丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】陈皮 百药煎 枳壳 半夏曲 诃子 知母各等分

【用法】上为末,姜汁入蜜为丸。白汤送下。

【主治】诸咳,伤风咳甚发表后,以此断根。

73328 诸疮膏

【方源】《虺后方》。

【组成】苦参半斤 商陆根半斤 桐油一斤(内加香油四两)

【用法】将前二味入油内,共慢火熬至枯黑去滓净,将锅拭净,入前药油再熬,加佗僧细末五两,陆续投下,频投频搅,滴水成珠,取起出火,加黄白蜡各五钱,待将冷,倾入水中去火毒。

【功用】止痛散血生肌。

【主治】诸疮。

73329 诸葛散

《观聚方要补》卷三。为原书同卷引《证治大还》“神效绞肠痧散”之异名。见该条。

73330 诸疮洗药

【方源】《药奁启秘》。

【组成】蛇床子 龙胆草 苦参子 石菖蒲 金银花 生甘草 明矾各等分

【用法】上药煎汤,洗患处。

【主治】疥疮、黄水疮、脓窠疮、坐板疮、湿癣等。

73331 诸疮掺药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】煅熟石膏一两 松香 白芷各三钱 樟脑一钱 轻粉五分 冰片一分

【用法】上为末,用熬熟猪油调搽。

【主治】天泡疮。

73332 诸疽疮膏

【方源】《肘后方》卷五。

【组成】蜡 乱发 矾石 松脂各一两 猪膏四两

【用法】上先下乱发,发消下矾石,矾石消

下松脂，松脂消下蜡，蜡消下猪膏。涂疮上。

【主治】诸疽疮。

73333 诸葛干粮

【方源】《惠直堂方》卷四(附备急方)。

【组成】白茯苓二斤 干姜一两 黄米二升 山药一斤 白面二斤 芡实三斤 麻油半斤

【用法】各药一处蒸熟，焙干为末。每服一匙，新汲水送下，一日一次。

【功用】增气力，疗饥渴。

73334 诸风应效酒

【方源】《直指附遗》卷四。

【组成】当归 川芎 何首乌各三钱 苍术四钱 白芷 苦参 防风 胡麻 石南藤 石连藤 僵蚕各二钱 细辛一钱 穿山甲 黄柏 知母 白芍药 生地黄 牛膝 白术 藁本 木瓜 大枫子 威灵仙 羌活各二钱 川乌一钱 八角风 五加皮 紫荆皮各二钱 木香一钱半 薏苡仁三钱 (上为粗末，用好酒一坛，将药用绢袋盛之，悬于坛口下角，下用文武火煮一二时辰，取出放于湿泥地上，去火毒二三日) 乌药 白芷 木香 荆芥 甘草 首乌 川乌 青藤 藁本 天麻 金银花 苍术 全蝎 细辛 防风 草乌 川芎 人参 当归 石斛 麻黄 两头尖 (上药共为细末)

【用法】每服煎药酒一盅，入末药八分调服。

【主治】诸般风气湿痹，遍身骨节疼痛；及紫白癰风。

73335 诸毒一笔消

【方源】《青囊秘传》。

【组成】真碱一茶盅 矿灰 (即陈石灰) 一两 川山甲 (去筋) 七钱 藤黄一两 大黄 (末) 一两 血竭 (研细) 五钱 雄黄三钱 蟾酥一钱五分 麝香一钱

【用法】上先将石灰、山甲入碱中化七日，次下藤黄、大黄、血竭、雄黄 (边研边下)、蟾酥 (乳汁浸化和入)、麝香，共和匀如稀糊

状。用井水调稀，以新笔圈点涂敷，不空头围。药现配现用，不可多日存量。

【功用】消毒止痛。

【主治】诸毒肿痛。

【宜忌】忌入口中，孕妇忌用。

73336 诸疮一扫光

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】蛇床子五钱 (炒，为末) 大枫子 (去壳，为末) 五钱 水银二钱 白锡一钱 加枯矾一钱

【用法】上先将锡化开，次入水银搅匀，后入上二味研匀，用柏油调搽。

【主治】风癣，疥癩，生板，血风，瘙痒疼痛。

73337 诸疮一扫光

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】一扫光 (《嵩崖尊生》卷十二)。

【组成】苦参 黄柏各一斤 烟胶一升 木鳖肉 蛇床子 点红椒 明矾 枯矾 硫黄 风子肉 樟冰 水银 轻粉各二两 白砒五钱

【用法】上为细末，熟猪油二斤四两化开，入药搅匀作丸，如龙眼大，瓷瓶收贮，用时搽擦患处。

【主治】痒疮。不论新久及身上下，或干或湿，异类殊形，但多痒少痛者。

【宜忌】此方有毒，不可口服。

73338 诸疮解毒丹

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】双花五钱 元芩 地丁 甘草 桔梗 川连 山栀 乳香 黄柏 连翘 京母 白芷 青皮 当归 赤芍 花粉 没药 各三钱 生香 皂刺 重楼 苍耳各二钱 薄荷 山甲各一钱 公英四钱

【用法】共为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，白开水送下。接连服之有效。

【功用】化毒解热，消肿止痛。

【主治】疗毒恶疮，头面诸疮，无名肿毒，妇人乳痈，皮肤顽癣，干湿疥毒。

【宜忌】孕妇忌服。

73339 诸积太仓丸

【方源】《金匱翼》卷四。

【组成】陈仓米四两（以巴豆二十一粒，去皮同炒，至米香豆黑，勿令米焦，去豆不用）橘红四两

【用法】上为末，和丸如梧桐子大。每服五丸，姜汤送下，一日二次。

【主治】诸积。

73340 诸般败毒散

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】锦纹大黄四两（挫碎）

【用法】先以当归一两锉碎，用好酒二碗，煎至八分，将大黄片浸湿一宿，晒干，为末听用。每服大黄三钱，以白芷一钱，连翘六钱，酒煎八分，露一宿调服。其毒从大便出，出尽则以温粥止之。

【主治】诸般疮毒。

73341 诸蛊保命丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】肉苁蓉三两 青矾 红枣 香附各一斤 大麦芽一斤半

【用法】先将苁蓉、青矾入罐内，同煨烟尽，和前药为末，糊丸如梧桐子大。每服二十丸，食后以酒送下。

【主治】蜘蛛蛊胀。

73342 诸痔脱管丸

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】蜂房八钱 猬皮二两五钱 血竭花一两 制象牙二两五钱 僵蚕 木香 蝉退各一钱五分 火消一钱 乳香 没药各一钱五分

【用法】共研极细末，炼蜜和黄蜡二两熔化为小丸。每服一钱，空心白开水送下。

【功用】化瘀解毒止痛。

【主治】大肠热毒，内外诸痔，脱肛便血，肛门痛痒，痔漏生管，脓血淋漓。

【宜忌】忌发物，孕妇忌服。

73343 诸葛行军散

《良朋汇集》卷一。为《内经拾遗》卷三引《医家必用》“诸葛解甲风”之异名。见该条。

73344 诸葛行军散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】绿豆粉 麻黄（去节） 干姜 陈皮各不拘多少

【用法】共为细末。每服三钱，凉水调服。

【主治】感冒风寒。

73345 诸葛行军散

《卫生鸿宝》卷一。为《张氏医通》卷十五“点眼砂”之异名。见该条。

73346 诸葛行军散

【方源】《中药成方配本》。

【组成】麝香一钱 西牛黄一钱 珠粉二钱 冰片一钱二分 腰黄二钱 马牙消二分 姜粉四分

【用法】上各取净末，共研至极细为度，分装七十瓶，每瓶约一分。每用一至二分，开水吞服。小儿减半。

【功用】消暑解毒，辟秽利窍。

【主治】中暑昏晕，腹痛吐泻，热症烦闷，及小儿惊闭。

73347 诸葛行军散

《方剂学》。为《霍乱论》卷下“行军散”之异名。见该条。

73348 诸葛行营散

【方源】《医林纂要》卷六。

【组成】雄黄四两 丹砂五钱 乳香 没药各五钱 矾石（煨）三钱 皂角二钱（炙，研） 冰片二钱 麝香一钱

【用法】上为末，贮小瓷罐中。临用挑取少许，搐鼻取嚏；或用点二眼角。

【主治】暑热瘴疔，猝中暴仆，经络闭塞，霍乱绞痛，面垢爪甲青，自汗不收，一时欲死者。

【方论选录】方中雄黄辛温壮烈，秉正辟邪，除一切暑湿瘴疔结毒积聚；乳香苦温，香窜而滋润，能托里护心，外则舒筋活血，通行十二经脉；没药苦辛平，散结气，通滞血，

去妄热，托里护心；矾石酸咸以补心，收散消痰；皂角辛咸，能补心而荡阴秽，辟邪浊。

73349 诸葛卧龙丹

【方源】《经验秘方类钞》卷上。

【组成】当门麝香一钱 灯草灰(用青竹筒装满，烧存性，净重)一两 猪牙皂角三角 闹洋花三钱 梅花冰片脑一钱 细辛二钱 西牛黄六分(产西戎者，非犀牛也，其体轻气香，置舌上先苦后甜，清凉透心者为真)

【用法】上为细末，贮瓷瓶中，勿令泄气。临用取少许搐鼻。误落水中，心头尚温，及自缢气管初闭，二便未行者，速用芦管速吹取嚏即醒；风火牙痛，以指头蘸药擦之；痈疽发背，及一切无名疔毒，用酒调涂；蜈蚣蛇蝎诸虫毒，及一切山岚瘴毒，亦用酒调涂；妇人胞衣不下，吹药取嚏即下；天行时疫，霍乱吐泻，腹中急痛，四肢发厥，顷刻垂危，用一分，开水调吞。

【主治】中寒中暑，猝然牙关紧闭，倾倒在地；及大人中风中痰，小儿急慢惊风；伤寒胸闷，胸膈壅滞，邪毒郁蒸；及瘟疫发热，外感头痛肢痠。

73350 诸葛解甲风

【方源】《内经拾遗》卷三引《医家必用》。

【异名】发汗散(原书同卷)、诸葛行军散(《良朋汇集》卷一)。

【组成】麻黄(去根节)八两 绿豆十两(连皮)

【用法】上为细末，用无根水半茶钟调服。量强弱加减，壮者钱半，次者一钱，十岁以下用五六分。不用被盖，其汗立出。

【功用】发汗。

【主治】①《内经拾遗》：夏月感冒。②《良朋汇集》：瘟疫。

73351 诸葛武侯平安散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】朱砂二钱 麝香 冰片各五厘 明雄黄 硼砂各五分 白消二分

【用法】上研极细末，用小瓷罐收贮。每用

清水，以骨簪点二三厘在大眼角内，如点眼药法。

【主治】干霍乱，欲吐不得，欲泻不能，变在须臾，名搅肠痧；或遍体紫黑，名乌痧胀。

【宜忌】点后，忌热茶、饮食半日。

【备考】原书治上症，先急用烧盐和阴阳水吐之，或用四陈汤服之，外用本方点眼角。

73352 诸葛武侯行军散

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】珍珠二钱 犀黄一钱 麝香一钱 冰片一钱二分 腰黄二钱 银消二分 姜粉四分 金箔二十张

【用法】上共为末。急用搐鼻取嚏，或用清水调服一分。

【功用】开窍解毒。

【主治】四时六淫之气，山岚瘴毒之邪，骤然中人，痰凝气闭，关阻窍窒，阴阳交乱，以致头眩眼黑，绞肠痧痛，肢冷神昏，霍乱泄泻；及小儿急慢惊风，骤然闭厥。

【宜忌】孕妇忌用。

读

73353 读书丸

【方源】《医统》卷五十。

【组成】人参 远志 石菖蒲 菟丝子 生地黄 地骨皮 五味子 酸枣仁 当归 川芎各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枣汤送下。

【功用】除百病，日记万言。

【主治】健忘。

73354 读书丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】石菖蒲 菟丝子(酒煮) 远志各一两 地骨皮二两 生地黄 五味子 川芎各一两

【用法】上为末，薄糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，临卧白汤送下。

【主治】健忘。

调

73355 调卫汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】周卫汤 (《奇效良方》卷四十四)。

【组成】苏木 红花各一分 猪苓二分 麦门冬 生地黄各三分 半夏 (汤洗七次) 生黄芩 生甘草 当归梢各五分 羌活七分 麻黄根 黄耆各一钱 五味子七枚。

【用法】上咬咀,如麻豆大,作一服。水二盏,煎至一盏,去滓,稍热服。

【主治】①《脾胃论》:湿胜自汗,卫气虚弱,表虚不任外寒。②《医心方》:湿胜自汗,一身尽痛,脉濡者。

【方论选录】《医方考》:风能胜湿,故用羌活;辛能燥湿,故用半夏;淡能渗湿,故用猪苓;湿伤气,黄耆,甘草、麦冬所以益气;湿伤血,苏木、红花、归梢所以消瘀;五味子、麻黄根,收汗液而固表虚;生地、黄芩、凉阴血而除湿热。

【备考】本方方名,《普济方》引作“调卫散”。

73356 调卫汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】黄耆三钱 (蜜炙) 炒白术一钱 人参一钱半 炒苍术一钱 桂枝五分 白芍 (酒炒)一钱半 五味子一钱半 炙甘草五分

【用法】水煎,去滓,温服。

【主治】卫虚多汗,脉浮软者。

【方论选录】卫虚气弱,不能卫外而腠理不密,故多汗不止,黄耆补卫气之虚,白术壮脾气之弱,人参扶元益气,苍术燥湿强脾,白芍敛阴,五味收津液,桂枝行阳气于卫,炙草益胃气于中。使气壮卫强,则腠理缜密而汗可自止,安有不能卫外之患乎?此强中益卫之剂,为卫虚自汗之专方。

73357 调卫饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】广木香 木通 枳壳各八分 当

归 穿山甲 漏芦 柴胡各一钱 甘草三分

【用法】水酒各一钟,食后煎服。

【主治】产后发寒,皆缘乳汁不行,以致多寒。

73358 调卫散

《普济方》卷三十五。即《脾胃论》卷下“调卫汤”。见该条。

73359 调元丸

【方源】《广嗣纪要》。

【组成】香附子 (醋浸,春五,夏三,秋七,冬十,捶极烂,晒干,研为细末,以十两余醋作糊)一斤 当归 川芎 白术 陈皮各五两。

【用法】上五味各为极细末,浸药余醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心食前酒送下;不饮酒,小茴汤送下。

【功用】平气养血开郁。

【主治】女子月事或前或后,或多或少无定期者。

【方论选录】方用香附子、川芎、陈皮以开郁顺气;白术以补脾利滞血;当归养心生新血。

73360 调元汤

《痘疹心法》卷二十三。为《兰室秘藏》卷下“黄耆汤”之异名。见该条。

73361 调元汤

【方源】《医部全录》卷四九〇引《幼幼全书》。

【组成】人参 黄耆 甘草 生地 麦门冬 白芍药 白术

【用法】水煎服。

【主治】痘疹多汗。

【加减】如汗不止,加地骨皮、麻黄根,以猪心肺煮汤为引。

【备考】《片玉痘疹》有黄芩、无生地。

73362 调元汤

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】黄耆一钱 人参五分 炙草二分 半 白芍五分

【用法】水煎服。

【主治】小儿吐泻大病之后，浑身壮热，欲成慢惊风者。

73363 调元汤

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】人参二钱 黄耆三钱(炙) 甘草一钱(炙) 肉桂 姜 枣

【用法】水煎服。

【主治】痘疮气虚，顶陷者。

【备考】方中肉桂、姜、枣用量原缺。

73364 调元汤

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】人参 黄耆 麦冬 甘草 当归

【用法】水煎服。

【主治】痘疹表虚者。

73365 调元汤

【方源】《医方简义》。

【组成】生地四钱 阿胶(烊冲)一钱 白芍(酒炒)二钱 当归二钱 菟蔚子(炒)三钱 泽兰二钱 杜仲(盐水炒)二钱 天冬三钱 鹿角霜二钱

【用法】加桂圆肉五个，水煎服。

【主治】奇脉亏损，经水不调，肢节酸痛，腰痛气滞，心摇神怯，晕眩。

73366 调元汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】炙黄耆 炙甘草 山楂肉 白芍 木香 广皮 川芎 桔梗

【主治】痘疮初起，元气虚者。

73367 调元粉

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】潞参 山药 莲米 芡实 胡桃枣肉 黑芝麻 花生 花椒

【用法】加糯米炒黄磨粉，白糖调服。长服不断。

【功用】大养脾胃，益寿延年。

【主治】脾胃虚弱。

73368 调元散

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】调元地黄汤(《幼科金针》卷上)。

【组成】干山药(去黑皮)五钱 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 茯神(去皮木根) 白术 白芍药 熟干地黄(酒洗) 当归(酒洗) 黄耆(蜜水涂炙)各二钱半 川芎 甘草(炙)各三钱 石菖蒲二钱

【用法】上咬咀。每服二钱，以水一盏，生姜二片，大枣一个，煎七分，温服，不拘时候。如婴孩幼嫩，与乳母同服。

【主治】禀受元气不足，颅囟开解，肌肉消瘦，腹大如肿，致语迟行迟，手足如痛，神色昏慢，齿生迟者。

73369 调元散

【方源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】人参 白术 陈皮 厚朴(制) 香附各一钱 炙甘草 藿香各五分

【用法】每服一二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿变蒸，脾弱不乳，吐乳多啼。

73370 调元散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷三。

【组成】山药 茯苓 橘红 人参 白术(炒) 当归(炒) 甘草(炙) 枸杞各二钱 陈冬米三合

【用法】上为末。每用圆眼汤调下。

【主治】小儿胎怯。

73371 调元散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参 炒白术各一钱 陈皮三分 薏米(研)三分 藿香三分 炒扁豆一钱 法半夏五分 炙草四分 伏龙肝一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿变蒸，脾虚不乳，吐乳多啼，欲发慢惊。

73372 调中丸

【方源】《医心方》卷九引《广济方》。

【组成】人参五两 茯苓五两 甘草五两 白术五两 干姜四两

【用法】上为细末，蜜和为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，空腹温酒送服，日二夜一；不饮酒者，煮大枣饮送下。

【主治】①《医心方》卷九引《广济方》：腹冷气，不能食，及少气。②《圣济总录》：心腹冷气痛。

【宜忌】忌海藻、桃米、酢。

73373 调中丸

【方源】《颅囟经》卷上。

【组成】柴胡 茯苓 人参 木香 桂心 大黄(湿纸裹煨) 枳壳(麸炒，去皮瓤) 甘草(炙) 鳖甲(醋炙) 各等分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每岁服二丸，至五岁三丸，热水送下。

【主治】小儿诸疳，或热攻冲心，肺气急，昼夜有汗，日渐羸瘦，不吃乳食。

73374 调中丸

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】当归半两(锉，微炒) 川椒一分(去目及闭口者，微炒去汗) 附子一个(炮裂，去皮脐) 狼毒半分(炒黄) 巴豆二十个(去皮心，出油尽) 杏仁十二个(汤浸，去皮尖双仁，炒微黄) 细辛一分 豉四合(炒微焦)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大，以器盛之。未满百日儿，每服一丸，以温水送下；三岁儿，每服二丸。以利为度。

【主治】小儿胎寒虚，胀满，不嗜食，大便青，夹白脓，及欲发痢。

73375 调中丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】大黄(锉) 鳖甲(醋炙黄，去裙襖) 朴消 桃仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒) 各四两 莱菔一斤(捶碎，绞取汁) 皂荚五挺(去皮，捶碎，用水一升，绞取汁，滤过)

【用法】将前四味为末，以陈醋一升半，同皂荚、莱菔汁煎五七沸，后人药末，同熬得所为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米汤饮送下。

【主治】大肠风热，秘涩不通。

73376 调中丸

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】白术 高良姜各一两半 桂(去粗皮) 甘草(炙) 人参 京三稜(炮) 各一两 红豆蔻 干姜(炮) 各半两 枳壳(去瓤，麸炒) 三分。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】伤寒后宿食不消。

73377 调中丸

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】大黄五两(锉炒) 麻仁一两(别研) 枳壳(去瓤，麸炒) 白茯苓(去黑皮) 前胡(去芦头) 芍药 黄芩(去黑心) 各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后以饮送下。微利为度。日晚夜卧服之佳。

【功用】辟四时疫疠非节之气。

73378 调中丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】人参一两 赤茯苓(去黑皮) 桔梗(锉，炒) 橘皮(去白焙) 白术 半夏(姜汁同捣作饼，晒干) 沉香 槟榔(锉) 藿香叶各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温生姜汤送下，不拘时候。

【主治】厥逆病，三焦不调，升降否隔，颈痛膺肿，胸满腹胀。

73379 调中丸

《圣济总录》卷一七五。为《圣惠》卷八十八“枳壳丸”之异名。见该条。

73380 调中丸

【方源】《圣济总录》一八七。

【组成】阿魏三钱(用醋化成膏，入白面和作饼子，焙干) 厚朴(捣作粗末，用生姜自然汁拌匀，慢火铤子内炒干) 一钱 白附

子(捣作粗末,用醋拌匀,慢火铍子内炒干)一钱 草豆蔻(和皮捣作粗末)一钱(入青盐二钱,入铍子内同炒黄色)

【用法】上为末,酒煮面糊丸,如绿豆大,以丹砂为衣。每服二十至三十丸,空心食前米饮送下。

【功用】散宿冷,调脏气。

【主治】腰膝疼痛。

73381 调中丸

《小儿药证直诀》卷下。为《伤寒论》“理中丸”之异名。见该条。

73382 调中丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引洪州张道入方。

【组成】鳖甲(醋炙) 当归 黄耆 人参 附子(炮) 桂心 胡黄连各一两 雄黄少许。

【用法】上为末,枣肉为丸,如麻子大。每服三丸,米汤送下。

【主治】肉疳。眼目常痛,饮食不下,食物不消,日渐羸瘦。

【宜忌】忌鱼,油物。

73383 调中丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】人参 白术 鳖甲 柴胡 茯苓 三稜 当归 陈皮各半两

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如麻子大。每服三五十丸,米饮送下。

【功用】化癖进食长肌。

【主治】荣卫不和,脾虚多病,肌体清瘦,或发寒热,面色痿黄。

73384 调中丸

《鸡峰》卷二十三。为原书同卷“益儿丸”之异名。见该条。

73385 调中丸

【方源】《本事》卷十。

【组成】干姜(炮) 橘红 白术 茯苓(去皮) 木香 缩砂仁 官桂(去粗皮,不见火) 良姜各等分

【用法】上为细末,稀糊为丸,如麻子大。每服二、三十丸,食后温水送下。

【主治】小儿久伤脾胃,腹胀。

73386 调中丸

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】青皮 红皮各一两 大黄一两 牵牛三两

【用法】上为细末,滴水和丸,如梧桐子大。每服三二十丸,空心食前温水送下。

【功用】止呕吐,宽利胸膈。

【主治】脾胃虚。

73387 调中丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】赤茯苓(去皮) 白术 陈皮(去瓢) 桔梗 猪苓(去皮) 泽泻 黄芩 大黄 桂(去粗皮)各一两 枳壳(麸炒去瓢) 葛根 木通各一两半 半夏(汤洗) 滑石各二两 黑牵牛(生用)六两

【用法】上为细末,水煮薄面糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,温水送下,不拘时候。

【主治】脾胃不和,内挟湿热,烦躁发渴,不思饮食,头目昏眩,小便不清,胸膈痞闷,肋肋膜胀。

73388 调中丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】赤茯苓 白术 桔梗(锉碎) 泽泻 陈皮(去白) 干葛各一两 滑石 枳壳(麸炒去瓢) 半夏(汤洗七次,焙)各一两半 猪苓(去皮) 黄芩 木通各二分 黑牵牛一两半 干生姜三钱

【用法】上为细末,白面糊和丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后生姜汤送下。

【功用】剖判清浊,升降水土,流湿润燥,消饮除痰。

73389 调中丸

【方源】《保婴撮要》卷九。

【组成】白术 人参 甘草(炒)各五分

【主治】小儿脾胃虚寒。

73390 调中方

【方源】《外台》卷十一引《近效方》。

【异名】调中汤（《普济方》卷一八〇）。

【组成】升麻四分 玄参五分 甘草四分（炙） 知母五分 茯苓三分 牡蛎六分 漏芦五分 枳实六分（炙） 菝葜四分 黄连六分

【用法】上为末。每服方寸匕，一日二次。以愈为度。

【功用】除风湿，理石毒，止小便，去皮肤疮。

【主治】肾虚热渴，小便多。

【宜忌】忌猪肉、海藻、菘菜、酢物。

73391 调中汤

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】薤白（切）一升 枳实六个（炙） 橘皮三个 大枣十二个 梗米三合 香豉六合

【用法】上药切。以水六升，先煮薤，得四升，纳诸药，煮取一升半，适寒温，分二次服。

【功用】调和五脏。

【主治】胃气虚，不欲食，四肢重，短气。

73392 调中汤

【方源】《外台》卷一引《古今录验》。

【组成】大黄 葛根 黄芩 芍药 桔梗 茯苓 藁本 白术 甘草（炙）各二两

【用法】以水九升，煮取三升，分三次服，服别相去二食久，勿以食隔。须取快下，壮热便歇，其下亦止。

【功用】和胃气。

【主治】夏月及初秋，忽有暴寒，折于盛热，热结四肢，则壮热头痛；寒伤于胃，则下痢，或血或水，或赤带下，壮热且闷，脉微且数。

【宜忌】忌海藻、菘菜，猪肉、酢物、桃李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》：葛根、藁本、甘草解表药也；黄芩、芍药、甘草清热药也；大黄、黄芩、甘草攻里药也；芩、术、桔梗、甘草和中药也。为小儿寒郁热邪，腹痛下痢之方，

功用与人参败毒散相仿。

73393 调中汤

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】麦门冬半两 干枣一两 茯苓半两 甘草半两（炙） 桂心半两 当归半两 芍药半两

【用法】上药切。以水八升，煮取三升，去滓，每服一升，一日三次。

【功用】补益气力。

【主治】虚劳。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、醋物。

73394 调中汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】白芍药四两 续断 芎藭 甘草各一两 白术 柴胡各三两 当归一两半 乌梅一升 生姜四两 厚朴 枳实 生李根白皮各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，八日后复服一剂。

【主治】曾伤四月胎者，当预服。

【宜忌】海藻、菘菜、桃李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》：调中者，调土中之嫩阜坎陷也。土为万物之母，一息不调，便生疾苦，况曾伤四月之孕，至此能无坎陷乎？固之之法，阜则削之，陷则培之。方中枳实、厚朴削平敦阜之剂也；白术、甘草运平坎陷之剂也；芎、归、芍、续疏通泉脉之剂也；柴胡、李根，一升清阳，一降逆气；生姜、乌梅，一宣上壅，一固下脱。务令中州之气无过不及，以平为期，则胎息之运动绰有余地，孰谓立方之名无深意存焉。

73395 调中汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】人参 白茯苓（去黑皮）各十两 紫河车 甘草各二两（生）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】胃热肠寒，食已辄饥，小腹痛胀。

73396 调中汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【异名】调中散（《宣明论》卷一）。

【组成】白术 干姜（炮） 当归（切，焙） 人参 赤茯苓（去黑皮）各二两 桂（去粗皮）一两半 五味子 甘草（炙）各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，慢火煎至八分，去滓，稍热服，日二次，夜一次。

【主治】心掣，胸中少气，善咳善泄。

【方论选录】《古方选注》：方中桂枝、干姜、五味开太阳；以参、术、炙草阖阳明；而独倍加桂枝，佐以当归、赤苓、炙草，是不独治三焦，意专重于荣养心阳，以安动掣，则咳泻自止，其义高出千古。

73397 调中汤

《圣济总录》卷一七九。为《圣惠》卷九十三“调中散”之异名。见该条。

73398 调中汤

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】良姜 当归 桂心 芍药 附子（炮） 川芎各一两 甘草（炙）五钱

【用法】上咬咀。每服三钱匕，水三盞，煎一盞，去滓，热服。

【主治】产后腹痛兼泻痢。由产后肠胃虚怯，寒邪易侵，若未满月，饮冷当风，则腹痛阵作，或如锥刀所刺，水谷不化，洞泄肠鸣，或下赤白，脇肋腹胀，或走痛不定。

【备考】《重订严氏济生方》有人参半两。

73399 调中汤

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】陈粟米三两（炒） 缩砂 香茸 零陵香 藿香 香附子 甘草 白扁豆各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，生姜煎服，不拘时候。

【主治】暑气。

73400 调中汤

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】厚朴四两 枳实三两 桂一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盞，煎至一盞，去滓，温服。

【主治】脾胃不调，冷气暴折，客乘于中，寒则气收聚，聚则壅遏不通，卒然胀满，余无所苦，脉弦迟。

73401 调中汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】白术 川芎 当归 熟地 人参 黄耆 苍术 甘草 陈皮 川断 香附 砂仁 柴胡 乌梅 大枣

【功用】理顺三焦，养血安胎。

【主治】妊娠四月，胎动不安。

73402 调中汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】陈皮 半夏 甘草 云苓 归身 川芎 白芍（酒炒） 生地 银柴胡 秦艽 香附（酒炒） 益母草 丹皮 砂仁 煨姜 大枣

【功用】扶养脾胃。

【主治】产后蓐劳，由外伤风冷，内伤忧劳思虑，月内将养失宜。外症咳嗽口渴，头昏气喘，四肢不举，百节疼痛，寒热如疟，盗汗，心膈烦闷，沉重着床，病人困倦，不知痛苦。

【方论选录】是方四物佐丹皮养血滋阴，二陈加香附以行气和胃，秦艽祛风，银柴胡清热，外感内伤两无所损，而元气平复矣。

73403 调中汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】木香一钱（不见火） 防风（去芦） 黄耆（蜜炙） 炙甘草各一分 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 当归（去芦，酒浸） 熟干地黄各二两（洗） 罂粟壳（去顶蒂瓤）半两（剪碎，蜜拌炒令黄）

【用法】上为粗末。每服三大钱，水一盞，加生姜三片，枣子一个，煎至七分，去滓，食前通口服。

【主治】赤白痢。由肠胃虚弱，冷热之气，乘虚相搏，血渗入肠，则为泻痢，重者血与

脓相杂，状如浓涕，轻者浓血上赤脉，状如鱼脑，日夜不绝，脐腹痠痛，不思饮食。

【加减】如血痢，加竹茹一块同煎。

73404 调中汤

【方源】《阴证略例》。

【组成】白术 干姜 白茯苓 甘草各等分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盞半煎。

【主治】内伤寒。寒热间作，腕后有斑三五点，鼻中微血出，两手脉沉涩，胸膈四肢，按之殊无大热。

【方论选录】内伤寒，完颜小将军病寒热间作，腕后有斑三五点，鼻中微血出，两手脉沉涩，胸膈四肢，按之殊无大热，此内伤寒也。问之，因暑卧殿角伤风，又渴饮冰酪水，此外感者轻，内伤者重，外从内病，俱为阴也，故先斑后衄，显内阴症，寒热间作，脾亦有之，非少阳之寒热也，与调中汤数服而愈。

73405 调中汤

【方源】《普济方》卷一四六引《保生回车轮》。

【组成】白术二两 茯苓一两 丁香半两 厚朴二两（生姜汁炒） 半夏一两（汤浸七次，切，焙干） 甘草一两（炙赤色） 肉桂半两（忌火） 槟榔二对（锉碎）

【用法】上为粗散。每服三钱，水一盞，加生姜五片，同煎至七分，去滓，食前温服，日进三服。

【主治】伤寒后脾胃气不和。

73406 调中汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】制厚朴 陈皮（去白） 制半夏各一两 白术一两半 人参五钱 甘草（炙）三钱

【用法】上咬咀。每服一两，水二盞，加生姜七片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】腹胀胃虚空，关脉浮者。

73407 调中汤

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】调中疏邪汤（《医学入门》卷七）。

【组成】苍术一钱半 陈皮一钱 砂仁 藿香 芍药（炒） 甘草（炙） 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳壳各一钱 川芎半钱 麻黄 桂枝各半钱

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】①《丹溪心法》：内伤外感而发阴斑。②《伤寒绪论》：食积挟外感发热。

【方论选录】：《医方考》，内伤则里热，外感则表热，两热而无泄，故令斑烂。内伤者，调其中，苍、陈、砂、藿、半、芍、枳、桔，皆调中药也；外感者，疏其表，麻、桂、羌、芎、芷、草，皆疏表药也。表里治而斑自愈矣。

73408 调中汤

《普济方》卷一八〇，为《外台》卷十一引《近效方》“调中方”之异名。见该条。

73409 调中汤

【方源】《普济方》卷三七一。

【组成】人参 白茯苓 川白芷 白术 石莲肉 龙脑 麝香 芦荟 熊胆 膩粉各半钱（研） 胡黄连 使君子 青黛（研）各一钱 香墨半两（研）

【用法】上胡黄连、使君子为末，余研极细，滴水和丸，如梧桐子大。每服二丸，煎金钱薄荷汤磨下。经宿取恶物，便安。

【功用】和胃气，止吐泻，温中正气。

【主治】小儿急惊。

73410 调中汤

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】枳壳二钱（煮过） 陈皮 半夏 人参各一钱。

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，加生姜、大枣，煎至六分，温服。

【主治】小儿吐逆。

73411 调中汤

《奇效良方》卷十四。为《直指》卷十三“调中散”之异名。见该条。

73412 调中汤

【方源】《保婴撮要》卷七。

【组成】人参 茯苓 白术 木香 干姜 藿香 香附（炒，去毛） 缩砂仁 甘草（炙） 丁香各等分

【用法】水煎，食前服。

【主治】小儿伤乳食，泻后脾胃虚，嘔，吐泻。

73413 调中汤

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】葛根 黄芩 白术 桔梗 藁本 赤芍药 白芍药 甘草（炙）各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，煎至七分，温服。

【主治】滞下。似泻非泻，似痢非痢。

73414 调中汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】人参 黄耆 炙甘草 白芍（酒炒） 白术 木香 陈皮

【用法】加大枣为引，水煎服。

【主治】痘疮吐泻止后。

73415 调中汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】苍术 白术 当归 白芍 滑石 青皮 黄芩 黄连（姜炒） 生地各一钱二分 槟榔六分

【用法】上用水二钟，煎服。

【主治】痢不拘新久，红白杂下，里急后重，腹痛。

73416 调中汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】当归 芍药 白术 茯苓 木香 黄连 槟榔 枳壳

【用法】水煎服。

【主治】痢，里急后重。

73417 调中汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】白术 茯苓 当归 黄耆 木香 广皮 甘草

【主治】脾气损伤。气胀咽满，噫气，食不

得下，四肢不和，面黄喘咳，肿胀脾泄，脉右关细软。

73418 调中汤

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】人参五分 陈皮四分 蝉蜕三分 川芎八分 甘草二分 扁豆一钱 枸杞一钱 谷芽六分

【用法】上加生姜二片，大枣二个，水煎服。此权宜之剂也，精神稍醒，即当加減。

【主治】未痘时，先因吐泻里虚，随感时行见痘，目眶低陷，神情困倦者。

73419 调中汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草（炙） 白芷 藿香 石莲子（去心） 天麻（煨） 橘皮 木香 半夏曲 白扁豆（姜汁、炒）各五分

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【功用】和脾胃，止吐泻，正气温中。

【主治】小儿慢惊。

73420 调中汤

《张氏医通》卷十六。为《温热暑疫全书》卷一“调中饮”之异名。见该条。

73421 调中汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】生黄耆 白姜蚕 甘草 当归 白茯苓 炒扁豆 炒白芍 苡仁 连翘

【用法】水煎服。

【主治】小儿病后虚热，生口疮者。

73422 调中汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】白术一钱半（炒） 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 茯苓一钱半 木香一钱 香附二钱（酒炒） 苏梗三钱 续断三钱（酒炒） 杜仲三钱（酒炒） 砂仁一钱（炒）

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】孕妇腹痛脉弦。

【方论选录】妊娠血气不调，不能荣养其

胎，故腹中疼痛，胎孕不安。白术健脾生血以安胎；当归养血荣经以养胎；木香开胃醒脾，力能调气和中；白芍敛阴和血，性善除痛固胎；茯苓渗湿和脾气；香附调气解郁结；苏梗顺气安胎；砂仁醒脾开胃；续断续经脉；杜仲补腰肾。水煎温服，使血气调和，则胎得所养而胎无不安，何腹痛之不止哉。

73423 调中汤

【方源】《盘珠集》卷中。

【组成】当归 白芍（炒） 川芎 甘草（炙） 附子（制） 肉桂

【主治】产后泻痢。产后未满月，风邪乘虚袭之，留于盲膜，散于腹肋，故腹中阵阵作痛，水谷不化，胀鸣泄泻。

73424 调中汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】藿香 枳实 砂仁 甘草 苍术 茯苓 陈皮 青皮 半夏 厚朴

【主治】风疹。由脾虚感受风邪而作者。

73425 调中汤

【方源】《幼科释迷》卷六。

【组成】茯苓 当归 白芍 陈皮各一钱 白术一钱半

【主治】小儿一切浮肿。

73426 调中汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参一钱半 白术一钱半（炒） 云苓一钱 薏米五分（研） 炮姜五分 砂仁八分（炒） 木香一分 官桂一钱 扁豆一钱（炒） 制草五分

【用法】水煎服。

【主治】小儿伤乳食，泻后脾胃虚，嘔，吐泻。

73427 调中汤

【方源】《女科指南》。

【组成】猪苓 茯苓 半夏 厚朴 大腹皮 陈皮 木瓜 甘草 紫苏 木通 白术

【用法】加砂仁七粒，大枣三个（去核），生姜一片，煎水服。

【主治】产后腹胀肋疼，泄泻痢疾，或块在腹中，或隐或现，并治败血冲脾。

73428 调中饮

【方源】《幼幼新书》卷二十一引茅先生方。

【异名】调中饮子（《准绳·幼科》卷七）。

【组成】肉豆蔻 白术（炮） 人参 陈橘皮（去白） 诃子（炮，去核） 茴香 缩砂仁 甘草（炙）各半两 藿香 桂心 槟榔各三钱

【用法】上为末。每服半钱、一钱，姜、枣煎汤，随儿大小，通口服。

【主治】小儿胃气不和。

73429 调中饮

【方源】《伤寒绪论》卷下。

【组成】苍术（泔浸麻油炒）二钱 白术（生） 厚朴（姜汁炒）

【主治】食积，类伤寒，但身不痛者。

73430 调中饮

【方源】《温热暑疫全书》卷一。

【异名】调中汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】苍术二钱（泔水浸，麻油炒） 白术（生），厚朴（姜汁炒） 陈皮 甘草（炙） 枳实（炒） 神曲（炒） 黄连各一钱（姜汁炒） 山楂二钱（姜汁炒） 草果八分 炮姜五分

【用法】水煎，去滓，磨木香汁少许调服。

【主治】《张氏医通》：食积类伤寒，及手足四肢发阴斑。

【加减】如腹痛，加桃仁；痛甚便秘，加大黄；口干，加省头草。

73431 调中散

【方源】《外台》卷二十五引《广济方》。

【组成】龙骨 人参 黄连 阿胶（炙） 黄柏各一两

【用法】上为散。每服二方寸匕，煮米饮送服，一日二次。愈停。

【主治】冷痢青白色，腹内常鸣，其痢行数太多。

73432 调中散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】调中汤（《圣济总录》卷一七九）。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 木香半两 黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】小儿水谷痢不止，羸瘦腹胀，不欲饮食。

73433 调中散

【方源】《医方类聚》卷二〇四引《修真秘决》。

【组成】白芷半两 黄柏一两（炒） 陈橘（去瓤）二两（炒） 干姜一两（炮） 青橘皮一两（麸炒去瓤） 草果一两（炒，和皮用） 神曲一两（炒） 厚朴三两（依常法修事） 甘草二两（煨） 苍术四两（米泔浸一宿，锉，炒香）

【用法】上为末。每服二钱，入盐点；或泻痢，以生姜粥调下。

【功用】治脾胃，消酒食。

【主治】胸膈胀满，不思饮食。

73434 调中散

【方源】《普济方》卷三十五引《杨子建万全护命方》。

【组成】蓬莪术 京三棱各三分 甘草 黄橘皮一两 独活 芎藭 防风 桔梗 白芷 白术 木香各一两 青橘皮三钱

【用法】上为细末。每服二钱，空心入温盐煎点，任意吃。

【主治】胃气虚冷，少思饮食，面色痿黄，口无滋味，非时吐出清水，频发泄泻，忽时下黄沫白沫，呕逆恶心，身多寒慄，唇皮无光，肌肤不泽，肠内虚鸣，心腹刺痛，忽然心中沉冷气膈不安，一切脾胃虚冷证候。

73435 调中散

【方源】《幼幼新书》卷二十一引张涣方。

【组成】青橘皮（去白，焙） 人参 木香 各一两 白茯苓 丁香 白术 大腹皮 甘

草（炙）各半两

【用法】上为细末。每用一钱，水一小盏，加生姜三片，煎五分，去滓温服。

【主治】小儿冷热不调致脾胃不和。

73436 调中散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《吉氏家传》

【组成】人参 白术各半钱 肉桂 犀角 藿香 甘草（炙）各一钱

【用法】上为细末。每服半钱，枣汤调下。

【主治】虚渴。

73437 调中散

《宣明论》卷一。为《圣济总录》卷五十六“调中汤”之异名。见该条。

73438 调中散

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【组成】人参（去芦） 白茯苓 木香（炮） 白术 甘草（炙） 干姜（炮） 藿香叶 缩砂仁 香附子 丁香各等分

【用法】上为末。每服一钱，加生姜、大枣，煎汤送下；如肚腹痛，以白汤点下。

【主治】①《医方大成》引汤氏方：脾胃不和。②《医方类聚》卷一一三引《经验秘方》：饮食过度，胸膈不利，呕吐吞酸，腹胀肚疼。

73439 调中散

【方源】《直指》卷十三。

【异名】调中汤《奇效良方》卷十四。

【组成】藿香叶 缩砂 蓬术（炮） 干姜（炮） 肉桂 茴香（炒） 草果各半两 麦芽（炒） 益智仁 橘红各三分 苍术（炒） 神曲（炒） 甜梗各二两 甘草（炙）三钱

【用法】上为末。每服三钱，加生姜、大枣并少盐，煎服。

【功用】止呕进食。

【主治】肠虚泄泻。

73440 调中散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 诃子（煨） 陈皮 木瓜 白扁豆（炒） 黄耆

(蜜炙) 木香 罂粟子(炒) 干紫苏叶各等分

【用法】上为细末,白汤点服。

【功用】调气益脾。

【主治】小儿吐泻。

73441 调中散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】白术 人参 白茯苓 甘草(炙) 陈皮 罂粟壳

【主治】小儿虚积痢,腹肚痛,里急频。

73442 调中散

【方源】《普济方》卷三九六引《傅氏活婴方》。

【组成】人参一钱 白茯苓一钱 白术一钱(煨) 木香 御米各一钱 扁豆一钱 藿香一钱 诃子二个(煨) 甘草一钱 石莲肉一钱 (一方加丁香,枳壳,革澄茄,肉豆蔻)

【用法】上为末。每服一钱,陈米饮或甘草汤送下;如和气,紫苏木瓜汤送下;吐泻,气虚不食,头汗不止盐汤送下;胃气虚弱,呕吐腹胀,陈皮汤送下;盘肠气痛,木瓜盐汤送下。

【主治】小儿下痢纯白;吐泻,气虚不食,头汗不止;胃气虚弱,呕吐腹胀;盘肠气痛。

73443 调中散

【方源】《普济方》卷一三二。

【组成】柴胡 前胡(各去毛) 桔梗 贝母(去心) 牡丹皮(去心) 黄芩 麻黄各一分 枳壳(只用青) 梔子各四铢 升麻半两 甘草一分

【用法】上为末。每服三钱,水一盞,煎两三沸,去滓,食后临卧任意服。

【主治】伤寒吃转药,病热已减,然大腑馥热出后,终未快,精神昏闷。

73444 调中散

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】香附 甘草 白茯苓 天仙藤 藿香 白芍药 葛粉

【用法】上为末。每服一钱,食前乌梅甘草

汤调服。

【主治】小儿疳泻、伤食泻。

73445 调中散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】白茯苓 人参 紫河车 甘草(炙) 各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,加生姜三片,大枣二个,煎六分,分三二次服。

【主治】小儿痘疹。

73446 调中散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】人参 白茯苓各二钱 丁香二十个 白术二钱半(炮) 甘草半两(炙) 紫苏二钱半

【用法】上为末。每服一钱,用木瓜煎汤,入盐少许调服,不拘时候。

【主治】小儿吐泻。

73447 调中散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷三。

【组成】青木香 川楝子(去皮核) 没药 人参 茯苓各五分 桂(去皮)三分五厘 白牵牛二十五粒(一半生,一半炒)

【用法】用葱白二寸,盐一捻,水煎,食前服。

【主治】婴孩盘肠气,腹内筑痛。

73448 调中散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】北沙参三两 荷叶(去筋净)一两 广陈皮(浸去白)一两 茯苓一两 川贝母(去心,粘米拌炒)一两 丹参二两 陈仓米(炒熟)三两 五谷虫(酒炒焦黄)一两

【用法】上为细末。每服二钱,用米饮调下,一日三次。

【功用】开关和胃。

【主治】噎膈。

73449 调中散

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】青木香 川楝子 暗没药 白茯苓 上青桂 杭青皮 莱菔子 陈枳壳 尖

槟榔 炙甘草各等分

【用法】入葱白二寸，盐一钱，水煎，空心服。

【主治】婴儿盘肠气，腹内筑痛。

73450 调中散

【方源】《续名家方选》。

【组成】牡蛎六两 甘草 丁香 肉桂 胡椒各二两

【用法】上为细末。白汤送下。

【主治】诸般腹痛。

73451 调化丸

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】生黄耆八钱 白芍（炒） 当归（酒洗）各六钱 牛蒡（炒） 连翘各七钱（去心） 黄芩（炒） 川连各八钱（酒炒） 防风 荆芥各三钱 桔梗 木通各四钱 前胡 紫草茸各六钱 红花（酒洗） 大生地（用新瓦烤酥，焙干即时为末） 人中黄各四钱 蝉退三钱 楂肉八钱 丹皮五钱

【用法】凡酒洗者，须先晒干，方可合诸药同焙，共合为末，米糊为丸。

【功用】清热解毒，扶元活血。

【主治】痘出稠密红紫，潮热不退，烦闷，狂言，一切毒盛之症。

【加减】弱甚者，加入参。

73452 调气丸

《圣惠》卷十六。为《肘后方》卷二“承气丸”之异名。见该条。

73453 调气丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】槟榔 羌活 桂心 芎藭 木香 各一两 郁李仁（汤浸去皮，微炒） 川大黄（锉，微炒） 牵牛子（半生半炒熟） 青橘皮（汤浸去白瓢，焙）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温生姜汤送下。

【主治】妇人大便不通。

73454 调气丸

【方源】《普济方》卷一五四引《指南方》。

【组成】牵牛末一两 陈皮半两 青皮一分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，姜汤送下。

【主治】身体疼痛。

73455 调气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】青橘皮二两 陈橘皮三两 木香半两

【用法】上锉碎，用牵牛面四两同药炒黄色，其牵牛末更不用，将前三味为细末，炼蜜和丸，如鸡头大。每服一丸，含化咽津。

【功用】快气和中进食。

【主治】《普济方》：气噎。

73456 调气丸

【方源】《普济方》卷一八四引《卫生家宝》。

【组成】槟榔 木香 川芎 羌活 肉桂（去皮） 麻仁各半两 枳壳一两（去瓢麸炒） 沉香一分 大黄一两（湿纸裹煨） 郁李仁一两（汤去皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后临卧姜汤送下。

【主治】中气，如中风状。

【备考】中气而以风药治之十无一愈，中风而以气药治之，气顺而风散。

73457 调气丸

【方源】《普济方》卷一八五引《治风经验方》。

【组成】南木香 羌活 舶上茴香（炒） 桂（去粗皮，不见火） 陈皮各半两 蓬莪术（锉，炒） 酸枣仁（炒）各一两半 京三棱（湿纸裹，煨透取出捣） 枳壳（面炒去瓢） 川芎（捶碎炒）各一两 槟榔半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前木瓜汤下。

【功用】调气，进饮食。

【主治】风湿手足麻痹，语言謇涩，胸膈滞闷，痰涎并多。

73458 调气汤

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】京三稜(煨, 锉) 木香各一两 槟榔(煨, 锉) 三分 草豆蔻(去皮) 高良姜各一两半 当归(切, 焙) 芎藭各半两 桂(去粗皮) 人参各三分 芍药 陈橘皮(汤浸去白, 焙) 白茯苓(去黑皮) 各半两 陈曲(微炒) 一两 阿魏(面裹煨, 研) 半两

【用法】上除阿魏外, 为粗末和匀。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 入盐温服。

【主治】注气, 背膊疼痛, 心胸烦闷。

73459 调气汤

《普济方》卷一八二。为《医方大成》卷三引徐同知方“经验调气方”之异名。见该条。

73460 调气汤

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】白芍药 陈皮 生地黄 黄柏(盐水炒) 香附子(醋制) 知母(盐水炒) 当归身各一钱 枳壳 白茯苓各八分 甘草(用生梢) 五分

【用法】上锉碎。白水二钟, 煎至一钟, 去滓热服; 服此药后, 兼服磁朱丸。

【主治】因暴怒, 以致瞳神散大者。

73461 调气汤

【方源】《衡要》卷六。

【组成】白蔻一两 丁香一两 檀香五钱 砂仁五钱 炙草一两 木香五钱

【用法】共为细末。每服三五钱, 以盐沸汤调服, 或八味顺气散亦炒。

【主治】气郁作厥。

【方论选录】《经》云: 辛以散气。用白豆蔻、丁香、檀香、木香、砂仁、藿香等诸辛窜以行壅滞之气, 甘草缓中和药。

73462 调气汤

【方源】《证治汇补》卷六。

【异名】调气散 (《医略六书》卷二十三)。

【组成】香附 乌药 陈皮 青皮 砂仁 甘草 木香 藿香

【用法】水煎服。

【主治】气逆心痛。

【方论选录】《医略六书》: 暴怒伤肝, 肝气上逆, 横于胃口, 而胃气不化, 故心痛不止。香附调气解郁青皮破气平肝; 乌药顺气以降浊; 木香调气以和胃; 陈皮利气除痰; 甘草缓中和药; 藿香开胃气; 砂仁醒脾气。使脾胃调和, 则肝木自平而逆气自降, 胃气调和, 心痛无不霍然矣。此降气平肝之剂, 为气逆心痛之专方。

【备考】《医略六书》本方用: 香附一钱半(炒)、乌药一钱半、青皮一钱半(炒)、木香一钱、陈皮一钱半、藿香一钱半、甘草五分、砂仁一钱(炒)。水煎去滓, 温服。

73463 调气汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】玉竹 麦冬 苏子 炙草 橘红 白前 土沙参 白茯苓 淮山药

【用法】煎服。

【主治】疹后肺气受伤而喘者。

【加减】虚, 加北沙参。

73464 调气汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】代赭石 18 克(布包) 旋复花 6 克(布包) 牛膝 9 克 丹参 15 克 瓜蒌 15 克 郁金 9 克 白芍 9 克 柴胡 6 克 陈皮 9 克 枳壳 9 克 苏梗 桔梗各 6 克 木香 6 克。

【功用】理气、活血、解郁。

【主治】食管狭窄, 食管憩室。吞咽梗阻不利, 胸膈痞满, 有时疼痛或逆气, 舌苔白腻, 脉弦。

【方论选录】方中代赭石镇逆平肝, 有扩张食管的作用, 为治疗食管狭窄之主药; 牛膝降逆; 丹参活血; 瓜蒌、郁金宽胸解郁; 白芍、柴胡舒肝; 陈皮、枳壳、苏梗、桔梗、木香理气。

73465 调气饮

【方源】《金匱玉函经·附遗》。

【组成】黄蜡三钱 阿胶三钱

【用法】上同溶化, 入黄连末五钱搅匀, 分三次热服。

【主治】赤白痢, 少腹痛不可忍, 下重, 或

面青，手足俱变者。

73466 调气饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归一钱五分 远志肉一钱五分 川芎一钱 青皮一钱 乌药一钱 香附一钱五分 红花六分 大茴香八分 肉桂五分 延胡一钱 山楂二钱 艾叶(熟)一钱 砂仁 生姜 川断

【功用】行气和血。

【主治】妇女经欲来而腹痛者。

【加减】寒者，倍肉桂；因怒者，加木香，柴胡；饮食停滞，加神曲、枳壳；血少气滞，加人参、白术、丹参；肥人多痰者，加半夏、茯苓；暑令去肉桂。

【方论选录】妇人当经期欲来而腹先痛，是气滞面血亦随滞，故未来而腹先痛也。青皮乌药、香附之辛温以行气；红花、延胡、肉桂之辛温以行血；艾叶、茴香以暖命门，归、芎远志、川断以补血和血；山楂兼行气血之滞，腹痛自止。

【备考】方中砂仁、生姜、川断用量原缺。

73467 调气饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】广木香 槟榔 枳实 苏梗 青皮 陈皮各二钱 玄明粉四钱

【用法】水煎，临服加蜜一两，热服。

【主治】气闭结滞，大便不通，肚腹急胀。

73468 调气饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】香附 郁金 沉香 元胡 砂仁 荔枝 广香

【用法】水煎服。

【主治】胃痛，游走无定，属气者。

73469 调气散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】白术三分 人参三分(去芦头) 甘草三分(炙微赤锉) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一盞，

入生姜少许，煎至五分，去滓放温服。

【主治】小儿四五岁，腹内冷热不调，不能食饮。

73470 调气散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】木香 香附 厚朴 人参 橘皮 藿香 甘草(炙)各一钱

【用法】上为末。每服三字，加生姜、大枣水煎服。

【主治】变蒸。吐泻，不乳多啼。

73471 调气散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】生姜半两 葱一茎(根叶并用) 盐一捻 豆豉三十粒

【用法】捣烂，安脐中。良久即通。

【主治】老人大小便不通。

73472 调气散

《直指》卷五。为《局方》卷三“匀气散”之异名。见该条。

73473 调气散

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】木香五分 槟榔七分 陈皮八分 甘草三分 青皮(麸炒)一钱 紫苏五分 香附一钱 半夏八分 乳香 没药各三分

【用法】用水二钟，生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】气滞于内，胸膈虚痞，腹中刺痛。

73474 调气散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】沉香 木香 藿香 苏梗 砂仁 白豆蔻 甘草 白檀香

【主治】气结腹痛。气食相凝脾家，中气郁结，胸腹胀满，痛应手背，失气则痛减，气闭则痛甚，脉沉者。

73475 调气散

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】槟榔一钱半 紫苏一钱半 枳壳一钱半(炒) 青皮一钱半(炒) 郁金一钱半 乌药一钱半 香附三钱(炒) 厚朴

一钱半(制) 泽泻一钱半 桔梗八分 生姜三片

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】肢面浮肿，腹胀便闭，脉弦实者。

【方论选录】气实肝脾，邪更闭遏，而湿伏不化，故肢面浮肿，腹胀便闭。槟榔、枳实破滞宽胀；紫苏、厚朴散肿除满；乌药散浊气以顺气；青皮破滞气以平肝；郁金散气解郁；香附解郁调经；桔梗利咽膈；泽泻通利膀胱；生姜之温散，佐降药以通闭结也。使邪解气行则肝脾调和，而胃气无不化，安有大便不通腹胀不退乎？此散肿宽胀之剂，为气壅邪遏之专方。不论男妇，皆可施治。

73476 调气散

《医略六书》卷二十三。为《证治汇补》卷六“调气汤”之异名。见该条。

73477 调气散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】木香 乌药 厚朴(姜制) 白芷 青皮 杏仁(去皮尖) 苍术(米泔水浸炒) 陈皮 前胡 桔梗 甘草梢

【用法】上加生姜、大枣，用水煎，先以淡盐汤灌醒，然后服此。

【主治】跌打损伤昏晕者。

73478 调气散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】香附 藿香 沉香 木香 丁香 橘红 厚朴 槟榔 白蔻 香圆

【用法】上研末。姜汤送下。

【主治】干霍乱，不吐不泻者。

73479 调正汤

【方源】《傅青主男女科·女科》卷上。

【组成】白术五钱 苍术五钱 茯苓三钱 陈皮一钱 贝母一钱 薏米五钱

【用法】水煎服。连服四剂。

【主治】室女鬼胎。月经忽断，腹大如妊，面色乍赤乍白，六脉乍大乍小。

【备考】经攻下恶物后用本方。

73480 调饥散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参五分 山药一两 白芍三钱 甘草五分 肉桂一钱 菖蒲五分 肉豆蔻一个 炒枣仁三钱

【用法】水煎服。

【主治】未见饮食则思，既见饮食则厌，勉强进用，饱塞于上脘，微微胀闷，由胃气之虚、心包之火不足使然。

73481 调生丸

《济阴纲目》卷六。为《局方》卷九(淳佑新添方)“诃诃丸”之异名。见该条。

73482 调圣膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】新石炭 荞麦杆灰半钱 胡椒三十粒 巴豆三十粒(去壳) 木鳖子(去壳) 落藜草灰半斤

【用法】上以三灰一处和匀，三药一处研细，别置箱箕，摊帛于箕内，置灰帛上，下置丸钵盛贮。用沸汤五盏，淋取汁，候稍澄，勿用脚，将汁入铫熬沸，才干又添，直待煎至半盏许，如两呷多大，干即划起，入瓷器内，以椒、豆、木鳖等药搅令匀，便用黄蜡封固，勿泄气，候冷。挑一星许，微点舌头上，即时溃烂些少，过一刻便无事，此其验也。

【主治】二十四种疮毒。

73483 调血汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归 白芍 枳壳 陈皮 黄连 大黄 广香 甘草 车前

【主治】痢疾，赤白相杂者。

73484 调血饮

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归 白芍 枳壳 黄连 地榆 木通 滑石 甘草

【主治】痢疾，单红不白者。

73485 调导饮

【方源】《普济方》卷三二一。

【异名】调导散(《万氏家抄方》卷五)。

【组成】当归 川芎 防风 枳壳各四钱

甘草(炙)二钱

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜、大枣水煎服。

【主治】妇人产前后风秘，大便不通。

【宜忌】忌动风物。

73486 调导散

《万氏家抄方》卷五。为《普济方》卷三二一“调导饮”之异名。见该条。

73487 调阴汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归一钱半 川芎一钱 白芍(酒炒)一钱 生地三钱 阿胶(炒)一钱 丹参三钱 陈皮八分 续断一钱半 青蒿一钱半

【用法】水煎服。

【主治】伤寒热入血室，下血谵语，烦躁不宁。

【加减】如血热而下，加赤芍一钱半，青蒿加重；如血虚燥热，加熟地三、五钱；如瘀血作梗，血滞紫色，加酒炒元胡二钱，红花六、七分；如邪未散而寒热时有者，加柴胡一钱半。

73488 调肝汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】山药五钱(炒) 阿胶三钱(白面炒) 当归三钱(酒洗) 白芍三钱(酒炒) 山萸肉三钱(蒸熟) 巴戟一钱(盐水浸) 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】平调肝气，既能转逆气，又善止郁疼。

【主治】妇人肾气涸，行经后少腹疼痛。

73489 调肝饮

【方源】《玉案》卷三。

【组成】小柴胡汤加甘草 当归 青皮 龙胆草 枳壳各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】口酸。

73490 调肝饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 川芎 乌药 玄胡索 青皮各一钱五分 柴胡 槟榔 广木香 桃仁(去皮尖)各一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】季肋痛连小腹。

73491 调肝散

【方源】《外台》卷二十一引《深师方》。

【组成】细辛 柏实各二两 蕤仁 甘草(炙)各一两 羊肝一具(去脂膜，炙干)

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒送服。

【主治】肝气之少，眼视眊眊，面目青，眼中眵泪，不见光明。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生菜、猪肉、冷水、桃李、雀肉等。

73492 调肝散

【方源】《斑疹备急》。

【异名】犀角汤(《奇效良方》卷六十五)。

【组成】犀角屑一分 草龙胆半分 黄耆半两(炙锉) 大黄一分(炒过) 桑白皮一分(炙锉) 钩藤钩子一分 麻黄一分(去根节) 石膏(别研) 栝楼实各半两(去瓢皮) 甘草一分(炙)

【用法】上为散。每服二钱，水一盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】败肝脏邪热，解散斑疹余毒，令疮疹不入眼目。

【主治】《奇效良方》：小儿疹痘疮及赤疮子，风胜气实，心肝血热，津液内燥，大便不通，毒气上盛，表热未散者。

【方论选录】《奇效良方》：方中栝楼、大黄治内燥；钩藤、龙胆治风血热；桑白皮、石膏治上焦热；麻黄、黄耆散肌热；犀角、甘草解毒热。

73493 调肝散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】半夏(制)三分 辣桂 宣木瓜 当归 川芎 牛膝 细辛各二分 石菖蒲 酸枣仁(汤浸去皮，微炒) 甘草(炙)各一分

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，大枣二个煎服。

【主治】①《直指》：郁怒伤肝，发为腰痛。②《张氏医通》：小腹偏左结痛。

73494 调肝散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】犀角（如无，以升麻代之） 大黄（锉炒） 桑白皮 钩藤 甘草（炙）五钱 天花粉 石膏（煨） 黄芩 木通 荆芥 防风 牛蒡子（炒） 紫草 陈皮（去白） 龙胆草（去芦）各二钱

【用法】上锉为末。白水煎，食后温服。

【功用】令痘疮不入目。

【主治】痘疮热毒大盛者。

73495 调肝散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 生地 白芍药 川芎 柴胡 山梔 黄芩 广皮 甘草

【主治】肝虚劳伤，筋挛烦闷，眼目赤涩，毛焦色夭，腹痛，指甲痛，咳则胁下痛，口苦口酸，筋骨痠疼，寒热咳逆，肝血不足而有火者。

73496 调补丸

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】制首乌八两 百部 生地各五钱 秦艽 当归各三两 车前子 牡丹皮 白菊花各二两

【用法】蜜为丸。每服五钱，早、晚空心百滚汤吞服。

【主治】大麻风。

73497 调补煎

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】制首乌三钱 生地二钱 知母一钱五分 车前 白菊花各一钱 牡丹皮 薄荷各五分

【用法】水煎，午前午后服。

【主治】大麻风。

73498 调和饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】白芍三钱 当归一钱 川芎二钱 黄连二钱 黄芩二钱 桃仁一钱 升麻五分

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】下痢稍久者。

【加减】如红痢依本方；如白痢，用吴茱萸一钱，芩、连用酒炒；赤白痢，加白术，茯苓，陈皮，香附各一钱。

73499 调金汤

【方源】《四明心法》。

【组成】黄芩 黄连 泽泻 当归 白芍 丹皮 神曲 陈皮 厚朴

【用法】生姜为引。

【功用】解毒和血养气。

【主治】痢疾。毒势凝结，痢下红白。

73500 调肺丸

《圣济总录》卷四十九。为《圣惠》卷六“天门冬丸”之异名。见该条。

73501 调肺汤

【方源】《普济方》卷二十七。

【组成】杏仁（汤浸去皮尖双仁，炒）一两 麻黄（去根节，汤煮掠去沫，焙干）二两 甘草（炙）一两 紫苏子（炒）一分 贝母（炒）一两（去心）

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，入干柿一个（切），煎至六分，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】肺气喘急，四肢乏力，饮食无味。

73502 调肺散

【方源】《普济方》卷一五七引《卫生家宝》。

【组成】麻黄二钱（不去节） 甘草二钱（生用） 杏仁（不去皮尖）二钱 灯心十尺长 湖南蚌粉一块（如弹大小）

【用法】上锉为散，入瓷瓶内。用水一大碗，煮至小半碗，候五更初，再温过，去滓，作一服，滓再煎一服。

【主治】新旧咳嗽。

73503 调降汤

【方源】《百一》卷五。

【组成】人参 黄耆（蜜炙） 白芍药 白

茯苓 陈皮(去白) 甘草各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。

【功用】升降气。

【主治】气壅甚。

【加减】有痰，加半夏、生姜；清头目，加川芎；气壅，加紫苏。

73504 调降汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】枳壳(制)一两 半夏(制) 北梗 青皮 陈皮 真苏子 槟榔 茯苓 葶苈(隔纸炒)各半两 木香 白豆蔻仁 缩砂仁 紫苏叶各二钱半 甘草(炙)三分

【用法】上锉散。每用三钱，加生姜五片，煎服。

【主治】喘嗽。

73505 调经丸

【方源】《便览》卷四。

【组成】熟地三两 当归二两 芍药一两半 香附四两 莪术一两 陈皮一两 白术二两 枳实一两 乌药一两 砂仁五钱 阿胶五钱 艾叶七钱

【用法】将艾叶、香附、芍药一处醋煮透焙干为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心米汤送下。

【主治】经水或前或后，或多或少，或有积块，或赤白带下，或经水二三月不行。

【加减】腹痛，加玄胡。

73506 调经丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归(酒洗)二两 川芎 熟地黄(姜汁炒) 青皮(麸炒) 陈皮 枳壳(去瓢，炒) 白术(去芦) 厚朴(姜汁炒) 小茴香(炒) 艾叶(去筋)各一两 三稜(煨醋炒) 莪术(煨醋炒) 砂仁 白芷牛膝(去芦，酒洗) 玄胡各一两 香附(醋炒)五两 粉草 琥珀各五钱(另研入)。

【用法】上为末，醋打糊为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，米汤送下；酒下亦可。

【主治】经闭。

【加减】肚痛，加苍术、去白术。

【备考】《寿世保元》有赤芍，无琥珀。

73507 调经丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】香附半斤(童便、酒、醋各浸一分，生一分，俱酒炒) 川杜仲(姜汁炒)半斤 大川芎 白芍药 当归(去尾) 怀生地 广陈皮 小茴香(酒炒) 玄胡索(略炒) 肉苁蓉(酒浸) 旧青皮(麸炒) 台乌药(炒) 枯黄芩(酒炒) 乌贼鱼骨(酥炙)各四两

【用法】上为末，醋和面打糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心好酒送下。

【功用】调经种子。

73508 调经丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】当归 陈皮 白芷 牛膝 三稜 蓬术(醋制) 玄胡索各一两 白术 川芎 枳壳 小茴香 熟地各一两五钱 香附二两 粉草五钱

【用法】醋煮梗米为丸，如梧桐子大。每服九十丸，空心米饮或酒送下。先服逍遥散，次服加味八珍汤，再服此方。

【功用】补气血，扶脾胃，调经水。

【主治】室女十七八岁，脾胃虚弱，误食生冷，经脉不通，或阻百日，或半年，颜色青黄，饮食少进，寒热往来，四肢困倦，头痛目眩，肚腹疼痛，五心烦热，呕吐膨胀。

73509 调经丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】当归 白芍 山萸 山药 生地 香附各二两 茯苓 丹皮 泽泻 炒栀 陈皮各一两五钱 益母 川芎 白术各一两

【用法】蜜丸服。

【主治】经水或前或后，时多时少，时数时断。

73510 调经丸

【方源】《女科秘要》卷三。

【组成】三棱 蓬术 川归 白芍 生地 熟地 玄胡 白茯苓各一两 川芎 砂仁 乌药各八钱 香附一两二钱 大小茴香各二两

【用法】共为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，早、晚温酒送下。先服黄芩散退其烦热，后服此方。

【主治】妇人血气皆虚，月经前期，色如猪肝水，五心作热，腰痛，小腹痛，面色痿黄，不思饮食。

【备考】先服黄芩散退其烦热，后服此方。

73511 调经丸

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】紫丹参一斤（切薄片）

【用法】于烈日中晒脆，为细末，用好酒泛为丸。每服三钱，清晨开水送下。

【主治】经水不调。

73512 调经丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】香附一两（童便炙） 苍术一两 赤苓一两 川芎三钱 乌药一两 黄柏三钱（酒炒） 泽兰一两 丹皮八钱 当归八钱

【用法】上为细末，水叠为丸，如绿豆大。每服二钱，白开水空心送服。

【功用】调经养血，止痛散瘀。

73513 调经丸

【方源】《谢利恒家用良方》。

【组成】熟地六两 砂仁（打细，和黄酒炒，九蒸九晒）三钱 当归（酒蒸）四两 白芍（酒炒）三两 川芎（酒蒸）一两半 丹参（酒蒸）三两 羌蔚子（酒蒸）四两 香附（醋酒制）四两 姜汁（盐水制）一两 白术（陈土炒）四两

【用法】以益母草八两，酒、水各半，熬膏和炼蜜为丸。每服四钱，空腹时淡盐汤送下。

【主治】月经不调。

【加减】血热者，加丹皮，生地各二两；血寒者，加肉桂五钱

73514 调经丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】香附（炙）二百两 阿胶（炒）一百两 熟地一百两 川芎五十两 白术（炒）七十五两 橘皮五十两 茯苓五十两 当归七十五两 白芍七十五两 麦冬五十两 法半夏五十两 川断五十两 丹皮五十两 玄胡索（醋炙）二十五两 没药（炙）二十六两 益母草一百两 吴茱萸（炙）二十五两 小茴香（炒）二十五两 甘草十五两 黄芩五十两 艾叶（炒炭）五十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】理气调经，止痛散瘀。

【主治】经血不调，行经腹痛，气滞血凝。

73515 调经汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】当归（洗焙） 半夏（汤洗七次） 甘草（炙） 麦门冬（去心） 五加皮 熟干地黄（洗焙） 川芎 吴茱萸（汤洗七次） 肉桂（去粗皮） 牡丹皮 赤芍药 乌药 人参（去芦头） 红花各一两 没药半两（另研）

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盂半，加生姜五片，煎至一盂，去滓，食前温服，经欲行时，预前五日及经断后五日，并宜服之。

【主治】冲任脉虚，风寒客搏，气结凝滞，每经候将行，脐腹先作撮痛，或小腹急胀，攻注腰脚疼重。

73516 调经汤

《内经拾遗》卷一。为《洁古家珍》“三之一汤”之异名。见该条。

73517 调经汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身（酒炒） 赤芍 丹皮 桂心 赤茯苓 炙草 陈皮各一钱 细辛 干姜（炒）各五分

【用法】生姜一片为引，水煎服。

【主治】产后浮肿。新产之后，败血不尽，乘虚流入经络，与气相杂，凝滞不行，腐化

为水，故令四肢浮肿，乍寒乍热。

73518 调经汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】香附（童便制）四两 炙甘草一两 茯神一两五钱 陈皮（泡去白，炒）二两。

【用法】上为末。每服二钱，空心用滚汤调下。

【主治】月经不调而无子者。

73519 调经汤

【方源】《宋氏女科秘书》。

【组成】白当归（酒洗） 淮生地（酒蒸，姜汁炒） 川芎（酒洗） 白芍药（酒炒） 广陈皮 香附（酒炒） 白术（麸炒） 丹皮 砂仁 炙甘草

【主治】月经不调。

73520 调经汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归一两 川芎五钱 白芍六钱 玄胡 肉桂各二钱

【用法】上为末。每服四钱，食远滚水下；煎汤亦妙。

【主治】经事或前或后，或多或少。

73521 调经汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】当归 玄胡索 白术各二钱 香附 白芍 生地各一钱 川芎 陈皮 丹皮各八分 甘草六分 益母草三钱

【用法】月经来日，空心服。

【主治】瘀积经闭。

73522 调经汤

《妇科玉尺》卷四。即《产育宝庆集》卷上“调经散”加炙甘草。见该条。

73523 调经汤

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】生地黄 当归各等分。

【用法】水煎服。

【主治】产后血虚，败血攻冲，邪淫于心，胡言乱语，如见异物。

73524 调经汤

【方源】《女科秘要》卷四。

【组成】川芎七分 当归 生地 益母草各一钱 白芍 香附 丹皮 茯苓各八分 甘草三分 姜三片 枣一个

【用法】空心温服。

【主治】因经闭，败血停积五脏，流入四肢而作浮肿者。

【加减】如血热先期及血热过期，紫黑或块，加黄连七分（酒炒），血寒过期，加煨姜、肉桂各三分；临期正行作痛，加元胡、青皮各八分；临行继断不来，积块刺痛，加红花、苏木、桃仁各五分；经水过多，加黄芩一钱、蒲黄（炒）八分；经来饮食不思，加白术八分、陈皮、砂仁各五分；肥人多痰，赤白带下，加南星、苍术各八分；气虚血弱，四肢虚软，面无颜色，加人参、黄耆各五分。

73525 调经汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】泽兰叶三钱 熟地一钱半 当归一钱半 川芎一钱半（炒） 川楝子一钱（炒） 白芍一钱半（炒） 元胡一钱（炒） 槟榔一钱 木香五分 小茴香一钱（炒） 焦楂一钱半 砂仁五分（炒） 青皮八分（炒） 生草一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇女一切月经不调，或前或后，或多或少，或经后腹痛，或呕吐，或发烧，或干血癆，或久不生育，或室女经来腹痛。

73526 调经饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归三至五钱 牛膝二钱 山楂一至二钱 香附二钱 青皮 茯苓各一钱半

【用法】水二钟，煎七分，食远服。

【主治】妇人经脉阻滞，气逆不调，多痛而实者。

【加减】如因不避生冷而寒滞其血者，加肉桂、吴茱萸之类；如兼胀闷者，加厚朴一钱，或砂仁亦可；如气滞者，加乌药二钱；或痛在小腹者，加茴香一钱半。

【备考】《会约》有玄胡索、陈皮、无青皮。

73527 调经饮

《医级》卷九。即《产育宝庆集》卷上“调经散”加炙甘草。见该条。

73528 调经饮

【方源】《女科指南》。

【组成】黄连 乌药 当归 芍药 川芎 香附 生地 甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】经水超前者。

73529 调经酒

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】当归 川芎 吴萸（泡去苦味）各四两 白芍（炒） 白茯苓 陈皮 玄胡索 牡丹皮各三两，熟地六两 香附米（醋炒）六两 小茴香（盐炒） 砂仁各二两

【用法】火酒三十斤，南酒二十斤，同蒸。

【主治】月水不调，腹内疼痛，癥瘕成块。

73530 调经酒

【方源】《医方易简》卷一。

【组成】全当归五两 远志肉五两 生甘草三钱（洗一、二次）

【用法】上用稀布袋盛之，以甜白酒十斤，如无好者，陈绍酒亦可，浸过七日，晚上温服。慎无间断，将要服完再制，经调乃止。

【主治】经水不调，气血乖和，不能受孕，或生过一胎，停隔多年者。

【方论选录】方中全当归以行血养血，远志肉、生甘草以散血中之滞，行气消痰。

73531 调经散

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【异名】小调经散（《妇人良方》卷二十二）、小调经汤（《医统》卷八十五）。

【组成】没药（另研） 琥珀（另研） 桂心 赤芍药 当归 细辛 麝香（另研）各半钱

【用法】上为末。每服半钱匕，生姜汁，温酒各少许调匀服。

【主治】①《产育宝庆集》：产后四肢浮肿。

因产后败血停积于五脏，循经流入于四肢，留淫日深，腐败如水，故令四肢面目浮肿。②《局方》（续添诸局经验秘方）：产后败血上干于心，心不受触，致心烦躁，卧起不安，如见鬼神，言语颠倒。

【备考】本方加炙甘草，名“调经汤”（见《妇科玉尺》），又名“调经饮”（见《医级》）。

73532 调经散

【方源】《普济方》卷三三六引《便产须知》。

【组成】吴茱萸一两半（去目、闭口，沸汤洗通三次） 半夏一两（汤泡七次） 当归一两（去芦，酒洗） 人参 麦门冬各一两半（去皮） 白芍药（京南者） 川芎（色如腊者） 牡丹皮 厚朴（去皮，不见火） 阿胶（蚌粉炒如珠子） 甘草（炙）各一两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，食前稍热服。

【主治】月候不调，或在月前，或在月后，或多或少，或逾月不至，或一月两来，不孕者。

73533 调经散

【方源】《普济方》卷三三二。

【组成】当归一两（酒浸） 川芎半两 红花三钱 斑蝥（去翅足） 水蛭各二钱（炒） 虻虫二钱（去翅足） 红娘子一钱（去翅足） 牡丹皮半两 赤芍药半两 白芷三钱 蓬术二钱 桂三钱 白姜 生地黄 干漆 川牛膝各二钱

【用法】上为散。每服八钱，水煎，酒半盞，煎至八分，空心服，三日三服。

【功用】行血气。

【主治】月经不调。

【备考】如小便癃闭不通，用甘草汤解。

73534 调经散

《普济方》卷三三二。即《圣济总录》卷一五一“漏芦汤”。见该条。

73535 调经散

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】赤石脂 破故纸各一两

【用法】上为细末。每服二钱，粥饮调下。

【主治】妇人经脉过多。

73536 调经散

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】川芎 当归 芍药 黄耆各一钱半 青皮 乌药 陈皮 熟地黄 乳香（另研） 茴香各一钱

【用法】上作一服。水二钟，煎至一钟，不拘时服。

【主治】跌打损伤。

【备考】疏利后，用此药调理。

73537 调经散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归一钱半 川芎 桂心 甘草各五分 熟地黄 白芍药 香附子 莪术 苏木各一钱 木通八分 红花三分 桃仁二十个（去皮尖，研细）

【用法】上细切。用水一盞半，煎至一盞，去滓，空心温服。

【主治】月经过期不行。

73538 调经散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】当归身一钱半 生地黄 条芩 香附子各一钱 白芍药 黄连（姜汁炒）各八分 川芎 阿胶珠 艾叶 甘草 黄柏 知母各五分

【用法】上细切。用水二盞，煎一盞，去滓，空心温服。

【主治】经先期而来。

73539 调经散

《直指附遗》卷二十六。为《金匱》卷下“温经汤”之异名。见该条。

73540 调经散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】香附米 当归尾各一两 大黄五钱（蒸） 黄芩二两 黄连 生地黄 赤芍药 川芎 羌活 梔子 薄荷 木贼 苏木 红花 甘草各一两

【用法】为散服。

【功用】下气破血通经。

【主治】室女或肥壮妇人血热经闭，过期不行，则血逆于上，血灌瞳仁，满眼赤涩者。

73541 调经散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】乌药 附米 陈皮 川芎 当归 茯苓 防风 荆芥 升麻 干葛 血竭 紫薇花 红花

【用法】二香不过火，煎出药后，将此二味香磨，与药同服。若经脉月流不断，或因气胀冲眼，眼珠肿痛，翳膜不退，服天麻退翳散。

【主治】室女月水停久，倒行逆上冲眼者。

【加减】血不通，加苏木；气不顺，加木香、沉香。

73542 调经散

《傅青主女科》卷下。为《校注妇人良方》卷二十二“小调经散”之异名。见该条。

73543 调经散

【方源】《女科旨要》卷四。

【组成】三棱 小茴 白芍 香附 泽泻 当归各一两 苏叶 红花 青皮 生地各五钱 枳壳 丹皮各一两

【用法】先用煎服，分四帖；后为末，每服三钱，酒下。六七服见效。

【主治】妇人月经不调。

【加减】若要温经，加人参、阿胶、麦冬各三钱。

73544 调经膏

【方源】《理瀹》。

【组成】鲜益母草四两 党参 当归 香附（制） 丹参 熟地 白术 灵脂（炒） 生地各二两 陈皮 青皮 乌药 柴胡 丹皮 地骨皮 川芎 酒芍 半夏 麦冬 黄芩 杜仲 续断 延胡 红花 川楝 苍术各一两 没药 远志肉 枳壳（炒） 吴萸 黄连 厚朴 茴香 木通 木香 官桂 甘草各五钱 炮姜三钱

【用法】雄乌骨鸡一只，竹刀破腹，去毛杂，或用全付骨亦可，酥油熬，黄丹收，牛胶二

两，蒸化搅匀，贴脐下。

【功用】通经。

【主治】月经不调。

73545 调荣丸

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】川芎 苏木 丹皮 蒲黄 乳香 没药 草乌 血竭 乌药 菖蒲 黄芩各一两 益母草 生地 败龟板 熟地 夏枯草 枸杞 当归各四两 阿胶 苦参 苁蓉各二两 知母 地骨皮 人参各一两五钱 琐阳五钱 牛膝 银柴胡 薰本 升麻各三两 桃仁 芍药 柴胡 红花各一两五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。卯午酉时各服百丸，乳酪汤下。

【主治】大麻痹麻，躄曳哑风，颠风诸癩。

73546 调荣汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】白术 杜仲 牛膝 萆薢 独活 陈皮 肉桂 乌药 川断 当归 川芎 香附

【功用】养血温经。

【主治】产后两胯连臀俱酸痛者，由坐草久，劳伤筋脉，稳婆试水太早，或风冷乘于下焦，恶血停滞所致。

【方论选录】产后气血已亏，不能流通，加以风冷乘虚入宫，或恶血微有阻滞，则作酸痛。是方芎、归、川断补血，白术补气，能利腰脐间血，此四味为君；独活祛风，肉桂祛寒，乌药、香附、陈皮行气，萆薢治风湿，此六味为臣；杜仲、牛膝引药下行为佐。凡血气所不及至之处，诸药能引而至。

73547 调荣汤

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】川芎 当归 芍药 生干地黄 三棱 莪术 白芷 延胡索 蒲黄 香附子 泽兰 细辛 川白姜 厚朴（制） 桃仁（浸，去皮，焙）各二分 辣桂 半夏（制） 甘草（炙）各三分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜、大枣，

水煎。食前服。

【主治】妇人瘀血不消，脐腹引腰背俱痛。

73548 调荣汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 生地各三钱 官桂一钱 乌药 红花 陈皮 白芍（酒炒）各二钱

【用法】水酒各一钟，煎服。

【主治】闪挫腰痛。

73549 调荣汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】白茯苓 当归 生地 山楂各一钱 赤芍 木通 香附 丹皮各六分 川芎 甘草各五分

【用法】加乌梅五个，水煎服。

【主治】产后痢疾。

73550 调荣饮

【方源】《直指》卷十七。

【异名】调荣散（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】华阴细辛 莪术 辣桂 赤芍药 延胡索 当归 川芎 白芷 槟榔 大腹皮 桑白皮（炒） 瞿麦穗 赤茯苓 陈皮 葶苈（炒香） 大黄（湿纸煨）各一分 甘草（炙）一分半

【用法】上锉。每服三钱，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】瘀血留滞，血化为水，四肢浮肿，皮肉赤纹，名曰血分。

73551 调荣饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】蓬术 川芎 当归 白芷 槟榔 陈皮 延胡索

【主治】血肿。四肢浮肿，皮肉间必有红痕赤缕。

73552 调荣散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《惠眼观证》。

【组成】血余（父母首上者）一团（用绿竹笋壳一片裹，烧过）。

【用法】上为末。每服半钱或一钱，新汲井华水送下。

【主治】小儿衄血不止。

73553 调荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 丹皮 滑石 甘草 山梔 瞿麦 红花 香附 阿胶 竹叶 陈皮

【功用】清热行血，祛瘀利水。

【主治】产后淋证。有热邪搏血流渗腠中，血随小便而出，名曰血淋；更有污血阻滞，溺窍不通，以致淋漓，亦名血淋。

73554 调荣散

《赤水玄珠》卷五。为《直指》卷十七“调荣饮”之异名。见该条。

73555 调荣散

【方源】《顾松园医镜》卷九。

【组成】丹参二三钱 桃仁二三钱 赤芍钱许 刘寄奴二三钱 玄胡索钱许 泽兰二三钱 莪术钱许

【主治】瘀血肿胀，或单腹胀大，不恶食，小便赤，大便黑。

【加减】热，加连翘、黄芩，或再加童便；如欲行瘀，量加制大黄，或参用大黄蟄虫丸。

【方论选录】方中丹参活血，桃仁、赤芍破血，刘寄奴破血下胀，玄胡索活血化气，泽兰行血化水，莪术破气中之血。

73556 调胃丸

《御药院方》卷三。即原书同卷“调胃散”改为丸剂。见该条。

73557 调胃丸

《玉机微义》卷三十引《元戎》。即《伤寒论》“调胃承气汤”改为丸剂。见该条。

73558 调胃汤

《普济方》卷二十二。即《卫生宝鉴》卷八“益气调荣汤”。见该条。

73559 调胃汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】炮附子一钱半 人参一钱半 白术（炒）一钱半 白芍（酒炒）一钱半 茯苓三钱 肉桂（去皮）一钱半 吴茱（醋泡

炒）八分 炙甘草五分 川芎八分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】产后呕吐，脉虚细者。

【方义】产后气阳两虚，生气不振，夹悲怒而两胁疼痛，呕吐不止。附子补火扶阳以振生气，人参扶元补气以接真阳，白术健脾土止呕吐，白芍敛肝阴定胁痛，吴茱萸平肝气力能温中降逆，小川芎入血海性善活血行气，白茯苓渗湿清脾肺，紫肉桂温经和血脉，炙甘草缓中益气。水煎温服，使气阳内充，则肝阴暗复，而肝气和平，生生之气，无不振布，岂有胁痛呕吐之患乎。

73560 调胃汤

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】茯苓 扁豆 白术 半夏 广皮 人参 甘草各五分

【功用】调理胃气。

【主治】小儿急惊风，惊已定者。

73561 调胃散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】紫背荷叶（焙）半两 黄耆（锉）一分

【用法】上为细散。每服一钱匕，生姜蜜水调下，不拘时候。

【主治】吐血不止。

73562 调胃散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】大黄（锉，炒） 当归（切，焙） 麦门冬（去心焙） 桃仁（去皮尖双仁，麸炒） 生干地黄（焙） 菖蒲（锉） 鳖甲（醋炙，去裙襴） 柴胡（去苗）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙透） 秦艽（去苗土） 黄连（去须）各三分 桂（去粗皮）半两 吴茱萸（汤洗去涎，焙干炒）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、食前以温水调下。

【主治】产后大便秘涩不通。

73563 调胃散

《宣明论》卷八。为《圣济总录》卷四十七“厚

朴煮散”之异名。见该条。

73564 调胃散

【方源】《伤寒标本》卷下。

【组成】水银 舶上硫黄

【用法】上研至黑。每服一钱，重者二钱，米饮送下。

【主治】伤寒呕吐，四肢厥逆清冷。

73565 调胃散

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】藿香 甘草（炙） 陈皮（去白） 半夏曲（每一两用生姜三两半） 厚朴（每一两用姜一两拌制）各二两

【用法】上同为细末。每服二分，水一盞，入生姜二片，同煎至七分，和滓温服，不拘时候。

【主治】阴阳气不和，三焦痞隔，五劳七伤，山岚瘴气，八般疟疾，四时伤寒，头目肢节疼痛，心腹胀满，呕逆恶心，痰涎咳嗽，手足虚肿，五种隔气噎塞，寒热水泻诸痢，妇人产后蓐劳，脾胃不和，饮食减少。

【备考】本方为细末，生姜面糊和丸，如梧桐子大，名“调胃丸”。每服五十丸，食前生姜汤送下。

73566 调胃散

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】人参（去芦） 陈皮（去白） 白术 苍术 白茯苓（去皮） 桔梗（炒） 缩砂仁 厚朴（姜制） 肉豆蔻 扁豆（姜炒） 薏苡仁（炒） 山药 石莲肉（去心） 粉草各等分

【用法】上为末。猪肉拌食。

【主治】小儿冷痢。

【加减】痢不止，加诃子肉；吐不止，加丁香；吐痢内虚，可酌加附子、木香；重者，加白姜。

73567 调胃散

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】苍术 白术 茯苓 白芍药 桔梗 紫苏 槟榔 陈皮 甘草

【主治】胀满。

【加减】小便闭，加车前子；腹胀，加枳壳。

73568 调胃散

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】人参三钱 白术二钱半 甘草（炙） 白茯苓 罂粟子各一钱 白附子半分 藿香 丁香各半钱

【用法】上为末。每服半钱或一钱，紫苏汤送下。

【主治】小儿积热。

【备考】服桃枝丸取积热后用此方。

73569 调胃散

【方源】《痘科类编释意》卷四。

【组成】苍术（米泔浸去粗皮）八钱 厚朴（姜汁炒） 陈皮各五钱 茯苓 丁香 甘草 白术各二钱

【用法】上为粗末。加生姜、大枣水煎，温服；或研细，沸汤入盐点服二三钱。

【主治】胃热助手少阳火入于手太阴肺，故红点如斑，出于皮毛间者。

73570 调脉汤

【方源】《伤寒微旨论》卷上。

【组成】葛根一两 防风（去芦）半两 前胡（去苗）三钱 甘草（炙）半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜一块，如枣大劈破，煎至七分，去滓温服。如寸脉力小，加大枣三个，劈破同煎。

【主治】立春以后至清明以前伤寒，阴气已盛，关前脉力小，关后脉力大，恶风，不自汗者。

73571 调逆汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参 茯苓 白芍 生地 沙参 各三钱 白术五钱 甘草五分 苏子 神曲 各一钱 荆芥二钱

【用法】水煎服。

【主治】忧思不已，饮食失节，脾胃有伤，面色黧黑不泽，环唇尤甚，心中如饥，然见食则恶，气短而促。

73572 调息丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】陈皮 薏仁 射干 紫菀 桑皮 桔梗 石碱 海浮石 旋覆花

【用法】水泛为丸。

【功用】降气清热，开痰散结。

【主治】息贲。右肋下如覆盆状，令人洒洒寒热，背痛呕逆，喘咳。

【备考】《外科证治全书》有白芥子。

73573 调脏丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】木香 人参（去芦头） 白术 干姜 肉豆蔻（面裹煨熟） 白芍药各等分

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如黍米大。每服三十丸，乳食前温米饮送下。

【主治】小儿脏腑不调，泄泻频并，精神昏困，全不入食。

73574 调理丸

【方源】《便易经验集》。

【组成】槐米四两 川草薢四两 白藓皮三两 苍耳子二两 连翘二两 地肤子二两 胡麻仁二两 金银花三两

【用法】上共炒磨末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，早、晚以土茯苓五钱煎汤送下。先服梅毒方，后服此方。

【主治】杨毒结毒，遍身头面，鱼口便毒，红赤疼痛甚极者。

【宜忌】忌食茶茗。

73575 调营丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】香附一斤（醋浸炒） 蓬术二两（醋炒） 当归八两

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三钱，红花子汤送下。

【主治】经愆积癖块刺痛，脉弦牢者。

【方论选录】气滞不行，血亦留止，结成瘀癖积块，故腹中刺痛，天癸愆期。香附调气解郁结，蓬术破结削积坚，当归养营血以活血脉。醋丸化癖瘀消积块，红花子汤下，散

血结调天癸。使血活气行，则瘀癖积块自消，而腹中刺痛无不退，天癸愆期无不调矣。此调经消积之剂，为瘀癖积块痛经之专方。

73576 调营散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归 川芎 蒲黄（半生半炒） 香附 赤芍 生地 广皮 丹皮 川断 麦冬 生甘草

【主治】妇人七七，血分有余，滞血留于经络，天癸不绝，过期仍来，血来少而点滴六、七日不止者，或乍来即止。

【加减】有滞血去丹皮，麦冬，加红花、艾。

【方论选录】方中四物以补肝脾血，丹皮、麦冬以凉心血，蒲黄炒黑以止血，川断行周身经络，以通滞血，香附、广皮顺三焦结气。

73577 调营散

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】蓬术 川芎 当归 前胡 白芷 槟榔 赤芍 桑皮 瞿麦 大腹皮 赤苓 葶苈各一钱 大黄一钱半 细辛 官桂 炙草各五分 生姜三片 大枣三个

【主治】瘀血留滞，血化为水，四肢浮肿，皮肉赤纹，名曰血分。

【备考】此方只作一服，不欲多用，倘服后不减，未可再服，且再用活血补气之药调三五日，徐进此药，虚甚者，此参、附合用，得大力主持其间驱逐之，始能建功也。

73578 调鼎方

《医学正传》卷三。为原书同卷“无比丸”之异名。见该条。

73579 调脾丸

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】丁香 半夏各四十九个 巴豆四十九个 胡椒四十九个

【用法】上为细末，枣肉为丸，如粟米大。每服一丸，食后随汤水送下。如胸膈不和，煎生姜送下；泻痢，干姜汤送下；如脾大者，皂子汤送下；如喘嗽，桑白皮汤送下。

【主治】小儿脾疾，胸膈不和，泻痢，喘嗽。

73580 调脾汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术 陈皮 苍术 木通各一钱 黄芩 砂仁 人参 川芎各一钱二分 黄柏 甘草各八分

【用法】水煎，食前服。

【主治】湿伤，面黄倦甚，足痠口苦，脉散而大者。

73581 调脾汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参五钱 玄参一两 麦冬五钱 甘菊花五钱 苡仁五钱 金钗石斛三钱 芡实一两 山药五钱

【用法】水煎服。

【功用】益太阴之阴水，以胜其阳明之阳火。

【主治】阳明之火，固结于脾而不肯解，善用肥甘之物，食后即饥，少不饮食，便觉头红面热，两足乏力，不能行走。

73582 调脾汤

【方源】《幼科铁镜》。

【组成】陈皮 白术 丁香 人参 诃子 青皮 甘草

【主治】小儿脾疳。黄瘦腹大，或吃土吃米吃茶。

73583 调脾饮

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍 茯苓各五钱 白术一两 甘草一钱 陈皮五分 神曲三钱 白豆蔻二粒

【用法】水煎服。

【主治】脏腑不调，肝乘脾土，湿气下行，久泻不愈。

73584 调脾散

【方源】《普济方》卷二十二引《续易简方》。

【组成】苍术（米泔浸一宿，冬浸二宿，锉，焙干，炒赤色，秤）八两 厚朴（去皮，姜汁炒）五两 甘草（炙）一两

【用法】上为细末。每服二钱，用烧盐汤点

七分盏服。或用水一盏，生姜三片，大枣二个，水煎七分，食前服，或作铤散。可常服。

【主治】脾胃少有不和。

73585 调脾散

【方源】《急救仙方》卷六。

【组成】三棱 莪术各一两 麦芽半两 胡椒二钱 缩砂三钱 川芎二钱 茴香二钱 甘草三钱 青皮三钱 陈皮三钱

【用法】上为末。米饮调下。

【功用】顺经调气。

【主治】妇人肺经有病，热气上冲，经气行时，血反上行而吐者。

73586 调脾散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】白术 白茯苓 陈皮 防风 木通 荆芥穗 甘草稍 当归 川芎 怀生地 黄芩 连翘

【用法】上为细末。每用以半匙乳汁和饮少许。

【主治】小儿胎毒热在胸膈，啼声引努力气，伤人根本，脐突虚肿，按之有声，软而不痛者。

73587 调脾散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】炒白术 炒白芍 白茯苓 陈皮 甘草 木香 砂仁 官桂 麦芽

【用法】加生姜一片，大枣一个，水煎服。

【功用】温脾胃。

【主治】小儿虚寒作泻，或伤冷乳即作渴，泻青白色，或腹痛，或兼吐乳食。

73588 调脾散

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】白术 茯苓各七钱 白芍 神曲各五钱 炙草 香附 厚朴 木香各三钱 砂仁 莲子 诃子肉 苡仁 楂肉 豆蔻（去净油）各五钱 陈皮四钱

【用法】共为细末。米清汤送下。

【功用】健脾消积，制肝行气。

【主治】小儿痘疮虚寒泄泻，粪清白面无

声，小便清白，泻时滑溜而不自知，或溏泄者。

【加减】虚甚者，加人参。

73589 调痛散

【方源】《直指》卷六。

【组成】木香 丁香 檀香 大香附 天台 乌药 蓬术（煨） 辣桂 片姜黄 生白姜 白豆蔻仁 缩砂仁 甘草（炙）各等分

【用法】上锉。每服二钱半，加紫苏四叶，水煎服。

【主治】脾疼气膈。

73590 调滞汤

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】黄连 半夏 干姜 茯苓 白术 甘草 白芍

【用法】水煎服。

【主治】久痢腹痛不止。

73591 调解散

【方源】《直指小儿》卷五。

【组成】青皮 陈皮 桔梗 枳壳（制） 半夏（制） 川芎 木通 干葛 甘草（炒） 紫苏各等分 人参减半

【用法】上锉散。每用二钱，加生姜、大枣水煎服。

【主治】小儿疮痘已发，或为风冷所折，荣卫不和，或为宿食所伤，内气壅遏，以致坚硬。

【备考】《普济方》有柴胡、紫草。

73592 调敷散

《医级》卷八。为方出《医宗必读》卷七，名见《仙拈集》卷一“元戟膏”之异名。见该条。

73593 调中饮子

《准绳·幼科》卷七。为《幼幼新书》卷二十一引茅先生方“调中饮”之异名。见该条。

73594 调经末子

【方源】《理瀹》。

【组成】当归一两 川芎五钱 白芍 茯苓 五灵脂（炒） 延胡（炒） 白术 苍术 白芷 乌药 茴香 陈皮 半夏各三钱 柴胡二钱 黄连（同吴萸炒）各一钱。

【用法】上为粗末，醋或酒炒，熨心腹脐下，并缚脐，如冷再炒，每日用之，以调为度。

【主治】月经不论前后多少，痛或不痛。

【加减】先期者加条芩、丹皮、地骨皮各二钱；后期者，加官桂、干姜、艾各二钱；干血癆，加桃仁、红花、大黄、生姜、红枣；血癥，再加马鞭草。

73595 调卫止汗汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】炙耆 麻黄根 当归各一钱 人参随症加减 防风三分 桂枝 炙甘草各五分 枣二个

【用法】水煎服。

【主治】产后汗出不止。

【加减】汗多而渴，加麦冬、五味。

73596 调卫养荣汤

【方源】《医统》卷八十二引《集验方》。

【组成】陈皮 白术 当归 生地黄 沙参 麦门冬各一钱 牡丹皮 地骨皮各八分 桔梗 柴胡稍各五分 谷芽一钱 甘草四分

【用法】上加莲子、生姜、大枣，水煎，早、晚服。

【主治】妇人室女月经不调，或先或后，或经闭不通，憎寒壮热，口苦无味，饮食少思，连声咳嗽，烦躁头眩，渐成癆证者。

【加减】痰中带血，加侧柏枝；烦躁口干者，加炒山栀，倍麦门冬；肋下胀疼，加青皮、川芎；胸膈满闷，加黄连（姜炒）、枳实，去麦冬、地骨皮；夜出盗汗，加黄连、黄耆，去柴胡、桔梗；大便闭结，加桃仁，倍当归；咳嗽不已，加瓜蒌、阿胶；头眩头痛，加天麻、川芎；小水不利，加木通、茯苓；烦渴不利，加滑石、倍麦门冬。

73597 调元内托散

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄耆 人参 当归 桂枝 木香 青皮 赤芍 牛蒡（炒） 川芎

【用法】水煎服。

【主治】痘疮若起发泡浆时，月事大来，其

疮应起发而不起发，应泡浆而不泡浆，顶平形塌，或如灰白，或成黑陷。

【加减】虚者，加熟附子。

73598 调元化毒汤

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】绵黄耆一钱（生） 当归身八分（酒洗） 牛蒡子七分（炒研） 人参三分 白芍七分（酒洗） 连翘七分（去心） 木通七分 黄芩五分（酒炒） 黄连二分（酒炒） 防风七分 荆芥七分 桔梗六分 前胡一钱二分 蝉蜕十二只（去头足） 红花三分（酒洗） 紫草茸五分（酒洗，研末） 生地黄一钱（酒洗） 山楂肉一钱 甘草二分（生，去皮）

【用法】加生姜一片，同煎，温服。

【功用】《痘疹活幼至宝》：活血养气解毒。

【主治】①《痘疹传心录》：痘疹。②《痘疹活幼至宝》：痘疹身热一二日即出，痘先发于天庭、司空、印堂等处者，或一齐出而稠密者，或干枯而紫黑者，或成片不分颗粒，皆血气凝滞而毒气肆行所致者。

【方论选录】《痘疹活幼至宝》：此方以参、耆养气，归、芍、红花、生地活血，翘、蒡、芩、连、荆、防、前、桔、紫、蝉、通、草解毒，加山楂疏气。

73599 调元生脉汤

《种痘新书》卷九。即《片玉痘疹》卷十一“调元生脉散”加炙草。见该条。

73600 调元生脉散

【方源】《片玉痘疹》卷十一。

【组成】人参 黄耆（炙） 麦冬 当归 桂枝

【用法】水煎服。

【主治】元气本虚，痘收靥之后，六脉沉细，手足厥冷者。

【加减】虚甚者，加熟附子。

【备考】本方加炙草，名“调元生脉汤”（见《种痘新书》）。

73601 调元生脉散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄芩 人参 麦门冬 甘草 五味子

【用法】水煎服。

【主治】小儿伤暑发热，身热，自汗，作渴，昏睡，手足冷。

73602 调元生脉散

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】人参一钱 炙黄耆二钱 大杭冬一钱 北五味二分 炙甘草一钱 生姜三片 红枣三枚

【用法】水煎温服。

【功用】平肝木，益脾土，泻邪火，补元气。

【主治】阴暑热退后。

73603 调元地黄汤

《幼科金针》卷上。为《活幼心书》卷下“调元散”之异名。见该条。

73604 调元百补膏

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归身（酒洗）四两 怀地黄二斤 怀熟地黄四两 甘枸杞子一斤 白芍（米粉炒）一斤 人参四两 辽五味子一两 麦门冬（去心）五两 地骨皮四两 白术（去芦）四两 白茯苓（去皮）十二两 莲肉四两 怀山药五两 贝母（去心）三两 甘草三两 琥珀一钱三分 薏苡仁（用米粉炒）八两

【用法】上锉细末，和足水十斤，微火煎之，如干，再加水十斤，如此四次，滤去滓，取汁，文武火熬之，待减去三分，每斤加炼净熟蜜四两，春五两，夏六两，共熬成膏。每服三匙，白汤调下。

【功用】养血和中，宁嗽化痰，退热定喘，止泻除渴。

【主治】五劳七伤，诸虚劳极，元气虚损，脾胃亏损。

【加减】吐血，加牡丹皮二两；骨蒸，加青蒿汁、童便各两碗，同热服之。

73605 调元托里汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】人参 黄耆 甘草 木香 陈皮 诃子肉 桂枝 羌活 防风 赤芍 荆芥穗

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】痘疹发热，及养浆时作痒，若正气里虚，邪气外实，泄泻者。

73606 调元托里汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】人参 炙耆 当归 诃子肉 陈皮 桂枝（去皮） 羌活 防风 荆芥 赤芍 木香 红花各等分

【用法】用水同煎服。

【主治】痘痒塌，泄泻。

73607 调元肾气丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】淮生地（酒煮捣膏）四两 山萸肉 山药 牡丹皮 白茯苓各二两 人参 当归身 泽泻 麦门冬（捣膏） 龙骨 地骨皮各一两 木香 砂仁各三钱 黄柏（盐水炒） 知母（童便炒）各五钱

【用法】上为末，鹿角胶四两，老酒化稠，加蜜四两，同煎滴水成珠，和药为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心温酒送下。

【主治】房欲劳伤，忧恐损肾，致肾气弱而骨失荣养，遂生骨瘤，其患坚硬如石，形色或紫或不紫，推之不移，坚贴于骨，形体日渐衰瘦，气血不荣，皮肤枯槁，甚者寒热交作，饮食无味，举动艰辛，脚膝无力者。

【宜忌】忌白萝卜，火酒、房事。

73608 调元固本汤

《医钞类编》卷十九。为《片玉痘疹》卷十一“调元固表汤”之异名。见该条。

73609 调元固系丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】熟地六两（蒸晒） 当归 白芍 川断（俱酒炒） 阿胶各三两 人参（片焙）一两 白术（土炒） 茯苓（人乳拌蒸） 甘草（蜜炙） 杜仲（盐水炒） 山药（米泔制） 菟丝（酒制） 香附（酒醋

分制） 麦冬 血余（真者片研） 燕窝（煮捣） 藕节各二两（切片） 二蚕绵四两（剪炒另研）

【用法】先将地黄、燕窝捣烂，后人炒制诸药，以糯米粥饮浓汁打糊作丸，如梧桐子大。每服三四钱，早晚龙眼汤送下，白汤米饮亦可。

【主治】妊娠气血不足，冲任虚而胎系不固，屡孕屡堕。

【宜忌】忌食发气、助火、生痰、生冷等物。

73610 调元固表汤

【方源】《片玉痘疹》卷十一。

【异名】调元固本汤（《医钞类编》卷十九）。

【组成】人参 黄耆 当归 甘草 蝉退

【用法】水煎服。

【主治】痘疮表虚，收靥痂壳粘着皮肉不落者。

73611 调元养荣丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归八十八两 熟地八两 白术（炒）八两 白芍八两 川芎六两 茯苓八两 枣仁（炒）四两 甘草二两 天冬五两四钱 山萸肉（炙）四两 玄胡（炙）三两 藁本三两 青蒿三两 鸡冠花三两 香附（炙）十六两 阿胶（炒珠）十二两 黄芩五两 砂仁四两 生地八两 祁艾炭四两 牛膝四两六钱 没药（炙）四两 乳香（炙）三两 红花三两 藏红花二两 柴胡三两 苏叶三两三 石脂（煅）三两 沉香一两 青毛茸（去毛）十二两 秦艽四两 鳖甲（炙）四两 杜仲炭四两 续断四两 琥珀二两 橘红四两 橘皮十二两 人参（去芦）六钱 龟板（炙）四两 泽泻四两 木香一两 红曲三十二两 川牛膝四两

【用法】共研为细粉，过罗，每十六两细粉加益母膏四两，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一丸，日服二次，温开水送下。

【功用】调元补气，和血养荣。

【主治】妇女气虚血亏，行经腹痛，经期不

准，腰膝无力。

【宜忌】孕妇忌服。

73612 调元健步丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】当归（酒洗） 川黄柏（盐酒炒） 枸杞各二两 牛膝三两（盐酒浸） 白芍药（微炒） 白茯苓 白术（炒） 苍术 陈皮 各一两 炙甘草三钱 木瓜 五加皮各八钱 川续断七钱 泽泻 防己各五钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸或百丸，空心盐汤送下。

【主治】阴虚血少，湿热兼行，足履无力。

73613 调元益本汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术 人参 黄耆 山药 茯苓 各二钱 紫河车三钱 当归 丹皮 枣仁 远志各一钱五分

【用法】加大枣二个，水煎服。

【主治】劳伤过度，元气虚弱，四肢倦怠。

73614 调元清神汤

【方源】《片玉痘疹》卷十一。

【组成】人参 黄耆 当归 麦冬 陈皮 甘草（炙） 酸枣仁 黄连（炒）

【用法】大枣为引，水煎服。

【主治】痘疮收靥后，脾胃虚弱而不落痂，昏昏喜睡。

73615 调元渗湿汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】羌活 白术 防风 独活各八分 升麻四分 苍术 猪苓 柴胡 茯苓各一钱 泽泻 干葛 甘草 人参 黄柏 神曲各六分

【用法】水煎，空心服。

【主治】肾疸。目与浑身金色，小便赤涩。

73616 调元散瘀汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】党参三钱 生炙黄耆各三钱 川芎二钱 当归四钱 乳香八分（制去油） 没药八分（制去油） 肉桂六分 生甘草八分

青木香五分

【用法】水煎，作四分而服。

【主治】产后流注。即恶露流入腰肾关节、肩背手足等处，或漫肿，或结块。

73617 调元解毒汤

【方源】《痘疹仁端录》卷六。

【组成】白芍 白术 茯苓 甘草 桔梗 连翘 木通 山药 姜 枣

【用法】水煎服。

【主治】痘疹落痂后气血不调，尚有余毒，诸症将作。

73618 调元解毒汤

【方源】《慈幼新书》卷五。

【组成】白芍 川芎 当归 茯苓 白术 山药 甘草 桔梗 连翘 木通 生姜 大枣

【主治】痘后气血不调，癰痕不正，诸症将作者。

【加减】当靥不靥，加参、耆、芷、桂；抓破不干，以棉茧散敷之；下利脓血，加香连丸；泄泻，加猪、泽；后重加枳壳、槟榔；气脱，加升麻；腹痛，加木香，下和中丸；溺短，加木通、车前；伤食发热，加查、曲、芽；风寒发热，加桂枝、柴胡、干葛；乍寒乍热，加参、耆、柴、桂；热不退，加黄芩、地骨皮；厥冷去翘、桔，加参、耆、桂；神昏喜睡，去翘、桔，加麦冬、茯神、人参；自汗，加参、耆、肉桂、柏子仁；急惊，加木通、生地、梔仁；喘，加杏仁、冬、味；呕吐，加陈皮、黄连；吐血，加黄连、蒲黄；衄血，加黄芩、蒲黄、丹皮；吐衄，加苡仁、乌梅；痂不落，蜜水调滑石敷之；丹病癰疹，连翘饮；口疳，加黄连。

73619 调元解毒汤

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】人参八分 生耆 当归 连翘 牛蒡各一钱 防风 川芎各五分 升麻 黄芩 黄连各五分 前胡一钱 木通八分 炙甘草 虫退各三分

【用法】煎服。

【功用】补中兼解毒。

【主治】痘疮大热灼人，心中迷闷，元气虚而毒气盛者。

73620 调元解毒汤

【方源】《种痘新书》卷八。

【组成】黄耆 牛子 连翘 黄芩 花粉 全地 木通 前胡 人参 甘草

【主治】痘疮毒未尽化，当收时忽增大热，发渴烦躁者。

73621 调中二陈汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】陈皮，半夏 茯苓 甘草 枳壳 大腹皮 红花 川芎 当归 白芍各八分 防风 槟榔 黄耆 桔梗 青皮 乌药 苏木 枳实 黄芩 紫苏各六分 木香三分

【用法】用水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，不拘时服。

【主治】跌扑损伤，或从高坠下，以致瘀血流入脏腑，昏沉不醒，大小便秘；及木杖后瘀血内攻肚腹，膨胀结胸，不食恶心，干呕，大便燥结，已服行药之后。

73622 调中二黄丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】大黄一两（锉炒） 牛黄（研） 甘草（炙） 人参各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小绿豆大。每服二丸，米饮化下，一日二次。得利即止。

【主治】小儿大便不通。

73623 调中人参丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】人参 青木香 桂皮（去粗皮） 羌活（去芦头） 大麻仁 酸枣仁（去皮）各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下，一日二次。

【主治】咽喉中痒，咳嗽，状如伤寒。

73624 调中人参饮

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】人参三分 龙骨一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙锉）一分 当归（切，焙） 干姜（炮裂） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。一二岁儿，每用一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，分二次温服，空心、日晚各一次。

【主治】小儿下痢色白，小便赤。

73625 调中大成汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】白术 茯苓 归身 白芍 陈皮 山药 牡丹皮 黄耆各一钱 人参二钱 藿香 砂仁 远志 甘草各五分 附子 肉桂各八分

【用法】上用水二钟，加煨姜二片，大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】流注溃后，脓水清稀，饮食减少，不能生肌收敛。

73626 调中五参丸

【方源】《千金翼》卷十九

【组成】人参 丹参 沙参 苦参 玄参 防风 蜀椒（去目闭口者）各一两 附子（炮去皮） 干姜各半两 葶苈一合（熬） 大黄四两（蒸大黄于五升米下，及热切之，日晒干） 巴豆（去心皮，熬） 麝虫（熬）各五十个

【用法】上为末，炼蜜和丸，如小豆大。每服二丸，一日三次，空腹饮送下。

【主治】十年呕，手足烦，羸瘦面黄，食不生肌肤，伤饱食不消化。

73627 调中止嗽汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】焦白术三钱 款冬花三钱 茯苓四钱 广砂二钱 紫菀三钱 法半夏三钱 鼠粘子三钱 橘红三钱 甘草三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒发汗后，脾脏为内热所困，失其健运，致令痰涎积滞而咳嗽者。

【方论选录】此方以焦术、茯苓补脾；以广

砂、橘红开胃；紫苑、款冬平和之品，温胃清痰；半夏、牛子温和之品，益胃化痰；甘草助脾和药。虽然止嗽，纯是调养脾胃之药，脾胃健则痰运而嗽止矣。

73628 调中化痢丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连一两 白头翁一两 大黄四两 山楂四两 槟榔三两 厚朴（炙）五钱 木香四钱 小枳实（炒）八钱

【用法】共研为细粉，过罗，用冷开水泛为小丸，每十六两用滑石三两五钱为衣闯亮。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】顺气化滞，清热止痢。

【主治】气血凝结，湿热伤脾，红白痢疾，脐腹坠痛，口渴身烧。

73629 调中化瘀汤

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】当归 生地各五钱 三七根末三钱 丹皮二钱 白芍三钱 生黄耆三钱 生甘草一钱 大黄一钱 枳壳三分

【用法】水一碗，童便一碗，同煎，服二剂。

【功用】散瘀血。

【主治】杖疮。

【加减】虚极者，加人参三钱。

73630 调中六神散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】白术 茯苓 甘草 藿香叶 草果子各一分 丁香二钱

【用法】上为细末。每服一钱，紫苏米汤煎下。

【主治】小儿或吐或泻，脾困，不进乳食，或惊风、伤风、潮热，或喘后出汗。兼治气不匀，痞泻利。

73631 调中平胃丸

【方源】《摄生秘剖》卷二。

【组成】人参五钱 黄耆（蜜炙） 陈皮各二两 甘草（蜜炙） 苍术（酒浸炒） 厚朴（姜汁炒） 木香各一两

【用法】上为末，米糊为丸，如椒目大。每

服三钱或二钱，食后白滚汤送下。

【主治】脾胃虚弱，中气不调。

【方论选录】人参、黄耆、甘草甘温之品，甘者中之味，温者中之气，气味皆中，故能调补中气；而苍术、厚朴之苦辛皆平胃中敦阜之气；陈皮、木香之辛香能去胃中陈腐之气。夫敦阜之气平，陈腐之气去，宁有不调之中乎。

73632 调中正气散

《永类铃方》卷二十一。为《活幼口议》卷十九“调中正胃散”之异名。见该条。

73633 调中正胃散

【方源】《活幼口议》卷十九。

【异名】调中正气散（《永类铃方》卷二十一）。

【组成】藿香叶 白术 人参 白茯苓 甘草（炙） 陈皮（去白） 山药 白扁豆（炒） 半夏曲 川白姜各等分

【用法】上为末。每服一钱，水一小盏，生姜二小片，枣子半个，煎三二沸服。

【主治】婴孩小儿中脘不和，胃气不正，胃冷伤热，吐逆烦闷，神困力乏，饮食不美，虚弱思睡，睡不安稳。

73634 调中归耆汤

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】人参 首乌 远志 茯苓 黄耆 当归 肉桂 地黄

【功用】滋厚脓血，峻补脾胃。

【主治】产后流注溃后，脓水不止，而形衰食少者。

73635 调中白术丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】橘皮半斤 丁香 人参 白术 甘草各四两 神曲 麦麴各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心白汤嚼下。

【功用】和脾胃，进饮食。

73636 调中白术散

【方源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】白术 茯苓(去皮) 人参各半两
藿香半两 炙甘草一两五钱 木香一钱 葛根一两

【用法】上为末。每服二钱，白汤调下。

【主治】大病后，吐泻烦渴，霍乱虚损气弱及酒毒呕哕。

【加减】烦渴，加滑石二两，甚者加姜汁。

73637 调中白术煎

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】人参 白术 干姜 甘草 青皮 橘皮各半两

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，温酒下。

【功用】升降阴阳，宣通壅滞，调中顺气，款利三焦。

【主治】胸膈窒塞，噎气不通，噎痞喘满，食饮迟化，痰饮留滞，腹胁胀满，传道不匀，或秘或泄，脾胃易伤，心腹疼痛，霍乱呕吐，食饮不下，恚怒气逆，忧思结气，或作奔冲，胸肋刺痛，短气好眠，全不思饮食。

73638 调中托里散

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】人参(气虚倍用) 黄耆(炙) 当归(血虚倍用) 白术(炒，倍用) 茯苓 芍药(酒炒) 各五分 熟地二钱

【用法】上分二剂，水煎服。

【主治】痈疽疔肿恶毒，气血两虚，毒陷难起，难溃难敛。

73639 调中快斑汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙) 半夏 桂心 木香 陈皮 苍术 厚朴 藿香叶

【用法】上咬咀。加生姜，白水煎服。

【主治】痘疹误服解毒凉药及饮冷水者。

73640 调中沉香汤

【方源】《局方》卷三。

【异名】沉香汤(《普济方》卷二十二引《简易方》)。

【组成】麝香(研)半钱 沉香二两 生龙脑(研)一钱 甘草(炙)一分 木香 白豆蔻仁各一两

【用法】上为细末，入研药和匀，每服半钱，食后用沸汤点服；或入生姜一片，盐少许亦得。

【功用】调中顺气，除邪养正。常服饮食增进，脏腑和平，肌肤光悦，颜色光润。

【主治】心腹暴痛，胸膈痞满，短气烦闷，痰逆恶心，饮食少味，肢体多倦。

73641 调中畅脾膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】连翘三钱 银花五钱 茯苓六钱 于术五钱 广皮四钱 厚朴四钱 东楂六钱 鸡内金六钱 木香二钱 法夏四钱 槟榔三钱 神曲五钱 麦芽五钱 黑丑三钱 白蔻二钱 瓜蒌二钱 甘草三钱 甘菊三钱 青皮五钱 莱菔子四钱

【用法】用香油三斤，将药炸枯，滤去滓，入黄丹二斤，老嫩合宜收膏。

【功用】调中健胃畅脾，化积理气行水。

【主治】饮食少思，嘈杂呕逆，肚腹胀满，气逆不舒。

73642 调中和气饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【异名】调中和气散(《女科秘要》卷二)。

【组成】大黄 石膏各一钱 槟榔 枳壳(麸炒) 黄芩 知母各八分 黄连六分 黄柏五分 柴胡三分

【用法】水煎，空心服。

【主治】胎气攻心。妊娠过食辛热，毒物热积胎中，以致胎儿不安，手足乱动，上攻心胞，母多痛苦。

73643 调中和气散

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】苏梗 砂仁壳 石膏(不可多) 知母(炒) 川柏(炒) 前胡 百草霜

【主治】子悬。胎热气逆，胎上攻心，不知人事。

73644 调中和气散

《女科秘要》卷二。为《叶氏女科》卷二“调中和气饮”之异名。见该条。

73645 调中和胃丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白术(土炒) 苍术(炒) 半夏(姜矾制) 厚朴(姜汁炒) 砂仁(炒) 白豆蔻(炒) 广木香 薏苡仁(炒) 泽泻 各一两五钱 肉豆蔻(面包煨) 沉香 山药(炒) 各八钱

【用法】上为末，以水泛为丸。每服二钱五分，空心白滚汤送下。

【主治】脾胃不和，食后反饱，肌肉渐瘦，酒后泄泻。

73646 调中和胃汤

【方源】《女科秘要》卷六。

【组成】人参 白术 当归 扁豆各一钱 茯苓二钱 甘草 陈皮 干姜各四分 山药一钱五分。

【用法】水煎服。

【主治】产后呕吐，服安胃行血汤与加味六和汤而胃和呕止痛止，但气血不行，食少者。

73647 调中思食丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】陈曲(捣碎，炒黄色) 陈橘皮(汤浸去白，焙) 人参 麦蘖(炒黄色) 钟乳粉 槟榔(大者，锉) 白术 半夏曲 枳壳(去瓢麸炒) 各半两

【用法】上除钟乳别入外，余为细末，拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温米饮送下。

【主治】脾胃气虚弱，肌体羸瘦。

73648 调中顺气丸

【方源】《医学发明》卷三。

【组成】木香 白豆蔻仁 青皮(去白) 陈皮(去白) 京三棱(炮) 各一两 半夏(汤洗七次) 各二两 缩砂仁 槟榔 沉香 各半两

【用法】上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，渐加至五十丸，煎陈皮汤送下。

【主治】三焦痞滞，水饮停积，肋下虚满，或时刺痛。

73649 调中养荣汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地四钱 人参一钱半 山药(炒)三钱 茯苓二钱 白芍(炒)一钱半 葛根一钱半 当归三钱 藿香一钱半 木香八分 炙甘草五分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】孕妇赤白痢，脉虚浮数者。

【方论选录】妊娠气血两亏，冒暑热而肠胃有伤，不能敷化精微，传送糟粕，故下痢赤白，胎孕不安。生地滋阴凉血，以退暑热；人参补气扶元，以固胎息；当归养血荣经，白芍敛阴止血，茯苓渗湿和脾，山药补脾益阴，葛根升阳气以散热，藿香快胃气以祛暑，木香调气醒脾胃，炙草益胃缓中气也。水煎温服，使气血内充，则暑热外解而胃气调和，肠府完复，何赤白下痢不瘳者？胎孕无不安矣。

73650 调中健胃汤

《郑氏家传女科万金方》卷一。为《理伤续断方》“五积散”之异名。见该条。

73651 调中健脾丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】白术(炒)一两 木香五分 川黄连(同茱萸炒，去茱萸)七分 破故纸一两 茯苓八分 诃子一两 肉果(煨)一两 神曲(炒)六分 小茴香(炒)五分 厚朴五分 陈皮八分 砂仁五分 山药五分 莲子五分

【用法】上为末，粥和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，莲子汤送下。

【主治】脾肾气虚，早晚溏泻。

73652 调中健脾丸

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】黄耆二两(蜜炙) 人参二两 白术六两(土水拌炒) 茯苓二两 陈皮三两(盐水制) 紫苏子二两半(炒) 萝卜子一

两半(炒) 山楂肉三两(炒) 草豆蔻一两(酒炒) 泽泻三两半 薏苡仁三两(炒) 沉香六钱(另研) 五加皮三两(炒) 瓜蒌一两(用大瓜蒌二个,钻一孔,每个入川椒三钱,多年粪底一钱,敲米粒大,俱纳入瓜蒌内,外以绵纸糊完,再用绵筋、盐泥封固,炭火煨通红为度,取出择去泥,其黑皮一并入药)

【用法】上为细末,煎荷叶、大腹皮汤,打黄米糊为丸,如梧桐子大。每服百丸,日进三次,白汤送下。

【主治】单腹胀及脾虚肿满,膈中闭塞及胃口作痛。

【备考】此药不伤脾气,大有补益。

73653 调中健脾丸

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】五加皮 人参 黄耆 苍术 茯苓 陈皮 半夏 香附 楂肉 苡仁 吴茱萸 白芍 黄连 莱菔子 草蔻仁 大腹绒 泽泻 苏子 沉香 瓜蒌 川椒

【用法】荷叶煎汤,打黄米粉为丸。每服百丸,汤送下。

【主治】单腹胀。

73654 调中消食汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】川朴一钱 姜夏三钱 广木香一钱 炒麦芽五钱 炒车前三钱 炒神曲三钱 炒枳壳二钱 砂仁八分(冲) 赤苓三钱

【主治】泄泻脘闷,噎腐吞酸,宿食不化。

73655 调中益气丹

【方源】《杂病治例》。

【组成】人参 归身 茯神 远志 干山药 生地 酸枣仁 辰砂 陈皮各一两 白术一两半 牡蛎(煨)二两 麦门冬 黄连各半两 生甘草一两 枳实(炒)七钱 半夏(制)八钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,食远白汤送下。

【功用】导痰清神。

【主治】怔忡。

73656 调中益气汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】黄耆一钱 人参(去芦头) 甘草 苍术各五分 柴胡 橘皮 升麻各二分 木香一分或二分

【用法】上锉,如麻豆大,都作一眼。水二大盏,煎至一盏,去滓,带热服,宿食消尽服之。

【主治】脾胃虚弱,四肢满闷,肢节烦疼,难以屈伸,身体沉重,烦心不安,忽肥忽瘦,四肢懒倦、口失滋味,腹难舒伸,大小便清利而数,或上饮下便,或大便涩滞不行,一二日一见;夏月飧泄,米谷不化,或便后见血、见白脓,胸满短气,膈咽不通,或痰嗽稠粘,口中沃沫,食入反出,耳鸣耳聋,目中流火,视物昏花,餐肉红丝,热壅头目,不得安卧,嗜卧无力,不思饮食,脉弦洪缓而沉,按之中之下得,时一涩。

【加减】如时显热燥,是下元阴火蒸蒸发也,加真生地黄二分、黄柏三分;如大便虚坐不得,或大便秘而不了,腹中常逼迫,血虚血涩也,加当归身;如身体沉重,虽小便数多,亦加茯苓二分,苍术一钱,泽泻五分,黄柏三分;如胃气不和,加汤洗半夏五分,生姜三片,有嗽者,去人参,加生姜、生地各二分;如痰厥头痛,加半夏二分;如腹中气不得运转,更加橘皮一钱。

【方论选录】《医方考》:脾胃不调者,肠鸣、飧泄、膨胀之类也;气弱者,语言轻微,手足倦怠也。补可以去弱,故用人参、黄耆、甘草甘温之性行,则中气不弱,手足不倦矣;苍术辛燥,能平胃中敦阜之气;升麻、柴胡轻清,能升胃家陷下之气;木香、陈皮辛香,能去胃中陈腐之气。夫敦阜之气平,陷下之气升,陈腐之气去,宁有不调之中乎?

【备考】《兰室秘藏》有黄柏,无木香。

73657 调中益气汤

【方源】《东垣试效方》卷一。

【组成】黄耆一钱 人参(去芦)半钱 甘

草（炙）半钱 陈皮二分 五味子七粒 芍药三分 白术五分 当归五分 升麻二分 柴胡二分

【用法】上咬咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】因饥饱劳役，损伤脾胃，元气不足。其脉弦或洪缓而沉，按之无力，中之下，时得一涩。其证身体沉重，四肢倦懒，百节烦疼，胸满短气，膈咽不通，心烦不安，耳鸣耳聩，目有瘀肉，热壅如火，视物昏花，口中沃沫，饮食失味，怠惰嗜卧，忽肥忽瘦，溺色变，或清利而数，或上饮下便，或夏月飧泄，腹中虚痛，不思饮食。

【加减】如下元阴火蒸蒸发，燥热者，加生地黄二分；如咳嗽，加五味子十粒；腹中气不转运者，更加陈皮三分、木香二分；身体沉重，虽小便数多，加茯苓二钱、苍术一钱、泽泻半钱，黄柏三分；如胃气不和，加汤洗姜制半夏五分；痰厥头疼，加半夏；如夏月，须加白芍药三分，以补肺气不足；如春夏腹疼，尤宜加芍药；恶热燥渴而腹疼者，更加白芍药半钱；严寒腹疼，加中桂二钱；如冬月腹疼，不可用芍药，以太寒故也，只加干姜二分，或加半夏四分（姜制）。

【方论选录】《内经》云：劳则气耗，热则伤气，以黄耆、甘草之甘泻其热邪为主，以白芍、五味子之酸，能收耗散之气；又《经》云：劳者温之，损者温之，以人参甘温补气不足，当归辛温补血不足为臣；以白术、陈皮苦甘温除胃中客热，以养胃气为佐；升麻、柴胡苦平，味之薄者，阴中之阳，为脾胃之气下溜，上气不足，故从阴引阳以辅之，又行阳明少阳二经为使也。

73658 调中益气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄耆 人参 甘草（炙） 苍术（米泔浸，炒） 川芎各六分 升麻 柴胡 陈皮 黄柏（酒炒） 蔓荆子各三分 当归六分 细辛二分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】气血两虚之头痛。

73659 调中益气汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】黄耆一钱 人参 苍术 陈皮各五分 升麻 炙甘草 柴胡 黄柏 木香各三分 当归 白术 白芍各五分

【主治】病后耳鸣耳聩。

73660 调中益气汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】人参一钱半 黄耆（蜜炙）三钱 白术（炒）一钱半 苍术（炒）一钱 当归二钱 白芷一钱 升麻五分 柴胡五分 陈皮一钱半 甘草五分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】中虚湿伏，抑遏清阳，恶寒终日不罢，脉缓弱者。

【方论选录】劳伤中气，湿遏清阳，营气不能分布，故恶寒终日不罢。人参、黄耆扶元，补中气；苍术、白术燥湿健脾阳；甘草缓中和胃；当归养血益营；升麻、柴胡升九天之阳；陈皮、白芷调中气以疏湿郁。俾气壮脾强，则清气上升，而营运有权，湿邪自化，恶寒无不自止。此调中升阳之剂，为湿伏阳陷恶寒之专方。

73661 调中益气汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参一钱半 黄耆三钱（饴糖炒） 茅术一钱半（炒） 于术一钱半（炒） 升麻三分（醋炒） 柴胡五分（醋炒） 茯苓三钱 木香一钱半 炙草八分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】产后劳倦泄泻，脉软缓涩者。

【方论选录】产后劳倦伤脾，不能敷化，而清阳下陷，故倦怠腹痛，泄泻不止。人参扶元以补气之虚，黄耆补中以举气之陷，于术健脾燥湿，苍术燥湿强脾，茯苓渗湿清治节，炙草缓中益脾胃，升麻升阳明清气，柴胡升少阳清气，广木香醒脾开胃以调气化。水煎

温服，使元气内充，则脾能健运而清气上升，胃气自化，安有倦怠腹痛泄泻之患。

73662 调中益气煎

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】人参一钱（若无人参，以上党参一两蜜炙透、枸杞子三五钱酒炒代之）炙黄耆三钱 当归三钱 土炒白术三钱 甘草五分 陈皮一钱 神曲一钱五分（炒） 白蔻仁二钱（研） 煨姜二钱 大枣三个

【主治】痢后气虚怕冷，脾胃不开。

73663 调中益胃汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】人参二钱（如无人参，以明党参代之） 苍术四钱（炒） 熟地四钱 白芍三钱（酒炒） 草果二钱 黄耆三钱（蜜炙） 陈皮三钱 茯苓三钱 甘草一钱

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】中恶。凡人或入枯井，或入山洞，或入冷室，忽然晕倒，口目紧闭，不省人事。

【方论选录】此方以人参为君，扶其元气；佐以黄耆、熟地，气血双补；苍术、草果能驱败气而扶正气；陈皮、茯苓调其中气；白芍敛阴，甘草和中。细审此方，似乎平庸，然与正气被伤之人服之，不寒不燥，最为稳妥。

73664 调中理气汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】苍术（米泔浸，炒） 白术（炒） 各一钱 陈皮八分 厚朴（姜炒）七分 枳壳一钱 白芍（炒）一钱 木香五分 槟榔一钱

【用法】上锉一剂。水二盏，煎一盏，滤去滓，空心温服。

【主治】痢疾。痢稍久，胃虚者。

【加减】如赤痢，厚朴、乌药俱不必炒，再加黄连、条芩各一钱五分；白痢只依本方。

73665 调中葛根汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】葛根（锉） 黄芩（去黑心） 芍药 白术 藁本（去苗土） 甘草（炙，

锉）各一分 赤茯苓（去黑皮）半两 大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。一岁以下儿，每服一钱匕，水七分盏，煎至四分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】小儿春夏秋冬晨夕暴冷，折其四肢，热不得泄，发为壮热，冷气入胃，洞泄下痢，或赤白频数，小腹胀痛，脉洪大或数者。

73666 调中疏邪汤

《医学入门》卷七。为《丹溪心法》卷二“调中汤”之异名。见该条。

73667 调中愈痛汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】青皮 红花 丹皮 牛膝 陈皮 桔梗 甘草 人参 乌药 香附 蓬术 半夏

【用法】水二钟，加生姜五片，水煎，食后服。

【主治】受气，腹内有块，不时作痛，寒热。

【加减】孕妇去半夏。

73668 调中槟榔丸

《普济方》卷三九二。即《圣济总录》卷一七六“槟榔丸”。见该条。

73669 调气木香丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】木香二两 羌活二两 川芎二两 槟榔二两 桂心二两 川大黄四两（锉碎，微炒） 郁李仁四两（汤浸去皮，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒下；欲得快利，加至四十丸，夜临卧时服亦得。

【主治】一切风及气，脏腑壅滞，宿食不消，心腹胀满。

73670 调气止痛汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】白术一钱半（土炒） 木香六分 没药五分（去油） 生草五分 白芍一钱（炒） 上元桂五分（去皮研） 青皮一钱

(炒) 乌药五分(炒) 荔枝核三钱(盐水炒) 薏米五分(研) 附子一钱 川楝子七分(炒) 小茴香一钱(炒) 桑螵蛸三钱(盐水炒) 竹茹三分(炒) 生姜一片

【用法】水煎服。

【主治】一切胃肾虚寒，气直上冲，或呕，疼痛难忍。

73671 调气化饮膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】沙参二两 白术一两五钱(炒) 茯苓二两 槟榔二两 三棱二两 木香一两 广砂仁二两 苍术一两五钱(炒) 厚朴一两五钱(制) 陈皮一两五钱 鸡金一两五钱(焙) 枳实一两五钱(炒) 甘草(生)八钱

【用法】共以水熬透，去滓再熬浓，兑炼蜜为膏，瓷器盛之。每服四、五钱，白水冲服。

【主治】脾胃虚，有痰饮。

【方论选录】本方与香砂六君子汤与平胃散合方加减，加有枳实，鸡金、三棱，有补有消，颇具特色。

73672 调气化痰丸

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】半夏 南星 白矾 皂角 生姜各一斤

【用法】水煮南星无白点为度，拣去皂角不用，将生姜切作片，同半夏、南星晒干，再加青皮(去白)、橘红、苏子(炒)、萝卜子(炒，另研)、干葛、杏仁(去皮尖，另研)、麦蘖(炒)、山楂、神曲(炒)、香附子各半斤(净)，与前药合和一处，为细末，生姜汁浸蒸饼，打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后茶汤送下。

【功用】快脾顺气，化痰消食。

【主治】久喘，或作或止者。

73673 调气平胃散

【方源】《医统》卷三十九。

【异名】调气和胃散(《赤水玄珠》卷十六)。

【组成】白豆蔻 丁香 檀香 木香各二

钱 藿香 砂仁各四钱 甘草六钱 苍术八钱 厚朴五钱 陈皮五钱

【用法】上为末。每服二钱，加生姜、大枣，煎汤，入盐少许调服。

【主治】①《医统》：卒暴尸厥，触犯邪气，昏晕卒倒无所知。②《景岳全书》：胃气不和，胀满腹痛。

73674 调气平胃散

【方源】《会约》卷八。

【组成】厚朴(姜炒) 陈皮 苍术各一钱半 甘草 砂仁 檀香 白豆蔻(去壳，微炒) 藿香各八分。

【用法】生姜为引，水煎，温服。

【主治】秽气感触，或冒寒邪，胀满腹痛，恶心。

73675 调气四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】当归 酒白芍各9克 酒生地12克 川芎3克 陈皮 香附各6克 五味子3克

【功用】行气活血，收敛瞳神。

【主治】瞳神受损而散大者。

【方论选录】方中四物汤活血养血，陈皮、香附理气以助血行；五味子收敛瞳神。诸药合用，共起养血活血，行气缩瞳之功。

73676 调气和胃散

《赤水玄珠》卷十六。为《医统》卷三十九“调气平胃散”之异名。见该条。

73677 调气活血汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】人参 阿胶 当归 白芍 川芎 苏梗 砂仁 广皮 茯神 旋覆花 炙甘草 桑寄生

【主治】孕妇因跌仆挫闪而致半产。

73678 调气养血汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】香附米(炒) 乌药 砂仁 当归 川芎 白芍(酒炒) 熟地黄(姜汁浸，焙)各一钱 甘草(炙)三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，煎服；或丸或散皆可。

【主治】妇人室女血气不和，胎前产后诸病。

【加减】气痛，加吴茱萸，痰盛，加二陈汤。

73679 调气养血汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】人参 黄耆 半夏（制） 甘草 川芎 蝉退 陈皮 归身 桔梗 淫羊藿 云茯苓

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】痘疹八九日不成浆者。

73680 调气养神汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】龙眼肉八钱 柏子仁五钱 生龙骨（捣碎）五钱 生牡蛎（捣碎）五钱 远志（不炙）二钱 生地黄六钱 天门冬四钱 甘松二钱 生麦芽三钱 菖蒲二钱 甘草一钱半 镜面朱砂（研细，用头次煎药汤两次送服）三分

【用法】磨取铁锈浓水煎药。

【功用】养神明，滋心血，理肝气，清虚热。

【主治】其人思虑过度，伤其神明，或更因思虑过度，暗生内热，其心肝之血，消耗日甚，以致心火肝气，上冲头部，扰乱神经，致神经失其所司，知觉错乱，以是为非，以非为是，而不致于疯狂过甚者。

【方论选录】龙眼肉色赤入心，且多津液，最能滋补血分，兼能保和心气之耗散，故以之为主药；柏树杪向西北，禀金水之精气，其实采于仲冬，饱受霜露，且多含油质，故善养肝，兼能镇肝（水能养木，金能镇木），又与龙骨、牡蛎之善于敛戢肝火、肝气者同用，则肝火肝气自不挟心火上升，以扰乱神经也；用生地黄者，取其能泻上焦之虚热，更能助龙眼肉生血也；用天门冬者，取其凉润之性，能清心宁神，即以开燥痰也；用远志、菖蒲者，取其能开心窍，利痰涎，且能通神明也；用朱砂、铁锈水者，以其皆能镇安神经，又

能定心平肝也；用生麦芽者，诚以肝为将军之官，中寄相火，若但知敛之镇之，或激动其反应之力，故又加生麦芽，以将顺其性，盖麦芽炒用能消食，生用则善舒肝气也。至于甘松，用之以清热、开痰、逐痹，兼有安养神经之效。

73681 调气益黄散

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十一引钱乙方。

【组成】金头赤足蜈蚣一条（酒浸炙） 蝎尾四个 白僵蚕（炒）七个 炒瞿麦五分

【用法】上为末。每用一字，以鹅翎管吹入鼻中，喷嚏、啼哭则可治，仍用薄荷煎汤调一字服之。

【主治】脐风，噤口，撮口。

73682 调气清肺汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】苏子 杏仁 橘红 砂仁 白茯苓 桑白皮 马兜铃

【主治】孕妇肺阴不足以养胎，致肺气不肃，咳嗽气促，震动胞络，胎因不安，每致七月而半产者。

73683 调气温胃丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【异名】温胃丸（《普济方》卷三十五）。

【组成】半夏（汤洗七遍，焙干）二两 肉豆蔻（去壳） 桂（去粗皮） 人参各半两 诃梨勒皮 高良姜各一分 木香 陈橘皮（汤浸去白，焙） 蜜 枣肉各一两 生姜自然汁一盞（人蜜、枣熬为膏）

【用法】上为末，用姜蜜枣膏和丸，如梧桐子大。每服十丸，米饮送下；生姜汤亦得。

【主治】胃寒肠热，腹胀泄痢。

73684 调气暖宫丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归（酒洗） 川芎 肉桂各二钱 白芍药（煨） 香附 艾叶（醋炒） 阿胶（蛤粉炒成珠）各四两。

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。

每服五十丸，食前米汤送下。

【主治】宫冷不孕。

73685 调水愈通散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】青皮 陈皮 三棱 蓬术 厚朴 半夏 桔梗 甘草 藿香 益智 官桂 香附

【用法】水一钟，入姜煎八分，不拘时候服。

【主治】寒热经事不通，呕吐咳嗽，中脘不时疼痛。

【加减】如小腹痛，加红花，归尾。

73686 调血化核丸

【方源】《病科全书》。

【组成】当归 冬葵子 老熟地各二两 阿胶 白芍 茯苓 杭菊花各一两半 淡海藻 昆布 煅龙骨 煅牡蛎 山慈菇各一两（去皮毛） 柴胡四钱 白芥子八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。勿用火焙，早、晚饭后淡盐汤送下。临时加减，水煎亦可。

【主治】血瘀。初起仅一二核，形同覆杯，任指揉之，不摇不动，渐次加大。

73687 调阴养阳汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】茯苓 羊藿 白术各一钱 当归 川芎 白芍 熟地 柏仁 玉竹各一钱半 天台六分 甘草六分

【用法】姜、枣为引，水煎，温服。

【主治】酒病成蛊。

73688 调劳养血丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】黄耆 白术 茯苓 白芍各一两半 人参 山药 归身 熟地 五味 麦冬 远志各一两 陈皮八钱 生地 山萸各五钱

【用法】加入鸭血，炼蜜为丸。

【主治】气血两虚之虚损。

73689 调肝和血丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】当归八钱 白芍五钱 柴胡三钱

（醋炙） 香附四钱 薄荷三钱 丹皮四钱 栀子三钱（炒） 郁金三钱 大黄四钱（炭） 犀角一钱半 生地六钱 青皮二钱

【用法】共为细末，水打成丸，如绿豆大。

【功用】养血调肝，凉血和血。

【主治】肝郁血虚，热在血分者。

73690 调肝和胃膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参三钱 生杭芍四钱 金石斛四钱 桑叶四钱 竹茹三钱 焦三仙九钱 广木香八分（研） 枳壳二钱（炒） 橘红一钱五分 生甘草一钱 生于术二钱

【用法】共以水熬透，去滓，再熬浓汁，兑炼蜜收膏。每服五钱，白开水冲服。

【功用】调肝和胃。

【主治】肝阴不足，脾胃不和之证。

73691 调肝细辛散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】细辛散（《普济方》卷八十五）。

【组成】细辛一两 蕤仁二两（汤浸，去赤皮） 柏子仁二两（微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 羊子肝二具（细切，炙干）

【用法】上为细散。每服二钱，空心以温酒调下，晚食前再服。

【主治】肝气虚乏，视物眵眵、欲成青盲、面目青、眼中炙泪。

73692 调补中州散

【方源】《会约》卷十三。

【组成】人参（无者，以时下生北条参二三两代之） 腿白术（制）三两 茯苓二两 苡仁（炒） 山药（炒） 白扁豆（炒） 芡实（炒）各二两半 陈皮八钱 桔梗一两 元砂仁（去壳炒）七钱 干姜（炮）六钱 甘草（炙）八钱 神曲（炒）七钱 白莲肉（炒）一两 陈米（炒黄，少泔水再炒）一两半

【用法】共研细末。每服五六钱，开水调服，大小悉宜。如犹有虫者，用川椒皮、苦楝根皮煎水调服，五更时再细嚼使君子肉四枚；如

腹大而胀，是有积者，加谷虫七钱，共研末服；如口无味者，姜枣煎汤调服；如大便泄者，加肉豆蔻（面包煨）一两，同研末服；如胃寒气滞作痛者，用真藿香煎水调服。

【主治】一切脾胃虚寒，饮食少思，腹胀倦怠，泄泻暖气，及虫积下后。

73693 调和大补羹

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】大米 小米 糯米 苡仁米 莲肉 芡实 山药 白茯苓各等分 白糖少许

【用法】炒熟呈黄色，为末。每日空腹白滚汤和羹食之。

【主治】脾胃虚弱。

73694 调和肺胃汤

【方源】方出《蒲辅周医疗经验》，名见《古今名方》。

【组成】全瓜蒌四钱 薤白三钱 法半夏三钱 厚朴二钱 炒枳壳二钱 苏梗二钱 陈皮二钱 生姜二钱 麦芽二钱

【用法】一剂二煎，共取160毫升，分二次温服。

【功用】调和肺胃，温化痰湿。

【主治】痰滞胸膈，肺胃不和之胸痹。左胸闷痛，腹胀，咳痰不多，消化力弱，舌苔白腻，脉浮候缓，中候弦滑，沉候有力者。

73695 调和营卫汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 陈皮 独活各一钱 赤芍 白芷 乌药 大茴香 黄耆各八分 炙甘草 红花各五分

【用法】水二钟，煎八分，入酒一杯，量病上下服。

【主治】流注初起，气血凝聚，结肿不散，已成未成者。

【加减】病在下部者，加牛膝。

73696 调肺人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】人参 附子（炮裂，去皮脐） 知母各三分 紫菀（去苗土） 白茯苓（去黑

皮） 甘草（炙） 乌梅肉（炒） 柴胡（去苗） 秦艽（去苗土）各半两 河黎勒（面裹煨，令面黄，取皮）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，生姜半分（拍碎），大枣二枚（劈破），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺劳。形寒饮冷伤肺，及因酒后吐血，咳嗽吐浊，时发寒热，食物不得，日渐羸瘦。

73697 调经八物丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归（酒洗）二两 南芎（盐汤浸，切）一两 白芍（酒炒）一两五钱 熟地黄（酒浸）二两 白茯苓（去皮）一两 白术（米泔浸，焙）二两 橘皮（盐汤洗，晒）一两 条芩（酒炒）一两 牡丹皮一两 玄胡索（酒炒）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八、九十丸，空心淡盐汤送下，寒月酒下。

【功用】养血调经，除赤白带，久服令孕。

73698 调经止带丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】元参（生晒） 白芍（土炒） 杜仲（盐炒） 茯神（辰砂拌） 十大功劳子 阿胶（蛤粉炒） 牡蛎各二两 生地（晒干） 制首乌 乌贼骨（漂煨） 白螺壳各四两 归身炭（酒炒） 广橘白（盐炒） 茜根炭（水炒） 淡芩（水炒） 川柏皮炭（水炒）各一两 冬术（土炒） 白薇（水炒） 川贝 柏子仁（水炒） 制香附 知母（盐炒） 天虫（炒） 枣仁（炒）各一两五钱 川芎（酒炒）七钱 鸡内金（炙脆）八钱 木香（煨） 川连（酒炒）各二钱 甘草梢（生晒） 砂仁各四钱 芡实 莲肉各四两

【用法】上为细末，用藕节炭四两，竹茹二两煎汤，拌蜜四两泛丸，如绿豆大。每服二钱，空心将丸烘热吞服，淡盐汤送下。

【主治】妇人带下，乃由七情内伤，气血乖乱，以致带脉失司，伤及冲任，或经水不调，病成崩淋之累，或湿热郁蒸，色有赤白之分，轻则孕育之难，重则劳怯之渐，专治十二带症。

73699 调经化瘀丸

《中药制剂手册》。为《鲁府禁方》卷三“消积通经丸”之异名。见该条。

73700 调经乌鸡丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】白毛乌骨未炖雄鸡一只（约重一斤，以糯米喂七日，勿令食虫蚁，以绳缢死，干捋其毛，去肚内杂脏不用，纳生地黄、熟地黄、天门冬、麦门冬各二两于鸡肚内，以好酒十碗，文火煮烂，取出肚内药，将鸡连骨用桑柴火焙干，仍以前煮过之生地等药酒，又浸又焙，至鸡骨肉枯为度，研极细末）人参五钱 肉苁蓉（酒洗净）炒破故纸 砂仁 当归 白术 川芎 丹参 茯苓 甘草（炙） 杜仲（盐水炒）各一两 香附米（醋制）四两

【用法】共为细末，入鸡骨肉末和匀，酒面糊为丸。每服五十丸，空心米汤下。

【主治】月经愆期。由脾胃虚弱，冲任损伤，气血不足，致经来或前或后。

73701 调经六合汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】白术 黄芩 香附 陈皮 半夏 白茯苓 归身 白芍 生地 川芎 甘草

【用法】水二钟，生姜三片，煎汤，食远服。

【主治】妇人气血凝滞，经闭而腹中结块，腰腿重疼者。

73702 调经四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒）熟地黄各一钱 青皮（去瓢） 陈皮 丹参各八分 川乌头（火煨去皮脐）七分 红花五分 桃仁（去皮）十个 紫苏 香附各六分 砂仁五分

【用法】上锉。水、酒煎服。

【主治】血气不调，或前或后，或多或少。

73703 调经过期汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】熟地二钱 当归一钱 白芍八分 丹参八分 吴萸八分 白术一钱 香附一钱 川芎八分

【用法】水煎服。

【功用】调经。

【主治】月经过期。

73704 调经至宝汤

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】当归三钱 白芍药（酒炒） 熟地黄 川芎各二钱 人参 吴茱萸（炒） 丹皮 半夏（制） 阿胶各一钱 麦冬一钱五分 肉桂五分

【用法】加生姜、大枣，煎服。

【主治】赤白带下，崩漏淋漓，恶寒发热，口渴，腹痛，小腹急疼，五心烦热，久不成孕。

73705 调经回春膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归三两 生地一两 肉桂（去粗皮）一两 厚朴一两 全蝎一两 白芷一两 玄胡一两 防风一两 蓖麻子一两 杏仁一两 花粉一两 白芍一两 黄柏一两 玄参（去芦）一两 草乌一两 乌药一两 川芎一两 丹参一两 丝瓜络一两 细辛五钱 独活五钱 羌活五钱 枳实五钱 山甲六钱 桃仁六钱 三棱六钱 莪术六钱 红花六钱 牛膝六钱 黄连八钱 猪牙皂八钱 槟榔八钱 大黄一两四钱 川乌一两四钱 木香一两四钱 香附二两 益母草二两 熟地二两

上药酌于碎断，用香油三百二十两炸枯，过滤去滓，炼至滴水成珠，春用黄丹一百三十八两，秋用黄丹一百三十六两，搅匀成膏，取出放入冷水中，出火毒后，加热熔化，兑细料粉：

丁香七钱 干姜二钱 阿魏一钱 乳香二

钱 没药二钱 血竭二钱 肉桂(去粗皮)四两 冰片六钱 麝香二钱

【用法】上研为细粉，每十六两膏油，兑药粉八钱，搅匀摊贴，大张六钱，小张四钱。贴脐上。

【功用】理气通经，化瘀止痛。

【主治】月经不调，血色不正，瘀血结块，胁胀腹痛。

【宜忌】孕妇忌用。

73706 调经补真汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】调经固真汤(《东垣试效方》卷四)。

【组成】独活 干姜(炮) 藁本 防风 苍术各二分 麻黄(不去节) 炙甘草 人参(去芦) 当归身 白术 生黄芩 升麻各五分 黄耆七分 良姜 泽泻 羌活各一钱 柴胡四钱 杏仁二个 桂枝少许 白葵花七朵(去萼)

【用法】上咬咀，除麻黄、黄芩各另外，都作一服。先以水三大盏半，煎麻黄一味令沸，掠去沫，入余药同煎至一盏零七分，再入生黄芩煎至一盏，空心服之。候一时许，可食早饭。

【主治】冬后一月，白带再来，阴户中寒。

73707 调经固荣汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】白茯苓 橘红 乌药 香附 枳壳各八分 当归 白芍 缩砂 熟地 半夏各一钱二分

【用法】加大枣五个，煎汤，食前服。

【主治】月信色淡而稠粘，肚腹疼痛。

73708 调经固真汤

《东垣试效方》卷四。为《兰室秘藏》卷中“调经补真汤”之异名。见该条。

73709 调经育子方

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗)一钱 川芎七分 白芍(酒炒)一钱 熟地黄(姜汁炒)七分 陈皮八分 白术(去芦)一钱 香附(酒炒)一

钱 砂仁二分 丹参五分 条芩(酒炒)一钱 甘草(炙)四分

【用法】水煎，空心服。

【功用】调经理脾，孕育子嗣。

【加减】月经先期者有热，加黄连(姜汁炒)七分，倍黄芩；后期者血虚，加黄耆(蜜炙)一钱，倍芎、归；腹痛有块，加玄胡索(炒)、牡丹皮各一钱；发热，加软柴胡、地骨皮；赤白带下，加柴胡、升麻(俱酒炒)各七分，半夏(姜汁炒)、白茯苓、苍术(米泔浸)、黄柏、知母(俱酒炒)、干姜(炮)；肥盛者，痰脂满子宫，加南星、半夏、苍术、茯苓；瘦怯者血少，不能摄精，倍芎、归；经血过多，加黑姜五分，荆芥穗(炒)八分，地榆九分；经闭不通，加桃仁、红花、苏木；气盛善恼，加乌药、香附、柴胡、陈皮。

73710 调经种子丸

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】当归(酒洗)四两 川芎(微炒)一两 白芍(炒)三两 熟地黄四两 白术(土炒)三两 白茯苓三两 人参一两 甘草(蜜炙)一两 制香附三两 阿胶(炒珠)三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】妇人月经不调，久不受孕。

73711 调经种子丸

【方源】《救产全书》。

【组成】益母草末十两(四月中采上半截白梗，肥壮者佳，蒸透熟晒干) 当归身四两(酒洗) 真川芎二两 白术四两(饭上蒸熟) 白芍三两(醋炒) 怀熟地四两(酒煮杵膏) 黄耆二两(蜜炙) 人参一两 白茯苓二两(人乳拌晒) 砂仁二两(炒) 粉甘草二两 广木香一两(不见火)

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三四钱，早空心、晚食前白滚汤送下。

【功用】调经种子，延年益寿。

73712 调经种子方

【方源】《便览》卷四。

【组成】蕲艾四两 香附六两（醋浸，炒）
当归二两 白茯苓二两 吴茱萸二两（汤泡
七次，盐酒炒） 川芎二两 白芍二两 白
芷一两 广木香一两（煨） 生地二两 小
茴一两五钱（炒） 炒白术一两半 黄芩一
两二钱（炒）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。
每服六十九，空心米汤送下。

【主治】月经不调，血气刺痛，头晕恶心，
赤白带下，子宫虚冷，久无孕育。

73713 调经种子汤

《外科全生集》卷二。为《万氏女科》卷一“调
经种玉汤”之异名。见该条。

73714 调经种玉丸

【方源】《竹林女科》卷四。

【组成】香附（四制） 杜仲（姜汁炒）各
八两 川芎 白芍 当归身 干地黄 陈皮
小茴香（酒炒） 玄胡索（微炒） 肉苁蓉
（酒炒） 青皮（陈者，麸炒） 炒乌药 酒
炒黄芩乌贼鱼骨（酥炙）各四两

【用法】共为末，醋和面糊为丸。每服百丸，
空心好酒送下。

【主治】妇人经水不调，赤白带下，久不受
孕。

73715 调经种玉汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【异名】调经种子汤（《外科全生集》卷二）。

【组成】当归身八钱 川芎四钱 熟地一
两 香附六钱（炒） 白芍（酒炒）六钱 茯
苓（去皮）四钱 陈皮三钱 吴茱萸（炒）三
钱 丹皮三钱 玄胡索三钱

【用法】上锉，作四贴。每剂加生姜三片，
水一碗半，煎至一碗，空心温服；滓再煎，临
卧时服，经至之日服起，一日一服，药完经
止，则当入房，必成孕矣，纵未成孕，经当
对期，俟经来再服最效。

【功用】调经种子。

【主治】《寿世保元》：妇人无子。因七情所

伤，致使血衰气盛，经水不调，或前或后，或多
或少，或色淡如水，或紫色如块，或崩漏带下，
或肚腹疼痛，或子宫虚冷，不能受孕。

【加减】若过期而经水色淡者，乃血虚有寒
也，加官桂、炮姜、熟艾各一钱；若先期三
五日系紫者，血虚有热也，加条芩三钱。

73716 调经种玉汤

【方源】《医部全录》卷三八四。

【组成】熟地黄（酒蒸） 香附子（炒）各
六钱 当归身（酒洗） 吴茱萸 川芎各三
钱 官桂 熟艾各二钱

【用法】上锉，分作四帖。每帖入姜一片，
水煎，空心服。待经至之日服起，一日一帖。
药尽交媾，必成孕。

【主治】妇人无子，多因七情所伤，致经水
不调，不能受孕。

73717 调经香附丸

《仙拈集》卷三引《汇编》。为《济阴纲目》卷
一“九味香附丸”之异名。见该条。

73718 调经活血汤

《郑氏家传女科万金方》卷一。为《女科万金
方》“红花当归饮”之异名。见该条。

73719 调经济阴丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】生地五两 山药三两 茯苓三两
香附三两 当归三两 白芍三两 山萸肉二
两 泽泻二两 杜仲二两 地骨皮二两 丹
皮二两 青蒿一两三钱 蕲艾茸一两三钱
川芎一两三钱 知母一两三钱 黄柏一两三
钱 牛膝一两三钱 鳖甲一两三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，
早、晚空心白汤下。

【功用】开郁清热，滋阴济火。

【主治】阴虚内热，热郁于经脉之中，久而
不清，遂成骨蒸劳热，火炎金燥，水涸精枯，
先致咯血、吐血、咳嗽、音哑，渐及自汗盗
汗，虚寒虚热，冲任不和，天癸闭绝。

73720 调经养血丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】香附十二两(酒、醋、盐汤、童便各浸三日,取出炒) 当归(酒洗) 白芍(酒炒)各二两 川芎一两 生地黄(酒洗)二两 茯苓(去皮) 白芷各一两 牡丹皮(酒洗) 干姜(炒)一两 肉桂一两 红花一两 桃仁(泡去皮)一两 玄胡索六钱 没药一两 半夏(香油炒)一两 甘草(炙)一两 小茴(炒)三钱 莪术(煨,醋炒)五钱 阿胶(蛤粉炒成珠)一两

【用法】上为末,醋糊为丸。每服八十丸,空心白汤、黄酒任下。

【主治】妇女经脉不行或不调,或前或后,赤白带下,久不成孕。

73721 调经养血汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】大熟地 12 克 当归身 15 克 阿胶珠 12 克 丹参 30 克 炒白芍 18 克 柴胡 6 克 陈皮 9 克 香附 9 克 炒杜仲 12 克 川续断 12 克 桑寄生 30 克 甘草 3 克

【功用】养血调经。

【主治】月经不调,色淡量少,或经期提前错后,少腹隐痛,得按则减,腰痠疼痛,舌质淡,苔薄白,脉沉细。

【方论选录】方中熟地、当归身、阿胶、白芍养血;杜仲、川续断、桑寄生固腰肾;丹参、香附、陈皮活血理气调经;柴胡舒肝。共达养血调经之目的。

73722 调经养荣丸

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】生地 丹皮 白茯苓 山药 黄肉 泽泻 白芍 阿胶(蛤粉炒珠) 白当归 枣仁 砂仁 川芎 川断

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二钱,空心白汤送下。

【功用】清热养血。

【主治】妇人月事后五六日,发热见疹,则血室空虚,热邪乘虚入内,重则妄见妄闻,如见鬼祟,昼时了了,夜时谵语,轻则常发夜热,变成疹怯者。

73723 调经养荣汤

【方源】《内经拾遗》卷一引《经验秘方》。

【组成】归身一钱半 川芎七分 白芍八分 熟地一钱 生地五分 丹参八分 玄胡六分 丹皮五分 香附一钱 陈皮七分 白术八分 砂仁二分 红蓝花三分

【用法】上以水二钟,煎八分,空心腹。

【主治】血枯经闭。

73724 调经养营丸

【方源】《活人方》卷六。

【组成】熟地六两 制香附八两 当归四两 白芍四两 蕲艾四两 川芎三两 白术三两 茯苓三两 延胡索二两 陈皮二两 木香一两五钱 砂仁一两五钱

【用法】蜜丸。每服四五钱,早空心白滚汤吞服。

【主治】女子先天禀气不足,或后天营气不及,则冲任之血脉不和,遂至月经愆期,参差不准,临时多寡不一,颜色黄紫不正,未及期而腰腹先为窘痛,或至期而肢不胜烦倦,亦有气血两虚,带脉不引既行,而腹内空陷为痛,甚至心肾不交,天癸不应,则孕育艰难,赤白淋带,兼之七情郁结,五心烦热,饮食减少,面黄肌瘦,头目眩晕,腰膝痠痛,三脘痞结,四肢乏力,血瘦癯瘠,隐痛不一。

73725 调经除带汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞党参三钱 白术五钱(土炒) 炒山药五钱 茯苓三钱 巴戟天六钱(去心,盐水炒) 桑螵蛸三钱(盐水炒) 胡芦巴二钱(盐水炒) 白果仁一钱(去皮炒) 茵陈五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人白带,属肾经虚甚,寒湿火衰者。

73726 调经破瘀汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】丹参八钱 当归身四钱 香附四钱 赤芍三钱 丹皮三钱 栀子三钱 桃仁

四钱 红花三钱 木贼三钱 蝉蜕三钱 菊花三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】月经攻眼，两眼赤丝满目，白膜点点，热泪常流，不痒稍疼，月经先期，气盛血热者。

【临证举例】月经攻眼症 韩某，女，27岁。经时腹痛，两乳胀疼，头疼目赤，酸疼流泪，风轮上生白云点点，六脉皆数，两目赤胀。此乃肝火太盛，上冲于脑。先刺太阳、合谷、睛明等穴，以泻太阳之火；内服调经破瘀汤，四五剂而愈。

73727 调经柴胡汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】柴胡 黄芩 人参 甘草 大黄 当归 白芍各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，食后服。

【主治】日逐积热，口干烦躁，喘，咳嗽。

73728 调经逍遥散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归 白芍 白茯苓 白术 柴胡 薄荷 香附 竹叶 煨姜

【用法】不拘时候服。

【主治】妇人血去太过，血虚生热，自汗体热，脉微。

73729 调经消肿汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】当归尾四钱 茜草根四钱 泽兰三钱 赤芍三钱 川芎一钱五分 益母草四钱 红花二钱 制香附三钱 安桂心八分（冲） 赤苓三钱 藕节四枚

【主治】妇女先经断，而后肿胀。

73730 调经益气丸

【方源】《活人方》卷六。

【组成】生地八两 当归五两 白芍五两 制香附五两 丹皮五两 茯苓三两 杜仲三两 枸杞子三两 白术三两 牛膝三两 泽泻三两 川芎二两 黄耆二两 延胡二两 陈皮二两

【用法】炼蜜为丸。每服三至五钱，早晨空腹，白滚汤服。

【功用】气血兼补，开郁顺气，滋阴清热。

【主治】妇人元气不足，失其营运转输之用，则气滞气郁，而心胸肚腹为痛，营血有亏，失其灌溉滋养之权，则血虚血热，而月信愆期不准，于是百病丛生，形神消烁。

73731 调经益母丸

【方源】《履霜集》。

【组成】益母草八两（砂锅焙干） 香附末二两（七制） 人参二两 嫩黄耆三两（蜜水炒） 白术三两（土炒） 白茯苓三两（去黑皮，乳拌蒸透） 粉甘草三两（去皮，蜜水炒） 陈皮三两 熟地三两 当归身三两 川芎二两 炒白芍二两 远志二两（去骨，水煮片时） 酸枣仁三两（炒透） 莲肉二两（去心烫）

【用法】上为末，用龙眼肉六两，好黄酒制烂，杵羔和炼蜜为丸，每丸重三钱，晒干收用。病轻者，日用一丸研末，或热黄酒下，或蜜汤下；有痰者，姜汤下；病甚者，朝、夕各一丸，以愈为度。或丸如绿豆大，每服三钱亦可。

【主治】月经不调。

73732 调经益母丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】熟地八两 归身三两 香附二两 川芎 延胡索各二两 蒲黄一两 炮姜五分

【主治】妇人血气虚寒，或经行前后凝滞作痛；及产后因虚恶露不行。

【方论选录】方中以熟地大补阴血为君；归身养血和血为臣；而佐之以川芎活血理气，使之补而不滞；香附、延胡行其气；蒲黄去其瘀；炮姜之温，以助药力，则虚者得补，而滞者可行耳。

73733 调经益母丸

【方源】《中药成方配本》（苏州）。

【组成】熟地四两 当归三两 炒白芍二两 川芎一两 制香附二两 桃仁一两 延

胡索一两 炒蒲黄一两 干姜一两 益母膏八两

【用法】将熟地捣烂，与诸药打和晒干，共研细末，用益母膏化水泛丸，如绿豆大，约成丸十七两。每服一钱五分，开水吞服，每日二次。

【功用】行血通经。

【主治】月经愆期，量少腹痛。

【宜忌】孕妇忌服。

73734 调经清郁丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】生地三两 当归三两 续断三两 杜仲三两 川芎二两 阿胶二两 香附二两 知母二两 黄芩二两 川连二两 柴胡二两 干葛二两 白芍三两

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，早、晚空心白汤吞服。

【功用】滋阴散郁，调和冲任之气血，清散经脉之郁火。

【主治】热证初发，阴虚内蒸，月经不调。

73735 调经琥珀汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】三棱 莪术 白芍 刘寄奴 当归 熟地 官桂 甘菊 延胡索 蒲黄

【主治】闭经。

【加减】痛甚，加炮姜、红花、桃仁、牛膝、苏木、香附。

【备考】本方名“调经琥珀汤”，但方中无琥珀，疑脱。

73736 调经滋血汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】马鞭草 荆芥各二分 川芎 枳壳 桂心 当归 赤芍各一钱 乌梅六分 丹皮五分

【用法】水煎，食远服。

【主治】妇人气热气虚，经滞不通，致使血来肢体麻木，或身疼痛；或室女经未行，日渐黄瘦，将成癆疾。

73737 调经滋补丸

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】香附米（酒、醋、童便、盐汤各浸一两，各炒干）四两 怀生地黄（酒浸蒸，炒黑）二两 当归（酒洗）二两 川芎 白芍（酒炒）各一两 白术（去芦炒）二两 白茯苓（去皮）一两 陈皮一两 怀山药一两 牡丹皮一两 小茴（盐酒炒）一两 元胡索一两 阿胶（蛤粉炒）一两 山茱萸（酒蒸去核）一两

【用法】上为细末，酒醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤送下。

【主治】妇人经水不调，或前或后，或多或少，时常头晕，眼黑耳鸣，赤白带下，腰腹疼痛，五心烦热，四肢沉困，胸膈痞闷，不思饮食，肌肤减削。

73738 调经愈痛汤

【方源】《女科指南》。

【组成】黄连 桃仁 乌药 香附 甘草 当归 川芎 地黄 芍药

【用法】水煎服。

【主治】经水将来，预先作痛。

【加减】临行作痛者，加红花。

73739 调经愈痛散

【方源】《女科指南》。

【组成】四物汤加桃仁 红花 蓬术 升麻 香附 木香 黄连 黄芩 延胡索 砂仁

【用法】姜煎服。

【主治】经行作痛。

73740 调荣化滞汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 红花（俱酒洗） 黄芩（酒炒） 陈皮各一钱 生甘草五分 生姜三片

【用法】上用水二钟，煎八分，加酒少许，调五灵脂末二钱，食后服。

【主治】酒皸鼻。

【加减】气弱形肥者，加酒炒黄耆。

73741 调荣四物汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】熟地 当归各二钱 北五味 蕲艾 香附 败龟板各一钱（酥炙） 麦门冬八分（去心）

【用法】上加大枣二个，水煎，空心服。

【主治】月信过期而来，其色如淡红水者。

73742 调荣顺气汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归（酒洗）一钱 川芎八分 生地一钱 白芍（盐水炒）一钱 香附（便制）一钱 艾叶（醋炒）八分 丹皮（酒洗）一钱 阿胶（蛤粉炒）一钱 白术一钱二分 甘草四分 红花一钱 桃仁一钱（去皮尖）

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，食前服。

【主治】妇室经闭不调，或前或后，心腹疼痛。

【加减】腹痛，加玄胡索一钱，五灵脂八分（醋炒），没药一钱；憎寒潮热，加柴胡一钱，地骨（酒炒）一钱。

73743 调荣活络汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】调荣活络饮（《准绳·类方》卷四）。

【组成】当归 桃仁 大黄 牛膝各二钱 川芎 赤芍 红花 生地黄 羌活各一钱 桂枝三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】失力腰闪或跌扑，瘀血凝滞，及大便不通而腰痛者。

【备考】方中桃仁，《准绳·类方》作“杏仁”。

73744 调荣活络汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】大黄 牛膝 赤芍 当归 杏仁 羌活 生地 红花 川芎 桔梗

【主治】腰间死血痛，转动如锥刀之刺，大便黑，小便或黄或黑，日轻夜重，脉芤。

73745 调荣活络饮

《准绳·类方》卷四。为《回春》卷五“调荣活络汤”之异名。见该条。

73746 调荣活络饮

【方源】《症因脉治》卷一。

【成组】当归尾 红花 桃仁 赤芍药 大黄 独活 牛膝 秦艽 桂枝

【主治】内伤腰痛。因瘀血停滞，致腰痛日轻夜重，痛定一处，不能转侧，脉芤涩者。

【加减】有寒，去大黄，有热，去桂枝。

73747 调荣活络散

【方源】《证治汇补》卷七。

【组成】大黄 当归梢 牛膝 杏仁各二钱 赤芍 红花 羌活 桃仁各一钱 川芎 桂枝各三分 香附一钱半

【用法】水煎服。

【功用】通经络。

【主治】瘀血腰痛。

73748 调荣养卫丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】人参 黄耆 当归 白术 白芍 茯苓 山药 麦冬 远志 山萸 陈皮 熟地 生地 五味子

【用法】鸭血、蜜为丸。

【主治】久痹。因杂病久不愈，病久必虚，虚久成劳者。

73749 调荣养卫汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】调营养气汤（《赤水玄珠》卷十八）。

【组成】人参 黄耆 当归 羌活 防风 白术 陈皮各八分 柴胡 地黄各一钱 甘草 细辛各三分 川芎七分

【用法】上用水二钟，加生姜三片，大枣二个，捶入葱白一茎，煎之，温服。

【主治】劳力感寒症。因内伤气血，外感寒邪，致头疼身热，恶寒微渴，濈然汗出，身作痛，脚腿痠疼，无力沉倦，脉空浮而无力。

【加减】元气不足者，加升麻少许；口渴，加天花粉、知母；喘嗽，加杏仁，去升麻；汗不止，加芍药，去升麻，细辛；胸中饱闷，加

枳壳、桔梗，去生地黄、甘草，黄耆；痰盛者，加瓜蒌仁、贝母、去防风、细辛；腹痛，去耆、术，加芍药和之。

73750 调荣通脉汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】天冬二钱 生地五钱 丹参二钱 柏仁二钱 党参四钱 茯神二钱 白术一钱 黄连四分(酒炒) 当归二钱 川断二钱 牛膝二钱

【用法】上加红枣十个，桑枝一尺，水煎服。

【主治】脉痿。关节之处，如枢纽之折，而不可提挈，足胫纵缓，则脉不通而懈弛。

73751 调荣清热饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】丹皮(炒) 地骨皮 当归 鳖甲(酥炙) 白术各一钱五分 黄耆(蜜炒) 青蒿 知母(盐水炒) 人参 柴胡各一钱

【用法】上加枣二个，煎八分，不拘时服。

【主治】骨蒸。

73752 调荣解毒汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】山药 当归 川芎 红花 蝉退 苍术 玄参 防风 香附 金银花各半两 大黄二两

【用法】水煎服。

【主治】痒疮血热甚，痒痛不止者。

73753 调胃干姜散

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《圣济总录》卷四十。

【组成】生姜或干姜一二升

【用法】上咬咀，以水六升，煮三沸，顿服。若不即愈，更可作，无新药，煮滓亦得。

【主治】霍乱心腹胀痛，烦满短气，未得吐下。

【备考】《圣济总录》本方用干姜(炮)一两，上为细散。每服二钱匕，温粥饮调下。

73754 调胃升阳汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】大熟地五钱(炒松) 粉葛根一两

半 白芍药一两半 紫厚朴一钱半 冬白术一钱半(炒焦) 广木香一钱 白云苓三钱 广藿香三钱

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】孕妇吐泻垂脱，脉未脱者。

【方论选录】妊娠暑伏三焦，伤寒邪而吐泻并作，手足厥冷，势已垂危，胎孕难安矣。熟地补血以滋冲任，炒松兼去阴中之湿；白术健脾以护胎元，炒焦兼去肠胃之湿；葛根升阳以解阳明之邪；白芍敛阴以和厥阴之血；木香调气醒脾胃；厚朴散满通阳气，茯苓渗湿和脾；藿香快胃祛暑。水煎温服，俾寒暑并解，则脾胃调和而阳气通行，肢体无不温，吐泻无不止，何胎孕有不安之患哉。

73755 调胃白术散

《痢疽验方》。为《元戎》“调胃白术泽泻散”之异名。见该条。

73756 调胃和中汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】大附子(童便制) 橘红 苍术 青皮 草果 子丁香 半夏各一钱五分

【用法】上加生姜十片，水煎服。

【主治】中脘寒痰，呕吐不止者。

73757 调胃参耆汤

【方源】《产宝》。

【组成】人参三钱 生黄耆二钱 当归二钱 桂枝四分 防风三分 麻黄根(因麻黄发汗，根止汗，宜用根)五分

【用法】上加黑枣一个，用水一盞半，煎至七分，食远热服。

【主治】产后心慌无主，澹澹汗出，形色又脱，汗多亡阳者。

【加减】口渴，加麦冬一钱五分，五味子九粒；有痰，加橘红四分；虚脱，手足冷，加熟附子五分，黑姜四分，牡蛎一钱。

73758 调胃承气丸

《中药成药配本》(苏州方)。即《伤寒论》“调胃承气汤”改为丸剂。见该条。

73759 调胃承气汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】小承气汤(《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》)、调胃承气散(《医方大成》卷一)、承气汤(《外科发挥》卷六)。

【组成】大黄四两(去皮,清酒洗) 甘草(炙)二两 芒消半斤

【用法】上切。以水三升,煮取一升,去滓,纳芒消,更上火微煮令沸,少少温服之。

【功用】①《内经拾遗》:推陈致新以和中。②《医方集解》:除热荡实,润燥软坚,甘平和缓。

【主治】阳明腑实,发热汗出,口渴心烦,大便秘结,腹满痛拒按,脉滑数。胃热发斑,口齿咽喉肿痛,中消,疮疡等见上述症状者。

①《伤寒论》:伤寒脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝误攻其表,胃气不和,谵语者;发汗后,不恶寒,但热,属实者;太阳病未解,但阴脉微者;伤寒十三日,过经谵语,自下利,脉和,内实者;太阳病,过经十余日,心下温温欲吐,而胸中痛,大便反溏,腹微满,郁郁微烦,先此时自极吐下者;阳明病,不吐不下,心烦者;太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者;伤寒吐后,腹胀满者。②《口齿类要》:中热,大便不通,咽喉肿痛,或口舌生疮。③《医方集解》:渴证中消,善食而瘦。④《温病条辨》卷二:热结旁流。阳明温病,纯利稀水无粪者。斑疹,阳明证悉具,外出不快,内壅特甚者。

【方论选录】①《医方考》:大黄苦寒,可以荡实;芒消咸寒,可以润燥;甘草甘平,可以和中,此药行,则胃中调而里气承顺,故曰调胃承气。②《医宗金鉴》:本方有调和承顺胃气之义,非若大、小专攻下也。《经》曰:热淫于内,治以咸寒,火淫于内治以苦寒,君大黄之苦寒,臣芒消之咸寒,二味并举,攻热泻火之力备矣。更佐甘草之缓,调停于大黄、芒消之间,又少少温服之,使其力不峻则不能速下而和也。

【临证举例】蛔厥(蛔虫性肠梗阻) 《上

海中医药》1966;2:62;王某,女,73岁。先患泄泻二天,日下数十次,经治泻止,继而腹胀,二便不通,腹痛,痛极汗出,烦躁不安,呕吐黄色稀水,先后吐出蛔虫四条,诊为蛔虫性肠梗阻,其时口唇干燥,腹胀如鼓,脉象沉细,舌苔黄厚,证属蛔厥。但正气不足,未宜猛下,以调胃承气汤和之。生大黄9克,玄明粉9克,生甘草3克。药后当天大便四次,粪色先黑后黄,中夹蛔虫七条,呕吐止,腹胀消,当晚进牛奶少许,次日即进流质饮食。

【备考】本方改为丸剂,名“调胃丸”(见《玉机微义》引《元戎》),又名“调胃承气丸”(见《中药成方配本》苏州方)。

73760 调胃承气汤

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】大黄 芒消 甘草各等分 生姜三片

【用法】上用水一盞半,先煎大黄、甘草、姜,煎至六分,后入消,水煎去滓,温服。

【主治】①《普济方》:热留胃中发斑,及服热药过多而发斑。②《金鉴》:小儿肥甘过度,必生内热,以致发热蒸蒸,小便赤涩,面赤唇焦,舌燥而渴,脉实有力者。

73761 调胃承气汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】大黄 芒消 枳实 厚朴 黄芩

【用法】加甘草,水煎服。以利为度。

【主治】阳明经胃实,潮热谵语,燥渴,大便不通,手足濇濇自汗,或面赤谵语,脉洪数,或揭去衣被,恶热,饮水不止者。

73762 调胃承气汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】枳壳 酒大黄 槟榔末 甘草

【用法】水煎服。次用黄芩汤

【主治】痘后滞下。因平日食煎炒,素有积热,痘后气血虚,不能胜积,故利脓血,肠鸣作痛,里急后重;或疗肠垢,因痘出之后,饮水太过,水停作泄,热毒乘虚入里,便下脓血者。

73763 调胃承气汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】大黄 枳壳 厚朴 甘草

【主治】伤寒阴厥。用温复阳太过，不耐辛温，胃热谵语。

73764 调胃承气汤

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】大黄三钱（酒制） 元明粉一钱五分 甘草一钱 枳壳一钱五分

【用法】上水煎，去滓，入玄明粉、童便顿服。

【主治】牙衄，阳明壅盛之甚，口渴便秘而衄不止者。

73765 调胃承气散

《医方大成》卷一。为《伤寒论》“调胃承气汤”之异名。见该条。

73766 调胃养中汤

【方源】《医方类聚》卷二一九引《仙传济阴方》。

【组成】人参 白术各三钱 陈皮 豆蔻各三钱 诃子一个 白茯苓三钱

【用法】上为末。米饮调下。

【主治】妇人因受寒热之邪，积于脏腑，下痢赤白，腹痛。

【备考】本方治上症，当先用八宝汤去其热，后以本方调脾胃。

73767 调胃噎膈汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞党参一钱半 白术一钱半（土炒） 扁豆三钱（炒） 陈皮三分 砂仁一钱 归身一钱半 川芎一钱（炒） 神曲一钱（炒） 白芍一钱（炒） 谷芽一钱半（炒） 巴戟天五钱（去心，盐水炒） 茯神一钱半 泽兰叶二钱 薏米五分（研） 生草一钱 柿蒂三钱 竹茹五分

【用法】水煎服。

【功用】补养脾胃。

【主治】一切噎食反胃。因思虑太过，不能解释，气血两虚，津液衰少，致不能食，或

食而即吐。

73768 调顺正气散

【方源】《普济方》卷一〇三引《护命方》。

【组成】麻黄（去根节） 羌活 紫苑 贝母（去心） 防风（去叉） 桔梗 菊花 藁本 独活 川芎各一分 甘草三铢

【用法】上为细末。每服二钱八分，水一盏，煎取七分，食后去滓服。大腑不秘热，只可非时吃三五口，不要任性吃，令过剂，酌量脏腑进服。

【主治】寒风所中，吃透风气散子后，觉上焦有热。

【加减】若觉大腑秘热，加升麻。

73769 调顺阴阳汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 香附一钱 当归一钱 川芎八分 白芍八分 山药一钱 乌药一钱

【功用】调顺阴阳。

73770 调脉葛根汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】葛根 前胡 防风 甘草

【主治】阳明表邪项强之症。

【加减】若太阳见症，加羌活；少阳见症，加柴胡；里有积热，唇焦口渴加知母、石膏。

73771 调理益气汤

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】黄耆（蜜水炙） 党参各一钱五分（焙） 炒苍术一钱 橘红五分 木香（煨） 柴胡 升麻各四分 白蔻肉 炙甘草各三分

【用法】引加姜皮一分，小红枣三个，空心服。

【主治】湿热所伤，体重烦闷，口失滋味，或痰嗽稠粘，寒热不调，体倦少食，脾虚泄泻；兼治虚人疟痢。

73772 调营定痛丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五两 人参一两半 炒白术一两半 川芎一两（醋炒） 当归三两 木

香一两 白芍一两半(酒炒) 香附二两(酒炒) 茯苓一两半 紫石英三两(醋煅)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服五钱,温酒送下。

【主治】经后脐腹疼痛,不孕,脉虚涩者。

【方论选录】血脉空虚,气滞而血去,脉络愈虚,故经后脐腹疼痛,不能怀孕焉。熟地补血滋血,人参补气通脉,白术健脾气以生血,当归养营血以荣经,川芎行血中之气,白芍敛血室之阴,木香化滞气以调中,香附调营气以定痛,茯苓渗湿以清血室,石英涩血以暖子宫也。蜜丸酒下,使经血内充,则滞气自化而冲任调和,何有经后疼痛之患,尚可冀其怀孕矣。

73773 调营活络散

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】羌活 秦艽各一两 当归二两 乳香一两 香附一两 木香一两 续断二两(酒炒) 杜仲二两(酒炒) 牛膝一两半(酒炒)

【用法】上为散。水、酒各半,煎,去滓,早暮各一服。

【主治】血滞腰痛,脉弦涩者。

【方论选录】闪挫伤营,血滞不化,不能荣养经脉,故腰痛不止焉。羌活通经彻络,乳香活血散滞,秦艽活血脉以通肌,当归养营血以荣经,木香调和经气,香附调气解郁,杜仲补肾强腰,续断理伤续筋,牛膝补肝肾以壮筋骨也。为散水酒煎服,使血活滞行,则经络通畅而腰痛自瘳,何闪挫之足虑哉?此通经活络之剂,为闪挫腰痛之专方。

73774 调营养卫汤

【方源】《活人方》卷三。

【组成】当归身三两 川芎二两 川续断三两 牛膝四两 杜仲四两 羌活一两五钱 防风一两五钱 红花二两 黄耆二两 白术三两

【用法】上锉片,绢囊盛,空悬瓮中,用无灰陈酒二十斤,浸五七日,隔汤煮透,早、晚

随量热服。

【功用】活血通经,顺气止痛。

【主治】劳形辛苦,负重力作,气血不和,经络不通,筋骨疼痛,走注不定,胸膈痞闷,饮食不思,寒热交作,嗜卧烦倦。

73775 调营养气汤

《赤水玄珠》卷十八。为《伤寒六书》卷四“调荣养卫汤”之异名。见该条。

73776 调营通导散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 枳壳一两半(炒) 川芎八钱 防风一两半 甘草五钱

【用法】上为散。每服三钱,水煎去滓,温服。

【主治】产后便秘,脉浮涩者。

【方论选录】产后气滞,胃气不能转输糟粕,故传送失职,大便不通焉。枳壳导气滞以宽肠;防风疏风邪而通闭;当归养血荣经;善润泽肠胃;川芎活血行气,能通闭结;甘草缓中以和胃也。为散水煎,使气行血活,则风邪自散,而肠胃润泽,安有大便不通之患乎?

73777 调营敛肝饮

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】归身二钱 白芍一钱五分(酒炒) 阿胶一钱五分(蛤粉) 枸杞三钱 五味五分 川芎八分 枣仁一钱五分(炒研) 茯苓二钱 广皮一钱 木香五分

【用法】上加大枣二个,生姜三片,水煎服。

【主治】肝虚作痛。操烦太过,营血大亏,虚气无归,横逆胀痛。

73778 调脾内托散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】人参 黄耆 甘草 陈皮 白术 藿香 大枣 煨姜 陈仓米

【功用】益气调脾。

【主治】痘疹。

73779 调脾抑火汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓 黄连 山梔仁 白术各二钱 陈皮 黄芩 甘草各一钱

【用法】水煎，不拘时服。

【主治】脾气不足，心中不时嘈杂。

73780 调脾养荣汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】人参 山药 茯苓 麦门冬 当归 芍药 黄连 酸枣仁 甘草

【用法】上锉。加莲肉、园眼肉，水煎服。

【功用】调脾养荣。

【主治】痘疹。

73781 调脾除湿汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】升麻 柴胡 防风 麦芽各二钱 苍术 陈皮 猪苓 泽泻 半夏各一钱二分 木通 羌活各八分

【用法】水煎，温服。

【主治】湿气伤脾，久泻不止，中气下陷，小便黄赤，腹微作胀。

73782 调脾清毒饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】天花粉 连翘 荆芥穗 甘草 黍粘子 桔梗 白茯苓 白术 苏薄荷 防风 广陈皮各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】两目睑浮肿如球，微有湿热，重则流泪，赤肿。

73783 调元益胃饮子

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】川芎炭一钱 炒当归三钱 炮姜一钱 淡附子二钱 苍术炭八分 清炙耆三钱 姜半夏一钱五分 川连（吴萸八分拌炒）一钱 琥珀六分 泽兰一钱 菟藟子（炒）三钱 车前（炒）一钱 广木香（煨）一钱

【用法】水煎，和陈酒半盏，徐徐服下，每日一剂，分作五六次服。

【主治】产后泄泻。产后脾胃虚弱，土不胜

水，木旺侮土，停滞不运，更有血瘀不净，致患泄泻。

【加减】脱肛者，加炙粟壳一钱；如挟食者，加神曲三钱；如有癥瘕者，加莪术（炒）一钱，山楂肉三钱，尖槟榔二钱；如瘀血未净者，加桃仁一钱，红花八分；如心悸者，加远志肉八分，枣仁一钱（炒）。

73784 调经不及期汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】熟地二钱 当归一钱 白芍八分 丹皮八分 元参八分 麦冬八分 陈皮八分 杜仲八分

【用法】水煎服。

【功用】调经。

【主治】月经先期。

73785 调元健脾保肺汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷七。

【组成】白茯苓 人参 黄耆 牡丹皮 陈皮 沙参 白芍（酒炒） 甘草 当归 百合 薏苡仁 麦门冬

【主治】痧后面色青白，唇淡气弱，瘦弱成疳疾。

【加减】大便不实，泻白色者，加木香、白术、诃子少许；泻黄色者，加酒炒黄芩、车前子。

73786 调中清热化湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】云茯苓六钱（研） 广皮三钱 焦茅术三钱 藿梗三钱 紫厚朴二钱（炙） 腹皮三钱 酒连炭二钱（研） 条芩三钱（酒炒） 白蔻仁三钱（研） 香附四钱（炙） 生杭芍 12 克 泽泻 12 克

【用法】共以水煎透，去滓，再熬浓汁，少兑炼蜜为膏。每服一匙，白开水冲服。

【功用】调中清热化湿。

【主治】湿滞脾胃兼有里热之症。

73787 调气养胃和中汤

【方源】《痘疹定论》卷三。

【组成】白术一钱（土炒） 人参三分（去

芦) 白茯苓八分 陈皮八分 砂仁五分 (炒研) 扁豆八分 (炒研) 广木香三分 (研末) 山药八分 (炒) 建莲八分 (去心) 甘草三分 (炙去皮)

【用法】上加煨姜三片, 陈老米三钱作引, 水煎服。

【主治】痘后痢疾。

【加减】腹痛, 加白芍五分 (酒炒)。

73788 调气滋补温肠丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】沉香一两 (另为末) 肉苁蓉二两

【用法】上为末, 用麻子仁汁打糊为丸, 如梧桐子大。每服七十丸, 空心米饮送下。

【主治】发汗, 利小便, 亡津液, 以致大便秘结。

73789 调肝舒筋软坚丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】大生地六钱 赤芍四钱 香附四钱 (炙) 青皮四钱 (子研) 川郁金六钱 (研) 元胡四钱 (炙) 没药三钱 海藻三钱 夏枯草五钱 薄荷二钱 菊花三钱

【用法】共研细面, 水泛为丸, 如绿豆大。每服一钱五分, 开水送下。

【功用】滋肾舒肝, 理气活血, 解郁软坚。

【主治】肾水不足, 肝气郁结, 脾胃同损, 腰痛滑泄, 两胁窜痛, 打嗝暖气, 心下痞满。

73790 调经升阳除湿汤

《普济方》卷三三〇。为《兰室秘藏》卷中“升阳除湿汤”之异名。见该条。

73791 调经升麻除湿汤

《兰室秘藏》卷中。为原书同卷“升麻除湿汤”之异名。见该条。

73792 调经养荣种子丸

【方源】《幼科直言》卷六。

【组成】鱼鳔二两 (蛤粉炒) 牡丹皮一两半 (酒洗晒干) 白芍一两 (酒炒) 沙苑蒺藜二两 (酒洗) 续断一两 (酒洗晒干) 白茯苓一两半 大熟地黄四两 (另捣) 黄芩一两 (酒洗) 菟丝子一两半 (酒煮) 山

萸肉二两 杜仲一两 (盐水炒) 川草薢一两 (白色者, 酒洗) 山药二两 当归一两 (酒洗晒干) 车前子二两 (酒洗) 阿胶一两五钱 (蛤粉炒, 真者) 益母草一两 (取嫩尖晒干, 酒拌, 饭上蒸过, 再晒干) 香附米一两 (童便浸七日后洗净炒)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每早白滚水吞三钱, 空心服后, 随宜进饮食, 将药压入下部。

【功用】滋水生精, 调经种子。

73793 调胃白术泽泻散

【方源】《元戎》。

【异名】调胃白术散 (《痢疽验方》)。

【组成】白术 泽泻 芍药 陈皮 茯苓 生姜 木香 槟榔各等分

【用法】上为末。

【主治】①《元戎》: 痰病化为水气, 传变水蛊, 不能食。②《痢疽验方》: 痢疽声嘶色败, 唇鼻青赤, 面目浮肿。

【加减】若腹上肿, 加白术, 余药各半; 若心下痞者, 加枳实; 若下实者, 加牵牛末。

【备考】《普济方》本方用法: 上为末。每服二钱匕, 更量病势虚实加减, 临时消息。

73794 调胃黄连解毒汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】黄连二钱 广陈皮三钱 焦白术二钱 滑石三钱 酒黄芩三钱 粉葛根三钱 梔子三钱 黄柏三钱 木通三钱 甘草二钱

【用法】水煎, 温服。

【主治】伤寒隐疹后, 内热过盛, 脉象洪数或细数, 不思饮食者。

【方论选录】此方用黄连、黄芩、梔子、黄柏清上中下三焦之热, 滑石清六腑之热, 木通引热下行, 佐以葛根清淡之品, 稍为解其肌表; 其脾胃为热所用, 久已虚衰, 用焦术、甘草、陈皮助胃扶脾, 少为开导, 培养其根蒂。服一二剂, 周身必见微汗, 则热解而人安矣。

73795 调脉理中茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】赤茯苓二两 黄芩一两 梔子仁一两 人参一两(去芦头) 赤石脂二两 远志一两(去心) 犀角屑一两 麦门冬一两(去心, 焙) 石膏四两

【用法】上为粗散。每服二钱, 以水一中盏, 入淡竹叶二七片, 豉五十粒, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】脉极实热, 血气伤心, 好生嗔怒, 面色变赤, 语涩不快。

73796 调理众病醒脾散

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】木香 白术(并湿纸裹煨) 人参 茯苓 草果子 甘草(炙) 陈橘皮 厚朴(缩砂水煮) 紫苏子各等分

【用法】上为末。每用一钱, 水六分, 生姜一片, 大枣半个, 煎四分, 通口服。

【主治】小儿不乳食。

73797 调脾清肝理湿饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯苓三钱(朱染) 炒茅术一钱五分 广皮一钱五分 壳砂一钱(研) 薏米三钱(炒) 扁豆三钱(炒) 泽泻二钱 酒胆草一钱五分 丹参二钱 次生地三钱 白鲜皮二钱 车前子三钱(包煎)

【用法】引用地肤子三钱。

【主治】脾胃湿热, 或心肝郁闷, 气滞夹湿, 及肾阴湿热, 膀胱之气不化, 小水浑赤或少, 顷则变白色, 形如米泔, 或少腹弦急, 痛引于脐, 则小水淋漓作疼。

73798 调经种子神验秘方

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】白归身一钱二分半(酒洗) 白芍(酒炒) 川芎各五分 熟地一钱三分(自制) 四制香附一钱半 广皮 丹皮(酒炒) 各八分 白茯苓五钱(乳蒸) 吴茱萸一钱(炒) 延胡索八分

【用法】照方连进四剂, 加生姜三片, 水二钟, 煎八分, 清晨空心服, 滓再煎, 临卧服。俟经水来时服起, 一日一服, 药尽经止。如

未成孕, 俟后经来, 如法再服四剂。

【主治】不孕。

【加减】若过期三五日紫色者, 乃血虚有外寒也, 外加官桂一钱, 炒干姜炭二钱, 熟艾二钱; 若先期三五日紫色者, 血虚有热也, 外加黄芩三钱。

73799 调经种子第一神方

【方源】《寿世新编》卷上。

【组成】淡吴萸一钱半(平时腹不痛, 兼之火旺者, 减去五分, 体寒腹痛者加五分) 全当归二三钱 正川芎一钱半 杭白芍二钱(酒炒) 嫩桂枝(手足常冷兼之麻痹者, 用桂尖, 否则用桂枝心, 火旺者用一钱, 火衰者用一钱半, 冬月或用二钱) 真阿胶二钱(水酒另炖冲) 法半夏二钱(体寒痰多者, 加五分或加一钱, 痰少而口常干者, 减一钱, 加淡条芩一钱半) 台党参一钱半(津液不足, 口常干苦, 素体火旺者, 以清洋参二钱代之) 粉丹皮一钱半(血热者用二钱) 拣寸冬四钱(常时口干, 唇舌红赤者, 用五钱, 并加生地二钱) 炙甘草一钱半(胸腹胀满者减去, 加四制香附一钱五分) 淡生姜(切薄片)一钱半(体寒痰多易呕者, 用二钱, 暑月少减)

【用法】水煎, 每于经行时服起, 日服一剂, 每月三四剂。服至二三月, 经即对期色正, 数月必受孕矣。

【主治】妇人上热下寒, 心中发热, 少腹常痛, 经寒久不受胎, 经水紫黑稀少, 或过期不至, 两尺迟涩, 两寸关洪大或弦数, 或腰腹胀痛, 或经行干呕。

73800 调胃承气加橘皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】陈橘皮(汤浸去白, 焙)半两 大黄(锉, 醋炒)一两 甘草(炙)半两

【用法】上药细锉。每服四钱匕, 水一盏半, 煎至一盏, 去滓, 入芒消一钱匕, 搅令匀, 更煎三两沸, 温服。

【主治】伤寒发汗不解, 蒸蒸发热者。

73801 调胃承气加木香槟榔汤

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】调胃承气汤加木香 槟榔

【主治】热性腹痛。

73802 调胃承气加生地苡蓉汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】大黄二钱 甘草一钱 芒消二钱
肉苡蓉三钱 生地三钱 白蜜半杯【主治】小儿痘病，阳明府证，潮热谵语，
腹痛便秘。

73803 调胃承气加白芍青萍汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【组成】大黄三钱 芒消一钱 甘草一钱
芍药一钱 浮萍三钱 生姜二钱

【用法】流水煎半杯，温服。

【功用】双解表里。

【主治】小儿温疫，阳明府证已成，表证未
解。

73804 调胃承气加芍药地黄汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【组成】生大黄三钱 生甘草一钱 芒消
一钱 芍药二钱 生地三钱【用法】流水煎半杯，去滓，入芒消煎化，
温服。【主治】小儿疹病阳明府证，烦热谵语便
秘。

73805 调胃承气加麦冬元参汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】大黄三钱 芒消三钱 甘草二钱
麦冬五钱 元参三钱 白蜜一杯

【用法】流水煎大半杯，入白蜜热服。

【主治】阳明府证，潮热汗出，谵语腹满，
便秘者。

朗

73806 朗明汤

【方源】《名家方选》。

【组成】枳实 厚朴各一分 牡蛎 白术
各七分 梔子 黄连 竹茹 石膏各三分

甘草二分

【用法】水煎，顿服。

【主治】遗精久不止，盗汗，五心烦热。

扇

73807 扇坠香

【方源】《医统》卷九十八。

【组成】檀香 沉香各二斤 排草一斤半
零陵香 丁香 酥合油各半两 桂枝 黄板
(即黄连) 甘松 三柰 白芷各四两 麝香
一两 冰片半两 白及面二斤 蜜四斤

【用法】调和得所，做作扇坠。

【功用】芳香辟秽。

弱

73808 弱痰汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参一钱 茯苓五钱 荆芥一钱
苡仁一两 陈皮五钱 天花粉三钱 枳壳三
分 白芥子二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃气怯而水旺，水流胁下，咳唾引
痛，吐痰甚多，不敢用力。【方论选录】此方上能消膜膈之痰，下能逐
肠胃之水，助气则气旺而水降矣。倘徒用消
痰之药，不补其胃气之虚，则气降而水升，泛
滥之祸不止矣。

展

73809 展筋丹

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】人参 珍珠 琥珀 当归 冰片
乳香 没药 三七各五分 血竭二钱 麝香
三分 牛黄一分【用法】共为极细末，收贮瓶中听用，宜收
藏于阴干之处。搽擦用。

【功用】活血舒筋止痛。

73810 展阳神丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参六两 白芍 当归 杜仲 麦冬 巴戟天各六两 白术 熟地 菟丝子各五两 肉桂 牛膝 柏子仁 破故纸各三两 龙骨二两 (醋淬) 琐阳二两 蛇床子四两 覆盆子 淫羊藿各四两 驴鞭一具 人胞一个 蚯蚓十条 海马二对 附子一个 肉苁蓉一枝 鹿茸一具 (照常制)

【用法】上药各为末,炼蜜为丸。每日五钱,酒送下。但必须保养三月始验,否则无功。

【主治】男子天生阳物细小,而不得子者。

73811 展轮四维饮

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】金银花三钱 紫花地丁三钱 丹皮二钱 鲜石菖蒲根八分 川连八分 (吴茱萸二分炒) 晚蚕沙五钱 (包煎) 五灵脂二钱 (炒令烟尽) 连翘二钱 飞滑石三钱 (荷叶包) 白茯苓五钱 生苡仁六钱 丝瓜藤一两 嫩桑枝一两

【用法】地浆水煎、取二瓯,冲入阿芙蓉膏一二分。

【主治】霍乱证具,两目眶陷,爪甲色变,两足转筋,甚则螺蚊皆瘁,此热毒深入血分,阳明与厥阴俱病,热郁不达,煎熬血液,穿经入络,风火鸱张所致。

陵

73812 陵零香油

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】陵零香半两 藿香半两 甘松半两 白檀香半两 马牙消半两 莲子草一分 没石子五个 诃黎勒七个 干椹子一两 沥槽油二斤 乏铍子铁一斤

【用法】上细锉,以绵裹,瓷瓶内用油浸,密封七日后,取出。用摩顶。

【主治】头而热毒风,头黄发拳,头疮目赤。

73813 陵鲤甲汤

【方源】《外台》卷五引《小品方》。

【组成】陵鲤甲十片 (炙) 乌贼鱼骨 (去甲) 鳖甲 (炙) 各一两 常山三两 附子

一个 (炮)

【用法】上切,以酒三升,渍之一夕。先疟发前稍稍服之,勿绝药味。兼以涂身体,断杂人,勿食饮,过时乃得通人,进饮食。

【主治】山瘴疟。南方山岭溪源瘴气毒作,寒热发作无时,痿黄肿满,四肢痹弱。

【宜忌】忌苋菜、生葱、生菜、猪肉。

73814 陵鲤甲散

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【组成】陵鲤一头 (取甲爪,炙) 桂心三分 当归二分

【用法】上为散。每服方寸匕,一日三次,酒进。

【主治】发背及乳房痈肿。

陷

73815 陷水散

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】大戟半两 当归 陈皮各一两

【用法】上为细末。每服五钱,水一大盏,煎至五分,去滓,临卧腹空时温服。

【主治】十种水气极甚,肿从脚起,入腹难忍。

73816 陷伏散

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】蝉蜕 姜蚕 (姜汁炒)

【用法】上为末。每服一钱,紫草汤送下。

【主治】痘疮陷伏。

73817 陷坚散

【方源】《普济方》卷一七一。

【组成】杏仁一升 (去皮尖)

【用法】上以水三升,煎滓取汁,分为三服,下肉为度。

【主治】食狗肉不消,心腹胀急,发热多语。

73818 陷肿散

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】乌贼骨 石硫黄各一分 白石英 紫石英 钟乳各二分 丹参三分 琥珀 附子 胡燕屎 大黄 干姜各四分

【用法】上为散。以韦囊盛，勿泄气，若疮湿即敷；若疮干以猪脂和敷，日三四次，以干为度。若汁不尽者，至五剂、十剂止。

【功用】令人不痛。

【主治】二三十年癭瘤；及骨瘤、脂瘤、石瘤、肉瘤、脓瘤、血管瘤，或息肉，大如杯盂升斗，十年不愈，致有漏溃，令人骨消肉尽，或坚或软，或溃，令人惊悸，寤寐不安，身体痠缩，愈而复发者。

【加减】若不消，加芒消二两。

【方论选录】《千金方衍义》：硫黄、钟乳、紫石英皆悍烈之性，助以姜、附破阴；乌贼、丹参、琥珀散结，燕屎辟毒，仅取大黄一味，以泄癭瘤之旺气，并解药石之悍烈，敷之不消，更加芒消以辅大黄破毒之盛。

【备考】本方去胡燕屎，名“陷脉散”（见《千金翼》）。

73819 陷脉散

《千金翼》卷二十。即《千金》卷二十四“陷肿散”去胡燕屎。见该条。

73820 陷胸丸

《圣惠》卷十五。为《伤寒论》“大陷胸丸”之异名，见该条。

73821 陷胸汤

【方源】《千金》卷十一。

【组成】大黄 栝楼实 黄连各二两 甘遂一两

【用法】上咬咀。以水五升，煮取一升五合，分三服。

【主治】胸中心下结积，饮食不消。

【方论选录】《千金方衍义》：小陷胸用半夏、黄连、栝楼实以涤胸中痰垢，大陷胸用大黄、芒消、甘遂以散心下结硬。此以食积仓廩而蕴热，故于小陷胸中除去半夏，参入大陷胸中大黄，乃革去大小二字，仅取陷胸之名，以除水谷陈气，而与有形坚积略无干预也。

73822 陷胸汤

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】大黄一两 栝楼二两 甘草二两

甘遂一两 黄连六两

【用法】上咬咀。以水五升，煮取二升五合，分三服。

【主治】胸中心下结坚，饮食不消。

73823 陷胸汤

《圣惠》卷十五。为《伤寒论》“小陷胸汤”之异名。见该条。

73824 陷胸汤

《儒门事亲》卷十二。为《伤寒论》“大陷胸汤”之异名。见该条。

73825 陷胸汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】枳实 玄明粉 瓜蒌霜 桔梗 甘草 紫苏 茯苓 陈皮 杏仁

【用法】加韭汁，灯心，水煎服。

【主治】痰食壅滞。

73826 陷胸散

【方源】《普济方》卷一五二引《圣惠》。

【组成】大黄一两半 甘草半两 枳实半两（去瓤）

【用法】上为末。每服三钱，水七分盏，煎三两沸，温温和滓服。汗出为度。六日内多使此散，如无证不用。

【主治】热病喘急，及心胸闷结，喘不定。

73827 陷胸散

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡（去芦头） 甘遂（麸炒） 甜葶苈（隔纸炒） 大黄（锉，微炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 马牙消（研）各一两

【用法】上为末。每服一钱匕，生姜蜜水调下，更看虚实加减。

【主治】伤寒结胸，伏阳在里，心下坚硬，按之则痛。

73828 陷胸青龙汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】牵牛子（微炒）一两半 人参三分 陈橘皮（汤浸去白，焙）半两 桂（去粗皮） 槟榔（锉）各一分 大黄（锉，醋

炒) 半两 朴硝半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，入生姜半分（拍碎），同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒结胸，毒气内盛，手足逆冷，腹胀，喘息急，大便不通。

73829 陷胸泻心汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】栝蒌仁四钱 仙半夏一钱五分 小川连八分 小枳实 青子芩各一钱 淡竹茹三钱

【用法】水煎，去滓，入生姜汁二滴，竹沥二瓢，冲服。

【功用】豁痰降火。

【主治】痰躁。火痰郁遏胸膈，咳嗽不爽，胸中气闷，夜不得眠，烦躁不宁者。

73830 陷胸承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】瓜蒌仁六钱（杵） 小枳实一钱半 生川军二钱 仙半夏三钱 小川连八分 风化消一钱半

【功用】开肺通肠。

【主治】痰火结闭，肺气失降，大肠之气痹，胸膈痞满而痛，甚则神昏谵语，腹满便秘。

【方论选录】此方君以蒌仁、半夏辛滑开降，善能宽胸启膈；臣以枳实、川连苦辛通降，善能消痞泄满；然下既不通，必壅于上，又必佐以硝、黄咸苦达下，使痰火一齐通解。

娛

73831 娛亲汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】熟地一两 白术一两 甘草一钱 人参五钱 杜仲五钱 山药五钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人脾肾两亏，小腹作痛，胎动不安，如下坠之状。

難

73832 难产散

【方源】《慎斋遗书》卷十。

【组成】人参 炮姜 肉桂

【用法】水煎服。

【主治】难产。

73833 难产散

【方源】《慎斋遗书》卷十。

【方源】兔骨髓一个 麝香三分 母丁香一粒 乳香三分

【用法】共为末，和丸，阴干。临产酒服一丸。

【主治】难产。

73834 难产散

【方源】《慎斋遗书》卷十。

【组成】鱼胶五钱（炒成珠） 穿山甲二钱（用背脊者，炒成珠）

【用法】上为末，滚酒送下。

【主治】难产。

73835 难产夺命丹

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】好鱼鳔不拘多少（用香油灯火上众手捻烧，令焦色存性，碾成细末，取一钱） 麝香三厘（研入末内）

【用法】上药拌匀。再以蜡调服，自然易产；如再迟阻，少顷刻一服，即效。

【主治】难产坠下，服药犹迟者。

預

73836 预防汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】黄连一钱五分 生犀角 鼠粘子（炒，研） 山豆根各一钱 蜜蒙花八分 苦参七分 升麻三分 红花子十粒

【用法】水一钟半，煎至八分，于痘疹未出时空腹服之。

【功用】预防小儿痘疹，毒少者可使不出，毒多者亦能减轻。

73837 预固丸

《奇效良方》卷十二。为《圣济总录》卷三十七“豫固丸”之异名。见该条。

73838 预知丸

【方源】《普济方》卷三九六引《傅氏活婴方》。

【组成】预知子一钱（去壳，别研） 诃子二钱（煨去核） 木香半钱 白附子半钱 海金沙半钱（炒） 石决明二钱（煨研） 肉豆蔻一钱

【用法】上为末，冷水滴丸如绿豆大。每服二十丸，藿香汤送下。

【主治】一切痢疾。

73839 预服散

《外台》卷三十四引《小品方》。为原书同卷“甘草散”之异名，见该条。

73840 预知子丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】镇心丸（《御药院方》卷六）。

【组成】枸杞子（净） 白茯苓（去皮） 黄精（蒸熟） 朱砂（研，水飞） 预知子（去皮） 石菖蒲 茯神（去木） 人参（去芦） 柏子仁 地骨皮（去土） 远志（去心） 山药各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼核大，更以朱砂为衣，每服一丸，细嚼，人参汤送下，不拘时候。

【主治】心气不足，志意不定，神情恍惚；语言错妄，忪悸烦郁，愁忧惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寤即惊魇，或发狂眩，暴不知人。

73841 预知子膏

《本草纲目》卷十八。为《圣惠》卷二十四“乳香煎”之异名。见该条。

73842 预制金枪药

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】雄猪油一斤四两（熬化去滓） 松香六两（熬化去滓） 轻粉四两（炒研） 黄蜡六两（熬化去滓） 樟脑三两（研） 麝

香六分 冰片六分 没药 乳香各一两（去油） 真血竭 儿茶各一两

【用法】研极细末，先将黄蜡、松香、猪油熬化待冷，入前药拌匀，瓷瓶收贮，勿令泄气，待用。敷伤处。

【功用】止血，止痛，不作脓。

【主治】刀斧伤，跌扑打碎。

73843 预服万灵丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十七。

【组成】升麻（小者）三钱 葛根三钱 甘草三分 紫草茸一两 蝉蜕 僵蚕（洗） 连翘 白附子（炒）各三钱 山豆根五钱 全蝎（去毒）十枚 雄黄一钱半 麝香一钱 蟾酥一钱（好酒煮化）

【用法】上为细末，和拌为丸，如皂角子大。每服一丸，紫草汤送下。

【主治】痘疹初发热者。

73844 预备夹棍方

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】小金莲方。

【组成】乳香 没药各（去油）一钱 蓖麻仁（炒） 川乌 草乌各五钱

【用法】上为末，将肥皂二十个，去弦及内外筋膜，同药捣极烂，在夹棍先一日做四饼，敷两拐骨过夜，次日洗去，任夹无妨。如治妇人金莲，敷在足骨上过一夜，次日洗去，骨软如绵。

【功用】预防夹棍及裹足伤。

73845 预备金疮散

【方源】《外台》卷二十九引《深师方》。

【异名】干姜散（《圣惠》卷六十八）。

【组成】干姜 甘草（炙） 桂心各一两 当归三两 芎藭四两 蜀椒三两（汗）

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒送下，一日三次。

【主治】金疮。

73846 预解胎毒饮

【方源】《医学正印》。

【组成】生甘草一钱 怀生地四钱 连翘

二钱 黄连一钱(酒炒) 玄参二钱 瓜蒌根二钱 木通一钱 贝母二钱(去心) 牡丹皮一钱五分 金银花四钱 荆芥穗一钱 羚羊角五分(磨汁入药中二十匙)

【用法】上用河水二钟,煎八分,孕妇空心饥时服。

【主治】预防小儿脐风、撮口,痘毒之患。

能

73847 能消丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】威灵仙(去苗土)十两 木香 防风(去叉)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,荆芥汤送下,不拘时服。

【主治】五痔肿痛,下血不止,或荣卫滞涩,身体疼痛,大便风秘不通。

73848 能消丸

【方源】《圣济总录》一四一。

【组成】威灵仙(净洗,麸炒) 蝉壳(净洗去土足,焙干)各一两

【用法】上为末,醋面糊丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,米饮送下。

【主治】痔疮。

73849 能消丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】威灵仙(去苗土)四两 卷柏(去根) 防风(去叉) 猬皮(烧灰存性) 阿胶(炙燥)各半两 糯米(炒)一合

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,加至二十丸,人参汤送下,一日三次,不拘时候。

【主治】痔疾疼痛,如锥刀刺不可忍。

桑

73850 桑酒

【方源】《外台》卷二十引《古今录验》。

【组成】桑枝(并心皮,细锉)

【用法】上以水八升,煮取四升,以四升米

酿酒。每服一升。

【主治】水病。不下则满溢,下之则虚竭,还复,十无一活。

73851 桑煎

【方源】《外台》卷十八引《近效方》。

【组成】桑条二两

【用法】上细锉如豆大。以水一大升,煎取三大合,每服半大合,空腹时当茶或羹粥饮。

【主治】水气袭肺,肺气壅肿,兼风气者。

【方论选录】桑枝性平,不冷不热,疗遍体风痒干燥,脚气风湿,四肢拘挛,上气眼晕,肺气咳嗽,消食,利小便。久服轻身,悦耳目,令人光泽;兼疗口干,可以常服。

73852 桑木灸

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】干桑木

【用法】将桑木劈成细片,扎作小把,燃火吹息,患处每吹灸片时,以瘀肉腐动为度,内服补托药。

【功用】未溃者则拔毒止痛,已溃则补接阳气。火性畅达,通关节,去风寒。

【主治】痈疽发背不起发,或瘀肉不腐溃;及阴疮瘰癧,流注,疔疮,顽疮,恶疮,久不愈者。

73853 桑仁粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】桑椹子 20~30 克(鲜者 30~60 克) 糯米 2 两 或加冰糖少许

【用法】先将桑椹浸泡片刻,洗净后与米同入砂锅内煮粥,粥熟加冰糖稍煮即可。每日二次,空腹食之,5~7 天为一疗程。

【功用】补肝滋肾,养血明目。

【主治】肝肾血虚,头晕目眩,视力减退,耳鸣腰痠,须发早白,及肠燥便干。

【宜忌】煮粥忌用铁锅,以砂锅为好;桑椹以紫者为佳,红者次之,青者不可用;平素大便稀溏或泄泻者不宜服。

【方论选录】桑椹味甘性寒无毒,入肝肾经,有滋补肝肾,养血明目作用。用于头晕

目暗, 失眠贫血, 腰膝痠软, 须发早白, 及老人便秘。

【现代研究】据近代研究, 桑椹含糖、鞣酸、苹果酸, 及维生素 B₁、B₂、C、A、D 和胡萝卜素。桑椹油的脂肪酸主要由亚油酸、油酸和少量硬脂酸组成。药理实验认为, 桑椹在胃中能补胃液的缺乏, 以增强胃的消化能力; 入肠能刺激肠粘膜, 增加肠蠕动, 使肠液分泌增加。

73854 桑乌丸

【方源】《经验广集》卷三。

【组成】何首乌一斤 (料豆一升合煮, 晒干) 桑叶二斤 (陈酒拌透, 晒干) 侧柏叶二斤 (晒干) 女贞子半斤 芝麻半升

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三钱, 空心滚汤送下。

【功用】降火清目, 补肾健步。

73855 桑心汤

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】桑木心 (锉) 二斗

【用法】上于釜中, 以水五斗, 煮取二斗, 澄清, 再用微火煎取五升。旦服五合。吐出蛊毒即愈。

【主治】中蛊吐血。

73856 桑艾煎

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】大桑叶十个 大艾叶十个 黄连三钱 倍子二钱 朴消二钱

【用法】上锉。用水一大盏煎, 去滓, 加铜绿末三四分搅匀, 以绵蘸温水洗。

【主治】一切火眼, 热眼烂弦, 及风眼。

【加减】如非烂弦, 减去铜绿。

73857 桑叶方

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】黄皮桑叶二升

【用法】上用水煎, 带温以布盛罨小儿肛门, 轻手按入, 次用门白中细尘, 绵蘸扑之。

【主治】小儿脱肛。

73858 桑叶汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七。名见《普济方》卷二〇一。

【组成】桑叶一握 篇竹一握

【用法】上细锉。以水二大盏, 煎至一大盏, 去滓, 温温分为三服, 如人行三二里再服。

【主治】霍乱, 吐泻不定。

73859 桑叶汤

【方源】方出《临证指南医案》卷八, 名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】桑叶 丹皮 夏枯草 黑山梔 川贝 苡仁

【主治】阳升不交于阴, 目珠赤痛, 竟夕无寐。

73860 桑叶饮

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】桑叶一大握 (切)

【用法】上以水一盞, 煎取七分。顿服。

【主治】霍乱吐利, 心烦闷不止; 及乳石发转筋, 不吐不下, 气急。

73861 桑叶散

【方源】《幼幼新书》(古籍本)卷二十八引相濡方。

【组成】人参 白茯苓 藿香 干姜 (焙) 各等分

【用法】上为末。小儿泻, 每服半钱, 桑叶汤调服; 大人泻, 每服一钱。

【主治】小儿虚滑泄泻, 频数不止。

【备考】方中干姜, 人卫本作“干葛”。

73862 桑叶散

《普济方》卷二七二。为《证类本草》卷十三引《经验后方》“绿云散”之异名。见该条。

73863 桑叶煎

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】白桑木 (用生白椹者, 采取软条或带叶者亦得, 细锉) 一石

【用法】上纳大釜中, 以水一石, 煎至五斗, 更添水五斗, 以慢火煎令常沸, 再减至五斗, 去滓澄清, 纳净釜中, 更煎至二斗, 滤去滓, 纳锅中, 慢火熬成膏, 约至二升, 如稠饬即

止，倾入通油瓷瓮内收藏。每日取一匙头，空心含化之；如呕逆不下，亦可和粥食之。

【主治】脚气，曾用诸方蘸脚后。

73864 桑叶煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】桑叶（霜后取）

【用法】上煎水，洗眼。

【主治】迎风流泪，并眼目赤肿翳障、疼痛诸疾。

73865 桑叶膏

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】水银 硫黄各一钱（同研黑） 丁香 槐花（蜜炙炒） 藿香叶 腊茶各十分 滑石三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。三岁儿每服一丸，煎桑叶汤，食前化下。

【主治】小儿伏热，吐泻烦渴，腹疼肢冷。

【备考】本方方名桑叶膏，据剂型当为“桑叶丸”。

73866 桑白汁

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】新桑根白皮不以多少（细锉）

【用法】上取其自然汁，涂于儿口内。如无新桑根白皮，取干者一两，细锉，用水一盞，煎至半盞，放温，涂儿口内。

【主治】小儿脾热，乳食不下，胸膈痞闷，涎溢不收。

73867 桑白散

《普济方》卷二八四。为《直指》卷二十二“桑皮散”之异名。见该条。

73868 桑白散

【方源】《银海精微》卷下。

【异名】桑皮汤（《杂病源流犀烛》卷二十二）。

【组成】桑白皮 元参 升麻 杏仁 旋覆花 赤芍药 菊花 葶苈 防风 黄芩 枳壳 甘草（炙）各一两

【用法】上加生姜三片，用水一钟半，煎至八分，食远温服。

【主治】肺气壅塞，邪热上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛，心胸烦闷。

73869 桑白散

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】桑白 杏仁 玄参 防风 升麻 赤芍 葶苈

【用法】水煎，食远服。

【主治】肺经热盛，眼白仁肿胀。

73870 桑皮汤

《杂病源流犀烛》卷二十二。为《银海精微》卷下“桑白散”之异名。

73871 桑皮汤

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】桑皮 茯苓 橘红 白术 木瓜 秦艽

【用法】水煎服。

【主治】妊娠腹胀痛。

73872 桑皮豆

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】赤小豆一升 桑白皮二两

【用法】上以水同煮至软烂，去桑白皮，只服吃赤小豆，未已再服。

【主治】水肿，小便不利，疾轻者。

73873 桑皮饮

【方源】《直指》卷十七。

【组成】桑白皮（炒） 青皮 陈皮 槟榔（制） 枳壳 赤茯苓 青木香 当归 川芎 石苇（炙，去毛） 羌活各一分 牵牛（炒，末） 半夏（制） 葶苈（炒香） 甘草（炙）各一分半

【用法】上锉细。每服三钱，加姜四片，用水煎服。

【主治】肺间积水，头面浮肿。

73874 桑皮饮

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】桑白皮二钱 干葛 柴胡 黄芩 玄参各一钱 地骨皮 天门冬 麦门冬各一钱半 甘草 木通各四分

【用法】上加生姜三片、葱一寸，用水二盞，

煎八分，食远服。取微汗。

【主治】皮肤痛，不可以手按。

73875 桑皮饮

【方源】《寿世青编·病后调理服食法》。

【组成】桑根白皮四两

【用法】上和米四合，煮烂食之。

【主治】水肿，腹胀喘急。

73876 桑皮散

【方源】方出《千金》卷二十五。名见《普济方》卷三〇六。

【组成】桑皮

【用法】先推纳复位，以桑皮细作线缝之，破乌鸡取肝细锉以封之，且忍，勿小便。

【主治】马啮人，阴囊脱出者。

73877 桑皮散

【方源】《直指》卷八。

【组成】脑荷 北桔梗 川芎 防风 桑白皮(炒) 黄芩 北前胡 柴胡 紫苏 赤茯苓 枳壳(制)各一分 甘草(炙)一分半

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】上焦有热，壅血腥闷，嗽声连并，气不得透。

73878 桑皮散

【方源】《直指》卷二十二。

【异名】桑白散(《普济方》卷二八四)。

【组成】桑白皮(新者)一两 苦参 槐花 天花粉(晒)各半两

【用法】上为细末。干掺。仍煎苦参、桑白皮汤盥洗。

【主治】疮口有热，攻焮作痛，赤烂淫汁。

【加减】疮口痒者，加槟榔、轻粉。

73879 桑皮散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】桑白皮 郁李仁各一钱 赤茯苓二钱 木香 防己 大腹皮各五分 苏子 木通 槟榔 青皮各七分半

【用法】上为散，加生姜，水煎服。

【主治】脚气感发，两脚浮肿，小便赤涩，

腹胁胀满，气急，坐卧不得。

73880 桑皮煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】桑白皮(炒)八钱

【用法】上水煎，早、晚温服。

【主治】鼻不闻香臭。

【宜忌】忌椒辛鱼腥。

73881 桑朴汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】桑皮二钱 厚朴一钱 橘红一钱 半夏一钱 茯苓二钱 沉香五分 苏子一钱 五分 杏仁三钱 萸皮二钱 贝母二钱 郁金二钱 佛手五分

【用法】上加生姜三片，水煎服。

【主治】肺痹。烦满，喘而呕者。

73882 桑耳丸

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】桑耳二两 巴豆一两(去皮)

【用法】上捣和，以枣肉为丸，如麻子大。每服一丸，不下，服二丸。病下即止。

【主治】留饮宿食。

【宜忌】忌野猪肉、芦笋。

73883 桑耳丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桑耳 菴蒿子 桂(去粗皮) 芎劳 人参 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 赤茯苓(去黑皮) 白芍药各一两半 大黄(锉，炒)一两 生干地黄(焙)一两 甘草(炙)半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下。

【主治】室女月水不利，或来或止，不得宣通，脐腹攻痛。

73884 桑耳汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桑耳(炙)一两 当归(切，焙) 芍药 桂(去粗皮) 大黄(锉，炒)各半两 枳壳(麸炒，去瓤) 瞿麦穗各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

煎至六分，去滓，温服，一日二次。

【主治】室女月水不通。

73885 桑耳汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】桑耳（微炒）三分 芍药 黄耆 干熟地黄（焙） 阿胶（炙燥）各一两 蛇黄（煨，醋淬五遍，烧末） 蒲黄（微炒） 白堊（煨赤）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，入豉半合，煎至八分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】妇人虚损，或房室无忌，带下赤白。

73886 桑耳饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】桑耳（微炙） 芍药 地榆 茜根 牛角腮（烧灰） 阿胶（炙令燥）各一两 艾叶 鸡苏各三分 白龙骨二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服，早晨、日午、夜卧各一次。

【主治】产后下血不止。

73887 桑耳散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】桑耳（微炙） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 木贼 当归（锉碎，微炒） 槐鹅（微炙）各一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】肠风下血，风毒气攻注，大肠疼痛。

73888 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桑耳一两 菴蒿一两 牛膝一两半（去苗） 赤芍药一两 土瓜根一两 赤茯苓一两 牡丹一两半 桂心一两半 芎藭一两 川大黄一两半（锉，微炒） 生干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，空腹及晚食前以温酒调下。

【主治】妇人月水不调，脐下疔痛，不多嗜

食。

73889 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桑耳（微炒） 牡蛎粉 龙骨 当归（锉，微炒） 白芍药各一两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人大便下血，小腹中切痛不止。

73890 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】桑耳续断散（《圣济总录》卷一五二）。

【组成】桑耳一两（微炒） 丹参一两 续断三分 芎藭三分 柏叶三分（炙微黄） 熟艾三分（焙微黄） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 牡蛎一两（烧为粉） 地榆三分（锉） 阿胶一两（炙令黄燥） 刺蓟根三分 龟甲一两（涂醋炙令黄） 赤石脂一两 当归三分（锉，微炒） 槲叶一两 熟干地黄一两 牛角腮一两（炙令微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人赤白带下，无问远近。

【备考】方中龟甲，《圣济总录》作“鳖甲”。

73891 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】桑耳一两（微炒） 白芍药二分 黄耆二两（锉） 肉豆蔻一两（去壳） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 熟干地黄一两 当归一两（锉，微炒） 蒲黄半两 桔梗一两（去芦头）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人赤白带下。

73892 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】桑黄散（《鸡峰》卷十五）。

【组成】桑黄一两（微黄） 蛇甲一两（炙

微炒黄) 当归三分(锉, 微炒) 乌贼鱼骨一两(烧灰) 白芍药一两 禹余粮二两(烧, 醋淬七遍) 干姜三分(炮裂, 锉) 吴黄三分(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 白石脂一两

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以粥饮调下。

【主治】妇人风冷伤于冲任之脉, 经络虚损, 致成白带。

73893 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】桑耳二两(微炙) 阿胶一两(捣碎, 炒令黄燥) 茜根一两(锉) 熟干地黄二两

【用法】上为细散。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】妇人崩中, 下血不止, 渐致虚困黄瘦。

73894 桑耳散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桑耳三分 菴蒿子一两 牛膝一两(去苗) 赤芍药三分 赤茯苓一两 延胡索一两 桂心三分 芎藭一两 泽兰三分 生干地黄一两

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以温酒调下。

【主治】产后经络不调, 脐下疼痛。

73895 桑耳散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】桑耳(锉碎)二两 鹿茸(酒浸, 炙, 去毛)一两

【用法】上为散。每服二钱匕, 温酒或米饮调下, 空心、日晚各一次。

【主治】妇人漏下赤白, 日久不止。

73896 桑耳散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】麝香一钱 晚蚕沙三分 桐皮二两 桑耳半两

【用法】上为散。每服二钱, 以热酒调下,

不拘时候。

【主治】妇人崩中, 下血不止, 渐加虚困黄瘦。

73897 桑耳粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】桑耳四两 米三合

【用法】上以水三升, 煎桑耳, 取汁二升, 着盐、椒、葱, 投米煮粥, 空腹食之。

【主治】痔疮, 下血不止。

73898 桑尖汤

《类证治裁》卷五。为《杂病源流犀烛》卷十三“沈氏桑尖汤”之异名。见该条。

73899 桑虫丸

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】桑虫一条(捣烂) 麝香 朱砂各五厘

【用法】上为丸, 如绿豆大。每服二三丸, 薄荷汤送下。

【主治】小儿惊风时, 不省人事。

73900 桑虫浆

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】生桑树内虫一二枚

【用法】上蒸熟酒酿, 捣绞, 顿服之。

【主治】痘疮。气虚毒盛, 白陷不起。

73901 桑花饮

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】干桑叶五钱 生甘草三钱 瓜蒌二钱 当归五钱 榆树皮二钱 荆芥二钱 紫花地丁五钱

【用法】上用水煎汁一碗, 饥服。服后饮酒, 令微醉。

【主治】各种疔疮。

73902 桑杏汤

【方源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】桑白皮八钱 朴消一两 乳香杏仁各二钱

【用法】上以水五大碗, 先煎桑、杏至三碗, 再入乳、消, 封口化尽, 先熏后洗。

【功用】小脚, 使足大能小, 其软如绵。

73903 桑杏汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】桑叶一钱 杏仁一钱五分 沙参二钱 象贝一钱 香豉一钱 栀皮一钱 梨皮一钱

【用法】上以水二杯，煮取一杯，顿服之。重者再作服。

【功用】清气分之燥。

【主治】秋感燥气，右脉数大，伤手太阴气分者。

【方论选录】《方剂学》：方中以桑叶、豆豉宣肺散邪，以杏仁宣肺利气，沙参、贝母、梨皮润肺止咳，栀子清泄胸膈之热。诸药合用，共奏清宣温燥，润肺止咳之效。

73904 桑连散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】绿豆粉 桑白皮（蜜蒸） 苦参各五钱 黄连 天花粉各二钱

【用法】上为末。每服三四茶匙，白汤送下。

【主治】麻疹后，余毒未清，留滞肺经，致成肺痈，吐如黄脓者。

73905 桑条煎

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】桑条

【用法】二三月间采嫩条，暴干，净器内烧过，令火自灭，或成白灰，每用三钱，滚水一大碗，泡打转，候澄清，倾清汁于别处。以新绵洗目，每日洗一度。药冷于重汤内令热。

【主治】目内障外翳，及赤脉昏涩。

73906 桑枝方

【方源】《外科精要》卷下。

【异名】桑枝汤（《医学纲目》卷十八）。桑枝煎（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】嫩桑枝（细切，炒）一升

【用法】上以水三升，煎取一升，日服五七剂，多服更妙。

【主治】疮疡口渴。

73907 桑枝汤

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】桑枝 柳枝 椒枝 杉枝 槐枝各一斤（细锉） 白矾三两 盐三两

【用法】上以水三斗，煎取一斗五升，滤去滓，入白矾及盐，搅令冷热得所，淋洗痛处，汤冷更暖过用之。

【主治】风毒攻手足疼痛，或有赤肿，皮肤不仁。

73908 桑枝汤

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】桑枝 柳枝 槐枝 枸杞根 黄荆根 羚羊角（镑）各一两

【用法】上并生用，锉如麻豆大。每用五钱匕，以水一盞半，煎取七分，去滓，以送服乌蛇丸十至十五丸，一日二次。

【主治】大风癰疾。

【宜忌】服药时，身体皮肤痒痛，不得搔抓，宜避风；疾稍退，终身禁房室，及忌动风物。

73909 桑枝汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】桑枝（切） 槐枝（切）各一升

【用法】上以水一斗，煮取七升，去滓淋洗。

【主治】风毒攻肌肉，皮肤浮肿，或在脚，或在手。

73910 桑枝汤

《医学纲目》卷十八。为《外科精要》卷下“桑枝方”之异名。见该条。

73911 桑枝汤

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】桑枝二握（锉） 葱二握

【用法】上以水三升，煎至二升，去滓，稍热浴疮上。

【主治】阴疮。

73912 桑枝散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【异名】桑枝煎（《济阳纲目》卷七十八）。

【组成】桑枝（嫩者）一升

【用法】上切碎，炒香。以水三升，煎取二升，一日服尽。

【主治】①《疮疡经验全书》：痈疽。肾水枯

竭,心火炎上,舌上焦硬,甚坚大燥,厚如鸡内金状,非渴症。②《济阳纲目》:诸风臂痛。

73913 桑枝煎

【方源】《外台》卷十四引《张文仲方》。

【异名】扶桑煎(《惠直堂方》卷二)。

【组成】桑枝(锉,不用全新嫩枝)一大升

【用法】上以水一大斗,煎取二大升,夏月沉井中。每服一盏,空腹时服,服尽又煎。

【主治】①《外台》引《张文仲方》:偏风及一切风。②《惠直堂方》:风热臂痛。

73914 桑枝煎

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】桑枝(锉)三升 黑豆一升 附子五两 茄子根(锉)一升(上四味,以水三斗,煎至一斗,滤去滓,再煎取五升,入后药末) 石斛二两(去根,锉) 天雄二两(炮裂,去皮脐) 天麻二两 芎藭二两 牛膝二两(去苗) 桂心二两(上六味为末)

【用法】将后药末入于前药汁中,于银锅内以慢火熬,用柳木篦不停手搅,候如膏,盛于瓷合内。每服一茶匙,空心、夜晚以热酒调下。

【主治】风,脚膝软弱。

73915 桑枝煎

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】桑枝十斤(锉) 益母草三斤(锉)

【用法】上以水五斗,慢火煎至五升,滤去滓,入小铛内,熬为膏。每服半合,夜卧时以温酒调服。

【主治】紫癜风。

73916 桑枝煎

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】桑枝(如箭直者,细锉,熬令微黄)三斗 白蜜三合 黄明胶一两(炙)

【用法】上以水六斗,煎桑枝取三斗,去滓,再以重汤煎取二升,下白蜜、黄明胶收膏,入瓷器中封贮之。每服一匙,以开水或无灰酒化服。

【主治】脚气,四肢拘挛,遍体风痒干燥,咳嗽上气。

73917 桑枝煎

《景岳全书》卷六十四。为《外科精要》卷下“桑枝方”之异名。见该条。

73918 桑枝煎

《济阳纲目》卷七十八。为《疮疡经验全书》卷九“桑枝散”之异名。见该条。

73919 桑枝膏

【方源】《活人方》卷六。

【组成】青桑枝(取朝东者,锉碎,晒一周)不拘多少

【用法】上用河水、井水各半,熬膏至滴水成珠不散,略用熟白蜜收贮,早、晚空心用史国公酒调服。

【功用】①《活人方》:滋肾益阴,祛风润燥。②《中药成方配本》:祛风宣络。

【主治】①《活人方》:痛风,肝虚血少,风热风盛者。②《中药成方配本》:肢节痠痛。

【备考】《中药成方配本》本方用法:鲜桑枝用水煎透,去滓滤清收汁,加白砂糖收膏。每服五钱,一日二次,开水冲服。

73920 桑枣酒

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】桑叶(九月经霜者,阴干) 红枣各一斤 好酒五斤

【用法】上药入坛内,煮二炷香。空心服三小钟。不可多饮。

【主治】虚劳痰嗽。

73921 桑根汤

【方源】《医心方》卷八引苏敬方。

【组成】桑根白皮五升 大豆五升

【用法】上以水三斗,煮取三升,去滓,分三次服。

【主治】脚气。通身体满,小便涩,上气,心下淡水,不能食,食则胀满者。

73922 桑根汤

《千金翼》卷十七。为方出《外台》卷十一引《肘后方》,名见《普济方》卷一七七“桑根白皮

汤”之异名。见该条。

73923 桑根散

【方源】《普济方》卷三〇八引《十便良方》。

【组成】蒜（细，切） 桑根白皮（取汁）

【用法】将蒜细研，用桑根白皮汁调和。涂于咬伤处。

【主治】蜈蚣咬伤。

73924 桑根煎

【方源】《千金翼》卷八。

【组成】桑根白皮（细切）一斗 麻子仁三升

【用法】上用淳清酒三斗，煮得一斗，绞去滓，加大枣百枚（去皮核），饴糖五升，阿胶五两，白蜜三升，复煎得九升；下干姜末、厚朴（阔二寸，长二尺）末、蜀椒末三味各一升，桂心长一尺二寸，甘草八两，薤米末一升，干地黄四两，芍药六两，玄参五两为丸，如弹子大。每日服三枚。

【主治】妇人伤中，崩中绝阴，使人怠懒不能动作，胸胁心腹四肢满，而身寒热，甚，溺血。

73925 桑柴饮

【方源】《温病条辨》。

【组成】桑叶 黄芩 法半夏各 10 克 柴胡 薄荷各 5 克 忍冬藤 连翘各 12 克

【用法】水煎服。

【功用】辛凉解表，和解少阳。

【主治】温热之邪人于半表半里，而仍偏表，寒热往来一日数作者。

73926 桑脂散

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】桑条（嫩枝） 鹅脂

【用法】上将桑条于铁上烧灰，收贮待用。用时以鹅脂调敷患处。

【主治】口吻疮。

73927 桑消煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】皮消六钱 桑皮八分

【用法】上用水一钟半，煎八分。冷定洗眼，

一日数次。

【主治】火眼，并老年红花眼。

73928 桑粉丹

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】桑条（烧灰存性）三钱 轻粉一钱 雄黄一钱 贝母一钱

【用法】上各为末。用甘草、枸杞各三钱，煎汤一碗，先将疮口洗净（多浸一会），后用米醋少许将药末调稀，入疮口令满，频频换之，待刺去自生肌矣。

【主治】狐刺疮。生于手上，多由受竹木签伤皮破肉而成，疮内生有乱丝，疮外生有小刺，疼痛。

73929 桑菊饮

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】杏仁二钱 连翘一钱五分 薄荷八分 桑叶二钱五分 菊花一钱 苦梗二钱 甘草八分（生） 苇根二钱

【用法】上用水二杯，煮取一杯。一日二服。

【功用】《方剂学》，疏风清热，宣肺止咳。

【主治】太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者。

【加减】二三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加石膏、知母；舌绛，暮热甚，燥邪初入营，加元参二钱、犀角一钱；在血分者，去薄荷、苇根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮各二钱；肺热甚，加黄芩；渴者，加花粉。

【方论选录】《方剂学》：风温袭肺，肺失清肃，所以气逆而咳。受邪轻浅，所以身热不甚，口微渴。治当以辛以散风，凉以清肺为法。本方用桑叶清透肺络之热，菊花清散上焦风热，并作君药。臣以辛凉之薄荷，助桑菊散上焦风热，桔梗、杏仁一升一降，宣肃肺气以止咳。连翘清透膈上之热，苇根清热生津止渴，用作佐药。甘草调和诸药，是作使药。诸药配合，有疏风清热，宣肺止咳之功。但药轻力薄，若邪甚病重者，处方时应酌情加减。

【备考】本方改为散剂，名桑菊散（见《全国中药成药处方集》重庆方）。

73930 桑菊散

《全国中药成药处方集》(重庆方)。即《温病条辨》卷一“桑菊饮”改为散剂。见该条。

73931 桑黄丸

《普济方》卷三二八。为《圣济总录》卷七十一“补益桑黄丸”之异名。见该条。

73932 桑黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】桑黄(锉) 槲白皮(去粗皮,炙,锉) 各一两半

【用法】上为粗末,每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓。温服。

【主治】小便淋沥,出血疼痛。

73933 桑黄散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】桑黄一两(微炒) 地榆三分(锉) 黄连三分(去须,微炒) 当归一两(锉,微炒) 黄芩半两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盞,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】血痢。日久不止,腹痛心烦。

73934 桑黄散

《鸡峰》卷十五。为《圣惠》卷七十三“桑耳散”之异名。见该条。

73935 桑麻丸

【方源】《同寿录》卷尾。

【组成】桑叶一斤(炒为末) 黑芝麻 糯米 黑豆各一升(同炒为末) 黑枣一斤(去核,煮熟)

【用法】上药同捣为丸。每服三钱,早、晚以酒或滚汤送下。

【功用】养血宽筋,温和血脉。

【主治】肢体瘫痪挛痹。

73936 桑麻丸

《医级》卷八。为《寿世保元》卷四引胡僧方“扶桑至宝丹”之异名。见该条。

73937 桑麻丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】制首乌三斤 党参 桑叶(酒蒸) 黑芝麻各一斤 女贞子 白蒺 滁菊 杞子各十两 熟地八两 当归 牛膝各五两 茯苓二两五钱 麦冬 五味 蒙花各二两 望月砂 蝉衣 石决明 草决明各一两

【用法】上为蜜丸。每服三钱,空心淡盐汤送下。

【主治】男妇肝阴不足,眼目昏花;并治久嗽不愈,肌肤甲错,麻痹不仁。

73938 桑麻汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇八。

【组成】麻叶 桑叶

【用法】上以泔煮,去滓。沐发七遍。

【功用】长发。

73939 桑楮汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】桑根白皮 楮白皮(均细锉,洗净) 各一升

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓。空腹温服,一日二次。

【主治】脚气虚肿,小便少。

73940 桑葛汤

《中医喉科学讲义》。为原书“除瘟化毒汤”之异名。见该条。

73941 桑落酒

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】糯米粉五升 白曲五斤 桑条末五斤(取桑枝法:于二三月看朝东桑树发芽时,收取嫩枝吊檐下阴干,寸断,以川蜜拌匀蒸之,阴干后又拌又蒸,如此三次,晒极干听用)。

【用法】将粉面以冷水和作饼子,用皮树叶包好,吊屋檐下,过七日取下,看内有菊花心听用。先用上熟糯米五斗,泡洗入甑内蒸熟,用桑条末五斤,前米曲二斤八两,共拌入饭内和匀,中按一窝,再以好酒洒上,不用火酒,过七日,即有酒浆潮来,再养一七日榨出,再入黄蜡一斤,装坛内密封,重汤煮过三炷香,取起任饮。

【功用】清心明目。

73942 桑椹方

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】桑椹子 楮皮

【用法】先将楮皮细切，以水二斗，煮取一斗，去滓，入桑椹重煮五升，以好糯米五升酿为酒。每服一升。

【主治】水肿。不下则满溢，水下则虚竭，还胀，十无一活。

73943 桑椹汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】桑椹 白茯苓（去黑皮） 牡丹皮 熟干地黄（焙） 桂（去粗皮） 芎藭各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓，空心温服。

【主治】妇人月经不调，脐下疔痛。

73944 桑椹酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】桑椹（捣汁煎）

【用法】上同曲末如常法酿酒饮。

【功用】补五脏，明耳目。

【主治】水肿。不下则满，下之则虚，入腹则十无一活。

73945 桑椹酒

【方源】《本草纲目》卷三十六。

【组成】桑心皮（切） 桑椹

【用法】上以水二斗煮桑心皮，取汁一斗，入桑椹再煮，取五升，以糯米五升，酿酒饮。

【主治】水肿胀满。

73946 桑椹散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】揩齿桑椹散（《圣济总录》卷一二一）、桑椹子散（《普济方》卷七十）。

【组成】干桑椹子 川升麻 皂荚（盐水浸一宿，焙干） 生干地黄 槐白皮各一两

【用法】上细锉，用糯米饭搜为丸，以炭火烧令通赤，候冷，入麝香一分，都研令匀细。每日早晨及夜临卧时先以浆水漱口，后用揩

齿。

【功用】揩齿常令光润白净。

73947 桑椹膏

《保命集》卷下。为原书同卷“文武膏”之异名。见该条。

73948 桑椹膏

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】桑椹不拘多少（取汁） 苍术

【用法】取桑椹汁，入苍术共熬，去滓成膏。

【主治】骨蒸。

【加减】肾气虚，加枸杞子四两（研末）；肺气虚，加人参一两。

73949 桑榆散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】地榆二钱 桑白皮二钱 羌活一钱 玄参三钱

【用法】上为细末。羊脂溶化调涂。

【主治】天火丹。因肾督脉中热毒，兼足太阳经风热，以致从脊背先起赤点，后则渐渐赤肿成片。

73950 桑螺散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】桑螺蛸三十个 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂各三钱

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】小便数，及遗尿。

73951 桑螺膏

【方源】《直指》卷十四。

【组成】桑模上缘桑螺子（烧存性，雨后佳）

【用法】上为末，以猪膏和涂。

【主治】脱肛。

73952 桑木耳散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】桑木耳一两（微炒） 槐木耳一两（微炒） 猬皮一两（炙黄焦） 枳壳三两（麸炒微黄，去瓢） 当归一两（锉，微炒） 羌活一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮

调下。

【主治】痔疾，肛边痒痛。

73953 桑白皮丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】桑根白皮（取上有白槲者，北阴下根白皮，锉，炙黄）二两 郁李仁（汤，去皮，炒） 商陆（微炙） 葶苈（纸上炒令紫色） 牵牛子（炒熟） 巴豆（清水煮一日，去皮心膜，出油尽）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，茶汤送下。利三五行即止。

【主治】水肿。

73954 桑白皮丸

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】桑根白皮二两（锉） 半夏（生姜汁浸一宿，焙） 阿胶（炒令燥） 人参各一两 丹砂（研）一分 甘草（炙）半两

【用法】上为末，糯米粥为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后、临卧含化咽津。

【主治】妊娠咳嗽，痰盛喘逆。

73955 桑白皮汤

【方源】方出《医心方》卷二十八引《玉房秘决》，名见《外台》卷三十四引《千金翼》。

【组成】桑根白皮（切）半升 干姜一两 桂心一两 枣二十枚

【用法】上以酒一斗，煮三沸，去滓，服一升。亦可用水煮。

【主治】①《医心方》引《玉房秘决》：女入伤于夫，阴阳过，患阴肿疼痛。②《外台》引《千金翼》：诸妇人伤丈夫，苦头痛，欲呕而闷。

【宜忌】勿令汗出当风。

73956 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】桑根白皮（锉） 冬葵子 滑石各一两 甘草（炙，锉）半两 朴消一两半 青橘皮（去白，切，炒）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，葱白五寸（切），煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒小便赤涩似淋；膀胱风热。

73957 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】桑根白皮（锉）一两 大腹皮（锉）半两 枳实（去瓤，麸炒） 大黄（锉，炒）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入生姜一枣大（拍碎），煎至六分，去滓。下朴消末半钱匕，空心温服。未通再服，以通为度。

【主治】伤寒五六日，大便不通，气喘。

73958 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】桑根白皮（锉，炒） 款冬花 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙，锉） 干姜（炮）各一两 桂（去粗皮）二两 五味子 白石英（研）各一两一分

【用法】前七味为粗末，与白石英粉拌令匀。每服三钱匕，水一盞，枣五枚（劈破），煎至六分，去滓，一日三次温服。

【主治】肺气不足，胸痛牵背，上气失声。

73959 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】木香汤（《圣济总录》卷五十八）。

【组成】桑根白皮（锉，炒） 人参 黄耆（锉，炒） 草豆蔻（去皮）各一两 枳壳（去瓤，麸炒） 青木香 芍药 半夏（汤洗去滑） 槟榔（锉）各半两 桂（去粗皮）三分 枇杷叶（去毛，蜜炙）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，入生姜五片，煎取八分，去滓，温服。

【主治】消渴。饮水过多，心腹胀满。

73960 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】桑根白皮（锉） 人参 知母（切，焙） 麦门冬（去心，焙） 枇杷叶（去毛，微炙） 黄连（去须，锉，炒） 葛根（锉） 地骨皮（去土） 淡竹根（洗去土，暴干，锉）各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞半，

煎至一盞，去滓，食前服，一日二次。

【主治】消渴及心脏燥热，饮水无度。

73961 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】桑根白皮（锉） 紫苏（连茎叶） 知母（焙） 贝母（去心，炒） 款冬花 半夏（汤洗七遍，焙干） 五味子各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 甘草（炙，锉） 人参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，生姜三片，同煎至七分，去滓温服。一日三次。

【主治】咳嗽，胸满气急。

73962 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】桑根白皮（炙，锉） 麦门冬（去心，焙） 款冬花各一两 贝母（去心） 甘草（炙，锉） 黄明胶（炙令燥） 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】咳嗽，唾脓血痰涎。

73963 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】桑根白皮 苍术（去皮） 木通 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 黄连（去须） 各一两 草豆蔻（去皮） 三枚 天雄（炮裂，去皮脐） 瞿麦穗 大腹 射干 牵牛子（炒） 各一两半 桃仁（去皮尖双仁，炒） 二十枚 郁李仁（去皮，炒） 三分 吴茱萸（炒） 半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，入生姜七片，煮取八分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】三焦咳嗽，面目虚浮，不得安卧，饮盛减食。

73964 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷七十一。

【组成】桑根白皮（锉） 麦门冬（去心，焙） 各一两半 桂（去粗皮） 甘草（炙，

锉） 各半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 猪牙皂荚（酥炙，去皮） 各一两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盞，入生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓。温服，空心、晚食前各一次。

【主治】肺积息贲气胀满，咳嗽涕唾脓血。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“桑根白皮汤”。

73965 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】桑根白皮（炙令黄色，锉） 赤茯苓（去黑皮） 郁李仁（汤浸，去皮尖，麸炒，研） 各二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 一两 海藻（洗去咸，炙） 一两半 赤小豆（炒） 半升

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，煎取八分，去滓，温服，一日三次。

【主治】下痢后，脾胃虚弱，不能转输水气，致身肿胀满。

73966 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】桑根白皮（切） 三两 射干 赤茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 白术各二两 泽漆（炙，锉） 防己 泽泻各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水三盞，煮大豆一撮，至一盞半，去豆下药末，煎至七分，去滓，温服，一日二次，夜一次。

【主治】膀胱石水，四肢瘦者。

73967 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】桑根白皮（炙黄色，锉） 五两 吴茱萸（水浸一宿，炒干） 二两 甘草（炙） 一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，用水二盞，生姜一枣大（切），饴糖半匙，煎至一盞，去滓，温服，一日二次。

【主治】水肿。通身皆肿。

73968 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】桑根白皮(炙黄)三两 陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两 葶苈子(纸上炒令紫色,别捣)二两

【用法】上除葶苈外,共为粗末,入葶苈末再捣匀。每服三钱匕,先用枣五枚(劈破),水一盞半,煎至一盞,去滓入药末,再煎至七分,去滓,温服,如人行五里以来再服。服后当利一二行,肿气下即愈。三五日服一剂。

【主治】脚气。面目浮肿,上气眠卧不得,若卧气欲绝。

73969 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】桑根白皮二两 杏仁(去皮尖双仁,炒)一两 槟榔(生,锉)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至一盞,去滓,温服,空心、日午、近晚各一次。

【主治】脚气肘肿。

73970 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】桑根白皮(东引者,切)三合 茱萸根(东引者,锉,切)一合半

【用法】上以酒二升,煮取一升,空心分二次温服。

【主治】肾热,四肢肿满拘急。

73971 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】桑根白皮(炙,锉)五两 大豆(炒)一升 陈橘皮(汤浸,去白,焙)防风(去叉)麻黄(去根节,汤煮,掠去沫)赤茯苓(去黑皮)各二两 旋覆花 紫苏茎叶各一两 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,人生姜半分(拍碎),同煎至七分,去滓,空腹温服。衣覆出汗。

【主治】脚气。通身肿满,小便涩少,上气痰壅头痛,不能饮食。

【加减】若冷多,加吴茱萸二两;若热多,

加玄参二两。

73972 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】桑根白皮(锉) 紫苏茎叶 木通(锉) 青橘皮(去白)各一两 荆芥穗 羌活(去芦头) 茴香子根(锉) 干木瓜 独活各半两 枳壳(麸炒,去瓤)二两 大腹(大者,并子用)二十枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,生姜一枣大(切),葱白二寸(并根),煎至七分,去滓。空心、日午、夜卧各一服。

【主治】男子妇人风毒脚气,及遍身拘急刺痛,大小便赤涩,不思饮食,呕逆或寒热。

73973 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】桑根白皮(炙,锉) 白茯苓(去黑皮)各一两半 麻黄(去根节,汤煮,掠去沫)一两一分 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,别研) 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,入生姜半分(拍碎),煎至七分,去滓,温服,不拘时候顿服。

【主治】虚劳上气喘息,语声嘶哑。

73974 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】桑根白皮(锉,炒)一两 青橘皮(去白,炒) 半夏(汤浸,洗去滑,姜汁制)各半两 沉香 柴胡(去苗) 贝母(去心) 附子(炮裂,去皮脐) 干姜(炮) 白茯苓(去黑皮) 赤芍药 白芷 甘草(炙,锉) 白术 鳖甲(去裙襕,醋浸,炙) 细辛(去苗叶) 麻黄(去节)各一两 大黄(煨) 木通 乌梅(炒,去核) 黄耆(锉,炒) 玄参 石斛(去根) 陈橘皮(去白,炒) 常山各半两

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞半,同煎至一盞,去滓,温服,不拘时候。

【主治】虚劳损伤,骨节痠痛,肌热咳嗽。

73975 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】桑根白皮（炙，锉） 猪苓（去黑皮） 滑石（碎） 木通（锉） 郁李仁（汤浸，去皮尖，炒） 赤茯苓（去黑皮） 各一两半 陈橘皮（汤浸，去白） 半两 槟榔（微煨，锉） 三枚 泽泻三分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，温服。

【主治】虚劳，脾肾气弱，水液妄行，四肢浮肿，小便不利。

73976 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】桑根白皮（锉） 一两半 茅根（锉） 二两半 木通（锉） 干百合（锉） 各二两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】气淋结涩，洩便不利。

73977 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】桑根白皮（锉） 木通（锉） 各一两半 泽泻 犀角屑 黄芩 旋覆花 茯神 玄参 川大黄（锉，炒） 各一两 甘菊花半两 甘草一分（炙）

【用法】上为细散。每服二钱匕，水一盞，煎至六分，和滓温服。

【主治】目生花翳白点，状如枣花。

73978 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】桑根白皮（切） 升麻 甘草（炙） 秦艽（去苗土） 大黄（锉，炒） 各一两半 石膏（碎） 葛根各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，入竹沥一合，煎至一盞，去滓，早、晚食后、临卧温服。

【主治】肺壅气促，四肢痠痛，鼻塞及痛。

73979 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】桑根白皮（锉） 消石（研如粉） 各二两 紫葛 芍药各三分 犀角（镑） 虎杖各一分

【用法】上除消石外，共为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入消石半钱匕，打匀。空心、晚后温服。

【主治】癰痈，肝中有根。

73980 桑白皮汤

《圣济总录》卷一五七。为《圣惠》卷七十五“桑白皮散”之异名。见该条。

73981 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】桑根白皮（锉，炒） 款冬花（去梗） 五味子（炒） 杏仁（去皮尖双仁，炒，研如膏） 当归（切，焙） 人参 甜葶苈（纸上炒） 防己（锉） 各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】产后上气，虚喘咳逆。

73982 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】桑根白皮（锉） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫） 秦艽（去苗土） 各一分 大黄（锉，炒） 半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，牛乳一合，同煎至五分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】小儿发黄。

73983 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】桑根白皮（锉，焙干） 山梔子仁 芦根（锉） 赤茯苓（去黑皮） 冬葵子 茅根（锉） 甘草（炙） 各一分 滑石（研入） 半两

【用法】上为粗末。五六岁儿，每服一钱匕，水一小盞，煎至五分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】小儿淋痛，小便如血色。

73984 桑白皮汤

【方源】《普济方》卷一五九。

【组成】桑白皮一两 紫菀一两 百合一两 桔梗一两 半夏半两（姜汁制） 人参一两 知母半两（姜汁制） 贝母半两 阿胶一两（炒） 南星半两（姜汁制） 甘草半两 陈橘皮五分 钟乳粉一两 木香一两

【用法】上咬咀。每服半两，水二盏，入生姜五片，大枣一枚，煎至八分，去滓，下钟乳粉一钱或半钱，调匀热服。

【主治】咳嗽。

73985 桑白皮汤

【方源】《普济方》卷一六一。

【组成】柴胡（去苗） 桑根白皮 天雄（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头） 枳壳（去瓤，麸炒） 大腹（连皮锉）各一两半 黄连（去须） 当归（切，焙） 麻黄（去根节） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一两 白梅（拍碎）四块 黄芩（去黑皮） 旋覆花（微炒）各半两

【用法】上锉，如麻豆大，每服五钱，水一盞半，入生姜三片，同煮八分，去滓，温服。

【主治】咳嗽，上气促急，心躁寒热，四肢烦疼，夜间甚者。

73986 桑白皮汤

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】桑白皮 楮白皮 泽漆叶各三升 大豆五升

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞半，煎至八分，温服。

【主治】膀胱石水，四肢瘦，腹肿。

73987 桑白皮汤

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】桑白皮 赤茯苓 郁李仁 陈橘皮各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盞半，入赤小豆一百粒，同煎至八分，去滓，食前服。

【主治】下痢后，脾胃虚弱，不能制水气，以致身肿胀满。

73988 桑白皮汤

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】乌豆五升 桑皮（切）四升（二物以水二斗，煮取一斗半，去滓） 橘皮二两大麻子仁一升（炒） 蜀升麻二两 杏仁（去皮尖）二两 猪苓二两 丹参三两 生姜二两（切）

【用法】上切。将七物纳前桑皮、豆汁中，煮取四升，朝二服，相去如三食久，药消进食，食消，又更进二服。

【主治】遍身肿，小便涩及脚肿。

73989 桑白皮汤

【方源】《医统》卷四十四引《医林》。

【组成】桑白皮 半夏 苏子 杏仁 贝母 山梔 黄芩 黄连各八分

【用法】上以水二盞，加姜三片，煎至八分，通口服。

【主治】肺气有余，痰火盛而作喘者。

73990 桑白皮汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】桑白皮一钱半 泽泻 黑元参各八分 甘草二分半 麦门冬（去心） 黄芩 旋覆花各一钱 菊花五分 地骨皮 桔梗 白茯苓各七分

【用法】上为末。用白水二钟，煎至八分。去滓，温服。

【主治】眼白涩症，不肿不赤，昏蒙涩痛。

【备考】《金鉴》桑白皮汤，治白眼痛，不红不肿，沙涩疼痛，多生红丝赤脉，无地骨皮。

73991 桑白皮汤

【方源】《医钞类编》卷五。

【组成】桑白皮 干葛 柴胡 黄芩（枯）元参各一钱 地骨皮 天冬 麦门冬各一钱五分 木通四分 甘草四分

【用法】上加葱、姜，煎服。

【主治】火邪伤肺，皮肤发痛，手不可按者。

73992 桑白皮饮

【方源】《养老奉亲》。

【组成】桑白皮四两（切） 青粱米四合

(研)

【用法】以桑汁煮作饮，空心渐食，常服尤佳。

【主治】老人水气，面目手足浮肿，腹胀气急。

73993 桑白皮饮

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】桑根白皮（锉） 木通（锉） 紫苏茎叶 桔梗（炒） 大腹皮各一两半 款冬花 紫菀 槟榔 旋覆花各一两 前胡（去芦头） 杏仁各半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱匕，水一中盏，生姜半分，煎至六分，去滓，温服，一日三次。

【主治】肺气壅热，喘息咳嗽，不得安卧，咽嗑干燥。

73994 桑白皮饮

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】桑根白皮（锉，炒） 赤芍药 郁李仁（研） 百合各一两半 木通（锉） 二两 大腹五枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前温服，如人行五里再服。

【主治】水气。面目浮肿，胸满短气，小便不利。

73995 桑白皮饮

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】桑根白皮（锉，炒）一两 商陆根一两半 赤小豆三合 羌活（去芦头）半两

【用法】上咬咀，如小豆大，拌匀。用水五盞，入生姜七片，同煮候豆熟，滤去滓，渴即饮汁，并食豆。

【主治】妊娠四肢肿，皮肉拘急。

73996 桑白皮散

【方源】《外台》卷二十九引《许仁则方》。

【异名】桑白皮八味散。

【组成】桑根白皮六两 生姜屑六两 柏

叶 鸡苏各四两 小蓟根五两 干地黄七两 青竹茹一升（新者） 地菰三两

【用法】上药捣散。每服一方寸匕，渐加至二三匕，煮桑白皮饮和服；以竹沥下亦得。

【主治】积热劳累吐血，但觉心中惛惛，背上烦热，余无他候。

73997 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】桑根白皮散（《普济方》卷二十七）。

【组成】桑根白皮半两（锉） 桔梗三分（去芦头） 木通三分（锉） 紫菀三分（洗，去苗土） 槟榔三分 旋覆花半两 款冬花半两 前胡半两（去芦头） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】肺痿。咳嗽，涕唾稠粘，胸膈壅滞，咽喉不利。

73998 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】桑根白皮一两（锉） 赤茯苓三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 旋覆花一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 大腹皮一两（锉） 前胡一两（去芦头） 麻黄一两（去根节） 紫菀三分（洗，去苗土） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢）

【用法】上为散。每服五钱，用水一大盞，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】伤寒，痰唾无恒，上气喘急，胸中满闷，坐卧不安，面目微肿。

73999 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】桑根白皮一两（生，锉） 白前一两半 木通一两（锉） 旋覆花半两 甘草半两（炙微赤，锉） 川朴消三分 麦门冬一两（去心） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】伤寒，肺热咳嗽，涕唾稠粘，背膊拘急，口干头痛，大小便秘涩。

74000 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桑根白皮一两(锉) 大腹皮半两(锉) 枳壳二两(麸炒微黄，去瓤) 川大黄三两(锉碎，微炒) 川芒消一两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。以利为度。

【主治】伤寒五六日，大便不通，气喘。

74001 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】桑白皮三分(锉) 大腹皮一两(锉) 木通三分(锉) 陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙) 紫苏茎叶三分

【用法】上为粗末。每服半两，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脚气冲心，神识闷乱。

74002 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】桑根白皮一两(锉) 木通三分(锉) 天门冬一两(去心) 款冬花一两 紫苏茎叶一两 皂角根皮一两(锉) 川大黄一两(锉碎，微炒) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为末。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】热病咳嗽，气喘息促，不得睡卧。

74003 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】桑根白皮一两(锉) 赤茯苓一两 麻黄三分(去根节) 杏仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 甘草半两(炙微赤，锉) 泽泻三分 紫菀三分(去苗土) 柴

胡一两(去苗) 大腹皮三分(锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】虚劳肺壅，心胸不利，每唾稠粘，不思饮食。

74004 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】桑根白皮三分(锉) 赤茯苓三分 麻黄三分(去根节) 杏仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 紫菀三分(去苗土) 泽漆三分 柴胡一两(去苗) 大腹皮三分(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】骨蒸劳热，喘急咳嗽。

74005 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】桑根白皮汤(《圣济总录》卷九十九)。

【组成】桑根白皮半两 酸石榴皮半两 茺萸半两 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 生姜一分 槟榔(末)二钱

【用法】上细锉。以水二大盏，煎至一盏，去滓，下槟榔末，搅令匀，分三次稍热服。

【主治】诸虫心痛，每发，连脐腹刺痛，多吐涎沫。

74006 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】桑根白皮三分(锉) 子芩一两 瞿麦半两 陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 葵子一两 牵牛子一两(微炒)

【用法】上为细散。每服二钱，食前煎生姜灯心汤调下。

【主治】卒然小便淋涩不通。

74007 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】桑白皮一两(锉) 赤茯苓二两

汉防己半两 木香半两 紫苏子三分 郁李仁一两(汤浸,去皮,微炒) 木通三分(锉) 大腹皮半两(锉) 槟榔三分 青橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为粗散,每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓,温服,不拘时候。

【主治】妇人脚气盛发,两脚浮肿,小便壅涩,腹胁胀满,气急,坐卧不得。

74008 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】桑白皮汤(《圣济总录》卷一五七)。

【组成】桑根白皮一两(锉) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓢) 商陆半两 泽泻三分 冬葵根一两 赤茯苓一两 木通一两(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓。食前温服,以利为效。

【主治】妊娠四肢肿满,小便不利,时时喘促。

74009 桑白皮散

【方源】《普济方》卷七十六引《圣惠》。

【异名】葶苈桑白皮饮(《证治宝鉴》卷十)。

【组成】桑白皮 玄参 枳壳(去瓢,麸炒) 川升麻 杏仁(去皮尖,炒) 旋覆花(去枝梗) 黄芩 防风(去芦头) 赤芍药 甘草(炙) 甘菊花(去枝梗) 甜葶苈(炒) 各一两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盏半,加生姜三片,煎至八分,去滓,食后温服。

【主治】肺气壅塞,毒热上攻睛目,白睛肿胀,日夜疼痛,心胸烦闷。

74010 桑白皮散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】桑根白皮一两(锉细,炒) 甘草半两(炙黄色) 大黄半两(锉,炒)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,入葱白二寸,煎至六分,去滓,食后、临卧温服。

【主治】肺热久嗽不愈,涕唾多者。

74011 桑白皮散

【方源】方出《证类本草》卷十三引《经验方》,名见《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】鲜桑根白皮 1 斤

【用法】上用米泔水浸三宿,刮去黄皮,锉细,入糯米四两,焙干,一处为末。每服二钱,米饮调下。

【主治】咳嗽甚者,或有吐血。

74012 桑白皮散

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】桑根白皮(锉) 防风(去叉) 麦门冬(去心,焙) 各半两 防己 紫苏叶 槟榔(面裹炮) 各一分 甘草(炙,锉) 半两

【用法】上为散。每服二钱匕,食后沸汤调下。

【主治】肺热膈消。

74013 桑白皮散

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】桑根白皮一两(锉) 大腹皮一两(锉) 陈皮一两(汤浸,去白瓢) 甘草三分(炙微赤,锉) 桂心五分 赤茯苓一两(去粗皮) 木通一两(锉) 紫苏子二两(微炒)

【用法】上为粗散。每服五钱匕,水三盏,生姜一分(拍破),同煎至一盏,去滓,空心、日午、临卧各一服。

【主治】上气。心胸满,不下食。

74014 桑白皮散

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】桑根白皮(锉) 桔梗(锉,炒) 各一两 紫菀(去苗土) 半两 木香 人参 各一分

【用法】上为散。每服三钱匕,用猪胰子一具,劈开,掺药在内,用麻缠定,水二盏,同煮令水尽为度,去麻缕,细嚼,食后米饮送下。

【主治】肺劳咳嗽,胸满短气。

74015 桑白皮散

【方源】《医统》卷四十四引《医林》。

【组成】桑白皮(炒) 桔梗 川芎 防风 薄荷 黄芩 前胡 柴胡 紫苏 赤茯苓 枳壳 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服七钱，生姜三片，大枣一枚，煎七分，食远温服。

【主治】上焦热壅，血腥烦闷，咳嗽连声，气不得透。

74016 桑白皮散

【方源】《普济方》卷二十八。

【组成】桑根白皮一两(锉) 半夏半两(汤浸七次，去滑) 赤茯苓一两 前胡一两(去芦头) 大腹皮三分(锉) 白术半两 木香半两 甘草(炙微赤，锉)一分 川大黄一两(微炙，锉碎)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】肺脏痰毒停滞，心胸满闷，肩背烦疼，不欲饮食。

74017 桑白皮散

【方源】《普济方》卷二四二。

【组成】桑根白皮一两(锉) 泽泻半两 汉防己半两 木香半两 槟榔一两 枳壳半两(麸炒微黄，去瓢) 赤芍药半两 桂心半两 川大黄一两半(锉碎，微炒) 紫苏茎叶一两 木通三分(锉) 赤茯苓一两

【用法】上为散，每服四钱，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】湿脚气。肿满喘急，大便不利。

74018 桑白皮散

《普济方》卷二四二。即《圣惠》卷四十五“桑根白皮散”。见该条。

74019 桑白皮散

【方源】《普济方》卷二四五。

【组成】桑白皮一两(锉) 槟榔一两半 木香半两 牵牛子二两(微炒) 青橘皮一两(汤浸，去白瓢) 川大黄一两(锉碎，

炒) 杏仁一两(汤浸，去皮尖)

【用法】上为散。每服二钱，暖生姜童便调下，不拘时候。以利为度。

【主治】脚气。心腹胀满，壅闷喘急。

74020 桑白皮散

【方源】《普济方》卷三一九。

【组成】桑白皮三分 枳壳 木通 生干地黄 子芩 白芍 甘草

【用法】上为粗散。每服三钱，重水盏半，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】心胸积气作痹，引两胁痛，昏闷不收，音声不清，虚热上壅，作鼻衄者。

74021 桑白皮散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】桑根白皮半两(炒) 射干 赤茯苓 黄芩 木通(锉) 泽泻 泽漆 汉防己各半两

【用法】上为细散。每服半钱，煮赤小豆汤调下，一日三四次。

【主治】小儿水气，遍身肿满，喘促，小便不利。

74022 桑白皮散

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】桑白皮四两 蜜佗僧二两 乌贼骨 煅龙骨 枯矾各五钱 炒黄丹二钱半

【用法】上研为散。外敷伤处。

【主治】金疮血出不止。

74023 桑白皮散

【方源】《医钞类编》卷十二。

【组成】桑皮 木通 大黄(炒)各二两 升麻一两半 炙草一两 石膏 葛根各三两

【用法】上为散。每服三钱，水煎服。外以冰片、马牙消、瓜蒂等分为末，吹鼻。

【主治】鼻干无涕。

74024 桑白皮粥

【方源】《普济方》卷三八七引《傅氏活婴方》。

【组成】桑白皮(洗净，去粗皮，以水煮)二三升 糯米 猪肺 杏仁(去皮尖) 花

椒 茴香

【用法】上煮作粥。五更初吃。

【主治】肺痿。咳嗽吐痰。

74025 桑白皮煎

【方源】《幼幼新书》卷十六。

【组成】桑根皮（东引者）五合 白狗肺一具 甘草 茯苓 芍药 升麻 贝母各十二分 杏仁（炒）十分 李根白皮四分 淡竹青皮八分 款冬花 麦门冬各六分 蜜 地黄汁各一升 黄芩十一分

【用法】上以水一斗，煮取三升，去滓，下杏膏、地黄汁、蜜，微火煎，不住手搅，至二升三合，绵滤。二三岁儿，每服一合，温服，日、夜各三次。

【主治】小儿咳嗽，经久不愈，一嗽气绝；及伤肺见血。

74026 桑白皮煎

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】桑白皮（切）五合 白羊肺一具（切） 芍药十分 款冬花六分 茯苓十二分 贝母十二分 麦门冬六分 杏仁六分（去皮尖，熬为膏） 升麻十二分 生地黄汁一升 黄芩十二分 蜜一升

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，内杏仁膏、地黄汁、蜜等，微火上煎如鱼眼沸，搅勿停手，取二升二合，净绵夹布滤。每服一合，食后含之，日夜三四度。

【主治】咳经年不愈，气喘欲绝，伤肺见血。

【宜忌】忌生冷、油、醋、面、鱼、蒜、茺荑。

74027 桑汁涂方

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】桑根白皮汁（或桑条汁）

【用法】上以涂儿唇口。

【主治】小儿口生白疮。

74028 桑皮汁方

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】桑白皮汁

【用法】将上汁涂于金疮上，血便止；如不

止，更取桑白皮裹疮上，令汁得入疮中。

【功用】止血。

【主治】金疮出血。

74029 桑灰洗方

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】水淋桑柴灰汁

【用法】温浸洗，日三五度。

【主治】冷疮。

74030 桑枝饮子

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】桑枝一握（东引者） 黑豆一分（布袋盛药） 独活一两 生姜一分 羌活一两

【用法】上药细锉。以水二大盏，煎至一盏三分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，分温三服，不拘时候。

【主治】中风不语。

74031 桑枝浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】花桑枝一斤 垂柳枝一斤 槐枝一斤 羌活三两 牛膝三两（去苗） 黑豆一升（炒熟） 附子三两（炮裂，去皮脐） 桂心三两 熟干地黄三两

【用法】上细锉。和匀，以生绢袋盛，用好酒五斗，浸经七日后。每日食前后，暖饮一二小盏，不得令过度，但醺醺然，常有酒气为妙。

【主治】风。

【宜忌】忌生冷、毒鱼、猪肉。

74032 桑枝煎丸

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】桑枝 槐枝 柳枝各一斤（细锉） 黑豆一升（淘洗过） 天蓼木（研）半两（上药以水二斗，煎至五升，滤去滓，入酒一升，更熬令如稀汤） 天麻二两 海桐皮一两 草薺一两 芎藭一两 防风一两（去芦头） 五加皮一两 酸枣仁一两（微炒） 葱苡仁一两 桂心一两 生干地黄一两半

【用法】上为细末，入前煎中拌搜，入炼蜜

为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】妊娠中风。手足缓弱，口眼喎斜，言语謇涩，肢节疼痛。

74033 桑枝膏丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】制首乌 杞子 归身 三角胡麻 菊花炭 柏子仁 刺蒺藜

【用法】上为末，以桑枝膏和为丸。

【主治】肝血不足，虚风内动，左指胀痛引肩。

74034 桑根皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【异名】桑根白皮汤（《普济方》卷一七九）。

【组成】桑根白皮（锉） 麦门冬（去心，焙） 石膏（碎）各二两 赤茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 瓜蒌根各一两半 梔子仁半两 土瓜根一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】暴渴。饮水不止，头面虚浮。

74035 桑根皮散

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】桑根白皮一两（锉，炒） 杏仁一两（去皮尖双仁，炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白） 甘遂一两（煨令微黄） 泽泻一两 赤茯苓二两 黄芩半两 赤小豆一升（以水五升，煮取二升）

【用法】上为散。每服三钱，以小豆汁一中盞，煎至六分，去滓，五更初温服。如人行十里当利，未利再服。

【主治】皮水。头面四肢浮肿，心跳呼吸不利，喘促烦闷，大小便涩。

74036 桑根煎丸

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】桑根白皮（锉）二两 麻子仁（淘净，研）五合 清酒五盞（煮前二味药至三盞，绞汁去滓） 枣三十枚（大者，取肉） 饴糖二两 阿胶（炙令燥）一两 蜜五大合

（取枣糖胶，同煎一大盞，如膏） 干姜（炮裂） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙七遍，锉碎）各半两 蜀椒（去目并合口者，炒出汗） 桂（去粗皮） 甘草（炙令赤） 黄柏（锉碎） 生干地黄（焙） 玄参 五味子各一分 芍药半两

【用法】上药前七味共煎成稀膏，后十味为末，与前膏同和为剂涂酥为丸，如弹子大。每服一丸，食前温酒化服。

【主治】妊娠堕胎后，血出不止，胸胁心腹满痛，时复寒热甚者。

74037 桑寄生丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】桑寄生 黄耆（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 熟干地黄（焙）各二两 蔓荆子（炒）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】风，腰脚不遂。

74038 桑寄生丸

【方源】《疡医大全》卷二十六。

【组成】羌活 桑寄生 防风 白术各三两 杜仲 川续断 赤芍药 薏苡仁 当归 独活 自茯苓各二两 苍术四两 红花五钱 川芎八钱 宣木瓜三两六钱

【用法】上为细末，水叠为丸。每服三钱，白汤送下。

【主治】脚气。

74039 桑寄生丸

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】川杜仲（糯米水泡，即以糯米拌炒，勿令焦）一两六钱 炙耆三两二钱 真桑寄生 高丽参（去芦，米炒） 北五味各八钱 白术（净，炒）一两二钱

【用法】上加大枣（去核）一两二钱，水熬成膏，将所炒之糯米研末，共和为丸，如绿豆大。每服四钱，米汤送下，一日二次。

【主治】妊娠应期堕胎，不受热药者。

74040 桑寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】桑寄生（炙） 芎藭 艾叶（炙）各一两 当归（焙）二两 白胶（炙燥）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒各半盏，同煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】妇人带下。

【加减】服此汤口渴者，加茅根（切）二合，生地黄一两、麦门冬（去心）一两。

74041 桑寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【异名】芎藭散（《朱氏集验方》卷十）。

【组成】桑上寄生（炙令黄，锉碎）半两 当归（炙，锉）一两半 芎藭（锉）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水、酒各半盏，同煎取六分，去滓，温服，早晨、午时、晚间各一次。

【主治】妊娠胎漏，淋漓下血，脐腹疼痛。

74042 桑寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】桑上寄生（锉） 当归（切，焙） 赤茯苓（去黑皮） 木通（锉） 生干地黄（焙） 河黎勒（炮，取皮） 陈橘皮（去白，炒）各一两 白术 芎藭各一两半 莎草根（去毛，炒）半两 木香一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜二片，同煎至六分，去滓，温服，一日三次。

【主治】妊娠胎动不安。

74043 桑寄生汤

《圣济总录》卷一五四。为《圣惠》卷七十五“阿胶散”之异名。见该条。

74044 桑寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】桑寄生（锉） 白茯苓（去黑皮） 人参 萎蕤各一两 白术二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，入粳米半合，生姜一分（切），同煎至七分，

去滓，温服，一日三次。

【主治】妊娠胎萎燥，不能转动，心中急痛。

74045 桑寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】桑寄生 当归（切，焙） 芎藭 人参 甘草（炙）各等分

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏，入葱白七寸，同煎至六分，去滓，温服。

【功用】安胎止痛。

【主治】妊娠胎动，数损堕者。

74046 桑寄生汤

《杏苑》卷八。为《医方类聚》卷二二四引《济生》“桑寄生散”之异名。见该条。

74047 桑寄生汤

【方源】《产孕集补遗》

【组成】桑寄生三钱（酒炒） 川断二钱 熟地三钱 人参二钱 白术二钱 艾一钱 川芎一钱 当归三钱

【用法】上作一服。

【主治】妊娠气血两虚，下血不止，胎动欲下。

74048 桑寄生饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】桑寄生 阿胶（炒燥） 柴胡（去苗） 麦门冬（去心，焙） 人参 大蓟各一两 郁李仁（去皮，炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】妊娠恶阻。头旋呕吐，腰腹疼痛，胎动不安。

74049 桑寄生散

【方源】方出《千金》卷十九，名见《圣济总录》卷五十一。

【组成】桑寄生 牡丹皮 鹿茸 桂心各等分

【用法】上为细散。每服方寸匕，温酒调下，一日三次。

【主治】腰痛。

74050 桑寄生散

【方源】方出《经效产宝》卷上,名见《圣惠》卷七十五。

【异名】寄生葱豉汤(《医方类聚》卷二四引《胎产救急方》)、当归散(《普济方》卷三四二)。

【组成】当归四分 芍药三分 阿胶二分(炙,临时入) 葱白十四茎 豉八合 桑寄生四分

【用法】上用水二升,煎取八合,下阿胶,分两次空腹服。

【主治】①《经效产宝》:妊娠胎动不安,烦闷。②《圣惠》:妊娠胎动,腹痛闷乱。

【备考】《圣惠》本方用桑寄生一两,当归一两(锉,微炒),芍药三分,阿胶二分(捣碎,炒令黄燥)。上为散,每服四钱,以水一中盏,入豉五十粒,葱白七寸,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

74051 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】桑寄生一两 白芍药三分 独活三分 熟干地黄一两 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 牛膝一两(去苗) 附子一两(炮裂,去皮脐) 细辛半两 秦艽三分(去苗) 白茯苓一两 羚羊角屑三分 防风三分(去芦头) 芍药三分 人参三分(去芦头) 当归三分 桂心一两 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水、酒各半中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳痿痹,肢节疼痛或偏枯,或腰痛挛急。

74052 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桑寄生三两 附子一两半(炮裂,去皮脐) 独活二两 当归三分(锉,微炒) 狗脊三分 桂心一两 羌活半两 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 赤芍药三分 芍药三分 甘草半两(炙微赤,锉) 石斛三分(去根,锉) 牛膝三分(去苗) 海

桐皮一两(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】五种腰痛,及脚弱不能行立者。

74053 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桑寄生一两 桂心一两 鹿角屑一两(微炒) 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉)

【用法】上为细散。每服二钱,食前温酒调下。

【主治】元脏久虚,肾腰疼痛。

74054 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】桑寄生一两 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 麦门冬一两(去心) 刺薊一两 人参一两(去芦头) 郁李仁半两(汤浸,去皮尖,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓,温服,不拘时候。

【主治】妊娠阻病,气攻肩背,两肋肋及腰脐下痛,胎动不安。

74055 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】桑寄生一两 当归一两(锉,微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 续断一两 艾叶半两(微炒) 芍药一两

【用法】上为散。每服五钱,先以水一大盏半,入银三两,煎至一盞,次入药并竹茹一分,糯米一百粒,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妊娠损动,腹内结痛,血下晕闷。

74056 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】桑寄生一两 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 艾叶一两(微炒) 白芍药一两 白术一两

【用法】上为散,每服四钱,以水一中盏,

入淡竹茹一分。煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠漏胎，心腹疴痛。

74057 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】桑寄生 当归（锉，微炒） 芎藭 人参（去芦头） 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散，每服四钱，以水一中盏，入葱白七寸，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【功用】安胎止痛。

【主治】胎动逼心，烦闷欲绝。

74058 桑寄生散

《圣济总录》卷一五二。为《圣惠》卷七十三“龟甲散”之异名。见该条。

74059 桑寄生散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】真桑寄生 白茯苓 大川芎 干地黄各半两 吴白术十八铢 黄耆 甘草各六铢

【用法】上为末。每服一钱匕，以枣汤调下，不拘时候。

【功用】安胎清气。

【主治】妊娠胎气上攻，肩项拘急，头目不清，或间有呵欠。

74060 桑寄生散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生》。

【异名】寄生散（《医统》卷八十五）、桑寄生汤（《杏苑》卷八）。

【组成】桑寄生 当归（去芦，酒浸） 川续断（酒浸） 芎藭 香附子（炒，去毛） 阿胶（锉，蛤粉炒如珠子大） 茯神（去木） 白术各一两 人参半两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎动不安，下血不止。

74061 桑寄生散

【方源】《得效》卷十四。

【组成】桑寄生 当归（去芦，酒浸） 川

续断（酒浸） 川芎 香附（去毛，炒） 茯神（去木） 阿胶（蚌粉炒成珠子） 白术各一两 人参 甘草（炙）各半两 陈艾叶一两 乌梅（去核）半两

【用法】上锉散，每服四钱，水一盏半，生姜五片煎服，不拘时候。

【主治】妊娠因房室惊触，或劳力过度，伤动胞胎，或食毒物，致子宫虚滑，经血淋漓，日渐胎干。若不急治，败血凑心，母子难保。

74062 桑寄生散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】桑寄生

【用法】上为末。每服一钱，白汤点服，不拘时候。

【主治】便血止后，腰膝沉重少力者。

74063 桑椹子散

《普济方》卷七十。为《圣惠》卷三十四“桑椹散”之异名。见该条。

74064 桑椹子膏

【方源】《中药成方配本》（苏州）。

【组成】鲜桑椹子（紫色）一百斤

【用法】先将鲜桑椹子榨汁，其渣入锅内加水煮透，去滓滤清，加入原汁一并收膏，约成膏十斤。每用五钱，开水冲服。

【功用】养血祛风。

【主治】肝肾两亏，关节不利。

74065 桑椹膏丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 当归 川芎 白芍 熟地 牡蛎 龙骨 甘草 丹参 神曲

【用法】上为末，以桑椹膏捣丸，如绿豆大。每服五十丸，温酒送下。

【主治】妇人瘰癧，经闭无潮者。

74066 桑螵蛸丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】桑螵蛸三分（微炒） 菖蒲三分 山茱萸三分 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎，细研，水飞过） 肉苁蓉一两（酒浸一

宿，刮去皱皮，炙令干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 续断三分 五味子三分 薯蓣一两 草薢一两 沉香一两 茴香子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前，以温酒送下。

【主治】肾脏风虚耳鸣，腰脊强直，小便数滑。

74067 桑螵蛸丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】桑螵蛸一两（微炒） 兔丝子半两（汤浸三日，曝干，别捣为末） 熟干地黄二两 山茱萸三分 黄连一两（去须）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎大麦饮送下。

【主治】痼肾。小便白浊，久不愈者。

74068 桑螵蛸汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】桑螵蛸四十九枚（醋浸，炙令焦黄） 酸枣仁 菖蒲（石上者） 阿魏（研） 麝香（研） 丹砂（研） 蛇黄（煨，醋淬，研） 各一分

【用法】上为细末，面糊为丸，如小豆大。每服十五丸至二十丸，食后生姜、薄荷汤送下。

【主治】心风癫邪。

74069 桑螵蛸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】附子（炮，去皮脐） 五味子 龙骨各半两 桑螵蛸七枚（切细，炒）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】下焦虚冷，精滑不固，遗沥不断。

74070 桑螵蛸汤

【方源】《千金翼》卷七。

【异名】桑螵蛸散（《圣惠》卷七十九）。

【组成】桑螵蛸三十枚（炙） 鹿茸（炙） 黄耆各三两 生姜四两 人参 牡蛎（熬） 甘草（炙） 各二两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取二升半，

分三次服。

【主治】①《千金翼》：产后小便数。②《圣济总录》：妊娠小便滑数。

74071 桑螵蛸汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】桑螵蛸（锉，炒） 白术 黄耆（锉） 赤茯苓（去黑皮） 人参各一两 甘草（炙） 半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，入生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓。食前温服。

【主治】痿黄。病人色青，次却色赤，或经下后，头发自落，吃食渐少，吐逆心烦，睡则梦与鬼交，气力虚乏，或食物难消。

【备考】原书治上症，宜灸脐下百壮。得力者肉色渐变，如是小便赤涩，鼻中煤生，齿焦眼黑，不堪医也。若无此候，宜服本方。

74072 桑螵蛸汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】桑螵蛸（炙）三十枚 黄芩（去黑心）二两

【用法】上细锉，用水三盞，煎至二盞，去滓，分温二服，相次顿服。

【主治】小便不通。

74073 桑螵蛸汤

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】桑螵蛸（炙）十枚 牡丹皮半两 白术（米泔浸一宿，锉，炒） 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 牡荆子（炒） 磁石（煨，醋淬七遍） 附子（炮裂，去皮脐） 菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙） 熟干地黄（焙） 各一两 大黄（锉，炒） 细辛（去苗叶） 芎藭 各半两

【用法】上咬咀。每服三钱匕，先以水三盞，煮猪肾一只，取汁一盞，去肾下药，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】虚损耳聋。

74074 桑螵蛸散

【方源】《妇人良方》卷二十三引《千金翼》。

【异名】人参螺蛳散（《胎产心法》卷下）。

【组成】桑螺蛳三十个（炒） 鹿茸（酥炙） 黄耆各三两 牡蛎（煨） 人参 厚朴 赤石脂各二两

【用法】上为末。每服二钱，空心粥饮调下。

【主治】产后小便数，及遗尿。

74075 桑螺蛳散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】桑螺蛳一两（微炒） 赤石脂二两 补骨脂二两（微炒） 狗脊三分 草薢一两（锉） 白龙骨二两 韭子三分（微炒） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 肉苁蓉四两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 兔丝子二两（酒浸三日，曝，别研为末）

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】膀胱虚冷，小便滑数，色如泔淀。

74076 桑螺蛳散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】桑螺蛳（微炒） 韭子（微炒） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别杵为末） 牡蛎（烧为粉） 车前子各一两 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】上为细散，人兔丝子末和匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】伤寒后，虚损乏力，阴萎，夜梦失精。

74077 桑螺蛳散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】桑螺蛳三七枚（微炒） 薯蓣一两 山茱萸一两 黄耆三分（锉） 桂心三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 鹿茸一两半（酒洗，去毛，微炒） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳，小便数，及精气虚冷。

74078 桑螺蛳散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】桑螺蛳半两 地龙半两 乳香半两 麝香一分（细研） 黄丹半两 黄柏半两（锉） 梗米粉一分 膩粉一分

【用法】上为散。每用少许，以不食井水和沙糖调涂。

【主治】一切恶疮。

74079 桑螺蛳散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】桑螺蛳三十枚（微炒） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 黄耆半两（锉） 牡蛎粉一两 甘草二两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，食前生姜汤调下。

【主治】妇人虚冷，小便数者。

74080 桑螺蛳散

《圣惠》卷七十九。为《千金翼》卷七“桑螺蛳汤”之异名。见该条。

74081 桑螺蛳散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】桑螺蛳（切破，炙） 附子（炮裂，去皮脐） 人参 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各半两 熟干地黄（焙） 牡丹皮 白术（锉，炒）各一两 羊肾一对（薄切，去筋膜，炙干）

【用法】上为散。每服一钱匕，加至二钱匕，空心、食前温酒调下，一日三次。

【主治】肾气虚弱，气奔两耳，鸣甚成聋。

74082 桑螺蛳散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】桑螺蛳十枚（烧存二分性） 膩粉一钱 麝香半钱

【用法】上为细散。生油脚调，鸡翎扫，候干，有裂处再扫。

【主治】小儿一切疮癣，痒痛不止。

74083 桑螺蛳散

【方源】《本草衍义》卷十七。

【组成】桑螺蛳 远志 石菖蒲 人参 茯神 当归 龙骨 龟甲（醋炙）各一两

【用法】上为末。每服二钱，夜卧时以人参

汤调下。

【主治】小便数，如稠米泔，色亦白，心神恍惚，瘦瘠食减，或男女虚损，阴萎梦遗。

74084 桑螵蛸散

【方源】《济生》卷九。

【组成】桑螵蛸十二个（炙）

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前米饮调服。

【主治】①《济生》：妊娠小便不禁。②《赤水玄珠》：遗溺。

74085 桑螵蛸散

【方源】《直指》卷十。

【组成】桑螵蛸（蒸过，略焙） 远志（水浸，取肉，晒，姜汁和，焙） 石菖蒲 人参 白茯苓 当归 龙骨（别研） 鳖甲（醋炙黄）各半两 甘草（炙）二钱

【用法】上为末。每服二钱，夜卧时以人参、茯苓煎汤调下。

【主治】心肾不和，小便白浊，或如米泔，或为梦泄。

74086 桑螵蛸散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】桑螵蛸 地龙 贝母 厚黄柏各半两 虢丹（煨） 乳香各一分 梗米粉二钱 雄黄 轻粉各一钱 麝香半钱

【用法】上为细末。以不食井水和沙糖调敷。

【主治】诸恶疮。

74087 桑螵蛸散

【方源】《医学纲目》卷十四。

【异名】桑螵蛸龙骨散（《类证治裁》卷八）。

【组成】桑螵蛸半两（炒） 龙骨一两

【用法】上为细末。每服二钱，空心米饮调下。

【功用】《类证治裁》：缩溺。

【主治】产后小便数及遗尿。

74088 桑螵蛸散

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】桑螵蛸一两（微炒） 韭子二两

（微炒）

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下，晚食前再服。

【主治】虚劳梦泄。

74089 桑螵蛸散

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】桑螵蛸（焙）

【用法】上为末。每服一钱，酒浆调服。

【主治】遗精，漏下不止。

74090 桑螵蛸散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】桑螵蛸三十个 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂各三钱

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】小便数。

74091 桑螵蛸散

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】螵蛸二十枚 人参三两 黄耆三两 鹿茸 牡蛎 赤石脂各二两

【用法】上为末。空心米饮送下。

【主治】产后体虚，腹中宿有冷气，小便数者。

74092 桑螵蛸散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】真桑螵蛸（炒） 白龙骨（煨） 牡蛎（煨）各等分

【用法】上为末。每服三钱，食前水饮调服。

【主治】妇人小便数，及遗尿不禁。

74093 桑木根洗方

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】桑木根五两

【用法】上细锉。以水五升，煎至三升，去滓温洗，一日五七度。

【主治】小儿尿灶火丹，发膝下，从两股起及脐间，走入阴头。

74094 桑丹杞菊汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】桑叶 丹皮 滁菊花 炒杞子 煨天麻 焦山栀 生地 钩藤 橘红

【用法】水煎服。

【主治】妊娠眩晕，名曰子眩，因肝火上升，内风扰动，致昏眩欲厥者。

74095 桑丹泻白汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】霜桑叶三钱 生桑皮四钱 淡竹茹二钱 清炙草六分 粉丹皮一钱半（醋炒） 地骨皮五钱 川贝母三钱（去心） 生梗米三钱 金橘饼一枚（切碎） 大蜜枣一枚（对劈）

【用法】水煎服。

【功用】清肝保肺，蠲痰调中。

【主治】肝火燥肺，咳则胁痛，不能转侧，甚则吐血，或痰中夹有血丝血珠者。

【方论选录】何秀山：本方以桑、丹辛凉泄肝为君；臣以桑皮、地骨皮泻肺中之伏火，竹茹、川贝涤肺中之粘痰；佐以炙草、梗米温润甘淡，缓肝急以和胃气；使以橘、枣微辛甘润，畅肺气以养肺液。此为清肝保肺，蠲痰调中之良方。适用于火郁生热，液郁为痰，痰热上壅，治节不行，而作咳嗽者。

【宜忌】咳由风寒而致者忌用。

74096 桑丹泻白散

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】桑叶 丹皮 桑皮 地骨皮 牛蒡 前胡 杏仁 土贝母 甘草

【主治】痧回热退，舌化脉和，余邪未尽，时时手足心热。

74097 桑丹清毒饮

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】桑叶 连翘 花粉 土贝 丹皮 赤芍 甘菊 生草 黄连 羚羊 茅根

【主治】鬓疽初起，里热者。

74098 桑叶掩耳方

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】桑叶一握 盐一撮

【用法】以桑叶裹盐，炙令热，掩耳上，冷即易之。

【主治】蜈蚣入耳。

74099 桑白分解散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】薏仁二两 泽泻三钱 升麻一钱 天花粉三钱 桑白皮三钱 神曲三钱

【用法】上水煎服。小儿药减半。

【主治】白火丹。

74100 桑白皮根煎

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】桑根白皮酒（方出《千金》卷十八、名见《普济方》卷二三九）、桑根白皮汤（《圣济总录》卷八十六）。

【组成】桑根白皮（东引，切）一升 狼牙三两 茱萸根皮（东行）五两

【用法】上切。以酒三升，煮取一升，平旦服之。

【主治】肺劳热，生肺虫，在肺为病。

74101 桑白皮涂方

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】桑根白皮（生者）

【用法】上捣汁，涂敷螫处。

【主治】蜂螫。

74102 桑皮十味煎

《医林纂要》卷六。即《外台》卷九引《许仁则方》“桑白皮汁十味煎”。见该条。

74103 桑皮杏仁饮

【方源】《温热经解》。

【组成】桑皮一钱 杏泥三钱 五加皮一钱 车前子一钱 大腹皮一钱 陈皮一钱 茯苓皮一钱半 地骨皮一钱半

【用法】水煎服。

【主治】热饮外溢，久咳，面浮肢肿。

74104 桑皮接骨丹

【方源】《吴氏医方汇编》。

【组成】桑根白皮（东引者） 柘桑根皮（向东者） 香油各四两 生姜二两

【用法】先将二皮捣烂，入生姜捣匀，入香油炒微热，将断骨拿对敷上，外以物逼住，以绳缠定，贴一昼夜去之，不可过时，亦不可不及时。

【主治】折伤。

74105 桑耳续断散

《圣济总录》卷一五二。为《圣惠》卷七十三“桑耳散”之异名。见该条。

74106 桑耳塞鼻丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】桑耳

【用法】上药炒焦，捣末。衄发时，以杏仁大塞鼻中。

【主治】衄血。

74107 桑耳羹臛方

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】桑耳不拘多少

【用法】上取作羹臛，调和令美，空腹随饭食之。

【主治】诸痔。

74108 桑防白膏汤

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】桑叶 防风 豆豉 牛蒡 桔梗 前胡 杏仁 土贝 中黄 霍斛 河柳

【主治】痧透喉宽，苔黄尖绛，脉转洪数。

74109 桑苏桂苓汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桑皮三钱 苏子二钱 桂枝八分 茯苓三钱 泽泻一钱半 大腹皮一钱半 橘红一钱 半夏一钱半 杏仁三钱 猪苓一钱

【用法】上加生姜三片煎服。

【主治】支饮。水停心下，入于胸膈，咳逆倚息，短气，其形如肿。

74110 桑杏清肺汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】霜桑叶 瓜蒌皮 蜜炙枇杷叶各三钱 光杏仁 川贝 炒牛蒡各二钱 杜兜铃 桔梗各一钱

【用法】加鲜葱白三枚，淡香豉三钱，水煎服。

【功用】清宣肺气。

【主治】冬温兼寒。即寒包火，首先犯肺之轻证。

74111 桑枝虎杖汤

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】桑枝 15~30 克 虎杖根 9~15 克 金雀根 15~30 克 臭梧桐根 15~30 克 红枣 10 只

【功用】祛风湿，通经络，止疼痛。

【主治】风湿病，四肢麻木，筋骨痠痛。

74112 桑枝秦艽汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】鲜桑枝尖每岁一寸 秦艽三钱 明天麻一钱五分 广皮一钱 当归三钱 川芎一钱 羌活节三节 小桂枝二钱 桔梗二钱 甘草一钱 皂刺二钱

【用法】水煎服。

【主治】肩臂肘痛。

74113 桑桔杏仁煎

【方源】《医级》卷七。

【组成】桑皮 桔梗 杏仁 甘草 栀子

【主治】肺经感邪，郁热化火，或木火刑金，痰中见血。

74114 桑根白皮丸

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】桑根白皮（炙，锉） 山栀子（去皮壳） 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 羌活（去芦头） 防风（去叉） 当归（切，焙） 诃黎勒（煨，去核） 胡黄连各一分 地骨皮 人参 白茯苓（去皮） 柴胡（去芦头） 各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前温酒送下。

【主治】鼻衄久不止。

74115 桑根白皮汤

【方源】《医心方》卷十引张仲景方。

【异名】桑根白皮饮（《普济方》卷一九二）。

【组成】桑根白皮（切）二升 桂一尺 生姜三颗 人参一两

【用法】上切。以水三斗，煮取桑根得一斗，绞去滓，纳人参、桂、生姜、黄芩十两煮之，得七升。每服一升，消息更服。

【主治】脾胃水，面目手足跗肿，胃管坚大满，短气，不能动摇。

74116 桑根白皮汤

【方源】方出《外台》卷十一引《肘后方》，名见《普济方》卷一七七。

【异名】桑根汤（《千金翼》卷十九）。

【组成】桑根白皮（新掘入地三尺者，炙令黄黑色，切）

【用法】上以水煮令浓，随意饮之。亦可纳少量粟米，勿与盐。

【主治】①《外台》引《肘后方》：卒消渴，小便多，日饮水一斛。②《圣济总录》：消渴后，心肺气独盛，结成痼疽。

【备考】《圣济总录》本方用法：桑根白皮（锉，炒）半斤，为粗末，每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服，一日二次。

74117 桑根白皮汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】桑根白皮半两 干姜二两 桂心五寸 大枣二十枚

【用法】上咬咀。以酒一斗，煮取三升，去滓分三服。适衣，勿令汗出。

【主治】妇人伤丈夫，苦头痛，欲呕，心闷。

74118 桑根白皮汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《圣济总录》卷七十九。

【组成】桑白皮 谷白皮 泽漆叶各三升 大豆五升 防己 射干 白术各四两

【用法】上咬咀。以水一斗五升，煮取六升，去滓，内好酒三升，更煮取五升。白昼二服，夜一服，余者明日再服。

【主治】膀胱石水，四肢瘦，腹肿。

74119 桑根白皮汤

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《普济方》卷二一四。

【组成】桑根白皮一两（锉） 木通一两（锉） 百合一两 白茅根一两（锉） 鸡苏一两 赤芍药一两

【用法】上为散，每服四钱，以水一中盞，

煎至六分，去滓。食前温服。

【主治】①《圣惠》：气淋，腹胁胀满，脐下气结，小肠疼痛。②《普济方》：脐下血结，小便疼痛。

74120 桑根白皮汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】桑根白皮（锉）三分 羚羊角（镑）半两 漏芦（去芦头） 茯神（去木） 败酱 木通（锉） 芎藭各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，入生地黄汁半盞，更煎令沸。空心、日午、临卧温服。

【主治】风腰脚不遂，或痛或痒，肿硬如石，胫中少力；及指间生疮，有黄水自出不止。

74121 桑根白皮汤

《圣济总录》卷六十六。为《圣惠》卷四十六“桑根白皮散”之异名。见该条。

74122 桑根白皮汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷七十一。即原书人卫本卷七十一“桑白皮汤”。见该条。

74123 桑根白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】桑根白皮（锉）四两 葶苈（纸上炒） 泽漆茎叶 郁李仁（汤浸，去皮尖）各二两 杏仁一百枚（去皮尖双仁） 赤茯苓（去黑皮）三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，生姜一枣大（切），煎至八分，去滓，温服。以小便利为度。

【主治】水气肿满，气急喘嗽，小便赤涩。

74124 桑根白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】桑根白皮（锉）三分 防风（去叉） 升麻各半两 犀角（镑）一分 芍药半两 槟榔（锉）二枚 淡竹沥不拘多少

【用法】上除竹沥外，共为粗末，每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，入竹沥半合，再煎沸，去滓，空腹时温服，一日二次。

【主治】湿毒风，脚气瘴气，四肢痛痹，疼

痛不仁。

74125 桑根白皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】桑根白皮一两 槟榔五枚（锉）黑豆半升 生姜（洗，切，焙）半两

【用法】上为粗末，每服五钱匕，水一盞半，煎取一盞，去滓，温服，不拘时候。

【主治】湿毒脚气，肿满，小便少。

74126 桑根白皮汤

《圣济总录》卷八十六。为《外台》卷十六引《删繁方》“桑白皮根煎”之异名。见该条。

74127 桑根白皮汤

《圣济总录》卷九十九。为《圣惠》卷四十三“桑白皮散”之异名。见该条。

74128 桑根白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】桑根白皮（细锉）二两

【用法】上为粗末，分三服，每服三钱匕，用水一盞半，煎至八分，去滓，空腹顿服。

【主治】腹中虫多，大便见虫。

74129 桑根白皮汤

【方源】《普济方》卷一六一。

【组成】桑根白皮 草豆蔻（去皮）三枚 天雄（炮裂，去皮脐） 瞿麦穗 苍术（去皮） 木通 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 黄连（去须）各一两 大腹皮 射干 牵牛子（炒）各一两半 桃仁（去皮尖双仁，炒）二十枚 郁李仁（去皮尖）三分 吴茱萸（炒）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盞半，入生姜七片，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】三焦咳嗽。面目虚浮，不得安卧，饮盛食减。

74130 桑根白皮汤

《普济方》卷一七九。为《圣济总录》卷五十九“桑根皮汤”之异名。见该条。

74131 桑根白皮汤

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】桑皮 款冬花 五味子 杏仁（去皮尖双仁，炒） 当归 人参 甜葶苈 防己各一两

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，煎七分，去滓服，不拘时候。

【主治】产后上气，虚喘咳逆。

74132 桑根白皮饮

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】桑根白皮（锉） 木通（锉） 桔梗（锉，炒） 紫苏各一两半 槟榔二枚（锉） 款冬花 郁李仁（炒，去皮，研）各一两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】虚劳上气，咳嗽喘息不得卧。

74133 桑根白皮饮

《普济方》卷一九二。为《医心方》卷十引张仲景方“桑根白皮汤”之异名。见该条。

74134 桑根白皮酒

方出《千金》卷十八，名见《普济方》卷二三九。为《外台》卷十六引《删繁方》“桑白皮根煎”之异名。见该条。

74135 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】桑根白皮一两（锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 赤茯苓一两 前胡一两（去芦头） 大腹皮三分 白术半两 木香半两 甘草一分（炙微赤，锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】肺脏痰毒壅滞，心胸满闷，肩背烦疼，不欲饮食。

74136 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】桑根白皮一两（锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 葵子一两 滑石二两半 川芒消二两 黄芩一两 甘草一两（炙

微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。以通利为度。

【主治】伤寒，小便赤涩不通。

74137 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】桑根白皮（锉） 木通（锉） 犀角屑 黄芩 旋覆花 茯神 玄参 川大黄（锉碎，微炒）各一两 甘菊花半两 甘草（炙微赤，锉）一分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。以愈为度。

【主治】眼忽然白睛肿胀，如水泡者。

74138 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】桑根白皮一两（锉） 升麻一两半 甘草一两（炙微赤，锉） 木通一两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 石膏三两 葛根三两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺脏积热，皮肤干燥，鼻痛无涕，头痛心闷。

74139 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】桑根白皮一两（锉） 大腹皮一两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 甘草三分（炙微赤，锉） 桂心三分 赤茯苓一两 木通一两（锉） 紫苏子二两（微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓。温服，不拘时候。

【主治】上气，心胸满塞，不下食。

74140 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】桑根白皮一两（锉） 酸枣仁一两（微炒） 薏苡仁一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】腰脚疼痛，筋脉挛急，不得屈伸，坐卧皆难。

74141 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】桑根白皮一两（锉） 泽泻半两 汉防己半两 木香半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 槟榔一两 赤茯苓一两 赤芍药半两 桂心半两 川大黄一两半（锉碎，微炒） 紫苏茎叶一两 木通三分（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】湿脚气，肿满喘息，大小便不利。

74142 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】桑根白皮一两（锉） 射干三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 赤茯苓一两 贝母三分（煨微黄） 白前三分 生干地黄一两半 柴胡一两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药三分 天门冬三分（去心） 百合三分 槟榔三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】脚气上气，坐卧不得，咽喉不利，四肢烦疼。

【备考】本方方名，《普济方》引作“桑白皮散”。

74143 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】桑根白皮一两（锉） 槟榔一两半 木香半两 青橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 川大黄一两（锉碎，微炒） 牵牛子二两（微炒） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，暖生姜汁、童便调下，不拘时候，以利为度。

【主治】脚气。心腹胀满，壅闷喘急。

74144 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】桑根白皮汤（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】桑根白皮一两（锉） 柴胡一两（去苗） 大腹皮三分（锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤芍药一两 赤茯苓一两 黄耆一两（锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬三分（去心） 牛蒡子一两（微炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，面目浮肿，或四肢肿，气促不得眠卧。

74145 桑根白皮散

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九二。

【组成】桑根白皮一两（锉） 大腹皮一两（锉） 汉防己一两 泽漆二两 赤茯苓二两 紫苏茎叶一两

【用法】上为散。每服四钱，以酒一大盏，入炒熟黑豆五十粒，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】石水，四肢瘦，腹大，胸中满闷，食即喘急。

74146 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】桑根白皮一两（煨令微黄） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓一两 甘遂一两（煨令微黄） 泽泻一两 黄芩半两 赤小豆一升（以水五升，煮取汁一升）

【用法】上为粗散。每服三钱，以小豆汁一中盏，煎至六分，去滓，五更初温服，如人行十里，当利；如未利，即再服。

【主治】皮水。头面四肢浮肿，心胸不利，喘息烦闷，大小便涩。

74147 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】桑根白皮一两（锉） 羚羊角屑三分 漏芦三分 败酱一两 茯神一分 木通一两（锉） 芎藭三分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，更煎一两沸，量儿大小，以意分减服之。

【主治】小儿中风，四肢筋脉拘挛。

74148 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】桑根白皮半两（锉） 海蛤一分 汉防己一分 赤茯苓一分 白术一分 甜葶苈一分（隔纸炒令黄色） 川朴消一两 猪苓一分（去黑皮）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，温服，一日三四次，量儿大小，加减服之。

【主治】小儿水气肿满，上气喘促，小便赤涩，大便稍难。

74149 桑根白皮散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】桑根白皮半两（锉） 射干半两 赤茯苓半两 黄芩半两 木通半两（锉） 泽漆半两 泽泻半两 汉防己半两

【用法】上为细散。每服半钱，煮赤小豆汤调下，一日三四次。

【主治】小儿水气，遍身肿满，喘促，小便不利。

74150 桑根白皮散

《普济方》卷二十七。为《圣惠》卷六“桑白皮散”之异名。见该条。

74151 桑根白皮散

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】桑根白皮（锉） 白前 麦门冬（去心）各一两半 木通 川大黄（锉碎，炒微黄）各一两 旋覆花 甘草（炙微赤，

铍)各半两 川朴消三分

【用法】上为粗末，每服四钱，水一中盏，煎六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】伤寒，肺热咳嗽，涕唾稠粘，背拘急，口干头痛，大小便秘涩。

74152 桑菊葱豉饮

【方源】《集成良方三百种》卷中。

【组成】冬桑叶三钱 菊花三钱 淡豆豉一钱半 葱白三寸

【用法】水煎服。

【主治】温症初起。

74153 桑菊感冒片

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】桑叶八百两 菊花三百二十两 连翘四百八十两 桔梗六百四十两 杏仁六百四十两 芦根六百四十两 甘草二百五十六两 薄荷冰一两二钱八分

【用法】取桔梗五百一十二两，轧为细粉。取桔梗粗末与桑叶、菊花七倍量，用60%乙醇按渗漉法提取，浓缩稠膏约三百二十两。将杏仁压榨去油，取杏仁饼约三百五十两，用85%以上乙醇加热回流提取二次，浓缩膏约九十六两。取连翘、芦根用提取法提取二次，合并浓缩稠膏约二百二十四两。粗提甘草酸，混合，制粒，压片。每服四至八片，温开水送服，一日二次。

【功用】散温解表，清热止咳。

【主治】感冒风寒，发热头痛，咳嗽口渴，咽喉疼痛。

74154 桑菊愈风汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】桑叶三钱 杭菊三钱 蔓荆子一钱半 当归一钱半 桔梗一钱 枳壳一钱 川贝二钱 杏仁三钱 川芎八分

【用法】加黑芝麻一撮，煎服。

【主治】风邪伤脑，鼻窍不通，时流清涕。

74155 桑寄生饮子

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】桑寄生三分 木通三分 生干地

黄三分 白术三分 诃黎勒皮二分 赤茯苓三分 当归三分(铍微炒) 芎藭三分

【用法】上细铍，和匀。每服半两，以水一大盏，入葱白七寸，豉五十粒，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】妊娠五六月，心腹胀满，口干，腹中疔刺疼痛不止。

74156 桑椹河车丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】河车二具(酒净，焙干) 鹿茸一对(酥炙) 黑驴肾(连腰子肾子，切片，酥炙) 四具 黄狗肾(连腰子肾子，酒煮焙干) 十具 熟地(九蒸晒) 枸杞(酒蒸) 生首乌各八两 巴戟天(酒蒸) 破故纸(合桃拌炒) 山药(盐水炒) 萸肉 骨碎补(炒) 鱼鳔(蛤粉炒) 五味子 菟丝子(酒煮) 仙茅(米泔浸三次，去皮) 肉苁蓉(去鳞肠) 锁阳 茯苓各四两 人参二两

【用法】上为末，桑椹熬膏，加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，空心清汤送下。

【功用】补虚。

74157 桑白皮八味散

《外台》卷二十九引《许仁则方》。为原书同卷“桑白皮散”之异名。见该条。

74158 桑白皮沐头方

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】桑白皮二升(细切)

【用法】上以水淹渍，煮五六沸，去滓，洗沐鬓发，数数为之。

【功用】安发生发润发。

【主治】脉极虚寒，鬓发堕落。

74159 桑枝酸枣仁煎

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】酸枣仁三两(一半炒令香熟，一半生用) 羚羊角屑一两 海桐皮二两(铍) 羌活二两 仙灵脾一两 赤箭一两 草薢一两(铍) 杜仲一两(去粗皮，炙令微黄，铍) 虎胥骨一两半(涂酥炙令黄) 防风

一两(去芦头) 石斛一两半(去根, 锉) 牛膝一两(去苗) 巴戟一两 附子一两(炮裂, 去皮脐) 木香一两 生干地黄一两 蜜四两 真酥一两 桑枝一握(长一尺, 锉)

【用法】上除酥蜜桑枝外, 共为散, 用清酒七升, 先煎桑枝, 令色微黄, 去桑枝后下药末, 更煎一二十沸, 次下酥蜜, 煎成膏, 看稀稠得所, 以瓷合盛。每服一茶匙, 食前以温酒调下。

【主治】筋极。身体拘急, 四肢疼痛, 行立不得。

74160 桑螵蛸龙骨散

《类证治裁》卷八。为《医学纲目》卷十四“桑螵蛸散”之异名。见该条。

74161 桑螵蛸酒调散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】当归 甘草 大黄 赤芍药 菊花 苍术 桑螵蛸 羌活 麻黄 茺蔚子各等分

【用法】上用水煎, 食后加酒温服; 或为末, 每服三钱, 温酒调下。

【主治】眼红痛, 有血翳, 壅肿。

【加减】如热甚, 加大黄、朴消。

74162 桑贝芎归清肺汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】前胡 紫菀 贝母(去心) 桑白皮 茯苓 当归 川芎 干姜 紫苏各一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后咳嗽。

74163 桑白皮汁十味煎

【方源】《外台》卷九引《许仁则方》。

【组成】桑白(切)一升 地骨皮(切)三升(二味用水七升熟煎, 取三升汁, 去滓澄清) 生地黄汁五升 生麦门冬汁二升 生姜汁一升 竹沥三升 生葛根汁三升 白蜜一升 牛酥三合 大枣膏一升

【用法】上取生地黄汁以下, 生葛根汁以上, 于微火上煎减半, 内桑白皮等二物汁和煎之, 三分减一, 内酥蜜枣膏, 搅之勿停

手, 得如稠饴状, 置别器中收贮。每取胡桃大, 于临卧时含之, 细细咽津, 稍加至鸡子大。昼间服之亦得。

【主治】咳嗽经久, 将成肺痿, 昼夜咳嗽不断, 唾白如雪, 细末粘稠, 喘息气上, 乍寒乍热, 发作有时, 唇口喉舌干焦, 亦或唾血, 渐觉瘦悴, 小便赤, 颜色青白, 毛耸者。

【宜忌】忌茺萸。

【方论选录】《医林纂要》: 桑白皮甘酸微辛, 补肺泻火, 肃敛清气; 麦冬、地骨皮补肺清金, 下滋肾水; 生地大滋肾水, 以靖君相之火; 葛根清提胃气, 以解膈中之热; 竹沥升散阴中之火, 祛除经络之痰; 白蜜润肺止咳, 枣肉补土生金, 牛酥滋阴润肺, 养血止咳。方皆寒凉之味, 非辛莫化, 故以生姜行痰, 并以调剂, 亦反佐也。

【备考】本方方名, 《医林纂要》引作“桑皮十味煎”。

74164 桑根白皮六味丸

【方源】《外台》卷十九引《许仁则方》。

【组成】桑根白皮五两 生姜屑六两 蜀椒(汗) 桂心 升麻 五味子各四两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 稍加至三十丸, 觉热食前服, 觉冷食后服, 以饮下之, 一日二次。

【主治】脚气。

【备考】本方原名桑根白皮十味丸, 与组成用药数不符, 据《普济方》改。方中蜀椒、桂心用量原缺, 据《普济方》补。

通

74165 通云散

《普济方》卷三六四。为方出《阎氏小儿方论》, 名见《卫生总微》卷十八“桃红散”之异名。见该条。

74166 通天散

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】赤芍药 川芎 黄连 黄芩 玄胡索 草乌头 当归 乳香(别研) 各等分

【用法】上为细末。以纸捻子蘸药，搐鼻。

【功用】通一切壅滞，明目。

【主治】偏正头痛，并夹脑风。

74167 通天散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】人参 陈皮 桂枝各八分 川芎 熟地 芍药各一钱 当归 紫草各一钱半 红花 木香各三分 甘草六分 知母八分 荔枝壳十个

【用法】上用鸡汁一钟、枣三枚、糯米一撮，水煎服。初服痘出到颈，再服到脐，三服到脚。

【主治】小儿患痘发热不出，或已出而色不红活者。

74168 通天散

【方源】《回春》卷七。

【组成】芒消五钱 雄黄三钱

【用法】上为细末。吹入鼻中。两鼻内流水，双目流泪，即效。

【主治】赤眼暴发，肿痛。

74169 通天散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】大黄 独生皂角各一两（俱生）

【用法】上为细末。每服二钱，临卧时以冷酒调下。

【主治】大风疾，遍身隐疹瘙痒，麻木在下者。

74170 通天膏

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】大枫子四斤 川胡麻 蓖麻子 土木鳖 杏仁 山棘各二两 芝麻四合

【用法】上捣烂，入瓶内筑实，以柳枝三四根插着瓶底，掘地潭，埋一大罐，外以水灌泥潭，将药瓶合在罐上，以炭火烤约三炷香，燂油下溜。外涂。

【主治】大风疔疮痒痛，干烂疥癣。

74171 通中丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】川大黄一两（铤，微炒） 巴豆霜

二分 皂荚一两（不蛀者，去皮子，烧令焦黑）

【用法】大黄、皂荚为末，入巴豆霜同研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。四五岁儿，每服三丸，温水送下。

【主治】小儿大便不通，心腹疼痛，卧即烦躁。

74172 通中散

【方源】方出《圣惠》卷五，名见《普济方》卷二十一。

【组成】萝卜子（拣子好者）五两（炒令熟，捣细，罗取末一两，余有油者别研如膏） 沉香一分 白术一分 草豆蔻一分（去皮）

【用法】上为散，入前萝卜子末，再入白砂糖一钱半，同研令匀。每服一钱，细嚼，后以米饮送下。萝卜子膏，别入草豆蔻末一分，白砂糖三分，拌令匀，每服半枣大，细嚼，米饮送下，不拘时候。

【主治】脾气虚，心腹胀满，胸膈不利，少思饮食。

74173 通中散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】牵牛子一两半（微炒） 槟榔三分 桂心一分 干姜一分（炮裂，铤） 木香一分

【用法】上为细散。每服二钱，空腹热酒调下，可二服续之，并饮热茶一二盏。得利下恶物为效。

【主治】五膈气，胸中不利，脏腑壅滞。

74174 通中散

《圣惠》卷九十五。为原书同卷“红雪”之异名。见该条。

74175 通中散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】神曲

【用法】上为末。每服三二钱，白汤调下。

【主治】过食糯米，心脾大痛。

74176 通化汤

【方源】《千家妙方》引高乐众方。

【组成】石菖蒲 10 克 连翘 10 克 竹茹 10 克 薄荷 10 克 橘红 10 克 黄连 8 克 桔梗 8 克 僵蚕 10 克 甘草 10 克 蜈蚣 3 条 (研碎冲服) 全蝎 3 克 (研碎冲服)

【用法】水煎服, 每日一剂。

【功用】凉肝清心, 祛风消痰。

【主治】脑外伤后综合征, 辨证属肝郁风动, 心火炽盛, 风火痰扰者。

【临证举例】脑外伤后综合征 《千家妙方》: 刘某某, 女, 22 岁, 于 1976 年 5 月 4 日来诊。患者语謇, 其父代述病情, 称其女于春季大队建房当小工, 坠砖击头而晕倒, 经抢救回苏后即言语不清, 头晕目眩, 时如昏迷, 四肢痿软, 握物无力, 行路蹒跚, 三五步即摇摇欲跌, 曾转治几个医院, 皆诊为脑外伤后综合征, 治疗四个月, 未见好转。检查: 体弱神疲, 坐须人扶, 面红目赤, 问而不答, 痴呆之象。脉细弦数, 治用通化汤加川芎 10 克, 水煎服。共服 20 剂, 症除病愈。随访一年, 疗效稳固。

74177 通气丸

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】胶饴五斤 蜀椒二升 (汗) 乌头七分 (炮) 桂心六分 大附子五枚 (炮) 干姜 人参各四分 杏仁一升 天门冬十分 蜈蚣五节 (去头, 炙)

【用法】上为末, 捣杏仁为膏, 纳药末于膏中捣干下, 烱胶饴, 搅令调和为丸, 如半枣大。每服一枚, 昼日六七、夜二三服。令胸中温为度。

【主治】咳嗽上气, 喉咽中腥臭, 虚气搅心, 头痛眼疼, 耳中嘈嘈, 风邪毒注天行, 食不生肌, 胸中膈塞, 呕逆多唾, 恶心, 心下坚满, 饮多食少, 疔疮并淋。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、鲤鱼等物。

【加减】梦与鬼神交通及饮食者, 全用蜈蚣; 食不消者, 加杏仁五合; 有虚气, 少腹急, 腰痛, 加天门冬、杜仲; 有风, 加乌头二枚、附子一枚 (立夏后勿加); 有留饮, 加葶苈子一两 (熬, 末之)。

【方论选录】《千金方衍义》: 《金匱》大建中汤专取蜀椒下气止逆, 干姜温中破积, 人参补正除邪, 胶饴润肺止嗽, 以治胸腹寒积, 出见有头足, 上下痛不可触。《千金》加乌、附、桂心以攻毒破结, 杏仁泄肺散满, 蜈蚣截风解毒, 天门冬除咳逆寒热, 并制乌、附、椒、姜之燥烈也。

74178 通气丸

《圣济总录》卷一二五。为《外台》卷二十三引《广济方》“昆布丸”之异名。见该条。

74179 通气丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】木通 (锉) 射干 杏仁 (汤浸, 去皮尖双仁, 炒) 恶实 (微炒) 昆布 (洗去咸, 焙) 诃黎勒 (煨, 去核) 海藻 (洗去咸, 焙) 黄耆 (锉) 各一两 白茯苓 (去黑皮) 三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。每日早、晚各含化一丸。

【主治】瘰气, 咽喉肿塞, 毒气壅闷不通。

74180 通气丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】丁香皮 黑牵牛各五两 京三棱 (炮, 切) 蓬莪术 (炮, 切) 青橘皮 (去白) 陈橘皮 (去白) 白术 益智仁各二两 茴香 (炒) 萝卜子 (炒) 缩砂仁 枳壳 (去瓢, 麸炒) 各一两

【用法】上为细末, 面糊为丸, 如梧桐子大。每服二十至三十丸, 食后萝卜汤送下。

【功用】宽中导气。

【主治】噎塞满闷, 腹胁胀急, 小肠气痛。

74181 通气丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】附子 (大者) 一只 (生, 去皮脐, 切薄片) 大蒜头五枚 (剥去皮苗, 捶令碎) 赤小豆五两 (拣净。以上三味放于砂锅内, 加水三升煮, 渐添至五升, 慢火煮干为度, 只取附子焙干为末, 余药不用) 白花商陆根半两 南木香 沉香二钱 (不见

火) 车前子

【用法】上同附子为细末,用薏苡仁末水煮作糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,空心、食前以薏苡仁煎汤送下,一日二至三次,病重者一日五次。

【主治】脾肾气虚,肾水流溢,四肢作肿,面目虚浮,腰脚肿胀,游走不定,小便赤涩,大便秘结,胀满气痞,脚膝无力,食少倦怠,渐成水肿。

【备考】方中南木香、车前子用量原缺。

74182 通气丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】海藻 海带 昆布 木通 甘草 各一两 诃子 薄荷各半两 杏仁少许(汤浸,去皮尖)

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每夜嚙化一丸。

【主治】瘰癧。

【宜忌】忌食油腻物。

【备考】《准绳·疡医》有夏枯草,无甘草。

74183 通气丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】海藻 海带 昆布 泽泻 木通 猪脂 羊脂各五枚 海蛤 连翘

【用法】上为细末,研脂为丸,如鸡头子大。每服一丸,临卧嚙化咽下。

【主治】瘰癧。

【备考】方中海藻、海带、昆布、泽泻、木通、海蛤、连翘用量原缺。

74184 通气丸

【方源】《普济方》卷一四七。

【组成】葫芦巴一两(炒) 补骨脂七钱半 玄参五钱 杜仲一两(炒断丝) 川楝子一两半(酒浸) 三棱五钱 羌活 茴香各五钱 麻黄(去节)二钱(春夏三钱)

【用法】上为细末,面糊为丸。每服五十至七十丸,空心姜汤或盐酒任下。

【主治】少阴不足,肾气微少,忽为寒热,太阳下陷肾中,肾气奔迫,内动三焦,或发

热头疼,咳嗽痰促,或右胁牵痛,或传为疹子,其脉左尺沉而弦,按之则虚大而涩。又治上气。

74185 通气丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】甘草 甘遂各五分 麝香一分

【用法】上为末。入葱管内,塞耳中。

【主治】气闭耳聋。

74186 通气丸

《仙拈集》卷二。为方出《千金》卷六,名见《三因》卷十六“通草散”之异名。见该条。

74187 通气丹

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】儿茶三钱 苏叶一钱 雄黄一钱 轻粉五分 冰片一分 锅脐烟五分 细辛三分

【用法】上各为细末。吹入鼻孔中,一日三次。数日即愈。

【主治】鼻疳。鼻内生疮,痒时难忍,欲忍而不能,言语糊涂,声音闭塞。

74188 通气汤

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】半夏八两(洗) 生姜六两 桂心三两 大枣三十枚

【用法】上切。以水八升,煮取三升,每服五合,日三夜一服。

【主治】①《外台》引《深师方》:胸满气噎。②《普济方》:膈气,咽喉噎塞,胸膈填满,不思饮食。

【宜忌】忌羊肉、饧、生葱。

【方论选录】《千金方衍义》:通气者,解散胸中逆满之痰,以通噎塞之气也。姜、半所以豁痰,桂心所以开结,大枣以布脾胃之津气也。

【备考】《御药院方》有吴茱萸。

74189 通气汤

【方源】《千金》卷十三。

【异名】通气散(《圣惠》卷四十二)。

【组成】半夏八两 生姜六两 橘皮三两

吴茱萸四十枚 (一方有桂二两, 无橘皮)

【用法】上咬咀。以水八升, 煮取三升, 分三服。

【主治】胸痹。胸满, 短气噎塞。

74190 通气汤

【方源】《外台》卷八引《广济方》。

【异名】半夏通气散 (《施圆端效方》引《简要济众方》, 见《医方类聚》卷八十九)。

【组成】半夏 (洗) 生姜各六两 橘皮桂心各三两 (切)

【用法】上切。以水八升, 煮取二升五合, 绞去滓, 分温三服, 服后相去如人行六七里再服。

【主治】胸胁气满, 每食气噎。

【宜忌】忌羊肉、生葱、杨等。

74191 通气汤

【方源】《丹溪心法附余》卷十引《应验方》。

【组成】牵牛 (头末) 一两 (半生半熟) 鼠粘子二钱半 防风一钱七分半 枳壳一钱二分半 (炒) 甘草一钱二分半 (生用)

【用法】上为细末。每服三钱, 沸汤点服。

【主治】喉痹疼痛, 闭塞不通气, 水浆不下, 痰涎壅盛。

74192 通气汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】藁芩 连皮大腹 (锉) 各一两 沉香 (锉) 草豆蔻 (去皮) 木香 干姜 (炮) 诃黎勒 (去核) 甘草 (炙, 锉) 青橘皮 (去白, 焙, 炒) 桂 (去粗皮) 枳壳 (去瓤, 麸炒) 桃仁 (去皮尖双仁, 炒黄) 槟榔 (锉) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】气上逆, 胸膈痞塞, 饮食不下, 及积气心腹胀满, 大肠虚秘。

74193 通气汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】犀角 (镑) 半两 射干 桔梗 (炒) 马蔺 (切) 各三分 甘草 (炙, 锉)

半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 入竹叶七片, 煎至七分, 去滓, 下马牙消一钱匕, 搅匀, 细细温呷。

【主治】喉痹。咽喉气膈, 胸满, 咽肿生脓。

74194 通气汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】羌活 独活 防风 葛根 升麻各三钱 川芎一钱 苍术 炙草各三钱 黄耆四钱 白芷一钱 黄连 黄柏

【主治】酒渣鼻、鼾鼻息肉, 鼻渊由于寒邪所伤者。

【备考】方中黄连、黄柏用量原缺。

74195 通气汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】柴胡一钱 石菖蒲 知母 黄柏 (酒浸) 白芷各七分 防风 羌活各六分 乌药七分 枳壳 甘草各五分 干生姜三分 全蝎 (炒) 三枚

【用法】上咬咀。水煎至八分, 食前热服。

【主治】风气上壅, 耳聋, 或气定而聪者。

74196 通气汤

《杏苑》卷六。为《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》“秘传通气散”之异名。见该条。

74197 通气汤

【方源】《医灯续焰》卷十八。

【组成】羌活 独活 苍术 防风 升麻 葛根各六分 白芷 甘草 川椒各二分

【用法】加生姜、大枣、葱白, 水煎服。

【主治】鼻塞不闻香臭。

【加减】冬月, 加麻黄二分。

74198 通气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】木通 瓜蒌子各五钱 忍冬花粉 甘草各三钱 贝母 紫苏叶各二钱

【用法】以水二大钟, 煎至八分, 空腹服; 渣再煎至七分服。

【主治】横痃初起, 或两髀俱肿作痛, 肉木坚实者。

74199 通气饮

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】桔梗二钱 紫菀二钱 白术五钱 茯苓五钱 甘草三分 茵陈三钱 益智仁三粒 贝母二钱

【用法】水煎服。

【功用】宣通肺气，健运脾胃。

【主治】肺失清肃之令，膀胱气化不利，湿热壅盛，致为肺疽，鼻塞不通，头面俱黄，口淡咽干，小便不利。

74200 通气饮

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】甘菊 幽兰（即兰花） 木香 归尾 川芎 红花 山楂 通草 藿香 桔梗 前胡 陈皮 荆芥 玄参 连翘 丹参

【主治】痘疮发胖时，触冒作痒。

74201 通气散

《圣惠》卷四十二。为《千金》卷十三“通气汤”之异名。见该条。

74202 通气散

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】郁李仁（去皮，研）半两 木香一分 槟榔（锉）三枚 大黄（锉）一两 芍药半两 细辛（去苗叶）一分 人参半两 山芋 桂（去粗皮）各一两 甘草（炙，锉） 牡丹皮各一分

【用法】上除郁李仁别研外，并为散，和匀。每服一钱匕，空心温酒调下。

【主治】聤耳。

74203 通气散

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】青橘皮（汤浸，去白，焙） 木香 槟榔各一分

【用法】上锉细，用巴豆三十粒同炒令赤色为度，去巴豆，捣三药为细散。每服半钱匕，煎紫苏、木瓜汤调下。

【主治】小儿腹胀。

74204 通气散

【方源】《幼幼新书》卷三十九引张涣方。

【组成】象牙（烧） 鹅羽（烧）各一钱 磁石皂子大（烧）

【用法】上为细末。每服半钱，新汲水调下。

【主治】误吞铜钱物及钩绳之类，哽于咽喉。

74205 通气散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍 杜仲 阿胶 茴香 川断 补骨脂 山药 橘核 防风 独活 香附 甘草 葱白 草薢

【主治】妇人妊娠，劳伤损动，风邪寒气乘之，腰腹痛上连肩背，痛而不止则伤胎易堕。

74206 通气散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】破故纸不拘多少（瓦上炒令香熟）

【用法】上为末。空心先嚼胡桃肉半个，再服药二钱，温酒调下。

【主治】①《妇人良方》：妊娠腰痛，状不可忍。②《景岳全书》：妇人肾虚腰痛。

74207 通气散

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】穿山甲（锉细，用蛤粉炒胀，去粉）二两 白牵牛一两（炒） 玄胡索（去皮）一两 陈皮（去白，净）一两（炒） 木香一两半（不见火） 舶上硫黄二两（炒） 厚朴（去皮）一两 甘草一两（炙） 黑牵牛半两（炒）

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下，病在上者食后服，病在下者食前服。

【主治】小肠疝气，腰腹牵引疼痛，感风寒或劳损腰痛，妇人吹乳，心气脾痛，疮疖不拘溃否等。

74208 通气散

【方源】《外科精义》卷下。

【异名】通圣散（《医统》卷八十一）。

【组成】玄胡一两五钱 猪牙皂角 川芎各一两 藜芦五钱 羊蹄躑花二钱五分

【用法】上为细末。用纸捻蘸少许入鼻内。取嚏为效。

【主治】时气头面赤肿，或咽喉闭塞不通；亦预防时气传染。

【备考】方中玄胡，《外科枢要》作玄参，《医统》作玄明粉。

74209 通气散

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】防风 藁本 独活 羌活 黄芩 黄连 人参 黄耆

【主治】风热乘肺，脉洪大，肩背痛，颊颌肿，颈肩膊肘臂外后腋痛，汗出，小便数而欠者。

【备考】《医部全录》本方用量：防风、藁本、羌活、独活各八分，黄芩、黄连各一钱；无人参、黄耆；用法作咬咀，水煎服。

74210 通气散

【方源】《普济方》卷五十三。

【组成】茴香 木香 全蝎 陈皮 玄胡各一钱 穿山甲(炮)二钱 羌活 僵蚕 川芎各半钱 蝉蜕半钱 菖蒲一钱 甘草一钱半

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调下。

【主治】耳聋，气闭不通。

74211 通气散

【方源】《普济方》卷五十四。

【异名】通圣散（《景岳全书》卷六十）。

【组成】穿山甲(炮) 蜈蚣各五两 麝香一钱

【用法】上以葱涎和捣，塞耳中；或为细末，每用少许，以葱管盛药放耳中。同时以追风散搐鼻。

【主治】久聋，诸药不效。

74212 通气散

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】陈皮一斤(去蒂) 阿胶四两(炒) 甘草四两

【用法】上咬咀。每服半两，用水二盏，煎至八分，去滓温服。

【主治】诸肿毒初发。

74213 通气散

【方源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】陈皮 苏叶 枳壳(面炒) 木通各一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：虚人忧怒，以致伤肺与大肠，不能传送，大便秘结。②《济阴纲目》：产后大小便不通。

74214 通气散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】木通 木香 枳壳 菖蒲各五钱 川芎 柴胡 陈皮各二钱 白芷 羌活 僵蚕(炒) 全蝎 蝉蜕各二钱 甘草一钱半 川山甲(炮)三钱

【用法】上为末。每服三钱，酒调下。

【主治】气闭耳聋。

【备考】《济阳纲目》有延胡索，无柴胡。

74215 通气散

《外科启玄》卷十一。为《仙传外科集验方》“荣卫返魂汤”之异名。见该条。

74216 通气散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】玄参一钱半 猪牙皂角 川芎各一钱 北细辛 藜芦 草乌头 羊蹄躑花

【用法】上为末。用纸捻蘸少许，人鼻内取嚏为度，一日二次。

【主治】时毒焮肿，咽喉不利。

【备考】方中细辛、藜芦、草乌头、羊蹄躑花用量原缺。

74217 通气散

【方源】《诚书》卷七。

【组成】茴香 石菖蒲 人参 延胡索 陈皮 木香各一钱 羌活 僵蚕 川芎 蝉蜕各五钱 穿山甲二钱 甘草一钱半

【用法】上为末。酒调服。

【主治】暴怒气闭，耳部肿胀。

74218 通气散

《金鉴》卷四十三。为《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》“秘传通气散”之异名。见该条。

74219 通气散

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】柴胡一两 香附一两 川芎五钱

【用法】上为末。每服三钱，开水调下，早、晚各一次。

【主治】耳聋，不闻雷声。

74220 通气散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】陈皮 青皮各八钱 瓜蒌 甲珠各四钱 银花 连翘 炙草 甘草各一钱

【用法】上为末。酒调下。

【主治】乳痈初起。

74221 通气膏

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】木通 当归（切，焙） 芎藭 蕤仁 桂（去粗皮）各半两 细辛（去苗叶） 白芷各三分

【用法】上锉细，与羊髓三两，同于银石器中微火煎，候白芷黄色，去滓澄凝。每取小豆大一块，塞鼻中，每日二次。

【主治】鼻中不利，窒塞不闻香臭。

74222 通火汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍 玄参 麦冬各一两 生地五钱 甘草一钱 陈皮五分 荆芥一钱 白芥子二钱 茯苓三钱 半夏八分

【用法】水煎服。一剂郁解，二剂全愈。

【主治】火郁为病，少气，胁、腹、胸、背、面目、四肢填塞愤懑，时面呕逆，咽喉肿痛，口干舌苦，胃脘上下忽时作痛，或腹中暴痛，目赤头晕，心热烦闷，懊恼善暴死，汗濡皮毛，痰多稠浊，两颧红赤，身生痱疮。

74223 通心丸

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】辰朱砂 马牙消 明雄黄 真麝香 白附子 陈枳壳 正川芎 白茯苓 人参 川黄连 金银箔

【用法】炼蜜为丸。麦冬煎汤送下。

【主治】痛证。

74224 通心汤

【方源】《普济方》卷十六引《护命方》。

【组成】麦门冬（去心，焙） 梔子（去皮） 黄芩（去黑心） 当归（酒浸，切，焙） 荆芥穗 芍药 大黄（生，锉） 升麻 木通各一分

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盞，入葱白三寸，煎至八分，去滓，食后热服。

【主治】心脏积热，口舌生疮，善怒，言语不快，舌强，小便赤痛。

74225 通心汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】升麻 犀角（镑） 龙胆 玄参 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 羌活（去芦头）各半两 苦竹叶三分 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】心脏壅盛，烦热，口舌生疮，头痛颊赤，心神不宁。

74226 通心饮

【方源】《得效》卷十一。

【组成】木通（去皮节） 连翘 瞿麦 梔子仁 黄芩 甘草各等分

【用法】上锉散。每服二钱，以水一盞煎，灯心、麦门冬（去心）汤送下。心经有热，每服四钱，以水一盞半，入灯心十茎、滑石末一匕、麦门冬二十粒、桑白皮七寸煎汤，去滓，再入生车前草汁一合，和匀服；心脾蕴热作呕，每服三钱，加灯心、藿香叶煎服；口疮，加地黄、野苳根煎服；旋螺风，先用土牛膝、泽兰煎水外洗，再服上药。

【功用】清心热，利小便，退潮热，分水谷。

【主治】心经有热，唇焦面赤，发热，小便不通；心脾蕴热作呕，潮热乍来乍去，心烦，面赤口干，如疟状；小儿钓气；口疮；旋螺风，赤肿而痛者。

【加减】春，加蝉蜕、防风；夏，加茯苓、车前子；秋，加牛蒡、升麻；冬，加山梔子、连翘；小儿钓气，加钩藤、川楝子，或加白

茅根、竹叶。

74227 通心饮

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】木通 连翘各等分

【用法】上为细末。每服一至二钱；用麦门冬或灯心煎汤调下，不拘时候。

【主治】心经有热，唇焦面赤，小便不通。

74228 通心饮

【方源】《医级》卷八。

【组成】木通 梔子 黄芩 瞿麦 连翘 枳壳 川楝子 甘草各等分

【用法】入车前草五茎、灯草二十根，水煎服。

【主治】诸腹内热胀痛，及小便不利而渴者。

74229 通心散

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】瞿麦穗 木通（去皮） 梔子（去壳） 黄芩 连翘 甘草 枳壳（去瓤） 川楝子（去核） 当归尾 桃仁 山楂各等分

【用法】上为末。每服三钱，以灯心二十茎，车前草十茎煎汤，空心调服。

【主治】痲癰疽，内有脓血，小便不通。

74230 通水丹

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】芫花不拘多少（拣净，晒干）

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。每用五分，将大枣二三枚去核，夹药在内，空心嚼下，冷茶过口。

【主治】下部诸疮，鱼口便毒，横痃腹痛，小便淋沥等，初起入壮气实者。

74231 通水散

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】白术一两 熟地一两 茯苓三钱 山茱萸五钱 薏仁一两 肉桂五分 车前子三钱 人参一两

【用法】水煎服。

【主治】产妇湿气感中胞络，下阴肿胀，小水点滴不出者。

74232 通正散

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】丁香 干柿蒂各一两 莲子肉五十枚（去心）

【用法】上为细散。每服二钱匕，温酒或饭饮调下。

【主治】伤寒诸虚气上逆，哕逆呕吐。

74233 通仙散

【方源】《本草纲目》卷二十二引《多能鄙事》。

【组成】荞麦面三钱 大黄二钱半

【用法】上为末。临卧酒调服。

【主治】男子积聚，女子败血。

74234 通玄丹

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】麝香丸（《普济方》卷三九七）。

【组成】巴豆一两 油一升 麝香一钱（细研）

【用法】先入油于铛内，以急火煎巴豆，看爆出者收之，去皮心，纸裹压去油，入麝香研，以粟米饭为丸，如麻子大。每服二丸，冷水送下。

【主治】小儿囊痢久不愈，腹多鼓胀，痢如枣花。

74235 通圣丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】干姜（炮） 白矾（烧令汁尽） 硫黄（细研）各二钱 桂（去粗皮） 肉豆蔻仁 附子（炮裂，去皮脐） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 缩砂仁 诃黎勒皮各一分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前醋、艾煎汤送下。

【主治】中焦虚寒，泻痢不止，脐腹疼痛。

74236 通圣丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】防风 当归 白芍（酒炒） 白术（土炒） 黑梔 荆芥 干姜各二两

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服三钱。小儿酌减。

【主治】一切阳毒，小儿秃疮。

74237 通圣丸

【方源】《外科传薪集》。

【组成】防风 桔梗 麻黄（去节） 甘草各一两 当归 川芎（酒炒） 滑石各一两 白芍（酒炒） 石膏（煨） 白术（土炒） 芒消（酒浸，焙干） 连翘 黄芩（酒炒） 黑栀 薄荷 荆芥各二钱五分

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。

【主治】一切阳毒，小儿秃疮。

74238 通圣丸

《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。即《宣明论》卷三“防风通圣散”改为丸剂。见该条。

74239 通圣汤

《普济方》卷二八三。为《三因》卷十四“通圣双行汤”之异名。见该条。

74240 通圣饼

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】天麻 使君子（去皮） 白僵蚕（炒） 白附子（炮） 天南星各一分（炮） 乳香（研） 青黛 蝎梢（炒） 膩粉 水银各一钱 黑铅半钱（与水银结沙子） 麝香（研） 龙脑（研） 各半钱 无食子一对

【用法】上为末，白面糊为丸，如梧桐子大，捏作饼子。每服一饼子，食后及临睡用薄荷煎汤化开送下。

【主治】小儿慢惊，风痫涎盛，咽喉不利，手足搐搦，目睛直视。

74241 通圣饼

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连二钱（锉为末） 巴豆 生蒜一个 生盐半钱

【用法】上于石钵内烂杵，捻作寸半阔饼子。贴脐，再紧搓干艾，切作绿豆大五枚，作五次安脐间饼子上，以火灸之。

【主治】大腑闭涩，连日不通，满腹膨胀，气壅闷乱，服药罔效。

【备考】方中巴豆用量原缺。

74242 通圣饼

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】黄连末一钱 巴豆五粒 独头蒜一颗 盐五分 皂角末一钱

【用法】上研烂，捻作寸半阔饼子，贴脐上。

【主治】大小便不通。

74243 通圣散

【方源】《活人书》卷二十一。

【异名】煎柿散（《卫生总微》卷八）、豆皮饮子（《三因》卷十六）、豆皮饮（《直指小儿》卷五）、白菊花散（《卫生宝鉴》卷十九）、通神散（《保婴撮要》卷十八）。

【组成】白菊花（如无，用甘菊花代） 绿豆皮 谷精草各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，用干柿一枚，生粟米泔一盏，与药同煎，水尽为度，只服干柿，一日可服三枚。病轻者五七日便效，重者半月余效。

【主治】斑疹、痘疮入眼及生翳。

74244 通圣散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】金星石 银星石 太阴玄精石 云丹 阳起石 不灰木各等分

【用法】以砂锅子一只，先入罗过紫冬灰（水牛粪是也），厚约一二寸，铺药一重，再盖灰一层约一二寸，筑令实，又铺药一重，同前法盖灰后再铺药，上下以灰封盖，以盐泥固济；不限药多少，皆用炭一秤，于静室中周密不通风处，火煨一日一夜，候冷取出；于净地掘一坑子，深一尺许，埋锅子一宿，取出，先拣出药块子，余以粗罗罗去灰，取药研为末，更入乳钵，研令极细，即入罐子内收之。每药末一两，入龙脑、麝香各半钱，阿胶一分（炒）同研，合和令匀；每服一钱或半钱匕，以糯米少许研细，入薄荷汁、蜜各少许，合煎为饮，候温调下，空心日午、临卧各一服。

【主治】肺损，吐血嗽血。

74245 通圣散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】大枣 乌梅各七枚 干姜三块如枣大 甘草一尺 (各细锉)

【用法】上为散。每服一钱匕，水一盞，加生姜半枣大 (拍破)，同煎至六分，去滓温服。

【主治】血痢，腹中疔刺，日夜无度。

74246 通圣散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】谷精草 (炒) 天南星 (炮) 贯众 (炒) 黄柏 (炙) 各一分 麝香半钱

【用法】上为散。每用少许，干掺疮上。

【主治】诸般恶疮。

74247 通圣散

【方源】《卫生总微》卷六。

【异名】至圣散 (《普济方》卷三六七)。

【组成】蝎尾二十一个 (去毒) 晚蚕蛾十四个 天浆子 (去壳) 十四个 白附子半两 (上为末) 朱砂一分 (研，飞) 麝香一钱 (研)

【用法】上为末。每服一字或半钱，薄荷汤入酒两滴调下。

【主治】小儿中风痉病，口噤体强，耳中策痛，发昏愤，不时醒。

74248 通圣散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】乌贼鱼骨二钱 铜青一钱

【用法】上为细末。每用一钱，热汤泡洗，如冷再烫令热，更洗一次。

【主治】妇人血风眼。

74249 通圣散

【方源】《普济方》卷二四九引《卫生家宝》。

【组成】桃仁六两 (去皮尖) 硃砂一两半 (去砂石，研)

【用法】上生为末。每服一钱，煎生葱酒调下。一服立止，更不再发。

【主治】小肠气，痛不可忍。

74250 通圣散

《伤寒标本》卷下。为《宣明论》卷三“防风通圣散”之异名。见该条。

74251 通圣散

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】川芎 当归 麻黄 薄荷 连翘 白芍 黄芩 石膏 桔梗一两 滑石三两 荆芥 栀子 白术二钱半 甘草

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜三片，煎汤服之。

【主治】斑疹属风热挟痰而作，自里而发于外，宜微汗者。

【加减】身疼痛，加苍术、羌活；痰嗽，加半夏。

【备考】方中川芎、当归、麻黄、薄荷、连翘、白芍、黄芩、石膏、荆芥、栀子、甘草用量原缺。

74252 通圣散

《医统》卷六十二。即《御药院方》卷一“增损防风通圣散”。见该条。

74253 通圣散

《医统》卷八十一。为《外科精义》卷下“通气散”之异名。见该条。

74254 通圣散

《景岳全书》卷六十。为《普济方》卷五十四“通气散”之异名。见该条。

74255 通圣膏

《普济方》卷七十三。为《博济》卷三“通神膏”之异名。见该条。

74256 通圣膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】真麻油一斤 无蛀皂角一尺二寸 (去核，捶碎) 降真香二两 (捶碎) 巴豆四十粒 (去壳，劈开去心)

【用法】上用柳枝一握，长四五寸，以草系定，先煎油转黑色 (火稍猛不妨)，取下稍定，再下柳枝煎，少时除去，而后依次下降真香、皂角、巴豆，用火稍慢以防溢涌，又以尺许长柳二条，时时搅转，候巴豆紫黑色为度；以绵或绢绞去滓，入红色虢丹八两，分作三二次下，不住手搅转，候黑光，滴少许入净冷水内，以不粘手为度，倾入石器中，乘热入少许乳香末尤妙。摊纸上贴患处。

【主治】痈疽漏疮，一切恶疮。

74257 通皮饮

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】广皮一钱 青皮一钱 冬瓜皮二钱 茯苓皮四钱 当归二钱 厚朴一钱 枳壳一钱 砂仁一钱 泽泻一钱五分 车前子二钱 鲜姜皮一钱

【功用】调和气血，疏导行水。

【主治】三焦胀。气满于皮肤中，轻轻然而不坚。

74258 通耳丸

【方源】《奇效良方》卷五十八。

【组成】穿山甲（用大片，以蛤粉炒赤色，去粉） 蝎梢七个 麝香少许

【用法】上为细末，以蜡入麻油一滴为丸。绵裹塞耳内。

【主治】卒聋及肾虚耳鸣，耳内作风水声、钟声。

74259 通耳丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】安息香 桑白皮 阿魏各一两半 朱砂半钱

【用法】上为末，将巴豆七个、蓖麻仁七个、大蒜七个研烂，与药末和匀为丸，如枣核大。每用一丸，绵裹塞耳中，如觉微痛即取出。

【主治】耳聋。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“通神丹”。《外科精义》有桑螵蛸，无桑白皮。

74260 通耳方

【方源】《济阳纲目》卷一〇三。

【组成】白矾一两（飞过）

【用法】上为末。用竹筒吹入耳中。

【主治】耳聋，并耳聋作哑。

74261 通耳汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地三两 麦冬一两 炒枣仁 茯神 玄参各五钱 菖蒲一钱 柏子仁 炒黑荆芥各三钱

【用法】水煎服。十剂自通。

【主治】大病之后，或年老人，肾水内闭而气塞，双耳聋闭，雷霆喧呼之声，终不相闻，而耳内不痛。

74262 通耳法

【方源】《奇效良方》卷五十八。

【异名】通耳散（《景岳全书》卷六十）。

【组成】磁石（用紧者）如豆大一块 穿山甲（烧存性，为末）一字

【用法】上用新绵包裹，塞所患耳内，口中衔少许生铁，觉耳中如风雨声即愈。

【主治】耳聋日久，不闻声响。

74263 通耳散

《景岳全书》卷六十。为《奇效良方》卷五十八“通耳法”之异名。见该条。

74264 通达饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】当归 桃仁（去尖） 大黄（酒煨） 猪苓 泽泻 木香各二钱 附子 滑石 玄胡索各一钱二分

【用法】加灯心三十茎煎，食前服。

【主治】小腹胀痛，溺涩不通，内有蓄血结聚者。

74265 通邪煎

【方源】《外科图说》卷一。

【异名】通邪表毒汤。

【组成】荆芥穗 防风皮 土茯苓皮 杏仁 天名精 广橘红 赤茯苓皮 枳壳

【主治】痈疡。

74266 通光丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】苍术（去黑皮） 黄芩（去烂心） 朴消各二两 甘草七钱半

【用法】上为细末，干柿为丸，每两作五丸。每服二丸，食后细嚼，冷水送下。

【功用】清神水，退翳膜。

【主治】眼目昏晕，赤隐难开。

74267 通光散

《普济方》卷七十八。即《圣济总录》卷一一“洗眼通光散”。见该条。

74268 通血丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】生地黄(焙) 赤芍药各半两 川芎一两 甘草五钱 防风 荆芥 当归尾各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食后荆芥、薄荷茶嚼下。

【功用】引血归肝。

【主治】因损伤或肝气闭，使血无所归，血灌瞳仁，致目痛如锥刺，而无翳膜，视物不明者。

74269 通血散

【方源】《仙传外科集验方》卷四。

【组成】大黄三钱(面裹煨) 当归二钱(焙)

【用法】用苏木、枳壳煎汤放温调服，亦可入酒与童便。

【主治】肉伤无出血者，及打扑遍身赤肿，大小便不通。

【宜忌】有潮热，不用酒。

74270 通血散

【方源】《扶寿精方》。

【组成】当归尾 枳壳 木通 泽兰 大黄 桃仁各五钱 苏木 红花各三钱

【用法】上为细末，或滴水为丸。每服二钱，好酒送下，重者童便合酒送下。

【主治】打扑伤损，血污入心。

74271 通血散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】生地 赤芍 当归各一钱 川芎 防风 苏木各六分 荆芥八分 菊花一钱五分 红花 炙甘草各五分

【用法】上入葱头二个，以水二钟，煎至八分，食后温服。

【主治】目因物撞，瘀血蓄内，致生翳障，疼痛昏花。

【备考】原书治上症，先用本方，次服经效散、还睛丸。

74272 通血散

【方源】《异授眼科》。

【组成】草决明 防风 荆芥 赤芍 当归 大黄 山梔 羌活 木贼 蒺藜 甘草

【用法】上为末。每服三钱，茶汤调下。

【主治】目中赤脉下垂，眼目昏痛。

74273 通产散

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】败龟版(一个，炙)四两 女人发一握(洗去油，煨存性) 当归(全用)四两 川芎二两 乳香四钱 益母草(研头末)四两

【用法】上为末。每服六钱，圆眼煎汤调下。

【主治】妇人临产交骨不开，五七日不生；及矮小女子交骨不开，危在须臾者。

【加减】有力者，加人参一钱，煎汤送下，催产更速。

74274 通闭方

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】大黄三两 槟榔一两半 赤苓二两 枳壳一两半(炒) 诃子三两(炒) 腹绒一两半

【用法】上为散。每服二三钱，葱白煎汤，去滓，放温调下。

【主治】孕妇大便秘结，脉沉实大者。

【方论选录】妊娠气滞于中，不能运化而大腹胀满，大便不通，是为气秘，胎孕因之不安。大黄通幽导滞；枳壳泻滞宽胀；赤苓利营渗水；腹绒除满泻气；槟榔下气，性如铁石；诃子涩肠，力能收肺。为散，葱白汤下，既不使病气滞而不通，亦不使元气虚而下脱，洵为导滞通幽、涩肠收肺、不致胎动之专方。《经》曰：有故无殒，亦无殒焉。

74275 通闭汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】枳壳一钱半(炒) 防风一钱半 甘草八分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】孕妇感冒，大便秘结，脉浮。

【方论选录】妊娠感冒，风邪直入大肠，而

大便秘结,谓之风秘,胎孕因之不安。防风祛外邪以通风秘,枳壳泻滞气以疏肠结,甘草缓中和胃也。水煎温服,使风邪外解则滞气通行,而津液四布,胎得所安,岂有大便秘结之患乎?

74276 通闭散

【方源】《明医指掌》卷七。

【组成】香附五钱 陈皮五钱 赤茯苓一两

【用法】上为末。每服二钱,水煎,空心服。

【主治】①《明医指掌》:血热成淋。②《证治汇补》:气壅小便不利。

74277 通汗煎

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】生姜一两(拍碎) 葱白(连须)七根 茶叶一撮 黑糖三钱

【用法】水煎三碗,热服。盖被出汗,即愈。如无汗,以葱汤催之,然亦不可太过。

【主治】伤寒感冒。

74278 通关丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】滋肾丸(原书同卷)、坎离丸(《明医指掌》卷二)、知母黄柏滋肾丸、大补滋肾丸(《医林绳墨大全》卷六)、泄肾丸(《医部全录》卷二六五)、通关滋肾丸(《全国中药成药处方集》上海方)。

【组成】黄柏(去皮,锉,酒洗,焙) 知母(锉,酒洗,焙干)各一两 肉桂五分

【用法】上为细末,熟水为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心白汤送下。药后顿两足,令药易下行,如小便利,前阴中如刀刺痛,当有恶物下为验。

【主治】①《兰室秘藏》:热在下焦血分,口不渴而小便闭。②《医方集解》:肾虚蒸热,脚膝无力,阴痿阴汗,冲脉上冲而喘,及下焦邪热,口不渴而小便秘。

【方论选录】①《医方集解》:肾中有水有火,水不足则火独治,故虚热,肝肾虚而湿热壅于下焦,故脚膝无力,阴痿阴汗;冲脉起于

三阴之交,直冲而上至胸,水不制火,故气逆上而喘,便秘不渴。治当壮水以制阳光。黄柏苦寒微辛,泻膀胱相火,补肾水不足,入肾经血分;知母辛苦寒滑,上清肺金而降火,下润肾燥而滋阴,入肾经气分,故二药每相须而行,为补水之良剂;肉桂辛热,假之反佐,为少阴引经,寒因热用也。②《古方选注》:《难经》关格论云:关则不得小便。口不渴而小便不通,乃下焦肾与膀胱阴分受热,闭塞其流,即《内经》云无阴则阳无以化也。何则?膀胱禀大寒之气,肾感寒水之运,气运窒塞,故受热而闭。治法仍须用气味俱阴之药,除其热,泄其闭。治以黄柏泻膀胱之热,知母清金水之源,一燥一润,相须为用;佐以肉桂,寒因热用,伏其所主而先其所因,则郁热从小便而出,而关开矣。

【临证举例】肾绞痛 《湖北中医杂志》1983;4:封3:将通关丸改成散剂,治疗26例肾绞痛,疗效显著。所治患者均有腰腹绞痛,尿频,排尿困难等症状,于就诊时立即用温开水送服上药1克,多数患者在3~5分钟内疼痛减轻,10分钟内疼痛大减,20分钟绞痛基本缓解。若数分钟内绞痛不减者,可继服药末1克。一般患者,首次服药后半小时再服药1克,此后可三小时服药1克,每日四次。经上述治疗后,一般于三天内绞痛可完全控制。

【备考】本方改为汤剂,名“滋肾通关饮”,(见《丁甘仁医案》卷六)。

74279 通关丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】黄柏二两(酒炒) 知母二两(酒炒) 肉桂三钱 滑石二两 木通一两

【用法】上为末,水为丸,如梧桐子大。每服百丸,白水送下。

【主治】热在下焦血分,小便不通;兼治诸淋。

74280 通关丸

【方源】《外科十三方考》。

【组成】甘遂 丑牛各等分

【用法】上为末，水为丸。每服一钱，甜酒送下。

【主治】凡气积、食积、痰积、水积，老人风秘，寒火结胸，肚腹胀满，大便闭结，用消、黄下之不通者。

74281 通关汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】吴茱萸三两（人黑牵牛三两同炒香熟，拣牵牛别取头末半两） 青木香

【用法】上为末，并入前牵牛末研匀。每服方寸匕，以水三合，煎至七分上下，温服，一日三次。

【主治】疝气。

【备考】方中青木香用量原缺。

74282 通关饮

《圣济总录》卷二十一。为《圣惠》卷九“通关散”之异名。见该条。

74283 通关饮

【方源】《医学正传》卷五引东垣方。

【异名】通关散（《寿世保元》卷六）。

【组成】人参 白术 茯苓各一钱 炙甘草一钱五分 桔梗（去芦）二钱 防风（去芦）七分 荆芥五分 薄荷五分 干姜（炮）五分

【用法】上细切。以水二盏，煎至七分，作一服，徐徐与之。

【主治】喉痹肿痛，不能语言者。

【加减】或加附子（炮）五分。

74284 通关散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】附子一颗（炮裂，去皮脐） 干姜半两（炮裂，锉） 桂心一分 麻黄一分（去根节）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入葱白二茎，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】伤寒三日，不得汗，四肢不利。

74285 通关散

【方源】《圣惠》卷九。

【异名】通关饮（《圣济总录》卷二十一）。

【组成】附子一两（炮裂，去皮肤） 干姜五两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 黄耆三分（锉） 桔梗半两（去芦头） 防风三分（去芦头） 羌活半两 五加皮半两 桂心三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒六日，脉沉细不足者。

74286 通关散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒） 羌活 附子（炮裂，去皮肤） 芎藭 五加皮 桂心 防风（去芦头） 麻黄（去根节） 旋覆花 甘草（炙微赤，锉） 各半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、薄荷七叶，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候，汗出为度。

【主治】伤寒，遍身壮热，头痛腰疼，肢节不利。

74287 通关散

【方源】《本草纲目》卷十七引《篋中秘宝方》。

【组成】生乌头 青矾各等分

【用法】上为末。每用一字，搐入鼻内。取涕吐涎。

【主治】口眼喎斜。

74288 通关散

【方源】《博济》卷二。

【组成】麦藁三钱 马兜铃三钱 诃子一枚 芫花三钱（浆水浸，微炒） 朱砂一钱 白丁香三钱 黄丹一钱 硼砂二钱（飞，去砂石） 白矾 铅白霜各一钱

【用法】上为细末。每服一钱半，入膩粉两文，鸡蛋一个，去黄只取清，调末，却入鸡蛋壳内，用湿纸裹，慢火煨熟，放冷，临卧，烂嚼，腊茶汤送下。来日逐下黑恶物则愈。如噎闭轻证，可依法服一钱。

【主治】五膈气，噎塞妨闷，遍身虚肿，涕

唾稠浊，不下饮食。

74289 通关散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】旌德乌头四两（破皮，旌德有芦头肌白者） 藁本 防风 当归 白芷 天南星 川芎 干姜 雄黄（细研） 桂各半两（并生，勿近火）

【用法】上为末。每服一字或半钱，葱酒调下，亦可以薄荷酒调下。小儿药量减半。

【主治】诸中风伤寒。

【加减】瘫痪，加牛黄、麝香。

【临证举例】①中风偏瘫 曾在江南，见市门有卧者，乃客贩因病偏风，医之，遂至病困，为邸家所委，时伯氏为邑，使人舁到令舍，调药（即通关散）饮之，又与十服。数日伯氏出，市有一人，扶倚床而呼曰：昔日卧者，今能扶榻而行矣，药尽，愿少继之。伯氏又与十服，服讫能起。②痉挛 一吏病疮而挛，逾岁月卧矣。伯氏与散（即通关散）二钱匕，为八服。吏谬以为一服，服已，僵眩呕吐，几因将殆，数日疮挛悉除。

74290 通关散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】原蚕蛾（瓦上炒令黄） 白附子（炮） 苦参 益智（去皮） 蒺藜子（炒去角） 干薄荷各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，每日三次。

【主治】脑风。鼻息不通，不闻香臭，或鼻流清涕，多嚏，肩项拘急，头目昏痛，风府怯寒。

74291 通关散

【方源】《普济方》卷九十二引《全生指迷方》。

【组成】白僵蚕（炒）半两 羌活一分 麝香半钱

【用法】上为末。每服二钱，先以姜汁少许调匀，以沸汤浸，放温服之；又以真菖蒲末，时时放舌根下。

【主治】风邪客于脾经，上入关机，失音不

能言；或关格不通，精神昏愤失忘。

74292 通关散

《幼幼新书》卷十引《汉东王先生方》。为《圣济总录》卷一七一“排关散”之异名。见该条。

74293 通关散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《刘氏家传》。

【组成】山梔子（炒）一分半 大黄（炒）一钱 木通（炒） 甘草 瞿麦 茯苓 人参 滑石 车前子（炒）各一分 地菖蒲（焙）半两

【用法】上为细末。婴孩每服一字，二三岁每服半钱，四五岁每服一钱，以水半盏，入灯心煎数沸，温服。

【功用】《景岳全书》：通心经，降心火，利小便。

【主治】小儿斑疮水痘，心燥发渴，小便赤色，口舌生疮。

74294 通关散

【方源】《卫生总微》卷一。

【组成】乳汁二合 葱白一寸（四破）

【用法】上同煎，取一合，灌服。

【主治】初生儿不饮乳，及不小便。

74295 通关散

《卫生总微》卷八。为《幼幼新书》（古籍本）卷十五引《家宝》“通经透关散”之异名。见该条。

74296 通关散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】枯白矾 雄黄（水飞） 藜芦（微炒） 白僵蚕（去丝嘴） 猪牙皂角（去皮弦）各等分

【用法】上为细末。每用一字，搐鼻；病重者以苇筒吹入喉中。涎出或血出立愈。

【主治】咽喉一切诸病。

74297 通关散

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【组成】抚芎二两 川芎一两 川乌二两 龙脑薄荷一两半 白芷 甘草各二两 细辛半两

【用法】上为细末。每服一大钱，葱白茶清调下，薄荷汤亦得，不拘时候。

【主治】中风伤寒，发热恶风，头痛目眩，鼻塞声重，肩背拘急，身体痠痛，肌肉瞤动，牙关紧急，久新头风。

【备考】《医统》有草乌三两，无甘草。

74298 通关散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】山茵陈叶 薄荷叶(去土) 藁本(去土) 木贼(去节) 当归(洗，焙) 川乌头(炮，去皮脐、尖) 蝉蜕(去土) 各二两 川芎 甘草(炙) 香白芷 羌活(去芦头) 藜蘆各三两 石膏一两半 麻黄一两(去根节) 荆芥穗 防风(去芦头) 各五两

【用法】上为细末。每服一大钱，食后腊茶调下。

【主治】偏正头风，头眩脑痛，鼻塞声重，四肢倦怠；又治赤目肿痒，昏涩羞明，冷泪不止，渐生翳膜，胬肉遮障，数年不愈者。

74299 通关散

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】蜈蚣一条(干者，葱汁浸一日一夜，焙干) 麝香一字(别研) 草乌头尖十四枚(薄荷、生姜自然汁浸一日一夜，焙干)

【用法】上为细末。每潮搐时，用一米粒大吹入鼻中，男左女右。

【主治】小儿急慢惊风，搐搦潮作。

74300 通关散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】盆消 甘草 蒲黄 白僵蚕 青黛各等分(并生用)

【用法】上为细末。每用一字，干掺在舌上，咽津。

【主治】一切咽喉危急症。

74301 通关散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】白矾(枯) 直僵蚕(炒) 南星(生) 藜芦各一钱 全蝎(焙)二个

【用法】上为末。以小管挑一字，吹入鼻中，吐痰喉通。

【主治】①《直指》，喉风喉痹。②《秘传证治要诀类方》，伤冷热，鼻暴塞，流涕多者。

74302 通关散

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】羌活 独活 防风 天麻 山梔子 大黄 甘草各一两 滑石二两

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盞，加生姜五片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】风热上攻头目，筋脉拘急，痰涎壅滞，肢节烦疼。

74303 通关散

【方源】《医方类聚》卷一三六引《施圆端效方》。

【组成】生白矾 沧盐各二钱半

【用法】上为细末。用纸圈围脐周，抄药在内，滴水药上，少时小便自行。

【主治】小便不通。

74304 通关散

【方源】《普济方》卷四十六引《卫生宝鉴》。

【组成】半夏(为末) 百草霜少许

【用法】用纸一条，入上药半钱，作纸捻子，焙极干。每用药时，先含水一口，将纸捻子点着鼻中搐之，如有涎，即吐去，再含水再搐，如此用三次见效。

【主治】八般头风。

74305 通关散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】香附子(炒)三分 川芎七分 荆芥四分 白僵蚕(炒)三分 细辛茎二分 猪牙皂角一分

【用法】上为末。取生葱白去须，捣调药，涂囟门上。

【主治】婴儿囟门被母鼻息吹着，以致鼻塞，不能食乳。

【备考】《育婴家秘》有荷叶(汉阳忠信堂本作“薄荷叶”)。

74306 通关散

【方源】《得效》卷十三。

【组成】细辛 薄荷叶 牙皂(去子) 雄黄各一钱

【用法】上为末。每用少许,以铜管吹入鼻中,候喷嚏,然后进药。

【功用】《景岳全书》:开通牙关。

【主治】①《得效》:卒暴中风,昏塞不省,牙关紧急,药不得下咽。②《景岳全书》:时毒痈肿,鼻塞气闭。

74307 通关散

【方源】《医方类聚》卷一三六引《烟霞圣效》。

【组成】陈皮半两 西灯草三钱 瞿麦三钱 山梔子二钱 白茯苓三钱

【用法】上为末。每服三钱,加葱白三寸,同煎至七分,去滓,食前温服,每日三次。

【主治】小便不通。

74308 通关散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】大黄一两 牡蛎半两(烧) 山梔子三钱 地龙二钱 甘草三钱(炒)

【用法】上为末。每服五钱,以水一盞,煎至六分,去滓温服,以利为度。

【主治】一切痈疽,无头肿痛者。

74309 通关散

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】南星(炮)一钱 麝香一字 猪牙皂角(略烧存性)二钱 赤蜈蚣(炙)一条 直僵蚕(炒,去丝嘴)一钱

【用法】上为末。以手点姜汁蘸药少许擦牙,或用物引药滴入口中二三点,涎出自开。

【主治】小儿痰塞中脘,留滞百窍以致惊风搐搦,关窍不通。

74310 通关散

《口齿类要》。为原书“破棺丹”之异名。见该条。

74311 通关散

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【异名】开关散(年氏《集验良方》卷一)。

【组成】细辛(洗去土叶) 猪牙皂角(去子)各一钱(一方有半夏一钱)

【用法】上为末。每用少许搐鼻,候喷嚏服药。

【主治】①《丹溪心法附余》:卒中风邪,昏闷不醒,牙关紧闭,汤水不下。②《笔花医镜》:小儿急惊风。

【方论选录】《成方便读》:此亦治中风闭证之一法也。凡邪气骤加,正气被遏,经隧不通,肢厥脉绝,此时不特药力所不能达,且亦不能进,唯有取嚏一法,先开其关,使肺气一通,则诸脏之气皆通,然后方可用药施治。二味皆辛散之品,俱能开窍,均可上行,合之为散,以搐鼻中,一取嚏而关即通也。

74312 通关散

《本草纲目》卷十一。即《医方类聚》卷七十四引《济生续方》“白矾散”。见该条。

74313 通关散

【方源】《回春》卷二。

【组成】牙皂(去皮弦)一两 生半夏 藜芦各五钱 细辛 苦参各二钱

【用法】上为末。每用少许,吹入鼻内。候有嚏可治,无嚏不可治。

【主治】中风痰厥,昏迷卒倒,不省人事。

74314 通关散

《寿世保元》卷六。为《医学正传》卷五引东垣方“通关饮”之异名。见该条。

74315 通关散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白芍五钱 茯苓三钱 甘草 枳壳 神曲各三分 白豆蔻一枚 川芎二钱 生姜汁半合 柴胡一钱

【用法】水煎服。愈后须用补肾之剂。

【主治】关格。食至胃而吐,欲大小便而不能出,眼睛红赤,目珠暴露,而胁胀满,气逆拂抑者。

74316 通关散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】牙皂 细辛 藜芦 川乌尖 石

菖蒲 雄黄各等分 麝香少许

【用法】上为末。吹鼻。取嚏即醒，无嚏不治。

【主治】小儿急惊。

74317 通关散

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】生南星 生半夏 猪牙皂各等分

【用法】上为细末。每用少许吹鼻内。有嚏可治，无嚏不可治。

【主治】中风不语，不省人事，牙关紧闭，汤水不入者。

74318 通关散

【方源】《良朋汇集》卷一。

【异名】通窍烟（《惠直堂方》卷二）。

【组成】巴豆（去壳）

【用法】上以纸包捶油，去豆不用，将纸捻成条，送入鼻内，或烧烟熏入鼻内。

【主治】①《良朋汇集》：中风痰厥，昏迷卒倒，不省人事。②《惠直堂方》：喉痹，牙关紧急。

【加减】加牙皂末尤良。

【备考】《惠直堂方》本方用法，亦可将烟熏入口内，霎时流痰涎即开，或吐出瘀血立愈。

74319 通关散

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】猪牙皂一钱 细辛二分 麝少许

【用法】上为末。搐鼻取嚏。

【主治】妇人血厥，平居无病，忽如死人，身不动摇，目闭口噤。

74320 通关散

【方源】年氏《集验良方》卷四。

【组成】硼砂一钱 胆矾二钱

【用法】上为末，入青鱼胆内阴干，加山豆根一钱，研细，瓷器收贮。外吹患处。流涎即愈。

【主治】乳蛾，及喉内一切热毒。

74321 通关散

【方源】《医部全录》卷四三二。

【组成】南星（泡） 石菖蒲各等分

【用法】上为末。以麝胆汁调下。即能言语。

【主治】小儿惊风已退，但声哑无音者。

74322 通关散

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】南星 皂角 细辛 薄荷 生半夏

【用法】上为末。吹鼻。有嚏可治。

【主治】中风闭证，双手握固，牙关紧闭。

74323 通关散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】半夏（生） 皂角 细辛 薄荷各等分

【用法】上为细末。用笔管吹入鼻内少许。

【主治】小儿痰壅气塞，壅结胸中，发为惊风抽搐，神气昏愦。

74324 通关散

【方源】《喉科指掌》卷一。

【组成】细辛一钱 猪牙皂三钱 藜芦二钱 白矾末一钱

【用法】上为细末。以滚水或淡姜汤冲调，灌喉间。

【主治】咽喉急症。

74325 通关散

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】牙皂一两（瓦上焙存性） 川芎五钱

【用法】上为细末。吹入鼻中，或喉口等症，脓成胀痛而畏刀针者，候熟用此吹鼻，其脓自出。

【主治】一切喉风，口噤不开，痰逆不知人事，或喉症已成脓，怕刀针者。

74326 通关散

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】牙皂一两（瓦上焙存性） 川芎五钱 麝香一分 北细辛三钱

【用法】上为细末。吹入鼻中。或喉口等症，脓成胀痛而畏刀针者，候熟用此吹鼻，其脓自出。

【主治】一切喉风，口噤不开，痰逆不知人

事；或喉症已成脓，怕刀针者。

74327 通关散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】牙皂五钱 白芷三钱 细辛三钱 冰片二分 麝香二分 蟾酥五分

【用法】上为极细末，入瓷瓶内收贮。吹鼻。

【功用】取嚏通经。

【主治】《中医伤科学讲义》：晕厥。

74328 通关散

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】牙皂三钱 巴豆仁二十一粒 大枳壳一个（去瓢子皮膜）

【用法】将牙皂（切片）及巴豆入枳壳内，合住以线扎紧；分数次晒干，切片，共为细末。用时加沉香一钱，白滚水调下。

【主治】关隔不通，翻胃噎膈。

74329 通关散

《卫生鸿宝》卷一。为《痧证汇要》卷一“丹平散”之异名。见该条。

74330 通关散

《急救痧症全集》卷下。为原书同卷“霹雳散”之异名。见该条。

74331 通关散

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】白细辛一钱 牙皂一钱 石菖蒲一钱五分 生半夏三钱 生南星一钱五分（炒，研） 蟾酥一钱五分 元寸八分

【用法】上为末，收贮听用。

【主治】外伤昏厥，不省人事。

74332 通关散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】细辛十两 苦参四两 猪牙皂二十两 薄荷（去梗）四两

【用法】上为细末。每三十八两兑麝香二钱，研细和匀。每用少许，吹鼻取嚏。

【功用】开窍取嚏。

【主治】中风痰厥，牙关紧闭，昏迷不省。

74333 通关散

【方源】《中国药典》一部。

【组成】细辛十两 牙皂二十两 薄荷四两 麝香二钱

【用法】上除麝香外，余为极细末，将麝香与末研匀。每用少许，吹鼻取嚏。

【功用】开窍取嚏。

【主治】中风痰厥，昏迷不省。

【宜忌】孕妇慎用。

74334 通关散

【方源】《中国药典》一部

【组成】猪牙皂 500 克 鹅不食草 250 克 细辛 250 克

【用法】上为极细末。每用少许，吹鼻取嚏。

【功用】通关开窍。

【主治】突然气闭昏厥，牙关紧闭，不省人事。

【宜忌】孕妇慎用。

74335 通关膏

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】乳香 轻粉各等分

【用法】上为末。津唾调涂肿处，外用纸贴护。

【主治】疮疖痈疽等无头者。

74336 通导散

【方源】《回春》卷八。

【组成】大黄 芒消 枳壳各二钱 厚朴 当归 陈皮 木通 红花 苏木各一钱 甘草

【用法】上锉一剂。水煎，热服。以利为度。

【主治】跌扑伤损极重，大小便不通，瘀血不散，上攻心腹，肚腹膨胀，闷乱至死者。

【宜忌】孕妇、小儿勿服。

【备考】方中甘草用量原缺；《证治宝鉴》有桃仁。

74337 通导散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】大黄 生地黄 桃仁 枳壳 赤芍 当归各二钱 陈皮三钱 木通 朴消各一钱 甘草六分

【用法】水煎，热服。以通利为度。

【主治】跌扑重伤危症，大小便不通。

【宜忌】不可用酒煎药，否则令人闷绝而死。

74338 通阳汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】茯苓 附子 干姜 草果 陈皮 厚朴 车前子 椒目

【主治】寒湿鼓胀。寒湿留着中焦，清阳不布，满腹坚胀，面黄，不渴不食，脉沉迟。

74339 通阳散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】硼砂二分 儿茶 青黛 滑石 寒水石各一分 蒲黄 枯矾 黄连 黄柏各五厘 香母二厘

【用法】上为末。吹喉。

【主治】喉中生疮。

74340 通壳丹

【方源】《吴氏医方类编》卷二。

【组成】生半夏一个 葱头如指大一块

【用法】上捣烂。以夏布裹，塞鼻，左患塞右，右患塞左，半炷香为度。

【主治】怀孕而内吹，或小儿食乳而外吹，或勒乳面结，或欲断乳而太急，致成乳症，初觉疼痛者。

74341 通声丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】桂末 杏仁各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，新绵裹含化，稍稍咽津，不拘时候。

【功用】温肺顺气，通畅音声。

【主治】肺伤风冷，气不通流，咳嗽失声，语音不出。

74342 通声丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】石菖蒲 肉桂（去粗皮） 杏仁（去皮尖，炒） 干姜（炮） 木通各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两，作十丸。食后、临卧每服一丸，含化咽津。

【主治】寒邪客搏肺经，咽噤窒塞，语声不出，咳嗽；及忧思恚怒，气道闭涩，噎塞不通，胸满气短。

【备考】《普济方》有青橘皮、甘草，无木通。

74343 通声煎

《圣济总录》卷六十六。为《千金》卷十八“通声膏”之异名。见该条。

74344 通声膏

【方源】《千金》卷十八。

【异名】通声煎（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】五味子 通草 款冬花各三两人参 细辛 桂心 青竹皮 菖蒲各二两酥五升 枣膏三升 白蜜二升 杏仁 姜汁各一升

【用法】上咬咀，以水五升，微火煎，三上三下，去滓，纳姜汁、枣膏、酥、蜜，煎令调和。酒服枣大二丸。

【主治】咳嗽语声不出。

①《千金》：暴嗽失声，语不出。②《奇效良方》：咳嗽气促，胸中满闷，语声不出。③《证治宝鉴》：暗由久病肺虚、风邪传肺及久嗽所致者。

【方论选录】《千金方衍义》：肺脏方中酥蜜膏专滋肺胃之燥以化其气，此方专滋脾肺之津以通其声。方中五味、人参滋肺之气，款冬、竹茹清肺之燥，桂心、细辛搜肺之邪，通草、菖蒲利肺之窍，杏仁、酥、蜜、姜汁、枣膏滋培津气而通其声。

74345 通声膏

《鸡峰》卷十一。为《圣济总录》卷六十六“通声辛甘煎”之异名。见该条。

74346 通里汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】川芎 羌活 黄芩 大黄各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】破伤风。邪传入里，痰涎壅塞，舌强口噤，项背反张，筋惕搐搦，胸腹满闷，便溺闭赤，时或汗出，脉洪数而弦。

74347 通利方

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】独蒜一枚

【用法】烧热，去皮。纸裹纳下部，则气立通。

【主治】关格。

74348 通利散

《普济方》卷三四七。为方出《圣惠》卷八十一，名见《圣济总录》卷一三二“鲛鲤甲散”之异名。见该条。

74349 通利膏

【方源】《三因》卷十六。

【组成】杏仁二十一个(去皮尖，嚼细) 乳香皂子大 轻粉一字

【用法】上旋入口中都嚼，候津液满口，吐入瓷器中，置火上，令四边沸，以绵滤别盏中，入生脑子如皂子大，研匀，再滤过。以铜箸点之。

【主治】眼赤涩，翳膜遮障，时多热泪。

74350 通彻丸

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】牵牛头末

【用法】和水为丸，如秫米粒大。每次三至五钱，清晨空心服下。

【功用】温通下积。

【主治】肠有冷积，少腹时觉下坠冷痛，脉两尺沉弦；或因心有忿怒，饱食当风，治失其宜而为温病结胸，初但心下痞闷，继则胸膈痞塞，且甚烦热，其脉左部沉弦，右部沉牢者。

【临证举例】冷积腹痛 王某，年五十岁。少腹时觉下坠，眠时须以暖水袋熨脐下，不然则疼不能寐。若屡服热药，上焦即觉烦躁，是已历二年不愈。脉象沉弦，左右皆然，至数稍迟。其两尺沉弦、凉而且坠论之，知其肠中当有冷积。此宜用温通之药下之。即予以自制通彻丸三钱，俾于清晨空心服下。阅三点钟，腹中疼似加剧，须臾下如绿豆糊所熬凉粉者若干，疼坠脱然全愈，亦不觉凉。继为开温通化滞之方，俾再服数剂，以善其后。

74351 通肝散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】山梔子 蒺藜(炒，去尖) 枳壳(去白) 荆芥各半两 车前子 牛蒡子各一分(炒) 甘草五钱(炙)

【用法】上为末。每服二钱，食后苦竹叶汤调下。

【主治】①《得效》：胆气盛，攻于肝，致生冰翳，如冰冻坚实，傍观目透于瞳仁内，阴处及日中看之，其形一同，疼而泪出；旋螺尖起，目疼痛，生翳膜，尖起而赤似旋螺，睑硬睛疼，睑中红赤而坚硬，眼睛疼痛而泪出无时，怕日羞明。②《医学入门》：垂帘膜，赤膜自上垂下遮睛。

74352 通肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】白芍 柴胡 黄芩 细辛 草决明 龙胆草 蔓荆子 青箱子 木贼草 蒺藜 防风 玄参

【用法】白水煎，食后服。

【主治】冰翳内障，有头疼、鼻颊骨疼，或因呕吐而起，其翳如冰雪之状，阴看不大，阳看不小者。

74353 通肝散

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】白芍一两 归身 川芎 茯苓各三钱 郁金 薄荷各一钱 香附 神曲各二钱 陈皮三分 苏叶五分 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人怀抱忧郁，肝气不通，子无血荫，以致胎动不安，两胁闷痛，如子上悬。

74354 通肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】梔子(炒黑) 白蒺藜(炒，去刺) 各一两 羌活二两 荆芥穗 当归 牛蒡子(炒，研) 甘草(炙) 各一两二钱

【用法】上为散。每服三钱，食后竹叶汤调服。

【主治】辘轳转关，睑硬睛疼，风热翳障。

74355 通肠丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】厚朴（去皮，生姜汁和膏，焙干，为细末） 猪胰等分

【用法】上用猪胰同和成膏，丸如梧桐子大。每服三十丸，生姜水送下，汤亦得。

【主治】大肠干结不通。

74356 通肠丸

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】大黄（酒浸） 滑石（飞研）各二两 陈皮（去白） 厚朴（姜汁制）各一两五钱 人参 当归 贯众（去毛） 干漆（炒烟尽）各一两 木香 槟榔各七钱五分 三棱（煨） 蓬术（煨） 川芎 薄荷 玄明粉 雄黄 桃仁泥 甘草各五钱

【用法】俱各另研，取细末，用竹沥等汁各二杯，烧酒、姜汁一杯，隔汤煮浓和丸，如芥子大。每服三钱，去枕仰卧，唾津咽下。通利，止后服。

【主治】反胃噎膈。

【宜忌】①《医学六要》：服此丸后，得药不反，切不可便与粥饭及诸饮食，每日用人参五钱、陈皮二钱作汤细啜，以扶胃气。②《准绳·杂病》：扶胃气，觉稍安，渐渐加人参，旬日、半月间方可小试陈仓米饮及糜粥。仓廩未固，不宜便贮米谷，常见即食粥饭者，遂致不救。

【备考】《准绳·杂病》本方用法：俱各另取细末，用竹沥、童便、韭汁、人乳、驴尿、芦根汁、茅根汁、甘蔗汁、烧酒、米醋、蜜各二杯，姜汁一杯，隔汤煮浓和丸。

74357 通肠丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】忍冬藤 归尾 白芷 皂角刺 乳香 没药 甘草 苡仁 花粉

【用法】用矾一两、黄占一两为丸。

【主治】肠痈，脓未成者。

74358 通肠汤

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】黑脂麻三钱 大黄 滑石 枳壳

各一钱 当归五分 绿豆七粒

【用法】水煎服。

【主治】痘疹大、小便秘结。

【加减】加牛膝一钱引经，易下。

74359 通肠饮

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】皮消（提过，净者）五分 葱白（连须）五枝（捣烂，加蜜少许）

【用法】用黄酒调饮。

【主治】大便不通。

74360 通肠饮

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】忍冬藤 归尾 白芷 皂角刺 乳香 没药 甘草 苡仁 花粉

【功用】解毒。

【主治】肠痈，脓未成者。

74361 通肠散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】枳壳 当归 大黄各一钱 芝麻三钱 牛膝一分

【用法】水煎服。

【主治】大便秘结。

74362 通应散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效》。

【组成】天南星（炮） 白僵蚕（炒） 干蝎（炒） 鱉（炮）各等分

【用法】上为细末。每服半钱，酒调灌之。

【主治】破伤风。

74363 通快饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】山楂一钱 麦芽 苍术 莱菔子 枳实 木通各七分 大黄 槟榔各一钱二分

【用法】加生姜三片，水煎，不拘时热服。

【主治】小儿痢疾始发。

74364 通快饮

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】黄连 茯苓各三钱 白芍一两 黄芩 车前子 枳壳各二钱 厚朴一钱

【用法】水煎服。

【功用】补阴液，泻湿热。

【主治】湿热作痢，大渴引饮，饭后又不甚快，心中懊恼，大便不利，红白相间，似脓非脓，似血非血。

74365 通灵丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】五灵脂一两 巴豆一两（去皮心，研，纸裹压去油） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 砒黄一分（细研） 川乌头一两（去皮脐，生用） 芫花半两（醋拌，炒令干） 皂荚一两（去黑皮，涂酥，炙令焦黄，去子） 自然铜一两（细研）

【用法】上为末，入巴豆，研令匀，别入生黑豆面二两，拌和令匀，滴水为丸，如绿豆大。每服二丸，生姜汤送下。膈上有涎即吐，有滞食血气即转下。

【主治】食癥及恶血气。

74366 通灵丸

【方源】《博济》卷三。

【组成】荆三棱 酸石榴（大者）二枚 杏仁 苦葶苈 甘遂 大戟 大黄 巴豆 芫花 五灵脂各一两 盐豉 乌梅各二两

【用法】上锉，用水一斗二升，入药于锅内同熬，候水尽，就锅内炒令黄焦色止，取出，杵罗为末，更入木香、青橘末各一两，拌匀，醋煮面糊为丸，如小豆大。每服三五丸，姜汤送下；心胸痞闷疼，橘皮汤送下；吃酒食饱闷，生姜汤或茶汤、温水送下亦可。

【功用】消化痰瘕。

【主治】久患癖块，或因气不和，即发疼痛，胸多痞塞。

【备考】方中荆三棱用量原缺。

74367 通灵丸

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】白附子 僵蚕各一两（炒去丝） 全蝎半两（炒） 麝香一字

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，温酒送下，一日三次。

【主治】男子、妇人手足痛风，不可忍者。

74368 通灵丸

《外科精义》卷下。为《圣济总录》卷一一四“巴豆丸”之异名。见该条。

74369 通灵丸

《仙拈集》卷二引《集验》。为《普济方》卷五十四引《卫生宝鉴》“麝香丸”之异名。见该条。

74370 通灵丹

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】安息香一钱五分 桑螵蛸一钱五分 阿魏一钱五分 朱砂五分 蓖麻子仁七个 巴豆仁七个 独蒜七个

【用法】上为细末，入二仁与蒜同研为丸，如枣核大。每用一丸，绵裹入耳内，觉微痛即去。

【主治】耳聋。

74371 通灵散

【方源】《产乳备要》。

【异名】催生通灵散（《卫生家宝产科备要》卷三）。

【组成】蛇蜕皮一条（全者）

【用法】上紧卷，以蚯蚓泥裹烧黑，为细末。每服一钱，温酒调下。

【功用】催生。

74372 通灵散

【方源】《普济方》卷三四二引《医学类证》。

【组成】人参 附子（炮） 熟地黄 木香（煨） 白术 干姜 牡丹皮 白芍药 陈皮（去白） 薯蓣 黄耆（蜜炙） 甘草（炙） 芎藭各等分（一方无人参）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，糯米四十九粒，煎八分，去米，温服，一日二次。妊娠初期预服之。

【功用】养胎。

【主治】曾因子宫久冷，血海虚羸，致令妊娠三两月，胎动不安，下血腹痛而胎堕者。

【宜忌】忌一切毒物。

74373 通灵散

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】益智仁 白茯苓 白术各等分

【用法】上为细末。每服二钱，用白汤或温酒调服，不拘时候。

【主治】心气不足，小便滑，赤白二浊。

74374 通灵散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】蒲黄 五灵脂各一两 木通 赤芍各五钱

【用法】每服四钱，水煎，临熟入盐少许，通口服。

【主治】①《医学入门》：九种心痛。②《医钞类编》：死血作痛。

74375 通灵散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】瞿麦一钱 归尾（酒洗） 赤芍（酒洗） 羌活 生地（酒洗） 花粉 石决明 草决明（炒） 黄芩（酒炒） 黄柏各八分 红花（酒洗） 苏木（酒洗）各五分 甘菊一钱二分 连翘七分

【用法】水二钟，煎八分，灯心作引，食后热服。

【主治】风砂入目，粘睛不脱，疼痛癢涩，流泪，闭目不开，日久生云翳，赤丝瘀血堆聚。

74376 通灵散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】山羊粪七个（烧烟尽，闷熄） 头发一团（烧存性）

【用法】上为末，烧酒送下，不论远年近日，永不再发。

【主治】心胃痛。

74377 通表散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】麻黄一两半（去根节） 赤芍药二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半两，枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠五月、六月或七月，卒患伤寒，烦热，四体疼痛，不得安卧。

74378 通苓汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】木通 猪苓 茯苓 车前子 淡竹叶 甘草 麦门冬

【功用】通利小便。

【加减】清心胃之热，加川连；清肺胃之热，加桔梗、黄芩、石膏；清肾火以滋真阴，加生地、黄柏、知母；气化不及，加人参以助肺气。

74379 通苓散

【方源】《得效》卷五。

【组成】猪苓（去皮） 白术（去芦） 泽泻（去毛） 赤茯苓（去皮） 车前子 木通 茵陈 瞿麦

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，灯心、麦门冬煎服。

【功用】分利水谷，解烦热，止泄泻。

【主治】①《得效》：泄泻属暑证者，伤暑，潮热烦渴，小便不利；肿满，口燥咽干，小便绝少。②《证治宝鉴》：热泻，肠鸣水泻，痛一阵，泻一阵，或出黄糜，或所下稠粘。

74380 通苓散

【方源】《医统》卷十六。

【组成】麦门冬 淡竹叶 车前穗 灯心各等分

【用法】水煎服。

【主治】伤暑，潮热烦渴，小便不利。

74381 通苓散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】麦门冬 淡竹叶 车前草 赤茯苓 木通

【功用】利湿清肺。

【主治】伤湿咳嗽，汗后。

74382 通苓散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】麦门冬 淡竹叶 车前子

【功用】流湿润燥。

【主治】湿热痢。湿热结于膀胱，小水不利。

74383 通苓散

【方源】《女科旨要》卷三。

【组成】赤苓 泽泻 木通 黄连 猪苓 各三钱 白术 瞿麦 杞子 滑石 车前子 各二钱

【用法】分四帖。加生姜三片，灯心十根，水煎，空心温服。

【主治】产后因血热积于小肠经，水道不利，小便紧涩不通，误将热毒物食之，致成淋漓。

74384 通郁汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍一两 茯神三钱 人参二钱 熟地三钱 玄参三钱 麦冬三钱 当归五钱 柴胡一钱 菖蒲五分 白芥子二钱 白术五钱

【用法】水煎服。一剂而郁少解，二剂而郁更解，四剂而郁尽解。

【功用】通肝气，补心肾。

【主治】肝郁不舒，忽忽如有所失，目前之事，竟不记忆，一如老入之善忘。并治诸郁，阴虚而兼郁者尤宜。

74385 通顶烟

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】川乌一两

【用法】上为末。烧烟熏碗内，热茶清泡碗内烟气服之。

【主治】诸头风，如斧劈，痛不可忍者。

74386 通顶散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《四十八候》。

【组成】石膏(煅) 薄荷花各一钱 川芎二钱(炙) 硼砂 牙消各半钱 甘草二寸(炙)

【用法】上为末。麝香、蜜水调。

【主治】风毒赤眼。

74387 通顶散

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】消石一分 滑石一分

【用法】上药于铤子内同炒令黄色，候冷，细研为末。每用少许，吹入鼻中。

【主治】头偏痛。

74388 通顶散

《圣惠》卷八十七。为原书同卷“吹鼻散”之异名。见该条。

74389 通顶散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】白矾灰一分 赤小豆一百粒 藜芦一分(去芦头) 丁香二十枚 黄连一分(去须) 田父一枚 麝香一钱(细研) 定粉一钱

【用法】上为细散，入麝香同研令匀。每使时，候儿睡着，以梗米大纳鼻中。有虫出，似马尾，长三二寸，便是瘡病也。

【主治】小儿一切瘡。

74390 通顶散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】青黛一分(细研) 蟾酥半杏仁大(研入) 赤小豆二十粒 麝香半分(细研) 藜芦一分 瓜蒂十枚

【用法】上为细散。每度用一绿豆大，吹入鼻中。当有虫子出，如米心大，黑者难治，赤白黄者易疗。

【主治】小儿一切瘡。

74391 通顶散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】龙脑(研) 地龙(去土，炒) 瓜蒂 赤小豆(炒) 马牙消(研) 各等分

【用法】上为散。每用一小豆许，食后含水搐入两鼻内。

【主治】风头痛、偏正头痛，不可忍者。

74392 通顶散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】藜芦(研)半两 黄连(去须)三分

【用法】上为散。每用少许，搐入鼻中。

【主治】头痛，鼻塞，胸闷。

74393 通顶散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】马牙消(研细)半两 地黄汁一合

【用法】上药于铜器中用慢火煎令干硬,取出研细。每挑少许入鼻搐上。吐痰即愈。

【主治】鼻塞及风痰头痛。

74394 通顶散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】苦葫芦子四十九粒 谷精草一钱 瓜蒂十四枚(烧灰) 乳香(研)半钱 薄荷叶一钱

【用法】上为末。入龙脑少许,鼻内搐一字。

【主治】赤眼肿痛。

74395 通顶散

《圣济总录》卷一一六。为《圣惠》卷三十七“吹鼻通顶散”之异名。见该条。

74396 通顶散

【方源】《幼幼新书》卷九引《吉氏家传》。

【组成】藜芦不拘多少

【用法】上为细末。用竹管吹少许入左右鼻。

【主治】急慢惊风,眼目上视,手足搐搦,牙关不开。

74397 通顶散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】干姜 香白芷各半两 蒿角子一钱

【用法】上为细末。每日用半钱许,作三次细细搐入鼻内。揉动两太阳穴,其痛立止。

【主治】偏正头痛不可忍,诸药无效,及赤眼、牙痛。

74398 通顶散

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】石膏四两(煨) 荆芥一两半 川芎三两 薄荷五钱

【用法】上为细末。每服二钱,食后茶清调下。

【主治】头风。

74399 通顶散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】川芎 细辛(去叶土) 香白芷

藿香叶(去土)各七钱 踯躅花 谷精草各半两

【用法】上为细末。每用先含新汲水一口,然后挑少许搐在鼻内,以手揉两太阳穴。

【主治】风毒攻眼并夹脑风。

74400 通顶散

【方源】《朱氏集验方》卷一引《叶氏录验方》。

【组成】黄踯躅一分(为末) 雄黄一分(研,飞) 北细辛半两(为末)

【用法】上和匀。挑少许搐入鼻中,即醒。

【主治】初中风,口噤,不省人事,或伤风头疼昏眩。

74401 通顶散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】石膏 川芎 瓜蒂各等分 藜芦少许

【用法】上为细末。鼻内搐之。

【主治】风疾。

74402 通顶散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】瓜蒂 藜芦各一分 皂角肉半分 麝少许

【用法】上为末。吹些入鼻。

【主治】①《直指》:鼻鼈。②《奇效良方》:风热眼疼,肿胀作楚。

74403 通顶散

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】藜芦(去苗土)半两 踯躅花(去土)一钱 藿香叶(去土)二钱

【用法】上为细末。每用纸拈蘸药,鼻内搐,不拘时候。

【主治】风痰眩晕,头目大痛及偏正不定发作,神志昏愤,或冒风寒,鼻塞声重。

74404 通顶散

【方源】《杂类名方》。

【组成】石膏 川芎 赤小豆 瓜蒂各一钱 藜芦少许

【用法】上为细末。噙水搐之。取嚏。

【主治】《普济方》：风头痛。

74405 通顶散

【方源】《丹溪心法》卷一。

【组成】藜芦 生甘草 川芎 细辛 人参各一钱

【用法】上为末，吹入鼻中一字。就提头顶中发，立苏。有嚏者，可治。

【主治】中风、中气，昏愦不知人事者。

74406 通顶散

【方源】《原机启微》。

【组成】川芎 薄荷各半两 茵陈 甘草各四钱 朴消三钱（甜消亦可）

【用法】上为末。用少许吹鼻中。即效。

【主治】小儿脑热，脑枕骨痛，闭目不开，或头风痛，攒眉啼哭，并赤目。

【加减】如要嚏喷，加踮躅花一钱。

74407 通顶散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】川芎 白芷 谷精草 藜芦 防风 薄荷 牙皂 蔓荆子 细辛 蒲黄

【用法】上为末。口含水搐之，吹入鼻内亦可。

【主治】一切头风。

74408 通顶散

【方源】《医方考》卷一。

【组成】藜芦 生甘草 人参 川芎 细辛各一钱 石膏五钱

【用法】共为末。每用一字，吹入鼻中。有嚏者，肺气未绝，可治。

【主治】初中风，不知人事，口噤不能开者。

【方论选录】①《医方考》：中风不知人事病则急矣，以平药与之，不能开其壅塞，故用藜芦与人参、细辛相反，使其相反而相用也。肺苦气上逆，故用石膏之重以坠之，甘草之平以缓之。乃川芎之用，取其清气利窍而已。②《医钞类编》：藜芦苦寒有毒，入口即吐，能通脑顶，令人嚏；细辛散风通窍，温经破痰；石膏辛寒，入肺降火；川芎，取其清气利窍，升清阳而开诸郁；用人参者，祛驾其邪，与藜芦相反

而相成也。

74409 通顶散

【方源】《医级》卷八。

【异名】透顶散。

【组成】藜芦 甘草 人参 川芎 石膏

【用法】上为末，吹鼻探嚏，以验肺气，有嚏可治，无嚏不治。

【功用】激嚏。

【主治】中风卒仆及诸昏厥不省之候。

74410 通齿汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】当归 红花 生地 熟地 桃仁 升麻 甘草 火麻子

【用法】水煎服。

【主治】妇女痘，大便秘结。

74411 通肾汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】菖蒲（锉） 羚羊角（镑） 生干地黄（焙） 赤芍药各二两 五加皮（锉） 甘草（炙，锉） 猪苓（去黑皮） 泽泻各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服。

【主治】解体。少气不欲言，脊脉急痛，腰背强直，足下热疼，小便癃闭，心烦噤干。

【方论选录】《古方选注》：解，舒缓也；体者，疑也，不可必之辞。病有脊脉痛，少气安卧，不欲言，诊其尺脉沉缓而涩，察其病疑于寒，亦疑于热；疑于壮，亦疑于弱，此作强之官精气内滞，不能运行于形体也。以菖蒲、五加皮通九窍，强志意，能运动肾精；猪苓、泽泻助阳通窍，起阴利肾；生地、羚羊角起阴气，强筋骨；赤芍入阴散气；甘草入肾缓急。

74412 通肾散

【方源】《医钞类编》卷十一。

【组成】茴香 木通 全蝎 元胡索 陈皮 石菖蒲各一钱 羌活 僵蚕 川芎 蝉蜕各五分 山甲二钱 甘草一钱半

【用法】上为末。每服三钱，酒调下。

【主治】气闭不通，耳聋。

74413 通鸣散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引张涣方。

【组成】菖蒲（一寸九节者） 远志（去心）各一两 柴胡（去苗） 麦门冬（去心） 防风各半两 细辛 甜葶苈各一分（上为细末） 磁石一分（捣碎，水淘去赤汁，研） 杏仁二十七粒（汤浸，去皮尖，研）

【用法】上为末。每服半钱，乳食后煎葱白汤调下，一日二次。

【主治】小儿耳聋病。

74414 通明丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】麦门冬三斤 干地黄 石韦各一斤 紫菀 甘草 阿胶 杜仲 五味子 肉苁蓉 远志 茯苓 天雄各半斤

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服十九，加至二十九，食前酒送下，一日二次。

【主治】五劳七伤六极，强力行事举重，重病后骨髓未满，所食不消，胃气不平。

【方论选录】《千金方衍义》：方中滋阴助阳、益精补血、坚骨充髓之药萃聚十一味中，因以通明命方，言周身脏腑得此无不通彻。

74415 通明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】石决明（刮洗） 芍药 桔梗（锉，炒） 车前子各一两 羌藟子 熟干地黄（焙）各二两 细辛（去苗叶）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，临卧盐汤送下。

【主治】肝肾气虚，眼目昏暗，时见黑花飞蝇。

74416 通明丸

【方源】《普济方》卷二九六。

【组成】鸭嘴青胆矾（煨）

【用法】上为末。青蜜调，笔敷。

【功用】消脱。

【主治】诸痔。

【备考】本方方名，据剂型，当作“通明散”。

74417 通明汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】木通（锉） 萎蕤 甘草（炙）各一两半 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，下芒消、地黄汁各少许，再煎沸，食后温服。

【功用】散三焦热。

【主治】小眦偏赤，赤脉射黑睛。

74418 通明汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】通明散（《秘传眼科龙木论》卷一）。

【组成】柏子仁（捣，研）二两 防风（去叉） 羌藟子各一两 车前子 桔梗（炒）各二两 人参 白茯苓（去黑皮） 玄参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓。食后、临卧温服。

【主治】内障，黑水凝翳。

74419 通明饮

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】羚羊角（镑） 地骨皮（锉） 山梔子仁 柴胡（去苗）各一两 蔓荆实 芍药 蕤仁各三分 枳壳（去瓤，麸炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓食后温服，一日二次。

【主治】眼生胬肉。

74420 通明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】柏子仁二两 防风一两半（去芦头） 羌藟子一两 车前子二两 前胡一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 蔓荆子一两，黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后及临卧温服。

【主治】风内障，黑水凝翳，恐绝三光。

74421 通明散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】人参 防风 黄芩各一两 细辛一两半 茯苓半两 羌蔚子二两

【用法】上为末。水一盞，散一钱，煎至五分，夜食后去滓温服。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：肝肾俱劳，脑风积热，致生偃月翳内障。②《普济方》：眼生翳膜赤脉，胥肉涩痒，疼痛有泪。

74422 通明散

《秘传眼科龙木论》卷一。为《圣济总录》卷一一二“通明汤”之异名。见该条。

74423 通明散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄 防风 干葛 菊花 谷精草（焙） 蝉蜕 天花粉各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】痘后余毒，眼生翳障。

【加减】眼赤肿，加黄连、梔子；翳厚，加木贼。

74424 通明散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】升麻 山梔子各一两半 细辛 川芎 白芷 防风 羌活 草决明 白及 白藜 夏枯草各一两 杨梅皮 蝉蜕 五倍子各五钱 甘草一钱

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，淡竹叶七片同煎，食后温服。

【主治】眼目患后损其经络，喜怒哀乐之情有伤于心，气轮受病，致成气眼，发作不时。

74425 通畅饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】麻仁（研为泥） 桃仁（去皮尖） 杏仁（去皮尖） 当归 滑石各一钱五分 瓜蒌仁（去壳） 郁李仁（去壳） 玄明粉 陈皮 枳壳各一钱

【用法】水煎，临服入蜜一两，热服。

【主治】血枯肠燥，大便闭结。

74426 通畅饮

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】当归 白茯苓 通草 菖蒲 红花 木香 香附 青皮 前胡 山楂 枳壳 川芎 桔梗 升麻 乌药 苏子

【功用】疏通经络。

【主治】痘疹见点之时，气滞血凝，出现恶症。

【加减】从下引上，去乌药、苏子；从上引下，去芎、桔、升麻（上下以喉为界）。锁眉、填胸，心火也，加黄连；锁喉，肺火也，加黄芩；锁腰，命门火也，加知母（盐水炒）；闷顶，去苏子。

【宜忌】血热血瘀症，禁用通草，以木通代之。

74427 通和汤

《卫生宝鉴》卷十八。为方出《圣惠》卷八十一，名见《圣济总录》卷一三二“鲮鲤甲散”之异名。见该条。

74428 通乳丹

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】生乳丹。

【组成】人参一两 生黄耆一两 当归二两（酒洗） 麦冬五钱（去心） 木通三分 桔梗三分 七孔猪蹄二个（去爪壳）

【用法】水煎服。二剂而乳如泉涌矣。

【功用】补气血，生乳汁。

【主治】产后气血两虚，乳汁不下。

74429 通乳汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】猪蹄（下节）四只 通草二两 川芎一两 穿山甲十四片（炒） 甘草一钱

【用法】上用水五升，煮汁饮之。更以葱汤频洗乳房。

【功用】《杂病源流犀烛》：下乳。

【主治】产后气血不足，经血衰弱，乳汁涩少。

【宜忌】忌生冷，避风寒，夜卧不宜失盖。

74430 通乳汤

【方源】《医学六要》卷七。

【组成】猪蹄（下节）四只 通草二两 川

芎一钱 川山甲十四片(炒) 甘草一钱 归身一钱

【用法】用水五升,煮汁饮。外以葱椒汤频洗为佳。

【主治】产后气血不足,乳汁涩少。

【宜忌】忌生冷。

【方论选录】《医略六书》:产妇经血不足,不能上奉而化液为乳,故乳窍不通,乳汁不出焉。当归养血脉以荣经脉,川芎入血海以行血气,猪蹄资津液以上奉,通草通乳窍以成浆,穿山甲行散血气以出乳汁也。水、酒各半煎,使经血内充,则乳汁自化而乳窍无不通,何有乳汁不出之患哉?

74431 通乳汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】牡蛎三钱(炒) 川贝二钱(去心) 胡桃肉一个

【用法】水煎,加酒服。

【主治】乳汁不通,或经络凝滞,将成痈肿者。

74432 通乳汤

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】当归五钱 白芍四钱 川芎三钱 王不留行三钱 熟地四钱 炙山甲二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】妇人乳汁缺乏。

【加减】脉弦者,乃气逆郁结,加木香、郁金各三钱;脉缓者,乃脾胃虚弱,加焦术、茯苓各三钱。

74433 通乳饮

【方源】《医统》卷九十七。

【组成】川当归一钱半 王不留行一钱半 川芎八分 穿山甲七片(炒,研末) 木通一钱 漏芦一钱 升麻一钱 甘草节一钱

【用法】上用水二盏,生姜三片,大枣一枚,煎一盞,稍热服。随饮酒数杯以助药力。

【主治】养子妇人无乳及未行经者。

74434 通乳饮

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三钱 花粉三钱 王不留行一钱半 甲片一钱半 甘草八分

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】乳汁不出,脉涩数者。

【方论选录】产后阳明热滞,血液素亏,不能化液为乳,故乳汁不出焉。当归养血荣经脉;花粉清热润血燥;王不留行力能行散,以化乳汁;穿山甲性善走窜,以出乳汁;甘草泻火缓中,以和胃气也。水煎温服,使阳明热化,则滞气自行而液化为乳,安有乳汁不出之患乎?

74435 通乳散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】王不留行 天花粉各三钱 甘草梢 穿山甲(炙脆)各五钱

【用法】上为细末。每服三钱,热酒调下。

【主治】乳汁不下与来而少者。

74436 通乳散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】木通 赤芍 天花粉 白芷 通草 桔梗 连翘 甘草各五分 瞿麦一钱 青皮一钱半 (或加柴胡)

【主治】乳汁不下与来而少者。

【宜忌】服此方仍服猪蹄汤,再用木梳梳之。

74437 通乳散

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】当归三钱 川芎一钱 熟地二钱 瞿麦一钱 花粉一钱 通草一钱 山甲一钱(土炒) 生麦芽一钱 王不留行一钱(炒)

【用法】上为末。每服二钱,滚水加黄酒冲服。

【功用】通络生血。

【主治】产后经络闭塞,或气血不足,无乳,或有而甚少。

74438 通乳煎

《仙拈集》卷三。即《达生篇》“通脉汤”。见该条。

74439 通乳煎

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】当归 王不留行 天花粉 甘草 柴胡 穿山甲 香附子

【用法】上作大剂，水煎。凡欲服此药，先以赤小豆二合煮熟，食一盞讫，服药汁一碗，复每历一炊时，服药食小豆如前法，最后寻饮温酒少许。

【主治】产后乳汁少者。

74440 通命丸

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】大黄四分 远志四分（去心） 黄耆四分 麻黄四分（去节） 甘遂四分 鹿茸四分（炙） 杏仁六十枚 豉一合 巴豆五十枚 芒消三分（一方无鹿茸、黄耆，用黄芩）

【用法】上为末，蜜为丸，如小豆大。先食服三丸，一日二次。

【主治】心腹积聚，寒中疔痛，及心胸满，胁下急，绕脐痛。

【宜忌】忌芦笋、野猪肉。

74441 通命丸

【方源】《外台》卷七引《古今录验》。

【组成】大黄 远志（去心） 黄芩 麻黄（去节） 甘草（炙）各四两 芒消三两 杏仁六十枚（去皮尖） 豉二合 巴豆五十枚（去心皮，熬，别为脂）

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。先食饮服三丸，一日三次。

【主治】心腹积聚，寒中绞痛，叉心迫满，胁下胀痛。

【宜忌】忌野猪肉、芦笋、海藻、菘菜。

74442 通命丸

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】茯苓六分 甘草六分（炙） 杏仁六分（去皮尖，熬） 牛膝七分 黄芩五分 阿胶三分（炙） 防风四分 干天门冬六分（去心） 芍药六分 大黄六分 当归六分 干姜六分 干地黄七分 人参六分 桂心三分 干漆四分（熬） 紫菀五分 白术四分

苁蓉五分 吴茱萸三分 蜀椒三分（汗） 石斛三分

【用法】上为末，以枣膏、蜜为丸。每服七丸，食前服，一日三次。不知渐增，以知为度。病剧者，夜更一服。

【主治】虚劳百病，七伤六极，少气羸弱，不能饮食。

【宜忌】忌茺萸、鲤鱼、生葱、海藻、菘菜、桃、李、雀肉、酢等。

74443 通命散

【方源】《普济方》卷三八〇引《医方妙选》。

【组成】瓜蒂半两 细辛一分 干地龙（炒）一分 白矾一分 藜芦一分（去芦头）

【用法】上为细末。每用少许，吹鼻中，得嚏即吉。若有虫出，即愈。

【主治】一切疳证。

74444 通肺汤

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】人参 前胡（去芦头） 细辛（去苗叶） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄） 桂（去粗皮） 甘草（炙）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，入生姜少许，枣一枚（擘破），煎至五分，去滓温服，不拘时候，量大小加减。

【主治】小儿肺寒，鼻多浊涕，精神不爽，不思乳食。

74445 通泄散

【方源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】苦丁香（为末）三钱

【用法】上加轻粉一字，水半合，调匀灌之。良久涎自出。如未出，含砂糖一块，下咽涎出。

【主治】①《丹溪心法附余》：痫病，风涎暴作，气塞倒仆。②《东医宝鉴·内景篇》：忽患癫狂不止或风涎暴作，气塞倒仆。

74446 通经丸

【方源】《本事》卷十。

【异名】椒姜通经丸（《医略六书》卷二十六）。

【组成】桂心(不见火) 青皮(去白) 大黄(炮) 干姜(炮) 川椒(去目并合口, 微炒, 地上出汗) 蓬莪术 川乌(炮, 去皮尖) 干漆(炒令烟出) 当归(洗, 去芦, 薄切, 焙干) 桃仁(去皮尖, 炒) 各等分

【用法】上为细末, 将四分用米醋熬成膏, 和余六分末为丸, 如梧桐子大, 阴干。每服二十丸, 加至三十丸, 用淡醋汤送下, 温酒亦得, 空心食前服。

【功用】①《本事方释义》: 去故生新。②《全国中药成药处方集》(沈阳方): 调理经闭。

【主治】经闭腹痛, 血瘕, 妊娠腹痛, 吐血。

①《本事》: 妇人室女月候不通, 疼痛, 或成血瘕。②《普济方》引《医学类正方》: 怀妊三四个月, 头晕腹痛, 不能饮食, 日渐羸瘦。③《医方类聚》引《仙传济阴方》: 吐血上行。

【方论选录】《医略六书》: 经寒血闭, 结成瘕瘕, 故冲脉不行, 月经不通焉。当归养血活血以荣经脉, 桂心暖血温经以通经闭; 川椒补火散寒, 干姜温中开结; 桃仁破积血以通经, 干漆消除垢以化积; 青皮平肝破瘕, 蓬术削积溃瘕; 川乌振发生阳之气, 大黄荡涤陈积之结也。醋以丸之, 酒以行之, 使经寒解散, 则血闭自行而瘕瘕无不退、月经无不通矣。

【临证举例】《普济方》引《医学类正方》: 经闭腹痛 尝有一妇人经水不行, 腹中疼痛, 诸医皆进温中治寒气药剂, 其痛尤甚。告之亲族曰: 痛不能忍, 欲求自尽。举家无主。因看《本事方》通经丸论说, 遂合, 数服顿愈。妊娠腹痛 一妇人怀妊三四个月, 头晕腹痛, 不能饮食, 日渐羸瘦, 沉重危困, 医治不效, 已办后事。偶得通经丸服之, 痛止, 进食如故。月数满足, 遂生一女, 子母皆安。

【备考】《永类铃方》: 入鸡子清同丸, 畏漆人肠胃生疮也。

74447 通经丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归(去芦, 酒浸)一钱半 蓬术

(炮) 桂心(不见火) 青皮(去白) 大黄(炮) 干姜(炮) 桃仁(去皮尖, 炒) 干漆(炒令烟尽) 红花 川椒(去目及闭口者, 微炒, 放地上密盖出汗) 各一钱

【用法】上为末, 将一半用醋煮, 熬成膏, 一半入鸡子清同捣匀为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心淡醋汤送下。

【主治】①《济生》: 室女血瘕, 月经不通, 脐下坚结大如杯, 发则寒热往来。②《杏苑》: 瘀血停留, 月水不通, 腹中疼痛, 属气实者。

【备考】《杏苑》有川芎。

74448 通经丸

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《医林方》。

【组成】木香半两 当归半两 芍药一两 干漆半两(炒令烟尽为度) 五灵脂半两 桂半两 广茂一两 水蛭二钱半(微炒) 大黄半两 蜈蚣三十个(去头足翅, 微炒) 桃仁二十七枚(汤浸, 去皮尖)

【用法】上为细末, 醋面糊为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食前温醋汤或温酒送下, 日进一服。

【主治】妇人经血凝滞不行, 脐腹腰背疼痛, 渐成血瘕。

74449 通经丸

《普济方》卷二二一。即《御药院方》卷六“通络丸”。见该条。

74450 通经丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】熟地黄三两 虻虫(去头翅, 炒) 水蛭(糯米炒) 桃仁(去皮尖) 各五十个

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服五丸, 渐加至七丸, 空心酒送下, 以通为度。

【主治】经闭不通, 结积成块。

74451 通经丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】归尾 桃仁(去皮尖) 大黄(煨) 丹皮 干漆(炒烟尽) 肉桂各一两

三棱五钱 莪术(醋炒) 牛膝各一两 麝香八分

【用法】上为末，皂角五钱，芫花二钱，水煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】经闭不通及血块疼痛。

74452 通经丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】斑蝥二十个(糯米炒) 大黄五钱 桃仁四十九个

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸，甚者十五丸，空心酒送下。

【主治】经闭并干血气属血实气滞者。

74453 通经丸

【方源】《准绳·类方》卷三。

【组成】仲景抵当丸加穿山甲 广茂 桃仁 桂

【用法】蜜为丸。

【主治】蓄血。

【宜忌】妇人伤寒妊娠不可以此丸下。

74454 通经丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】川椒(炒去目) 蓬术(煨) 干漆(炒烟尽) 干姜(炮) 大黄(酒蒸) 桂心 桃仁 川乌各七钱 当归一两 青皮一两(炒) 红花七钱 紫葳七钱 牛膝七钱 刘寄奴七钱

【用法】上为末，将一半药用米醋熬成膏，和前余药末一半为丸，如梧桐子大，阴干。每服五十丸，空心温酒酣汤送下。

【主治】室女妇人，经脉不通，脐腹疼痛，潮热，或成瘕症。

74455 通经丸

【方源】年氏《集验良方》卷五。

【组成】黑牵牛 神曲各等分

【用法】上为细末，面为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心好黄酒送下。

【主治】妇人干血经闭。

74456 通经丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】当归尾 赤芍药 生地黄 川芎 牛膝 五灵脂各一两 红花 桃仁各五钱 香附二两 琥珀七钱五分

【用法】苏木屑二两煎酒，和砂糖熬化为丸，如梧桐子大。每服三钱，酒送下。先发水肿，然后经断者，名曰水分，五皮饮送下；体虚者，用理中汤送下。

【主治】妇人经水先断，后发水肿，名曰血分。

【加减】血寒，加肉桂三钱。

74457 通经丸

《金鉴》卷四十三。为《本事》卷四“药棋子”之异名。见该条。

74458 通经丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】桂心 青皮 大黄 姜炭 蓬术 干漆 当归 桃仁 延胡索

【主治】妇人因经闭而火升，致喉症肿痛者。

74459 通经丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】三棱(醋炒) 莪术(醋炒) 当归(酒洗) 川芎 赤芍 芫花 穿山甲(炒) 刘寄奴

【用法】粳米糊为丸。酒送下。

【主治】室女月经初来，不知保养，误饮冷水或用冷水洗衣、洗手，血见冷而凝，以致经闭，面色青黄，遍身浮肿。

【备考】《女科秘要》本方用三棱、莪术各五钱，川归、川芎、赤芍各一两，穿山甲六钱，芫花四钱，刘寄奴三钱。

74460 通经丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】刚铁五十钱 大黄三十钱 没药二十五钱 冰糖适宜

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服五十粒，白汤送下。

【主治】妇人月经不利，男子劳瘵，或诸般

内障及属于虚证之病。

74461 通经丸

【方源】《增辑验方新编》卷九。

【组成】三棱 莪术 赤芍 川芎 当归 紫苑 刘寄奴各八分 穿山甲一片

【用法】上为末，米糊为丸。酒送下。

【主治】①《增辑验方新编》：室女经闭，遍身浮肿。②《丸散膏丹集成》：月经不通，或成血瘕。

74462 通经丸

【方源】《女科证治约旨》卷二。

【组成】桂心 川乌 桃仁 当归 附子 干姜 川椒 大黄 青皮各等分

【用法】上为末，准一两，以四钱用米醋熬成膏，和余药末六钱为丸。淡醋汤送下；温酒亦得。

【主治】蓄血，月水不调，疼痛，或成血瘕。

74463 通经汤

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】蛇床子三两 左顾牡蛎三两（为末） 浮萍草三两 草香附子三两（为末） 磁石二两（引针试有力者，杵如豆大，用绢袋盛，煎十遍，勿用）

【用法】用向阳仰泉水一斗，同上件药煎至七升，滤滓，贮于瓶中。临卧阴器贮于瓶口中，提地户三七遍，熏浸少时，倾于盆子中，通手淋洗少时。

【主治】真气不足，暴感寒邪，阴阳升降失常，手足厥冷，囊缩或小腹急痛。

74464 通经汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍 生地黄 大黄 官桂 厚朴 枳壳 枳实 黄芩 苏木 红花 乌梅

【用法】上锉一剂。姜、枣煎服。

【主治】妇女经闭。

【备考】《妇科玉尺》本方用四物汤加大黄、官桂、厚朴、枳壳、枳实、黄芩、红花、苏木各七分，乌梅一，姜三，枣二。

74465 通经汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄 当归 川芎 白芍 川楝子（炒） 小茴香 槟榔 玄胡索 木香 各七分

【用法】水煎，食前服。

【主治】血涩不行，经水将来而脐腹绞痛。

74466 通经汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归 川芎 柴胡 黄芩 白芍 各八分 香附一钱二分 青皮 砂仁 甘草 各四分 熟地 白术（蜜炙） 陈皮 枳壳（麸炒） 小茴（炒） 三棱 莪术 红花各五分 白芷六分 肉桂三分

【用法】姜三片，葱白三根，水煎。空心服。

【主治】室女十五六岁，误食生冷，经水不通，日夜寒热，手足麻痹，头痛，恶心呕吐，腹中忽然结块冲痛。

【加减】上部痛，加羌活五分；下部痛，加独活五分；咳嗽，加半夏、玄胡索、干漆各七分；寒热疟疾，加常山、草果各七分；泄泻，加肉豆蔻（煨）、粟壳、木香各七分。

74467 通经饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】红花 归尾 寄奴 牛膝 紫苑 赤芍 甘草 苏木 官桂 白芷

【用法】水、酒煎服。

【主治】①《女科万金方》：经事不通，寒热头疼。②《郑氏家传女科万金方》：寒热，经事不通，呕吐，咳嗽，头痛。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有紫葳花，无紫苑。

74468 通经饮

【方源】《仙拈集》卷三引《汇编》。

【组成】厚朴（炙）二两 桃仁 红花各三钱

【用法】水煎一碗，空心二次服。二剂立通。

【主治】妇人月水不通。

74469 通经散

【方源】方出《圣惠》卷七十二，名见《普济方》卷三三三。

【组成】鼠屎一两（烧灰）

【用法】上为细末。每服一钱，空心以温酒调下。

【主治】室女月水不通。

74470 通经散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】斑蝥（去翅足，炒） 虻虫（麸炒，去羽） 水蛭（麸炒）各四十枚 杜牛膝半两 当归（洗，焙）三钱 红花三钱 滑石一分

【用法】上为细末。每服一钱，加生桃仁七枚（细碎），食前用温酒调下。如血未通，再服，以通为度。

【主治】冲任不调，经脉闭塞，久而不通，渐成坚瘕，服寻常通经药不效者。

74471 通经散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】陈皮（去白） 当归各一两 甘遂（以面包，不令透水，煮百余沸，取出，用冷水浸过，去面焙干）

【用法】上为细末。每服三钱，临卧温汤调下。

【功用】《东医宝鉴·外形篇》：下水湿。

【主治】落马堕井，打扑闪肭损折，汤沃火烧，车碾大伤，肿发焮痛，日夜号泣不止；或膝踝肘腕大痛，腰胯胁痛；或腰痛气刺，不能转侧，不能出气，不食；或膝被肭跛行，行则痛数日。卒疝，赤肿大痛，数日不止；寒疝，脐下结聚如黄瓜，每发绕腰急痛不能忍。贲豚。风寒湿三气，合面为痹，及手足麻木不仁。蛇虫所伤；或为犬所啮，胫肿如罐，坚若铁石，毒气入里，呕不下食，头痛面重。风水，喘不能食，遍身皆肿；或浑身肿绕，阴器皆肿，大小便如常，其脉浮面大。项疮，状如白头，根红硬，疼痛不可忍，项肿及头，口发狂言，如见鬼神。代指，痛不可忍。痰隔，咽中如物塞，食不下，中满。嗽血。目翳，目

赤多泪。经水不行，寒热往来，面色萎黄，唇焦颊赤，时咳三两声。黄疸，面黄如金，遍身浮肿，乏力，惟食盐与焦物；或脾疸，湿热与宿谷相搏，善食而瘦，四肢不举，面黄无力。黄病，遍身浮肿，面如金色，困乏无力，不思饮食，惟喜食生物泥煤之属。收产伤胎，经脉断闭，腹如刀刺，大渴不止，小渡闷绝，口舌枯燥，牙齿齩黑，臭不可闻，食饮不下，昏愤欲死。肥气积，初如酒杯，大发寒热，十五余年后，因性急悲感，病益甚，唯心下三指许无病，满腹如石片，不能坐卧。积气二十年，视物不真，细字不睹，当心如顽石，每发痛不可忍，食减肉消，黑黧满面，腰不能直。伤寒瘀血，心胸痞闷，不欲饮食，身体壮热，口燥舌干，小便赤色，大便色黑。

【宜忌】闪肭膝踝肘腕大痛、腰胯胁痛、杖疮落马、坠堕打扑者，忌热酒。

【临证举例】代指 麻先生妻，病代指痛不可忍，酒调通经散一钱，半夜先吐，吐毕而痛减。

74472 通经散

《普济方》卷三三三。即《朱氏集验方》卷十“神授散”。见该条。

74473 通经散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】斑蝥（去头足） 大黄（酒浸）三钱 藿香少许

【用法】上斑蝥量疾远近轻重用之，如一年，壮者用七八个，每服七八分，弱者五六个，每服五六分；如五六个月，壮者五六个，每服五六分，弱者四五个，每服四五分。俱为末。未服之先，以热水漱口令净，即食枣三四枚，将药用温酒一钟调服，再食枣三四枚，静卧，勿令人搅扰。待腹疼二三阵，其经即行。如腹不疼，再进一服，立通。后服平胃散，以复胃气也。

【主治】经闭。

【宜忌】忌气恼、生冷、油腻。

74474 通经散

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】陈皮一两 甘遂(煨)一两 当归尾一两五钱 川芎一两 红花一两(酒洗) 桃仁一百个(去皮尖)

【用法】上锉。每服七钱，水二钟，酒一钟，煎至八分，空心服。

【功用】活血定痛。

【主治】①《明医指掌》：女人瘀血积滞，经闭，腹中痛。②《证治宝鉴》：因跌扑或吐衄后，经行呕止，血滞腹痛，日轻夜重，其痛有常处，一块不移，喜热恶冷，口干，或口中常觉血腥气，其血已结块，脉粗涩。

74475 通经散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归 生地 梔子 薄荷 赤芍 黄芩(酒洗)各一两 大黄八钱 红花二两 黄连六钱 川芎六钱 羌活六钱 甘草三钱 苏木六钱 木贼五钱

【用法】上为极细末。每服二钱，姜皮汤调下。

【功用】《金鉴》：破血通经。

【主治】妇人、室女因血热而经逆上行，血灌瞳仁，或患久血死在目珠而生胬肉。

【备考】《金鉴》有香附一两。

74476 通经散

【方源】《女科旨要》卷四。

【组成】川牛膝 当归 刘寄奴 红花 苏木 肉桂 白芷 急性子 白芍 甘草各等分

【用法】上为末。每服四钱，酒送下。

【主治】妇人月经不通。

74477 通经散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】苏木一两 大黄五钱 红花一两 黄芩二两 黄连 羌活 薄荷 黑梔子 香附 生地黄 当归 赤芍药 木贼 甘草 川芎各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一盂半，

煎至七分，去滓，食后温服。

【功用】破血通经。

【主治】女子血热逆经，血灌瞳仁，满眼赤涩或生胬肉。

74478 通经散

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】刘寄奴二钱 当归尾 穿山甲(炒) 赤芍 红花 玄胡索 莪术(醋炒) 乌药(炒) 牡丹皮(酒洗) 川牛膝(酒洗) 三棱各一两(醋炒) 官桂 辰砂(另研)各三钱

【用法】上为极细末。每服二钱，空心温酒调服，或薄荷汤调服。

【主治】室女经闭，血瘀腹痛，攻刺小腹，坚硬成块。

74479 通经散

【方源】《产科发蒙》。

【组成】紫檀 红花 牛膝各二钱 肉桂 白矾 代赭石各一钱

【用法】上为细末。分作五帖，三日服尽。

【主治】妇人经水不来。

【加减】倘经水不来者，更加枯矾二分。

74480 通经膏

【方源】《理渝》。

【组成】全当归五两 酒川芎 苍术 熟地 乌药 半夏 大黄 酒芍 附子 吴萸 桂枝 红花各二两 羌活 独活 防风 党参 黄耆 白术 萸肉 白芷 细辛 荆芥 穗 秦艽 制厚朴 青皮(醋炒) 陈皮 枳实 苏木 生香附 炒香附 生灵脂 炒灵脂 生延胡 炒延胡 生蒲黄 炒蒲黄 莪术(醋炒) 三棱(醋炒) 姜黄 灵仙 草果 山楂 麦芽 神曲 槟榔 南星 杏仁 桃仁 菟丝饼 蛇床子 杜仲 续断 熟牛膝 车前子 泽泻 木通 炙草 甘遂(煨) 葶苈 黑丑(炒黑) 巴仁 益智仁 大茴 川乌 五味子 良姜 远志肉(炒) 黄连 炮山甲 木鳖仁 蓖麻仁 柴胡各一两 炒蚕砂 飞滑石各四两 发团二两 皂

角一两六钱 生姜二两 葱白 韭白各一两
大蒜头 桃枝各四两 槐枝 柳枝 桑枝各
八两 凤仙(全株) 菖蒲 干姜 炮姜 白
芥子 艾 川椒 胡椒 大枣各一两 乌梅
五钱

【用法】上共用油二十四斤，分熬丹收。再入雄黄、枯矾、官桂、丁香、木香、降香、乳香、没药、砂仁、轻粉各一两，牛胶四两(酒蒸化。俟丹收后，搅至温温，以一滴试之，不爆，方下。再搅千余遍，令匀，愈多愈妙。勿炒珠，炒珠无力，且不粘也)。上贴心口，中贴脐眼，下贴脐下，兼贴对脐两腰等处。

【功用】温经通经。

【主治】血虚有寒，月经后期；或腹中积冷，临经作痛；或兼寒湿带下；或经闭，久成痞满肿胀。

【加减】先期者，加条芩、丹皮、地骨皮各二钱；后期者，加官桂、干姜、艾各二钱；干血癆，加桃仁、红花、大黄、生姜、红枣；血瘕，再加马鞭草。各为粗末。或醋，或酒炒，熨心腹脐下并缚脐，如冷再炒，每日用之，以调为度。

【备考】导经末子：附子、肉桂、当归、元胡、灵脂、蓬术、青皮、灵仙、川芎、酒芍、红花、乌药、香附、苍术、厚朴、郁金、半夏、丁香、木通、大黄(醋炒)、蚕砂(炒)、吴萸(黄连同炒)各一钱，巴霜五分，共研末，每以半厘，掺膏上贴。又调经末子(不论前后多少，痛或不痛)：当归一两，川芎五钱，白芍、苁蓉、灵脂(炒)、延胡(炒)、白芷、苍术、白术、乌药、茴香、陈皮、半夏各三钱，柴胡二钱，黄连(同吴萸炒)各一钱。

74481 通草丸

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】椒目 附子(炮) 半夏(洗) 厚朴(炙)各一两 芒消五两 大黄九两 葶苈三两(熬) 杏仁三两(去皮尖)

【用法】上为末，别捣葶苈、杏仁令如膏，

合诸末，以蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸。

【功用】长肌肤，补不足。

【主治】积聚，留饮，宿食，寒热烦结。

【宜忌】忌猪肉、羊肉、饴等。

【备考】本方方名通草丸，但方中无通草，疑脱。

74482 通草丸

《医学入门》卷七。为方出《千金》卷六，名见《三因》卷十六“通草散”之异名。见该条。

74483 通草丸

《准绳·类方》卷八。为方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一六“细辛丸”之异名。见该条。

74484 通草汤

【方源】《外台》卷二引《范汪方》。

【组成】通草一两 干姜一两 枳实四两(炙) 人参一两 附子一枚(炮令裂破)

【用法】上切。以水六升，煮取二升，适寒温，每饮五合，一日三次。不愈，稍加至七合。

【主治】伤寒下利，脉微，足厥冷。

【宜忌】忌猪肉。

74485 通草汤

【方源】《外台》卷二(注文)引《古今录验》。

【异名】通草橘皮汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】通草三两 生芦根(切)一升 橘皮一两 粳米三合

【用法】上切。以水五升，煮取二升，去滓，随意便稍饮。不愈更作，取愈止。

【主治】①《外台》引《古今录验》：伤寒后呃逆。②《张氏医通》：伤寒胃热呕逆。

74486 通草汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】通草 茯苓 玄参 桑白皮 白薇 泽泻各三两 人参二两 郁李仁五两 泽漆叶(切)一升

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分四次温服。服别相去如人行六七里，进一服。

【主治】膨胀气急。

【宜忌】忌热面、油腻、酢、粘食等。

74487 通草汤

【方源】《幼幼新书》卷三十引《婴童方》。

【组成】通草 甘草 滑石各二两 葵子三分

【用法】上以水三升，煮六合，二百日儿服半合，日三夜一服。

【主治】小儿小便不通。

【备考】方中葵子用量原缺，据《永乐大典》补。

74488 通草汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】通草 王不留行 葵子 茅根 桃胶 瞿麦 当归（去芦，洗） 蒲黄（炒） 滑石各一两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】诸淋。

74489 通草汤

【方源】《普济方》卷四十二。

【组成】雀粪半合 车前子 滑石各四两 通草 芍药各二两

【用法】上切。以水七升，煮取三升，食前每服五合，一日三次。

【主治】胞转不得小便。

74490 通草汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【异名】通草散（《济阴纲目》卷十四）、立效散（《杂病源流犀烛》卷二十七）。

【组成】通草七分 瞿麦 柴胡 天花粉各一钱 桔梗二钱 木通 青皮 香白芷 赤芍 连翘 甘草各五分

【用法】上锉一剂。水煎细饮，更摩乳房。

【主治】乳汁不通属实证者。

①《古今医鉴》：乳汁不通。②《医学六要》：年少初产，乳虽胀，汁不流，有风热。③《济阴纲目》：产后血气盛实，乳汁不通。

【方论选录】《医略六书》：产后风热外遏，

血气内壅而乳房肿胀、乳窍不通，故乳汁不出焉。瞿麦泻热以通气闭，赤芍破血以行血滞，连翘清利热结，通草通利阳明，花粉清热润燥，青皮破滞泻气，白芷解散阳明之经，桔梗开提气血之滞，柴胡疏乳房之腠理，甘草和厥阴之胃气也。为散水煎，使风热外解，则气行血活而经气亦清、乳窍通利，何乳房肿胀不退，乳汁乃有不出者乎？

74491 通草饮

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】木通（锉）三两 桑根白皮（锉，炒） 石韦（去毛） 赤茯苓（去黑皮） 防己 泽泻各一两半 大腹（炮）四枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前温服，如人行五里再服。

【主治】涌水，肠鸣腹大。

74492 通草酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】通草子

【用法】煎汁，同曲、米酿酒饮。

【功用】续五脏气，通十二经脉，利三焦。

74493 通草散

【方源】《医心方》卷二十五引《产经》。

【组成】通草一两 细辛一两

【用法】上为末。展绵如枣核，取药如小豆，着绵头纳鼻中，一日二次。

【主治】少小鼻息肉。

74494 通草散

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】通草 细辛 蕤仁 雄黄（研）皂荚（去皮子）各一分 白矾二分（烧） 礞石三分（泥裹，烧半日，研） 藜芦三分（炙） 地胆三分（熬） 瓜蒂三分 巴豆十枚（去皮） 茜茹三分 地榆三分

【用法】上为末。以细辛、白芷煎汤，和散敷息肉上，又以胶清和涂之，取愈。

【主治】鼻中息肉。

74495 通草散

【方源】方出《千金》卷二，名见《外台》卷三十四。

【组成】通草（横心者是，勿取羊桃根，色黄无益） 石钟乳各等分

【用法】上为末。每服方寸匕，粥饮送下，一日三次。

【功用】《外台》：下乳汁。

【主治】妇人无乳汁。

74496 通草散

【方源】方出《千金》卷六，名见《三因》卷十六。

【异名】通草膏（《济生》卷八）、通草丸（《医学入门》卷七）、通气丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】通草 细辛 附子各等分

【用法】上为末。以蜜和，绵裹少许，纳鼻中。

【主治】①《千金》：鼻鼈。②《三因》：鼻鼈，气息不通，不闻香臭，并有息肉。

【方论选录】《千金方衍义》：鼻鼈，必有息肉阻碍，气道不得贯通之故，故以散结通气为主。方用通草开通关窍，细辛解散结邪，附子流行经络，立方最捷。

【备考】方中通草，《三因》作“木通”。《普济方》有辛夷一钱。

74497 通草散

【方源】《千金》卷六。

【组成】通草半两 矾石一两 真朱一两（一方有桂心、细辛各一两）

【用法】上为末。拈绵如枣核，取药如小豆，著绵头，纳鼻中，一日三次。

【主治】鼻中息肉，不通利。

【方论选录】《千金方衍义》：消鼻中息肉，矾石最捷；佐以真珠消管，通草透窍；加桂、辛尤为得力。

74498 通草散

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】通草（蜜涂，炙干，为末） 木猪苓（去黑皮，为末）各等分

【用法】上为细末，加土地龙、麝香少许。

每服半钱或一钱，米饮调下。

【主治】一身黄肿透明，及肾肿。

74499 通草散

【方源】《普济方》卷一一七引《经验济世方》。

【组成】木通 通草各半两 泽泻一分 竹茹二钱（少用不妨，老人减半）

【用法】上锉如大米粒，或为细末。每服三钱，水一盞，煎至七分，温服。细末每服二钱，依前法煎，食后、日午、夜卧各一服。

【主治】伏暑下血如久痢。

【临证举例】伏暑下血如久痢 崇宁二年，自太府出为发运，自夏及秋，患痢两月，一日一夜三四十次，然血多白少，名医皆曰：此痢也。闻泗洲青阳镇李中和助教善医，即遣人召之。中和至，看脉，即曰：此非痢也。始甚怒之，徐叩之，李曰：血多白少，小便涩少，即非痢。其言中余之病，心已神之。乃是旧因伏暑，小便传导入大肠，由心经而过，遂化为血，由大肠而下，故其状似痢而非痢也。但令大小便各归其本，即安。依法煎上方，食后、日午、夜卧各一服便止。余家数婢患久痢，服之皆安。

74500 通草散

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】通草二两 白芍一两 王不留行半两 甘遂三钱 石韦一两 葵子一两半 滑石半两 蒲黄一两 桂心一两

【用法】上为末。每服三钱，沸汤调下。

【主治】肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥砂石，痛不可忍，或出鲜血。

74501 通草散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】赤芍药 川芎 羌活 甘草 当归 麝香

【用法】上为末，调匀为丸，如皂角子大，百沸汤泡。

【主治】风泪障翳。

【备考】本方方名通草散，但方中无通草，

疑脱；又据剂型，当作“通草丸”。

74502 通草散

《济阴纲目》卷十四。为《古今医鉴》卷十二“通草汤”之异名。见该条。

74503 通草膏

【方源】《医方类聚》卷一八八引《千金月令》。

【组成】通草八分 当归 芎藭 防风 黄耆 乌蛇各二十分 白薇 白芷 白藜 白术各四分 蜡六两 黄丹三两 麻油二升半

【用法】上为末，煎油三二十沸，次下黄丹，令色黑，后下蜡，更煎二十沸，次下诸药，候银珠飞上即成，于不津器中收贮之。

【主治】一切疮肿。

74504 通草膏

《济生》卷八。为方出《千金》卷六，名见《三因》卷十六“通草散”之异名。见该条。

74505 通草膏

《得效》卷十。为方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一六“细辛丸”之异名。见该条。

74506 通胃散

【方源】《普济方》卷三十六引《经验良方》。

【组成】肉豆蔻 鸡心槟榔各一枚 胡椒四十九粒

【用法】上为末。每服半钱，空心以无灰酒、枳壳末少许调服，稀粥压之。

【主治】结肠翻胃。

74507 通幽汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】桃仁泥 红花各一分 生地黄 熟地黄各五分 当归身 炙甘草 升麻各一钱

【用法】上咬咀，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服之。

【功用】润燥通塞。

①《兰室秘藏》：以辛润之。②《医林纂要》：润枯槁，通壅塞。③《医方论》：调和气血，开通胃腑。

【主治】胃肠燥热，阴液损伤，通降失司，噎塞，便秘，胀满。

①《脾胃论》：脾胃初受热中，幽门不通，上冲，吸门不开，噎塞，气不得上下，大便难。②《古今医鉴》：燥热内甚，血液俱耗，以致大便闭结。③《准绳·类方》：胀满。

【方论选录】①《医方集解》：此手足阳明药也。当归、二地滋阴以养血，桃仁、红花润燥而行血，槟榔下坠而破气滞。加升麻者，天地之道，能升而后能降，清阳不升，则浊阴不降，经所谓地气上为云，天气下为雨也。②《医林纂要》：当归身辛甘而润，滋而能行，可以化湿而为血，调热而顺气，独用其身者，以养血而专治幽门也。升麻甘辛寒，行肝气以达脾胃，而达之膈中，使清气升则浊气自降。槟榔苦涩温，能敛气而降泄之，以燥湿除痰，使下行而达于下极，治二便闭结，里急后重。此与升麻一升一降，皆所以通壅塞。桃仁苦甘辛润，缓肝火，和脾土，去瘀血，生新血，润枯槁。红花辛甘苦，功专润燥行血，去瘀生新。生地黄滋阴血以达于上，以助当归而润幽门之槁；熟地黄坚肾水以守于下，而安下焦命门之火。甘草厚脾土而滋血气，和阴阳也。

【备考】本方方名，《东垣试效方》作“导滞通幽汤”；《中国医学大辞典》引作“导气通幽汤”。《兰室秘藏》本方用法：上都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，调槟榔细末五分，稍热食前服之。《张氏医通》有生甘草，将成用药汁磨槟榔五分调服；《金匱翼》有大黄一钱。

74508 通幽汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【异名】润肠汤（《医学六要·治法汇》卷六）、润燥汤（《准绳·类方》卷六）。

【组成】当归一钱 生地黄 熟地黄 甘草（炙）各五分 升麻 桃仁各一钱 红花三分 大黄（煨） 火麻仁各三钱

【用法】上作一剂。水煎，去滓，调槟榔末五分，食前稍热服。

【功用】辛润幽门。

【主治】大便难，幽门不通，上冲，吸门不开，噎塞，大便燥闭，气不得下。

74509 通幽汤

【方源】《片玉痘疹》卷五。

【组成】紫草 归梢 生地 麻仁（研）枳壳 酒大黄 槟榔 红花 桃仁泥

【用法】水煎服。

【功用】①《片玉痘疹》：利大便。②《幼幼集成》：润肠，凉血，降火。

【主治】痘疹大便艰难。

74510 通幽汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】生地 升麻 桃仁泥 归身 甘草 红花 麻仁（炒）

【用法】加大黄水煎，调槟榔末服。

【主治】津液不足，大肠干涩，大小便不通。

74511 通幽汤

【方源】《医方考》卷二。

【组成】生地黄 熟地黄 当归梢 大黄（酒浸，煨） 桃仁泥 红花 升麻

【主治】结燥腹痛。

【方论选录】此方服之，可以通其留滞，故曰通幽。大便燥结，升降不通，故令腹痛。燥者濡之，生地、熟地，皆濡物也；逸者行之，大黄、归梢，皆行物也；留者攻之，桃仁、红花，皆攻物也；抑者散之，升麻之用，散抑郁也。

【备考】《景岳全书》本方用法：用水一钟半，煎服。

74512 通幽汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【异名】通幽散（《痘科类编释意》卷三）。

【组成】甘草（炙） 红花各三分 生地 熟地各五分 升麻 桃仁泥 归身各一钱 麻仁三钱

【用法】临服加槟榔末半钱。

【功用】以辛润之。

【主治】①《医学六要·治法》：大便难，幽门不通，上冲，吸门不开，噎塞，不便，燥结不得下。②《种痘新书》：痘症大便秘结。

【方论选录】《痘科类编释意》：此润燥下利之方。胃之下口曰幽门，服此通滞，故曰通幽。大肠得血则润，润则下行，亡血则燥，燥则秘结，故用熟地、当归以养血；初燥动血，久燥血瘀，故用桃仁、红花、麻仁与归尾并用，又能润燥而下行；血热，凉以生地；气热，凉以甘草；微入升麻，消风热又散抑郁。

74513 通幽汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】大黄三钱 条芩一钱半 车前子三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇二便不通，脉数者。

【方论选录】胎热内壅，气化不利，故二便不通，大腹膨胀，胎孕因之不安。大黄通秘宽胀，条芩清热安胎，车前子清热以利小便也。水煎温服，使胎热内化，则二便自通而膨胀无不退、胎孕无不安矣。

74514 通幽汤

【方源】《清代名医医案大全·叶天士医案》。

【组成】归须 红花 郁李仁 柏仁 麻仁 生地 升麻

【功用】润下。

【主治】高年肾阴暗亏，血液不能灌溉四旁，肠中枯燥，更衣颇觉费力，大便艰涩不爽，脐间隐隐作痛。

74515 通幽汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】二地 当归 桃仁 红花 大黄 升麻 香油 蜂蜜（冲）

【主治】阴虚大便闭。

74516 通幽散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】升麻 木通 滑石 葵子 麻仁 苏子 陈皮 枳壳 甘草 川芎 赤芍 生地 当归 黄芩 葱白 淡竹叶 大黄 槟榔（二味酌用）

【功用】补阴血，滋肾水，抑阳清热。

【主治】产后血去亡阴，津液内竭，肠胃枯燥，阳气独盛，热结大肠、膀胱、小肠，以致二便不通。

【方论选录】是方木通、滑石、葵子、竹叶、甘草以通小肠之火，麻仁、苏子、枳壳以通大肠之火，而大黄、槟榔性猛，必宜酌用，恐不宜于产后、芎、归、芍、地四物养血滋阴，升麻引火上泄，黄芩引火下达，葱白滑窍，陈皮行气，皆可以通之也。

【备考】大小便三日不通，方可用大黄以荡涤。

74517 通幽散

《痘科类编释意》卷三。为《医学六要·治法汇》卷六“通幽汤”之异名。见该条。

74518 通香丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】远志 石菖蒲 枣仁 柴胡各一钱 蓖麻子（连壳） 每一岁用一粒

【用法】上为末，用猪肝一个，将药末掺入猪肝内，纸包，煨熟，捣丸服。日三五次至七日，即效。

【主治】小儿哑不能言。

74519 通便饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】赤茯苓 人参各一钱 车前子 龙胆草 木通各二钱 甘草梢 川芎各六分

【用法】灯心三十茎，空心煎服。

【主治】妊娠胎压膀胱，以致小便不通。

74520 通便条

【方源】《外伤科学》。

【组成】细辛 皂角各等分

【用法】上为细末，煮蜂蜜至滴水成珠时和药末（30%），做成小指大药条，作栓药用。

【功用】行气通便。

【主治】老人粪便性肠梗阻及蛔虫性肠梗阻。

74521 通便散

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】朱砂 芦荟各一两 麝香二钱

【用法】上为末，酒酿为丸，如黄豆大。每服三丸，酒送下。

【主治】打伤数日之后，大小便不通

【备考】本方方名，据剂型，当作“通便丸”。

74522 通顺散

《仙传外科集验方》。为原书“荣卫返魂汤”之异名。见该条。

74523 通泉饮

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】炒枣仁一两 麦冬一两 天门冬三钱 北五味一钱 人参三钱 丹参三钱 远志一钱 当归五钱 甘草一钱 柏子仁三钱

【用法】水煎服。一剂口润，再剂心头之汗止，三剂诸症痊愈。

【功用】补心气，生津液。

【主治】过于欢娱，大笑不止，阳旺火炎，心中无液，心气损伤，遂致唾干津燥，口舌生疮，渴欲思饮，久则形容枯槁，心头出汗。

74524 通脉汤

【方源】《达生篇》。

【组成】黄耆（生用）一两 当归五钱 白芷五钱

【用法】七孔猪蹄一对，煮汤，吹去浮油，煎药一大碗服之。覆面睡，即有乳。或未效，再一服，无不通矣。新产无乳者，不用猪蹄，只用水一半、酒一半煎服。

【功用】①《仙拈集》：通乳。②《医林纂要》：补养气血。

【主治】乳少或无乳。

【加减】新产体壮者，加好红花三五分以消恶露。

【方论选录】《医林纂要》：乳即经血所化，血下溢于肝则为经，酿成于胃则为乳，而两乳则阳明胃脉所经行，肝脉交于脾，脾脉络于胃，故乳得从胃化而出。是欲酿乳，补胃为本。黄耆充胃气而壮卫气，甘缓益土，生用则行，故能通也。乳本血也，当归辛润滋血，而惟血所归，又所以为乳之本。合生耆即东垣补血

汤,气倡而血从,血充而乳足。白芷辛温色白,行阳明胃经,宣木气于土中,达血脉于经隧,除血中之壅滞,故用以为佐使。猪蹄,旧说须七孔者,然可不必,但要公猪前蹄,若后蹄则少力,母猪者不足用。盖前蹄为全身筋力所在,味甘咸平,能补气血,养虚羸,润肌肉,又水畜也,故善通经隧,能通乳汁,又以血气补血气,古人多用之。煮汤去油,恐油腻能滞经络,且滑肠。

【备考】本方方名,《仙拈集》引作“通乳煎”。

74525 通脉汤

【方源】《大生要旨》卷四。

【组成】生黄耆一两 当归五钱 白芷一钱 通草二钱

【用法】用七孔猪蹄一对煮汤,吹去浮油,煎药一大碗服之,以被覆面而睡,即有乳。或未效,再一服。新产无乳者,不用猪蹄,只用水、酒各半煎服。

【主治】产时去血过多,或产后失于调养,以致乳少或无乳者。

【加减】新产体壮者,加好红花三五分以消恶露。

74526 通脉散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】麻黄一两半(去根节) 肉桂一两(去皱皮) 甘草半两(炙微赤,锉) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候稍热服。

【主治】伤寒病极,脉沉,厥逆。

74527 通脉散

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归 天花粉 木通 牡蛎 穿山甲

【用法】上为细末。用猪蹄汤入酒少许调服。

【主治】女人乳少。

74528 通音丸

《青囊秘传》。即《笔花医镜》卷一“通音煎”改为丸剂。见该条。

74529 通音散

【方源】方出《千金》卷十七,名见《圣济总录》卷六十六。

【组成】防风 独活 芎藭 秦椒 干姜 黄耆各四十二铢 天雄 麻黄 五味子 山茱萸 甘草各三十六铢 秦艽 桂心 薯蓣 杜仲 人参 细辛 防己各三十铢 紫菀 甘菊花各二十四铢 贯众二枚 附子七分

【用法】上为细末。以酒服方寸匕,一日二次。

【主治】肺虚冷,声嘶伤,语言用力,战掉缓弱,虚瘠,风入肺。

74530 通音煎

【方源】《笔花医镜》卷一。

【组成】白蜜一斤 川贝二两 款冬花二两 胡桃肉十二两(去皮,研烂)

【用法】上将川贝、款冬为末,四味和匀,饭上蒸熟。开水送服。

【主治】①《笔花医镜》:音哑。②《集验良方拔萃》:喉痹。

【备考】本方改为丸剂,名“通音丸”(见《青囊秘传》)。

74531 通涎散

【方源】《金匱翼》卷四。

【组成】瓜蒂五钱

【用法】上为末。每服一钱,并花水调下。涎出即愈;如未出,含砂糖一块,下咽即出。

【主治】忽患癫狂不止,或风涎暴作,气塞倒仆。

74532 通津丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】赤茯苓 木通 大腹子 木香 破故纸(炒) 萆薢茄 苦苣苳(隔纸炒)各半两 白牵牛五两(微炒,取头末二两半)

【用法】上为细末,水面糊为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,渐加至七八十丸,食后

或食远陈皮、灯芯汤送下。

【功用】宣导小水。

【主治】一切肿满，风湿脚气变成肿气。

74533 通宣丸

【方源】《卫生家宝产科备要》卷七。

【组成】巴豆十五粒（去心膜）

【用法】上以生绢袋盛，于酹灰汁中煮十沸，取出用纸厚裹，压于重物下出油，研成霜，却取黑散（即原书琥珀黑神散）三钱匕，以无灰酒调成稀膏，入瓷器中，于铛内重汤煮令稠，入巴豆霜和合可丸，如绿豆大。每服五丸，熟水送下。

【主治】产后崩中，状似鸡肝，寒热闭闷；或产后四肢浮肿及寒热；子烂腹中不下。

【临证举例】死胎：有村妇用毒药落胎不能下，子烂于腹中，脐穿时出小骨，病极，朱子东遂用此丸下枯骨一具而愈。

【备考】原书治上症，先服琥珀黑神散，次服本方。

74534 通神丸

【方源】《普济方》卷二三七引《圣惠》。

【组成】兔粪七粒 胎发（二七天小儿胎发） 人手指甲七七片 人脚指甲七七片 天灵盖一枚（圆者） 穿山甲七七片 硃砂半两（通明者） 紫河车一具

上入瓦器内，盐泥固济，穿一地窍，方圆一尺，将药瓶置于地窍内，用槐木火固定，烧一日，取出细研，再入后药：

雄黄（研） 鬼白（炒，捣末） 鬼箭羽（炒，捣末） 麝香（研） 丹砂（研）各一两

【用法】上将后五味末，与前烧药相合，研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，别用丹砂为衣。每服十丸，渐加至二十丸，早、晚食前米饮送下，日进二服。

【主治】传尸劳，情思不悦，心多惊悸，盗汗羸瘦。

74535 通神丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 附

子（炮裂，去皮脐） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（汤洗七遍，焙）各一两 杏仁（汤浸去皮尖双仁，炒，研如膏） 葶苈子（纸上炒）各三两 芒消（研）五两 大黄（锉，炒）九两

【用法】上除研药外，余并为末。与杏仁芒消研匀。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。

【功用】长肌肤，补不足。

【主治】积聚留饮宿食，寒热烦结。

【宜忌】《普济方》：忌食猪、羊肉、饧、冷水。

74536 通神丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【异名】至妙通神丸（《普济方》卷一七五）。

【组成】干姜（炮） 知母（焙） 乌头（炮裂，去皮脐）各一两 巴豆（去皮心膜，出油，研）半两

【用法】上将前三味为末，入巴豆同研匀，酒糊为丸，如绿豆大。每服七丸，加至十丸，临卧生姜汤送下。

【主治】酒癖。

74537 通神丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】没药（研） 五灵脂（研） 乳香（研）各一钱 巴豆（去皮心膜，研出油）五粒

【用法】上为末，滴水为丸，如粟米大。每服一丸，生木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】脓血杂痢，后重疼痛，日久不愈。

74538 通神丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四。

【组成】茯苓 龙脑（煨）各半两 胡黄连 铅丹各一分 银箔五片 麝一钱 钩藤（煨）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服十丸，米饮送下。

【主治】小儿肝疳。爱饮水，眼目不开；或天钓，手足动，眼合，语笑嗔怒无常，兼多惊，指甲青，形似死。

74539 通神丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】麻黄（去根，锉细，洒酒、醋炒黄色） 桑柴煤（二月二日未出时取东枝，火烧，醋淬） 乌菱角壳（十一月取，火烧，醋淬） 当归（切片，洒酒、醋炒黄色） 晚蚕沙（五月五日收，洒酒、醋炒黄色） 没药（别研）各一两

【用法】上除没药外，俱为细末，先将米醋一大碗熬至半碗，入没药同熬成膏，次入余药捣匀，一两分作十丸，每服一丸，以生姜、地黄自然汁各一合，酒半升，同煎五七沸，磨药温服，不拘时候。

【主治】一切颠扑，筋伤骨折，骡马踢踏，迷闷欲绝，及瘀血凝结，痛不可忍。

74540 通神丸

【方源】《普济方》卷一九七引《卫生家宝》。

【组成】神桃二七个（桃木上自干不落者）黑豆一两 巴豆七粒（去壳并心膜，研细）

【用法】上为末，冷水为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。清晨面东以井花水吞下。

【主治】五种疟疾，热多寒少，及诸疟不效者。

【宜忌】《医统》引《余家秘宝方》：忌食生冷、鱼腥、油腻、粘滑。

74541 通神丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】胡黄连 川黄连各三钱 木香 羌薏（炒）各二钱 丁香 肉豆蔻（生） 使君子（肉焙）各一钱 大虾蟆干一枚（锉碎，水煮烂，研膏）

【用法】上为丸，如麻子大。每服十丸，米饮送下。

【主治】《普济方》：小儿冷热痢，其症泻多脓血，日加瘦弱。

74542 通神丸

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【组成】南星二两 半夏四两（切碎，铜器内炒） 辰砂一两（为衣） 狗肝一个 大皂角十个 明矾二两（枯过）

【用法】上以水一大碗，将上药物煮干为度。去狗肝等药，只用皂角晒干为末，米醋糊为丸，如绿豆大，以辰砂为衣。每服三十丸至四十丸，空心米饮送下，每日一次，小儿看岁数加减用。

【主治】大人、小儿诸痢病。

【宜忌】孕妇勿服。

74543 通神丸

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】大桃仁二百个（去皮尖，研，以童子小便一盏半，石器内文武火熬成膏，刮出） 真阿魏三分 干蝎十个（全者，去毒） 真麝香半钱

【用法】上为末，桃仁膏为丸，如梧桐子大。每服二丸，空心酒送下，每日二次。

【功用】去败脓，消膜外肿胀。

【主治】肾气偏坠，疝气肿痛，水流不止，兼肾痢。

74544 通神丸

【方源】《婴童百问》卷九。

【组成】龙胆草不拘多少（一方加防风等分）

【用法】上为细末，米醋煮糊为丸，如椒目大。每服五七丸，用饭饮送下。

【主治】小儿白日精神欢悦，至夜卧通身多汗。

74545 通神丹

【方源】《普济方》卷九十一引《卫生家宝》。

【组成】五灵脂二两（初一日用姜汁压至初五日，调并花水，去粗滓） 干蝎一分（如僵蚕制度） 大川乌二两（去皮，研为细末） 草乌三分（如川乌制度） 没药半两（用井花水磨膏） 天南星一分（用姜汁压一宿，晒干，碾罗为末） 白僵蚕一分（洗过，碾末） 朱砂三分（飞过，半入药，半作衣） 麝香半分（用法酒发一宿，碾细） 木香半两（碾末） 轻粉一分 滴乳香半两（用井水磨为膏）

【用法】上药末于端午日或腊日合和匀，以

腊水煮面糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后同生姜一片、薄荷一叶，用茶汤或酒嚼下。

【主治】卒中风，左瘫右痪，口眼喎斜，偏正头痛，夹脑风等；及小儿一切惊风。

74546 通神丹

《医学纲目》卷二十九。即《卫生宝鉴》卷十“通耳丹”。见该条。

74547 通神汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】干姜（炮，去皮）五两 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）三两 菖蒲 桂（去粗皮） 白术各二两 半夏（汤洗去滑七遍，生姜制） 人参 五味子（炒） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后温服。良久，稍增至四钱匕，以知为度。

【主治】上焦虚寒，干呕无度。

74548 通神汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】土马鬃（焙干）二两 枳实（去瓤，麸炒） 白茯苓（去黑皮） 秦艽（去苗土） 甘草（炙，锉） 柴胡（去苗） 人参 生干地黄（焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】虚劳，咳嗽不止，肺气损伤，咯吐脓血，日渐痿瘦。

74549 通神汤

【方源】《普济方》卷十六。

【组成】升麻 犀角（镑） 龙胆 玄参 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 羌活（去芦头）各半两 苦竹叶三钱 甘草（炙，锉）一钱

【用法】上为末。每服五钱，水一盞半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】心脏壅盛，烦热，口舌生疮，头痛颊赤，心神不宁。

74550 通神饼

【方源】《得效》卷十一。

【组成】甘草末三钱 绿豆末 败荷叶各三钱 砒霜半钱（生） 朱砂一钱半 定粉半钱 脑子 麝香各少许 金银箔十片

【用法】上炼蜜为丸，如梧桐子大，作饼子。周岁每服半丸或一丸，大者二丸而止，井花水或桃、柳枝煎水磨化服，每日一次。亦可系于候脉处。

【功用】截疟。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌烧热饮食。

74551 通神烟

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】沉香 琥珀 乳香 没药 藿香 好茶 泥菖叶 百草霜各二钱

【用法】上为细末。分为十四炷，每日一炷，含冷水熏三度，经一七日而止。此方绝无瞑眩之忧，但口鼻泄出毒液耳。

【主治】眼病或痛或不痛，生翳失明，头痛耳鸣。

74552 通神散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄一两（去根节） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 川大黄一两（锉碎，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术半两 人参半两（去芦头） 五味子半两 桂心半两

【用法】上为细散，每服三钱，以新汲水调下，不拘时候。良久以热水漱口三五度后，吃热姜茶一盞，衣盖出汗。

【主治】伤寒，头痛壮热，心胸燥闷，不得汗者。

74553 通神散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷七十。

【异名】伏龙肝散（《普济方》卷一八八）。

【组成】乱发灰半两 伏龙肝一两

【用法】上为细末，每服三钱，以新汲水调

下。

【主治】鼻衄日夜不止，面无颜色，昏闷。

【备考】《圣济总录》本方二药等分。

74554 通神散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】羊胛炭五两（烧令遍赤，入醋蘸，如此七遍） 木香一两 没药一两 当归一两（锉，微炒） 生干地黄一两 刘寄奴一两 桂心一两 补骨脂一两（微炒） 黑豆二合（炒熟） 赤芍药一两 桑根白皮一两（锉） 川大黄一两（锉，微炒） 败龟一两（涂醋，炙微黄）

【用法】上为细散，每服二钱，以温酒调下。

【功用】接骨续筋，散瘀血，止疼痛。

74555 通神散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】川大黄（锉，微炒） 川芒消 槟榔 桃花 郁李仁（汤浸，去皮，微炒）各一两 木香半两

【用法】上为细散。每服二钱，空心以粥饮调下。

【主治】①《圣惠》：妇人大便不通。②《妇人良方》：妇人大便不通，热而实者。其证心腹胀痛，手不得近，心胸烦闷，六脉沉滑而实。

74556 通神散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】菝葜一两（锉） 蛇床子一两 木贼一两 桑蛾一两（微炙）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】妇人崩中下血不止。

74557 通神散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】蒲黄一两 肉桂一两（去皱皮） 当归半两（锉，微炒） 延胡索半两 硃砂一分 琥珀半两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】产后败血冲心。

74558 通神散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】乱发一两（烧灰） 桂心一两

【用法】上为末。每服半钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】小儿中风，失音不语，诸药无效。

74559 通神散

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】麻黄（去根节） 官桂（去粗皮）各三分 甘草一分（炙） 大芎 白术各一两 细辛八铢 独活 桔梗 防风 芍药 白芷各半两 牡丹皮（去心） 牵牛四铢（炒）

【用法】上为细末，每服二钱，非时热汤调下，和滓热吃。若吃此药后，寒热已退，赤痢已消减，再酌用还真散，舶上硫黄丸。

【主治】毒痢。初得时先发寒热，忽头痛，忽壮热，忽转数行便下赤痢，忽赤白相杂，忽止下白痢，或先下白痢后变成赤痢，或先下赤痢后变成白痢。

【备考】《准绳·类方》有藁本。方中丹皮用量原缺。

74560 通神散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】乌蛇（去皮骨，酒浸，炙） 踯躅花（酒浸，炒） 蝉蜕（生用） 天南星（生姜汁浸，炒干） 麻黄（去根节） 天麻（酒浸，炙） 牛膝（酒浸，切，焙） 防己（锉） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 石斛（去根，酒浸，炒） 地龙（去土，生用） 桂（去粗皮） 皂荚（去皮子，酒浸，炒） 干蝎（生用） 附子（炮裂，去皮脐） 白附子（半生半炮） 乌头（炮裂，去皮脐） 丹砂（别研）各一两 麝香（别研）半分

【用法】除别研外，余药为散。每服一钱至二钱匕，温酒调下，每日三次。

【主治】中风昏愆，肢体不收，不以缓急。

74561 通神散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【异名】返魂追命再造散（《直指》卷四）、追

命再造散(《医统》卷十二)。

【组成】皂荚树上独生刺(无杈牙者) 大黄(锉)各等分(俱生用)

【用法】上为细散,每服三钱匕,临卧冷酒调下。候来晨令病人于净地上登溷,当取下黑身赤头虫。次服温补风药,候气完复,再依前法更进,直候无虫,即病根已除,不须服也。

【主治】大风癰疾,鼻梁未折。

74562 通神散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】粟米一合 故笔头二枚(烧灰) 马蔺花七朵(烧灰)

【用法】上为细散。每服二钱匕,温酒调下。痛不可忍者,连进三服。

【主治】气淋,结涩不通;砂石淋。

74563 通神散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】雄黄(通明者,研,水飞) 麝香(用当门子,为末)各半钱匕

【用法】上为细末,只作一剂。一岁儿作三服,温酒调下。

【主治】小儿疮痘,蓄伏黑陷。

74564 通神散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《聚宝方》。

【组成】石燕子一枚(先为细末,再研) 石苇半两

【用法】上为细末。每服一字,煎三叶酸浆草汤调下。甚者再三服。

【主治】①《幼幼新书》引《聚宝方》:小儿五疳淋。②《幼幼新书》引《谭氏殊圣》:血淋。

【宜忌】忌食生冷,油腻。

74565 通神散

【方源】《幼幼新书》卷三十引郑愈方。

【组成】石燕子(煨)一枚 石苇一分 海金沙 木通各二钱

【用法】上为末。每服一钱,酸浆草汤调下。二服效。

【主治】淋。

74566 通神散

【方源】《伤寒标本》卷下。

【异名】通解散(《普济方》卷一四七)。

【组成】苍术 石膏各四两 甘草 黄芩各二两 滑石六两

【主治】①《伤寒标本》:伤寒,始得脉便沉而里病表和,属内伤者。②《普济方》:四时伤寒,内外一切所伤。

【备考】《普济方》本方用法:上为粗末,每服三钱,水一盞,煎至七分,去滓温服,日进四服。如发汗,用葱白、盐豉同煎热服;如和解,用生姜五片、枣五枚(去核)同煎,去滓热服,食前进三服。

74567 通神散

【方源】《普济方》卷三十八引《十便良方》。

【组成】缩砂仁不拘多少(去粗皮)

【用法】上为末。米饮调,热服。

【主治】泻血。

74568 通神散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】全蝎一枚 土狗二枚 中地龙二条 雄黄 明矾(半生半煨)各半钱 麝香一字

【用法】上为细末,葱白引药入耳,闭气面壁坐一时。三日一次。

【主治】耳聋。

【备考】《张氏医通》无土狗,有蜣螂三枚。

74569 通神散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施圆端效方》。

【组成】石决明(烧粉)一分 硼砂一钱 粉霜一钱 片脑一字 朱砂半钱

【用法】上为末。每用一字,乳汁调,随左右耳灌之,日用三次。

【主治】小儿斑疹,毒气入眼,云翳失明。

74570 通神散

【方源】《袖珍》卷一引《德生堂方》。

【组成】藜芦二钱(去芦) 川芎二钱半 谷精草 石菖蒲 东平薄荷 顽荆叶各四钱

【用法】上为细末。先令患者吃葱茶一盞,

后含水在口，再以芦管吹药入鼻中。即时痰唾涕喷见效。

【主治】阴证及中风，不省人事。

74571 通神散

【方源】《医方类聚》卷一三六引《烟霞圣效》。

【组成】白茯苓三钱 泽泻三钱 木猪苓半两（去黑皮） 白术二钱 滑石五钱 甘草二钱 肉桂一钱（去粗皮）

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调下。后多饮热水三两盏，多利小便效。

【主治】小便壅闭，脐下结硬，小便状如撒火，或变砂石淋，脓血淋，疼痛不可忍者。

74572 通神散

【方源】《医方类聚》卷一八八引《烟霞圣效》。

【组成】麻黄半两（去根节） 木贼半两 陈皮半两（干，刮去白） 甘草三钱

【用法】上为细末。每服五钱，热酒调下。后饮酒至醉，醒不疼痛，三服见效。

【主治】打扑损伤，无筋断骨折。

74573 通神散

《普济方》卷九十二。为《袖珍》卷一引《圣惠》“正舌散”之异名。见该条。

74574 通神散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】生地黄（炒） 地龙（炒） 朱砂（别研）各一两

【用法】上为细末。每服一字，煎胡荽酒少许，同温汤调下。

【主治】疮疹毒气少，大小便利，倒伏不出者。

74575 通神散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】白菊花 绿豆皮 谷精草 石决明（煅过）各等分

【用法】上为末。每服二钱，与干柿一个、米泔水一盏同煎，候水干吃柿，不拘时服；能服汤药，又将本方煎服亦可。

【主治】小儿痘疹伤眼，睛上红紫涩痛。

74576 通神散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】菊花 谷精草 密蒙花 绿豆皮 苍术 石决明 甘草 黄芩 蝉蜕 木贼各等分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】小儿痘疹伤眼，睛上红紫涩痛。

74577 通神散

【方源】《回春》卷七。

【组成】儿茶末一钱

【用法】扁蓍煎汤送下。

【主治】小便紧急不通，或出血。

74578 通神散

《保婴撮要》卷十八。为《活人书》卷二十一“通圣散”之异名。见该条。

74579 通神散

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】附子一枚 大黄一两 牛黄五分

【用法】上为末。每服一半，以桃柳枝、青蒿各七握（锉），用童便半碗，浸一宿，来日五更煎多沸，滤滓调服。以衣服盖便睡，取下恶物，当自止。

【主治】尸劳尸虫。

【宜忌】忌食生冷、硬物、茶、蒜、炙煨、鸡鸭、虾、蟹、油腻、醃咸等物。

74580 通神散

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】白僵蚕七个（焙干，研末）

【用法】生姜汁半盏调服。立吐出风痰，又用七个，依法再吐尽，仍用大黄如指大，纸裹煨熟，含津咽下。食填，再用大黄，若口闭紧，用蚕煎汁，以竹管灌鼻中，男左女右。

【主治】①《证治宝鉴》：风痰喉痹。②《证治汇补》：中风，痰涎壅塞。

74581 通神散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】五灵脂 枯矾 干姜各三钱 木香五分

【用法】上为末。每服一钱，烧酒调下。

【主治】心胃痛。

74582 通神散

【方源】《便览》卷三。

【组成】大黄 芒消 桃仁 郁李仁（汤泡，去皮，微炒）各一两 木通（不见火）五分 当归 川芎 生地黄 芍药各二钱

【用法】上为末。每服二钱，米汤调下。

【主治】妇人大便不通。

74583 通神膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】雄黄二两（细研） 黄丹一两（细罗） 蜡六两 膩粉半两 没药末一两 麒麟竭末一两 麝香一分（细研） 桑枝四两 槐枝四两 蜴蜥三枚 当归三分 芎藭二两 白芷三分 木香三分 沉香半两 郁金半两 乌蛇肉三分 蒿本一两 细辛三分 桂心一两半 麻油二斤

【用法】上锉细，先取油倾于铛中，以文火煎令熟，下锉药煎，候白芷黄黑色，以绵滤过，拭铛令净，下蜡于铛内；煎令熔，都入药汁于铛中，下黄丹，次下诸药末，不住手搅，稀稠得所，滴在水中，药不散，即膏成；以瓷盒盛，密封闭，悬于井底一宿时出火毒。每用摊在故帛上帖，日二换之，以愈为度。

【主治】一切痈疽发背，恶疮，及痿疮。

74584 通神膏

【方源】《博济》卷三。

【异名】通圣膏、金水膏（《普济方》卷七十三）。

【组成】白沙蜜四两 青盐一字 麝香一字 乳香 硃砂半字 当归半钱 黄连一钱 白矾半字（飞过）

【用法】上于乳钵内轻研破，于青竹筒内煮半日，绵滤去滓，瓷瓶收贮。点眼。每点药时，瞑目少时，以温汤洗，翳膜等并退。

【主治】眼生翳膜，赤脉胬肉，涩痒痛有泪。

【备考】方中乳香用量原缺。

74585 通络丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】生地黄一两 覆盆子二两 苁蓉二两（酒浸，焙干） 巴戟一两（酒浸，焙干） 川芎二两 白芍药一两 当归（去须）一两 枳壳（麸焙，去瓢）二两 木香二两 川楝子半两 地肤子二两 楮实子一两 山茱萸三两 远志（去心）一两 茯神（去皮）一两 五味子一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或米饮送下。晚食前亦得。

【功用】益血明目，通经络，壮筋骨。

【备考】本方方名，《普济方》引作“通经丸”。

74586 通络片

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】地龙 姜矾南星 川乌 枫茄子 生地

【用法】制成片剂。每服3片，每日3次。

【功用】祛风通络、止痛。

【主治】关节痠痛，肢体麻木者。

74587 通泰丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】梔子仁一两 茵陈二两 海金沙一两 木通一两 赤苓 滑石（炒） 黄连各一两 大黄一两

【用法】上为末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，茵陈汤送下。

【主治】湿热黄疸，形体、尿、汗皆黄，口渴，心下满闷。

74588 通真丸

【方源】《得效》卷十五。

【组成】当归（去尾） 苍术（切，炒） 肉桂 防风 川芎 人参 白芍药 白薇（去土） 熟地黄（酒炒） 牡丹皮 茴香 白术 白茯苓 桔梗 附子（炮） 泽兰叶各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服一丸，血崩，经脉不匀，赤白带下，炒当归酒送下；血

风瘾疹瘙痒，薄荷蜜汤送下；冷气块筑心腹，呕逆反胃，炒盐汤送下；肠风泻血，赤白痢，月信不止，米饮送下；血风劳倦，青蒿酒送下；头疼眼花，荆芥茶送下；月信不行，室女红脉不通，产后诸风，中风不语迷闷，每服五丸，红花苏木汤送下；胎漏下血，气刺心腹胀满，炒姜酒送下。

【主治】血崩，经脉不匀，赤白带下；血风瘾疹瘙痒，冷气块筑心腹，呕逆反胃；肠风泻血，赤白痢，月信不止；血风劳倦，头疼眼花；月信不行，室女红脉不通；产后诸风，中风不语迷闷；胎漏下血，气刺心腹。

74589 通真丸

【方源】《医方大成》卷五。

【组成】草薢 破故纸 黑牵牛各等分 淮乌半两（用巴豆一两煮熟，去巴豆）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心盐汤送下。如利数行，欲止之，以冷水洗手即止。

【功用】通利。

【主治】脚气，大便秘结者。

74590 通真丸

《急救仙方》卷四。为原书同卷“通真煨姜丸”之异名。见该条。

74591 通真丸

【方源】《医学纲目》卷四。

【组成】大黄（去皮，米醋同煮烂） 桃仁各四两（去皮尖，另研） 天水末四两（即益元散） 干漆二两（瓦上焙至烟尽） 杜牛膝二两半

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸。

【功用】破血通经。

【主治】《嵩崖尊生》：蓄血。

74592 通真散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】黑牵牛一钱半 大黄三钱 归尾三钱 甘草节二钱 白僵蚕一钱半 木鳖三个（去壳） 穿山甲（壁土炒）二钱

【用法】上锉一剂。好酒煎，早晨空心服。少食，至巳时泻下脓血便安。

【主治】便毒。

74593 通真散

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】当归二钱 甘草五分 木鳖子一枚（去壳） 僵蚕一钱（炒） 穿山甲（炒）一钱 皂角刺五分

【用法】上以酒、水各半煎，药成后，大黄末三钱及黑丑末，空心服。用葱汤漱口，仍饮数口，利下脓血数次，再服冲和解毒汤二服。

【主治】便毒。

74594 通热汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】人参二两 白茯苓（去黑皮）一两 甘草（炙）一分 柴胡（去苗）一两 葛根（锉）一两 麻黄（去根节）一两 黄芩（去黑心）半两 石膏（碎）三两 五加皮（锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，加生姜三片，煎取七分，去滓温服。

【主治】胃气实热，头痛，汗不出，口中干燥。

74595 通秘散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】陈皮 香附子 赤茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，同煎至六分，去滓，食前服。

【主治】①《鸡峰》：气淋。②《朱氏集验方》：血淋痛不可忍者。

74596 通秘散

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】香白芷不拘多少（焙干）

【用法】上为细末。每服二钱，加蜜少许，食前温米饮调下。连进二服即通。

【主治】风秘，大便秘涩。

74597 通秘煎

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】枳实五钱 大黄七钱 瓜蒌四钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒热结不解。

74598 通脑散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】寒水石（烧通赤，研细）二钱 脑子（另研细）一钱 南硼砂（另研）一钱 盆消（另研细）半钱

【用法】上为极细末。每用少许，搐鼻，不拘时候。

【主治】目赤脑热。

74599 通脑散

《普济方》卷三八。即《圣惠》卷八十七“吹鼻通脑散”。见该条。

74600 通脑散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】川芎 当归 茯苓各三钱 桔梗二钱 蔓荆子 白芷各五分 人参 半夏各一钱

【用法】水煎服。二剂愈。

【主治】春温，伤风头痛，发热盗汗，畏风。

74601 通流饮

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】茯苓五钱 白术三钱 桂枝五分 茵陈一钱 木通 车前子各二钱

【用法】水煎服。

【主治】膀胱湿热，结而成疸。小便点滴不出，小腹膨胀，两足浮肿，一身发黄。

74602 通窍丸

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】磁石一钱（为末） 麝香五厘

【用法】上为丸，如枣核大。绵裹纳耳中，又以锈铁一块，热酒泡过，含口中。须臾气即通。

【主治】气闭耳暴聾。

【备考】《古今医鉴》本方用法：磁石锉如枣大，头尖，揉麝香少许于磁石尖上，塞两耳孔，口中含生铁一块，候一时，两耳气透，飒飒有声为度，勤用三五次即愈。

74603 通窍汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】防风 羌活 藁本 升麻 干葛 川芎 苍术 白芷各一钱 麻黄 川椒 细辛 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，葱白三根，水煎，热服。

【主治】①《回春》：鼻不闻香臭者，肺经有风热也。②《古今医鉴》：感冒风寒，鼻塞声重，流涕。

【加减】肺有邪火，加黄芩一钱。

74604 通窍烟

《惠直堂方》卷二。为《良朋汇集》卷一“通关散”之异名。见该条。

74605 通窍散

【方源】《活人心统》。

【组成】滑石一钱 硼砂五分 孩儿茶三分 冰片少许

【用法】上为末。以鹅毛管接长，兜药末，口管头对肾窍吹入。

【主治】淋病塞痛不可忍。

74606 通窍散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】辰砂三钱 珍珠 琥珀各二钱 麝香一钱 玛瑙一钱五分 冰片五分

【用法】上为极细末。若翳在右目，吹左耳；翳在左目，吹右耳；若两目有翳，即吹两耳。

【功用】通心肺二窍。

【主治】痘后眼生星翳。

74607 通窍散

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】黄丹五钱（水飞） 轻粉三钱 珍珠一颗

【用法】上为细末，吹耳。左目病，吹左耳；右目病，吹右耳。

【功用】退翳。

【主治】痘后害目症（痘疹性结角膜炎），两目赤胀，热泪常流，怕光羞明，风轮周围点点而起白膜，但不头痛。

74608 通理汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 苡仁四钱 枳壳一钱 橘红一钱 半夏一钱 厚朴一钱 苏子一钱五分 桑皮二钱 砂仁一钱 青皮一钱 姜三片

【主治】久咳三焦俱病。咳而腹满，不欲饮食，多涕吐，面浮气逆。

74609 通淋散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】瞿麦穗三两 赤茯苓一两半 条黄芩一两半 白芍药一两半 麦门冬三两（去心） 生甘草一两半 桑白皮一两半 车前子三两 冬葵子三两

【用法】上为散。每服三钱，水煎去滓，温服。

【主治】子淋，脉滑数者。

【方论选录】妊娠湿热，渍于胞门，脬气不得施化而溺窍闭塞，故小便涩痛，淋漓不已，谓之子淋，胎孕何以能安？瞿麦降心热，以通淋闭；条芩清肺热，以安胎元；白芍敛阴护胎，最滋阴血；麦冬润肺清心，得振水源；赤苓利营渗水道；生草泻火，缓涩痛；桑白皮肃清肺金；冬葵子滑利溺窍；车前子清降以利小水也。为散水煎，使湿热并解，则气化有权，而胞门清肃，小便快利，何淋漓涩痛之不已者？胎孕无不安矣。

74610 通淋散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】海金沙 滑石各一两 甘草二钱半

【用法】上为末。每服二钱，麦冬煎汤调下，日服二次。

【主治】膏淋如油。

74611 通淋散

【方源】《女科秘旨》卷八。

【组成】当归三钱 甘草三分 黄耆 白术 牛膝 独活 肉桂各八分 韭白五根 姜三片

【主治】产后遍身痛。

74612 通淋膏

【方源】《理渝》。

【组成】玄参 麦冬 当归 赤芍 知母 黄柏 生地 黄连 黄芩 栀子 瞿麦穗 篇蓄 赤苓 猪苓 木通 泽泻 车前 甘草 木香 郁金 萆薢 乱发各一两

【用法】麻油熬，黄丹收，滑石八两搅匀。贴脐下。

【主治】膀胱积热，淋秘尿血。

74613 通喉散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】如圣散（《普济方》卷六十三引《卫生家宝》）。

【组成】黄连（去须） 矾石 猪牙皂荚（去皮子）各等分

【用法】上于瓦器内煨过，成细散。每用一字匕，甚者半钱匕，吹在喉中。取出涎愈。

【主治】风热上攻，咽喉肿痛。

74614 通喉散

【方源】《名家方选并续集》。

【组成】黎实（连茎叶）二十钱 盐梅肉二个（连核） 昆布四方五、六寸许

【用法】上三味，各黑霜为细末，吹咽中。

【主治】咽喉肿痛，或喉痹食难通，或骨鲠后疼痛甚者。

74615 通痢散

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】茅术（炒，米泔水浸）三两 羌活（炒） 甘草（炙）各一两五钱 川大黄（酒制） 杏仁霜各二两

【用法】上为散。每服四分，小儿减半，炒薏苡或陈莱菔茎叶煎汤送下。

【主治】脾土不健或湿热内阻，或寒滞伤中，而成赤白痢疾。

74616 通滞汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】归（全） 香附 玄胡各二钱 川芎一钱

【用法】酒煎，热服。

【主治】经水未行疼痛。

【加减】壮人，加炒大黄。

74617 通滞散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】蒲黄二两半 当归（切，焙） 干姜（焙） 桂（去粗皮）各二两 虻虫（去足翅，炒）一两 大黄（锉，炒）三两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心温酒调下，每日二次。

【主治】伤折，腹中瘀血。

74618 通滞散

【方源】《名家方选并续集》。

【组成】香附（半炒半生） 阿胶（炒） 反鼻 大黄各等分

【用法】上为末。每服一钱，温酒送下，每日二次。

【主治】经闭带下，或痢后腹中生块，手足痿弱者。

74619 通滑散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《经验良方》。

【组成】滑石一两 木通草七钱半 冬葵子 赤茯苓 车前子 黄芩各半两

【用法】上为细末，每服一钱或半钱，食前温熟水调下。

【主治】热极小便赤涩不通，水道中痛，尿即号啼。

74620 通隘散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】通噎散（《金匱翼》卷五）。

【组成】白礞砂二钱 孩儿茶一钱 蒲黄六分 青黛一钱 牙消六分 枯矾六分 片脑二分 黄连五分（末） 滑石一钱 寒水石一钱 黄柏五分

【用法】上为末。以苇筒装药少许，吹入喉中。

【主治】喉痛生疮声哑。

【备考】《金匱翼》本方用法：上为细末，炼

化白砂糖为丸，如芡实大。卧时舌压一丸，自化入喉。

74621 通噎散

《金匱翼》卷五。为《古今医鉴》卷九“通隘散”之异名。见该条。

74622 通微丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】营实根（即蔷薇根）五两 白薇三两 虎骨 獭肝（微炙） 五灵脂各二两 丹砂（别研） 消石（别研） 雄黄（别研） 代赭（别研）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，温木香酒化下，每日三次。以知为度，不拘时候。

【主治】五络闭竭，病发尸厥，不知人。

74623 通解散

《伤寒直格》卷下。为《宣明论》卷六“双解散”之异名。见该条。

74624 通解散

《普济方》卷一四七。为《伤寒标本》卷下“通神散”之异名。见该条。

74625 通解散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】黑丑（炒，捣末） 大黄（炒） 桃仁（去皮尖） 官桂 白芍 泽泻各二钱半 干姜一钱 甘草五分

【用法】上锉二剂。水煎，空心服。

【主治】男子交感，强固不泄，以致血气交错，大小便涩滞，或肛门肿痛，或作便毒痼疽。

74626 通解散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十九。

【组成】麻黄 石膏 滑石 苍术 甘草 黄芩

【主治】①《杂病源流犀烛》：夏季外感寒邪。②《温热暑疫全书》：夏热病。

74627 通痹丸

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】川乌头（生，去皮脐） 五灵脂

(炒, 别研) 川当归(去芦, 酒浸, 焙) 各三两 草乌头五两(生, 去皮尖) 没药(别研) 木鳖子(取肉, 炒) 地龙(洗, 去土) 各二两 白胶香一两(银器内熔过) 全蝎(麸炒) 朱砂各半两(别研) 乳香一两半(别研) 麝香二钱(别研)

【用法】上为细末, 滴水为丸, 如鸡头子大, 风干。每服一丸, 生姜汁磨化, 温酒浸服。妇人血风, 当归酒磨下; 小儿惊风, 每丸分作三服, 金银薄荷汤磨下; 大人急中仆倒, 磨一丸灌之即苏。

【主治】中风, 左瘫右痪, 口眼喎斜, 半身不遂, 手足顽麻, 语言蹇涩及一切风疾。

74628 通痹散

【方源】《普济方》卷一八七引王海藏方。

【组成】独活半两 羌活三钱 防风 细辛 当归各半两 白术一两 没药二钱 僵蚕二钱 藁本三钱 甘草二钱 白芷一两 川芎二钱 苍术三钱 川山甲三钱 麝香半两

【用法】上为末。每服三钱, 食后酒调下。

【主治】腰脚冷痹。

74629 通痹散

【方源】《奇效良方》卷三十八。

【组成】独活 川芎 天麻 当归 白术各等分

【用法】上为细末。每服二钱, 食前用好酒调服。

【主治】风寒湿痹, 腰以下至足冷如冰, 不能自举, 或因热立冷水中, 久成此疾。

【备考】《医统》有藁本。

74630 通瘀饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归尾 大黄各三钱 白术(蜜炙) 木通各一钱 红花五分

【用法】上以水一碗, 黄酒一小盏, 煎二滚; 加桃仁三十个(捣烂), 再煎二滚, 去滓温服。

【主治】产后恶露不通, 心慌昏沉, 寒热交攻。

74631 通瘀饮

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】当归(酒洗) 三棱 莪术 赤芍 丹皮 白术(蜜炙) 香附(童便制) 猪苓 陈皮 木通各八分 生姜一片

【用法】水煎服。

【主治】经来臭如腐肉。

74632 通瘀锭

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】巴豆一个 斑蝥三个 麝香 冰片各少许

【用法】上为末, 以葱汁蜂蜜和捻如麦粒形。以新绵裹, 置耳中。响声如雷, 勿得惊恐, 待二十一日方可去锭。

【主治】耳聋。

74633 通瘀煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】归尾三五钱 山楂 香附 红花(新者, 炒黄) 各二钱 乌药一二钱 青皮一钱半 木香七分 泽泻一钱半

【用法】水二钟, 煎取七分, 加酒一二小钟, 食前服。

【主治】妇人血滞血积, 经脉不利, 痛极拒按, 及产后瘀血实痛, 并男妇血逆、血厥等证。

【加减】兼寒滞者, 加肉桂一钱, 或吴茱萸五分; 血盛内热, 血燥不行者, 加炒梔子一二钱; 微热血虚者, 加芍药二钱; 血虚涩滞者, 加牛膝; 血瘀不行者, 加桃仁三十粒(去皮尖), 或加苏木、玄胡索之类; 瘀极而大便结燥者, 加大黄一二三钱, 或加芒消、蓬术亦可。

74634 通瘀煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】归尾 大黄各二钱 红花 苏木各一钱

【用法】水煎, 取半碗服下, 加黄酒、童便半杯调匀服更好。

【功用】行恶血。

【主治】一切损伤。

74635 通瘀煎

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】生蒲黄三钱 五灵脂三钱 川郁金一钱半 小枳实一钱半(炒) 白术炭一钱半 建泽泻一钱半 西赤芍一钱半 桃仁泥三钱 明琥珀三钱

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】血瘀成臌，脉涩滞者。

【方论选录】血瘀不消，脾失健运之职，不能输化精微，故浊阴壅塞而胀满有加，是为血臌。蒲黄破瘀血，通经络；灵脂破瘀血，降浊阴；桃仁破瘀润燥；赤芍破瘀泻火；枳实消胀满；术炭健脾气；郁金调气开郁结；泽泻分清阳；琥珀散瘀血，以通渗道也，使瘀化气调，则冲脉清和，而肝脾气化，壅塞顿开，何腹脉之不退哉？

74636 通潮饮

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】黄柏 车前各三钱 茯苓 白术各五钱 王不留行二钱 肉桂三分 黄连一钱

【用法】水煎服。

【主治】小便溺血，其症痛涩，马口如刀割刺触而难忍。

74637 通鼻散

《普济方》卷五十七。为方出《千金》卷五，名见《圣惠》卷三十七“涂凶膏”之异名。见该条。

74638 通鼻散

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】葫芦壳(烧灰) 石钟乳 胆矾 冰片各等分

【用法】上为末。吹入鼻内，日吹二三次，出黄水，三二日即通。

【主治】杨梅结毒，毒入巅顶，头痛如破，鼻塞不通。

74639 通鼻膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】辛夷膏(《普济方》卷五十六)。

【组成】白芷半两 芎藭半两 木通半两 当归三分 细辛三分 莽草三分 辛夷一两

【用法】上锉细，以猪脂一斤，煎令白芷色黄，绵滤去滓，盛于不津器中。候冷，绵裹枣核大，纳鼻中，日换三次。

【主治】鼻窒塞，香臭不闻，妨闷疼痛。

74640 通膈丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】黄连(去须) 茯苓(去皮) 人参各三两(去芦) 朱砂一分(水飞) 真脑子少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五丸，熟水送下，每日二三次。

【主治】上焦虚热，肺脘咽膈有气如烟抢上。

【方论选录】《本事方释义》：黄连气味苦寒，入手少阴；茯苓味甘平淡渗，入足阳明；人参味甘温，入足阳明；朱砂气味苦温，入手少阴；脑子气味辛大热，能行十二经络。此上焦虚热，肺脘胸膈之间有气如烟上逆欲抢者，非大热之品不能引苦寒之药入里也。

74641 通膈丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】槟榔三两 枳实四两(麸炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食后生姜汤送下，温水亦得。

【主治】胸中气痞不通，水饮停滞。

【备考】本方改为散剂，名“通膈散”(见《御药院方》)。

74642 通膈丸

【方源】《医方大成》卷三引《澹寮》。

【组成】丁皮 草澄茄 白豆蔻 檀香 粉草各半两 砂仁 香附子 片姜黄各一两 木香二钱 甘松 丁香各三钱

【用法】上为末，用草澄茄为母泛丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【功用】快气进食，利胸膈，消膨胀。

74643 通膈丸

【方源】《斑论萃英》。

【组成】大黄 牵牛 木通各等分

【用法】上为细末，滴水为丸，如粟粒大。每服三五十丸，量虚实加减。

【功用】《准绳·幼科》：利上下气血。

【主治】①《斑论萃英》：斑出青干黑陷，身不大热，大小便涩，热在内者。②《治痘全书》：痘因内伤，腹热足冷，胀满，大小便不利者。

74644 通膈汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】昆布（洗去碱，焙） 白术各一两 丁香 槟榔（煨，锉） 诃黎勒皮 木香 半夏（汤洗七遍，炒）各三分 大黄（锉，炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入生姜三片，同煎至六分，去滓温服。

【主治】胃反，不下食。

74645 通膈汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】射干 桑根白皮（炙，锉）一两 麻黄（去根节，汤煮掠去沫，焙） 甘草（炙）各一分 槟榔（锉） 草豆蔻仁各半两 郁李仁（麸炒，去皮）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肺气喘急，烦闷，或时咳嗽。

74646 通膈散

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】枳壳（去瓢，麸炒） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉） 陈曲（炒） 诃黎勒皮 白术 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 赤茯苓（去黑皮） 人参 京三棱（煨，锉） 干姜（炮） 草豆蔻（去皮） 槟榔（半生半熟） 五味子（炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（汤洗，用生姜同捣如泥，摊在新瓦上，用文武火焙令黄色） 木香 郁李仁（汤浸，去皮，麸炒黄）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，人盐少许。

如茶点服，不拘时候。

【主治】五种膈气。

74647 通膈散

《御药院方》卷三。即原书同卷“通膈丸”改为散剂。见该条。

74648 通膈散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】蓬莪术 延胡索 北芍药 当归 川芎 甘草 丹皮各等分

【用法】上为细末。每服二钱，姜、酒调服。

【主治】妇人心腹刺痛，寒热往来。

74649 通精散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】防风 川芎 当归 赤芍药 大黄 芒消 蒺藜 石膏 黄芩 甘草 桔梗 牙消 黄连 羌活 滑石 荆芥

【用法】加姜三片，煎，食后服。

【主治】险生偷针。

74650 通隧丹

【方源】《医级》卷八。

【组成】川楝子 茴香 穿山甲 牙皂炭 冬葵子各等分 甘草稍减半 黑丑加倍

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一二钱，开水送下。

【主治】败精阻经隧，以致前后不通。

74651 通滞散

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】枳壳 大黄 皮消各二钱 陈皮 厚朴 当归 木通 红花 苏木各一钱 甘草五分

【用法】水煎，热服。以通利为度。

【主治】折伤跌仆极重，大小便不通。

【宜忌】此药切不可用酒煎，否则令人闷绝而死。凡小儿、孕妇不可服。

74652 通壅汤

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】桔梗 白及 橘红 贝母 甜葶苈 苡仁 甘草节 金银花

【主治】肺痈，咳嗽吐脓血，咳引胸中痛。

【方论选录】苡仁甘寒，益胃补肺；银花甘平，除热解毒，用以为君。川贝母辛散肺郁，甘草节甘泻肺火，用以为臣。白及苦平，肺损可以复生；葶苈甘辛，肺闭可以疏泄；桔梗开提，橘红宣通，用以为佐使。共成化毒之功。

74653 通天饮子

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】黄牛脑一具 川芎 白芷各等分（一方用川芎九钱，桔梗二两，陈皮二两，当归五钱，甘草二钱，细辛五钱）

【用法】上为末，入脑内，用厚绢包裹悬挂铤中，下好白酒二斤，蒸脑熟。连酒服。

【主治】多年头风。

74654 通气饮子

《医林绳墨大全》卷八。为《妇人良方》卷三“舒经汤”之异名。见该条。

74655 通气噎汤

【方源】《外台》卷八引《集验方》。

【组成】半夏三两（洗） 桂心三两 生姜八两 羚羊角三两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分服半升，日再服。

【主治】气噎。

【宜忌】忌羊肉、生葱、饧。

74656 通圣饼子

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】天麻 使君子（去皮） 白僵蚕（炒） 白附子（炮） 天南星（炮）各一分 乳香 青黛 蝎梢（炒） 膩粉 水银各一钱 黑铅半钱（与水银结沙子） 麝香 脑子各半钱 无食子一对（去皮）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，捏作饼子。每服一饼子，食后、临睡用薄荷汤化下。

【主治】小儿慢惊，风痫涎多，咽喉不利，手足搐搦。

74657 通耳神丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】鼠胆一枚（觅一大鼠先以竹笼养之，后以纸为匣子，引其藏身，内用果品，令其自食；久之忽然用棒捶击死，立时取胆，干者可用，用水调化，俱入药末中） 龙齿一分 冰片一分 麝香一分 朱砂一分 乳香半分 潮脑半分

【用法】上各为极细末，以入乳为丸，如绿豆大，外用丝绵裹之，不可太大。临用塞入耳之深处，至不可受而止。塞三日取出，即耳聪不再聋，不必三丸。

【主治】耳聋。

74658 通闭饮子

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】厚朴（制） 生姜（焙） 草果 香附子（去毛，炒） 草澄茄 陈皮各三钱 青皮二钱

【用法】上为细末。空心沸汤、盐点服。

【主治】膈气。

74659 通灵玉粉

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】扁鹊玉壶丹（《中藏经》卷下）、通灵玉粉散（《普济方》卷一五四）、玉壶丹（《医级》卷八）。

【组成】硫黄半斤

【用法】上以桑柴灰五斗，淋取汁，煮三复，时时以铁匙抄，于火上试之，候伏火即止，候干，以火煨之，如未伏，更煮，以伏火为度，伏了即研为细散；又穿地作坑，深一尺二寸，投水于中，待水清取和硫黄末，水不得绝，于瓷锅内煎之，候欲干，即取铁铤一所，仰著纳细砂，砂上布纸，铤下著微火，令铤热，即于瓷锅内抄硫黄于纸上滴之，自然如玉色，光彩射人；为细末，以饭为丸，如扣子大。每服十丸，空心盐汤送下。

【功用】①《圣惠》：暖水脏，益颜色。②《中藏经》：驻颜补暖，祛万痛。

【主治】①《圣惠》：腰膝痛。②《医级》：命火衰微，阳气暴绝，及虚寒水肿，寒中等候。

【临证举例】《普济方》：余乡人王昭服之，

年九十颜貌如童，夜视细字，力倍常人。

【备考】本方方名，《普济方》引作“扁鹊玉壶丸”，并云本方亦可作散，每服两字盐汤调下。

74660 通明赤丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】乌蛇（去头骨并皮） 麻黄（去根节） 白僵蚕各一两 白附子（生用） 半夏（汤洗去滑） 干蝎（去土） 干姜（炮） 天南星 附子（去皮脐）各半两 麝香（研）一分

【用法】上并生用，为末，以汤浸槐胶研和为丸，如大麻子大，以生绢袋盛，不得置盒内，亦不得以火焙。每服三丸至五丸，空心微嚼破，薄荷酒送下，如觉药冲，煨甘草含之。如中风，急以温薄荷酒磨五丸或七丸服之；小儿中诸风痼、天钓风等，以母乳磨一丸或二丸，量力服之。

【主治】中风瘫痪，并柔风，一切风疾。

74661 通经奇方

【方源】《玉案》卷五。

【组成】玉簪花（并叶） 急性子 乳香 没药各等分

【用法】上为末，以烧酒为丸。每服二钱，空心热酒送下。

【主治】经闭。

74662 通经秘方

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】大船上多年灰条不拘多少（用炭火烧通红，淬入好烧酒内，取出待干）

【用法】上为末。每服三钱。第一服空心好酒调下；第二服红花酒调下；第三服大黄酒调下。三次要见红。

【主治】经闭。

74663 通草饮子

【方源】《外台》卷二十七引张文仲方。

【组成】通草 葵子 茅根 王不留行 蒲黄（炮） 桃胶 瞿麦 滑石各一两 甘草七钱

【用法】上切。以水一斗，煮取六升，去滓，分五六次温服。

【主治】热气淋涩，小便赤如红花汁色。

74664 通草饮子

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】通草三两（一作木通） 葵子一升 滑石四两（碎） 石韦二两

【用法】上切。以水六升，煎取二升，去滓，分三次温服，如人行八九里又进一服。

【主治】热气淋涩，小便赤如红花汁色者。

【宜忌】忌食五辛、热面、炙煿等物。

74665 通塞脉片

【方源】南京中医学院制药厂。

【组成】当归 玄参 牛膝 甘草等

【用法】制成糖衣片。每次8~10片，温开水送服，每日三次。一般2个月左右为一疗程。长期服用无毒副作用。

【功用】培补气血，养阴清热，活血化瘀，通调脉络。

【主治】血栓闭塞性脉管炎，脑血栓形成及其后遗症，闭塞性动脉硬化症，静脉血栓形成及糖尿病性坏疽，血栓闭塞性血管病，冠心病心绞痛等。

74666 通元二八丹

《济阳纲目》卷二十二。为《扶寿精方》“通玄二八丹”之异名。见该条。

74667 通天再造丹

《幼幼新书》卷九。为原书同卷引《张氏家传》“夺命丹”之异名。见该条。

74668 通天再造散

【方源】《三因》卷十五。

【异名】再造散（《丹溪心法》卷四）。

【组成】郁金半两（生） 大黄一两（炮） 白牵牛六钱（半生半炒） 皂角刺一两（炮、经年黑大者）

【用法】上为末。每服五钱，日未出面东以无灰酒调下，尽量为度。晚利黑头小虫，病稍轻者止利如鱼肠臭秽物，甚者不过三二次。

【主治】①《三因》：大风恶疾。②《痼疾机

要》：疔疮下体患多。

【宜忌】①《三因》：轻者忌毒半月，但食稠粥软饭，渐生眉毛，皮肤如常；甚者须将理，不可妄有劳动，并终身不得食牛、马、骡、驴等肉。②《丹溪心法》：忌房事。

【方论选录】《医钞类编》：郁金散肝郁，下气破血，下虫毒；皂刺出风毒于荣血中；大黄利出瘀恶；牵牛利大小便，且苦寒皆能杀虫也。

【临证举例】疔疮 《疔疮机要》：一男子冬间口苦耳鸣，阴囊湿痒，来春面发紫块，微肿麻木，至冬遍身色紫，不知痛痒，至春紫处俱大，至夏渐溃，又至春眉落指溃。此患在肝胆二经，今刺手指缝并臂腿腕出黑血，先与再造散二服，下毒秽，更以小柴胡合四物汤加白芷、防风、天麻、皂角刺，渐愈。又与换肌散，但遍体微赤，此血虚有火，因家贫未得调理，秋间发热，至春面仍发块，用前散并养血药，喜年少谨疾得愈。

74669 通天再造散

【方源】《普济方》卷一一〇引《十便良方》。

【组成】锦纹大黄一两（湿纸包裹煨熟，切片，焙干） 皂角刺一两（去刺皮，取其茎，锉碎）

【用法】上为细末。每服十钱，空心冷酒调下一方寸匕。至午时取下毒物如鱼脑胶相似；如未取再服五钱，即取下如乱发之虫；恶物取尽，然后服补药雄黄膏。

【主治】大风。

74670 通天再造散

《普济方》卷一一〇。为《直指》卷二十四“皂棘汤”之异名。见该条。

74671 通天达地散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】连翘 防风 贝母 荆芥 玄参 枳壳 甘草 白芥子 赤芍 天花粉 桔梗 牛蒡子 黄芩 射干

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】①《冯氏锦囊》：诸喉病，疔腮肿毒。

②《会约》：喉痹肿痛。

【备考】《会约》本方用量各等分；用法：外用木鳖子磨醋噙喉中，引去其痰，不可咽下，太酸，少掺清水亦可；随服煎药，后用吹药。

74672 通天达地散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】白矾（细末）五分 乌鸡子一个

【用法】二味调匀，灌喉中。

【主治】缠喉风。

74673 通天愈风汤

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】人参一钱 威灵仙（去芦）半钱 南星（汤泡） 贝母（去心）各一钱 连翘 防风（去芦）各五分 瓜蒌仁十五粒 白术一钱半 桔梗三钱 甘草 荆芥穗各五分 生姜三片

【用法】上以水一钟半，煎至七分，去滓，入荆沥一呷，姜汁些少，半饥时送下清心导痰丸五十丸，每日一次。

【主治】①《医学纲目》：舌纵，涎下多唾。②《杂病源流犀烛》：肝风。始而口角流涎，渐至口眼歪斜。

74674 通气生姜丸

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】人参 茯苓 神曲（炒） 麦芽（炒）各一两半 官桂 归尾 陈皮（炒）各六两 半夏（洗）一两 生姜（去皮，切）六两 厚朴六两

【用法】上为末，以生姜汁煮曲糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】三焦虚胀。

74675 通气防风汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】防风通气汤（《杏苑》卷三）。

【组成】防风 羌活 陈皮 人参 甘草各五分 藁本 青皮各三分 白豆蔻 黄柏各二分 升麻 柴胡 黄芩各一钱

【用法】上咬咀，都作一服，水二盏，煎至

一盞，去滓，食后温服。

【功用】①《内外伤辨》：泻风热。②《脾胃论注释》：开泻肺经的风热，解肌表而和膀胱。

【主治】①《内外伤辨》：风热乘肺，肺气郁甚，肩背痛，汗出，小便数而少。②《脾胃论》：手太阳气郁而不行，肩背痛不可回顾。

【宜忌】①《内外伤辨》：如面白脱色，气短者，不可服。②《脾胃论》：气盛者，宜服。

【方论选录】《脾胃论注释》：用柴胡、升麻升阳气；黄耆、人参、甘草益肺气；防风泻肺经风热，用于升阳与益气之中，因为防风既是风药中润剂，又能助黄耆以益气；羌活、藁本散太阳的风寒，橘皮运脾气，青皮理胃气，薏仁宣肺气，三使分途而出，少用黄柏引热下行，阳气舒伸，气通痛定，溲便自调。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“防风汤”。

74676 通气防风汤

《医学发明》卷五。为《内外伤辨》卷中“羌活胜湿汤”之异名。见该条。

74677 通气防风汤

《东垣试效方》卷二。为《兰室秘藏》卷下“上清汤”之异名。见该条。

74678 通气防风汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】苍术一钱半 羌活 茯苓 泽泻 白术 陈皮各一钱 甘草四分 桂枝 威灵仙 桔梗 防风 赤芍各五分

【用法】上药以水二盞，加生姜三片，煎。

【主治】肩背痛。

74679 通气防风散

《伤寒直格》卷下。为《宣明论》卷六“双解散”之异名。见该条。

74680 通气防风散

《普济方》卷九十七。为《内外伤辨》卷中“羌活胜湿汤”之异名。见该条。

74681 通气利中丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】白术一两 白芷 羌活各半两

黄芩 滑石（取末）各一两半 大黄二两半 牵牛（取末）一两半

【用法】上除滑石、牵牛另研极细末外，余合为细末，入上药和匀，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至百丸，食后、临卧茶汤送下。

【主治】眇多眵，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结，或风热不制，热甚而大便硬者。

【方论选录】方以白术苦甘温，除胃中热为君；白芷辛温解利，羌活苦甘平微温，通利诸节为臣；黄芩微苦寒，疗热滋化，滑石甘寒，滑利小便，以分清浊为佐；大黄苦寒，通大便，泻诸实热；牵牛苦寒，一说味辛，利大便除风毒为使。此逆攻之法也。然牵牛有毒，非神农药，今与大黄并用者，取其性猛烈而快也。

【宜忌】不宜久用，久用伤元气。

74682 通气辛黄散

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】藁本 羌活 防风 薄荷 白芍 辛黄 升麻 甘草 川芎 当归 生地 黄芩 连翘 桔梗 白芷 黄连 麦冬 柴胡 山梔仁

【用法】水二钟，加生姜一片煎服。

【主治】鼻痔。

【宜忌】戒酒，绝欲，除烦恼忧愁。

74683 通气阿魏丸

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】阿魏二两 沉香一两 桂心半两 牵牛末二两

【用法】上先用醇酒一升，熬阿魏成膏，入药末为丸，如樱桃大，朱砂为衣。每服一丸，酒化下。

【主治】诸气不通，胸背痛，结塞闷乱者。

74684 通气驱风汤

【方源】《得效》卷十三。

【组成】天台乌药五两 桔梗（去芦） 川白芷 川芎 甘草（炙） 陈皮（去白） 白术各三两半 麻黄（去根节） 枳壳（麸炒，

去瓢)各一两半 人参(去芦)半两

【用法】上为末。每服三钱,紫苏、木瓜煎汤调下。

【主治】男子妇人血气虚弱,虚风攻注,肌骨颤掉,肩背刺痛,手足拳挛,口角喎斜,半身不遂,头目眩晕,痰涎壅盛,语言蹇涩,行步艰难,心忪气短;客风所凑,四肢拘急,鼻塞身重,头疼;脾胃不和,心腹刺痛,胸膈不快,少力多困,精神不爽,不思饮食,呕吐恶心,霍乱吐泻,胎前产后,气虚百病。

74685 通气驱风汤

《普济方》卷八十八。即《直指》卷三引《良方》“人参顺气散”。见该条。

74686 通气祛风汤

《准绳·类方》卷八。为《局方》卷二(宝庆新增方)“人参顺气散”之异名。见该条。

74687 通气散坚丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 石菖蒲 枳实(炒) 人参 胆南星 天花粉 桔梗 川芎 当归 贝母 香附 海藻 黄芩(酒炒)各等分

【用法】上为末,荷叶煎汤泛为丸,如豌豆大。每服一钱,食远以灯心二十根,生姜三片,泡汤送下。

【功用】《金鉴》:清肺气,调经脉,理劳伤,和荣卫。

【主治】①《外科正宗》:忧郁伤肺,致气浊不清,聚结为瘤,色白不赤,软而不坚,随喜怒消长者。②《金鉴》:劳伤元气,腠理不密,外寒搏之,致生气瘕、气瘤。

74688 通心辰砂丸

【方源】《普济方》卷八十八引《旅舍备要》。

【组成】朱砂半两(研) 龙脑半两 硃砂半两(研,明者) 黄丹(炒)一钱 白芥子(微炒,取末)一两 半夏(汤洗,取末)半两 天南星(炮,取末)半两

【用法】上为末,而糊为丸,如绿豆大,朱砂为衣。每服十五丸,同铁粉、牛黄丸共服。

【主治】一切风涎潮发,以致狂语,状若心风。

74689 通水至奇汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参三钱 莲子三钱 白果二十个 茯苓三钱 甘草一钱 车前子三钱 肉桂三分 王不留行三钱

【用法】水煎服。

【主治】膀胱气化不行,小便不通。

【方论选录】此方之奇妙,全在用人参,其次则用肉桂三分,盖膀胱必得气化而始出。气化者何?心包络之气也,膀胱必得心包络之气下行,而水路能出。尤妙用白果二十个,人多不识此意:白果通任、督之脉,又走膀胱,引参、桂之气,直奔于膀胱之中。而车前子、王不留行尽是通泄之物,各随之趋出于阴气之口也。

74690 通仙五宝汤

《寿世保元》卷九。为《回春》卷八引王范泉方“通仙五宝散”之异名。见该条。

74691 通仙五宝散

【方源】《回春》卷八引王范泉方。

【异名】通圣五宝丹(《东医宝鉴·杂病篇》卷八)、通仙五宝汤(《寿世保元》卷九)。

【组成】钟乳粉三分 大丹砂二分 琥珀五厘 冰片五厘 珍珠二厘半

【用法】上为细末,另人飞白霜二分半(炒过)合作一服。每服五厘,每一料分作十二帖。每一日用土茯苓一斤,水煎作十二碗,去滓,清晨用一碗入药一帖,搅匀温服。其茯苓汤须一日服尽,不可别用汤水并茶,日日如是。服尽一料,至十二日即愈;或有不终剂而愈者;如病重,须再服一料,无不愈也。

【主治】凡人病过杨梅、天泡、绵花等疮,致成一切难名状之疾;或杨梅疮烂见骨,经年不收口者;或筋骨疼痛,举发无时;或通身疙瘩不消;或手足皴破出血;或通身起皮发痒,好一层起一层;或赤癰、白癰,鹅掌风癣;或皮好骨烂,口臭难当,及年久臃疮

不愈；一切顽疮恶毒。

【宜忌】忌食鸡、鹅、牛肉及房事。

74692 通白四逆汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】炙甘草 熟附子 干姜 葱白

【主治】寒伤太阴，腹冷如冰，每至五更则绵绵而痛，时欲大便，便而滑利，粪色淡白而不黄。

74693 通用乌须方

【方源】《医统》卷六十六。

【组成】五倍子（要川中大者，打如豆大，锅内炒黑色，白烟起时自然炒作一团，取起，裹湿青布内踏成饼，以石压，晒干收，听用）红铜花（将细红铜丝以炭火煨，醋中淬之，不拘遍数，以化尽为度；去醋，取铜花，晒干）皂矾三分 明矾三分 没石子一分 食盐二分 硃砂（净）一分

【用法】每次染时，旋配倍子末，以二钱为则，铜花四分，余皆一二分，和匀作一副，以烧酒或煎浓茶用瓷酒杯调如稀糊，坐汤中煮之，杯内绿气生面为好。先用皂角汤洗须净，拭干，将药以掠柄涂上，以皮纸答湿包之，或以青布囊囊之，过夜。次早温水洗之，不润，用胡桃油捻指润之，一连染二夜，其黑如漆。制得法者可黑一月。

【功用】乌须。

74694 通用痛风丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《医林纂要》卷五。

【组成】南星（姜制） 苍术（泔浸） 黄柏（酒炒）各二两 川芎一两 白芷半两 神曲（炒）一两 桃仁半两 威灵仙（酒拌）三钱 羌活三钱 防己半两 桂枝三钱 红花（酒洗）一钱半 草龙胆半钱

【用法】上为末，曲糊为丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心，白汤送下。

【功用】《医林纂要》：泻热行痰，祛风去湿。

【主治】①《丹溪心法》：痛风，上中下疼痛。②《医林纂要》：行痹，痛痹，著痹，热痹，痰痹，

血痹。

【方论选录】《医林纂要》：黄柏坚肾水以清热，苍术行肝木以燥湿，二药皆有辛味，兼能祛风；天南星辛苦温，祛风燥痰，通关透节；神曲调剂中州，兼能祛风寒热湿郁积之淫邪；川芎行血中之气，桃仁活血祛瘀，红花以佐桃仁，龙胆草苦寒，助黄柏以泻相火；防己辛苦寒，通行经络之湿；白芷祛阳明之风；羌活祛筋骨百节之风；威灵仙辛咸温，祛风行湿破结，性最快利；桂枝横行于手。全方合泻热行痰，祛风去湿之药，故可通治痹证。

74695 通玄二八丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】通元二八丹（《济阳纲目》卷二十二）。

【组成】黄连八两（去毛，雅州者） 当归（酒浸） 生地黄（酒浸） 白芍药 乌梅肉 各五钱

【用法】上为细末，以雄猪肚一个，盐醋洗去秽气，煮将熟，取控干水，入药在内，置甑中，上下韭菜厚铺，自辰至酉，慢火蒸之，以银簪插试有黄色为度，乘热为丸，如梧桐子大。每服七十丸，治积聚，空心姜汤送服，泻一二次即愈，用粥补，治泄痢，饭后茶汤送服，即止；若肠滑、肠风下血，可常服。

【功用】能通能塞。

【主治】积聚，泄痢肠滑，肠风下血。

74696 通玄千金丹

【方源】《医方类聚》卷二六六引《保童秘要》。

【组成】青黛二钱（细研） 熊胆（汤化破） 蛇皮灰 膩粉 芦荟各一钱 蝉壳三个（去足） 瓜蒂二十个 田父头一个（炙） 麝香半钱 蟾酥二个 獾猪胆一个

【用法】上为末，纳熊胆、膩粉、麝香、蟾酥于乳钵内别研，与前药相和，以猪胆浸蒸饼为丸，如黄米大。每服一丸，如惊风，先取半丸，温水化破，滴入鼻中，余半丸，以薄荷温水研入口中；如疳气状貌多端者，粥

饮送下，甚者不过三五服；若变成寒热，薄荷温水送下；蛔蛭心，苦楝子煎汤送下；久患疳痢，陈米饮送下。

【主治】小儿惊风，疳积，疳痢。

74697 通玄消肾散

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】玄胡 猪苓 柴胡 甘草 连翘 山梔 泽泻 苍术 白术 青皮 陈皮 乌药 木香 茴香

【主治】小肠气走痛。

74698 通圣五宝丹

《东医宝鉴·杂病篇》卷八。为《回春》卷八引王范泉方“通仙五宝散”之异名。见该条。

74699 通圣双行汤

【方源】《三因》卷十四。

【异名】通圣汤（《普济方》卷二八三）。

【组成】大黄（蒸）一两 木鳖（去壳，切） 防风 枳壳 桔梗 甘草各一分

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盞，煎至七分，去滓，入朴消二钱，重煎溶，热服。得疏转一二次，即服万金汤。

【主治】伤风寒暑湿，或涩或散，使气血滞凝，肉腐为脓，壅结成痈疽，随处发作。

【宜忌】阴证忌服。

74700 通圣双解散

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】防风 川芎 桔梗 芍药 黄芩 薄荷 当归 荆芥 滑石 石膏 白术 连翘 梔子 麻黄 大黄 朴消各等分 甘草减半

【用法】上咬咀。入生姜水煎，调益元散服；或为末，蜜丸，生姜汤化下。

【主治】小儿表里俱热，或疮疹。

【加减】有表无里，去消、黄；有里无表，去麻黄。

74701 通圣消毒散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】荆芥 防风 白芷 连翘 甘草 川芎 当归 薄荷 黄芩 山梔 滑石 桔

梗 石膏 芒消 大黄 麻黄 牛蒡子（一方用犀角）

【用法】水煎服。

【主治】头面肿甚，目不开，鼻塞，口干舌燥，烦渴，内外有热，或咽肿痛不利，或内热大便秘结，脉洪数。

【加减】肿不消，加重牛蒡子，再加玄参。

74702 通耳红棉散

《全国中药成药处方集》（兰州方）。为《寿世保元》卷六“红棉散”之异名。见该条。

74703 通邪表毒汤

《外科图说》卷一。为原书同卷“通邪煎”之异名。见该条。

74704 通关止血丸

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】枯白矾一钱 沉香三分 半夏四个 糯米十四粒 麝香一分

【用法】上为末，面糊为丸，如豌豆大。每用二丸，塞左右两耳，即服陈槐汤。

【主治】鼻衄。

74705 通关导滞散

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】木香 槟榔 枳壳 当归尾 厚朴各一钱 大黄三钱

【主治】大便不通。

【加减】小便不通，加瞿麦、木通、滑石各一钱半，用八正散水煎，食前服。

【备考】《济阳纲目》本方用法：上锉，以水一钟半煎至八分，食前服。

74706 通关利窍散

【方源】《玉案》卷二。

【组成】麝香一钱 半夏三钱 青黛八分 猪牙皂角五钱

【用法】上为细末。用少许吹鼻。有嚏者生，无嚏不治。

【主治】中风。不省人事，牙关紧闭，汤水难进。

74707 通关青金散

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】薄荷叶 好朴消各四两(钱) 川芎 青黛各二钱 脑子一分

【用法】上为细末。搐鼻。

【主治】偏正头风；赤眼。

74708 通关神应散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】山慈姑 硼砂 海巴(煨) 川连(入姜汁内煨熟) 珍珠(煨) 明矾(煨) 冰片 辰砂(水飞) 红铁皮(即铁锈，以有锈之铁煨，醋淬，刮下) 各等分

【用法】上为细末，瓶贮。每用三五厘，以鹅毛管吹于患处。重者，三五次取效。

【主治】一切咽喉肿痛，乳蛾，喉痹，缠喉风。

74709 通关滋肾丸

《全国中药成药处方集》(上海方)。为《兰室秘藏》卷下“通关丸”之异名。见该条。

74710 通关瞿麦汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】瞿麦穗 芍药 大黄(铤，炒) 当归(切，焙) 葵子 甘草(炙) 榆白皮(铤) 栀子仁 木通(铤) 石韦(去毛) 大麻仁各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，入灯心少许，煎至一盂，去滓温服。

【主治】膀胱积热，小便不通。

74711 通阳圣化汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】当归二钱 川芎一钱 香附二钱 白术一钱五分 羌活一钱 白芷五分(酒蒸) 辛荑一钱(切) 天麻六分 红枣五枚 姜三片

【主治】寒伤脑漏，鼻窍不通，时流浊涕。

74712 通阳抑阴煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归二钱 琥珀一钱 辰砂五分 丹参三钱 远志五分(甘草水炒) 沉香五分 破故纸一钱五分 益智仁一钱 茯神二钱 白术一钱 枣二枚 姜三片

【功用】养心营，通心气。

【主治】心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，噤干善噫，厥气上则恐。此乃心经主病而兼肾病也。

74713 通阳消毒汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】茯苓三钱 神曲一钱 消砂一钱 甘草一钱 麻黄五分 白术三钱 黄柏一钱 天花粉三钱 黄耆五钱 蒲公英三钱

【用法】水煎服。

【主治】阳湿痰破疮在手而未溃者。

74714 通声辛甘煎

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【异名】通声膏(《鸡峰》卷十一)。

【组成】酥(真者) 蜜 饴糖 生姜(取自然汁) 百部(取自然汁) 枣(炊，去皮核，研) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，研) 各一升 柑皮五枚(为末)

【用法】上以微火煎，不住搅，约一炊久，取药汁减半止。每服一匙头，酒调细细咽之，日二夜一。

【主治】肺虚，为风寒所伤，语声嘶哑，气息喘急，上气咳嗽。

74715 通利运转汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】寒水石 车前子 木通 滑石各二钱 麝香三分 淡竹叶二十片

【用法】水煎，空心服。

【主治】脾转内热。

74716 通利定胀汤

【方源】《点点经》卷三。

【组成】当归 腹皮 槟榔 木通 厚朴 六曲 山楂 黄芩 枳壳 栀子 酒军 朴消 木香

【用法】不用引。

【主治】酒染成痞，面红腹胀，气喘发咳。

74717 通利湿气丸

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】沉香 木香 丁香各(另研)二钱

巴霜 陈皮(洗) 青皮(醋炒) 莪术(炒) 乌梅肉(焙干) 黄连 槟榔各五钱

【用法】将巴霜醋浸一时煮干,皮纸重碾去油,和各药研细,米糊为丸,如黍米大。每服三五丸,温白汤送下。

【主治】痢疽。

74718 通肝生乳汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】白芍五钱(醋炒) 当归五钱(酒洗) 白术五钱(土炒) 熟地三分 甘草三分 麦冬五钱 通草一钱 柴胡一钱 远志一钱

【用法】水煎服。一剂即通,不必再服。

【主治】羞愤成郁,土木相结,致产后数日两乳胀满作痛,乳汁不通。

74719 通肝收乳汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】柴胡 当归 白芍 熟地 白术 甘草 麦冬 远志 麦芽 通草

【功用】舒肝养血。

【主治】肝郁乳汁自漏。乳汁不断自行漏出,量少质浓,两乳胀硬疼痛,精神郁闷,性急易怒,或脘胀纳少,舌质正常或偏暗红,脉弦涩。

74720 通肠活血汤

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】生军一钱 熟地一钱半 炙甘草三分 腹皮 枳壳 陈皮 青皮 苏木八分 乌药 川断 羌活 独活 木通 加皮 桃仁 红花 当归 玄胡索

【用法】酒、水煎,食远服。

【主治】伤肛门,大便不通。

【备考】方中腹皮至玄胡索用量原缺。

74721 通肠痔漏丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】白术(麸炒) 白茯苓(焙) 当归(酒洗,锉破,不得见火) 黄柏(炒) 羌活(炒) 独活 防己(焙) 防风 定风草(即独活苗,生用) 荆芥(生) 山豆

根(不见火) 柏子仁(生) 白鲜皮(醋炒) 白蒺藜(生) 赤芍(醋炒) 百部(醋炒) 一两 人参五钱(焙,日久加至一两) 苦参五钱(炒) 薏苡仁五钱(焙) 天花粉二两(炒燥) 玄明粉一钱(重者加至三钱)

【用法】上各为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一百丸,莲肉汤送下,每日三次。服至十二两愈,重者不过一斤。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌煎炒、酒色、气恼。

【备考】方中白术至赤芍 15 味药用量原缺。

74722 通肠痔漏方

【方源】《吴氏医方类编》卷五。

【组成】龟版(酥炙) 槐花(炒黄) 肥皂核(炒黄色) 各一两 戊盖一个(即狗头骨,用羊酥油炙)

【用法】上为末,醋煮鳖汤为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心白汤送下,每日三次。

【主治】痔漏。

【加减】如漏流脓,加酥炙番木鳖三钱同丸。

74723 通肠解毒汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】生甘草一两 大黄一两 金银花一两

【用法】水煎服。

【功用】解毒通利。

【主治】因服断肠草,初则胸前隐隐作疼,久则气不能通,及至腹痛,大小便俱不能出。

【方论选录】方用金银花、生甘草以解其毒,用大黄迅逐以通其气,毒解气通,断肠之草何能作祟哉。

74724 通补血络汤

【方源】方出《临证指南医案》卷三,名见《证因方论集要》卷三。

【组成】人参一钱 当归二钱 茺蔚子二钱 香附(醋炒)一钱 茯苓三钱 小茴一

钱 生杜仲二钱 白芍(炒) 肉桂

【功用】通补血络。

【主治】经水不至，腹中微痛，右肋蠕蠕而动，皆阳明脉络空虚，冲任无贮所致。

【方论选录】《证因方论集要》：人参、茯苓通补阳明，归身、白芍柔和厥阴，香附、小茴辛以走络，肉桂、杜仲温以暖肝，菟蔚子活血顺气。

【备考】方中白芍、肉桂，用量原缺。

74725 通补奇经丸

【方源】《温病条辨》卷五。

【组成】鹿茸八两（力不能者以嫩毛角代之） 紫石英（生研极细）二两 龟版（炙）四两 枸杞子四两 当归（炒黑）四两 肉苁蓉六两 小茴香（炒黑）四两 鹿角胶六两 沙苑蒺藜二两 补骨脂四两 人参二两（力绵者，以九制洋参四两代之） 杜仲二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如小梧桐子大。每服二钱，渐加至三钱。

【功用】《吴鞠通医案》：通补八脉。

【主治】①《温病条辨》：妇人肝虚而热，每殒胎必三月者。②《吴鞠通医案》：疟疾，带下，月经不调。

【宜忌】《吴鞠通医案》：暂戒猪肉，永戒生冷。

【加减】大便溏者，加莲子、芡实、牡蛎各四两，以蒺藜、洋参熬膏为丸；淋带者，加桑螵蛸、菟丝子各四两；癥瘕久聚少腹痛者，去补骨脂、蒺藜、杜仲，加肉桂、丁香各二两。

【临证举例】①疟疾 《吴鞠通医案》：孙，四十岁，少阴三疟，二年不愈，寒多热少，脉弦细，阳微损及八脉，与通补奇经丸四两，服完全愈。②带下，月经不调 《吴鞠通医案》：乙酉八月十九日，余氏，二十三岁，产后漏经半年，经止后一年有余，忽来如崩，又疑半产。以温经法后至九月初一日经通，舌白滑，五日前面肿腹痛，带下特甚，其为带脉之寒湿下注无

疑。以温经散寒利湿等法后至十一月十四日，带症已少，不时举发，经不调，六脉阳微之极。此症病起产后，漏经半年，胞宫之损可知，体厚湿重易肿，纳食不旺，阳明之虚又可知矣，当兼治之。每日空心服奇经丸三钱，以补胞宫；午间、晚间各服温经行湿汤药一碗，以理阳明为主。

74726 通补肺督丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生耆皮 杏仁霜 姜半夏各一两半 生于术（米泔水浸晒） 云茯苓 羊脊骨（炙黄） 菟丝子（生晒）各三两 嫩毛鹿角（镑）二两 桂枝木七钱 蜜炙麻黄 北细辛各三钱 广皮红一两 甘草（炙黑）五钱。

【用法】上为末，用生苡仁煮浆糊丸。每服三钱。

【功用】温补肺肾，化痰平喘。

【主治】伏饮久踞，阳衰浊泛，渐损及阴而致哮喘，症见上气郁闷，勉强咳出一二口痰，痰中稍杂以血点。

74727 通补温络汤

【方源】方出《临证指南医案》卷七，名见《证因方论集要》卷三。

【组成】黄耆四两 茯苓三两 生白术三两 炙草 淡苁蓉二两 当归三两 牛膝二两 仙灵脾二两 虎骨胶 金毛狗脊十二两（无灰酒浸半日，蒸熬膏）

【用法】胶、膏为丸。

【功用】温养通补。

【主治】痹痛止而行走痿弱无力。

【方论选录】行走痿弱，有属肝肾阳不足者，肉苁蓉生精补阳，仙灵脾专益精气，金狗脊能健筋骨，虚骨胶追风定痛，耆、术、苓、草以护持脾阳，当归、牛膝以通达肝络。

【备考】方中炙草、虚骨胶用量原缺。

74728 通灵万应丹

【方源】《痧证汇要》卷一。

【组成】茅山苍术（色黑而小朱砂点者佳，

米泔水浸软,切片,烘干,为末)三两 丁香(不拘公、母)六钱 明天麻(切片,焙干,为末) 雄黄(透明者,研细,水飞) 麻黄(去节,细锉,焙,为末) 朱砂(研细,水飞)各三两六钱 真蟾酥九钱(好烧酒浸化) 麝香(上好者,为末)三钱 绵纹大黄(切片,晒干,为末)六两 甘草(去皮,微炒,为末)二两四钱

【用法】上各为细末,以糯米粥浆为丸,如萝卜子大,朱砂为衣,候干,收贮瓷瓶备用。每用轻者三丸,重者七丸,纳舌下,少顷咽下;中暑、绞肠腹痛及中寒腹痛等证,先将二丸研细,吹入鼻内,或纳之舌下,少顷吞下,再灌六丸,阴阳水或凉水送下;山岚瘴气、空心触秽,感冒风寒等证,口含三丸,邪热不侵;痈疽疔毒,及蛇蝎毒蛇所伤,捣末,好酒调敷;小儿发痘不出、急慢惊风,并年老臌胀噎膈等证,灯心汤或凉水加倍调服。

【主治】中暑头眩眼黑,及绞肠腹痛,一时闭闷,不省人事,斑痧;中寒骤然腹痛,阴阳反错,睡卧不安,手足厥冷,吐泻不出,卒然难过;山岚瘴气;夏月途行,及空心触秽;感冒风寒,恶心头痛,肚腹饱胀,风疾;痈疽疔毒,及蛇蝎所伤;小儿发痘不出,及急慢惊风,痰涎壅盛,并年老臌胀,噎膈。

【宜忌】孕妇忌服。又此方不宜与玉枢丹一时并服,以甘草与红芽大戟相反。

74729 通灵玉粉散

《普济方》卷一五四。为《圣惠》卷九十八“通灵玉粉”之异名。见该条。

74730 通灵黄金膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】木香 当归(洗,焙) 金毛狗脊(去毛) 防风(去芦头) 白及 白薇 香白芷 白术 乳香(别研) 松脂(别研) 枫香(别研) 杏仁(去皮尖,别研)各一两

【用法】上件除乳香、枫香、松脂外,各焙干锉细,用清油三斤,炼熟放冷,浸药于银石器内,文武火养三日,常似鱼眼,勿令大

沸,恐损药力,候香白芷黄为度;滤过,别入净锅内,入黄蜡八两,细罗黄丹二两,次入已研者枫香、乳香,用槐、柳枝子不住手搅,再上慢火熬少时,候凝即成。每先用膏药半分,蛤粉为衣,温酒送下;次用药摩患处。如损折者,以竹夹挟直,用药摩之;患缠喉风服药不下者,先用药于喉外摩之,候喉宽,然后服之;牙疼、齿浮出血者,以药填齿缝,如有清水吐之;耳内停风气,疼痛作声,纸捻经药在耳内。

【主治】打扑伤损,驴伤马坠,痈疽,瘰癧,鬼箭,骨疽,漏疮,软疔,眉疽,发背,脑疽,脚膝生疮,远年恶疮,臃疮、缠喉风,五般痔,漏耳,鼻内生疮,牙疼,耳痛。

74731 通顶石南散

【方源】《幼幼新书》卷六引《龙木论》。

【异名】石南散(《本草纲目》卷三十六)。

【组成】石南一两 藜芦三分 瓜蒂五七个

【用法】上为细末。每用一梗米许,搐鼻,每日二次,通顶为妙。

【功用】《银海精微》:利膈,开风痰。

【主治】①《幼幼新书》引《龙木论》:小儿通睛外障;初因失误,筑打头面额角,倒蹙扑下,令小儿肝受惊风,使目通睛。②《银海精微》:肝受风痰盛,瞳人开大眼不收而展缩者。

74732 通顶吹鼻散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】藜芦一分(去芦头) 瓜蒂三分 马牙消三分 龙脑半钱(研) 麝香半钱(研)

【用法】上为细散,研入龙脑、麝香令匀。每用少许,吹入鼻中。得嚏即愈。

【主治】伤寒头痛不止。

74733 通顶抽风散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】消石二两

【用法】上以新瓷瓶内盛,渐以水熔成汁,时时投三二十粒生萝卜子入于消内,候烟出

尽，又投，直候萝卜子、消石无声；消已伏火，去火放冷，敲破瓶，取出研如粉；用萝卜子一两，去皮，拣净，只取半两；麝香半钱，合研令细。每用半字，纳笔管内，随左右痛处，猛用力吹入鼻内。当有清涕水出，其疼痛立止。

【主治】眼睛如针刺疼痛。

74734 通顶定命散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】芦荟一分（细研） 瓜蒂一分 麝香一钱（细研） 鹅不食草一分 猪牙皂荚一分

【用法】上为细散。每取少许，吹于鼻中。当嚏出疳虫，黑者难治，赤白黄者易医。

【主治】小儿一切疳，脑热鼻塞。

74735 通肾祛邪散

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术一两 茯苓五钱 瞿麦一钱 苡仁五钱 扁蓄一钱 肉桂三分 车前子三钱

【用法】水煎服。

【主治】肾虚而感湿热所致淋证。

74736 通肾消水汤

【方源】《傅青主男女科·男科》卷下。

【组成】熟地 山药 苡仁各一两 山萸一钱五分 茯神五钱 肉桂 牛膝各一钱 车前子三钱

【用法】水煎服。

【功用】通肾气。

【主治】水结膀胱。目突口张，足肿气喘。

74737 通明利气丸

《便览》卷一。即《回春》卷五“通明利气汤”改为丸剂。见该条。

74738 通明利气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】苍术（盐水炒） 白术（瓦焙） 香附（童便炒） 生地黄（姜汁炒） 槟榔各一钱 抚芎八分 陈皮（盐水浸炒）一钱 贝母三钱 黄连（酒浸，猪胆汁炒） 黄芩

（同上制）各一钱 黄柏（酒炒） 梔子仁（炒） 玄参（酒洗）各一钱 木香 甘草（炙）各五分

【用法】上锉作二剂。加生姜，水煎，入竹沥同服。

【主治】虚火上升，痰气郁于耳中，或闭或鸣；或痰火炽盛，忧郁痞满，咽喉不利，烦躁不宁。

【备考】本方改为丸剂，名“通明利气丸”（见《便览》卷一）。《便览》有菖蒲（去毛）二钱，无竹沥。

74739 通明补肾丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】车前子 石决明 桔梗 芍药各一两 细辛二两 大黄一分 茺蔚子 干地黄各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】五风变内障。因脏腑虚劳，肝风为本，初患之时，头旋偏痛，或一眼先患，或因呕吐双暗，毒风入眼，兼脑热相侵，致令眼目失明。

74740 通明补肾丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】楮实子 五味子 枸杞子各一两 人参 菟丝子 肉苁蓉 菊花 熟地黄 当归 牛膝 知母 黄柏 青盐各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服五十丸，空心盐汤送下。

【主治】玉翳遮睛。因肝风入脑，肝膈积热，久则肾虚，致眼中发热或赤痛，初起红肿赤脉穿睛，渐生白翳，久则成片遮睛乌睛，凝结如玉色。

74741 通乳四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 木通一钱半 王不留行三钱 花粉三钱 猪蹄二只 知母一钱半（酒炒）

【用法】水、酒各半浓煎，去滓，温服。

【功用】《中医妇科治疗学》：清营养血。

【主治】①《医略六书》：乳汁不行，脉虚数者。②《中医妇科治疗学》：产后血虚兼热，乳汁不行，面色苍白，有时颊赤，头眩心悸，手心灼热，口舌干燥，或午后潮热，心烦寐少，小便淡黄，大便干燥，舌红苔薄黄，脉细数。

【方论选录】产后血虚热炽，不能施化津液以上奉为乳，故乳汁不行，乳房不起焉。生地壮水以滋血室，当归养血以荣经脉，川芎入血海行血气，白芍敛营阴养血脉，花粉清热润燥，木通降热通经，王不留走经隧以周流于身，雄猪蹄滋津液以上奉乎乳，知母清热润燥以资生乳汁也。水、酒煎服，使血脉内充，则瘀热自化，而津液无不上奉，乳房无不起胀，安有乳汁不行之患乎。

74742 通乳四物汤

【方源】《女科证治》

【组成】熟地 12 克 当归 9 克 川芎 木通 王不留行各 3 克 制香附 陈皮各 6 克

【功用】养血调气通乳。

【主治】产后乳汁不行，血虚气滞者。症见乳少难下，面色苍黄，头晕目涩，心悸少寐，胸肋作胀，舌苔薄白，脉细涩。

74743 通乳活血汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】大黄酒一两 当归五钱 川芎三钱 青皮三钱 王不留五钱（炒） 山甲二钱（炙） 二花四钱 寸冬三钱 菊花三钱 通草一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后病目症（继发性点状角膜炎）。症见两眼微红，头晕羞明，风轮之上星翳四起，视物昏蒙，服活血补气汤，病情好转，但乳汁减少者。

74744 通乳消肿汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】泽兰叶五钱 青皮一钱半（炒） 贝母一钱半（去心） 白芷五分 当归一钱

半 甲珠三分 蒲公英三钱 乳香一钱（去油） 没药一钱（去油） 瓜蒌一钱半 生甘草一钱 地肤子一钱半（炒）

【用法】水煎，温服。服之汗出自愈。

【主治】妇人吹乳、乳岩，积滞成块，红肿疼痛，身上发烧发冷，属气血凝滞者。

74745 通乳涌泉散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】王不留行三两 穿山甲五两 天花粉 炙甘草各三两 全当归五两 漏芦二两

【用法】上为细末。每服二钱，猪蹄煎汤送服；或热黄酒冲服。

【功用】通经下乳。

【主治】血气诸虚，经络失营，致乳汁不足，甚或缺乳。

【禁忌】孕妇忌服。

74746 通乳散结汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】全瓜蒌四钱 青皮三钱 丝瓜络五钱 桔络 通草各三钱 桔叶十片 郁金二钱 刺蒺藜三钱 蒲公英五钱

【用法】水煎，温服。

【功用】舒肝解郁，通络散结。

【主治】乳结属肝郁气滞证。乳汁停滞不畅，以致乳房硬满胀痛，甚或肿红，时有恶寒发热，舌淡苔白，脉弦数。

【加减】红肿甚者，加银花三钱，甘草一钱。

74747 通乳瓢畜饮

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】瓢畜一钱 桔梗八分 天花粉七分 紫苏五分 甘草五厘

【用法】上以水一盞半，煮取一盞，温服。

【主治】产后乳汁少。

74748 通变黑锡丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】铅灰二两（用黑铅数斤熔化后，其面上必有浮灰，屡次熔化，屡次取之，研细） 硫化铅一两（用黑铅四两，铁锅内熔

化；再用硫黄细末四两，撒于铅上；硫黄皆着，急用铁铲拌炒，铅经硫黄烧炼，结成砂子，取出晾冷，碾轧成饼者去之，余者，再用乳钵研极细）麦曲一两半（炒熟）

【用法】上用水为丸，如梧桐子大。每服五六丸，多至十丸，用净芒消四五分冲水送服。若服药后，大便不利者（铅灰、硫化铅皆能涩大便），芒消又宜多用。

【主治】痢风。

74749 通府保精丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】粉草薺 荷叶蒂 槐米 黄柏（盐水炒）各三两 海金砂二两五钱 象牙屑（酒炒） 扁蓄各二两 滑石（飞）一两五钱 甘草梢 赤苓各一两

【用法】上为末，用车前子五两煎汤为丸，如梧桐子大。每服三钱，土茯苓汤送下；开水亦可。

【主治】肾家经火，败精阻窍，内热溺艰，结痈淋浊。

74750 通治三消丸

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】黄连不拘多少 冬瓜（切，肉研自然汁）

【用法】上和成饼，阴干，再为末，又用汁浸和，加至七次，仍用汁为丸。大麦煎汤入汁送下。

【主治】消渴。

【方论选录】黄连苦入心，寒泻火；冬瓜甘益脾，寒泄热。

74751 通治还少丹

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】山药（炮） 牛膝（去苗，焙） 山茱萸（水洗，去核） 白茯苓 舶上茴香（炒）各一两半 菟丝子（酒浸，焙，研） 续断（去芦）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤送下。

【主治】心肾俱虚，漏精白浊。

74752 通治实火膏

【方源】《理渝》。

【组成】大黄 当归 生地各二两 黄柏 黄芩 黄连 川芎 柴胡 干葛 薄荷 连翘 赤芍 梔子 知母 黑丑各一两 犀角片 羚羊片各三钱（一方有生甘草）

【用法】麻油熬，黄丹收，加石膏、滑石各四两，搅。

【主治】实火。

74753 通治荆芥散

【方源】《普济方》卷二四七引《经验良方》。

【组成】荆芥穗不拘多少（新瓦上焙）

【用法】上为末。每服二钱，热酒调下。

【主治】风疝，阴肾肿大，或阴囊肿痛。

74754 通治瘰癧方

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮 白术 柴胡 桔梗 川芎 当归 白芍 连翘 茯苓 香附（醋炒） 夏枯草 黄芩各一钱 藿香 半夏 白芷 甘草各五分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎取八分，入酒一小杯，临睡时服。

【主治】瘰癧，不分新久、表里虚实，及诸痰结核。

74755 通治蟾酥丸

《普济方》卷三七九。为《得效》卷十二“蟾酥丸”之异名。见该条。

74756 通经下取方

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【组成】海蛤粉半两 苦葶苈 牙皂各二钱半 巴豆（略去油） 天花粉 苦丁香 红娘子各一钱半 麝香少许

【用法】上为细末，每用一钱，葱涎同捣为丸。薄绵裹，以五寸竹管纳阴户中。候热时先通黄水，次则经行。

【主治】①《医学正传》引《产宝》：月经不通。②《济阴纲目》：痰结经闭。

【备考】方中麝香用量原缺，据《济阴纲目》补。

74757 通经止痛汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】酒丹参 30 克 杭白芍 30 克 醋柴胡 9 克 当归尾 9 克 酒川芎 6 克 鸡血藤 15 克 玄胡 12 克 乌药 9 克 香附 9 克 青皮 陈皮各 9 克 苏梗 桔梗各 6 克 甘草 3 克

【功用】活血理气，调经止痛。

【主治】痛经属气滞血瘀型。经前或经期小腹胀痛，按之痛甚，经行量少不畅，色紫有块，舌质紫暗，脉沉弦或沉涩。

【方论选录】本方以丹参、白芍、柴胡为主药。丹参、当归尾、川芎、鸡血藤、玄胡活血；香附、青皮、陈皮、苏梗、桔梗、乌药理气；白芍酸敛缓急，柴胡辛散解郁，两药相伍为用，调和气血而止痛，甘草调和诸药、缓痉止痛。上药合用，活血理气，调经止痛。

74758 通经六合汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归 白芍 官桂 蓬术 川芎 熟地（一方用生地）

【用法】水煎服。

【功用】逐瘀血，通经络。

【主治】经闭，腹中结块，腰腿重疼属气血凝滞者。

【加减】加延胡索，名延胡索散。

74759 通经六合汤

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】熟地 白芍 当归 川芎 半夏 茯苓 益母草 贝母 白术 知母 橘红

【用法】水煎服。

【主治】妇人气血凝滞，经闭，腹中结块，腰腿重痛者。

74760 通经甘露丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】大黄十六两（四两用头红花四两，入水取汁浸一日，不用红花；四两以童便入盐二钱浸一日，取出晒干，不用童便；四两用好酒浸一日，令软，切片如杏核大，晒干，

入去皮巴豆三十五粒，同炒黄色，去巴豆不用；四两用当归四两入淡醋浸一日，晒干，不用当归。上四份共合一处）南木香二两 百草霜五钱

【用法】上为细末，以当归、醋红花水煮米糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心温酒送下。

【主治】妇人经血不通，崩漏肠风，赤白带下，血气五淋，产后积血，男女五劳七伤及小儿骨蒸劳热，夫妇阴血阳精不交。

74761 通经甘露丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归四两 桃仁（去皮）四两 大黄四两 丹皮四两 干漆（煅）四两 肉桂（去粗皮）四两 牛膝四两 三棱（炒）五钱 莪术（醋炙）一两 红花四两

【用法】将桃仁另研成泥，其余共研为细粉，过罗，与桃仁同串，混合均匀，过罗，细粉兑麝香三分，研细和匀，用冷开水泛为小丸。每服二至三钱，温开水送下，每日二次。

【功用】化瘀通经。

【主治】妇人月经不通，少腹胀痛，午后发热。

【宜忌】孕妇忌服。

74762 通经甘露丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】当归八两 丹皮四两 枳壳二两 陈皮二两 灵脂三两 砂仁二两 熟地四两 生地四两 玄胡四两（炙） 熟军八两 赤芍三两 青皮三两 香附一斤半（炙） 炮姜二两 桂心二两 三棱八两 莪术八两 甘草二两 藏红花二两

【用法】以醋三斤，煮苏木四两取汁，泛为小丸。

【功用】活血理气，逐瘀生新。

【主治】妇人月经不通，或癥瘕痞块，少腹胀痛，骨蒸劳热等。

74763 通经四物汤

【方源】方出《回春》卷六，名见《古今医鉴》

卷十一。

【组成】当归一钱半 川芎五分 白芍(酒炒)一钱 熟地黄一钱 桃仁二十个(去皮尖,研) 红花三分 香附一钱 肉桂五分 蓬术一钱 苏木一钱 木通八分 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎,空心温服。

【功用】①《回春》:温经养血。②《医学正印》:温经养血行气。

【主治】血虚有寒,经水过期不来作痛者。

74764 通经四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗) 川芎 白芍(酒炒) 熟地黄各一钱 人参 黄耆(蜜炒) 肉苁蓉(酒洗)各七分 五味子十个 红花五分 苏木一钱

【用法】上锉。加葱白三茎,酒、水煎,空心服。

【主治】经脉不通。

74765 通经导滞汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】香附 赤芍 川芎 当归 熟地 陈皮 紫苏 牡丹皮 红花 牛膝 枳壳各一钱 甘草节 独活各五分

【用法】水二钟,煎八分,入酒一小杯,食前服。

【主治】妇人产后,败血流注经络,结成肿块疼痛者。

74766 通经利窍汤

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】第一日:大黄 荆芥 桔梗 归尾 黄芩各一钱 羌活 防风 连翘各一钱二分 防己 白芷各八分 牛膝七分 甘草五分

第二日:大黄 羌活 防风 桔梗各一钱 白芷 防己 归尾 独活 荆芥 牛膝各八分 甘草五分

第三四日:羌活 桔梗 防风 黄芩各二钱 白芷 荆芥 防己 独活 牛膝 归尾各八分 甘草五分

第五日至八日:羌活 独活 防风 荆芥

各一钱 归尾 芍药 防己 连翘 黄芩各八分 甘草五分

第九日:大黄 荆芥 羌活 独活 防风 川芎各一钱 当归 牛膝 黄芩 白芷 桔梗各八分 甘草五分

第十日至十八日:同上,惟大黄用二钱

第十九、二十日:大黄 黄柏 连翘 羌活 苦参 荆芥 黄芩各一钱 黄连 防风 防己 甘草 当归各八分

第二十一、二日:黄柏(炒) 大黄(蒸) 苦参 羌活各一钱 连翘 防风 黄芩 牛膝 防己 独活各八分 甘草五分 黄连一钱五分

第二十三、四日:芍药 羌活 黄芩 荆芥 牛膝 白芷 大黄 连翘各一钱 独活 当归 防己 桔梗各八分 甘草五分

第二十五至二十七日:玄参 连翘 独活 当归 防己 桔梗 牛膝 芍药各八分 防风 大黄各一钱 黄连七分 草乌一钱 川芎 甘草各五分

第二十八至三十日:草乌 芍药 羌活 荆芥 防己各一钱 川芎 当归 桔梗 牛膝 白芷 苦参 防风各八分 甘草五分

【用法】上药三十帖,俱水煎,按日早、晚服之,温酒同下。

【功用】开经络。

【主治】风痹初起。

【加减】如肠涩,加大黄一钱。第三四日如腹中有积作痛,加制大黄一钱;心痛,大肠不利,则加生大黄一钱。第五至八日如腹痛大便不利,加大黄一钱。

74767 通经妙灵丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】黄连(酒炒)一两 苍术(米泔浸炒)二两 黄柏(盐酒炒)二两 肉桂(去皮)四两 南芎五分 当归(酒洗)一两 白芍(盐酒炒)一两三钱 汉防己(酒洗)三钱 白芷二钱半 桃仁(去皮尖)三钱 威灵仙一两(酒浸,蒸晒九次) 羌活(酒

洗)三钱 龙胆草(酒洗)一钱 红花(酒洗)五钱 防风(酒洗)五钱 龟版(酥炙)五钱 杜仲(姜汁炒)八钱

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服百丸,空心陈酒送下,盐汤亦可。

【功用】疏筋活血行湿。

【主治】因酒色所伤,筋脉空虚,感受风寒湿热,损伤经络,致遍身走痛如刺,日轻夜重,左足痛尤甚。

74768 通经活络丹

《普济方》卷一一五。为《局方》卷一(绍兴续添方)“乳香没药丸”之异名。见该条。

74769 通经活络汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】瓜蒌四钱 橘络 青皮各二钱 丝瓜络四钱 生香附二钱 通草三钱 扁豆五钱 当归身一钱半

【功用】舒肝活络。

【主治】乳汁不行属气郁者。产后乳汁不行,乳房胀痛,胸胁饱满,面色青黯,精神抑郁,食量减少,有时两肋作痛,腹部胀痛,大便不畅,舌淡苔白腻,脉沉迟而涩。

【加减】恶露已净,少腹微胀者,加王不留行、漏芦各三钱;如因暴急暴怒之后,饮食减少,胸胁胀甚者,加柴胡、厚朴花各二钱。

74770 通经逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】桃仁八钱(研) 红花四钱 赤芍三钱 山甲四钱(炒) 皂刺六钱 连翘三钱(去心) 地龙三钱(去心) 柴胡一钱 麝香三厘(绢包)

【用法】水煎服。

【功用】《医林改错评注》:活血化瘀,解毒。

【主治】痘形攒簇,蒙头覆釜,周身细碎成片,或夹疹夹斑,浮衣水泡,其色或紫、或暗、或黑,其症或干呕、烦躁,昼夜不眠,逆形逆症,皆是瘀血凝滞于血管。

【加减】大便干燥,加大黄二钱,便利去之;五、六日后,见清浆、白浆,将麝香去之,加

黄耆五钱,将山甲、皂刺减半;至七、八日后,桃仁、红花亦减半,黄耆可用八钱。此方指四五岁而言,若一二岁,分两可减半;若七、八岁,分两可加一半。

【方论选录】《医林改错评注》:方中用连翘、柴胡解毒,麝香、山甲、地龙、皂刺通络,赤芍、桃仁、红花逐瘀。

74771 通经逐瘀汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】刺猬皮9克 薄荷9克 地龙9克 皂刺6克 赤芍6克 桃仁6克 连翘9克 银花9克

【用法】水煎服。

【功用】《朱仁康临床经验集》:通经化瘀,活血消风。

【主治】①《中医皮肤病学简编》:慢性顽固性荨麻疹。②《朱仁康临床经验集》:瘀血阻于经隧,营卫之气不得宣通,风邪久郁而致风痞瘤日久发作之证。

【加减】血热,加山梔、生地;风冷,加麻黄、桂枝;虚热,加银柴胡、地骨皮;喘咳,加杏仁、苏梗。

【方论选录】《朱仁康临床经验集》:地龙、角刺、刺猬皮通行经络,搜风止痒;桃仁、赤芍活血化瘀;银花、连翘清热解毒。

74772 通经透关散

【方源】《幼幼新书》(古籍本)卷十五引《家宝》。

【异名】通关散(《卫生总微》卷八)。

【组成】地扁竹半两(嫩,焙) 山梔仁(炒)一分半 大黄 木通 车前子(并炒)滑石 瞿麦(去粗梗) 甘草(炙)各一分

【用法】上为末。婴孩每服一字,二三岁每服半钱,四五岁每服一钱,水半盏,加紫草三寸,煎数沸,温服。

【主治】斑疮水痘,心躁发渴,大小便不通,口舌生疮。

【备考】本方方名,原书(人卫本)作“透关散”。

74773 通经益母丸

【方源】《履霜集》卷二。

【组成】益母草八两(用上截) 香附米三两(七制) 桃仁三两(去皮尖双仁,晒干,麸炒) 红花三两(酒炒) 当归四两(酒洗) 白芍四两(酒炒) 白术四两(土炒) 白茯苓四两(乳拌,蒸透) 粉甘草三两(蜜水拌炒) 陈皮三两 丹皮三两(去骨) 丹参三两(酒洗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,每丸重三钱,晒干收用。病轻者,日用一丸,研末热黄酒送下,或蜜汤送下;有痰者,姜汤送下;病甚者,朝、夕各一丸,以愈为度。或丸如绿豆大,每服三钱。

【功用】养血破积。

【主治】积块经闭者。

74774 通经调气汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归(酒洗) 川芎 白芍(酒炒) 生地黄(酒浸) 香附(童便炒) 各一两 牡丹皮八钱 柴胡六钱 黄柏(酒炒) 知母(酒、童便炒) 八钱 黄芩(酒炒) 六钱 牛膝(去芦,酒洗) 八钱 桃仁 红花 各酌量

【用法】上锉作十剂。水煎,空心、临卧各一服。

【主治】妇入经闭虚弱者。

74775 通草猪蹄羹

《胎产心法》卷下。为方出《妇人良方》卷二十三引《灵苑方》,名见《局方》卷九(续添诸局经验秘方)“猪蹄汤”之异名。见该条。

74776 通草橘皮汤

《张氏医通》卷十四。为《外台》卷二(注文)引《古今录验》“通草汤”之异名。见该条。

74777 通幽化浊汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】枳壳一钱五分 青皮一钱五分 木通一钱五分(酒炒) 车前二钱 赤苓二钱 薏仁三钱 厚朴一钱 木香五分 乌药

一钱 谷芽三钱(炒) 姜三大片

【功用】分理水道,通行二便。

【主治】小肠胀。小腹腹胀,引腰而痛。

74778 通幽润燥丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归二十两 枳壳(炒) 八十两 红花二十两 厚朴(炙) 八十两 郁李仁二十两 黄芩八十两 火麻仁二十两 熟军八十两 生地二十两 槟榔二十两 熟地二十两 木香十两 桃仁(去皮) 二十两 杏仁(去皮,炒) 二十两 甘草十两

【用法】上药将当归等十一味,共研为细粉,过罗;另将郁李仁、火麻仁、杏仁、桃仁研成细泥,串入上列细粉内,过罗,混合均匀,炼蜜为丸,重三钱。每服一丸,温开水送下,日服二次。

【功用】清热润肠通便。

【主治】大肠热盛,风热秘结,幽门干燥,大便不通。

【宜忌】孕妇忌服。

74779 通幽润燥汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】大黄 当归 火麻仁 生地 桃仁 红花 枳壳 升麻

【主治】大便秘结。

74780 通脉化痰饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】童便一小盏 姜汁一匙

【用法】二味和匀,温服。

【主治】中风暑毒,一切恶毒,干霍乱卒暴之症。

【方论选录】童便降火为君,姜汁开痰下气为佐。

74781 通脉四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】通脉加减四逆汤(《圣济总录》卷二十一)、姜附汤(《普济方》卷二〇一引(十便良方))、通脉四逆加减汤(《法律》卷二)。

【组成】甘草二两(炙) 附子(大者)一

枚(生,去皮,破八片) 干姜三两(强人可四两)

【用法】上以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服。其脉即出者愈。

【功用】回阳通脉。

①《注解伤寒论》:散阴通阳。②《重订通俗伤寒论》:回阳通脉。③《金鉴》:回阳胜寒。

【主治】少阴病,阴盛隔阳。下利清谷,里寒外热,反不恶寒,手足厥逆,脉微欲绝。

①《伤寒论》:少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者。下利清谷,里寒外热,汗出而厥者。②《千金》:霍乱,吐利已断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝。③《永类铃方》:霍乱,腹痛,呕吐泄泻,发热恶寒,小便自利属少阴者。④《卫生宝鉴·补遗》:四肢冷,身不热,恶心,踡足卧,或引衣被自覆,不渴,或下利,或大便如常,脉沉微不数,或虽沉实按之则迟弱,此名冷厥。男子阳易,头重不欲举,眼中生花,腰膝内连腹痛,身重少气,阴肿入里,腹内绞痛。

【宜忌】《普济方》引《十便良方》:忌海藻、菰菜、猪肉。

【加减】面色赤者,加葱九茎;腹中痛者,去葱,加芍药二两;呕者,加生姜二两;咽痛者,去芍药,加桔梗一两;利止脉不出者,去桔梗,加入参二两。

【方论选录】①《古今名医方论》:通脉四逆是于水中温土。里寒外热,浑是肾中阴寒逼阳于外,故君以干姜,树帜中宫;臣以国老,主持中外;更以附子,大壮元阳,共招外热返之于内。盖此时生气已离,存亡俄顷,若以柔缓之甘草为君,何能疾呼外阳?故易以干姜,然必加甘草与干姜等分者,恐丧亡之余,姜、附之猛,不能安养夫元气,所谓有制之师也。其加减法内,面色赤者加葱,后人遂以葱白为通脉四逆,不知阳亡于外,更用葱以助其散,则气从汗出,而阳无由内返也,岂不误耶?盖白通立名,因下利脉微,用葱白以通上下之阳;此

里寒外热,用通脉以通内外之阳,故主方不用葱也。宜详辨之。②《古方选注》:通脉四逆,少阴格阳,面赤阳越欲亡,急用干姜、生附夺门而入,驱散阴霾,甘草监制姜附烈性,留顿中宫,扶持太和元气,藉葱白入营通脉,庶可迎阳内返。推仲景之心,只取其脉通阳返,了无余义矣。③《历代名医良方注释》:此方与四逆汤三药同,但加重干姜,方名通脉四逆汤,是其所以通,端在干姜,原无疑义。窃干姜守而不走,其何能通,而此能通者,盖谷入于胃,脉道乃行,中气鼓荡,是为行脉之本。若下焦脉绝,本为不治,但仅寒邪凝阻,而脉不通,则加干姜温暖中气,以鼓舞之,兴奋体工,由中以达四末,脉即可复,不通之通,乃妙于通,仲景用干姜之神化如此。脉资生于中焦谷气,此方已求到资生源头,是此方通脉,较强心以复脉,尤深一层。

【临证举例】霍乱 《冉雪峰医案》:田某儿媳患霍乱寒多,渴不欲饮,饮亦喜热,舌苔白,吐泻多清水,不太臭,惟耽搁时间过久,救治较迟,肢厥筋挛,皮瘪目陷,六脉全无,病已造极,拟大剂温肾以启下焦生气、温脾以扶中宫颓阳,作最后挽救,拟通脉四逆汤加重其剂,方用:甘草二钱,干姜六钱,乌附八钱。隔三时复诊,吐泻未止,厥逆未回,嘱照原方再进一剂;隔二时又再复诊,吐泻虽缓,厥逆仍未回,俨似正气与邪气同归于尽状,细审细察,探其手心,微有温意。曰:生机在此。盖正气过伤,迟迟其复,兆端已见,稍候即当厥回向愈,嘱其续将三煎药服完,另用前方,姜、附各减为三钱,并加党参四钱,夜间作二次缓服。翌晨复诊,厥回脉出,已能起坐,特精力匮乏,为拟理中加知母、栝楼根善后。

74782 通脉四逆汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】吴茱萸(炒)二两 附子(炮,去皮脐)一两 桂心(去皮,不见火) 细辛(洗,去叶土) 白芍药 甘草(炙)各半两 当归(去芦)三钱

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，酒半盞，加生姜七片，大枣一个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：霍乱多寒，肉冷脉绝。②《校注妇人良方》：霍乱恶寒，腹痛身冷，自汗，脉沉微如欲绝。

【备考】《普济方》引《医方集成》有通草（一作木通）半两。

74783 通脉四逆汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】干姜 附子 人参 炙甘草

【用法】加生姜，水煎，入童便、猪胆汁；如烦躁，冷服。

【主治】阴证发斑，身冷无脉，斑黑昏沉者。

74784 通脉四逆汤

【方源】《医统》卷十四。

【组成】四逆汤加甘草一倍

【主治】厥逆，下利，脉不至。

74785 通脉四逆汤

【方源】《痄症论疏》。

【组成】甘草（去头尾，酒润，炙黄色）七钱 干姜（取如法修事白干姜，切）一两 葱白五茎 细辛（真北地者，瓜水浸一宿，晒干，锉碎）七钱

【用法】上以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【主治】肝症。

【加减】其状若死，兼下利，脉绝者，加附子五钱（生用）。

74786 通脉四逆汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】附子 干姜 广皮 甘草 葱白头

【主治】真阳欲脱，腹痛，下利厥冷，脉伏。

74787 通脉回厥煎

【方源】《寒温条辨·坏证》。

【组成】熟地一两 当归一两 洋参五钱 大黄（酒浸，蒸）三钱 芒消三钱 僵蚕三

钱（酒炒） 蝉蜕十二个 火麻仁三钱（炒） 滑石三钱 肉苁蓉（米泔洗净，盐）三钱 姜黄一钱 寸冬三钱（去心） 白蜜一杯 饴糖一钟

【用法】用水五升，先煎当归、熟地、洋参极浓，后入诸药煎三四沸，倾调蜜糖匀，冷服。

【主治】温病体厥、脉厥，数下之而厥不回、脉不出者。

【加减】小便赤，加茯苓、泽泻以利之；痰甚，加枳实以祛之。

【方论】方中熟地、当归滋真阴以润燥，洋参固天清以下降，大黄、芒硝扫热毒以下出，僵蚕、蝉蜕解温气以潜消，火麻仁、滑石、肉苁蓉润肠胃以散结，姜黄、寸冬开胸结以润燥。

74788 通宣理肺丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】紫苏叶一百四十四两 黄芩九十六两 枳壳（炒）九十六两 甘草七十二两 橘皮九十六两 桔梗九十六两 茯苓九十六两 杏仁（去皮，炒）七十二两 前胡九十六两 麻黄九十六两 法半夏（炙）七十二两

【用法】上将杏仁另研成泥，余药为细末，再和匀，共为极细末，过罗，炼蜜为丸，每重二钱。每服一至二丸，温开水送下，日服二次。

【功用】解热止咳。

【主治】外感咳嗽，发热恶寒，头痛无汗，四肢痠懒，鼻流清涕。

74789 通宣理肺丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津、兰州方）。

【组成】苏叶一斤 麻黄六两 生石膏二两 甘草二斤 枳壳（麸炒）八两 杏仁（去皮，炒） 桔梗 制半夏各六两 冬花三两 葛根四两 前胡十二两 生桑皮八两 广皮四两 浙贝母三两 百合四两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡衣筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】发汗解表，清肺化痰。

【主治】感冒风寒引起的咳嗽气喘，发烧头疼，鼻塞不通，周身作疼。

【宜忌】肺虚者忌服。

【备考】本方改为膏剂，名“通宣理肺膏”（见原书）。

74790 通宣理肺丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参五钱 苏叶一两 葛根六钱二分五厘 半夏五钱（炙） 陈皮七钱五分 前胡七钱五分 茯苓五钱 枳壳七钱五分（炒） 桔梗一两 甘草二钱五分 木香一钱八分七厘五毫 麻黄六钱二分五厘

【用法】上为细面，炼蜜为丸。每丸重三钱。

【功用】解热止嗽。

【主治】感冒风寒所致之发热恶寒，鼻塞不通，头痛无汗，四肢痠懒作疼。

74791 通宣理肺膏

《全国中药成药处方集》（天津、兰州方）。即原书（天津、兰州方）“通宣理肺丸”改为膏剂。见该条。

74792 通神三灵丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】柏叶四斤（米泔浸七日，每日换泔洗净，次一日取出，近日阴处阴干，杵为末）甘菊花一斤（蒸一日，晒干，为末） 松脂四两（用滴乳者，以桑柴灰内煮半日以上候化，取出，绞取净汁，入新水内候凝，研如粉）

【用法】上拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、临卧茶、酒或温水送下。

【功用】延年益寿，祛风气，通荣卫，活血脉，壮腰脚。

【主治】本脏诸虚。

74793 通神补血丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】生地三两 茯神三两五钱 紫石英（煅，飞） 远志 枣仁（炒）各二两 当

归一两五钱 人参 麦冬 丹参 制半夏各一两 石菖蒲八钱 胆星四钱 琥珀三钱 川连二钱

【用法】上为细末。用连血猪心一个，入辰砂三钱，煮烂打丸，如干加炼蜜，或独用炼蜜亦可，每丸重一钱五分，辰砂为衣。每服一丸，空心枣汤或盐汤化服。

【主治】神虚血少，惊悸健忘，不寐怔忡，易恐易汗。

74794 通神乳香膏

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】乳香 没药 血竭 蜡 黄丹 木鳖子二两 膩粉三分 乌鱼骨二两 不灰木四两 五灵脂二两 海桐皮二两 沥青四两 麝香二钱 油八两（熬用）

【用法】如法熬膏。

【主治】疮肿。

【备考】方中乳香、没药、血竭、蜡、黄丹用量原缺。

74795 通神保明丹

《圣济总录》卷二〇〇。为原书同卷“太清四扇丹”之异名。见该条。

74796 通络利湿汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】大豆卷 防己 赤芍 秦艽 川牛膝 川革薢 干地龙 归须 黄柏 白茄根 桑枝

【功用】通络利湿。

【主治】肝肾阴亏，阳明湿热下注，鹤膝肿大热作痛。

74797 通络活血方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】归尾9克 赤芍9克 桃仁9克 红花9克 香附9克 青皮9克 王不留行9克 茜草9克 泽兰9克 牛膝9克

【用法】水煎服。

【功用】活血祛瘀，通经活络。

【主治】结节性红斑，硬结性红斑、下肢结节病属风湿阻于经络，气滞血瘀，结聚成核，

红肿疼痛。

【方论选录】归尾、赤芍、桃仁、红花活血化瘀；王不留行通经活血；青皮、香附理气，气行血亦行；茜草凉血清热；泽兰活血破瘀；牛膝引药下行。

74798 通络益气丹

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】生山甲六两 稀莪草一斤八两 木瓜一斤十二两 苏地龙一斤二两 灵仙一斤八两 海风藤一斤十二两 麻黄三两 橘红一斤二两 僵蚕一斤八两 薄荷一斤八两 生牡蛎三斤 生龙骨一斤八两 玄明粉一斤八两 黄柏十二斤 川牛膝一斤二两 黑郁金十二两 蒺藜一斤八两 生磁石一斤二两 生鳖甲四斤 夜交藤三斤 龙胆草一斤八两 生梔子一斤八两 车前子一斤一两 菟丝子四斤 蕲蛇肉四两五钱 紫贝齿一斤三两 乌药一斤三两 莲子心一斤一两 法半夏一斤八两 藿香一斤八两 砂仁一斤三两 生白芍一斤八两 黄豆卷十二两 生赭石一斤三两 广寄生六斤 旋复花十二两 全蝎十二两 鸡血藤二斤四两 生石决明二斤 茯苓(去皮)二斤四两 青皮(醋炒)一斤二两(共为细粉，每细粉七十六斤五两五钱兑以下药物) 琥珀面四两 朱砂面九两 瓜蒌三斤 胆星三斤 竹沥水一两五钱 生石决明六斤

【用法】将以上熬清膏和水打小丸。再用滑石四斤、生石膏八斤、知母四斤、花粉四斤、竺黄一斤八两、竹茹粉四斤研细为衣，装盒，每盒二两重。每服四钱，白开水送下，一日二次。

【功用】除湿祛风，活络豁痰，镇静安神。

【主治】风湿内闭，痰涎壅盛，周身麻木，神志昏乱，肝热上冲，头晕头眩，身重脚轻。常服预防血压高。

【宜忌】孕妇忌服。

74799 通络排石汤

【方源】《古今名方》引刘炳凡经验方。

【组成】金钱草 30 克 六一散 15 克(包) 火消 4.5 克(分兑) 桃胶 30 克 白芍 腊瓜(八月札)各 12 克 当归 9 克 郁金 5 克 鸡内金 3 克

【功用】益气活血，通络排石。

【主治】尿路结石。

74800 通真延龄丹

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】通真延龄种子丹、膈脐脐丸(《医学正印》卷上)。

【组成】五味子三斤 山茱萸二斤 菟丝子二斤 砂仁一斤 车前子一斤 巴戟天一斤 甘菊花二斤 枸杞子三斤 生地黄三斤 熟地黄三斤 狗肾四斤 怀山药二斤 天门冬一斤 麦门冬三斤 柏子仁二斤 鹿角霜二斤 鹿角胶四斤 人参二斤 黄柏一斤半 杜仲一斤半 肉苁蓉三斤 覆盆子一斤 没食子一斤 紫河车十具 何首乌四斤 牛膝三斤 补骨脂一斤 胡桃肉二斤 鹿茸一斤 沙苑蒺藜四斤(二斤炒磨，二斤磨粉打糊)

【用法】上为末，同柏子仁、胡桃肉泥、蒺藜糊、酒化鹿角胶炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，空心、饥时各一眼，龙眼汤吞下。

【主治】《医学正印》：阳痿无火。

【宜忌】有火者不可服。

【备考】方中狗肾，《医学正印》用海狗内、外肾各一副。如无即本地黑狗或黄狗内、外肾各一副酥制。其服法用龙眼汤、淡盐汤、寒天好酒任下。

74801 通真煨姜丸

【方源】《急救仙方》卷四。

【异名】通真丸。

【组成】良姜(炮) 诃子(炮) 肉桂(去皮) 木香 肉豆蔻 破故纸 茴香 葫芦巴 末硝各一钱

【用法】上为末，醋为丸，如梧桐子大。每用一钱，再用生姜、木瓜同药一处以湿纸裹煨令香，热酒送下。

【主治】痔疮。

74802 通脑丁香散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】丁香一分 蜗牛壳一分(炒令黄)
赤小豆一分 不蛀皂荚一分(并子)

【用法】上为细散。每取少许,以竹管子吹入鼻中,每日二次。若病重者,鼻内出虫子。

【主治】小儿脑疳,头发干竖作穗,眼有白膜,鼻头有疮。

【备考】本方方名,《普济方》引作“丁香散”,方中有辛夷,无皂荚。

74803 通润四物汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】四物汤加火麻仁

【主治】产后液枯,大便秘结。

74804 通窍明目汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】当归四钱 桃仁三钱(炒) 红花二钱 丽参三钱 黄耆五钱 白术二钱(炒) 菖蒲三钱 茯神三钱 川芎三钱 细辛二钱 甘草一钱

【用法】水煎,并用牙皂五分,镜砂二分,赤金三张,共为细末,随药水冲服。

【主治】暴盲症(视网膜中央静脉血栓)初期属虚脱证者。

【加减】愈后头疼目胀,不时昏乱者,去细辛、牙皂,加楮实子五钱、茺蔚子四钱、川羌三钱、白芍四钱、生地八钱,以上加倍,共为丸,镜砂为衣。每服三钱,一日二次,白水送下。虽不能光明如初,亦可保守睛光不失。

74805 通窍活血汤

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】赤芍一钱 川芎一钱 桃仁三钱(研泥) 红花三钱 老葱三根(切碎) 鲜姜三钱(切碎) 红枣七个(去核) 麝香五厘(绢包)

【用法】用黄酒半斤(各处分两不同,宁可多二两,不可少),煎前七味至一钟,去滓,入麝香再煎二沸,临卧服。大人每日一付,连

吃三付,隔一日再吃三付;若七、八岁小儿,两晚吃一付;三、四岁小儿,三晚吃一付。麝香可煎三次,再换新的。头发脱落,用药三付发不脱,十付必长新发;眼疼白珠红,无论有无云翳,先将此药吃一付,后吃加味止痛没药散,一日二付,三二日必全愈;糟鼻子,无论三、二十年,此方服三付可见效,二三十付可全愈;耳聋年久,晚服此方,早服通气散,一日两付,三、二十年耳聋可愈;白癩风、紫癩风,服三、五付可不散漫,再服三十付可痊;紫印脸,如三、五年,十付可愈,若十余年,三、二十付必愈;青记脸如墨,三十付可愈;牙疳,晚服此药一付,早服血府逐瘀汤一付,白日煎黄耆八钱,徐徐服之,一日服完,一日三付,三日可见效,十日大见效,一月可全愈;出气臭,晚服此方,早服血府逐瘀汤,三、五日必效;妇女干劳,服此方三付或六付,至重者九付,未有不全愈者;男子劳病,轻者九付可愈,重者十八付可愈,吃三付后,如果气弱,每日煎黄耆八钱,徐徐服之,一日服完,此攻补兼施之法;若气不甚弱,黄耆不必用,以待病去,元气自复;交节病作,服三付不发;小儿疳证,用此方与血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤三方轮服,未有不愈者。

【功用】活血祛瘀,通络开窍。

①《医林改错》:通血管。②《医林改错评注》:通络开窍,行血活血。③《江苏中医杂志》:活血祛瘀,通络止痛,芳香开窍。

【主治】血瘀所致的脱发,暴发火眼,酒糟鼻,耳聋,白癩风,紫癩风,牙疳,男女劳病,小儿疳证,头痛,骨膊胸膈顽硬刺痛,中风。

①《医林改错》:头面、四肢、周身血管血瘀所致的头发脱落;眼疼白珠红;糟鼻子;耳聋年久;白癩风,紫癩风;紫印脸,脸如打伤血印,色紫成片,或满脸皆紫;青记脸如墨,长于天庭者多;牙疳;闻出臭气;妇女干劳,经血三、四月不见,或五、六月不见,咳嗽急喘,饮

食减少,四肢无力,午后发烧,至晚尤甚;男子劳病,初病四肢酸软无力,渐渐肌肉消瘦,饮食减少,面色黄白,咳嗽吐沫,心烦急躁,午后潮热,天亮汗多;交节病作;小儿疳证,初起尿如米泔,午后潮热,日久青筋暴露,肚大坚硬,面色青黄,肌肉消瘦,皮毛憔悴,眼睛发眵。②《血证论》:瘀血在上焦,或发脱不生,或骨膊胸膈顽硬刺痛,目不了了。《吉林中医药》:中风。

【方论选录】①《医林改错评注》:方中赤芍、川芎行血活血,桃仁、红花活血通络,葱、姜通阳,麝香开窍,黄酒通络,佐以大枣缓和芳香辛窜药物之性。其中麝香味辛性温,功专开窍通闭,解毒活血(现代医学认为其中含麝香酮等成分,能兴奋中枢神经系统、呼吸中枢及心血管系统,具有一定抗菌和促进腺体分泌及兴奋子宫等作用),因而用为主要药;与姜、葱、黄酒配伍更能通络开窍,通利气血运行的道路,从而使赤芍、川芎、桃仁、红花更能发挥其活血通络的作用。②《历代名医良方注释》:妇女干血劳或小儿疳证,都因瘀血内停,新血不生所致,必须活血化瘀,推陈致新。本方用活血通窍之品治疗劳症,深得此法。方中麝香为君,芳香走窜,通行十二经,开通诸窍,和血通络;桃仁、红花、赤芍、川芎为臣,活血消瘀,推陈致新;姜、枣为佐,调和营卫,通利血脉;老葱为使,通阳入络。诸药合用,共奏活血通窍之功。

【临证举例】①中风 《吉林中医药》:作者应用通窍活血汤治疗中风 34 例。其中脑溢血 14 例(均经西医抢救和治疗 3~7 天,病情已相对稳定,没有继续恶化)、脑血栓形成 20 例。其临床表现:浅昏迷 9 例,失语 14 例,语言障碍 14 例,二便失禁 17 例,半身不遂 34 例。均予赤芍 9 克,川芎 9 克,红花 9 克,红枣 10 枚,鲜生姜 3 片,老葱 3 根,冰片 0.1 克,黄酒一钟。加减法:若见气虚者,加黄耆 60 克;阴虚者,加玄参 20 克,生地 30 克;肝阳上亢者,加羚羊角粉 0.3 克,石决明 30 克;风盛

者,加僵蚕 9 克,天南星 9 克;兼腑实者,加小承气汤。本组 14 例出血性中风从发病 3~7 天开始服中药治疗,基本恢复率为 78.5%;而 20 例缺血性中风病例病程较长,基本恢复率为 65%。②白癫风 《陕西中医学院学报》:作者应用通窍活血汤治疗白癫风 128 例,其中 110 例治愈(病变部位颜色恢复正常),18 例也有不同程度好转,疗效满意。

74806 通窍排脓汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】细辛 1.5 克 薏苡仁 9 克 白芷 3 克 天花粉 6 克 黄耆 茯苓各 9 克 甘草 3 克

【功用】扶正祛邪,通窍排脓。

【主治】大眦漏症溃后,肿核已消,肤色如常,按压眦部,或流脓液,或浊水外溢者。

【加减】若脓水清稀,或浊泪外溢者,是气血两伤之候,应加当归 12 克以养血、加党参 9 克以补气。

【方论选录】本方是清心排脓汤去生地、木通,加细辛、黄耆而成。因患眦漏已久,眦部已不肿不红,证情转虚,故去生地、木通清热之品。加黄耆补气健中,且助薏苡仁、白芷、天花粉托里排脓。加细辛者,是借其开散走窜之力,使泪窍畅通、排尽里蓄之脓。

74807 通淋琥珀丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】琥珀三钱 鳖甲五钱 滑石 黄连各八钱 石首鱼脑骨三对(煨) 牛膝八两(熬膏)

【用法】上为细末,以牛膝膏为丸。每服二钱,空心清茶送下。

【主治】砂石淋,茎中涩痛不可忍。

74808 通脾泻胃汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】麦门冬 羌蔚子各一两 防风 大黄 黑参 知母各一两 天门冬 黄芩各一两五钱

【用法】上为细末。每服一钱,以水一盞,

煎至五分,去滓,食后温服。并宜镰钩熨烙,然后点曾青膏。

【主治】①《秘传眼科龙木论》:眼黄膜上冲外障。此因肾脏风冷,胃家极热,初患之时,疼痛发歇,作时赤涩泪出,渐生黄膜,直覆黑睛,难辨人物。②《银海精微》:胃中伏热郁于内,眼久注不开,内生虚肉,眵泪胶凝者。

【备考】《审视瑶函》有石膏、车前子。

74809 通脾泻胃汤

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】知母一钱 大黄一钱 黄芩一钱五分 茺蔚子一钱 石膏二钱 梔子一钱 黑参一钱 防风一钱

【用法】上为粗末,以水二盏,煎至一盏,去滓,食后温服。

【主治】①《金鉴》:黄风者,发于脾经,初病雀目,日久瞳变黄色,甚而如金。乃脾胃风热,上冲于眼,致生黄膜,泪流赤涩,疼痛极甚。②《血证论》:眼目外障,目翳。

【方论选录】《血证论》:方取诸品清热泻火,使不上熏,则目疾自除;而防风一味,独以祛风者治火,火动风生,祛风则火势自熄;茺蔚一味,又以利湿者清热,湿蒸热遏,利湿则热气自消。

【备考】《血证论》有黄柏,无黄芩。

74810 通脾泻胃汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】生石膏一两 知母四钱 黄芩三钱 玄参四钱 梔子三钱 大黄四钱 茺蔚子三钱 连翘三钱 防风三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】黄膜上冲症(前房积脓)初起未甚。

74811 通隔芥苳汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】芥苳四两 石膏 地骨皮 甘草(微炙)各二两 葛根(锉)三两 黄芩(去黑心)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,入竹叶七片,煎至六分,去滓,食后温服,临

卧再服。

【主治】目赤痛及涩肿。

74812 通隔芥苳散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】芥苳一两 石膏二两 地骨皮 葛根(锉) 柴胡(去苗) 黄芩各一两 甘草半两(炙微赤,锉) 蕤仁半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盞,入竹叶七片,煎至六分,去滓,食后温服,夜临卧再服。

【主治】①《圣惠》:眼碇涩,心胸烦闷。②《圣济总录》:风毒冲目。

74813 通隘不二散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】硫黄一钱 靛花一分

【用法】上为细末。用凉水一酒钟调服。外吹紫粉人中白散,或用红粉涂之。

【主治】杨梅结毒发于咽,腐烂疼痛,汤水难入者。

74814 通用青金锭子

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】铜绿三钱 青矾 胆矾 轻粉 砒霜(开疮口用生砒,去死肉用煨砒) 白丁香 苦葶苈各一钱 片脑 麝香各少许

【用法】上为末,面糊或炼蜜加白及末为锭子,如麻黄大,二三寸长。看疮口深浅插入。疼者可治,不痛者不治。

【主治】发背疮疮。

【加减】如用本方生好肉,去砒,加枯矾。

74815 通变大柴胡汤

【方源】《衷中参西》卷五。

【组成】柴胡三钱 薄荷三钱 知母四钱 大黄四钱

【主治】伤寒温病,表证未罢,大便已实者。

【加减】若治伤寒,以防风易薄荷。

【方论选录】方中用防风、薄荷以散表邪,所以防邪之内陷;用柴胡以升之,所以防邪之下陷也。

【临证举例】伤寒 一人,年二十余,伤寒

六七日，头疼恶寒，心中发热，咳吐粘涎，至暮尤寒热交作，兼眩晕，心中之热亦甚，其脉浮弦，重按有力，大便五日未行。投以此汤，加生石膏六钱、芒硝四钱，下大便二次，上半身微见汗，诸病皆见轻，惟心中犹觉发热，脉象不若从前之浮弦，而重按仍有力，拟投以白虎加人参汤，恐当下后，易作滑泻，遂以生山药代粳米，连服两剂而愈。

74816 通变白头翁汤

【方源】《衷中参西》卷三。

【组成】生山药一两 白头翁四钱 秦皮三钱 生地榆三钱 生杭芍四钱 甘草二钱 旱三七三钱（轧细） 鸭蛋子六十粒（去皮，拣成实者）

【用法】上药先将三七、鸭蛋子用白蔗糖水送服一半，隔点半钟，再将余药煎汤服。所余一半，至二煎时如前法服。

【主治】热痢下重腹痛，及曾有鸦片嗜好而患痢之人。痢久而肠中腐烂者。

【临证举例】痢疾 王剑秋，年四十许。己未孟秋，自郑州病归，先泻后痢，腹痛重坠，赤白稠粘，一日夜十余次，其脉弦而有力，知其下久阴虚，肝胆又蕴有实热也。投以此汤，一剂痢愈，仍变为泻，日四五次，自言腹中凉甚，愚因其疾原先泻，此时痢愈又泻，且恒以温水袋自熨其腹，疑其下焦或有伏寒，遂少投以温补之药。才服一剂，又变为痢，下坠腹痛如故，惟次数少减。知其病原无寒，不受温补，仍改用通变白头翁汤。一剂痢又愈，一日犹泻数次，继用生山药一两，龙眼、莲子各六钱，生杭芍三钱，甘草、茯苓各二钱，又少加酒曲、麦芽、白蔻消食之品，调补旬日全愈。

74817 通噎消食膏酒

【方源】《千金》卷十五。

【组成】猪膏三升 宿姜（汁）五升 吴茱萸一升 白术一斤

【用法】上将茱萸、术二药为细散，内姜汁膏中，煎取六升，加温清酒一升。每服方寸

匕，一日二次。

【主治】脾虚寒，劳损，气胀噎满，食不下。

74818 通关匀气托里散

【方源】《幼幼新书》卷十五引《四十八候》。

【组成】人参 麻黄（去节） 甘草节各一分 白术 蔓荆子 紫草各一钱 白茯苓半两 升麻半分

【用法】上为末。疮未出，用好酒调下；疮已出，香熟水调下。

【主治】伤寒变疮疹。

74819 通经活血止痛散

【方源】《外科百效全书》卷五。

【组成】三棱 莪术 赤芍 黄柏 黄连 青皮 紫苏 野马 香附 北柴胡 乳香

【主治】跌扑打伤，败血冲心，胸紧痛者。

【加减】症重者，加红花、苏木、石菖蒲。

74820 通脉四逆加减汤

《法律》卷二。为《伤寒论》“通脉四逆汤”之异名。见该条。

74821 通脉加减四逆汤

《圣济总录》卷二十一。为《伤寒论》“通脉四逆汤”之异名。见该条。

74822 通脉泻热泽泻汤

【方源】《千金》卷二十。

【异名】通脉泻热泽泻散（《圣惠》卷四十七）。

【组成】泽泻 半夏 柴胡 生姜各三两 地骨皮五两 石膏八两 竹叶五合 菡心一升 茯苓 人参各二两 甘草 桂心各一两

【用法】上咬咀。以水二斗，煮取六升，分五服。

【主治】上焦饮食下胃，胃气未定，汗出，面背身中皆热，名曰漏气。

74823 通脉泻热泽泻散

《圣惠》卷四十七。为《千金》卷二十“通脉泻热泽泻汤”之异名。见该条。

74824 通津救命至灵丹

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】桂元肉(去核)六两 生牛膝梢一两(黄酒一杯浸,捣烂)

【用法】将桂元煎浓汁冲入牛膝酒内。半日即产。

【主治】难产,浆干数日不下。

74825 通真延龄种子丹

《医学正印》卷上。为《广笔记》卷二“通真延龄丹”之异名。见该条。

74826 通变白虎加人参汤

【方源】《衷中参西》卷三。

【组成】生石膏二两(捣细) 生杭芍八钱 生山药六钱 人参五钱(用野党参按此分量,若辽东真野参宜减半,至高丽参断不可用) 甘草二钱

【用法】上五味,用水四钟,煎取清汤两钟,分二次温饮之。

【主治】下痢,或赤或白,或赤白参半,下重腹疼,周身发热,服凉药而热不休,脉象确有实热者。

【方论选录】此方即《伤寒论》白虎加人参汤,以芍药代知母、山药代粳米也。痢疾身热不休,服清火药而热亦不休者,方书多委为不治。夫治果对证,其热焉有不休之理?此乃因痢证夹杂外感,其外感之热邪,随痢深陷,永无出路,以致痢为热邪所助,日甚一日而永无愈期。惟治以此汤,以人参助石膏,能使深陷之邪,徐徐上升外散,消解无余。加以芍药、甘草以理下重腹疼,山药以滋阴固下,连服数剂,无不热退而痢愈者。

【临证举例】赤白痢 一叟,年六十七,于中秋得痢证,医治二十余日不效。后愚诊视,其痢赤白胶滞,下行时,觉肠中热而且干,小便亦觉发热,腹痛下坠并迫。其脊骨尽处,亦下坠作痛,且时作眩晕,其脉洪大有力,舌有白苔甚厚。愚曰:此外感之热挟痢毒之热下迫,故现种种病状,非治痢兼治外感不可。遂投以此汤二剂,诸病皆愈。其脉犹有余热,拟再用石膏清之,病家疑年高,石膏不可屡服,愚亦应聘他往。过二十余日,痢复作,延

他医治疗,于治痢药中,杂以甘寒濡润之品,致外感之余热永留肠胃不去,其痢虽愈,而屡次反复,延至明年仲夏,反复甚剧。复延愚诊治,其脉象、病证皆如旧,因谓之曰,去岁若肯多服石膏数两,何至有以后屡次反复,今不可再留邪矣,仍投以此汤,连服三剂,病愈而脉亦安和。

74827 通脉四逆加芍药汤

【方源】《伤寒活人指掌》卷五。

【组成】甘草六钱二字半 附子(大者)一枚 干姜一两 芍药六钱二字半

【用法】水三大盏,煎取一盏半,去滓,分二服。

【主治】少阴腹痛,或泄利下重。

74828 通脉四逆加猪胆汁汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四逆加猪胆汤(《外台》卷六引《小品方》)、四逆加猪胆汁汤(《普济方》卷三一八)。

【组成】甘草二两(炙) 干姜三两(强人可四两) 附子(大者)一枚(生,去皮,破八片) 猪胆汁半合(无猪胆,以羊胆代之)

【用法】上四味,以水三升,煮取一升二合,去滓,内猪胆汁,分温再服。其脉即来。

【功用】《历代名医良方注释》:回阳救阴。

【主治】①《伤寒论》:霍乱,吐已下断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝者。②《退思集类方歌注》:阴盛格阳,手足厥冷,脉微欲绝,面赤咽疼烦躁者。

【方论选录】《历代名医良方注释》:此方回阳救阴,双管齐下,乃治霍乱吐下将止,阴阳气并竭,故为此两两斡旋之方也。一方面仍用通脉扶阳,一面重加胆汁益阴。胆汁气血有情,味苦健胃,能刺激神经,鼓舞细胞,奋起一身体工机能,此方将通脉之辛温,融纳于胆汁润沃之中。就阳方面解说,为激发阴气,以为藏起亟之本;就阴方面解说,为维护残阳,以为摄阳奠定之根。方注曰分温再服,其脉即出,履险如夷,煞具旋乾转坤,拨乱反正手段,

此中分际,此项疗法,岂但从治、岂但正治,学者所当深深体认也。

遯

74829 遯巡酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】桃花三两三钱(三月三日收) 马蔺花五两五钱(五月五日收) 脂麻花六两六钱(六月六日收) 黄甘菊花九两九钱(九月九日收)

【用法】上各阴干,十二月八日取腊水三斗,待春分取桃仁四十九枚好者(去皮尖)、白面十斤正,同前花和作曲,纸包四十九日。用糯米饭一升,白水一瓶,曲一丸及面一块,封良久成矣,如淡,再加一丸。

【功用】补虚益气,益寿耐老,好颜色。

【主治】一切风痹湿气。

74830 遯巡散

【方源】《传信适用方》卷二引李武仲方。

【组成】高良姜一块(约二寸许) 干全蝎一枚(瓦上焙干)

【用法】上为细末。以手指蘸药于齿患处,须擦令热透。须臾吐得少涎,以盐汤漱口。

【主治】①《传信适用方》:新久风牙,疼痛不可忍。②《百一》:腮颊肿痛。

【临证举例】风牙 《普济方》:鲍子明,常患风牙,腮颊肿痛不能忍。予以此方授之,出涎数口即愈。

駟

74831 駟龙珠

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】白花蛇五钱(酥油炙) 番木鳖一个(酥炙) 半夏一钱五分 虎胫骨一两(酥炙) 麻黄三钱(去节) 乳香三钱 寒水石四两(盐泥固,火煨红) 孩儿茶一钱五分 没药三钱

【用法】酒糊为丸,如弹子大,放铅盒内,起白毛取出,揩毛。每用一丸,先灯上烧烟

起,再为末,好酒送下。药后汗出如雨,不可见风,汗干即愈。

【主治】中风。

74832 駟龙散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】珍珠八分 牛粪一两(十二月生用,余月烧灰存性) 铁锈一两

【用法】上为细末。以猪脑加醋调敷疮口三五次,干再易之。

【主治】发背痈疽,破与不破二者之间。

【宜忌】《准绳·疡医》:凡发毒品味忌食。

74833 駟珠散

【方源】《重庆堂随笔》。

【异名】胜灵丹(《外科医镜》)。

【组成】龙眼核

【用法】上为末。外敷。愈后无瘢。

【功用】止血定痛。

【主治】刀刃、跌打诸伤。

驗

74834 驗胎法

【方源】《医学纲目》卷三十五引《灵苑》。

【异名】探胞汤(《三因》卷十七)、川芎散(《卫生家宝产科备要》卷六)、探胎汤(《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》)、探胎饮(《医统》卷八十五)。

【组成】真川芎

【用法】上为细末。每服一匕,浓煎艾汤调下。腹内渐动,是有胎也。

【功用】验胎。

【主治】妇人经脉不行已经三月。

【方论选录】《串雅内编选注》:川芎常用于月经困难、经闭腹痛、难产、胞衣不下等症,具有活血行气的功能。故凡妊娠之可使胎动,再佐以具有安胎作用的艾叶煎汤,即可达到验胎,而又安胎的作用。

【备考】《普济方》本方用法:如药后胎不转动,腰重如石,可用酒调下。

74835 驗胎散 《女科指掌》卷二。为《医学纲

目》卷三十五引王海藏方“神方验胎散”之异名。见该条。

74836 验方千捶膏

《全国中药成药处方集》(西安方)。为原书“白龙膏”之异名。见该条。

骏

74837 骏马散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】金枣丹 雄枣丹 中白散 冰硼散各一钱 黄连七分 冰片三分 犀黄二分五厘

【用法】上为极细末。吹入。

【主治】牙龈腐烂，穿腮落齿，臭秽难闻，疼痛不堪。

绿

74838 绿云散

【方源】《普济方》卷一八八。

【组成】柏叶 百合 人参 阿胶(炙令燥)各三两

【用法】上为散。每服二钱，用糯米粥饮调下。

【主治】吐血。

绣

74839 绣球丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】樟冰 轻粉 川椒 枯矾 水银 雄黄各二钱 枫子肉一百枚(别研)

【用法】上为细末，同大枫子肉再研和匀，加柏油一两化开，和药搅匀作丸，如龙眼大。于疮上擦之。

【主治】一切干、湿疥疮，及脓窠烂疮，瘙痒无度者。

【备考】《金鉴》本方用法：上药先以鼻闻，次擦患处。

74840 绣球丸

【方源】《串雅补》卷五。

【组成】苦参一两 黄柏五钱 枯矾二钱五分 雄黄一两

【主治】疥疮。